

بالقربية والبنطرية والفرسية والاندلسية
والبرطانية والبلانية واليونانية
المواد والمسارد



إدوار غَالِب المَوْسُوعَة

٢٤٢٠ صَفْحَة • ٣١٤٦٤ مَادَّة

٦٩٦٢ رَسْمًا • ٢٤ لَوْحَة مَلَوْنَة

فِي عُلُومِ الطَّبِيعَةِ

تَبْحَثُ فِي الزَّرَاعَةِ وَالنَّبَاتِ وَالْحَيَوَانَ وَالْجَيُولُوجِيَا



Bibliotheca Alexandrina
0139993

دارالمشرق بيروت

الأستاذ غَالِبُ
مهندس زراعي

الموسوعة في علوم الطبيعة

تبحث في الزراعة والنبات والحيوان والطير والسماك والحشرات والفطور
والجراثيم والأمراض الحيوانية والنباتية والمصطلحات العلمية على اختلافها
أخصها الفيزياء والكيمياء والرياضة والجيولوجية والطبيعة والحقوق
وتتألف من أربعة مجلدات يحترق أثرها على مسار المصطلحات باللغات :
الألمانية ، الإنكليزية ، الإيطالية ، الفرنسية ، اللاتينية ، واليونانية

طبعة ثانية محدّدة

المجلد الأول
من الألف إلى الذال

مَنشورات :
دار المشرق ش.م.م
ص.ب. ٩٤٦ - بيروت ، لبنان



الكَتَوِزِيع :
المكتبة الشرقية - ساحة النجمة
ص.ب. ١٩٨٦ - بيروت ، لبنان



الرسوم :

جورج ديب

جورج غنطوس

جان قرطباوي

جهاد جبر

سليم غصن

المجموعة : ISBN 2-7214-2148-4

المجلد الأول : ISBN 2-7214-2149-2

يحتوي هذا المجلد من

الموسيقى في علوم الطبيعة

١١١٥٢ مادة

٢٦٠٨ رسوم

٨ لوحات ملونة

مُقَدِّمَةُ الطَّبْعَةِ الْأُولَى

يسرّنا ان نرفّ الى ابناء الضاد — ولا سيما العاملون منهم على النهضة باللغة مجاراةً لأحداث العصر ، وتلبيةً لمختلف حاجاته وتكاليفه ؛ الغيّر على صفائها الأصيل ان تشوبه حوشية لفظ دخيل باسم العلم ، او رطانة تعبير غريب بحجة دقة البحث — هذه الموسوعة الجديدة ، شاملة علوم الطبيعة بأنواعها وتفرعاتها ، مفردةً ومجتمعة ، نظرية وتطبيقية في المجتمع الانساني المعاصر . فن الفلاحة والزراعة الى النبات في متميز ضروريه ، الى الحيوان في متعدد فروعه وشعبه ، الى الطفيليات والجراثيم ، وما قد ينتج بعضها من ادواء نباتية وحيوانية ، الى الفيزياء والكيمياء ، والرياضيات ، والجيولوجية ، والفلك ؛ الى اثر كل ذلك في المجتمع وعلاقة الناس به فائدةً واستخدماً ، ووقايةً وعلاجاً ، ومعاملات قانونية ؛ تتوالى الابحاث وفقاً للترتيب الابجدي العربي ، يقابلها ، في كل عنوان ، اسمها باللاتينية ، لغة العلم ، وباللغات الاجنبية . هذا ، مع الحرص على الجمع بين العلم والادب بإيراد النكتة اللغوية ، والشاهد الشعري ، والقول المأثور ، والحكمة البالغة ، والمثل الجاري ، والنصيحة العملية ، بما يلائم الموضوعات المدروسة . وكل ذلك في اوجز تعبير ، وأبلغ بيان ، واشمل إحاطة ، وأوضح رسم ؛ مما يجعل الكتاب سفر علم وادب ؛ يرضى عنه الاختصاصي المدقق ، ويرحب به اللغوي البصير ، ويهشّ له الاديب المثقّف ، ويفيد منه كل طالب علم على الاطلاق .

فشكراً للمؤلف ، وهنيئاً للمطالع ، ومرحى للبنان يشهد ، بهذا العمل ، رفع سلك جديد في صرحه اللغوي الشامخ .

بيروت في ٩ شباط ١٩٦٥

الدكتور فؤاد افرايم البستاني
رئيس الجامعة اللبنانية

توطئة الطبعة الأولى

لمست في لبنان والبلاد العربية ، حيال العلوم الطبيعية ، آراء متضاربة ونظريات متباينة ومتشابهة ، يمكن تلخيصها في نظريتين :

اولاهما تقضي بوجوب بقاء اللغة العربية على وضعها وما فيه من جمود لان قوامها تراث يرتكز على ناسوت لا يسير بركاب التطور العلمي الحديث .

والنظرية الثانية تقول بنزذ كل قديم ناقص وتجنّب كل عتيق معتلّ ثم بتعريب كلمات جديدة ونحت اخرى لتفي بالقصد العلمي الصحيح والمعنى الصريح وتجاري النزعة التطورية التي تهيمن على الطاقة الفكرية الحديثة .

أما الصواب فأن يؤخذ بالنظريتين وتطبيقهما معاً ، فالعربية غنيّة بالمبهمات التي يجب تحديدها واستعمالها . ولا يجوز حرمان لغتنا ممّا وصل اليه العلم والفنّ في عصر الكهرباء والذرة بعد عصور الابل والبخار . وهذا ما يجعلني اميناً على التكريس ومجتهداً طموحاً في مواكبة التطور الواعد .

يوم بدأت هذا العمل الضخم لم تراودني رغبة او طموح في مجازاة آية موسوعة اخرى ولا في الاتيان بسفر فريد من نوعه . انما هدفت الى ايجاد اداة عمل طيّعة للمشتغلين في هذا الحقل العلمي والى ابراز موسوعة لا تعنى الا بالعلوم الطبيعية ومشتقاتها في عصر اصبح الاختصاص من لزومياته ومقومات الحياة فيه .

لا شيء اصعب من صياغة التحديد العلمي لا سيما اذا كانت المفردات غريبة عن اللغة المتداولة . ولا شيء اصعب من تعريف المفردات بمصطلحات قد يسلم بها البعض ويناقشها البعض الآخر . وبرغم هذه الصعوبات التي اعترضتني بذلت اسخى ما يمكن بذله لتلافي كل جدل ولوضع التحديدات والمصطلحات التي اقرّها كبار الباحثين في هذا الموضوع كما استنبطت ما اهمله الذين سبقوني في حقل كثرت ثروته وقلّ الباحثون فيه .

وما الموسوعة العلمية التي ازفها الآن الى قراء العربية وأضعها تحت تصرفهم سوى نتيجة جهود فرد راعه ما لمس من نقص وجمود في لغة بلاده فجاء يسدّ الكثير من الفراغ الكبير الذي اوجده ذلك التقاعس المرير والخوف الاستنباطي العقيم .

الموسوعة تحدثكم عن الطبيعة والرياضة والكيمياء والفيزياء والخصوبة والزراعة . وترشدكم الى خواص النبات وصفاته المميزة وطريقة استعماله . وتبحث في الحيوان والسماك والطير وتبيّن بين النافع منها والضارّ ثم تتناول الحشرات والفطور والجراثيم بمعظم رتبها وفصائلها وأجناسها وأنواعها وما يعترى الحيوان والنبات من امراض واوصام وطرائق معالجتها والوقاية منها .

وهي تشمل ، فضلاً عن ذلك ، مجمل علوم الزراعة والنبات والتربة وما يمتّ اليها بصلة . وتماماً للفائدة اضيفت اليها ما تيسّر من الالفاظ والتعابير القانونية التي لا يستغني عنها الباحث في هذه الحقول .

عسى ان اكون قد اسديت خدمة سوف تعود بالنفع على لبنان وعلى العالم العربي اجمع . لان هدي الاقصى كان ، ولما يزل ، الاسهام قدر المستطاع في تعزيز العربية وتزويدها بموسوعة تصلح ، بحثاً وتنقيباً ونتاجاً ، لخدمة العلم والمعرفة .

الناسُ للناسِ والدنيا مكاتفةُ والحُرُّ مَنْ نفعَ الناسَ بما انتفع

بيروت في ٧ شباط ١٩٦٥

الأوارُ غَالِبُ

مُقدِّمة الطبعة الثانية

تصدر الطبعة الثانية من «الموسوعة في علوم الطبيعة» عن «دار المشرق» بعد أن أشبعها المؤلف المهندس الزراعي ادوار غالب ، تنقيحاً طوال عشرين سنة انقضت على الطبعة الأولى . وقد زاد عليها نحو سبعة آلاف مُفردة فأصبحت تضم أكثر من واحد وثلاثين ألفاً من المفردات . تتناول الموسوعة العلميّة هذه مسائلَ النبات والحيوان والطير والسمك والحشرات بالتعريف الصحيح ، الكامل والدقيق . وتشير الى ما تتعرض له من أمراض تحملها الجراثيم ، والى سبل الوقاية والعلاج ولا تغفل عما يتعلّق بها في حقول الفيزياء والكيمياء والجو والأرض والقانون بحيث لا تبقى زيادةٌ لمستزيد .

إنها ميوّبة نبويّاً حديثاً تبعاً للتسلسل الأيجدي . وازاء كلّ مفردة عربيّة نظيرها في اللاتينيّة والفرنسيّة والانكليزيّة مع رسوم لمعظمها من وضع المؤلف .

استعان المهندس غالب بالمراجع العربيّة المتوفرة وبالمراجع الأجنبية الوفيرة وعاد الى خبرته الطويلة العميقة في هذا المجال . وقد جعل لموسوعته فهرساً أيجدياً ضمّ جميع الألفاظ العلميّة اللاتينيّة والفرنسيّة والانكليزيّة والالمانية والايطاليّة التي وردت في أجزاءها الثلاثة مع رقم المادة تسهيلاً للرجوع إليها ، وهكذا أصبحت ستّ موسوعاتٍ في واحدة .

ابن البيطار ، أشهر علماء الطبيعة ، عند العرب في الاندلس في القرن الثالث عشر عرّف في كتابه «الجوامع لمفردات الأدوية والأغذية بالنبات وأسمائه وصفاته وأماكنه» تعريفاً بدائياً وجمع وصفات القدامى الطبيّة من المعدن والنبات والحيوان ، لكنّه ما تعدّى حدّ الدليل . والمعاجم والبحوث الطبيعية اللاحقة أعوزها الشمول والتجديد والمنطق ، حتى كانت دائرة المعارف التي تولاها البساتنة (المعلم بطرس وسليم ونجيب ثم فؤاد افرام) على مدى أجيال وما تزال في طور الأشجار .

الآبيل ، مثلاً ، في موسوعة ادوار غالب ، ليس ضرباً من النبات ، كما في القواميس السابقة التي لا تريد الباحث تعريفاً ، بل هو نوع من العرعر شجرته صغيرة القدّ تعلو من ٣ الى ٤ أمتار .

أوراقها حرشفية ، مهدبة ، متقابلة ، صلبة ، لسنة ، مدببة ، شائكة العقصة ، عابقة الخضار ، أزهارها وحيدة المسكن . ثمارها شويّة الشكل ، قطرها نحو ٨ مم . وهي فردية التجميع ، مغدبة اللون ، مستطيلة الأهن المنحرفة . وبعد هذا التعريف المفصل الوافي يشير المؤلف الى فوائده الطيبة .

وابن دابة ليس ضرباً من الطير ، بل هو الغراب الأبقع له خصائصه الواضحة . وكذلك الاسماك والحشرات والجراثيم والفطور .

لقد صرف ادوار غالب زهرة عمره ، أربعين سنة ، بصبر الناسك وتجرده وحرارة ايمانه في هذه الموسوعة حتى أتمّها على أكمل وجه فسدّ فراغاً كبيراً في حقل البحث العلمي بالعربية عجزت عنه جامعة دول .

من أهمّ المصاعب التي واجهها افتقار لغة الضاد الى المصطلحات الدقيقة والمصادر الوثيقة فاضطرّ أن يشتقّ مفردات جديدة قياساً او استنسافاً توافق عبقرية اللغة وأصولها وتقاليدها فكان في هذا السياق راشداً خلافاً .

أمّا أسلوبها فوجيز سلس واضح دقيق بليغ . لا يخلو من استشهاد بنادرة أو حكمة أو مثل أو بيت من الشعر .

هنيئاً للمكتبة العلمية العربية بهذا العمل الأكاديمي الصارم ، وهنيئاً للمؤلف بصنيعه الرائع ولدار المشرق بمجدها الموصول في خدمة التقدّم .

الدكتور جميل جبر

رئيس نادي القلم - لبنان

توطئة الطبعة الثانية

كان لا بدّ في هذا الثلث الأخير من القرن الحالي ، الذي أّسم بالنهضة العلميّة ، والذي تحقّقت فيه أحلام بساط الريح : طائرة تمخر سكك الفضاء بسرعة الصوت ، وصاروخ موجّه بحاري الطيف ، ومركبة معراجيّة تهبط على القمر وأخرى تطلّ على المريخ ، وغيرها تدور حول الأرض... كان لا بدّ من مواجهة الواقع وما تفرضه منطلّبات الذرّة وامتطاء الاجواء وارتباد الكواكب من اختزال في التعبير ودقّة في التحديد وأمانة في الاداء .

دأبي في هذه الطبعة الثانية وما حوته من موادّ إضافية وقدرها نحو ٦٦٠٠ ، كان سلوك النهج الذي ارتسمته منذ بداية العمل ، أي تحرير الكلمة العلميّة من بيئة الإبهام والغموض أو من مداغل التشابك وإدخالها في صميم معترك الحياة النائرة انطلاقاً مع طاقة الفكر البشري المتدفقة ، إن صحّ التعبير ، من المدفق حيث ينبع الكنه الى المسيب. حيث يتجسّد التعبير .

كنت أميناً على التكريس إن كان فيه المطلب أو المغزى ومحتهداً في مواكبة مشاعل العلوم . هدي في الخروج بالتقنيّة العلميّة العربيّة من كهف الانكماش الضيق وإبلاجها هيكل الاشعاع الرحب حيث تلتقي غيرها من لغات الحضارة التي تهيمن عليها فكرة الاستحداث المستمرّ .

وأمنيّتي الآن ألاّ يقف عملي حيث وصل ، فالمتابعة ميسورة ورجال العلم والتنقيب كثر وعلى ازدياد . والله مع العاملين .

الاصطلاحات

قد رقنا ألفاظ هذه الموسوعة برقم متسلسل من واحد حتى النهاية ورتبناها ترتيباً قاموسياً ابجدياً حرفاً حرفاً ولم نعتبر الهمزة الممدودة ألفين ولا الحرف المشدد حرفين ووضعنا لمعظم النبات الاسم العلمي وقد اشرنا اليه بحرف (S) ثم الاسم الفرنسي وعلامته حرف (F) يتبعه الاسم الانكليزي وعلامته (E) وعلامة الاسم الالماني (D) والاسم الايطالي (I).

امّا الحيوان والطير والسماك والحشرات والفقور والجراثيم والأمراض فقد ذكرنا اسمها العلمي والفرنسي والانكليزي كما اقتصرنا على المسميات الفرنسية والانكليزية لسائر مواد الموسوعة.

هذا وقد خصصنا المجلد الرابع من الموسوعة فهرساً ابجدياً بجميع الألفاظ العلمية والفرنسية والانكليزية والالمانية والايطالية الواردة في هذا المؤلف مع رقم مادتها ليعود اليها من يهتّم بحثها وتفصيلها.

امّا المقتضبات التي استعملناها فهي :

كيلو	للدلالة على كيلوغرام	°	للدلالة على الاسم الموضوع من قبلنا
ل	للدلالة على لتر	*	للدلالة على وجود رسم
غ	للدلالة على غرام	م	للدلالة على متر
مغ	للدلالة على مليغرام	م ²	للدلالة على متر مربع
مي	للدلالة على ميكرون	م ³	للدلالة على متر مكعب
سغ	للدلالة على درجة سنتيغراد	سم	للدلالة على سنتيمتر
فر	للدلالة على درجة فارنهييت	مم	للدلالة على مليمتر
بم	للدلالة على درجة بومه	كم	للدلالة على كيلومتر

المراجع

لما كان ذكر مصادر هذه الموسوعة يتطلب أكثر من مئة صفحة ، اكتفينا بسرد أسماء أهم المؤلفات العربية والاجنبية التي اطلعنا عليها وكانت لنا خير دليل .

وما نحن نوردها بالتسلسل الابجدي شاكرين قادرين واضعها واصحابها العلماء الأفاضل الذين يسرّوا لنا العمل بجهودهم الشاقة سائلين الله تعالى بأسمنا الخاص وباسم العلم والانسانية والثقافة الاجتماعية ان يكافئهم احسن الجزاء .

- | | |
|--------------------------------|---|
| ابن البيطار | مفردات ابن البيطار |
| ابن زكريا | معجم مقاييس اللغة ، دار احياء الكتب العربية ، القاهرة ١٣٦٩ هـ . |
| ابن سيدة | المختص |
| ابن منظور (العلامة جمال الدين) | لسان العرب ، دار صادر ودار بيروت ، بيروت ١٩٥٥-١٩٥٦ |
| ابو النصر (عادل) مهندس زراعي | اصلاح زراعة الاشجار المثمرة في لبنان ، المطبعة الوطنية ، بيروت ١٩٣٧ |
| | البطاطا والبندورة ، مطبعة الاتحاد ، بيروت ١٩٤٨ |
| | الحشرات التي تعترى جميع المزروعات ، مطبعة الكشاف ، بيروت ١٩٣٣ |
| | الحشرات الزراعية في لبنان ، المطبعة الوطنية ، بيروت ١٩٦٢ |
| | الحشرات والامراض التي تعترى النبات |
| | العناكب التي تصيب الاشجار المثمرة ، المطبعة الوطنية ، بيروت ١٩٥٩ |
| | تاريخ الزراعة القديمة ، بيروت ١٩٦٠ |
| | تاريخ النبات ، بيروت ١٩٦٢ |
| | زراعة الايكيدنيا ، المطبعة الوطنية ، ١٩٥٧ |
| | زراعة التين ، المطبعة الوطنية ، بيروت ١٩٥٨ |
| | زراعة الحمضيات ، المطبعة الوطنية ، بيروت ١٩٥٨ |
| | زراعة الدراق ، المطبعة الوطنية ، بيروت ١٩٥٧ |
| | زراعة الزيتون ، المطبعة الوطنية ، بيروت ١٩٣٩ |
| | زراعة الفستق ، المطبعة الوطنية ، بيروت ١٩٥٨ |
| | زراعة الكرز ، المطبعة الوطنية ، بيروت ١٩٥٨ |
| | زراعة الكروم |
| | زراعة اللوز ، المطبعة الوطنية ، بيروت ١٩٥٧ |
| | زراعة الموز ، المطبعة الوطنية ، بيروت ١٩٥٩ |
| الآباء اليسوعيون | المشرق |

- الاصمعي كتاب النبات والشجر وكتاب النخل والكرم ، المطبعة الكاثوليكية ١٩٠٨
الانطاكي (داود بن عمر) تذكرة اولى الالباب والجامع للعجب العجائب ، مكتبة البابي الحلبي وأولاده بمصر ١٩٥٢
البخاري (مصطفى) وعبد الحق (توفيق) أمراض النبات ، مكتبة الانجلو المصرية
البستاني (الشيخ عبدالله) البستان ، المطبعة الاميركانية ، بيروت ١٩٢٧ و ١٩٣٠
البستاني (المعلم بطرس) دائرة المعارف ، بيروت ١٨٧٦ ، مطبعة المعارف بيروت ١٨٨٤-١٨٨٤ ،
المطبعة الأدبية بيروت ١٨٨٧ ، مطبعة الهلال بمصر ١٨٩٨ و ١٩٠٠
عحيط المحيط ، بيروت ١٨٩٧ و ١٨٧٠
كتاب الخيوان ، مصر ١٣٢٣ هـ .
البحراني التمريقات ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ١٩٣٨
الجندي (علي) الكيمياء الحيوية ، دمشق ١٩٣٠-١٩٣٢
الحسيني (الدكتور احمد حاتم) ودميان (الدكتور اميل شنوده) بيولوجية الحيوان العملية ، دار المعارف بمصر ، ١٩٦٢
الحسيني (الدكتور احمد حاتم) وحافظ (الدكتور محمود) تشريح الحيوان ، مكتبة الانجلو المصرية ، ١٩٥٦
الحلادي (روحي) الكيمياء عند العرب
الدميري حياة الحيوان الكبرى
الشرتوني (سعيد) اقرب الموارد ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ١٨٨٩-١٨٩٣
الشهابي (الامير مصطفى) مهندس زراعي
الاشجار والانجم المنيرة ، دمشق ١٩٢٤
الرسالة النباتية
الزراعة العملية الحديثة (طبعة ثانية) ، دمشق ١٩٣٥
معجم الالفاظ الزراعية ، دمشق ١٩٤٣
معجم المصطلحات الحراجية ، دمشق ١٩٦٢
القاموس المحيط ، مؤسسة فن الطباعة ، مصر ١٩١٣
الفيروزبادي شرح الادوية المفردة من قانون ابن سينا
القازويني القاصي (مصطفى محمود) والبحري (محمد)
اصلاح الاراضي ، مكتبة الانجلو المصرية ١٩٥٧
المعلوف (الفريق امين باشا) معجم الحيوان ، مصر ١٩٣٢
النبوي (الدكتور صلاح محمود)
ثمار الفاكهة ، مكتبة الانجلو المصرية ١٩٥٩
النجومي (اللواء عبدالله باشا) وزين الدين (الدكتور حبيب فرح) والمنيري (الدكتور محمد عبد المنعم) وفاهد
(الدكتور مصطفى كمال) الطيور المصرية ، طبعة ثانية ، دار الفكر العربي ١٩٥٠
الهلالي (الدكتور عباس فتحي) النباتات (طبعة ثانية) ، مكتبة النهضة المصرية ١٩٥٨
الياس (الياس انطون وادوار انطون) القاموس المصري عربي انكليزي (الطبعة الثامنة) ، القاهرة ١٩٥٩
القاموس المصري انكليزي عربي (الطبعة الثالثة عشرة) القاهرة ١٩٦٣
بديقيان- (ارمناك) المعجم المصور لاسماء النبات ، مطابع ارجوس وبابازيان ، القاهرة ١٩٣٦
بوست (الدكتور جورج) نبات سورية وفلسطين والقطر المصري وبواديها ، بيروت ١٨٨٤
بوشادي (احمد ذكي) تربية النحل ، مطبعة الشباب ، القاهرة ١٩٣٠
حسن (الدكتور احمد سالم) الحشرات الاقتصادية (الطبعة الثانية) ، القاهرة ١٩٤٤
حماد (الدكتور شاكر محمد) علم الحشرات (الطبعة الثالثة) دار المعارف بمصر ، ١٩٦١
زين الدين (الدكتور فرج) وابو طيره (توفيق محمد) الثدييات ، دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٥١
سوليالك (علي) وقائع الاقتصاد التعاوني ، مطبعة ابن زيدون ، دمشق ١٩٥٠
شرف (الدكتور محمد) معجم العلوم الطبية والطبيعية ، القاهرة ١٩٢٦

- شبيب (الاستاذ خليل) المعجم القانوني ، مصر ١٩٤٩
- صدقي (حسن) القطن المصري ، مكتبة النهضة المصرية ١٩٥٠
- عبد الرؤوف (احد اسماعيل) زراعة الحقل ، مطبعة الامة بدمهور ١٩٤١
- علي (محمود بيومي) بساين الزيت ، مطبعة المقتطف والمقطع بمصر ١٩٢٥
- فارس (الدكتور محمد ابراهيم) وحسن (الدكتور محمد يوسف) قواعد البيولوجية العامة والتطبيقية ، دار النهضة العربية طبعة ثانية ١٩٦١
- فياض (محمد محمد) وعبد السلام (حسن) وابراهيم (احمد امين) الكيمياء ، مطابع مذكور ، مصر ١٩٥٤
- عجاهد وابو ريا ومنقريوس (الدكاترة) علم البيئة النباتية (ترجمة) مؤسسة فرانكلين ١٩٦٢
- مجمع نواد الاول مجموعة المصطلحات العلمية والفنية
- محمود (عبد العزيز) والبرعي (محمود) وريحان (حسن) معجم المصطلحات العلمية ، مصر ١٩٥٦
- مصطفى (عبد العزيز) والزيات (احمد حسن) وعبد القادر (حامد) والنجار (محمد علي) المعجم الوسيط ، مطبعة مصر ١٩٦٠-١٩٦١
- معلوف (الاستاذ تيموثي فلييب) الاشجار المثمرة (التفاح) ، بيروت ١٩٥٢
- مفتاح (الدكتور رمزي) احياء التذكر في النباتات العلية والمفردات المطارية ، مصر ١٩٥٣

ALEXANDER & ELSIE B. KLOTS, *Les Insectes vivants du monde*, Hachette, 1963.

ALPHANDÉRY EDMOND, *Encyclopédie apicole*, Baillière et Fils, 1945.

ANDRÉ G., *Chimie agricole du sol*, Baillière et Fils, 1931.

ANDRÉ G., *Chimie agricole végétale*, Baillière et Fils, 1924.

Annales agronomiques de 1936 à 1962, Dunod.

AUBERT PH. et LUGEON A., *Arboriculture fruitière moderne*, 4^e édition, Maison Rustique.

AUGÉ-LARIBÉ MICHEL, *La révolution agricole*, Albin Michel, 1955.

AUSTIN O. & SINGER A., *Les Oiseaux*, Flammarion, 1962.

BACH DENIS, *Classification des plantes vasculaires*, SEDES, Paris.

BACH DENIS, *Organisation générale et reproduction des plantes vasculaires*, SEDES, Paris.

BACH DENIS, *Physiologie végétale*, SEDES, Paris.

BALACHOWSKY A. et MESNIL L., *Les insectes nuisibles aux plantes cultivées*, Établissements Busson, Paris, 1936.

BAROT A., *Les plantes mellifères*, Ch. Mendel, Paris, 1932.

BELLAIR G., *Les arbres fruitiers*, Baillière et Fils, 1935.

BELOUSSOFF W., *Les problèmes de la géologie et de la géochimie de l'hélium*, Hermann et Cie, 1935.

BERTRAND A., *Plantes grasses*, Maison Rustique, 1952.

BILANS, *L'Economie rurale*, M. Rivière et Cie, 1959.

BŒUF F., *Les bases scientifiques de l'amélioration des plantes*, Lechevalier, 1936.

BŒUF F. et VESSEREAU A., *Recherches et expérimentation en agriculture*, t. I et II, Baillière et Fils, 1948.

BOIS D., *Les plantes alimentaires*, Lechevalier, 1937.

BOIVIN ANDRÉ, *Bactéries et virus*, Presses Universitaires de France, 1947.

BONNEMAISON L., *Les parasites animaux des plantes cultivées et des forêts*, SÉIA, Paris, 1953.

BONNIER GASTON, *Les plantes des champs et des bois*, Baillière et Fils.

BOUBIER M., *Les oiseaux*, Gaston Doin et Cie, 1926.

BOULOUMOY L., s.j., *Flore du Liban et de la Syrie*, Vigot Frères, 1930.

BOUVIER-AJAM MAURICE, *Histoire des doctrines économiques*, Plon, 1952.

BOUVIER-AJAM MAURICE, *L'Economie en mouvement*, Plon, 1954.

- BOUVIER-AJAM MAURICE, *Richesse et misère du monde*, Plon, 1953.
- BOUVIER R., *Les migrations végétales*, Flammarion, 1946.
- BOVEY R., *La défense des plantes cultivées*, Éditions Payot, Lausanne, 1967.
- BREHM, *La vie des animaux illustrée*, Baillière et Fils, 1868.
- BRICOUT P., *Microénergétique*, Gauthier-Villard, 1933.
- BRUNEL A., *Traité pratique de chimie végétale*, Georges Frère, Tourcoing, 1948.
- BUISSON M., *Caractéristiques physiques et mécaniques du sol*, Dunod, 1942.
- BUSNEL R. G. et GIRAU J., *La protection acoustique des cultures*, INRA, 1958.
- CAGNY P. et GOVIN R., *Hygiène et maladies du bétail*, Baillière et Fils.
- CAILLARET H. et SOUTY J., *Monographie des principales variétés de pêchers*, Société bordelaise d'Imprimerie, Bordeaux, 1950.
- CHAIGNEAU A., *Les animaux nuisibles*, Maison Rustique, 1947.
- CHALAND GERMAIN, *La sélection végétale*, Presses universitaires de France, 1946.
- CHAMPY, *La vie cellulaire*, Flammarion, 1947.
- CHANORIN E., *Botanique agricole*, Hachette, 1946.
- CHANORIN E., *Chimie agricole*, Hachette, 1948.
- CHEVALIER A., *Révolution en agriculture*, P.U.F., 1946.
- CHOUARD PIERRE, *La multiplication végétative*, Hermann et Cie, 1934.
- CLASON W. E., *Dictionary of nuclear science and technology*, Elsevier, 1958.
- COLIN HENRI, *La chimie des plantes*, Flammarion, 1945.
- COMBES R., *La vie de la cellule végétale*, Armand Colin (3^e éd.), 1942.
- CORD E., *Géologie agricole*, Baillière et Fils, 1920.
- CORNEVIN CH., *Plantes vénéneuses*, Firmin-Didot et Cie.
- CORNUT P., *Maladies à virus des plantes cultivées*, INRA, 1959.
- COSTANTIN et FAIDEAU, *Les plantes*, Librairie Larousse, 1922.
- COUPIN HENRI, *La fécondation*, Baillière, 1934.
- CONTANCEAU M., *Arboriculture fruitière*, Baillière, 1953.
- CROZIER W. J., *Déterminisme et variabilité dans le comportement des organismes*, Hermann et Cie, 1935.
- CUÉNOT L., *L'Espèce*, G. Doin et Cie.
- GURASSON G., *Traité de pathologie exotique vétérinaire et comparée*, Vigot Frères, 1942.
- CUROT E., *Fécondation et stérilité*, Ch. Amat, 1921.
- DANGEARD P., *Traité d'algologie*, Lechevalier, 1933.
- DAUVILLIER A. et DESGUIN E., *La genèse de la vie*, Hermann et Cie, 1942.
- DECHAMBRE P., *Traité de zootechnie*, Ch. Amat, 1914.
- DEFLANDRE G., *Les flagellées fossiles*, Hermann et Cie, 1936.
- DELAORIX G., *Maladies non parasitaires des plantes cultivées*, Baillière et Fils, 1927.
- DELAORIX G., *Maladies parasitaires des plantes cultivées*, Baillière et Fils, 1916.
- DELICHEVALIÈRE G., *Les orchidées*, Maison Rustique, 1912.
- DEMOLON ALBERT, *Croissance des végétaux cultivés* (3^e éd.), Dunod, 1946.
- DEMOLON ALBERT, *Dynamique du sol* (4^e éd.), Dunod, 1948.
- DEMOLON ALBERT, *La génétique des sols*, Presses universitaires de France, 1949.
- DÉRIÉRE MAURICE, *Les applications pratiques de la luminescence* (2^e éd.), Dunod, 1946.
- DIEHL R., *Agriculture générale* (t. I, 1957; t. II, 1959), Baillière et Fils.
- DIFFLOTH, *Zootechnie générale*, Baillière et Fils, 1922.
- DORVAULT, *L'officine*, Vigot Frères, 1945.
- DYBOWSKI J., *Traité de culture potagère*, Baillière et Fils, 1924.

- EMBERGER LOUIS, *Les plantes fossiles dans leurs rapports avec les végétaux vivants*, Masson et Cie, 1944.
- FAES H., STACHLIN M., BOVEY P., *La défense des plantes cultivées* (4^e éd.), Payot, Lausanne.
- FERICELLI JEAN, *Le revenu des agriculteurs*, éd. Grenin, 1960.
- FIGUIER L., *La vie et les mœurs des animaux*, Hachette, 1868.
- FOURMARIER P., *Eléments de géologie* (4^e éd.), Masson et Cie, 1944.
- FOURNIER P., *Flore illustrée*, Lechevalier, 1951.
- FOURNIER P., *Les plantes médicinales et vénéneuses de France*, Lechevalier, 1948.
- FOURNIER P., *Les quatre flores de la France*, Lechevalier, 1951.
- FROMONT PIERRE, *La modernisation de l'agriculture*, Armand Colin, 1954.
- FRON ALBERT, *Sylviculture*, Baillièrre, 1934.
- FUNK et WAGNALLS COMPANY, *Britannica world language dictionary*, 1963.
- GALLAY, RAPIN, STALÉ, *Les engrais*, Payot, 1948.
- GAUDY M., *Manuel d'agriculture tropicale*, Maison Rustique, 1959.
- GARRAU J. G., *Les engrais* (2^e éd.), Dunod, 1955.
- DE GASPARIN CTE, *Cours d'agriculture*, Maison Rustique (3^e éd.).
- GÉROUDET P., *Les Oiseaux nicheurs d'Europe*, Éditions Silva, Zurich, 1964.
- GILLIARD E. THOMAS, *Les Oiseaux vivants du monde*, Hachette, 1962.
- GONDÉ H., CARRÉ G., JUSSIAUX PH., *Nouvelles leçons d'agriculture*, Maison Rustique, 1948.
- GRASSÉ PIERRE P., *Parasites et parasitisme*, Armand Colin, 1935.
- LE GRAVEREND J., *Les jardins méditerranéens*, Baillièrre et Fils, 1959.
- GUÉNAUX G., *Entomologie et parasitologie agricoles*, Baillièrre et Fils.
- GUILLAUMIN A., *Les plantes sauvages*, Payot, 1948.
- GUILLIERMOND A., *Le chondriome*, Hermann et Cie, 1934.
- GUILLIERMOND A., *Le système vacuolaire ou vacuome*, Hermann et Cie, 1934.
- GUILLIERMOND A. et MANGENOT G., *Biologie végétale*, Masson et Cie, 1946.
- GUYÉNOT E., *La variation et l'évolution*, Gaston Doin et Cie, 1950.
- HATT PIERRE, *Les mouvements morphogénétiques dans le développement des vertébrés*, Hermann et Cie, 1935.
- HITCHING FRANCIS, *Grands mystères du monde*, Éditions Albin Michel, 1980.
- HOMÈS M. V., *Alimentation minérale des plantes*, Masson et Cie, 1953.
- JEANNEL R., *Introduction à l'entomologie*, Boubée, 1948.
- JOUS E., LE GRAVEREND E., RÉGNIER R., *Les vergers de grand rendement* (2^e éd.), Maison Rustique, 1946.
- JOUZIER E., *Droit administratif rural*, Baillièrre et Fils, 1926.
- JOUZIER E., *Economie rurale*, Baillièrre et Fils, 1920.
- JOUZIER E., *Législation rurale*, Baillièrre et Fils, 1924.
- KAYSER ED., *Microbiologie agricole*, Baillièrre et Fils.
- KAYSER ED., *Microbiologie appliquée à la fertilisation du sol*, Baillièrre et Fils, 1924.
- KAYSER ED., *Microbiologie appliquée à la transformation des produits agricoles*, Baillièrre et Fils, 1931.
- KLOTZ L. J. et FAWCETT H. S., *Maladies des citrus*, Setco, 1952.
- KOLTZOFF N. K., *Les molécules héréditaires*, Hermann et Cie, 1939.
- KOLTZOFF N. K., *Physiologie du développement et génétique*, Hermann et Cie, 1935.
- KOSTITZIN V. A., *Evolution de l'atmosphère*, Hermann et Cie, 1935.
- KUHUHOLTZ-LORDAT G., *Précis de phytogénétique*, Hermann et Cie, 1952.
- LACEPÈDE, *Histoire naturelle*, Furne et Cie.
- LAMBERT J., *Agriculture générale* (4^e éd.), Desforges, 1959.

- LAMBERT J., *Agriculture spéciale* (4^e éd.), Desforges, 1959.
- LANGERON M., *Précis de mycologie*, Masson, 1945.
- Larousse agricole*, Librairie Larousse, 1921.
- LAUMONIER R., *Cultures florales méditerranéennes*, Baillière et Fils, 1959.
- LAVAL DR ED., *Les champignons*, Ch. Delagrave, 1912.
- LEDERER EDGAR, *Les caroténoïdes des animaux*, Hermann et Cie, 1935.
- LEDERER EDGAR, *Les caroténoïdes des plantes*, Hermann et Cie, 1934.
- LEFEBVRE A., *Les engrais*, Flammarion, 1938.
- LEMÉE ALBERT, *Dictionnaire descriptif et synonymique des genres de plantes phanérogames*, 8 vol., Brest, 1929-1941.
- LEFIGRE A. L., *Technique de la désinsectisation*, Desforges, 1947.
- LEROY A. et RIVOIRE A., *Les plantes vivaces*, Maison Rustique, 1932.
- LEUBA J., *Introduction à la géologie*, Armand Colin, 1925.
- L'HÉRITIER PH., *Génétique et Evolution*, Hermann et Cie, 1934.
- L'HÉRITIER PH., *Traité de génétique*, Hermann et Cie, 1938.
- LHOSTE JEAN, *Maladies des plantes cultivées*, Lechevalier, 1947.
- LIMASSET P., *Principes de pathologie végétale*, Dunod, 1945.
- LOTKA ALFRED J., *Théorie analytique des associations biologiques*, Hermann et Cie, 1939.
- LUTZ LOUIS, *Traité de cryptogamie*, Masson, 1942.
- LWOFF ANDRÉ, *L'Evolution physiologique*, Hermann et Cie, 1943.
- MAIRE R., *Flore de l'Afrique du Nord*, Lechevalier, 1949.
- MANSION (M. A.) J. E., *Harrap's Standard French and English Dictionary*, George G. Harrap and Company Ltd., 1961.
- MARESQUELLE H. J., *Déterminisme génétique du sexe chez les plantes*, Hermann et Cie, 1935.
- DE MARGERIE EM., *Critique et géologie*, Armand Colin, 1943.
- MARINESCO NÉDA, *Influence des facteurs électriques sur la végétation*, Hermann et Cie, 1932.
- MÉNÉGAUX A., *La vie des animaux illustrée, les mammifères*, Baillière et Fils.
- MEURICE R., *La fertilisation du sol et les engrais*, Maison Rustique, 1944.
- MONOD JACQUES, *Recherches sur la croissance des cultures bactériennes*, Hermann et Cie, 1942.
- MONTILLOT, *Les insectes nuisibles*, Baillière et Fils, 1935.
- MONVOISIN A., *Le traitement frigorifique des fruits et des légumes* (4^e éd.), Dunod, 1951.
- MORET LÉON, *Manuel de paléontologie végétale*, Masson et Cie, 1943.
- MOREUX AB. TH., *Comment prévoir le temps*, Dunod, 1925.
- MOTTET S.-HAMM J., *Arbres et arbustes d'ornement*, Baillière et Fils, 1952.
- MOUTERDE PAUL, S.J., *La flore du Djebel Druze*, Beyrouth, 1953.
- NEVEU-LEMAIRE M., *Parasitologie des plantes agricoles*, Vigot Frères, 1913.
- NOBÉCOURT PIERRE, *Contribution à l'étude de l'immunité chez les végétaux*, Bosc et Riou, 1927.
- Nouveau Larousse illustré*.
- PAGOTTET, *Viticulture*, Baillière et Fils, 1921.
- PAILLOT A., *Les insectes nuisibles des vergers et de la vigne*, G. Doin et Cie, 1935.
- PARDE L., *Les conifères*, Maison Rustique, 1946.
- PARDE L., *Les feuillus*, Maison Rustique, 1943.
- PAULIAN RENAUD, *Le polymorphisme des mâles de coléoptères*, Hermann et Cie, 1935.
- PERROT EM., *Matières premières du règne végétal*, Masson et Cie, 1944.
- PEYRE DR P., *Les cerisiers*, Lechevalier, 1946.
- PEYRE DR P., *Les pommiers*, Lechevalier, 1949.
- PIRON GABTON, *Traité d'économie politique*, t. I et II, Lib. du Recueil Sirey, 1954.

POCHON G. et DE BARJAC H., *Traité de microbiologie du sol*, Gauthier-Villars, 1952.

QUILLET, *Dictionnaire encyclopédique Quillet*, 1965.

RABAUD ÉTIENNE, *L'hérédité*, Armand Colin, 1921.

REBOUR H., *Les agrumes*, Baillière et Fils, 1957.

RENAULT RENÉ, *Chimie agricole*, t. I: *Chimie végétale*, 1955; t. II: *Biosphère*, Eyrolles Gauthier-Villars, 1958.

RICHARD HENRI, *Productivité de la terre*, Flammarion, 1959.

ROBERT PAUL, *Les agrumes dans le monde*, S.E.T.C., 1947.

ROULE D^r LOUIS, *Les poissons*, Delagrave, 1941.

SALMON JULIEN, *La vie des animaux illustrée, les oiseaux*, Baillière et Fils.

SAUFORCHE A., *Les engrais phosphatés*, Dunod, 1947.

SCHAEFFER L., GUINIER PH., OUDIN A., *Technique forestière* (2^e éd.), Maison Rustique, 1947.

SCHOEN M., *Problèmes d'asymétrie dans les processus biochimiques*, Hermann et Cie, 1936.

SCHMIDT K. & INGER R., *Les Reptiles vivants du monde*, Hachette, 1960.

SCHRIBAUX E. et MANOT J., *Botanique agricole*, Baillière et Fils.

SENEVET G. et ANDARELLI L., *Les moustiques de l'Afrique du Nord et du Bassin méditerranéen*, Lechevalier, 1959.

SIMON R., *Hérédité-Variation*, Dunod, 1952.

SOUÈGES RENÉ, *Embryogénie et classification*, Hermann et Cie, 1938-1939.

SOUÈGES RENÉ, *L'embryologie végétale*, Hermann et Cie, 1934.

SOUÈGES RENÉ, *La cellule embryonnaire*, Hermann et Cie, 1935.

SOUÈGES RENÉ, *La différenciation*, Hermann et Cie, 1936.

SOUÈGES R., *La vie végétale*, Flammarion, 1949.

SOUÈGES RENÉ, *La segmentation*, Hermann et Cie, 1935 et 1936.

TEISSIER G., *Les lois quantitatives de la croissance*, Hermann et Cie, 1937.

TEISSIER G., *Dysharmonies et discontinuités dans la croissance*, Hermann et Cie, 1934.

THIÉBAUT J., *Flore libano-syrienne*, Le Caire, 1936.

THOMAS P., *Manuel de biochimie*, Masson et Cie, 1946 (2^e éd.).

TOURNAY AUGUSTE, *Système nerveux végétatif*, Hermann et Cie, 1939.

ULRICH ROGER, *La conservation par le froid des denrées d'origine végétale*, Baillière et Fils, 1954.

URBAIN P., *Introduction à l'étude pétrographique et géochimique des roches argileuses*, Hermann et Cie, 1937.

VAYSSIÈRE P., *Principes de zoologie agricole*, A. Colin, 1940.

VERCIER J., *Arboriculture fruitière*, Hachette.

VERCIER B., *Culture des fleurs*, Hachette, 1932.

VERCIER J., *Culture potagère*, Hachette (8^e éd.).

VERNADESKY W., *Les problèmes de la radiogéologie*, Hermann et Cie, 1935.


VERPLANGKE GERMAIN, *Éléments de microbiologie*, Maison Rustique, 1932.

VIENNOT-BOURGIN G., *Les champignons parasites des plantes cultivées*, Masson et Cie, 1949.

VILLEMART A. et CHAUX R., *Les grandes fonctions de la chimie organique*, Hermann et Cie, 1950.

WATTIEZ N. et STERNON F., *Éléments de chimie végétale* (2^e éd.), Masson et Cie, 1942.

WILLSTAEDT HARRY, *L'analyse chromatographique et ses applications*, Hermann et Cie, 1938.



آءة



آأكار، بوليوم



آأكار أجرد

درقاته الصغيرة الكلوية الشكل في المستحضرات الطبية . وهو من النباتات السامة . بذوره مسهلة ودرقاته هاضمة ، تزيل الانتفاخ وتدر البول .

٤- آب Aout (F). August (E).

يعرف أيضاً بأغسطس . الشهر الثامن من السنة الشمسية وهو من شهور الصيف البالغة الحرارة . مدته واحد وثلاثون يوماً . في عقده الثاني تهب الرياح البوارح وينتهي بها السوم . وفيه يكثر سقوط الطل والمطر || تقويمه الزراعي : في الزراعة العامة الموسمية : انتهاء الدراس ونقل الحبوب وخزنها . خلع السم وحفظه . متابعة قطاف التبع وتجفيفه . قطف الذرة والدخن والبطيخ والشمام . متابعة حشر العلف وتكديسه . مباشرة جني القطن .

في المحاصيل : توزيع آخر وجبة من الاسمدة الازوتية المدنية . متابعة المرق والرعي ومكافحة العناكب والكهذب . في الأشجار المثمرة والكرمة والموز : متابعة جني الاجاص والدراق وأنواع التفاح التي بلغت الإدراك . متابعة ري التفاح من نوعي الستاركن والكولدن ومكافحة الاكاروز والمن القطني ومختلف الحشرات والأمراض على سائر الأشجار || الاستمرار في ري الموز وتسميده . جني اللوز اليابس . قطاف العنب . متابعة التطعيم الرقي وقطاف التين وتجفيفه .

في البقول : تحضير التربة بعد اقتلاع البقول الصيفية التي انتهى انتاجها ومباشرة الزراعات الحريفية والشتوية كزراعة الخيار والاسبانخ والثفت والفجل والملفوف والجزر والبطاطا والشوندر .

في الزهور : متابعة الاعتناء بجميع الزهور الموجودة وبجميع البذور المنتخبة . تحضير التربة للزراعات الحريفية والشتوية . تحضير المشاغل لاقبال الاقلام . في النواجن : متابعة الاعتناء بصحة المواشي وعدم

١- آءة* ، سَرْحَة Aegiceras (S). Aegicère (F). River mangrove (E). Unachter manglebaum (D). Eglicera (I).

جنس نباتات برية وزراعية زيبية من فصيلة الجناحيات « القشيات » . انواعه عديدة مختلفة المنابت ، منها منقعية وبعضها يكثر في الاودية الظليلة وغيرها يرغب في الرمل ، جميعها شجيرات وجنبات دائمة الاوراق المتعاقبة ، المعتقة الصغيرة ، البيضية او المستطيلة || ازهارها سنبلية او صيواني التجميع . ازهارها بيض . ثمارها قرنية محدبة عوجاء الشكل مرة الطعم || اوراقها وحلها تصلح للدباغة .

٢- آأكار* ، بوليوم Bunium (S). Bunion. Bunium (F). Earth-nut (E). Erdnuss (D). Bunio (I).

نبات عشبي بري طبي من سبط الاسباط وفصيلة الخيميات . يعتبر من الاعشاب السامة كالبشونكران . وهو قريب الشبه من البقدونس ، غير ان وريقاته ادق منها والسن . اما قنبها فخارجي نصف حاض وله زهر ابيض اللون . يوجد في جميع الاقاليم المعتدلة الحرارة وفي بعض البساتين الحضرية ، يستعمل في تفتيت الحصى ومعالجة الاورام . ويستخرج منه بالتقطير زيت طيار مضاد لغازات المعدة والمفص .

٣- آأكار أجرد* ، تلخوطه ، جوز أرقم Bunium bulbocastanum (S). Conopode à tige nue. Gland de terre. Châtaigne de terre (F). Arnut. Earth chestnut. Pig-nut (E). Knollenkümmel. Saükastanie (D). Bulbocastano, Pancaciolo, Castagna di terra. Noce di terra (I).

نوع آخر من الاأكار لكنه نبات عشقولي ، سوقه جرداء نحيلة ، اوراقه صغيرة تشبه اوراق البقدونس || ازهاره صفراء اللون وبتلاتها كاملة وحسنة || ينبت طبيعياً في اكثر الاقاليم المعتدلة الحرارة || كانوا يستعملون دقيق

يتميز هذا الاباج بانتشار التموليات في البحار وانتشار الثدييات والطيور والحشرات والنباتات الكثيرة الزهر في البر. ويتميز أيضاً بظهور الرئيسات ، اصل الجنس البشري ، كما يقولون .

Ere quaternaire (F).
Quaternary era (E).

ويدعى الاباج المعاصر . مجموعة من حقبتين ، البليستوسانية والمعاصرة ، مركزهما الساف الاخير من سلم الرصف الارضي || يتميز هذا الاباج ، اولاً بشكوص المياه وارتدادها عن بعض اليابسة بعد استتباب القارات على حالتها الحاضرة || ويتميز ثانياً بمواكبة تطور الانسان المعاصر والعظم والنبوت التي نراها وتم الكون || ويتميز ثالثاً بتواتر أزمة الدفء والدميك . الزمن الذي نعيشه الآن ، مناخ معتدل دافئ ، يدوم منذ مئات القرون .

١٥ - إباحتية Libéralisme (F). Liberalism (E).
الاباحتية مذهب الذين يدينون بحرية المبادئ والآراء .

١٦ - إبادة الأعشاب ، تعشيب Désherbage (F).
De-weeding, Cleaning (E).

تنقية مختلف الزراعات وأخصبها الزروع من الأعشاب الضارة ويتم ذلك بالاختلاع باليد او بالعزق او باستعمال العواشب والمبيدات الزراعية الخاصة || وهذه العواشب التي سيأتي ذكرها في مواضعها تقسم اربعة اقسام :

- أ : قسم عواشب معظم النباتات الطوعية في الزروع .
- ب : قسم عواشب النباتات الطوعية في القطن والكتان ...
- ج : قسم المبيدات التي تقضي على النباتات الليلية والحشوشية
- د : قسم المبيدات التي تقضي على الطحالب في المراعي ...

١٧ - أبار الأبار هو الذي يأبر النخل || والأبار هو الرصاص الاسود.

١٨ - إبارة ، أبر ، تأبير Pollinisation (F).
Pollinization (E).

هو انتقال الجدرات اي حبوب الطلع من متك الزهرة الى ميسمها او مياسم غيرها من الازهار .

١٩ - إبالة Camélogie (F). Cameleology (E).
الفرع الخاص بالابل من علم الحيوان . يتناول كل ما له علاقة بها من تحلية وتثريج وتوالد واستئثار الخ...

٢٠ - إبالة ، جرزة Fagot (F). Faggot (E).
الحزمة من الحطب الدقيق العيدان . ومن الامثال « ضفت على ابالة » اي بلية على اخرى كانت قبلها .

٢١ - إبانة Analyse du sang (F). Blood analysis (E).
الابانة هي تحليل الدم للكشف عما فيه من طفيليات وغيرها.

٢٢ - أباهر Rémiges scapulaires (F).
Wing scapulars (E).

الأباهر من ريش جناح الطير ما يلي الكلى . اولها القوادم ثم المناكب ثم الخواشي ثم الاباهر ثم الكلى .

٢٣ - أبوة Ligne directe ascendante (F).
Ascending direct line (E).

الابوة هو خط النسب المرتفع اي حبل النسب الصاعد ويقابله بناوة اي حبل النسب الهابط .

اغفال مكافحة الجرب والقراد والقمل . السهر على نظافة مزارب الطيور ووقايتها من الامراض السارية .
في المناحل : وقاية النحل من الزناير التي تكثر في هذا الشهر . استمرار تفقد القفران لحفظها من عبث الصمل .

٥ - أب Prairie naturelle (F). Grass-land (E).
هو المرعى الطبيعي الذي حوى من الكلا ما تعتلفه الماشية .

٦ - أباء Raceur (F). Stud (Incows) (E).
الذكر المنتخب للانجاب من الحيل والبقر والغنم الخ...

٧ - أباءة Roselière (F). Reed-bed (E).
أجرة القصب والحلفاء الطبيعية المزمنة .

٨ - أبابيل جاء في كتاب حياة الحيوان للدميري : « واحدته إبالة . وقال ابو عبيد القاسم بن سلام لا واحد لها من لفظها وقيل واحدها ابول كمجول وقيل ابيل كسكيت وقيل ابيل كدينار ودفانير واختلفوا في قوله تعالى وارسل عليهم طيراً ابابيل . وقال سعيد بن جبير هي طير تعشش بين السماء والارض وتفرخ ولها خراطيم كخراطيم الطير وأكف كأكف الكلاب . وعن عكرمة أنها طيور خضر خرجت من البحر لها رؤوس ك رؤوس السباع . وقال ابن عباس رضي الله عنها بعث الله الطير على اصحاب الفيل كالبلسان . وقيل كانت كالوطايط . وقال عباد بن انصامت اظنها الزراير . وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها هي شبه شيء بالخطاطيف . ومنهم من قال انها السنونو التي تأتي الآن الى المسجد الحرام .

٩ - إبات* ، مخرار Thermomètre enregistreur (F).
Self-registering thermometer (E).

آلة تدون من تلقاء نفسها وتباعاً درجات الحرارة اليومية .

١٠ - إباج Ere, Epoque (F).
Era, Epoch (E).

الاباج مجموعة عصور تميزت بآثارها المكانية والحيوية الخاصة || والاباج حصلياً مجموعة حقبة تميزت بصخورها وبآثارها المناخية والمطمية والنباتية .
راجع مادة حياة . الجدول رقم ١

١١ - إباج أولي Ere primaire (F).
Primary era (E).

ويدعى الاباج القديم . مجموعة حقبة او احقاب حصلية مركزها الساف الاول من سلم الرصف الارضي . اولها الحقبة الكمبرية ثم السيلورية فالديفونية فالكربونية فالبرمية || يتميز هذا الاباج بانتشار اللاقريات وبظهور الحياة المائية والفقريات .

١٢ - إباج ثانوي Ere secondaire (F).
Secondary era (E).

ويدعى الاباج الاوسط . مجموعة من ثلاث حقبة حصلية مركزها فوق الاباج الاول وتحت الثاني . اولها الحقبة الترياسية ثم الجورية فالطباشيرية . || يتميز هذا الاباج بانتشار الزحافات المائية والبرية وبظهور البونات والطيور .

١٣ - إباج ثالثي Ere tertiaire (F).
Tertiary era (E).

ويدعى الاباج الحديث . مجموعة من حقبتين التمولية والنيوجينية . مركزها فوق الاباج الثانوي وتحت الرابعي ||



إبات



أبراميس



آبرة الابط



آبرة الاوراق



آبرة البراعم



آبرة التين



آبرة السنديان

الصغيرة تنتمي الى رتبة غشائيات الاجنحة المصنوعة .
انواعها عديدة تعيش بمعظمها عيشة طفيلية على بعض
الانواع النباتية وبعض الحشرات من ذوات الجناحين .
ارصافها : حشرة صغيرة ، ملونة ، خيطية الزباني ، طويلة
الارجل ، اجنحتها قليلة العروق والاعصاب غير المشعبة ،
جوشنها مسنم ، بطنها قصير مركب من سبع حلقات
وترجات تنتهي بالزوائد التناسلية ، اشربها مقوسة وممدية
للوعز . يكثر وجودها في الاحراج لا سيما على بعض انواع
السنديان حيث يحدث وخزها العفص || يمكنها صنع الشكل
مستطيل . رقاتها خاضعة او واثجة تعيش داخل العفص او
على الحشرات العاقلة .

٤٠ - إبرام *Nouaison (F). Fruit setting (E).*
هو اول نمو الشجرة بعد تقطيع الزهرة او تدميرها ، وقد يتم
ذلك عند الاخصاب ويعقبه سقوط التويجات الزهرية .

٤١ - أبراميس* ، برايميس *Abramis-brama (S).*
Braine, Brème (F). Abramis, Bream (E).
جنس سمك نهري من الفصيلة الشبوطية يعيش في المياه
الجلية الباردة وفي الانهر الشمالية || انواعه عديدة جميعها
كبيرة القد مفلطحة ، شبه بيضية الشكل ، طولها نحو
٥٠ سم . كبيرة الفلوس والزعنفة الظهرية ، صغيرة الزعانف
الصدرية والجوفية ، مستطيلة الشرجية والذنبية الفارقة .
تتكاثر بسرعة ولحمها لا يقل جودة عن لحم الشبوط .

٤٢ - آبرة ، قنفشة *Cynips (F). Gall-fly (E).*
جنس حشرات صغيرة من فصيلة الآبرات . انواعه عديدة
معظمها نافع ، أشهرها آبرة التين والسنديان والاوراق
والبراعم والابط والورد .

٤٣ - آبرة الابط* *Andricus fecundatrix (S).*
Cynips de l'alselle (F).
نوع من الآبرات عقمها يشبه زهرة الحرفش تمر كزه على
ابط الاوراق عند محور انتشابه لتتمكن من امتصاص ما
هي بحاجة اليه من النسغ || تركيب السنديان ويبدو كأنها
لا تؤذي .

٤٤ - آبرة الاوراق* *Neuroterus lenticularis (S).*
Cynips des feuilles (F).
نوع من الآبرات تركيب اوراق السنديان وتحدث فيها العفص
البلسني وهو اشهر انواع العفص واعمها استعمالاً .

٤٥ - آبرة البراعم* *Cynips kollari (S).*
Cynips des bourgeons (F).
نوع من الآبرات تركيب براعم السنديان فتتمتعها من الازماع
والايراق وتحدث فيها العفص الدرني الذي يؤذيها ويحد من
نشاطها الحيوي || ويستعمل العفص الدرني في الدباغة
الا انه اقل جودة من البلسني .

٤٦ - آبرة التين* *Cynips psenes (S).*
Cynips du figuier (F).
نوع من الآبرات وهي حشرة صغيرة ناقعة تعمل على تأخير
زهر التين فاخصابه وذلك بتقليلها الوليع من زهر التين
البري الذكري الى المزدوج الانثوي .

٤٧ - آبرة السنديان* *Biorhiza pallida (S).*
Cynips des chênes (F).
نوع من الآبرات تركيب جذور السنديان وتحدث فيها العفص
الثلوي الذي يصلح للدباغة ولكنه دون البلسني والدرني .

٢٤ - أبنة *Coudée (F). Elbow (E).*
الأبنة هي الدرجة من مقياس المياه .

٢٥ - أبنة
هي الدرجة في مقياس الحرارة العادية . راجع درجة .

٢٦ - ابتدائيات
الابتدائيات هي حيوانات دنيا . راجع اول .

٢٧ - أبتر *Anoure (F). Anourous (E).*
الأبتر هو عديم الذنب وقد يكون خلقاً كالصفدع او مفتعلاً
كالكلب الذي قطع ذنبه .

٢٨ - إبتناع ، شراء *Achat (F). Purchasing (E).*
الإبتناع والشراء هو عمل قانوني يقصد منه امتلاك
مال منقول او ثابت مقابل ثمن له .

٢٩ - أبتيث *Apatite*
فسفات كلس متبلور انواعه عديدة مختلفة الالوان منها
الاخضر والازرق والبنفسجي والاييض والاصفر والخططي .
وزنه النسبي من ٣,١٦ الى ٣,٢٢ وصلابته من ٤ الى ٥ .
بحري عادة : حامض فسفوري (٤١,٥ ٪) ؛ كلس
(٤٩,٦ ٪) ؛ فليور (٢,٢ ٪) ؛ كلور (٢,٧ ٪) ؛
كلسيوم (٣,٩ ٪) || وهو من الاسمدة الفسفورية غير
المستعملة مباشرة لان الحامض الفسفوري الذي فيه لا
ينوب في الحامض النمل بوجود الفورميات || ولهذا
فالأبتيت يستعمل خاصة في صناعة السوبرفسفات .

٣٠ - أبث *Abâtardissement (F).*
Degeneracy, Degeneration (E).
تطور خصائص الاصل وانحرافها نحو السلبية او السوء .

٣١ - أبجدية
الأبجدية نبات عشبي . راجع أكلة .

٣٢ - أبيد *Femelle qui porte tous les ans (F).*
Yearly delivering female (E).
الانثى تضع كل عام . وكثر اسنادها الى الاتان .

٣٣ - أبيدة ، أوييد *Sédentaires (F). Sedentary (E).*
صفة الحيوان الذي يقيم في منطقة ما لا يفارقها وقد كثر
اسناد هذه الكلمة الى الطير . وضدها القواطع .

٣٤ - أبذم
أبذمت الفرس والناقة ورم حياؤها من شدة الضربة ويكون
ذلك في بكرات الخيل والابل والبقر .

٣٥ - أبثر
اطلب لبارة .

٣٦ - إبثر الحبش
راجع طرثوث .

٣٧ - إبثر الذئب
راجع طرثوث .

٣٨ - إبراء ، مخالصة ، تخالص *Décharge, Quitus (F).*
Discharge (blood) (E).
الابراء يعني ان المدين بالالتزام قد أصبح طليقاً منه .

٣٩ - آبرات *Cynipidae (S). Cynipidés (F).*
Cynipidae, Gall wasps (E). Gallwespen (D).
وتعرف أيضاً بالمفصيات والقنفشيات . فصيلة من الحشرات

تعلوها مشحة بنفسجية ، سبلتها صغيرة لسنة مدببة قصيرة الحمة . اما ازهارها فيدوم من شباط الى نيسان || ثميرتها عقائية ثنية السنخ طويلة المردن المستدق الرأس شبه المنقار الطويل . وهذه الثمار تتأثر بالرطوبة التي تحيها نحو الارض حيث تدفن حبا || يكثر وجودها في لبنان وسورية وفلسطين حتى بادية التيه . تنبت في الاراضي البور وعلى جانب الطرقات .

٥٤ - أبرق Sirius (F.) Sirius (E).

الابرق ويسمى الشعرى اليمانية والشمرى العبور ، يعتبر من ألمع نجوم الفضاء . يبعد عن الارض نحو ٨٨ الف مليار كيلومتر . اطلب شعرى يمانية .

٥٥ - أبرم Erucaria (S).

Erucaria (F.) Erucaria (E).
جنس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة الصليبيات . انواعه المعروفة عشرة اعطائها حوض البحر الابيض المتوسط وبعض المناطق الداخلية || سوقها فرعاء تعلو من ٢٥ الى ٥٠ سم . اوراقها متعاقبة ، نصالها مخمرة ريشية . ازهارها صغيرة بنفسجية اللون او زرقاء او ليلية ، اشهر انواعه :

الابرم الثخين الورق E. crassifolia (S).
الابرم الحلبي E. aleppica (S).
الابرم الزغبى E. puberula (S).
الابرم الصغير الثمر E. microcarpa (S).
الابرم العريض الورق E. latifolia (S).

٥٦ - أبروس Abrus (S). Abre (F).
لفظة يونانية بمعنى الحش . جنس نباتات برية وتريينية من سبط الكرستيات وفصيلة القرنيات الفراشية || انواعه عديدة ، منبتها المناطق الحارة والمعتدلة وهي جنبات وجنابات مستنقعة السوق العارشة || اوراقها متعاقبة ، ريشية ثنائية التفصيل ، خضراء اللون ، ازهارها أبوية الارتكاز طويلة الزناد سفلية التجميع حرام او بيضاء || ثمارها قرون خشبية مفلطحة منعقفة . بزورها قرنية اللب صلبة ملساء وكروية الشكل ، لونها الى الحمرة || جذور بعضها صناعية تستعمل استعمال السوس (راجع ششم) ويستخلص من بعض انواعها مادة سامة يدعى جوهرها الفحال أبرين (Abrine) يستعمل في الطب ويدخل في تركيب عدة مستحضرات شافية اشهرها علاجات الملتهمة . اشهر انواعه واكثرها استعمالاً الأبروس العطر والششم .

٥٧ - أبروس عطر* ، عسب ، عزب ، نحلة ، سوس جيكا ، بطرقة هندية

Abrus bottae (S). Abre petit (F). Love pea, Indian licorice (E). Abrusbohne (D). Abrus (I).

نوع من الأبروس وهو جنبة عارشة برية وزراعية تريينية ساقها جميلة لولبية . اوراقها معنقة متعاقبة ريشية . ازهارها بيضاء ، شكلها جميل ، عرفها فواح مستحب || ثمارها قرنية مفلطحة لولبية . بزورها صلبة قرمزية زاهية تعلو كلاً منها نقطة سوداء . تستعمل في صناعة السبعات والقلائد . زراعتها التريينية فسيحة الارعاء لانها تنمو في جميع الاقاليم الحارة والمعتدلة وقد تكثر طبيعياً في الهند وفي معظم المناطق الافريقية وفي امريكا الوسطى والجنوبية .

٥٨ - أبروطون راجع قيصوم .

٤٨ - آبرة الورد* Rhodites rosae (S). Cynips du rosier (F). Mossy rose gall wasp (E). Rosengallwaspe (D).

نوع من الآبرات تركيب الورود وأخصها القمرين فتؤذيها اشد الاذى . وحيث تحمل تحدث في فروعها العفص الخيطي الذي يبدو ككبة من الصوف تمتطقها الخيوط الدقيقة القصيرة . لا دواء لها سوى الكشط والتطهير وإذا استفحل امرها فالقطع والحريق .

٤٩ - إبرة* ، هدب Aiguille (F).

Needle, Acicular (E).
تحديد وصفي لشكل خاص من اشكال الورق قوامه نصل ضيق مستطيل مذهب العرض ، جسامد النسيج اللينى ، مدبب العقصة ، تتميز به بعض اجناس الاشجار الراتنجية وأخصها الصنوبر والتنوب || من ذلك ان ورقة الصنوبر ابرية الشكل او هديته كما يبدو في الرسم .

٥٠ - إبرة آدم* ، يوكا ليفية Yucca filamentosa (S).

Yucca filamenteux, Yuque filamenteux (F). Adam's needle, Bear grass (E). Fädige palmillie, Palmenillie (D). Iucca, Jucca (I).

نوع من اليوكا وهو نبات صناعي وترييني معمر من فصيلة الزنبقيات || ساقه وحيدة ليفية . اوراقه من ١٠٠ الى ٢٠٠ وهي دائمة ، لحمية ، لبدة ، حاضنة ، نصلية ، لسنة ، مدببة العقصة ، تنتهي بأبرة صلبة حادة سوداء اللون . وهذه الاوراق تكون منتصبه في اول عهدها ثم تنحني ابتداء من السنة الثانية وتبقى على وضعها هذا . اما معدل طولها فهو من ٤٥ الى ٦٠ سم . || شمراخها الزهري عنقودي التجميع ، كبير القد ، منقصب ، يبلغ طوله من ٨٠ الى ١٢٠ سم . يظهر بعد السنة الثالثة . ازهاره زنادية جرسية طولها نحو ٥ سم . جملة القالب والهندام لا عرف لها . ثماره صغيرة ناشفة حقبة الشكل || ضروريه الزراعة التريينية اربعة تتميز بعضها عن بعض بلون الاوراق التي قد تميل الى الخضرة الزاهية او القاتمة او الموشحة بالحمرة او بالحمرة المرقشة بالبياض . تقايلها ازهار لونها الى القبر او الخضرة او الحمرة القرمزية او المرجانية المؤذرة بالصفار || تكثر زراعتها الصناعية في بعض المناطق الامريكية والافريقية لانهم يستخرجون من اوراقه ، بعد تحضيرها ، اليفاف الخيطية تستعمل في عدة صناعات كالحبال وما اشبه .

٥١ - إبرة الراعي

هو غرنوق المزهل نبات عشبي بري طبي . اطلبه .

٥٢ - إبرة الراهب هو الغرنوق العطر ، اطلبه .

٥٣ - إبرة العجوز* ، دهامين شوكراي ، حشيشة الابر ، غزيل ، يا غزال دور دور

Erodium cicutarium, Geranium cicutarium (S). Erodion cicutin, Bec de héron, Bec de cigogne (F). Common Pick-needle, Pin grass (E). Gemeiner reiher schnabel (D). Cicutaria, Erba cicutaria (I).

نوع من الجذاب وهو نبات عشبي بري حولي من فصيلة الغرنوقيات . ضروريه عديدة لا تقل عن ٥٠ منبتها الاقاليم المعتدلة ، جميعها برية ترغب فيها الماشية فترعاها وتعتلفها قبل الادراك . سوقها مفصلية قصيرة فرعاء وزباء || اوراقها متعاقبة ثنائية التفصيل المشطي او الريشي ، خضارها باهت . ازهارها عشكولية ثلاثية او رباعية التجميع مستطيلة الزناد خماسية البتلات والسبلات . لونها الى الحمرة الزاهية



آبرة الورد



إبرة ، هدب



إبرة آدم



إبرة العجوز



أبروس عطر



أبرومة



أبرومية



أبريات



أبريج



أبريسيه لبنانية



أبريسيه مثلثة الزوايا



إيس التنبؤ

٦٣- إبريج*، تمخض، تمخضة

Baratte (F). Churn (E).

وعاء تمخض فيه الكثافة لاستخراج الزيت منها. الإبريج الحديثة عديدة الأشكال والأحجام منها يدوية يحركها العامل ومنها آلية تحركها الكهرباء وغيرها || أما الأدوات القديمة التي كانت تستعمل لهذه الغاية فهي: السقاء، الشكوة، النحي...

٦٤- إبريسم، حرير، سندس
Soie (F).
Silk (E).
الحيط الذي ينسجه دود القز.

٦٥- أبريسيه
Aubrietia (S). Aubriette, Aubriete (F).

جنس نباتات عشبية معمرة من سبط الآلوسنيات وفصيلة الصليبيات. أنوارها قليلة جميعها نجمية. فروعها حزمية، مخشوشة، زباء اللحم. أوراقها متعاقبة، مستطيلة، ذاتية النصل الحامل البشرة على صفحتيه. أزهارها عشكولية التجميع، أرجوانية اللون أو ليلية. زبدانها مستطيلة. كؤوسها منتصبة، ثنائية الحدبات القاعدية. بتلاتها ملعقية الشكل، مفروضة القوس، رباعية التجميع. أمهيتها مستعرضة مجنحة والقصيرتان منها مجهزتان بسن. غديدها المصراعية توائية متحدة القاعدة || بزورها قرية، ثنائية الترتيب يجمعها حق اسطواني أو مخروطي الشكل، مذهب العقصة المستطيلة اللبوسية الحمة. أشهر أنواعها المقالات التالية:

٦٦- أبريسيه لبناكية*
Aubrietia libanotica (S).
Aubriete libanaise (F).

عشبة نجمية تعلو نحو ١٢ سم. متبها الجبال والبقاع، توجد من ارتفاع ٧٠٠ م حتى الجرد || أوراقها ذاتية النصل، كثيفة المسام، زباء. ثمارها جراء مستطيلة الزنيدات المتفرجة.

٦٧- أبريسيه مثلثة الزوايا*
Aubrietia
deltoidea (S). Aubriete deltoide (F).

عشبة نجمية براوح ارتفاعها من ١٢ إلى ١٥ سم. متبها حوض البحر المتوسط وتزرع في الحدائق على جوانب المسرات. أوراقها طحلاء اللون، أزهارها إلى الحمرة القرمزية. تتكاثر بالبذر والتعقيل والتدريج. تعيش في جميع الأتربة حتى الرملية منها.

٦٨- إيس
Tortue mâle (F).
He Tortoise, He Turtle (E).

هو الغليم، ذكر السلاحف من أي نوع كانت.

٦٩- إيس^٥
Ips

جنس حشرات خاشبة من فصيلة الكراشيات ورتبة نمديات الاجنحة. أنواعه المعروفة ٣٠ جميعها صغيرة القد، صولجانية الزبال. أجسامها تطول من ٤ إلى ٨ م. أنوارها إلى السمرة العابقة أو السواد اللامع. وقد يعلو أعواد بعض أنواعها رقشة حمراء مبعثرة أو زركشة صفراء يعترضها تجذيع أطول دقيق || تعيش تحت لحاء الأشجار فتخلج الشكير حيث تمتح مكها الذي ينقف عن يرقات تتابع عمل الحشرات الكاملة. وهي لا تخرج من سراديبها إلا مرة واحدة عند زمن الكرم ثم تعود || أشهر أنواعه وأضرها إيس التنبؤ

٧٠- إيس التنبؤ*
Ips sexdentatus (S).
Ips des ablétiées (F).

نوع من الإيس وهو حشرة صغيرة القد طولها نحو ٦ م. ثوبها إلى السمرة العابقة يعلوها موج أسود لامع. غداها

٥٩- أبرومة*
Abroma angusta (S). Abrome (F).

Abroma, Devil's cotton (E). Abrome (D).
Abroma (I).

الكلمة يونانية بمعنى عديم الغذاء. جنس نباتات برية وزراعية صناعية وتريينية من فصيلة البرازيات. متبها جميع الأقاليم الآسيوية المعتدلة الحرارة. تكثر في الصين ومنشوريا وفي بعض مناطق التبت حيث يستعملون الياف قشورها في صناعة الحبال || وهي جنات حولية أو معمرة. نمر في الأقاليم المعتدلة المنحرفة نحو الحر || سوقها مخشوشة، قشورها ليفية. أوراقها محورية الارتكاز متعاقبة، معتقة، راحية، ثلاثية الفصوص البسيطة، لونها أخضر عابق || أزهارها زنادية فردية متعاقبة مع أوراقها بتلاتها أهليجية الشكل، حمراء اللون، خماسية التركيب، سبلاتها مندعمة الانتشاح حاضنة البتلات، مدبة الرأس، هدية العقصة. تزرع للتزيين، تتكاثر بالبذر. تخشى المواقع الباردة.

٦٠- أبرونية*، رشيفة، غندور
Abronia (S).

Abronie (F). Abronia, Sand verbenes (E).
Softkrieche (D). Abronia (I).

من اليوناني بمعنى ناعم، لطيف. وتكتب أبرونيا وأبرونه. جنس نباتات عشبية ليفية معمرة من فصيلة الشيبات. أنواعها المعروفة قليلة جميعها مذابة وعارشة. جذورها جنتية مستطيلة. سوقها ليفية. أوراقها متعاقبة، معتقة، قلبية. أزهارها صيوانية أو نورية التجميع، ابطة الارتكاز، زاهية الألوان التي يغلب فيها الأصفر والليلكي والأرجواني. رائحتها عطرية مستحبة قريبة الشبه من الونيل || تنمو في جميع الأتربة، لكنها تخشى الرطوبة المستحكمة والأراضي القوية الاندماج والكتوم || أزهارها يتتابع نحو خمسة أشهر وزهرتها تدوم أكثر من أسبوعين || أشهر أنواعها:

أبرونية خمبية
Ab. umbellata (S). A. en ombelle (F).

أبرونية رملية
Ab. arenaria (S). A. des sables (F).

أبرونية عريضة الورق
Ab. latifolia (S). A. à larges feuilles (F).

أبرونية عطرية
Ab. fragrans (S). A. suave (F).

٦١- إبريات*
Hydnaceae (S).

Hydnacées (F). Hydnaceae (E).

فصيلة الفطور الأبرية من رتبة الدعاميات. أجناسها وأنواعها عديدة بعضها صالح للأكل وبعضها سام ضار. معظمها فطور رمية أرضية وبعضها طفيلي يعيش على جذوع الأشجار وأغصانها || من ميزاتها الخاصة نكعتها الفارشة وكثرة هيفاتها الأبرية المتمركزة على الصفحة السفلى، تحت الجراب الجرثومي، شائعة نحو العلاء أو منحرفة باتجاه الأفق أو متدلية نحو الأرض. أما صفحتها العليا فمساء السطح محدودية الأطراف. تحتها شبه كروي شديد الالتصاق تعلوه ساق قصيرة غليظة، أما فليزية التركيب سريعة العطب وأما لحمية قابلة الانعقاد قليلة العطب || منها جنس واحد خشن النكهة الحرفشية التركيب || اعرف وأشيع أجناسها الأرشون والبرقة والدردون.

٦٢- إبرية، هديئة
Aciculaire (F).
Needle shaped, Acicular (E).

كل ورقة شكلها شكل الإبرة أو كل عضو في الحشرات شكله كالإبرة.

٧٩ - أَبْعُمْبِيَّة ٥
Bucorve (F).
هو الاركوم ، طائر افريقي ، اطلبه .

٨٠ - أَبَقْ* ، مَوْز لِيْفِي ، قُنْب مَنِيْلِيَّة
Musa textilis (S). Abaca, Chanvre de Manille (F).
Abaca plant, Manila hemp (E). Manila hanf (D).
Canapa di Manilla (I).

نوع من الموز يزرع لاستخراج اليافه الصناعية الشائعة الاستعمال . موطنه بلاد منيليه ، يعيش في المناطق وفي الاراضي الدبالية الرطبة . نصبتة تعلو نحو ٣٥٠ سم . اوراقها كبيرة القد مستطيلة . ثمارها صغيرة ، مأكولة لكنها ناشفة ، حامزة المذاق ، قليلة المادة السكرية .

٨١ - أَبَقْ
أبقت وأبقت الغنم : ولدت وهي مهازبل .

٨٢ - أَبَقْرَاطِيَّات
Hippocrateae (S).
Hippocratéés (F). Hippocrateae (E).

سبط نباتات نجمية وجنبية من فصيلة القاتيات . منبتها جميع البلاد الحارة والمعتدلة المناخ . || أنواعه لا تقل عن ٥٠ جميعها معمرة . اوراقها متقابلة ، معتقة ، كاملة ، بيضيه ، مدببة . ازهارها عنقودي التجميع هامي الارتكاز . ازهارها قلسوية الشكل ثلاثية او خماسية البتلات . اشهر انواعه ابقراطية الانثيل . اوراقها زغبية . ثمارها لوزية يأكلها الناس ويدعونها بلفتهم بيجكوس (Bejucos)

٨٣ - أَبَقْل
Bourgeonner (F). To bud (E).
أبقل الشجر يخرج وقت الربيع في اعراضه شبه اعناق الجراد (الاساس) . وبعبارة المحكم : يخرج في اعراضه مثل اظفار الطير وأعين الجراد قبل ان يستبين ورقه .

٨٤ - أَبَقُونِيَّات
Aponogetaceae (S).
Aponogétacées (F). Aponogetaceae (E).

سبط من المزماريات يشمل خمسة اجناس وعدة انواع من النباتات المائية المعمرة البرية والتزيينية .

٨٥ - أَبَقُونِيَّة ، جَارَة المَاء
Aponogéton (F).
Aponogeton (E).

جنس نباتات مائية معمرة من الابقونيات وفصيلة المزماريات . انواعه المعروفة ستة جميعها معمرة مائية او متعقة ، اعماها زراعة واجلها شكلاً الابقونية السنبلية .

٨٦ - أَبَقُونِيَّة سُنْبِلِيَّة* ، جَارَة المَاء السُنْبِلِيَّة
Aponogeton distachum (S). Aponogéton en épis.
Asperge du Cap (F). Cape asparagus, Water hawthorn (E). Schwimmer, Wasserähre (D).
Sparagi del Capo (I).

نوع من الابقونية يزرع في احواض الماء او في الاماكن المستحكة الرطوبة المستمرة || اوراقه جلدية نصلية قرصية طويلة الزناد . ازهاره سنبلية التجميع ، مزدوج السنابل القائمة على شراخ طويلة الساق الاسطوانية . ازهاره بيض عطرة ليفية التركيب كالساق .

٨٧ - إِبْكَار ، تَهْرِيف
Précocité (F). Precocity (E).
الاسراع في انهاء طور النشوء والنمو سواء في الحيوان او في النبات ان حولياً او معمرأ .

٨٨ - إِبْكَكَ
هو عرق الذهب المخزفي ، اطلبه .

مسننات الطرف الداخلي الخماسي التقويس ، السداسي التسنين . تركيب التنوب والصنوبر المقطوع واليسابس . تعيش تحت اللحاء حيث تخرج الشكير وتتكاثر . جيلها الحولي واحد . اضرارها قليلة لانها سطحية . مكافحتها صعبة نظراً لبقائها مع يرقانها وخادراتها تحت القشور || توجد في لبنان على الصنوبر المقطوع اليابس دون سواء .

٧١ - أَبْسَانِي
Aptien.
ساف من الطبقة الطباشيرية مركزه بين الالبيني والبرماني .

٧٢ - أَبْسَنْت* ، أَفْسَنْتِيْن ، دَفْسِيْسَة ، شِيح
Artemisia absinthium (S).
Absinthe, Ab. amère, Grande absinthe, Alvine, Herbe aux vers (F). Absinth, Absinthium, Worm wood (E). Absinth, Wermut (D). Assenzio, As. domestico, As. romano (I).

عشبة معمرة من فصيلة المركبات الانبوية الزهر . تنبت برية في جميع الاصقاع المعتدلة وتزرع لاستعمالها الصناعي . اوراقها مركبة ، ريشية ، معتقة ، متعاقبة . ازهارها ابطية نورية التجميع ، قصيرة الزناد ، عطرية الرائحة . يستخرج منها زيت طيار اخضر اللون شديد العرف .

وأما جوهرها الفعال فهو الابسنتين (absinthine) وهو قليل الرائحة ، شديد المرارة ، قليل الذوبان في الماء سريعه في الكحول ، حامضي الرادع والانفعال || يستعمل في الطب للهضم والايلاع والحميات والادار وطرد الدود الى آخره || ويستعمل بنوع خاص في صنع شراب كحولي يعرف باسمه أبسنت .

٧٣ - أَبْسَنْت بَحْرِي* ، أَفْسَنْتِيْن بَحْرِي
Artemisia maritima (S). Armolse maritime (F).
Sea wormwood, Sea artemisia (E). Seewermut, Straudbaifuss (D). Assenzio marino, Assenziolo (I).

عشبة برية معمرة من فصيلة المركبات الانبوية الزهر . توجد في جميع المناطق المعتدلة على حافة الطرقات وفي الاراضي البور || ساقها مستقيمة حراء مضلمة يبلغ ارتفاعها المتر . اوراقها مفصصة ، معتقة ، متعاقبة . ازهارها ابطية نورية كازهار الابسنت . اوراقها وازهارها عطرية مرة الطعم تحوي مادة مقوية تحث على الايلاع . يستخرج من تقطير اوراقها شراب كحولي لا يخلو من اللذة وهو شائع الاستعمال في اروبه الغربية .


٧٤ - أَبْض
Jarret (F). Hough (E).
الابض هو باطن الركبة . وباطن مرفق البعير ، والمأبض كذلك . ج آباض ومأبض .

٧٥ - إِبْط
Aisselle (F). Axil, Arm-pit (E).
هو الزاوية العليا الناتجة عن اتصال قاعدة الورقة بالساق او الفصن او الففن || وهو في الحيوان باطن الكتف . ج آباط . وإبط الجبل : سفحه .

٧٦ - إِبْطَاء
Tardiveté (F). Lateness (E).
حاله اصلية او عرضية في الحيوان وفي النبات تؤخر النمو الطبيعي . اطلب تأخر .

٧٧ - إِبْطَال
Annulation (F). Annulment (E).
هو قرار تصدره سلطة قضائية او ادارية للقضاء على عقد مشوب بالبطلان .

٧٨ - إِبْطَال قِيَمَة النَقْد
Démonétisation (F).
هو الغاء سعر النقد القانوني . Demonetization (E).



أبْسَنْت



أبْسَنْت بَحْرِي



أَبَقْ



أَبَقُونِيَّة سُنْبِلِيَّة



أبكَسَة سَوْدَاء



إِبِل



أَبَلَى



أَبَلَى الْقَلْع



أَبَلَه

٩٤- أَبَلَقُ الْأَنْدَلُسِ (S). Oenanthe Hispanica (S).

Traquet à gorge noire (F).

عصفور من القواطع طوله نحو ١٦ سم. زوره اسود اللون.

٩٥- أَبَلَقُ الْبَادِيَةِ (S). Oenanthe deserti (S).

Tarier du désert, Vitrec (F).

عصفور من الأوايد طوله ١٧ سم. يألف الثنائف والأجرال.

٩٦- أَبَلَقُ الْحَقْلِ (S). Saxicola rubetra (S).

Tarier des prés (F).

عصفور من القواطع طوله ١٤ سم. يألف الحقول والمراعي وضايف الأهر في زمن الصيف.

٩٧- أَبَلَقُ الْحَوَادِلِ (S). Oenanthe leucura (S).

Traquet rieur (F).

عصفور من الأوايد طوله ١٩ سم. وهو اسود الثوب ابيض الزمكي. يألف الحوادل القاحلة الصخرية.

٩٨- أَبَلَقُ الرُّعْيَانِ (S). Saxicola torquata rubicola (S).

Tarier pâtre (F). Stonechat (E).

عصفور من القواطع طوله ١٣ سم. يألف المراعي والحقول المزروعة في فصل الشتاء.

٩٩- أَبَلَقُ الْقَنْعِ *، قَلْبِي (S).

Saxicola oenanthe (S). Traquet moiteux (F).

Whinchat (E).

عصفور من الأوايد طوله ١٦ سم. يألف الكروم والحقول المزروعة. يكثر وجوده في جبال لبنان وسورية.

١٠٠- أَبَلَه *، أَطْيَش (S). Anous stolidus (S).

Noddi niais (F). Noddy (E).

طائر مائي من كفيات القدم. متوسط القد، ابيض الثوب، تستطيل المنقار مستقيمه. طويل الجناح والذنب. قصير الرجلين. يطير الطيران || اقليمه البحار الحارة، يحط على السفن حتى يكاد يقبض عليه.

١٠١- أَبَلُوج، طَبَرَزْد، قَنَدَة (S).

Sucre candie (F). Sugar-candy (E).

هو سكر النبات يفيد الخنجرة ويحلي الصوت.

١٠٢- إِبِلِيَّات، جَمَلِيَّات (S). Camelidae (S).

Camélidés (F). Camelidae (E).

فصيلة الابل من رتبة مزدوجات الاصابع المجربات. تشمل الجمل والفالج واللامه والألبكة.

١٠٣- إِبِلِيْز، طَمِي، غَرِين (F). Limon (F). Mud (E).

الابلين والبلز هو الطين الذي تعقبه مياه الأنهر بعد فيضانها وعودتها الى مجاريها الطبيعية.

١٠٤- أَبَلَيْسَة *، ذُلُكُوفَة (S). Abelicea (S).

Zelcova (F). Zelcova (E).

جنس اشجار حرجية وتزيينية من فصيلة الانجريات. انواعها المعروفة قليلة العدد منها بعض جبال البلاد المعتدلة الحرارة || سوتها غليظة، رقيقة، تعلو من ١٥ الى ٣٠ م. اغصانها كثيرة الفروع. اوراقها عابدة، ثنائية الصف كالافنان. ثمارها ناشفة حصية الشكل والقذ كستنية اللون || اشهر انواعها الشريفة الورق والمؤنفة.

٨٩- أَبَكْسَة سَوْدَاء * (S). Abax ater (S).

Abax noir, Féronie (F). Abax ater (E).

حشرة دجوبة قانصة ودائمة من فصيلة العبقوسيات ورتبة غدييات الاجنحة. اعطائها معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة من الشرق الادنى واروية || جسمها متوسط القد يطول من ١٨ الى ٢٢ مم. ثوبها اسود لامع. رأسها معتدل الطول والعرض، قصير الخطم، ضليح التأشير. زباناها دقيقان، مرفقيان. عينها كبيرتان جاحظتان || الانثى اصغر قدأ من الذكر واقصر زبانا منه واهت ثوباً || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجمالنة في اواخر الربيع وتبقى حتى اواسط الخريف. تسرح في الليل. تسمى بسرعة وتطير بخفة. قوتها المواد النباتية المنحلة وما تستطيع اقتناصه من حشرات || تعاظم وتمتج المكن في اواسط الصيف. ينقف المكن بعد ثلاثة اسابيع عن يرقات دقيقة تتطور ببطء وتبلغ الكمال الجسموري في اواخر الربيع ثم تدخل في طور الاكمال الذي ينتهي بظهور الحشرة الجمالنة في اواسط شهر حزيران.

٩٠- إِبِل * (F). Dromedarys (E).

الإبل والإبل: الجمال. وهو اسم واحد يقع على الجمع وليس بجمع ولا اسم جمع انما هو دال على الجنس هذا ما قاله ابن سيده. وقال الجوهري ليس لها واحد من لفظها وهي مؤنثة. ويقول الدميري « روى ابن ماجه عن عروة البارقي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الابل عز لاهلها والغنم بركة والخير مقيود في نواصي الخيل الى يوم القيامة » || ويقال للابل بنات الليل. ويقال للذكر منها بعير اذا أجذع. والانثى تدعى ناقة. أشهر عروفي ابل الجزيرة وافريقية: الاربية والشذمية والبيدية والحجدية والشذمية والمهرية || ومن لقب الابل: العيس وهي الشديدة الصلبة، الشلال وهي الخفيفة، اليعلة وهي التي تعمل، الوجناء وهي الشديدة، الناجبة وهي السريعة، الموجاء وهي الضامرة، الشردلة وهي الطويلة، الهجان وهي الكريمة، الكوماء وهي الناقة العظيمة السنام، القوداء وهي الناقة الطويلة العنق، الحرف وهي الضامرة، الشارف وهي المسنة.

٩١- إِبِلَال (F). Départ de la sève.

Montée de la sève (F). Sap movement (E).

الابلال هو ابتداء الدورة النسفية الحولية في النباتات المعمرة. وتختلف مدة هذه الدورة باختلاف النبات والاقليم والموقع.

٩٢- أَبَلَان (F). Etude des nuages (F).

Study of clouds (E).

هو درس تحركات السحب وما فيها من شحن كهربائية.

٩٣- أَبَلَق *، أَبَو بُلَيْق (S). Oenanthe (S).

Traquet, Tarier (F). Wheatear (E).

جنس طير من العصافير النافعة الصغيرة القد من فصيلة الشحروريات. انواعه زهاء ٧٠ منتشرة في جميع اصقاع العالم القديم. تتميز باثوابها البلقاء اللون وبمناقيدها الدقيقة المستقيمة. قوتها الحشرات والهوام. تألف الأجرال والبراص والجوداس. معظمها من القواطع وبعضها من الطير الأبدية || تدن في الاشجار والشجيرات الجذلة. اناثها تضع من ٥ الى ٧ بيضات تحضنها وحدها. بيضها اغبر اللون، ازرق المواجه تعلوه رقشة خضراء || اعرف انواعه واشهرها في المقالات التالية:

garde-bœuf, H. des bœufs (F). Reef heron (E).

طائر من القواطع يألف الشطوط البحرية وبحاري الأنهار. وهو متوسط القد طوله نحو ٤٦ سم. ثوبه الى البياض الناصع يملوه من قبة الرأس الى أعلى الجؤجؤ سفنة من الريش المذهب || يعيش اسراباً كثيرة العدد. يبدن في المناطق بين القصب والغزار والاسل. قوته الاسماك الصغيرة والضفادع والديدان وجميع انواع الحشرات. يركب الابقار والجواميس فيلثم ما يعلو جلودها من قراد وحلم.

١١٤- ابن الماء القنبري (S). Herodias intermedia (S). Aligrette orientale (F). Oriental egret (E).

طائر من القواطع يحوب البلاد الاسيوية. يعيش اسراباً كبيرة لا تفارق الشواطى والمناطق والبحيرات واخوار الأنهار || وهو صغير القد، طوله نحو ٤٠ سم. ثوبه ناصع البياض يكثر فيه الريش الاخضر الفاخر الصنف.

١١٥- ابن آوى*، وآوى (E). Chacal (F). Jackal (E).

حيوان بري من فصيلة الكلبيات ورتبة اللوامح. وهو من السباع الخادرة التي تعيش جماعات. سمي ابن آوى لانه يأوى الى عواء بنات جنسه ولا يعوي الا ليلاً. كنيته ابو ايوب وابو ذؤيب وابو كعب وابو وائل. انشاء فهلوية، تضع في اواخر الربيع من خمسة الى تسعة جراء. اصرامه ثمانية ومنهم من جعلها تسعة. اجسامها رشيقة. طولها الكامل، مع ذيلها، يراوح من ١٠٠ الى ١٢٠ سم. أما ارتفاعها فن ٥٠ الى ٧٠ سم. اثنائها سوية، ظهورها صهباء اللون او سمراء. اعناقها وبطنها الى الصفار الاخير. قوته مسا استطاع اليه سبيلاً من حيوان وطيور وجيف وثمار || اشهر اصرامه المقالات التالية :

١١٦- ابن آوى، زغبر، أبو زهرا (S). Canis aureus (S). Chacal commun (F). Common jackal (E).

موطنه العالم القديم. يكثر في الشرق الاوسط واروبة. طوله نحو ٩٠ سم. ثوبه الى الصهبة الكدره وهو كثيف الصوف، جثل الذيل. يألف الاحراج ويعيش قرب الدساكر والقرى. يسرح من العصر الى الفجر وهو اجسر اصرام نوعه واحيلها. يسطر على الارانب والدجاج والبط. يأكل العناب والعنب والذره الصفراء وقصب السكر.

١١٧- ابن آوى الإفريقي*، وعوع (S). Canis anthus (S). Chacal du Sénégal (F). African jackal (E).

اعطانه فسيحة الارحاء تمتد من الحبشة الى السودان فصر ليبيا فتونس فالجزائر فالسنغال. وهو متوسط القد، رشيقي القوام طوله نحو ٨٠ سم. ثوبه الى الصهبة الرمادية يملوها موج اصفر || يسرح في الليل. قوته الطير والجرذان والفئران والدويبات || عروقه عديدة اعرفها :

ابن آوى المندي (S). Canis anthus, riparius (S). Chacal des rochers (F).

موطنه شواطى البحر الاحمر من باب المندب الى العقبة. ابن آوى الموشح (S). Canis anthus variegatus (S). Chacal varié (F).

يميش في الحبشة واfrريقية الشرقية والوسطى

١١٨- ابن آوى الجحقل*، جحقل (S). Canis latrans (S). Chacal aboyeur, Coyotte (F).

اكبر بنات آوى جثة واجثلها صوفاً واروغها خلقتاً واقلها خوفاً. طوله نحو ١٠٠ سم. ثوبه الى الصهبة السمراء. ظهره اعقب من ايطليه. بطنه الى الصفرة الخطية.

١٠٥- أبليسة شرمية الورق (S).

Abelicea carpinifolia (S).

Zelcova à feuilles de charme (F).

نوع من الابليسة. مهدا جبال القفقاز. ساقها فرعاء تعلو من ١٥ الى ٢٠ م. اوراقها معنقة، تطول من ٥ الى ٦ سم. نصالها بيضية الشوزن، سداسية او ثمانية العروق المتقابلة، مسنة الحتار. || تعتبر من الاشجار السبروتية التي لا تحشى سوى الجفاف.

١٠٦- أبليسة مؤنقة (S). Abelicea acuminata (S).

Zelcova acuminée (F).

نوع من الابليسة. مهدا الصين واليابان. ساقها فرعاء تعلو من ٢٠ الى ٣٠ م. اوراقها معنقة، متعاقبة. نصالها سنانية الشكل، مؤنقة، مسنة الحتار، عشارية العروق المتقابلة، تطول من ٦ الى ٨ سم. || تعتبر من الاشجار السبروتية.

١٠٧- ابن آوى (F). Milan d'Orient (F).

هو الخداة الشرقية؛ طائر شبه الباشق الا انه اطول جناحاً.

١٠٨- ابن الأرض

« ثبت يخرج في رؤوس الآكام له اصل ولا يطول وكأنه شمر يؤكل وهو سريع الخروج سريع الهيج » (كتاب النبات لابي حنيفة).

١٠٩- ابن الماء (S). Herodias, Egretta (S). Aligrette (F).

Egret, Egretta, Water fowl (E).

جنس طيور مائية من فصيلة البلشونيات. انواعه كثيرة العدد مهدا العالم. تتميز بأرياشها الناعمة، الفاخرة، المرغوب فيها || اشهر انواعه ما يتبع :

١١٠- ابن الماء الأبيض، بلسون أبيض (S). Herodias alba, Casmerodius albus (S).

Aligrette blanche, Grande aligrette (F). Great white egret (E).

طائر من القواطع. اعطانه التي يحوبها كل عام تمتد من جنوبي شرقي ااروبة الى استرالية بعد الهند والصين واليابان. وهو كبير الجثة طوله يفوق المتر. ريشه الى البياض الناصع. حدقة عينه وحندرتها الى الصفار الزاهي. منقاره اسود اللون وجلاه الى الجؤوة الخضراء الموج || يألف البحيرات والمناطق وبحاري الماء. يبدن في الاشجار القريبة من الماء وبين القصب والاسل.

١١١- ابن الماء البيوضي*، بياضي (S). Herodias egretta (S). Aigrette des récifs (F).

طائر من القواطع. وطنه العالم. يبدن في العراق. منه ضربان الابيض والاسود || يألف الشواطى واخوار الأنهار. ريشه فاخر الصنف مرغوب فيه.

١١٢- ابن الماء الصغير، سنقيل (S). Herodias garzetta (S). Aligrette garzetta (F).

طائر من القواطع يكثر في الشرق الاوسط وفي بلاد النوبة. وهو متوسط القد طوله نحو ٦٢ سم. ثوبه الى البياض الناصع يكثر فيه الريش الاخضر المستطيل. منقاره اسود الجسم. اصفر الانتشاب. رجلاه الى السمرة أما اصابعه وبخاليه فصفر.

١١٣- ابن الماء العادي*، بلسون بحري، أبو قردان (S). Herodias bulbus, Bulbus ibis (S). Héron



ابن الماء البيوضي



ابن الماء العادي



ابن آوى



ابن آوى الإفريقي



ابن آوى الجحقل



إبن آوى الصحراء



إبن آوى الهندي



إبن عرس



إبن مقرص



أبنة



إبنة يوم



أبئوس



أبئوس كاذب

١٢٤ - إبن قتره

ضرب من الحيات لا يسلم من لدغته وقيل هو ذكر الانمي وهو نحو من الشبر (اللسان).

Putorius furo (S).

Furet (F). Ferret (E).

حيوان بري وأليف من فصيلة السموريات. قريب الشبه بإبن عرس لكنه أكبر جثة وأطول ظهرًا. ثوبه الى الصهبة الغبراء يشوبها بعض الصفرة || يستعمل في صيد الارانب والقواع.

١٢٦ - أبنة *، برعمة زهرية

Bouton,

Bourgeon à fleurs (F). Bud, Pimple, Shoot (E).

نامية نباتية صغيرة في رأس الفند او محور القصب او ابط الورقة ... تتحول الى برعمة زهرية.

١٢٧ - إبنة البحر اطلب خيلان

Ephemera (S).

Ephémère (F). Ephemeral fly, May-fly (E).

جنس حشرات صغيرة من اليبويات. انواعه عديدة جميعها هوام دقيقة الجسم المستطيل. مؤخرها يقبني بحيطين في الذكور وبثلاثة خيوط في الاناث. اثوابها متباينة الالوان يغلب فيها الاخضر والاصفر. اجنحتها مثلكة الشكل دائمة الانتصاب. وهي من الحشرات التي تعيش حياتها القراشية بضع ساعات في حين ان حياتها البرقية التي تقضيها في الماء تطول الى السنتين وأكثر.

١٢٩ - أبئوس *، ساسم

Ebenus (S).

Ebénier, Ebène (F). Ebony tree, Ebony (E).

Ebenum, Ebenholz (D). Ebanio (I).

شجرة حرجية وصناعية من مجموعة الابئوسيات وفصيلة القرنيات. ساقها رفيعة، شاحمة، قليلة الاغصان الغليظة، كثيرة الافناد والافناد الدقيقة، طحلاء او سوداء اللحاء القليلة الخشونة || اوراقها معنقة، بيضيه، متفرجة الزاوية. ازهارها ابطية لا زنادية || خشبها ثمين القدر فاخر الصنف، ناعم الرقعة، ثقيل الوزن، شديد الصلابة سريع العطب اذا ما رقت الواحه وهو اسود اللون ويزداد اسوداداً مع عمر الشجرة || منبته الاصلي بلاد الهند وجزر المحيط الهندي. اجود ضرابه وافخرها ما جاء من جزيرة موريس || والأبئوس اذا وضع على الجمر فاحت منه رائحة طيبة. ويقال ان نقيعه يحلي الغشاوة والبياض. وربما نشارته ينفع الرمد والحرق ويحل نفخ البطن || يتكاثر بالبذور والعقل. يرعب في الاتربة العبيقة الفور، القليلة الاندماج، المتوسطة الرطوبة، يعيش في بعض مناطق البلاد المصرية قرب ضفاف النيل.

١٣٠ - أبئوس كاذب *

Laburnum anagyroides (S).

Laburne, Pluie d'or (F). Laburnum, Base tree (E).

Falscher ebenbaum, Goldregen (D). Ebanofalso (I).

شجيرة من القرنيات القراشية. منبتها البلاد المعتدلة الحرارة اخصها مناطق إقليم حوض البحر المتوسط || اوراقها مركبة ثلاثية، وريقاتها بيضيه الشكل منعكفة على الضلع يحجمها زناد مستطيل دقيق. ازهارها عنقودية التجميع، ذهبية اللون، عطرية الرائحة. خشبها ناعم الرقعة، صلب المود لونه الى السواد الباهت يتخلله تمشيح اصفر. يستعمل في الصناعات الخشبية الدقيقة الثمينة || تزرع للتزيين

يعيش جماعات يراوح عددها من ١٢ الى ٦٠ يروح في الليل ولا يتقطع عن العواء

١١٩ - إبن آوى الصحراء *، إبن آوى الثوبه، شعهر

Canis musomelas (S). Chacal à dos noir (F). Black-backed jackal (E).

كبير الجثة طوله نحو ٩٠ سم. وهو مستدق الرأس والأذنين. جثث الصوف الاصهب الاغبر، اسود الظهر، اصفر البطن وخزافي القوائم || عطنه شاسع الارحاء يمتد من اخيشة والثوبه الى تخوم القطب الجنوبي || يعيش في الاحراج والادغال والسهول. يقتنص القواع وام قرقة واليربوع والجردون والفارة.

١٢٠ - إبن آوى الهندي *، شعهر

Canis cancrivorus (S). Chacal des savanes (F).

متوسط القد طوله نحو ٨٠ سم. ثوبه الى الصهبة الخنطية الموج. ظهره اعقب من ابطيه وبطنه. وهو صغير الرأس، قصير الصوف، دقيق القوائم || عطنه سباب الهند والعراق. يروح في الليل. قوته الدويبات والطير والثمار على اختلاف انواعها كالموز والمنغو والعنب والتمر الخ...

١٢١ - إبن دأبة

Cornelle mantelée (F). هو الغراب الابقع سمي ابن دأبة لانه اذا رأى دبرة في ظهر بعير او قرقة في عنقه نزل عليها ونقرها الى الديات اي الفقار.

١٢٢ - إبن عرس *، عرس، عرسه، سنعبه

Putorius (S). Putois (F). Weasel (E).

كنيته ابو الحكم وابو الوثاب. وهو حيوان من فصيلة السموريات ورتبة اللوامح. صغير القد، طويل الجسم والذيل، قصير القامتين الاماميتين، صغير الرأس، اسك واصلم الأذنين. اصهب الظهر، اغبر البطن في الذكر ابيضه في الانثى || وهو من الروامس يروح في الليل يصيد الدجاج والحمام والارانب والجردان والفئران والعطاء والافاعي التي يلتهمها ولا يخشى اقبائها وسماها. قال عبد اللطيف البغدادي انه يسرق ما وجد من فضة وذهب وهو كثير الوجود في منازل اهل مصر. وحكى ان رجلاً صاد فرخاً منها وجسه في قفص بحيث تراه امه فلما رآته ذهبت ثم جاءت وفي لها دينار فألقته بين يديه كأنها تفتدي ولدها فلم يتركه لها فذهبت وعادت بدينار آخر حتى كمل العدد خساً فلما رأت انه لا يطلقه ذهبت وعادت بحرقه كأنها تشير الى فراغ حاصلها فلم يكثر لها فلما رأت ذلك منه عادت الى دينار منها لتأخذ فخشى الرجل من ذلك فأطلق لها ولدها || وقد جاء في كتاب الجاحظ قول الشمعق:

وابن عرس رأس بيبي صاعدة في رأس طبقه
صبيغة ابصرت منها في سواد العين زرقه
مثل هذا في ابن عرس اغيش تعلوه بلقه

١٢٣ - إبن عرس مثنين، فار الخليل، قوقدون قنذر

Putorius faetidus (S). Putois fétide (F). Polecat (E).

صرم من ابن عرس يتميز بثلاثة رنجه. موطنه الشرق الاوسط واروبه. يوجد منه في شمال سورية وفي احراج الاناضول || ثوبه الى الصهبة الكدره. خطمه اسود، لحيه ابيض اما ذنبه فشد يد السمرة || وهو كإبن عرس يفرس الافاعي ولا يخشى سماها.

وهي فردية التجميع ، مغذية اللون ، استطيلة الاهن المنحرفة || يستخرج من ثماره قبل الادراك تمام دهن الابهل المعروف ايضاً بدهن السابين وهو دهن طبي مجهض يدخل في تركيب عدة علاجات خارجية جلدية || نقيع ازهاره مدر للطمث . كان يستعمل فيما مضى كمنبه شارب وللإجهاض غير انه سيء العواقب ، شديد الخطر || وهو من الاشجار الحرجية اللينانية يتكاثر باليذر لكنه بطيء النمو ويرغب في الجبال العالية والأتربة العميقة الغور .

١٣٧- أبو أظلاف ، أبو ذقن

هو خنزير الارض ، حيوان افريقي لبون . اطلبه .

١٣٨- أبو الأبرد هو النمر اطلبه .

١٣٩- أبو الأسود هو النمر الاسود اطلبه

١٤٠- أبو الحن * ، أبو الحنّاء Erithacus rubecula, Rubecula familiaris (S). Rouge-gorge, Rouge-gorge familier (F). Robin, Robin-redbreast (E).

طائر من فصيلة الشحروريات ورتبة الجواثم وهو من المصافير الحاشرة ، النافعة ، الصغيرة القد ، طوله نحو ١٥ سم . ظهره اشهب اللون اسمر ، عنقه وصدره احمران ، بطنه ابيض اغبر يعلوه موج فضي . منقاره اسود . رجلاه الى السمرة || موطنه الشرق الاوسط واروبه وافريقية الشرقية والشمالية . وهو من المصافير الغريزة ، النزقة الطباع ، الخفيفة الحركة التي تألف الادغال والحدائق . قوته الحشرات على اختلافها من النملة الى البرقة والدودة والفراشة || يذئن في الادغال والاشجار الغناء . انشاء تضع من ٥ الى ٧ بيضات تحضنها متوابة مع الذكر .

١٤١- أبو الخطاف ، أبو الصلّ

هو الحدأة ، اطلبها .

١٤٢- أبو الرؤوس هو الزقزاق ، اطلبه .

١٤٣- أبو الزهور

هو التير الفلسطيني من العصافير المبدولة . اطلبه .

١٤٤- أبو السيمور Couleuvre-chapelet (F).

هو الثعبان المرقط ، اطلبه

١٤٥- أبو الصلّ هو الحدأة ، اطلبها .

١٤٦- أبو العنقاء هو البلسون الرأس ، اطلبه .

١٤٧- أبو النوم هو الخشخاش المنوم ، اطلبه .

١٤٨- أبو الهول

هو الصمل ، جنس حشرات من فصيلة الهوليات .

١٤٩- أبو الهول الأسمر هو صمل السمسم ، اطلبه .

١٥٠- أبو الهول الأغبر هو صمل الكرم ، اطلبه .

١٥١- أبو الهول الأفقع هو صمل اللبلاب ، اطلبه .

١٥٢- أبو الهول الأفلس * ، صمل الحدائق

Sphinx ocellata, Smerinthus ocellatus (S). Sphinx demi-paon, Sp. ocellé (F). Ocellate sphinx (E).

فراشة من فصيلة الهوليات ورتبة حرشفيات الاجنحة

ويستخرج من بزورها قبل تمام ادراكها مادة قلبية جمالية تستعمل في بعض المستحضرات الطبية || تتكاثر بالبذور والعقل . ترغب في المعارض الجنوبية الكثيرة الشمس وفي الأتربة الغنية المتوسطة الاندماج المعتدلة التركيب .

١٣١- أبنوس هندي * ، أبنوس سركديب

Diospyros ebenum (S). Ebénier de Ceylan (F). Ceylan ebony (E). Ebenholzbaum (D). Diospiro ebano, Ebano nero, Avolio (I).

شجرة حرجية دائمة عظيمة القدر من سبط الكاكيات التابع الى مجموعة الابنوسيات وفصيلة القرنيات . هيكلها جميل الشكل والقالب . اوراقها معنقة ، بيضية ، دقيقة الاذينات . نصلها جامد الصفحة ، شديد الخضار القاتم . ازهارها بيضاء اللون ، فردية او ثنائية التجميع . ثمارها كروية ، لحمية ، مأكولة اللب ، صفراء اللون . منبتها بلاد الهند وجزيرة سرديب . خشبها اسود امفر يستعمل استعمال الأبنوس وهو اشد متانة منه لكنه اقل جودة وصلابة .

١٣٢- أبنوسيات Ebenaceae, Diospyraceae (S).

Ebenaceae, Diospyraceae (F).

Ebenaceae, Diospyraceae (E).

مجموعة نباتية من فصيلة القرنيات . اسباطها خمسة ، اجناسها وانواعها ٢٧٥ منها ١٨٠ تنتمي الى سبط الكاكيات . جميعها اشجار وشجيرات وجنبات . اقليةها البلاد الحارة . اخشابها شديدة الصلابة ، ثقيلة الوزن النسبي ، سوداء اللون او سمراء . اوراقها بسيطة ، معنقة ، بيضية ، نصلها جامد الصفحة . جميل الخضار اللامع . ازهارها كاملة التركيب ثلاثية او رباعية او خماسية البتلات لونها الى الصفرة || ثمار بعض اجناسها مأكولة اشهرها الكاكي .

١٣٣- أبنية زراعية Bâtiments ruraux,

Constructions rurales (F). Rural buildings (E).

الابنية الزراعية عديدة الاشكال والاقسام ، مختلفة الاهداف منها البيوت والمساكن والخازن والاصطبلات والمرح والزرائب والمصارى والاهراء والمطامير || ولكل من اقسام هذه الابنية قواعد اساسية وشروط فنية لا بد من التقيد بموجباتها للوصول الى اقرب درجات الكمال الصحي والاقتصادي .

١٣٤- إبهام Pouce (F). Thumb (E).

اول اصابع اليد واكبرها . ج اباهم واباهيم

١٣٥- أبهر Aorte (F). Aorta (E).

شريان كبير يخرج من بطين القلب الايسر ويحمل الدم النقي المعروف بالشرياني ، اي المؤكسد ، لتوزيعه على فروع التي تتخلل جميع اجزاء الجسم || ومنهم من دعاه وريد العنق والمصريون يدعونه الاورطة .

١٣٦- أبهل * ، أبهل ، سبينّة ، صفيّنة

Juniperus sabina (S). Genévrier sabine, Sabine (F). Sabin, Savin (E). Sabinbaum, Sädewacholder (D). Savina, Genepéro sabina, Planta dannata (I).

الابهل والابهل نوع من العرعر . شجرته صغيرة القد تعلو من ٣ الى ٤ امتار . اوراقها حرشفية ، مهدبة ، متقابلة ، صلبة ، لينة ، مذبذبة ، شائكة العقصة ، عابقة الخضار . ازهارها وحيلة المسكن . ثمارها نووية الشكل ، قطرها نحو ٨ م .




أبنوس هندي



ابهل



أبو الحن



أبو الهول الافلس



أبو الهول العجول



أبو الوشي الجميل



أبو الوشي السلحي

٦٠ مم. اما الانثى فطولها نحو ٤٠ مم. وبسطها نحو ٧٤ مم. ثوبها الى الصبغة السمر. رأسها منقح بخطين ابيضين. جوشها وبطنها مجذعان بالكستني. زباناها قلاديان. عيناها كبيرتان. مرشفاها معتدل التقويس والطول. روشناها الاماميان متراكبا التوقيع حيث يكثر الاحمر الخطي الموج. روشناها الخلفيان صغيران تعلوها عند القاعدة يقع كستنية، وعند الحثار الخارجي عصبه حمراء طحلاء. سرفتها كبيرة، مستغلطة، تطول نحو ٨٠ مم. لونها الى الخضار الالفس يعلوها من الرأس الى الشرج جدة حمراء يكتنفها من جانبيها خطان اصفران ونقط سود تعلو جميع الترجات. قرنبا الشرجي صغير القد، قليل التقويس. لها جيلان في الحول. تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في آب. والانثى تمتع الممكن لطفاً مستغلة على اوراق النبات.

١٥٨ - أبو الهول المؤذّر هو صمل الياسم، اطلبه.

١٥٩ - أبو الهول المؤشع هو صمل الحور، اطلبه.

١٦٠ - أبو الهول المؤشعي هو صمل الصنوبر، اطلبه.

١٦١ - أبو الوشي، أبو الحسن، طاووسية. Paon (F). Peacock-butterfly (E).

تعريف يطلق على بعض انواع الفراش من مختلف الفصائل التابعة الى حرشفيات الاجنحة. جميعها مؤذية، يرقاتها تعيش على اوراق النبات فتعطها.

١٦٢ - أبو الوشي الجميل، بشورة الحوشف

Vanessa cardui, Pyraemis cardui (S).

Vanesse du chardon, Va. de l'artichaut, Belle-Dame (F). Painted lady, Thistle butterfly (E). Distelfalter (D).

فراشة جميلة الالوان والزخرفة من فصيلة البشوريات ورتبة حرشفيات الاجنحة. موطنها يمتد من الهند الى اروية وافريقية الشمالية. الفراشة جولة تجوب البلاد قوتها طلع الازهار ورحيقها. السرفة خاضعة قوتها اوراق النبات اغصنها الحوشف والحبازي. جسمها متوسط القد يطول من ١٧ الى ١٩ مم. بسطها تراوح من ٥٣ الى ٥٧ مم. رأسها حنطي اللون. عيناها كبيرتان. زباناها صولجانيان. مرشفاها دقيق الجرم. جوشها وبطنها الى الحنطي الالكلف. روشناها الاماميان الى الحنطي الاسمر يعلوه تبيج وتجذيع وزركشة فيها الاسود والاحمر والبرتقالي والايض والاصهب. روشناها الخلفيان الى الحنطي يعلوه تمشيع وتبيج اكلف وصفان من النقط السود تتخللها رقشة كستنية. لها ثلاثة اجيال في الحول. تظهر فراشة الجيل الاول في اذار. وفراشة الجيل الثاني في آب. وفراشة الجيل الثالث في تشرين الثاني. السرفة معتدلة الشخانة تطول من ٣٠ الى ٤٠ مم. ثوبها الى الحنطي الاصفر تعلوه رقشة سوداء وخطان جانبيان اصفران وخط ثبجي تتخلله ثول مهدبة شائكة برتقالية اللون.

١٦٣ - أبو الوشي السلحي. Aglais urticae.

Vanessa urticae (S). Paon petite tortue, Vanesse petite tortue (F). Small tortoiseshell (E).

فراشة صغيرة القد، جميلة الشكل مزركشة الالوان تظهر في الصيف من تموز الى ايلول. يرقاتها خاضعة تركب بعض يقول اغصنها نباتات الفصيلة القرابية. تكافح باستعمال احد الخواشير العفالة القليلة الرائحة العنصرية.

مختلفات الزباني. موطنها معظم اقاليم البلاد الحارة والمعتدلة الحارة من العالمين القديم والحديث. الفراشة تعيش على رحيق الازهار اما السرفة فقوتها اوراق الاشجار المثمرة والتزيينية. جسمها كبير القد. الذكر اصغر من الانثى بطول نحو ٣٠ مم. بسطه نحو ٨٠ مم. الانثى تطول نحو ٤٠ مم. وبسطها نحو ١١٠ مم. ثوبها الى الصبغة الصنابية. زباناها دقيقان مستطيلان. عيناها زميتان. مرشفاها مستطيل. روشناها الاماميان كبير القد مزخرفان وموشحان بالبي والوردي والبلكي. الخلفيان معتدلا القد موشحان بالاحمر تتوسطها بقعة سمر يطوقها حثار ابيض واسود. سرفتها كبيرة القد تطول نحو ٧٥ مم. لونها الى الخضار العابق يعلوه تجذيع اسود. قرنبا الشرجي معتدل التقويس اسود اللون. مدبها الى الطحلة السمر. لها جيل واحد في الحول. تمتع الممكن رزماً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق. طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٩٠ يوماً يتقضي ضمن صلبة يلفها غشاء من الملاط.

١٥٣ - أبو الهول العجول، صمل غيور

Deilephila celerio, Chocrocampa celerio, Hippotion celerio (S). Sphinx empressé (F). Zealous sphynx (E).

فراشة من فصيلة الهوليات ورتبة حرشفيات الاجنحة مختلفات الزباني. موطنها يشمل معظم اصقاع العالم القديم. الفراشة تعيش على رحيق الازهار اما السرفة فتعيش على اوراق الكرمة واوراق الفصيلة الباذنجانية. جسمها كبير القد. الذكر يطول نحو ٣٠ مم. وبسطه نحو ٥٢ مم. اما طول الانثى فنحو ٣٤ مم. وبسطها نحو ٦٠ مم. ثوبها الى الصبغة الحنطية الوردية الموج. زباناها قلاديان. عيناها زميتان. روشناها الاماميان كبيران. لونها الى السرة البنية تعلوها خطوط عاجية وتمشيع معترض وزرا كش متباينة الزخرفة. روشناها الخلفيان صغيران. لونها الى البياض الاغبر تعترضه اعصاب سود ويطوقه اطار اسود يكتشفه من الخارج حثار اغبر. سرفتها كبيرة، بسيمة، تطول من ٧٠ الى ٨٠ مم. ثوبها الى الخضار الحنطي الموج. وتحمل على جانبي ترجاتها البطنية، من السكة الثانية الى الثامنة بقعاً صغيرة بيض وسود. قرنبا الشرجي محدب، اسمر اللون. لها جيلان في الحول. فراشة الجيل الاول تظهر في اواسط الربيع وفراشة الجيل الثاني تظهر في ايلول. والانثى تمتع الممكن رزماً اسطوانية الشكل على اوراق النبات.

١٥٤ - أبو الهول المبطع هو صمل الزيفون، اطلبه.

١٥٥ - أبو الهول المبطع هو صمل الدنلي، اطلبه.

١٥٦ - أبو الهول المخطط هو صمل اليتوع، اطلبه.

١٥٧ - أبو الهول المرقع، صمل الكرمة المخطط، دلفيلة

Deilephila livornica, Celerio lineata (S).

Deilephile de la Vigne, Sphinx commun de la Vigne (F). White-lined sphynx (E).

فراشة من فصيلة الهوليات ورتبة حرشفيات الاجنحة مختلفات الزباني. موطنها اقاليم الكرمة في العالم القديم. الفراشة تعيش على رحيق الازهار اما السرفة فقوتها اوراق النبات ومنها الكرمة. جسمها كبير القد. الانثى اكبر قدماً من الذكر الذي يطول نحو ٣٢ مم. وبسطه نحو

منبته البرازيل . جذوره . وتدية غليظة . ساقه عارشة تطول من ٣ الى ٥ أمتار . أوراقه متعاقبة معنقة كثيرة التفصيص والتشريح تطول وتعرض نحو ١٢ سم . نصلها باهت الخضار مرقط بالابيض . ازهاره عطرية العرف خضراء اللون . ثماره ارجوانية ، صغيرة القدر قدرها قدر بيض المصفر لبها جامد المادة سكري المذاق .

١٧٠ - أبو براقيش* ، دغناش مبدول

Pyrrhula vulgaris (S). *Bouvreuil commun* (F). *Common Bullfinch* (E).

طائر من الجواثم المخروطيات المناقير وفصيلة الشرشوريات . جسمه صغير القدر طوله نحو ١٦ سم . وهو اسود الرأس والجناحين والذنب . اطلح الظهر . ابيض الخواشي والبطن والزمكي . احمر المنقار والصدر وسائر الجسم . ريشه شديد الموج || قال فيه الشاعر : « كأني براقش كل لون لونه يتخيل » ، وهو من طيور لبنان الأبدية يألف الاحراج والادغال الجبلية . يرغب في الاشجار الدائحة الباسقة || قوته النمل والديدان والاساريع والحبوب على اختلافها || يدن في الاشجار . انشاء تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها نحو ١٥ يوماً . بيضها مستدير . لونه الى الاخضر الموشى بالاسمر .

١٧١ - أبو بريص* ، *Gecko* (E). *Gecko* (F). *Tarentes* (F). هو الثعبان وسام ابرص . دويبة صغيرة من فصيلة الوزغيات . تعتبر من الدويبات النافعة لانها تلتهم الحوام وبعض الحشرات .

١٧٢ - أبو بشير* ، *Polypterus bechir* (S). *Polyptère Béchir* (F). *Polypterus Bichir* (E).

سمك نهري كبير الجثة مستطيلها من فصيلة الشنميات ، يكثر في النيل وفي معظم الانهر الافريقية . ثوبه الى الخضار الاسمر . زعانفه الظهرية متتابعة كاسنان المنشار . يعيش في سحل الانهر ويسبح كالانقليس .

١٧٣ - أبو بصك* ، *Daurade rose* (F).

سمكة بحرية تدعى رباك يرده ، اطلبها

١٧٤ - أبو بلسيق* هو الابلق ، اطلبه .

١٧٥ - أبو بوز* هو القنومة الخطاء ، اطلبها .

١٧٦ - أبو بيض* ، *Paspalum geminatum* (S). *Paspale* (F). *Millet grass* (E). *Pfannenhirse* (D). *Paspalo* (I).

نبات عشبي بري حولي كثير الاشطاء والدرفات البيضاء ينتمي الى فصيلة النجيليات . منبته الاقاليم الحارة والمعتدلة . سوقه فرعاء دقيقة وقصيرة . أوراقه عصفية الشكل ، حاضنة ومستطيلة . ازهاره سنبل التجميع يتألف من ثلاث او خمس سنبيلات ترتكز على زناد تخيل . يكثر بين الزروع وفي الارض البور . وهو من الاعشاب العلفية التي ترغب فيها الماشية || كان يستعمل قديماً لقطع السعال المزمن ولعلاج اوجاع الصدر والكبد . ومنهم من قال انه يزِيل الاستسقاء ووجع الرحم .

١٧٧ - أبو تمرّة* هو التير ، اطلبه .

١٦٤ - أبو الوشي الصغير* ، *Eudia payonia*. *Bشورة* (S). *Petit paon de nuit* (F). *Small Silkworm moth* (E). *Saturnia pavonia* (D).

فراشة ليلية خيلة الالوان المزركشة يكثر وجودها من اذار الى حزيران || يرقاتها خاضلة تركب اوراق الخوخ وبعض النباتات الزينية || تكافح باستعمال احد الحواشير الفعالة نفساً على الالوان .

١٦٥ - أبو الوشي الغيلمي* ، *Vanessa polychloros*. *Aglais polychloros* (S). *Vanessa grande tortue*. *V. polychrome*, *Paon grande tortue* (F). *Nymphalis polychloros* (E). *Grosser Fuchs* (D).

فراشة ليلية كبيرة القدر متعددة الالوان المتراكبة المدججة والمزركشة يغلّب فيها البرتقالي . يكثر وجودها من تموز الى ايلول || يرقاتها خاضلة تركب اوراق التفاح والكرز والمخلص والدردار... || تكافح باستعمال احد الحواشير الشديدة الوقع اخصها الزنيخات .

١٦٦ - أبو الوشي الليلي* ، *Saturnia pyri* (S).

Grand paon de nuit (F). *Giant Silkworm moth*, *Emperor-moth* (E). *Grosser Wiener*, *Nachtpfannauge* (D).

فراشة ليلية كبيرة القدر رواشنها كثيفة الزغب . لونها الى الجوزة تملوها زراكن مختلفة وبقع مستديرة يكثر وجودها من نيسان الى حزيران || يرقاتها خاضلة تركب اوراق الاشجار المثمرة اخصها الاجاص . طولها نحو ١٥ سم . ثوبها الى الخضار الزاهي ، تحمل عند كل مفصل من مفاصلها ثعول صغيرة زرقاء اللون يعلوها حلب طويل دقيق || صلجتها كبيرة وغليظة طولها يراوح من ٦ الى ٨ سم . تكافح بالتقاط اليرقات والصلجات .

١٦٧ - أبو الوشي النهارى* ، *Vanessa io* (S).

Petit paon du jour (F). فراشة صغيرة الحجم متعددة الالوان المزركشة الجميلة تكثر من تموز الى ايلول || يرقاتها خاضلة تركب البقول والقنب وغيرها || تكافح باستعمال احد الحواشير المرتكزة على الروتينون .

١٦٨ - أبو البسر* ، *Sبيرة المتوسط*

Glareola pratincola (S). *Glareole pratincole*, *Pouffe des sables*, *Pardrix de mer*, *Hirondelle des marais* (F). *Pratincole* (E).

نوع من السبر سريع الطيران كالخطاف . صغير الجثة طوله نحو ٢٥ سم . مستطيل السقط والذنب . ثوبه متداخل الالوان ، رأسه وظهره وسقطاه وذنبه الى الصهبة الطحلاء . زوره اغبر يحوق طوق من الريش الامغر . صدره وبطنه وزمكاه الى البياض || وهو من القواطع سر به يراوح من ٥ الى ١٠ أزواج يألف الشواطى البحرية وضفاف الانهر ومصباتها || قوته الحشرات على اختلاف انواعها من الاسروع واليرقة الى الفراشة والجرادة . يلتصق قوته من العصر الى الغروب || يدن عشه في شخايف الصخور بعيداً عن الاشجار قريباً من الماء . انشاء تضع اربع بيضات مستديرة الشكل غبراء اللون موشمة بالازرق والاسود تحضنها وحدها .

١٦٩ - أبو بوز* ، *Abobra* (S). *Abobra* (F).

نبات معمر وحيد الجنس والنوع من فصيلة القرعيات .



أبو الوشي الصغير



أبو الوشي النيلمي



أبو الوشي الليلي



أبو الوشي النهاري



أبو البسر



أبو براقش



أبو بشير



أبو بيض



أبو



أبوتيلون



أبوتيلون ابن سين



أبوتيلون أسرح



أبوتيلون نجمي



أبو درقة

أوراقها متعاقبة ، معنقة ، قلبية ، شرافية ، سنانية الزام
الآخر ، أزهارها صغيرة جميلة ، احادية ، ابطية ، طويلة
الزناد ، خاسية البتلات ، شقراء اللون . بزورها صغيرة
خلية متحدة القاعدة || تتكاثر بالبذر ، ترغب في
الأتربة الدبالية الغنية بالمواد العضوية . تنحني الرطوبة
المستحكمة والمواقع الشبالية .

١٨٣- أبو جرباب هو البجع ، اطلبه .

١٨٤- أبو جرادة

قال الدميري إنه الطائر الذي يسميه أهل العراق الباذنجان
ويسميه أهل الشام البصير . يؤخذ لحمه فيذوب ويتمسح
به من كانت البواسير فيه ظاهرة فينفعه نفعاً ينياً .

١٨٥- أبو جريون Chrysaora (S).

Chrysaora (F). Chrysaora (E).

جنس مدوس من قرصيات البحر . أنواعه المعروفة نحو ٢٠
منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة اخصها البحر
الايض المتوسط والمحيط الاطلسي . تألف المناطق
اليمة || تتميز بكبر القد وبكونها جميعها خشوية الشق .

١٨٦- أبو جقران هو الجدل المقدس ، اطلبه .

١٨٧- أبو جكتم هو العجهوم ، اطلبه .

١٨٨- أبو جهل هو النمر ، اطلبه .

١٨٩- أبو حداد هو الخلع الشجري ، اطلبه .

١٩٠- أبو حديج هو اللوسرج ، اطلبه .

١٩١- أبو حراب هو أرخ الصحراء ، اطلبه .

١٩٢- أبو حربة Monacanth (F).

هو النطاح من الاسماك البحرية ، اطلبه

١٩٣- أبو حلسا هو إثنان أبو ساق ، اطلبه .

١٩٤- أبو حشش هو حارس الحبشة ، اطلبه .

١٩٥- أبو خدأش هو النور ، اطلبه .

١٩٦- أبو خطاف هو النمر ، اطلبه .

١٩٧- أبو خنجر هو الكبوسين الكبير ، اطلبه .

١٩٨- أبو دخنخة هو الدخناء ، اطلبها .

١٩٩- أبو درقة* ، آذان الفيل Caladium

esculentum (S). Caladium, Pédiveau (F).
Indian kale, Elephant's ear (E). Beentwurz,
Kohl-pinte (D). Caladione (I).

نبات عشقولي معمر من فصيلة الفلقاسيات . أعطائه
البلاد الاسيوية الحارة الرطبة . سقوه ارضية عشقولية .
أوراقه قرصية التجميع ، كبيرة النصل القلبي الشكل
تقوم على محاليق مستطيلة . لونها الى الخضار الزيتي يحرقها
أطوار احمر يتصل بالصلع والعروق فتبدو كالسرنج المتقاطع
الخطوط الزاهية || يزرع للتزيين ضمن البيوت او في بعض
المواقع الخاصة خوفاً من البرد || يرغب في الأتربة المتناسبة
التركيب العنصري الغنية بالمواد العضوية والأزوت || أما

١٧٨- أبوته* Abuta refescens (S).

Abuta, Liane amère (F). White pareira brava (E).
Abuta-wurzel (D). Abuta, Liana amara (I).

نبات مداد من فصيلة القمريات ، منبته بلاد الهند
الصينية وكوبا وهايتي... ساقه ليفية مدادة عارشة ، أوراقه
لويحية ، معنقة ، رحيمة النصل ، مصقولة النسيج .
عصارتها قابضة لاذعة . أزهاره ثنائية التجميع ثلاثية
البتلات المستديرة ، ثماره لوزية . أما دقيقها وما يحويه
من مواد دهنية فيفيد في تمدد الكبد ويستعمل لادرار البول .

١٧٩- أبوتيلون* ، شجرة الواك

Abutilon, Sida (S). Abutilon (F). Yellow mallow,
Indian mallow (E). Schonmalve, Schmuckmalve,
Samtmalve (D). Abutilone, Abutilo (I).

جنبه خشوية الساق ، ليفية اللحاء من سبط السيداسيات
وفصيلة الخبازيات || ضرورها عديدة منتشرة في جميع
الاصقاع الحارة والمعتدلة . منها برية ومنها صناعية ومنها
للزئين || أوراقها كاملة ، مفترضة ، متعاقبة ، معنقة ،
قلبية الشكل . أزهارها ابطية ، احادية ، رأسية البتات ،
متحدة الاقلام . غريقات المبيض خاسية البتلات .
ثمارها دوائية النظام عند النضج ، متحدة من قاعدتها او
منفصلة من الفقار || منافعها : أوراقها لعابية لزجة
تستعمل كليفة . بزورها مقبلة للطعام ومدة للبول . أما
سوقها والياب قشورها فتصلح للغزل والنسيج .

١٨٠- أبوتيلون ابن سين* ، شوك الغنم ،

جوت منشوريا Abutilon Avicennae (S).

Abutilon ordinaire, Guimauve fausse, Jute de
Mandchourie (F). American jute, Am. velvet leaf,
Lantern flower, Manchurian jute (E). Sommer-
schonmalve, Bastardeibisch (D). Abutilo ordinario,
Malva gialla tessile, Cencio tessile (I).

جنبه حولية ليفية الساق واللحاء من سبط السيداسيات
وفصيلة الخبازيات . تزرع في بعض اصقاع منشوريا
وامريكا لاستخراج الياقها المستعملة في صناعة الجبال وفي
حياكة بعض الانسجة الوطنية الريفية || أوراقها متعاقبة ،
معنقة ، قلبية الشكل . أزهارها فردية ابطية الارتكاز
صفراء اللون || تستعمل أيضاً للتزيين ، تزرع في الحدائق
تتكاثر بالبذر .

١٨١- أبوتيلون أسرح* ، حب السنبل ، قرقدان

Abutilon muticum (S). Guimauve jaune (F).
Indian mallow (E). Cencio molle (I).

جنبه حولية ليفية من سبط السيداسيات وفصيلة الخبازيات
تزرع للتزيين . منبتها المعروف بلاد الهند || أوراقها
متعاقبة ، معنقة ، قلبية القاعدة ، شرافية ، مدبة المقصبة .
أزهارها احادية ، ابطسية وهامية ، قصيرة الزناد ، خاسية
البتلات ، صفراء اللون || بزورها صغيرة عفائية ،
منفصلة من الفقار ، معلقة بعصها || تتكاثر بالبذر
وتجود في جميع الأتربة القليلة والمتوسطة الاندماج .

١٨٢- أبوتيلون نجمي* ، خطمي هندي

Abutilon fruticosum (S). Althée, Althaea (F).
Twelve o'clock flower, Velvet leaved (E). Flore
di dodici ore, Malva Indiana (I).

جنبه حولية ليفية خلية الهيئة والملمس ، غبراء اللون ،
منتصبه الفروع من سبط السيداسيات وفصيلة الخبازيات .
تزرع للتزيين . منبتها الاصلي بلاد الهند وجزرها .

٢٠٨ - أبوز
Sauteur (F). Leaper (E).
الأبوز والأباز هو القفاز من كل حيوان .

٢٠٩ - أبو زريق* ، زرياب البلوط
Garrulus glandarius (S). Geal glandivore,
G. vulgaire (F). Common Jay (E). Eichelhäher (D).
طائر من الزرياب وفصيلة الغرابيات . يعتبر من الطيور
المؤذية الضارة . يألف القفص ويتقبل العلم فيقتبس
الاصوات ويردها || وهو بقدر الياسة أصداً اللون ،
أسود الذنب ، مجذع الجناحين بزرقه وخضار وسواد
ويبيض || قوته البلوط والحبوب والتفاح والثمار البانعة
وجميع انواع العصافير الصغيرة وفراخها ويبيضها والفأر
والعطاء والحشرات || يدفن في الاشجار الصغيرة على
ارتفاع بضعة اقدام . انشاه تبويض وتحفن وحدها من ه
الى ٧ بيضيات .

٢١٠ - أبو زلاف
هو الثيتل ، اطلبه .

٢١١ - أبو زماره
هي زيارة البحر الابرية ، اطلبها .

٢١٢ - أبو زهرا
هو ابن آوى ، اطلبه .

٢١٣ - أبو زيدان ، أنخونوم
Anchonium (S). Anchonium (F). Anconio (I).
نبات عشبي نجسي بري جردى معمر من فصيلة الصليبيات .
مهده بلاد الشرق الادنى . يقال انه من النباتات الطيبة
التي يتداوى بها والتي تقوي المعدة والامعاء || وهو من
نباتات جرود لبنان الطوعية ، يوجد من ارتفاع ١٥٠٠
الى ٢٥٠٠ م . نجمته كوكبية فرعاء . اوراقها جذرية
الانتشاب مستطيلة الشكل ، مستدقة العقصة . نصلها
خلى البشرة ، مسنن الحافة . ازهارها حرشفية الكاس ،
ارجوانية البتلات . سقاتها اسطوانية منتصبة مستدقة الطرف
زباء الملمس . بزورها ضخمة ثنائية التجميع السنني .

٢١٤ - أبو ساق

هو الطول طائر مائي من القواطع ، اطلبه .

٢١٥ - أبو سبال
Panure (F).
هو المسبال ، اطلبه

٢١٦ - أبو سعن* ، أرغل ، مريو

Leptoptilus (S). Marabout, Cigogne à sac, Argala,
Adjutant (F). Marabou, Adjutant (E).

نوع من طير اللقات . سمي ابا سعن لغدة في عنقه تشبه
السمن . وهو من الطيور القبيحة المنظر ، الكبيرة الجثة
التي تعيش في البلاد الحارة وقد تكثر في بعض المناطق الهندية
حيث يجلونها ويحرمون قتلها لانها تلتهم جميع اقدار المدن .

٢١٧ - أبو سعيد
هو اللقلق الاسود ، اطلبه .

٢١٨ - أبو سفاقة
هو ابو مركوب ، اطلبه .

٢١٩ - أبو سلام* ، عيشريق
Circaea lutetiana (S). Circe, Herbe aux sorciers (F). Enchanter's
nightshade (E). Grosses hexenkraut (D). Circea,
Erba maga, E. da incanti (I).

نبات عشبي حرجي معمر من فصيلة الاخدريات . ينبت
في بعض المناطق الباردة والمعتدلة . يوجد منه في احراج
القموعة من اعمال لبنان الشمالي || ساقه فردية تنتهي

في بلاده الحارة الرطبة وفي الاقاليم التي تماثلها فيزرع
للاكل كالبطاطا . عساقله كبيرة القد وزنها يراوح من
٢٠٠ الى ١٠٠٠ غ .

٢٠٠ - أبو ذقن*
Caryopteris Incana (S).
Caryoptire (F). Blue beard (E). Bartblume (D).
Cariopteride (I).

جنتية سبروتية معمرة من فصيلة رعي الحمام . اوراقها
متقابلة ، معتقة ، افقية الارتكاز . نصلها اهليلجي
الصفحة المخزوزة || ازهارها نوري التجميع ، صاجي
الشكل ، ابطي وهامي الارتكاز . ازهارها صغيرة القد ،
ليلكية اللون لا عرف لها || تزرع للتزيين . تتكاثر
بالبذر وتجود في جميع الانربة القليلة والمتوسطة الاندماج .

٢٠١ - أبو دينار* ، مريق فينيقي

Murex trunculus (S). Murex épineux (F).
Spikly Murex (E).

نوع من المريق . حيوان بحري من الرخويات معديات
الارجل . صدفه معتدلة الحجم او صغيرة ، مستطيلة
الانبوب ، كثيرة التزيدات الشوكية الشكل الذرية
الاطراف || يكثر وجوده في المياه اللبنانية الممتدة من
رأس الناقورة الى انفه ومجادح تربل || كانوا يستخرجون
منه الارجوان في عهد الفينيقيين .

٢٠٢ - أبو ذقن
هو خنزير الارض ، اطلبه .

٢٠٣ - أبو رقاش
هو النمر ، اطلبه .

٢٠٤ - أبو ركة* ، أبيد ، أبيد
Panicum
colonum (S). Blé du Dekkan (F). Dekkan grass,
Corn panic-grass (E). Dekkan grass (D).
Panico porporino, P. stellino (I).

نبات زراعي ، عشبي ، حولي ، عديم الاشطاء ، من
الفصيلة النجيلية . منبته الاقاليم الحارة . كثير الشبه
بالدخن || ساقه قصية ليفة ، منكفة عند العقدة
الاولى ولذا سمي بابي ركة . اوراقه عصفية ، رحيمة ،
طويلة ، حاضنة ، متوالية كعصف الذرة . ازهاره سنابل
هامية فرقة . حبة قلبية الشكل مستطيلة ، مغلف ، احمر
اللون يعلوه بعض الصفار . يستعمل في تحضير بعض المأكول
الوطنية الهندية والسودانية . ويستعمل ايضاً كمكاف الحضر
لبعض اجناس الماشية || يتكاثر بالبذر ويزرع عديداً
كالدخن في الانربة المتوسطة الاندماج

٢٠٥ - أبو رمح
Poisson-pique (F).

سمكة بحرية مشهورة باسم خدابة ، اطلبها

٢٠٦ - أبو رياح
هو اليؤثر ، اطلبه .

٢٠٧ - أبو ريش
Hedydipna (S).
Hedydipne (F). Hedydipna (E).

أبو ريش هو الاسم العربي الشائع في السودان والنوبة .
طائر وحيد الجنس والنوع من الجواثم رقيقات المناقير
وفصيلة المغثريات . موطنه يمتد من السودان الى الحبشة .
قوته رحيق الازهار والحوام والذباب || الذكر اجل
خضاباً من الانثى ، طوله نحو ١٧ سم . ثوبه الى الخضار
الاسفنج يعلوه موج ازرق وبنفسجي . بطنه جميل الصفار
الكبري . يتميز باستطالة الذنب .



أبو ذقن



أبو دينار



أبو ركة



أبو زريق



أبو سعن



أبو سلام



أبو سوم



أبو صنيعة



أبو صندوق



أبو صندوق أخطم



أبو طيط

الفكوك . انواعه المعروفة ٣٥ موطنها البحار الحارة . جميعها متوسطة او صغيرة القد طولها يراوح من ٢٠ الى ٥٠ سم . اجسامها مضلعة الزوايا ، ذاتة الحسك ، عظمية السهف الذي ينطلقها بدرع صلب تخرج منه الزعانف || اشهر انواعه :
أبو صندوق القرن *Ostracion quadricornus*
موطنه المحيط الهندي والبحر الاحمر .

أبو صندوق طويل القرن *Ostracion nasus*
موطنه البحر المتوسط .

٢٣٦ - أبو صندوق أخطم* ، نجم أخطم

Ostracion nasus (S). *Ostracion cornu*, *Coffre cornu* (F). *Coffer-fish* (E).

نوع من ابي صندوق . سمكة بحرية بيوض . اعطائها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي || تعتبر من اسماك الاغواط . قوتها النباتات البحرية || جسمها بيضي الشوزن ، يطول من ٣٠ الى ٤٠ سم . وهو مضلع الزوايا ، ناق الحسك ، عظمي السهف الذي ينطلق الجسم بدرع جامد صلب تخرج منه الزعانف والقليل من الذنب . وتعلوه اطراف وتنتوء متباينة الاشكال تمتد من الرأس الى اطراف الظهر || ثوبها الى الخضار البحري الباهت تعلوه ماجة رداء وخطوط شديدة السمرة القائمة . بطنها الى الرعدة البدراء . اطرافها وزعانفها الى الرعدة السمرام || لحمها رديء الصنف ، لا يؤكل .

٢٣٧ - أبو صنصون هو الضبرك ، اطلبه .

٢٣٨ - أبو صوي هو صرارة المتوسط ، اطلبها .

٢٣٩ - أبو ضبة هو الدراج ، اطلبه .

٢٤٠ - أبو طبق

هو الطبق جنس اسماك بحرية من السحليات .

٢٤١ - أبو طيط* ، طيط ، زقزاق شامي

Vanellus (S). *Vanneau* (F). *Lapwing* (E).

نوع من الزقزاق ثوبه الى السواد اللامع تعلوه زرقة وخضرة . صدره وباطن جناحيه بيض . رؤوس قواده ومناكبه الى الشقرة الصنابية . ذنبه اشعث اللون || وهو من القواطع التي تجوب الشرق واروبه وافريقية . يألف المناقع وصفاف الانهر . يدث في افحوص يفرشه بالحشائش الناعمة . انشاء تضع من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها وحدها .

٢٤٢ - أبو طيط متوج ، طيط متوج ،

أبو قيق ، طرطيس ، زقزاق شامي .

Vanellus vanellus, *V. cristatus* (S).

Vanneau huppé (F). *Green Plover* (E).

طائر من الزقزاق ورتبة طوال الساق . وهو من القواطع التي تجوب الشرق واروبه وافريقية الشمالية والشرقية حتى خط الاستواء || جسمه رشيق القوام . طوله نحو ٣٤ سم . وبسطه نحو ٤٥ سم . ثوبه العلوي الى السواد اللامع تعلوه زرقة وخضرة ومواج اسفع . قة رأسه وقزعتة وجدة زوره واعلى صدره الى السواد اللامع ، اما القسم الآخر من صدره مع بطنه وخوافيه فالى البياض العاجي . علاطا عنقه الى الغبرة . محسره الى البياض الاكدر تعلوه خط اسود ترتكز عليه العين . جناحه قضااض يلحظ الذنب .

بالعنقود الزهري . اوراقه معنقة متقابلة ، صغيرة الاذينات قلبية النصل المسن || ازهاره خشوية صغيرة ، رباعية البتلات ، عسلية اللون مندحمة . انبوبة الكاس لاصقة بالمبيض || كانوا يستعملونه في الرقية وفي الطلاسم والسحر .

٢٢٢ - أبو سُولَع هو أرخ الجزيرة ، اطلبه .

٢٢١ - أبو سوم* *Metachirus opossum* (S).

Opossum, *Sarigue opossum* (F). *Sarigue*, *Opossum* (E). *Beutelratte* (D).

نوع من السريغ من فصيلة الجرذان الجراية ، صغير القد ، رمادي اللون ، قصير الوبر ، طويل الذنب الاملط الاخاذ . اعطانه بلاد امريكا الوسطى واخصها المناطق الحارة .

٢٢٢ - أبو سيراس

قال القزويني في الاشكال انه حيوان يوجد في الفياض تكامل في قصبة افه اثنتا عشرة ثقبه اذا تنفس يسمع من افه صوت كصوت المزمار . والحيوانات تجتمع عليه لاستماع ذلك الصوت فاذا ادهش بعضها لذلك ، يصيده فيأكله فان لم يتهيا له صيد شيء منها وضجر صاح صيحة هائلة فتتفرق الحيوانات وتفر عنه .

٢٢٣ - أبو سيف هو سيف البحر المعروف ، اطلبه .

٢٢٤ - أبو شام هو بلسم مكة ، اطلبه .

٢٢٥ - أبو شيعاع *Polynème* (F).

سمكة بحرية من شائكات الزعانف تدعى بلنومة ، اطلبها .

٢٢٦ - أبو شلبه هو البجع ، اطلبه .

٢٢٧ - أبو شخاخ هو السنور ، اطلبه .

٢٢٨ - أبو شكتب هو الهجرس الأسبل ، اطلبه .

٢٢٩ - أبو شوكة

هو الزمر سمكة نهريّة صغيرة ، اطلبه .

٢٣٠ - أبو صبيزة* *Tityra* (S). *Bécarde* (F).

طائر من الجواثم المشرومات المناقير وهو احمر البطن ، اسود الظهر والرأس والذنب ، قوي المنقار والمخالب . قوته الحشرات على اختلاف انواعها ولا يعف عن بعض الثمار اليابسة || يألف الإحراج والغابات . يدث في اعالي الاشجار الباسقة . انشاء تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها .

٢٣١ - أبو صفن *Gazelle à bourse* (F).

نوع من الغزلان يدعى نزاق ، اطلبه .

٢٣٢ - أبو صفيتر هو النارج ، اطلبه .

٢٣٣ - أبو صلاح هو السرعة ، اطلبها .

٢٣٤ - أبو صمصام

Falcirostre à bec en sabre (F).

طائر يدعى قضاب أحجن المنقاد ، اطلبه .

٢٣٥ - أبو صندوق* ، نجم

Ostracion (S). *Coffre* (F). *Coffer fish* (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة النجميات ورتبة ملحومات

Faux nerprun (F). Sea buck thorn, Sallowthorn, Willow thorn (E). Echter sanddorn, Weidendorn, Haftdorn (D). Gorra, Olivella, O. spinosa (I).

جنية برية معمرة شائكة من فصيلة الخلافيات تكثر في الأودية والمواقع الظليلة وعلى ضفاف الأنهار والشواطئ الرملية الرطبة || أوراقها ضيقة مستطيلة ، نصلها وحيد الضلع ، خمل البشرة ، فضي اللون . أشواكها خشبية حادة . أزهارها فردية محورية الارتكاز . ثمارها نووية الشكل ، عنبية القد ، برتقالية اللون ، وحيدة البذرة الصغيرة الصلبة . لبها حامض الطعم ، شديد الحموضة . ثمارها اللينة غنية بالفيتامين «آ» و «ث» . وبمسا أن حوضها الزائدة تحول دون أكلها المباشر لذلك يحسن استعمال ربه المطبوخ بالسكر || الكيلو من الثمر يعطي من ٧٠٠ إلى ٧٥٠ غم . عصير . والكيلو من العصير يلزمه ٤٠٠ غم . سكر ثم يغلى على النار من ١٠ إلى ١٢ دقيقة .

٢٥٦ - أبو قحت Avocette (F). Avocet (E). طائر مشهور باسم نكبات ، اطلبه .

٢٥٧ - أبو قروة Châtaigne (F). Chestnut (E). ثمرة الكستنة وهي من الثمار الغنية بالمواد الغذائية . راجع كستنة .

٢٥٨ - أبو قروة* ، مرغى Casarca ferruginea (S). Casarca, Cassart (F). Ruddy shelduck (E). طائر من البط ينتمي إلى جنس الذهبيل ، رأسه وجوشه احمران . عنقه مطوق باطار اسود . قواده بيض . ظهره وبطنه وسائر ريشه إلى الرمادي الامر الاسفع الموج . وهو من طيور الماء القواطع التي لا تقيم في لبنان أكثر من بضعة أيام .

٢٥٩ - أبو قصادة هي ذرة الغنم ، اطلبها .

٢٦٠ - أبو قنابس هو إثنان القلي ، اطلبه .

٢٦١ - أبو قربة هو البجع ، اطلبه .

٢٦٢ - أبو قردان هو ابن الماء العادي ، اطلبه .

٢٦٣ - أبو قرص

هو الطبق سمكة بحرية من السحليات ، اطلبه .

٢٦٤ - أبو قرن* Naseus (S).

Nason, Nason licornet (F). Unicorn fish (E).

جنس سمك بحري من شائكات الزعانف يتميز بقرنه العظمي القائم في مقدم الرأس وبشكله الاهليلجي المفلطح وبزعانفه الظهرية والبطنية المتتابعة . ظهره رصاصي اللون ، بطنه إلى الرمادي الاغبر || أنواعه المعروفة خمسة فوارقها أشكال قرونها وحجم جنسها . يكثر وجودها في بحار البلاد الحارة .

٢٦٥ - أبو قرن ، تمليكة Gynandropsis

pentaphylla (S). Brède Caya, Gynandrop (F). Bastard mustard, Sambo (E). Senfkapper, Kleome (D). Bretta, Cleome (I).

نبات عشبي بقلي زراعي من فصيلة الكبريات . مهدد جزر الارخبيل والانتيل وموريس . وهو يستعمل في تلك البلاد للاكل بمثابة الاسبانخ || أوراقه مركبة ، خماسية الفصوص . نصلها غليظ الضلع ، قليل العروق ، غزير العصارة والمادة الخضراء || أزهاره عنقودية التجميع ، منتصب ، قلبية ، دقيقة البتلات الغبراء اللون || بزوزه

كرسوع منكبه مجهز بمنخس قرني المادة مدبب الطرف . ذنبه قصير الجرم ، ابيض النصف الاول ، اسود النصف الثاني ، حنطي الافنيك . عينه مكحلة ، كستنية اللون . منقاده اسود ، ساقاه رقيعتان جؤويتا اللون || الانثى اصغر قدماً من الذكر وابنت ثوباً منه . يالف المناقع وضفاف الأنهر والغدران . قوته الحشرات والديدان والبراغ والرخويات والقشريات || يذبح افحوصه بين الاعشاب في حفرة يفرشها بالحشائش الناعمة . الانثى تحضن من ٣ الى ٤ بيضات اجاصية الشكل . الترخيم يستمر من ٢٤ الى ٢٧ يوماً تقوم به الانثى بمناوبة الذكر في اثناء الليل || يعتبر من الطيور النافعة .

٢٤٣ - أبو ظفر هو التورم المصري ، اطلبه .

٢٤٤ - أبو عدس ، أبو عكص ، أبو عكش ، أبو عكش هو المهة ، اطلبها .

٢٤٥ - أبو عرف الاسود هو المهب الاسود ، اطلبه .

٢٤٦ - أبو عرف الاغبر هو المهب الاغبر ، اطلبه .

٢٤٧ - أبو عمي هو السبد الشائع ، اطلبه .

٢٤٨ - أبو عريف هو لبث عفرين ، اطلبه .

٢٤٩ - أبو عيزار هو البلشون الجبار ، اطلبه .

٢٥٠ - أبو عين هو الحسرم ، اطلبه .

٢٥١ - أبو عيئون* Bucephalus capensis (S).

Bucéphale (F).

حية من الحفاث وفصيلة الثعبانيات . موطنها البلاد الافريقية . تكثر في الجنوب قرب مجاري الماء . وهي مستطيلة الجسم ، غليظة الرأس ، بارزة العينين ، مستدقة الذنب .

٢٥٢ - أبو غزوان هو السنور .

٢٥٣ - أبو غلام* Spargularia (S).

Spargule, Spargulaire (F). Sand spurrey (E).

Spärkling (D). Spargularia (I).

جنس نباتات عشبية برية معمرة من الفصيلة القرنفلية . تنبت في جميع الاصقاع المعتدلة الحرارة . تكثر في مرتفعات لبنان والعلايين || أنواعه عديدة . سوقه عشبية ، منتصبية متشعبة . أوراقه حاضنة ، متقابلة ، لحيية ، خيطية ، مدببة . أزهاره ابطية وهامية الارتكاز ، طويلة الزناد ، خماسية البتلات الوردية اللون . والبتلات متدعة في أسفل الكأس || بزوره صغيرة ، ملساء ، كروية ، سمراء ، محاطة باطار اغبر ، يحممها حتى زيتوني الشكل رباعي الغلق . وهذه البلور تستعمل في الطب لعلاج الحصاة .

٢٥٤ - أبو غلام الرمال* ، عشبة حمراء Spargularia

rubra (S). Spargulaire rouge, Sabline rouge (F).

Sand spurry, Red sand-wort (E). Roter sandkraut,

Roter spärkling (D). Spergola, Lupinaia (I).

نوع من ابي غلام وهو نبات عشبي بري معمور . سوقه حمراء وأزهاره كذلك . يعيش في الاراضي الرملية || يقال ان بذوره لا تخلو من الخواص الطبية النافعة لعلاج الحصاة .

٢٥٥ - أبو فليس* ، شوك القصار Hippophae

ramnoides (S). Hippophaé, Argousier, Griset,



أبو عيون



أبو غلام



أبو غلام الرمال



أبو فليس



أبو قرون



أبو قرون



أبو قلنسة



أبو لوي



أبو ليد



أبو ميخجن



أبو مخيط



أبو مركوب



أبو مسكية

٢٧٦ - أبو مَالِك Souchet commun (F).

طائر من البط الوحشي يدعى كبش ، اطلبه .

٢٧٧ - أبو مِرْحَجَن * Ibdorhynchus (S).

Ibdorhynque (F). Ibdorhynchus (E).

طائر وحيد الجنس والنوع من طوال الساق فضيلة دجاجيات الارض . موطنه سفوح جبال حلايا || يألف ضفاف المنافع وبجاري الماء . ملجئه الحياتي جماعي . فرجه يعد من ١٠ الى ٣٠ زوجاً . قوته الحشرات والدوريات اخصها المائية || جسده معتدل القد ، يطول نحو ٢٦ سم . منقاده اسجين مستطيل . جناحاه لاحقان . ذنبه مخروطي قصير . ساقاه مستطيلتان . ثوبه الى الكهبة الرصاصية . قمة رأسه ونحره ومنقاده سود . بطنه اغير اللون تعرضه جدة سوداء في مؤخر الصدر || يدشن عشه في اقصوص يختفونه بين الاعشاب المتكاثفة المترامية . الانثى تحضن وحدها من ٦ الى ٨ بيضات بينما الذكر يؤمن لها الغذاء .

٢٧٨ - أبو مُخَيِّط * ، أزيب البحر Diodon atinga (S).

Diodon épineux, Orbes épineux (F). Globe-fish (E). نوع من قنفذ البحر اي الشيم البحرى ، من فصيلة الفهقيات ورتبة ملحومات الفكوك || وهو من الاسماك الشائكة غير المأكولة ، تكثر على شواطئ بحار البلاد الحارة .

٢٧٩ - أبو مِدِيد هو الخرطون ، اطلبه .

٢٨٠ - أبو مَرَكُوب * ، أبو سَفَاقَة Balaeniceps rex (S). Balaeniceps rex, Bec en sabot (F).

Shoebill stork (E). طائر مائي من فصيلة البيلشونيات ورتبة طوال الساق .

كبير القد ، رفيع الهامة ، بشع الشكل ، منقاره عجيب الطيبة يشبه الخذاء المنعطف الطرف || يكثر على ضفاف النيل الابيض والازرق وعلى شواطئ بحر الغزال وبحيرة فيكتوريا نيازا . قوته السمك والحيات والعطاء والجيف .

٢٨١ - أبو مَرِيْشَة هو شيخ البحر ، نوع من الفقمه ، اطلبه .

٢٨٢ - أبو مَرِيْشَة هو الشيق من الاسماك البحرية الماصة للدم ، اطلبه .

٢٨٣ - أبو مَرِيْشَة مَبْدُول Murène commune (F).

سمكة بحرية مشهورة باسم شيق مبدول ، اطلبه .

٢٨٤ - أبو مَرِيْشَة « سمك في البحر على صورة الرجل يقال انها تظهر في الاسكندرية والبرلس ورشيد على صورة بني آدم مجلود لجة واجساد متشاكلة لها بكاء وعويل » (القزويني) .

٢٨٥ - أبو مُسْكِيَّة * Clarias laticeps (S).

Clarias d'Afrique (F). Clarias laticeps (E).

سمكة نهريه من نوع السلور توجد في النيل والنيجر وفي بعض الانهار الافريقية . وهي عادمة الحراشف . رأسها مخروطي الشكل ، شديد الصلابة . زعنفتها الظهرية تقطع ثلج الظهر من العنق الى الشرج || ثوبها رخامي اللون ، اطلح الموج .

٢٨٦ - أبو مِسْوَط هو الملاعقي الوردي ، اطلبه .

مستديرة صغيرة سمراء اللون يجمعها حق عدسي الشكل رباعي الفلق || يتكاثر بالبذر ويزرع كالاسبانخ لكنه يخشى المواقع الباردة ويرغب في الاتربة الخوارة الغنية بالعناصر المعدنية .

٢٦٦ - أبو قُرَيْن هو البوقير ، اطلبه .

٢٦٧ - أبو قَشَش هو الخرشة المتوجة ، اطلبها .

٢٦٨ - أبو قَلَمُون هو الزمت ، اطلبه .

٢٦٩ - أبو قَلَنْسُوَّة * Sylvia atricapilla (S).

Fauvette à tête noire (F). Blackcap (E).

نوع من الدخلة وهو من عصافير التين المشهورة . صغير القد ، طوله نحو ١٤ سم . الذكر اسود الرأس يدعى الخوري والانثى مفراء الرأس تدعى الشمس . جوشنه الى الصهبة الزرقاء ، ظهره وجناحاه وذنبه الى الجوة الرمضاء . منقاره ورجلاه الى الصهبة الرصاصية . الانثى افصح لوناً من الذكر وبطنها يميل الى الغبار || قوته الحوام والحشرات الصغيرة والبار البائعة . يألف الجنائن والحدائق والبساتين والادغال . يدن في الشجيرات والجنات الشائكة . انشاء تبيض مرتين في السنة . الاولى في مطلع ايار والثانية في اواسط تموز . حضنتها من ٤ الى ٦ بيضات ، لونها اصهب امفر تعلوه نقط سمر مبعثرة بدون قياس || يألف القفص ويقتبس اصول التفريد .

٢٧٠ - أبو قِيْق Vanneau huppé (F).

طائر مشهور باسم أبو طيط متوج ، اطلبه .

٢٧١ - أَبُوكَاة ثمرة الاهوكاتية ، اطلب أدوكه .

٢٧٢ - أَبُوكَايَّة هي الاهوكاتية ، اطلبها .

٢٧٣ - أَبُوكَاة هي الاهوكاتية ، اطلبها .

٢٧٤ - أبو لُؤْي * ، لُؤَاء Yunx torquilla (S).

Torcol, Torcou (F). Wryneck (E). Wendehals (D).

طائر من المتسلقات وفصيلة النقاريات يتميز بلوي رأسه في جميع الاتجاهات . وهو صغير القد ، قدره قدر الصرد ، طوله نحو ٢٠ سم . ادهس اللون من قة رأسه الى طرف ذنبه . منقاره ورجلاه الى الخضار الاصفر || قوته الحشرات الصغيرة اخصها النمل . انشاء تدن عشها في تقار الاشجار القديمة العهد . تضع من ٥ الى ٨ بيضات ، لونها الى البياض الاغبر ، تحضنها وحدها نحو ١٤ يوماً . وهو من الطيور القواطع النافعة الواجب حمايتها ومنهم من قال انه من اوابد لبنان .


٢٧٥ - أبو لَيْلَة * ، أُوْزِيْوِس ، هَلَقِي ، نَشَاس ، أبو الصَّالِح ، أبو الصَّلَاة Osyris alba (S).

Osyris blanc, Osyride blanche, Rouvet (F).

Garde-robe, Poet's cassia (E). Welsser

harnustrauch (D). Cassia poetica, Genistrella (I).

جنية صغيرة من فصيلة الصندليات . منبها حوض البحر المتوسط . اوراقها بيضيه ، مستطيلة ، جامدة النصل . ازهارها كاملة ، خنثوية ، ثلاثية البتلات ، بيضاء اللون . ثمارها كروية الشكل . صغيرة القد قرمزية اللون . تنبت برية وتزرع للترزين .



أبو مشط



أبو مشقة



أبو مشول



أبو مصقار



أبو منشار



أبو منقار



أبو مهاز

٢٨٧ - أبو مُشَط * Taenianotus triacanthus (S).
Ténianote (F).

سمكة بحرية بيوض من شائكات الزعانف وفصيلة الطريحيات ، أعطائها بعض مناطق المحيط الهندي || جسمها معتدل القد يطول نحو ٢٧ سم . رأسها متوسط الجرم ، خافت الجبهة ، مقطوم الخطم ، كبير الشدق ، ثلاثي المناخس الذريرة الصغيرة . عينها كبيرتان ، متقاربتان ، متقدمتان . زعنفتها الظهرية كبيرة قاطبة مشطية الشكل ، تمتد من الرأس الى قاعدة الذيل . زعانفها الصدرية والخصوية والشرجية معتدلة الحجم ، مرقوشة الثوب . الذيلية شبه مستديرة . ثوبها الى الشبهة الزرقاء تسمر وتعبق في الظهر وفي طرف الذيل وتغبر في الجانبين وفي البطن .

٢٨٨ - أبو مُشَقَّة * Erodium gruinum (S).
Erode, Bec de grue (F). Stork's bill (E). Reiher-
schnabel (D). Becco di gru, Gruina (I).

نوع من الحزاز وهو نبات عشبي بري وزراعي من فصيلة الغرنوقيات . ساقه فرعاء مفصليّة قصيرة السلاميات . اوراقه مركبة ، زغبية ، نافرة العروق ، يجمعها زناد ليفي ازغب || ازهاره مزدوجة طويلة المعالق المنتصب ، خماسية البتلات البيض وبياضها يشوبه شيء من البنفسجي . ضرابه عديدة منها برية علفية ترعاها الماشية ومنها زراعية تزيينية تزرع في الحدائق والمراكن || يتكاثر بالبذر والعقل . يرغب في التربة المتوسطة الاندماج المعتدلة الرطوبة .

٢٨٩ - أبو مُشَوَّل * Falculia palliata (S).
Falculie à mantelet (F).

طائر وحيد الجنس والنوع من الجواثم رقيقات المناقير وفصيلة الطهدديات . موطنه جزيرة مدغشكر . يألف البراري والادغال التي لا تبعد كثيراً عن مجاري الماء . ملجئه الحياتي زوجي . قوته الحشرات المجنحة والديدان والدعابيص وبعض الثمار العنينة البرية || جسمه متوسط القد يطول نحو ٣٦ سم . متفاده مشولي الشكل ، دقيق الطرف المدبب ، يطول نحو ٨ سم . رأسه وعنقه وصدره وبطنه الى البياض الاغبر الدنس . رداؤه وجناحاه وذنبه الى السواد الفحمي . ذنبه متوسط الطول ، مقطوم الطرف || يدثن عشه في اعالي الاشجار الرفيعة . الانثى تحضن وحدها من ٤ الى ٥ بيضات بينما الذكر يؤمن لها الغذاء .

٢٩٠ - أبو مُشَقَّار * Scarus (S). Scare (F).
Parrotwrasse, Parrot-fish (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة بنات مصقار . انواعه عديدة جميعها زاهية الالوان كان لها شهرة عظيمة عند الفينيقيين والرومان . وهي من الاسماك المأكولة اللذيذة الطعم غير ان البعض يتحاشون أكلها في أشهر شباط واذار ونيسان خوفاً من مرعاها السام الممكن انتقال مفعوله الى آكلها || أشهر انواعه : الحريت ودرة البحر وديك البحر والسيجان والغبان والغيتان .

٢٩١ - أبو مُقَصَّص * Calmar à griffes (F).

هو الجنداعة من الحيوانات البحرية ، اطلبها .

٢٩٢ - أبو مُقَطَّم * Ebonite

٢٩٣ - أبو مُلَعَقَة * هو الملاعقي الابيض ، اطلبه .

٢٩٤ - أبو مُلَقَط Anastome

٢٩٤ - أبو مُلَقَط Anastome

٢٩٥ - أبو مُلَبَّح Crex des prés (F).

٢٩٥ - أبو مُلَبَّح Crex des prés (F).

٢٩٦ - أبو مُنَجَّل * Taenianotus triacanthus (S).
Ténianote (F).

٢٩٦ - أبو مُنَجَّل * Taenianotus triacanthus (S).
Ténianote (F).

٢٩٧ - أبو مُنَشَّار * Pristis (S).
Sclé (F). Sawfish (E).

٢٩٧ - أبو مُنَشَّار * Pristis (S).
Sclé (F). Sawfish (E).

٢٩٨ - أبو مُنَشَّار المُتَوَسِّط Pristis pectinatus (S).
Sclé pectinée, Vivelle (F).

٢٩٨ - أبو مُنَشَّار المُتَوَسِّط Pristis pectinatus (S).
Sclé pectinée, Vivelle (F).

٢٩٩ - أبو مُنَشَّار المُحِيط Pristis antiquorum (S).
Sclé commune (F). Common sawfish (E).

٢٩٩ - أبو مُنَشَّار المُحِيط Pristis antiquorum (S).
Sclé commune (F). Common sawfish (E).

٣٠٠ - أبو مُنَظَرَة Raja clavata (S).
Raie bouclée (F). Thornback (E).

٣٠٠ - أبو مُنَظَرَة Raja clavata (S).
Raie bouclée (F). Thornback (E).

٣٠١ - أبو مُنَقَّار * Hemiramphus (S).
Hémiramphé (F). Halfbeak (E).

٣٠١ - أبو مُنَقَّار * Hemiramphus (S).
Hémiramphé (F). Halfbeak (E).

٣٠٢ - أبو مُهَمَّاز * Gryllomorpha (F).

٣٠٢ - أبو مُهَمَّاز * Gryllomorpha (F).

٣٠٣ - أبو مُبَبَّر * Ebonite

٣٠٣ - أبو مُبَبَّر * Ebonite

٣٠٤ - أبو نَبَّاح ، بوشَبَك ، نَبَّاح

٣٠٤ - أبو نَبَّاح ، بوشَبَك ، نَبَّاح

٣٠٥ - أبو نَضَوَة

٣٠٥ - أبو نَضَوَة

٣٠٦ - إِبُونَيْت

٣٠٦ - إِبُونَيْت

٣٠٧ - أبو نَضَوَة

٣٠٧ - أبو نَضَوَة

٣٠٨ - أبو نَضَوَة

٣٠٨ - أبو نَضَوَة

٣٠٩ - أبو نَضَوَة

٣٠٩ - أبو نَضَوَة

٣١٠ - أبو نَضَوَة

٣١٠ - أبو نَضَوَة

٣٠٧- أبو هرّون

هو الهزار . لم يذكره غير الدميري الذي قال عنه : « هو طائر في حنجرتة اصوات مليحة شجرة يفوق انشواخ ويروق فوق كل منى ، لا يسكت بالليل البتة ويصبح الى وقت الصباح وتجتمع عليه الطيور » .

٣٠٨- أبي الرقص هو القرى الشائع ، اطلبه .

٣٠٩- أبيضجة ، زهر العضاه ، زهرة مايو

Epigaea (S). Epigée (F). Trailing arbutus, May-flower (E). Grundstrauch, Primelstrauch (D). Epigaea (I).

جنس نباتات معمرة برية وتزيينية من فصيلة الخلنجيات . له نوعان : ابيجة منتصبه وابيجة عارشة . سوقها زياء اللحاء . اوراقها كاوراق القلطب . فصلها خلي البشرة . ازهارها بيضاء اللون يشوبها موج وردى || تعيش بين الصخور في الحضاب والجبال .

٣١٠- أبيضين Epigyne (F). Epigynous (E).

اعلى المبيض وهو جزء من جهاز بعض الازهار .

٣١١- أبيضد ، أبيضد اطلب ابو ركه .

٣١٢- أبيضد Toujours vert (F). Evergreen (E).

نعت وصفي للنبات الدائم الخضرة على مدار السنة .

٣١٣- أبيضول Apyrol

حاشور زراعي يرتكز على مادة تريكلوريتلان . يستعمل لوقاية الحبوب المعدة للأكل من عبث الحشرات بمعدل ٣٠٠ سم لكل مائة كيلو من الحب .

٣١٤- أبيضية * ، أم كوكولو Aberia caffra,

Doyalls caffra (S). Abérie, Umkokolo (F). Key apple (E). Aberia (I).

جنية شائكة من النفضيات . منبتها امريكة الجنوبية . تزرع للسياج . ثمارها مأكولة مستديرة برقوية الشكل . لونها الى الصفرة . لها لذيذ الطعم فيه شيء من الحموضة . عرنها فواح الرائحة المستحبة المنعشة || ترغب في الارربة العميقة الغور التي لا تخلو من الرطوبة .

٣١٥- أبيضة * Epicea, Picea (S).

Epicea (F). Spruce (E).

جنس اشجار حرجية وتزيينية من فصيلة الصنوبريات . انواعه عديدة مختلفة الاشكال والاحجام . ثنتها مخروطية ، اغصانها يرمية ، اوراقها عروة دائمة الخضار . كرزها معلق || اشهر انواعها واعرفها ما يتبع .

٣١٦- أبيضة أموريكا Picea omorica (S).

Epicea omorica (F). Omorica spruce (E).

شجرة حرجية وتزيينية تعلو من ٣٠ الى ٤٠ م . منبتها بلاد البلقان . قالها هرمي الشكل مستدق القنة . اوراقها صغيرة مدببة العقصه لونها الى الخضار البحري . كرزها مستدير الاسقاط العادمة التسنين ، لونه الى الجؤوة البنفسجية ، طوله نحو ٥ سم . وقاعدته ٢ سم .

٣١٧- أبيضة بيضاء Picea alba (S).

Sapinette (F). Epicea blanc (F). White spruce (E). blanche, Welsse fichte (D). Pece bianco (I).

شجرة حرجية وتزيينية تعلو من ١٥ الى ٣٠ م منبتها كندا . اوراقها قصيرة مدببة ومنتصبه . لونها الى الاخضر الزاهي . يعلو موج فضي . نواحيها حنطية اللون . كرزها رقيق الاسقاط المقطوعة المتراكبة ، طوله نحو ٥ سم . وقاعدته ٢ سم .

٣١٨- أبيضة حمراء Picea rubra (S). Epinette

rouge, Sapinette rouge (F). Red-spruce (E). شجرة حرجية وتزيينية تعلو من ٢٠ الى ٤٠ م منبتها البلاد الامريكية . اوراقها ضيقة ، جميلة الخضار العابق . كرزها صغير القد ، طوله نحو ٤ سم . وقاعدته ٢ سم . لحاء جذعها واغصانها الى الجؤوة الحمرة .

٣١٩- أبيضة سامية Picea excelsa, P. vulgaris (S).

Epicea commun, Sapin de Norvège, S. blanc, S. du Nord, Pesse, Pesce (F). White fir, Norway-spruce (E). Tannenfichte, Rattanne, Fichte (D). Abeto pece, Epicea, Pezzo, Picella (I). شجرة حرجية شائخة ، مدببة القنة ، تعلو من ٢٠ الى ٦٠ م . تكثر في اروبة الشمالية . اوراقها ابرية العقصه لونها الى الاخضر الزاهي . كرزها لبد الاسقاط ، طوله من ١٠ الى ١٦ سم . وقاعدته من ٣ الى ٤ سم .

٣٢٠- أبيضة سوداء Picea nigra (S). Epinette

noire, Sapinette noire (F). Black-spruce (E). شجرة حرجية وتزيينية ، تعلو من ٢٠ الى ٣٠ م . منبتها كندا وامريكة الشمالية . اوراقها صغيرة لونها الى الاخضر الازرق العابق . كرزها صغير القد ، طوله نحو ٣ سم . اسقاطه مستديرة مسننة لونها الى الجؤوة البنفسجية .

٣٢١- أبيضة شائكة Picea spinulosa (S).

Epicea spinuleux (F). Spine-spruce fir (E). شجرة حرجية وتزيينية تعلو من ٦٠ الى ٨٠ م . منبتها جبال حلايا . اوراقها نحيلة طويلة . افنادها متدلية . كرزها ضيق الاسقاط المسننة المتراكبة ، طوله نحو ٨ سم . وقاعدته ٣ سم .

٣٢٢- أبيضة شرقية Picea orientalis (S). Sapin

d'Orient, Epicea d'Orient (F). Oriental spruce fir (E). Taurische fichte (D). Abeto orientale (I). شجرة حرجية وتزيينية تعلو من ١٥ الى ٢٠ م . منبتها الشرق الادنى . اوراقها قصيرة مدببة جميلة الخضرة القائمة . كرزها مستدير الاسقاط طوله نحو ٨ سم . وقاعدته ٢ سم .

٣٢٣- أبيضة طنبيرجي Picea Thunbergi (S).

Epicea de Thunberg (F). Spruce of Thunberg (E). شجرة حرجية وتزيينية تعلو من ٢٠ الى ٣٠ م . منبتها اليابان . اوراقها صغيرة ، ابرية العقصه تكتنف الافناد والافنان من جميع جهاتها . كرزها مستدير الاسقاط المسننة الكستنائية اللون .

٣٢٤- أبيضة موريندا Picea morinda (S).

Epicea morinda (F). Morinda spruce (E). شجرة حرجية وتزيينية تعلو من ٣٠ الى ٦٠ م . منبتها جبال حلايا . اوراقها نحيلة مستطيلة جميلة الخضار القاتم . كرزها مستدير الاسقاط طوله نحو ١ سم . وقاعدته ٤ سم .

٣٢٥- أبيض Abiad (F).

الابيض كوكب في حاشية الحجر .



أبيض



أبيض

يرأوح من ٣ الى ٧ وريقات . وريقاته بيضية الشكل ، معنقة . ازهاره عنقودي التجميع ، محوري الارتكاز . تنويره يستمر من آب الى ايلول . ازهاره عطرية العرف ، ارجوانية اللون يعلوها توشيم وردي . ثماره حنابل مستطيلة قرينة الشبه باللوبياء . يتكاثر بعسقله || عسقله مأكولة كالبطاطا الا انها احمدا لبا . اما متوسط تركيبها المنصري فهو : ٤,٥٠ ٪ مواد ازوتية ١,٨٠ ٪ مواد دهنية ٢٣,٥٥ ٪ هيدرات الكربون (مواد نشوية وسكرية الخ..)

٣٣٤ - أبيلوس وحيد اللون

من الحشرات يعرف بدحور الخرشيات ، اطلبه .

٣٣٥ - أبيلون ٥

جنس حشرات صغيرة من فصيلة السوسيات . انواعه عديدة لا تقل عن ٣٠٠ جميعها صغيرة القند طولها يرأوح من ١ الى ٦ مم . اثوابها متعددة فيها الاصفر والازرق والامبر والاسمر والاسود . اخطامها مستطيلة قليلة الانعكاف . قرونها الاستشعارية خيطية منحرفة || يرقاتها خاضلة ترغب في نباتات الفصيلة القرنية || اشهر واخصر انواعه الاربعة التالية اوصافها .

٣٣٦ - أبيلون الارضي شوكي ٥

Aplon de l'artichaut (F). Artichoke pear-shaped weevil (E). Artischokenspitzmäuschen (D).

حشرة صغيرة من فصيلة السوسيات طولها نحو ٣ مم . لونها الى الزرقة العابقة . تركيب مع يرقاتها اوراق واضلاع الارضي شوكي || تكافح باستعمال اسن الحواشير المركزة على الروتينون .

٣٣٧ - أبيلون الحماض ٥

Aplon violaceum (S). Aplon de l'oseille (F). حشرة من السوسيات طولها من ٣ الى ٤ مم . رأسها وخطمها سودوان . جسمها ازرق اسفع يعلوه موج اخضر . تركيب مع يرقتها اضلاع الحماض || تكافح باستعمال كل حاشور يرتكز على الروتينون .

٣٣٨ - أبيلون الحمص ٥

Aplon pisi (S). Aplon des pois (F). Pea pear-shaped weevil (E). Erbsenspitzmäuschen (D). حشرة من السوسيات طولها نحو ٢ مم . بطنها غليظ الشكل . رأسها وخطمها سودوان . جسمها وخطمها زرق . تنخر الحمص وسائر حبوب القطانة || تكافح باستعمال الاكسي شرنصون او الاتي بروش او اكسيد الاتيلان .

٣٣٩ - أبيلون الحنْدَقُوق ٥

Aplon tenue (S). Aplon frêle (F). Sweet-Clover pear-shaped weevil (E). حشرة من فصيلة السوسيات ورتبة غمديات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اروبة وافريقية الشالية . تألف البراري والمروج . خناقها تعيش على نواحي الحنْدَقُوق واوراقه الفتية . يرقاتها مرقالة تعيش على المواد النباتية التي تقرضها وتمتصها || جسمها صغير القند يطول نحو ٢ مم . رأسها مردني الشكل ، مستطيل الخطم المقوس ينتهي بمثلك قاضم ثاقب . زبالانها صغيران صولجانيان . عيناها ناشرتان . غمداها محببتان ، محزرتان

٣٣٦ - أبيل ، أبيلة . Baile de foin (F). Haystack (E). الحزمة او الربطة من الخشيش المكبوس والمزوم .

٣٣٧ - أبيلية * ، أبيلية ، آبلية . Abelia (S). Abélie (F). Abelia (E). Abelia (D). Abelia (I).

جنس جنات وجنيات برية وزينية معمرة من فصيلة الخماقيات ، منبها الاصل بلاد الصين وبعض اصقاع الهند . انواعها المعروفة ثلاثة اما ضروبها فعديدة . اوراقها متقابلة ، بحيلة الخضار الزاهي . ازهارها أبطية وهامية الارتكاز ، فردية او عشكولية التجميع ، مستطيلة الشكل ، بيضاء او وردية اللون . عرفها ضعيف . تزرع لجبال زهرها .

٣٣٨ - أبيلية ثلاثية الزهر

Abelia triflora (S). Abélie triflorée (F). جنبه كبيرة القند تعلو نحو ٤٠٠ سم . مهدها الهند ، اوراقها عابطة ، ازهارها كبيرة الحجم ، ثلاثية التجميع ، فواحة العرف العطر . ضروبها التزيينية عديدة || تزرع في الحدائق والمراكن .

٣٣٩ - أبيلية صينية

Abelia chinensis (S). Abélie de Chine (F). جنبه متوسطة القند تعلو نحو ٢٠٠ سم . جلبابها الاخضر بحيل الشكل . ازهارها بيضاء اللون او وردية . عرفها خفيف الرائحة مستحب || ضروبها التزيينية عديدة . تجود في جميع الاتربة الخفيفة والمتوسطة الاندماج .

٣٤٠ - أبيلية عديدة الزهر

Abelia floribonda (S). Abélie floribonde (F). جنبه صغيرة تعلو نحو ١٠٠ سم . فروصها دقيقة . اوراقها عرو . ازهارها كثيرة العدد ، وردية اللون ، بحيلة الشكل ، عديمة العرف || تزرع في الحدائق والمراكن .

٣٤١ - أبيلو ٥

Lucuma caimito, Pontaria caimito (S). Abiu (F). Marmalade fruit (E). نوع من اللكومة وفصيلة السبوتيات . مهده البلاد الامريكية وهو شجرة متوسطة الحجم سريعة النمو تثمر بعد بذرها بستين . تعلو من ٥ الى ٦ امتار . اوراقها معنقة مستطيلة . ملساء النصل الاخضر الزاهي . ثمارها بيضية تطول نحو ٦ سم . لونها الى الصفرة ، لها جامد مأكول . عصارته علكية لاصقة قبل الايناع || يعيش في جميع المواقع الحارة ويجود في مختلف الاتربة المتوسطة الاندماج والرطوبة .

٣٤٢ - إبيورليس

Aepiornis (S). Aepiornis, Aepyornis (F). Aepiornis (E). الاسم العلمي من اليوناني بمعنى « طائر رفيع » . طائر احفوري من الزمن البليستوساني العائد الى اوائل الاباج الرابعي ، وجدت احافيره من عظام وبيض في جزيرة مدغسكر || بيضه فائق الكبر والضخامة . البيضة الواحدة تستوعب ٨ لتر ماء ، اي انها تعادل ١٥٠ بيضة دجاج . ارتفاعه المقدّر نحو اربعة امتار .

٣٤٣ - أبيلوس عسقلولي ٥

Aplos tuberosa (S). Glycine tubéreuse (F). نبات عشبي عسقلولي معمر من فصيلة القرنيات الفراشية . مهده بعض مناطق امريكة الشالية . يزرع للتزيين || ساقه عارشة تطول من مترين الى اربعة امتار . اوراقه متعاقبة ، مركبة ، مستطيلة الزناد ، وقرية العدد الذي




أبيلية




أبيو



أبيوس عسقلولي



أبيون الارضي شوكي



أبيون الحماض



أبيون الحمص



أبيون الخندقوق



أبيون النفل



أثارية

٣٤٥- إتب Escal de l'orge (F). Shell (E).

الإتب قشرة حبة الشعير .

٣٤٦- إتب Accession

هو أحد طرق الامتلاك الذي ينشأ عن لحاق طبيعي بين عين وعين أخرى أكثر أهمية .

٣٤٧- إتب Orientation

معرفة اتجاه الأرض الزراعية شيء ضروري. فالنباتات المعرضة للجنوب ، في أرض وجهتها الجنوب ، يصيبها مثلاً من أشعة الشمس وحرارتها ما لا يصيب المزروعة باتجاه الشمال .

٣٤٨- إتب Vecteurs (F). Vectors (E).

هي الخطوط المستقيمة التي تحدد وجهة الاتجاه ومقدوره

٣٤٩- إتب Union

هو تضام أفراد أو جماعات تقرر مبادئ واحدة وتهدف إلى مصالح ومنافع معينة .

٣٥٠- إتب Union des agriculteurs (F).

هو تضام المزارعين للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية في جمعية رسمية لها نظامها وشخصيتها القضائية .

٣٥١- إتب Terrage (F). Clayng (E).

هو نقل تراب زراعي حسن التركيب وبسطه على أرض ينقصها التراب اللازم لخصبها .

٣٥٢- إتب Terrains (F). Grounds (E).

هي الأراضي الزراعية أو الممكن أن تستخدم في هذا السبيل. ولما كانت تراكيها الكيماوية والحكمية عديدة وكان عنصرها الرئيسي هو المروج المرجح . لذلك فالأترية تقسم مبدئياً إلى أربعة أقسام وهي الأترية الرملية والأترية الطينية والأترية الجصية والأترية الدبالية ، ولكل من هذه الأقسام ترتيب وميزات فارقة . اطلب تربة .

٣٥٣- إتب Soils de mélanges (F).

Mingling soil (E). هي الأترية المركبة من عدة أنواع متساوية .

٣٥٤- أترج Citrus medica cedrata (S). Cédratier (F). Adam's apple, Cedrat tree (E). Echte zitrona, Cedratbaum (D). Cedra (I).

نوع من الحمضيات الفصيلة النارجية . يقال أن مهد بلاد الهند الصينية . يزرع الآن في معظم الاصقاع الحارة والمعتدلة . وهو شجرة تشبه الليمون الحامض . ساقها فرعاء . أغصانها قاسية شائكة . أوراقها كبيرة معنقة متعاقبة ، نصلها بيضي القاعدة ، رمحي الطرف ، مائلش البشرة ، عابق الخضار . أزهارها قليلة العدد ، كبيرة القد ، خماسية البتلات البيض . وبياضها يشوبه حمرة بنفسجية خفيفة . ثمارها كبيرة القد ، مستطيلة الشكل ، بنفسجية اللون في أول عهدها ثم خضراء فصفراء عند الابناع . قشرة الثمرة ثلولية سميككة . لها حامض حامز مر لا يؤكل . قشور ثمارها تستعمل في المربيات || تتكاثر بالشعيل وهي من الأشجار التي تحشى الرياح العاصفة والأراضي الرطبة والأترية القوية الاندماج .

الصفحة ، تلحفان كامل البطن . ثوبها إلى السمرة الرصاصية الموج . رأسها اعتم من كوسلها وكوسلها اعتم من بطنها ومغنديها || لها جيل واحد في الحول . تخرج الحشرة الجملانة من مكمنها الشتوي في نيسان . تخرج في النهار وتبيت في الليل || اليرقة صغيرة دقيقة محدودة مرقالة تطول من ٣ إلى ٤ مم . ثوبها إلى الغبرة الصفراء الموج ، رأسها اسمر || الطور اليرقي يستمر نحو ٣٠ يوماً ثم تتحول اليرقة إلى حورية . وبعد انقضاء طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٢ يوماً تظهر الحشرة الجملانة وتبقى إلى أن يحل الشتاء فتكمن في التربة أو بين لحاء الأشجار حتى نيسان .

٣٤٠- أبيون النفل* Apion apricans (S).

Apion du trèfle (F). Clover seed weevil, Clover pear-shaped weevil (E). Kleesplitzmäuschen (D).

حشرة من السوسيات . طولها من ٣ إلى ٤ مم . لونها إلى الحمرة الزاهية . تركب أوراق النفل فتسردتها . يرقاتها تركب الأزهار فتقرنها وتقضم معاليقها || تكافح باستعمال أي حاشور كان يرتكز على الروتينون .

٣٤١- إتب Productivité (F). Productiveness (E).

إتاء الأرض : ريعها وحاصلها . يقال كثر إتبأ أرضه أي ريعها . ولبن ذو إتبأ أي ذو زبد كثير .

٣٤٢- أثارية* Otarla (S). Otarle (F). Otarlid (E).

جنس حيوانات بحرية لبونة ضارية من الفقريات ورتبة زعنفيات الاقدام . موطنها بعض مناطق المحيط الهادي وبحار الجنوب || أنواعها ١١ تقسم إلى قسمين : قسم أسود البحر وهو يشمل أنواع الأثارية الشعراء العنق ، وقسم أدياب البحر وهو يشمل أنواع الأثارية الزباء . جميعها مستطيلة العنق والرأس . لها اذنان صغيرتان . أثوابها مختلفة الألوان يغلب فيها البني الدايق || ذكورها كبيرة الجثة التي يراوح طولها من ١٧٠ إلى ٤٠٠ سم . ودوحها من ١٢٠ إلى ٢٥٠ سم . ووزنها من ٢٠٠ إلى ٤٥٠ كيلو || أفاثها نجيلة الجسم خفيفة الوزن . طولها يراوح من ١٠٠ إلى ١٥٠ سم ودوحها من ٥٠ إلى ٧٥ سم . ووزنها من ٤٠ إلى ٦٠ كيلو || تعيش جماعات كبيرة مؤلفة من عدة قطعان والقطيع يتألف من ٣ إلى ٥ أنثى رأسها ذكر واحد || تصاد لفرائها وشحمها .

٣٤٣- أتان ، حمارة Anesse (F). She-ass (E).

انثى الخارج أن وحمائر . يجوز أترها بعد بلوغها ٢٠ شهراً . ودقاتها يدوم نحو ٤٨ ساعة ويعاودها كل ٢٥ يوماً . محبلها يدوم ٣٦٠ يوماً . وقد ينزى عليها بعد الوضع بسبعة أيام كاملة .

٣٤٤- إتاوة Redevance (F). Tenure (E).

يقال أدى إتاوة أرضه أي خراجها . وضربت عليهم الإتاوة . قال جابر التغلبي :

« وفي كل أسواق العراق إتاوة

وفي كل ما باع أمروء مكس درهم »

فالإتاوة على وجه العموم هي المبلغ المطلوب من المال ، وصفه ضريبة . والإتاوة على وجه الخصوص تأتي بمعنى الدائنة أي المبلغ المطلوب مقابل التزام أو استعمال ملك أو مرفق عام وما أشبه . مثال ذلك إتاوة المناجم .

٣٦٤- **أُتْسُوغَة كَنْدَا** Tsuga Canadensis (S).
Tsuga du Canada, Pruche (F).
شجرة سبروتية شاحنة سريعة النمو ترغب في المواقع الرطبة .
تعلو نحو ٢٠ م. افنانها خلية اللحماء . أوراقها قصيرة
تطول نحو ١٥ م. نصلها مخطط البشرة || كرزها صغير
القد يطول نحو ٢٥ م. || يستخرج منها بالحز مادة
راتنجية تدعى بلسم كندا .

٣٦٥- **أُتْسُوغَة يَابَانِيَّة** Tsuga Sieboldi (S).
Tsuga de Siebold (F).
شجرة سبروتية شاحنة بطيئة النمو تعلو من ٢٥ الى ٣٠ م.
أوراقها تطول نحو ٢٠ م. وتعرض ٢ م. نصلها ميزابي
الصفحة ، سميك النسيج لونه الى الخضار العابق .
كرزها صغير القد ، عناقبي اللون .

٣٦٦- **أَتْعَاب** Honoraire (F). Honorary (E).
الاتعاب اي جزاء الخدمات هي بمثابة اجر مالي يتفق
عليه ودياً بين العملاء وارباب بعض المهن الحرة .
٣٦٧- **إِتْفَاق** Auplab Teaqd .

٣٦٨- **إِتْفَاق رِضَائِي** Accord amiable (F).
Amicable bargain (E).
هو الاتفاق الذي يتم بالتراضي بين الجهات المعنية .

٣٦٩- **إِتْقَاء ، إِحْتِرَاز ، وَقَايَة** Prophylaxie (F).
Prophylaxis (E).
محمل الوسائل والطرق الفعالة الواجب اتخاذها لاتقاء
الامراض الموصوفة كالتطهير والتلقيح والعزل والحجر او
لوقاية البنات من وسم يخشى وقوعه ومن حشرة ينتظر ضررها .

٣٧٠- **آيِل *٥** Ateles (S).
Atèle (F). Spider-monkey (E).
جنس قروء امريكية من فصيلة السبوسيات . انواعه ١١
موطنها فسيح الارعاء يمتد من المكسيك الى اواسط امريكة
الجنوبية || اجسامها رشيقة . قوائمها نحيلة مستطيلة ،
ايدنها رباعية الاصابع . اذناها شديدة الطول اخاذة . انواها
تختلف مع الانواع || تألف الغابات الرطبة . تعيش
جماعات كبيرة العدد . قوتها الثمار والاوراق والحشرات .
اناثها تضع جروان .

٣٧١- **إِتْلَاف المَزْرُوعَات** Dévastation de récoltes (F).
هو العبث في الاراضي المزروعة باثلاف الزرع غير
المحصود او باقتلاع الفراس من الكروم والبساتين وما اشبه .

٣٧٢- **أُتْم** هو المازريون نوع من الدفنة .

٣٧٣- **إِتْمَاك ٥** Surélévation (F).
Heightening (E).
الاتمك الزيادة الحاصلة من الارتفاع الاصاعي .

٣٧٤- **أُتْمَك ٥** Surélever (F).
To heighten (E).
زاد الشيء ارتفاعاً كالحائط والبناء وغير ذلك .

٣٧٥- **إِنْثُولُوجِيَّة** Ethnologie (F).
Ethnology (E).
الاثنولوجية علم يبحث في اصل الشعوب وأخلاقهم وانتشارهم .

٣٥٥- **أُتْرُجَّة * ، كَبَادَة ، تُرُنْجَة** Cédrat (F).
Cedrat (E).
هي ثمرة الاترج ، كبيرة الحجم ، مستطيلة الشكل وافرة
اللبن السميك المستعمل في صناعة المربيات الحافة || يقال
ان قشرها ينفع الفالج وهو جيد للبرص والقوباء واذا جعل
في الثياب يدفع عنها السوس . وعصارة قشرها تنفع نهش
الافاعي شرباً وضاداً . اما حامضها الحامز فيجلو العين
ويذهب الكلف ويسكن غلمة النساء ويزيل الكتابة بالحبر .
وحبها اذا سحق ووضع على لسع العقرب سكن الوجع .

٣٥٦- **أُتْرُوبِين** Atropine
الجوهر الفعال لنبات ست الحسن وهو سم شبه قلوي
يستعمل للتخدير وتوسيع حدقة العين .

٣٥٧- **إِتْرَازَان** Equilibre (F).
Equilibrium, Equipoise (E).
الاتزان حالة استقرار الجسم من معادلة القوى وتلاشيها .

٣٥٨- **إِتْرَازَان مَطْلَق** Equilibre astatique (F).
Astatic balance (E).
حالة استقرار ثابتة من تلاشي القوى المعادلة .

٣٥٩- **أُتْسُوغَة *** Tsuga
جنس اشجار حرجية من سبط التنوبيات وفصيلة الصنوبريات
مهده المقدر بلاد اليابان وكندا . انواعه عديدة جميعها
اشجار كبيرة الحجم شاحنة . اغصانها غليظة كثيفة .
افنانها دقيقة أوراقها صغيرة قصيرة العنق ، خلية الصفحة
السفلى التي تبدو بيضاء اللون . كرزها صغير القد .
يستخرج من خشبها مادة صمغية بطمية تدعى بلسم كندا .
اشهر انواعه ما يتبع .

٣٦٠- **أُتْسُوغَة بَطْوِيلَة** Tsuga pattoniana (S).
Tsuga de Patton (F).
شجرة سبروتية شاحنة بطيئة النمو تعلو من ٣٠ الى ٦٠ م.
أوراقها سمكة النسيج تطول نحو ٢٠ م. وتعرض ٢ م.
لونها الى الريدة الزرقاء || كرزها يطول نحو ٧ سم . يبدو
جذوي اللون يعلوه موج ازرق ثم ينحرف الى السمرة الخطية .

٣٦١- **أُتْسُوغَة حَمَلَايَا** Tsuga Brunoniana (S).
Tsuga de Brunon (F).
شجرة شاحنة نحيلة الشكل بطيئة النمو تعلو من ٣٠ الى
٣٥ م. أوراقها تطول نحو ٢٥ م. نصلها مخطط البشرة
على صفحته السفلى || كرزها مستطيل دقيق . خشبها
قليل الصلابة متوسط القيمة .

٣٦٢- **أُتْسُوغَة كَارُولِينَة** Tsuga Caroliniana (S).
Tsuga de la Caroline (F).
شجرة معتدلة الشموخ والنمو تعلو من ١٥ الى ٢٠ م.
افنانها مهدبة . أوراقها مفلوكة تطول نحو ٢٠ م. وتعرض نحو
٢ نصلها سميك النسيج لونه الى الخضار العابق || كرزها
صغير القد يطول نحو ٣ سم .

٣٦٣- **أُتْسُوغَة كَلِفْرِيَة** Tsuga Mertensiana (S).
Tsuga de Mertens (F).
شجرة سبروتية شاحنة سريعة النمو تعلو من ٥٠ الى ٦٠ م.
افنانها زباء اللحماء . أوراقها تطول نحو ٢٠ م وتعرض
نحو ٢ م. نصلها فستني الصفحة العليا ، عابق السفلى
كرزها كستني اللون يطول نحو ٨ سم . || خشبها شديد
الصلابة ديمومي .




أُتْرُجَّة



أُتْسُوغَة




آيِل



أثوماريه



أثوماريه خطية



أثوماريه ملونة



أثاب



أثاب الهند

الثام تطول نحو ٣ مم. ثوبها الى الصفار الداكن. رأسها اسمر. شرجها مجهز بكلايتين منعقتين نحو الداخل || طور الاكمال يتم في التربة ويستمر نحو عشرة أيام. تظهر الحشرة الجمالنة في اواسط آب. تسرح ساعية وراء الرزق حتى الشتاء فتخلد في مكمنها الى ان تدفنها نزعاً الغريزة الى النشاط ويكون ذلك في اوائل الربيع.

٣٨٣- أثون

Chaufour, Four à chaux (F).

Lime-kiln (E).

ج أن واثنتين. البناء الخاص لصناعة الكلس وهو يتألف من فرن تحرق فيه الحجارة الكلسية المرصوفة.

٣٨٤- أثاب*، تين البنغال

Ficus Indica, Ficus benghalensis, Urostigma bengalense (S).

Baniam, Figuier des Banians, F. de Bengale (F).

Banlan tree (E).

شجرة كبيرة ضخمة من فصيلة التوتيات. تتدل أغصانها الى الارض فتعلق ويتكون منها اشجار جديدة حول الساق الأم. منبها البنغال من اعمال الهند || تزرع للتزيين في جميع البلاد الحارة. تتكاثر بالعقل وتنمو في جميع التربة الرطبة القليلة او المتوسطة الاندماج || يستخرج من عصارها اللزجة التي يسببها ونز بقة اللك صرب صمغي امغر اللون يستعمل في عدة صناعات منها دهانات الآلية الخرفية الصينية.

٣٨٥- أثاب الهند*، تين المتجوس، تين الاصنام

Ficus religiosa (S). Figuier des pagodes, Arbre des

conseils (F). Peepul tree, Bo tree, Sacred fig tree

(E). Pagodenbaum, Indischer gottesbaum (D).

Albero del diavolo, Fico del diavolo (I).

نوع من الاثاب. شجرته ضخمة دائمة القد من فصيلة التوتيات. مهدها بلاد الهند، كانوا ولا يزالون يزرعونها عند معابدهم للدلالة على البقاء او استمراره || اغصانها متدلية كاعصان الاثاب. اوراقها متعاقبة ومتقابلة، كبيرة الحجم، بسيطة او مفصصة النصل || ازهارها وحيدة المسكن صغيرة. ازهارها سنبل التجميع عندما يكون ابطي الارتكاز وهو عنقودي التجميع اذا كان تاجي الارتكاز. ثمارها كثمار التين الصغيرة.

٣٨٦- إثابة هي اللاذن، اطلبه.

٣٨٧- أثر، إثر، خلصة السمن اذا سلى*

٣٨٨- أثر

Effet (F). Effect (E).

لفظة قانونية تشمل في عدة صيغ اشهرها ما يلي :

٣٨٩- أثر رجعي

Effet rétroactif (F).

Retroactive effect (E).

الاثر الرجعي ورجعية الاثر والفاعلية الرجعية هي نقل اثر الحكم او القانون او أي عمل شرعي الى الماضي.

٣٩٠- أثر كاشف

Effet déclaratif (F).

Declaratory effect (E).

هو الذي تحدته العقود المقررة او الكاشفة.

٣٩١- أثر ناقل

Effet dévolutif (F).

Devolutive effect (E).

هو الذي تحدته ايلولة الحق الى صاحبه.

٣٩٢- أثر واقف

Effet suspensif (F).

Suspensive effect (E).

هو الذي يؤجل به وقتياً تنفيذ الحكم المعارض فيه او المستأنف اذا لم يكن مشمولاً بالنفاذ الوقفي.

٣٧٦- إتهاب

Acceptation de donation (F).

هو قبول الهبة.

٣٧٧- إتهام

Accusation

الاتهام هو نسبة جريمة الى شخص معين وإحالة بسببها الى المحاكمة.

٣٧٨- أثوفيكس

Atofix

فاطور زراعي يرتكز على الكبريت الميكروني القابل

البلل. يستعمل سائلاً محلولاً ٢,٢ ٪ في مكافحة الازماداد

على الاشجار المثمرة والكرمة.

٣٧٩- أثوم

Atome (F). Atom (E).

هو الذرة أي الجوهرة الفرد أو الجزء النهائي من المادة

الذي لا يقبل التحطيم.

٣٨٠- أثوماريه*

Atomaria (S).

Atomaire (F). Pigmy mangold beetle (E). Moos-

knopfkafer (D).

وتدعى خنفساء الشوندر. حشرة صغيرة من غمديات الاجنحة

طولها نحو ٢ مم. ثوبها الى البني، زباناها صولجانية الشكل.

تلثم اوراق الشوندر عقب انتشار البذور ثم تركب الجذور

فتخرها مع جمام التربة.

٣٨١- أثوماريه خطية*

Atomaria linearis (S).

Atomaire linéaire, Atomaire de la betterave (F).

Pigmy mangold beetle (E). Mooskopfkafer (D).

حشرة صغيرة نحيلة من فصيلة الشوزريات ورتبة غمديات

الاجنحة. موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اروبة.

تألف المواقع التي تكثر فيها زراعة الشوندر، خنافسها

تلثم اوراق الشوندر عقب انتشار البذور يرقاتها تركب

الجذور فتقرضها عند جمام التربة || جسمها يطول نحو

٢ مم. ثوبها الى البني الاسمر الموج ثعلوه خلة صهباء.

حتار ظهرها الى الاحمر الفاتح. رأسها مستعرض الجرم.

عينها صغيرتان. زباناها صولجانيان احمران. كوسلها

مربع. ظهرها منقسط عادم التحزيز. ارساغها خماسية

العقل || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجمالنة

في اوائل الربيع وتساعد في اوائل حزيران وتعيش حتى

اواسط تموز. تسرح في النهار وتبيت في الليل || والبرقة

عند بلوغها الادراك الثام تطول نحو ٣ مم. جسمها اسطواني

الشكل عاجي اللون، اسمر الرأس. شرجها مجهز بكلايتين

صغيرتين محجبتين نحو الداخل.

٣٨٢- أثوماريه ملونة*

Atomaria analls (S).

Atomaire coloré (F). Atomaria Analls (E).

حشرة صغيرة نحيلة من فصيلة الشوزريات ورتبة غمديات

الاجنحة. موطنها موطن الاثوماريه الخطية. تألف المناطق

الجبلية المشرفة على البحر، خنافسها تعيش على المواد

النباتية الخضراء. يرقاتها تعيش على انواد النباتية الجافة ||

جسمها بيضي الشكل يطول نحو ٢ مم. رأسها مستعرض

الجرم اسود اللون. عينها صغيرتان. زباناها صولجانيان

احمران. كوسلها مقوس المقدم، اسود اللون. ظهرها

محزوز القشار، اسود النصف الاول، احمر النصف

الاخير. جرامزها حر. ارساغها خماسية العقل || تخرج

الخنفساء من مكمنها الشتوي في اوائل الربيع. تسرح في

طلب المرتع وتذهب للسفاد || البرقة عند بلوغها الادراك

٣٩٩ - أثلييات Tamaricaceae (S). Tamaricacées.

Tamariscinées (F). Tamaricaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين ، عديدة القعالات . اجناسها وأنواعها قليلة أشهرها الأثل والمرتن .

٤٠٠ - إثمار Fructification

لفظة شائعة المعنى تستعمل عادة للتعبير عن تكوين الثمار أو للدلالة على المقدور الثمري أو على قوة احتفاظ الشجرة بثمارها .

٤٠١ - أثمان* Ipomaea (S).

Ipomée (F). Ipomaea, Bind weeds (E).

جنس نباتات عشبية مدادة حولية وبحولة ومعمرة من فصيلة اللبلابيات . أنواعه عديدة منها للتزيين وبعضها للأكل كالبطاطا الحلوة ومنها طبية تدخل في تركيب عدة عقاقير ومستحضرات كالجلاب والجلبة || أشهر أنواعه :

Ip. purpurea أثمان أرجواني ، شب النهار

Ip. batatas (S). أثمان الكمر ، بطاطا حلوة

Patate douce (F). Sweet potato (E).

Ip. turpethum أثمان تربد

Ip. jalap أثمان جلاب

Ip. purga أثمان جلبة

Ip. hederacea أثمان عجب ، حب النيل ، جلاب النيل

Ip. coccinea أثمان قرمزي

Ip. bona-nox أثمان نور الليل

٤٠٢ - إلمد ، أنثيموان Antimoine (F).

Antimony (E).

معدن رصاصي اللون ، بين الأبيض والأزرق ، صفيحي التركيب ، بلوري الرقعة ، سريع المطب والسحق ، عديم الملوحة . رمزه (Sb - نت) وزنه النسبي يراوح مسن ٦٧٠ الى ٦٨٦ وزنه الاتومي ١٢١ يذوب عند ٤٤٠ درجة حرارة || مناجه عديدة واستعماله الصناعي كذلك .

٤٠٣ - أئنا ، أئنه ، أوتنا Othonna (S).

Othonne (F). African ragwort (E). Schiefelblume (D). Othonna (I).

جنس نباتات برية عشبية ونجمية من الحرشيات وفصيلة المركبات . أنواعه عديدة لا تقل عن ٨٠ جميعها افريقية المنبت . اوراقها متعاقبة درماء أو غشائية . أزهارها ثورية رؤسية صفر أو زرق || أشهرها الأئنا الحبشية المعروفة بالاحيون التي يبلغ ارتفاعها نحو المتر ، اوراقها تشبه اوراق القرنفل ، تزهر للتزيين .

٤٠٤ - إئنا عشري Duodénium (F).

Duodenum (E).

الاثنا عشري هو الممي المتصل بقعر المعدة . ويدعى ايضاً المعج ، اطلبه .

٤٠٥ - أئنة Forêt d'acacia gommier (F).

الاثنة غابة من الطلع . ج أئن .

٤٠٦ - أئيدة Ecidle, Aecidie (F). Aecidium (E).

شكل من الاشكال الثمرية الخاصة بالفطور الصدئية من فصيلة السحاميات التابعة لرتبة الدعاميات .

٤٠٧ - أئمة Atmosphère éthérée (F).

Ethereal atmosphere (E).

أثير عند علماء الطبيعة هو مادة تقع تحت الوزن تتخلل اجسام ويكون امتداد الصوت والحرارة بواسطة تموجاتها .

٣٩٣ - إثارة هي عود الريح اي البربريس

٣٩٤ - أئغم Aethéogame (F). Aetheogamous (E).

نعت تعريفي يطلق على النباتات الخفيات الزهر من ذوات الاعضاء التناسلية .

٣٩٥ - إئصال Sédimentation (F). Sedimentation (E).

عملية حكيمة تقوم على ترك السائل المقصود بعض الوقت لتفرقة اجزائه وتحديدها .

٣٩٦ - أئل ، طرفاء ، عبل Tamarix (S).

Tamaris (F). Tamarisk, T. salt tree (E). Tamariske (D). Tamarice, Mirclia, Bruca (I).

جنس اشجار وشجيرات وجنبات من فصيلة الاثليات . أنواعه المعروفة تقارب ١٤٠ ، معظمها من نباتات حوض البحر المتوسط ، بعضها صحراوي ومنها جبلي ينبت في الاصقاع المعتدلة . جميعها برية وقد تزرع للتزيين ولصد الرياح || ساقها قصيرة ، اغصانها غليظة متفرعة متدلية ومنها ساقطة . افئادها قليلة ، افئانها كثيرة ودقيقة . اوراقها حرشفية . أزهارها سنبلية التجميع صغيرة بيضاء أو وردية اللون خشوية التركيب أو ثنائية المسكن . بتلاتها من ٤ الى ٦ ، اسديتها مندعمة لا يقل عددها عن ٤ ولا يفوق ١٠ ، اقلامها من ٣ الى ٥ || أشهر أنواعه

أئل المن اي الطرفاء التي يحى منها مادة سكرية غذائية تسببها حشرة غشائية الاجنحة توخر الزهر وجراة الاملوج فتعمل المن المعروف بالطرفة || يتكاثر الائل باليدور وبالعقل . يعيش وينمو في جميع الآتية من الرملية الصحراوية الى الطينية ، ومن الجافة الى المنقعية . وهو يصلح للسياجات الحية قرب الشواطئ لانه لا يخشى الاملاح البحرية || اخشابه مرغوب فيها تستعمل في صناعة السفن والقصع والادوات الزراعية || من انواعه المعروفة :

أئل اردني Tamarix Jordani

» smyrnensis أئل ازمري

» africana أئل افريقي

» mannifera أئل المن ، طرفاء المن ، حطب احمر

» anglica أئل انكليزي

» campanulata أئل جرس

» tetrandra أئل رباعي الاسدية

» tetragyna أئل رباعي الاقلام

» hispida أئل زغب

» syriaca أئل سوري

» arborea أئل شجري

» passerinoide أئل صحراوي

» chinensis أئل صيني

» tigrensis أئل عراقي ، ائل دجلة

» gallica أئل فرنسي ، عذبة

» macrantha أئل كبير الزهر

» orientalis, T. articulata أئل مفصلي ، عبل

» nilotica أئل نيلي ، طرفة

» indica أئل هندي

٣٩٧ - أئلب ، إئلب Tesson de pierre (F).

Fragment of broken stone (E).

الأئلب والإئلب ثنات الحجر . ج أئالب .

٣٩٨ - أئمة ، بلاسمه Plasma

هي المادة الميولية الذرية الشديدة الميوعة التي تحضن نواة الخلية .



أئل



أثمان

٤٠٨ - أثينة* ، رغل ، تاخيم ، رجل الإوز ، إكشون ، أنصيرين

Chenopodium (S). Ansérine, Chénopode (F). Goose-foot (E). Gänsefuss (D). Chenopodio (I). جنس نباتات من فصيلة السرمقيات. أنواعه نحو ٦٠ جميعها أعشاب وجنبات حولية ومعمره. أكثرها طيبة ومنها الغذائية المأكولة. مهدا البلاد الحارة والمعتدلة || يستخرج من بذورها زيوت طيارة تستعمل في الطب.

٤٠٩ - أثينة بيضاء ، رجل الإوز البيضاء ، ركب الجممل ، أنصيرين بيضاء

Chenopodium album, Ch. anthelminticum (S). Ansérine blanche, Chénopode anthelmintique, Poule grasse, Grasseille (F). Fat-hen, Lamb's quarters, White goose-foot (E). Welser gänsefuss, Weisse melde (D). Chenopodio bianco, Atriplice salvatico, Gallina grassa, Farinaccio (I).

نوع من الاثينة يعلو من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. أوراقه تطول نحو ١٥ سم. نصلها مسنن الحافة || وهو نبات طيب بري كان ولا يزال يستعمل في عدة علاجات ومستحضرات تقوي الهضم وتدر الطمث وتضاد التشنج. بذوره طاردة للديدان. يعرف في البلاد المصرية باسم «فساء الكلب» والكلاب والسنانير تأكله علاجاً من تخمة أو عارض معوي.

٤١٠ - أثينة عطرية

Chenopodium ambrosioides (S). Chénopode fausse ambrosie, Ambrosine, Thé du Mexique, Thé des Jésuites (F).

نوع من الاثينة وهو نبات طيب حولي بري وزراعي، أزغب العروق والأوراق، يعلو نحو ٨٠ سم. || أوراقه صغيرة أهليلجية. أزهاره هامية. أوراقه وأزهاره تستعمل استعمال الشاي.

٤١١ - أثينة كبيرة

Chenopodium giganteum (S). Chénopode géant (F).

جنبه تزينية تملو نحو المترين ، ساقها مضلعة ، أوراقها مثلثة الزوايا كبيرة الحجم طوطا وعرضها نحو ١٤ سم. نصلها خلي اللبس تملو زغبة الى الجؤوة الزاهية. أزهارها هرمي الشكل ، هامى الارتكاز. تزه من أوائل آب الى اواخر تشرين.

٤١٢ - أثينة كينوا

Petit riz (F). هي الكينوا ، نبات زراعي مأكول الثار ، اطلبه .

٤١٣ - أثيوس* ، أثيوس

Salvia Aethiopis (S). Ethiopienne, Sauge d'Ethiopie (F). Ethiopian sage (E). Ungarische salvei (D). Salvia di candia, S. lanata (I).

جنس نباتات نجمية معمره برية وزراعية ، عطرة وطيبة من فصيلة الشفريات || أنواعه عديدة أشهرها القويسة والقصمين والخرنه والمردكوش الاحمر . اطلبها .

٤١٤ - أثيوسيمه* ، غريبة

Aethionema (S). Aethionème (F). Candytuft (E). Steintsächel (D). Etionema (I).

جنس نباتات جتبية او عشبية من فصيلة الصليبيات . انواعه عديدة منها الحولية والحولة والمعمره . أوراقها لاطنة ، مستدقة النصل ، متعاقبة الارتكاز او متعاقبة . أزهارها تاجية ، وردية اللون او أرجوانية او بيضاء . ثمارها زورقية مستطيلة || أشهر انواعه ما يلي وصفها .

٤١٥ - أثيوسيمه أرمنية

Aethionema armenum (S). Aethionème arménien (F).

بجلة معمره صغيرة القد فرعاء تملو نحو ٢٥ سم. ساقها وفروعها منتصبه أوراقها قصيرة النصل ، هدية الختار ، مدبة العقصة . أزهارها صغيرة مستطيلة أرجوانية اللون .

٤١٦ - أثيوسيمه قلبية الورق

Aethionema cordatum (S). Aethionème cordé (F).

بجلة صغيرة معمره قليلة الفروع . أوراقها قلبية الشكل والسفل منها متعاقبة . أزهارها كبيرة القد . كبريتية اللون . وهي من نباتات الجرود الطوعية يوجد منها قرب اورز لبنان وفي الجبل الشرقي .

٤١٧ - أثيوسيمه قلمية

Aethionema stylosum (S). Aethionème stylé (F).

بجلة صغيرة معمره ، قصيرة الساق ، قليلة الفروع . أوراقها رحيمة النصل . أزهارها مستطيلة الاقلام ، سنبلية التجميع ، كبيرة القد ، وردية اللون . اقليمها الجرود اللبنانية.

٤١٨ - أثيوسيمه قنبرية

Aethionema cristatum (S). Aethionème huppé (F).

عشبة حزمية حولية . أوراقها السفلى بيضية الشكل اما العليا فقلبية . أزهارها صغيرة وردية . تنبت في الاتربة الطينية . اقليمها البلاد الداخلية البعيدة عن الرياح البحرية.

٤١٩ - أثيوسيمه كبيرة الزهر

Aethionema grandiflorum (S). Aethionème à grandes fleurs (F).

بجلة صغيرة معمره تملو ٣٠ سم. ساقها فرعاء . أوراقها مستدقة ، نصلها خيطي الصفحة البحرية اللون. أزهارها أرجوانية ، سنبلية التجميع ، متقاربة الابعاد .

٤٢٠ - أثيوسيمه لبنانية

Aethionema libanotica (S). Aethionème libanais (F).

بجلة معمره تملو نحو ٢٥ سم. ساقها فرعاء . أوراقها متعاقبة ، نصلها خطي الصفحة الباهتة الخضار. أزهارها كبيرة القد ، أرجوانية اللون . ثمارها زورقية . تكثر في الجرود اللبنانية حتى ارتفاع ١٤٠٠ م.

٤٢١ - أثيوسيمه متعاقبة الورق

Aethionema oppositifolium (S). Aethionème à feuilles opposées (F).

بجلة حزمية معمره . ساقها فرعاء . فروعها قصصة . أوراقها لحمية ، اسطوانية النصل ، متعاقبة الارتكاز . ثمارها خرينية ، أهليلجية ، مجلومة ومفروضة القمة . أزهارها صبي . أزهارها أرجوانية متوسطة القد . توجد في معظم القمم اللبنانية .

٤٢٢ - أجاج

Saumâtre, Salé (F). Briny (E). الأجاج هو الملح الشديد الملوحة والمرارة .

٤٢٣ - إجارة

Ball (F). Lease (E). هو عقد يدعى احد طرفيه مزجراً فيلتزم به الطرف الثاني الذي يدعى مستأجراً ان يمكنه من استغلال العين المؤجرة واستعمالها الى اجل معين مقابل بدل معلوم .

٤٢٤ - إجارة ، كماء

Louage (F). Letting (E). عقد يلتزم به احد الطرفين بتمكين الطرف الآخر من الانتفاع بالشيء المؤجر وقتاً معيناً مقابل قدر من المال



أثينة



أثيوس



أثيوسيمه

٤٣٦- إجاص ، إجاص شائع ، إنجاص ، كُمثري

Pirus communis (S). Poirier, Poirier commun (F). Pear tree (E). Echter birnbaum (D). Pero (I).

شجر مشر من سبط الأجاصيات وفصيلة الورديات. أنواعه الأصلية عديدة سنذكرها فيما بعد. أما ضرابه الزراعية فلا تقل عن ٧٠٠ تفرس لثمارها || والأجاص من الأشجار الطرية الشكل، الغليظة الساق، العمودية الجذور، العابلة الأوراق || أوراقه متعاقبة، بسيطة، مسننة الحافة، معنقة، بيضية. وأما النصل فصفحة السفلى زباء في أول عهدها ثم ملساء لامعة || أزهاره نوري التجميع. أزهاره كبيرة البتلات، بيضاء اللون غالباً وقد تكون وردية. ثماره شبه كروية مستطيلة أو كروية، معظمها مأكول لذيق الطعم ذكي الرائحة سكري العصارة ومنها ما يستعمل في صناعة المربيات وغيرها لاستخراج الكحول وبعض المشروبات الكحولية || والأجاص من الأشجار التي تتطلب بعض العناية ولا تجود إلا في إقليمها الخاص وفي الأراضي الصالحة. ولكل ضرب من الأجاص تربة وأقليم يجدر معرفتها قبل القيام بأي عمل زراعي إحصائي كان. والأجاص بوجه عام يخشى شدة الحر وصبراً القفر ويرغب في التربة الطينية الرملية الجصية العميقة الغور، المتوسطة الاندماج، القليلة الرطوبة، الغنية بجميع العناصر الغذائية. يتكاثر الأجاص بالبذر وبالتطعيم ولا يستعمل البذر إلا للحصول على أنواع جديدة وأما التطعيم فشائع الاستعمال وهو يمتناول الجميع وقد يتم على عدة أشكال من الرقعة حتى المذلولف. ويطعم على الأجاص البري والزعرور والسفرجل. ضرابه عديدة لا تقل عن ٧٠٠ كما ذكرنا أعلاه، منها وطنية كانت كثيرة الانتشار وقد قلت زراعتها الآن ومنها اجنبية كثرت زراعتها ولا تزال على ازدياد نظراً لجودة صنفها || وفي الجدول التالي نذكر جميع الضروب الوطنية وأشهر الضروب الأجنبية مع صفاتها وخواصها المميزة :



بوره هردى



دوشس انفولم

يتفق عليه || وهذه الاجارة قد تكون اجارة اشياء او عمل او خدمة.

٤٢٥- إجارة اشياء Louage de choses (F).

عقد يلتزم المؤجر فيه بتمكين المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر سواء أكان ثابتاً أم منقولاً.

٤٢٦- إجارة الماشية Bail à cheptel (F).

هي الاجارة التي تنعقد على قطع من الماشية باعتباره مجموعاً. ويتحم على المستأجر حفظ المواشي وإطعامها والاعتناء بها بالشروط التي يبرمها بينه وبين المؤجر. وقد تأتي هذه الاجارة على ثلاثة اشكال.

٤٢٧- إجارة الماشية العادية Bail à cheptel simple (F).

هي التي تنعقد على قطع من الماشية يكون جميعه ملكاً للمؤجر. وينتفع المستأجر وحده بضرعها وروثها وعملها. أما صوفها ونتاجها فيقسم مناصفة بين المؤجر والمستأجر. فاذا هلكت كلها بال جائحة كان هلاكها على المؤجر أما اذا هلك بعضها فيضمن المستأجر النصف.

٤٢٨- إجارة الماشية بالمناصفة Bail à cheptel à moitié (F).

هي الاجارة التي يكون للمؤجر نصف القطيع المنعقد عليه، وللمستأجر النصف الآخر. وبمقتضى هذا العقد ينتفع المستأجر وحده بالبان الماشية وروثها وعملها مقابل اعتنائه بها. أما الصوف والنتاج فيقسم بين المتعاقدين.

٤٢٩- إجارة حديدية Bail à cheptel de fer (F).

هي اجارة مزرعة بما عليها من الماشية. ويوجب فيها على المستأجر ان يرد عند انقضاءها عدداً من الماشية مساوياً، في القيمة، ما اخذه. فيكون النقص عليه والزيادة له.

٤٣٠- إجارة خدمة Louage de services (F).

عقد يستخدم به أحد الطرفين نشاط الآخر وعمله الفني بطريقة يكفل بها لنفسه عمله تحت اشرافه.

٤٣١- إجارة زراعية Affermage (F). Farming (E).

هو ان يؤجر المالك ارضاً زراعية مقابل اجرة سنوية معينة سواء كانت نقوداً او عيناً.

٤٣٢- إجارة تحمل Louage d'ouvrage (F).

عقد يلتزم به احد الطرفين ان يعمل للطرف الآخر شيئاً معيناً يتقاضاه عليه ثمناً معلوماً.

٤٣٣- إجارة مزرعة Fermage, Bail à ferme (F).

Rent (of a farm) (E). ما يجب على مستأجر المزرعة دفعه الى صاحبها. وبعبارة اخرى هي نصيب صاحب المزرعة من غلة الارض. يعين مقداره في العقد بخلاف المزارعة (métayage) التي لا يعين في عقدها مقداره بل نسبة مثوية من الحاصلات.

٤٣٤- إجارة ، رخصة Licence

هي في القانون التجاري، بوجه عام، اباحة الاتجار بالبضائع غير الحرة.

٤٣٥- إجارة النفس للصيد البحري Charte de pêche (F). Charter of fishing (E).

يراد بها اجارة النفس التي يعقدها النوبي في سفينة مجهزة للصيد البحري.



شجرة إجاص



الكسندر



برغاموت



بكخس



بوره انجو

الثمرة	الشجرة			زمن الادراك	اسم شهرة الصرب	
	ميزاتها الخاصة	صفاتها الجنسية	شكلها وحجمها		الضروب الوطنية	
صفراء خضراء صغيرة الحجم	غذاء	متوسطة النشاط	متباينة وسطى	آب	Baladi	بلدي
صفراء حمراء كبيرة الحجم	مريعة	متوسطة النشاط	نصف مردنية فارشة	ايلول	Roumi	رومي
صفراء حمراء متوسطة الحجم	متوسطة الاتاء	متوسطة النشاط	نصف مردنية	تشرين الثاني	Chatawi	شتوي
صفراء كبيرة الحجم	مريعة	نشطة	متباينة كبيرة	ايلول	Ousmani	عثماني
صفراء صغيرة الحجم	متوسطة الاتاء	متوسطة النشاط	كروية متباينة	اواخر آب	Ousayfiri	عصيفيري
خضراء كبيرة الحجم	متوسطة الاتاء	نشطة	نصف متباينة	ايلول	Moukh al Baghl	مخ البغل
خضراء كروية كبيرة الحجم	مريعة	متوسطة النشاط	نصف مردنية	آب	Mourrab	مرآب
صفراء حمراء صغيرة الحجم	مريعة	متوسطة النشاط	مردنية وسطى	اوائل تموز	Miskawi	مسكاوي
فستقية اللون كبيرة الحجم	متوسطة الاتاء	متوسطة النشاط	هرمية	اوائل تموز	Masdaghanl	مصدغاني (ابو سطل)
الضروب الاجنبية						
خضراء متوسطة الحجم	غذاء	شديدة النشاط	مردنية	تشرين الاول	Alexander (Beurré Bose)*	الكسندر*
	غذاء	متوسطة النشاط	هرمية	تموز	André Desportes	اندره ديپورت
	غذاء	شديدة النشاط	متباينة	كانون الثاني	Pergamotte Esperen*	برغاموت إسبرن*
	مريعة	متوسطة النشاط	مردنية	شهر آب	Précoce de Trévoux	بريكوس تريفو
صفراء حمراء	غذاء	نشطة	مردنية	ايلول - تشرين	Packham's Triumph*	باكهامس تريومف*
	غذاء	نشطة	مردنية	تشرين الاول	Beurré d'Anjou*	بوره أنجو*
	مريعة	متوسطة النشاط	متباينة وسطى	تموز	Beurré Giffard	بوره جيفار
	متوسطة الاتاء	نشطة	هرمية	تشرين الاول	Beurré Diel	بوره ديال
خضراء صفراء متوسطة الحجم	غذاء	نشطة	متباينة وسطى	تشرين الثاني	Beurré clairgeau	بوره كلارجو
	غذاء	نشطة	مردنية	تشرين الثاني	Beurré d'Hardenpont	بوره هردنپون
	مريعة	شديدة النشاط	هرمية	ايلول	Beurré Hardy*	بوره هردى*
	مريعة	متوسطة النشاط	مردنية وسطى	كانون الاول	Passe-Crassane*	باس كراسان*
خضراء صفراء صغيرة الحجم	مريعة	متوسطة النشاط	متباينة	كانون الاول	Président Drouard	بريزيدان دروار
				-	Triomphe de Vienne	تريومف فيانا
	متوسطة الاتاء	نشطة	نصف مردنية	تشرين الاول	Jeanne d'Arc	جاندرك
	غذاء	متوسطة النشاط	نصف متباينة	شهر آب	Docteur Jules Guyot	دكتور جول غويو
لوزيون أرفنش	غذاء	متوسطة النشاط	مردنية	تشرين الاول	Duchesse d'Angoulême*	دوشس انغولم*
	متوسطة الاتاء	شديدة النشاط	فارشة	تشرين الاول	Doyenné du Comice*	دوينه كوميس*
	مريعة	نشطة	مردنية	شهر آب	Clapp's favourite	كلابس فافوريت
	غذاء	متوسطة النشاط	مردنية	تشرين الاول	Conférence*	كونفرانس*
صفراء وردية صغيرة الحجم	غذاء	نشطة	نصف مردنية	تموز	Coscia	كوشيا
	مريعة	شديدة النشاط	مردنية	تشرين الثاني	Comtesse de Paris*	كونتس باريس*
	غذاء	متوسطة النشاط	فارشة ومتباينة	تشرين الاول	Louise Bonne*	لويز بون أرفنش*
	متوسطة الاتاء	نشطة	مردنية	تشرين الاول	William's Duchess	ويليام دوشس
خضراء صفراء كبيرة الحجم	مريعة	متوسطة النشاط	مردنية	ايلول	William's*	ويليامس*



باس كراسان



لوزيون أرفنش



ويليامس



كونتس باريس



كونفرانس



دوينه كوميس

٤٤٦ - إجاص مُفَرَّض الورق. *Pirus trilobata* (S).*Poirier à feuilles trilobées* (F).

شجرة برية تعلو نحو ٦ أمتار . منبتها سورية ولبنان .
أوراقها ثلاثية أو خماسية التفريضة ، مسنة الحافة ،
مساء النصل || أزهارها عريضة ، أقلامها ملحومة القاعدة
فصلاتها زباء || ثمارها مستديرة كالشفاح .

٤٤٧ - إجاص هَاتِلِك *Pirus heterophylla* (S).*Poirier hétérophylle* (F).

شجرة كبيرة القد تعلو نحو ١٠ أمتار . منبتها التركستان .
أوراقها مفرضة شديدة الخضار مساء النصل الامرط .
أزهارها صغير النورة . أزهارها عريضة ، أقلامها خماسية
طليقة || ثمارها صغيرة جامدة اللب .

٤٤٨ - إجاص يُنَّان *Pirus yunnannensis* (S).*Poirier de Yunnan* (F).

شجرة برية تعلو من ٦ الى ٨ أمتار . منبتها الشرق الأقصى .
أوراقها بيضية قليلة التفريضة ، زغبية الصفحة السفلى .
أزهارها وردية اللون || ثمارها صغيرة ، بشرتها حمراء اللون
تعلوها وثمة بيضاء .

٤٤٩ - إجاصة ، كُمَثْرَاة *Poire* (F), *Pear* (E).

ثمرة الاجاص . الاجاصة في تصنيف الثمار وبالنسبة الى
فكاهتها وأقبال الناس عليها تأتي بالمرتبة الثالثة بعد الدراق
والنفاحة || يختلف لون الاجاصة وشكلها وحجمها وطعمها
ومقدار عصيرها باختلاف ضربها وموقع زراعتها وبيئتها
التربية . ومع ذلك وبرغم التفاوت الاكيد نقول بناء على
تحاليل «كونيغ» ان متوسط ما يحواه لباب الاجاصة من
مواد غذائية هو :

/.. ١٧٢	مستخلص جاف
/.. ٢,٧	حامض تفاحي
/.. ٩٠	سكر محلل (غلوكوز وفيلوز)
/.. ١٣	سكروز
/.. ٣,٥	رماد
/.. ٣,٥	بروتين (أزوت X ٦,٢٥)
/.. ٥٦٧	حريرات او سعرات حرارية

أما الصربيت الموجود في لباب الاجاصة فنسبته تراوح
من ١٠ الى ٣٥ /.. والفيتامين «ث» من ٢ الى ١٠ /..

٤٥٠ - إجاصي ، كُمَثْرِي *Piriforme* (F), *Pyriform* (E).

نمت وصفي لشكل خاص من اشكال الثمار يشبه الاجاص .

٤٥١ - إجاصيات *Pirées, Poiriers* (F).

سبط الاشجار والشجيرات المعروفة بالاجاصيات من الفصيلة
الوردية . منبتها جميع الاصقاع المعتدلة الحرارة من الصين
حتى اوروبا الشمالية الشرقية || انواعها المعروفة قليلة .
أوراقها معتقة ، متعاقبة ، بسيطة ، بيضية الشكل ، منها
مسنة الحافة ومنها مقعوفة ومنها زغبية الك ن || أزهارها
نورية او فردية التجميع . ثمارها شبه كروية او مستطيلة
محصورة ، مستدقة العنق . اهانها لبني قوي تحرف السرة والقيد .

٤٥٢ - إجاجة *Angophora* (S), *Angophore* (F).

من اليونانية بهذا المعنى الماعا الى شكل الشجرة . جنس
اشجار حرجية وزينية من سيلة الآسيات . انواعه قليلة
العدد ، منبتها استرالية . وقها شاحنة ترتفع من ٢٠ الى
٢٥ م . اغصانها فارشة . أوراقها عروية متقابلة كاملة النصل
الاملس البشرة المذهب المعصية . أزهارها عذقية التجميع .
واليك اعرف انواعه .

٤٣٧ - إجاص البر اطلب برقوق البر .

٤٣٨ - إجاص باشيا *Pirus Pashia* (S).*Poirier Pashia* (F).

شجرة متوسطة القد تعلو من ٦ الى ٨ أمتار . منبتها جبال
حلايا || أوراقها عميقة التفريضة ، مثلثة الزوايا ،
شديدة الخضار . أزهارها منفرجة عريضة البتلات الوردية
اللون . اسديتها كثيرة تعد من ٣٠ الى ٣٥ || ثمارها
جلدية اللب ، صغيرة الحجم ، قطرها نحو ٢ سم .

٤٣٩ - إجاص بتوني الورق *Pirus betulaefolia* (S).*Poirier à feuilles de bouleau* (F).

شجرة متوسطة القد تعلو نحو ٦ أمتار . منبتها الصين .
أوراقها بيضية لونها الى الاخضر الزيتوني || أزهارها
منفرجة ، بتلاتها الى البياض . التبي . اسديتها نحو ٢٠ .
ثمارها مردنية صغيرة الحجم فستقية اللون تعلوها رقشة بيضاء .

٤٤٠ - إجاص تشُونُسْكي *Pirus Tschonoskii* (S).*Poirier de Tschonoski* (F).

شجرة صغيرة القد منبتها اليابان . أوراقها قليلة التفريضة ،
زغبية الصفحة السفلى || أزهارها عريضة وردية اللون .
ثمارها صغيرة صفراء اللون ، لها غزير العصارة .

٤٤١ - إجاص ثُلْجي *Pirus nivalis* (S).*Poirier nival* (F).

شجرة كبيرة القد تعلو نحو ١٧ متراً . منبتها اروبة .
زماها زباء . أوراقها بيضية الشكل . أزهارها كبير
النورة ، أزهارها بيضاء اللون . ثمارها مستديرة طويلة الاذن .

٤٤٢ - إجاص سُوري *Pirus syriacus* (S).*Poirier de Syrie* (F).

شجرة صغيرة القد تعلو نحو ٤ أمتار . منبتها سورية .
أوراقها مسنة ، زاهية الخضار ، زغبية الصفحة السفلى .
أزهارها متوسط النورة . أزهارها وردية اللون ، ثمارها
مردنية الشكل طويلة الاذن ، حامزة الطعم .

٤٤٣ - إجاص صَفْصَافِي الورق *Pirus salicifolia* (S).*Poirier à feuilles de saule* (F).

شجرة متوسطة القد ، شائكة الجذع والاغصان تعلو من ٥
الى ٨ أمتار . منبتها ارمينية والقوقاز || فروعها افقية
الالتشاب ، اثنانها متدلية الاطراف || أوراقها كاملة ،
مسنة ، زغبية الصفحة السفلى || أزهارها كبير النورة ،
أزهارها تبينة اللون . ثمارها مردنية الشكل ، حامزة الطعم .

٤٤٤ - إجاص صيني *Pirus sinensis* (S).*Poirier de Chine* (F).

شجرة كبيرة القد تعلو من ١٠ الى ١٥ متراً . منبتها الصين .
أوراقها بيضية طويلة المنقصة ، مسنة ، هلبية
الاسنان ، لونها شديد الخضار اللامع || ثمارها كبيرة ،
غزيرة العصارة ذكية الطعم والنكهة .

٤٤٥ - إجاص لَوْزِي *Pirus amygdaliformis* (S).*Poirier amandier* (F).

شجرة متوسطة القد تعلو من ٣ الى ٦ أمتار . منبتها اروبة .
شكلها شكل اللوز . أوراقها سمكية جلدية ، نصلها
زغبية الصفحة السفلى في طور نموه || أزهارها وردية
اللون . ثمارها خذروفية الشكل قصيرة الاذن .

٤٦٥ - أجرّة ، جعالة Salaire (F). Salary (E). هي مكافأة تدفع عادة نقوداً واستثناء عيناً الى من يعمل لغيره بمقتضى عقد العمل او وكالة مأجورة .

٤٦٦ - آجرة التفاح *^٥ Sesia myopaeformis, Aegeria myopaeformis (S). Sésie du pommier (F). Small red-belted clearwing (E). Apfelbaumglasflügler (D). حشرة من الآجريات طولها نحو ١٢ مم. رواشها جميلة التخطيط والزراكنش الملونة. يرتبها صغيرة تطول نحو ١٥ مم. رأسه كسفي اللون ، جسمها برتقالي ، ثيج ظهرها احمر. تركيب السوق والاغصان فتتخر اللحاء والشكير والخشب. تكافح باستعمال احد المواكين او الزيوت الصيفية وذلك للقضاء على مكن الحشرة قبل نغفها وتطوره الى يرقة .



آجرة التفاح

٤٦٧ - آجرة الحور *^٥ Aegeria apiformis, Trochilium apiformis (S). Sésie du peuplier (F). Poplar hornet clearwing (E). Bienenschwärmer (D). حشرة من الآجريات تفعل لعل آجرة التفاح ، تركيب الحور وتؤذيها .

٤٦٨ - آجرة الكشمش *^٥ Aegeria tipuliformis, Sesia tipuliformis, Synanthedon tipuliformis (S). Sésie du groseillier (F). Currant clearwing (E). Schnaken-glasflügler, Johannisbeer-glasflügler (D). حشرة من الآجريات تركيب الكشمش فتتخر سوقه . تكافح كآجرة التفاح باستعمال احد المواكين او الزيوت .



آجرة الحور

٤٦٩ - أجرد Aphylle (F). Aphyllous, Leafless (E). نعت تعريفي يطلق على كل نبات عادم الورق كالامسوخ والكشوث . م. جرداء .

٤٧٠ - أجرد Penis (F). Male organ (E). الاجرد والمجرد : قضيب ذوات الحافر .

٤٧١ - آجريات^٥ Aegeriidae, Sesilidae (S). Aegeridés, Sésilidés (F). Aegeridae, Clear-winged moths, Clearwings (E). Glasflügler, Glasschwärmer (D).

فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة . اجناسها وانواعها زهاء ٨٠٠ . جيمها متوسطة او صغيرة الحجم . خطمها قصير جداً او أري ، رواشها طويلة ، ضيقة ، قليلة الزغب . جسمها دقيق مستطيل بين الحلقات . حشراتا نهارية المخرج ، سريعة الطيران . يرقاتها تعيش على الالياف النباتية في سراديب تحفرها تحت اللحاء بين الشكير والخشب .



آجرة الكشمش

٤٧٢ - إجمعال Rut des carnassiers (F). Rutting of carnivorous (E). أجملت واستجملت اللبنة والكلبة والهرة وكل ذات مخلب اشبهت الفعل وطلبت السفاد .

٤٧٣ - أجل ، مدّة ، ميعاد Délai (F). Delay (E). هو الفترة من الزمن يوقتها المتعاقدون لاجل القيام بعمل ما .

٤٧٤ - أجل ، ميثقات Terme (F). Term (E). التوقيت القانوني او التعاقدية لتنفيذ الالتزام او تحديد زواله .

٤٥٣ - إجانية سنائية الورق Angophora lanceolata (S). Angophore à feuilles lancéolées (F). شجرة سبروتية تعلو نحو ٣٥ م. اوراقها معنقة سنائية النصل . ازهارها بيض || ازهارها يستمر من ايار الى آب .

٤٥٤ - إجانية قلبية الورق Angophora cordifolia (S). Angophore à feuilles cordiformes (F). شجرة سبروتية . تعلو نحو ٢٠ م. اوراقها لاطئة العنق ، قلبية النصل . ازهارها الى الصفار الباهت || ازهارها يستمر من ايار الى آب .

٤٥٥ - إجباء Vente de la récolte avant l'éplage الاجباء هو بيع الزرع قبل ان يبدو صلاحه او يدرك . يقال أجبأت الزرع .

٤٥٦ - إجشرار Rumination عمل خاص بحيوانات فصيلة المجترات وهو اعادة الاغذية من الكرش الى الفم لمضغها .

٤٥٧ - إجتزاز ، جزّ ، قصّ Tondage (F). Clipping (E). قطع صفوف الحيوانات او شعرها ووبرها من غم وماعز وغيرها .

٤٥٨ - إجتفّ Déshydrater (F). ازال الماء من الشيء .

٤٥٩ - إجتفاف Déshydratation (F). Dehydration (E). ازالة الماء من الشيء .

٤٦٠ - أجدرّ ، أرشمّ ، أرشمّ ، أوزس Débourrer (F). To put forth (E). يقال اجدر او ارشم او ارشم او اوزس الشجر اذا اخرج ورقه .

٤٦١ - أجدل هو الصقر ، اطلبه .

٤٦٢ - آجر اطلب اكري .

٤٦٣ - آجر Briques (F). Bricks (E). قريميد من الغضار مستطيل الشكل منسوب القالب يذهب في النار ضمن افران خاصة تطبخه حتى الشئ . يستعمل في البناء . وان ذهب في الشمس فهو اللبن || الواحدة آجرة .

٤٦٤ - إجرّاء Formalité (F). Formality (E). هو تنفيذ بعض الشروط التي تتناول ظاهر العقد حتى يصبح صحيحاً . والاجراءات عديدة أهمها :

اجراءات باطنية Formalités intrinsèques (F). Intrinsic formality (E).

اجراءات جوهرية Formalités substantielles (F). Substantial formality (E).

اجراءات خارجية Formalités extrinsèques (F). Extrinsic formality (E).

اجراءات سابقة Formalités antécédentes (F). Preceding formality (E).

اجراءات عرضية Formalités accidentelles (F). Accidental formality (E).

اجراءات لاحقة Formalités subséquentes (F). Subsequent formality (E).

اجراءات مصاحبة Formalités concomitantes (F). Concomitant formality (E).

اجراءات مزهلة Formalités habilitantes (F). Qualified formality (E).

٤٨٩ - أجوف، مقعر
Concave
خلاف المحدث .

٤٩٠ - أجوف المنقاد
Cavirostre (F).
Cavirostre (E).
نعت تعريفى يطلق على كل طائر مكثف المنقاد .

٤٩١ - أجيد الأدغال *
Augiades comma (S).
Augiade des buissons (F). Augiades comma (E).
حشرة من فصيلة المسيريات ورقبة حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الأدنى الى اوروبا المعتدلة الحرارة . فراشاتها تجوب البراري والادغال قوتها رحيق الازهار . اساريها خاضعة تعيش على اوراق نباتات الفصيلة القرنية || جسمها صغير القد بطول نحو ١٥ مم . بسطتها نحو ٣١ مم . رأسها كبير الجرم حنطي اللون . عيناها زُميتان ، ناشزتان . زبانها صولجانيان دقيقان . جوشها وبطنها كثيفا الحمل لونها الى الحنطي الاسمر || رواشنها متباينة التخضب بين الشقين . رواشن الذكر الى الغبرة الحنطية يعطوها في الزوج الامامي جدة برتقالية يطوقها اطار بني ، ويعطوها في الزوج الخلفي فسحة خضراء صفراء || رواشن الانثى الى البني العنابي يطوقها اطار كستني || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في اواسط تموز وتبقى حتى ايلول . تسرح في النهار . تعاظم بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع . تمتح المكن مبيحاديا على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة عند الادراك التام تطول نحو ٢٢ مم . جسمها شبه اسطواني الشكل ، ملس القشار ، اسود النقط الجانبية ، ثوبها الى الخضار الالسن تعلو اربعة خطوط قاطبة سوداء اللون || طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع ينقضي ضمن صلبة تنسجها السرفة بين افنان النباتات الدغلة .

٤٩٢ - أجير
Salié (F). Salaried, Paid (E).
كل عامل عادي يتقاضى اجرة عمله .

٤٩٣ - أجيراتوم

الأجيراتوم هو الغولان نبات من المركبات ، اطلبه .

٤٩٤ - أجيل *
Aegialia (S).
Aegialie (F). Aegialia (E).

جنس حشرات من فصيلة الخنطيات غمديات الاجنحة صفحيات القرون . انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها صغيرة القد . اطوالها تراوح من ٤ الى ٦ مم . اجسامها شبه كروية الشكل . ألوانها سوية الالوان منها الاسود والاسمر والحنطي الاغبر || اعطائها سواحل البحر الابيض المتوسط . تظهر في اوائل الربيع وتبقى حتى منتصف الصيف || يرقاتها صغيرة ، دقيقة ، غبراء اللون ، سمراء الرؤوس تتركب بدور النباتات المختلفة فتقرضها وتعطها وتسيء الى نموها .

٤٩٥ - أجيل

الاجيل : الطين يجمع حول النخلة جمعه أجيل .

٤٩٦ - أجيئة
Urne (F). Urn (E).
هي الوعاء الجرابي الشكل الذي يحفظ بويغات الطحالب .

٤٩٧ - أجيئة *
Céphalote (F).
جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة الاجينيات . انواعها المعروفة قليلة العدد ، جميعها ممررة ، فريشة ،

٤٧٥ - إجل
Harde (F). Herd (E).
جمع من الايائل والقباء وبقر الوحش الخ...

٤٧٦ - أجم
Bélier sans cornes (F).
Ram without horns (E).
كباش لا قرن له .

٤٧٧ - إجماعية *
Unanimisme (F).
Unanimism (E).

الاجماعية مذهب ادبي يقول ان الاخرى بالكاتب الاديب اظهار السيكولوجية البيئية العامة من عرض السيكولوجية الفردية الخاصة .

٤٧٨ - إجمال ، جمل ، ضم
Remembrement.
Réunions parcellaires (F). Reconstitution (E).

هو ضم الاراضي الزراعية او توحيد القطع في الارض المجزأة .

٤٧٩ - إجمام ، جث
Recépage (F).
Cutting down close (E).

قطع الشجرة او الجنبه او الكرمة إما لتجديد نشاطها وإما للتطعيم

٤٨٠ - أجممة
Perchis, Fourré de bois (F).
Furry, Thicket (E).

كل حرج لا تزال اشجاره دون العشرين سنة وقطرها دون العشرين سم . وهذه الاجمة قد تكون :

أجمة عالية السوق
Haut perchis
أجمة قصيرة السوق
Bas perchis, gaulis

٤٨١ - أجن
s'altérer (F).
To be impaired, To degenerate (E).

أجن الماء : تغير لونه وطعمه فهو آجن واجين .

٤٨٢ - إجناف ، إعتداء
Empiétement (F).
Encroaching (E).

هو وضع اليد على جزء من ملك الغير وضه الى ملكه .

٤٨٣ - أجنبي ، أعجمي
Exotique (F). Exotic (E).
نعت تعريفى يطلق على كل حيوان او نبات غريب عن المحيط الذي استجلب اليه .

٤٨٤ - أجنف
Partial (F). Partial, Unfair (E).
ذو محاباة . او من مال عن الحق .

٤٨٥ - أجنهر ، خفش
Nyctalope (F).
Nyctalopic (E).

الاجهر من لا يبصر الا في الليل .

٤٨٦ - أجهزة زراعية
Matériel agricole (F).
Agricultural material (E).

الاجهزة الزراعية والعتاد الزراعي والمعدات الزراعية هي مجموعة العدة الزراعية التي يتألف منها الجهاز الاستثماري .

٤٨٧ - أجوائي
Météorologiste,
Météorologue (F). Meteorologist (E).

عالم بالحوادث الجوية اي الجويات .

٤٨٨ - أجور
Gages, Salaires (F).
Pawns, Hires, Wages (E).

هي ما يتقاضاه خدم المنازل والاجراء الزراعيون من بدل .



أجيد الادغال



أجيل



اجينة

٥٠٧ - أحافير أولية
Fossiles de la couche primaire (F). Primary fossils (E).
هي احافير الطبقة الارضية الاولى تدرج تحتها احافير الحيوانات اللافقارية والاسماك والقواذب .

٥٠٨ - أحافير بدائية
Fossiles de la couche archéenne (F). Primeval fossils (E).
هي احافير الطبقة الارضية البدائية تدرج فيها النباتات العديمة الزهر والنباتات الصنوبرية .

٥٠٩ - أحافير ثلثية
Fossiles de la couche tertiaire (F). Tertiary fossils (E).
هي احافير الطبقة الارضية الثلاثية تدرج تحتها متحجرات الثدييات والحشريات والنباتات المزهرة .

٥١٠ - أحافير ثنائية
Fossiles de la couche secondaire (F). Secondary fossils (E).
هي احافير الطبقة الارضية الثانوية تدرج تحتها احافير الزحافات والطيور والاصداف والحيوانات القشرية والمرجانية وبعض انواع الحشرات من فراش وتمل وجنادب .

٥١١ - أحافير رباعية
Fossiles de la couche quaternaire (F). Quaternary fossils (E).
هي احافير الطبقة الارضية الرباعية وفيها تقع احافير الانسان .

٥١٢ - أحال اطلب أسند .

٥١٣ - إحالة ، إستحالة ، فسَاد
Altération (F). Alteration (E).
هي تغيير جوهر الشيء وطبيعته حتى يفسد وضد استعماله وقيمه .

٥١٤ - أحسن
Hydropique (F). Dropsical (E).
أحسن ومحبون : مصاب بداء الحبن .

٥١٥ - إحتباس البول
Rétention d'urine (F). Retention of urine (E).
عارض يصيب الحيل والبقير والفم يمنعها عن التبول .

اسبابه مختلفة وعلاجه ايضا لذلك يحسن استدعاء الطبيب البيطري الذي يستطيع القيام بالواجب بعد تشخيص السبب .

٥١٦ - إحتجاز ، إحتجاز
Clôture (F). Enclosure (E).
هو إقامة حاجز أو كل ما يفصل بين عقارين يملكها مالكان على ان يقام هذا الفاصل وفقاً لما نص عليه القانون .

٥١٧ - إحتراز راجع اتقاء .

٥١٨ - إحتراق
Combustion
عمل الاشتعال وهو مجموعة الحوادث الكيماوية التي ترافق انفعال الجرم مع الاوكسجين .

٥١٩ - إحتش ، حش
Faucher (F). To mow (E).
قطع بالمنجل او بالمحشة نباتات الكلاء من المربة او المرعى .

٥٢٠ - إحتشاش *
Fauchage (F). Mowing (E).
قطع النباتات العلفية أو الكلاء في الحقول أو المروج اما بالمنجل او بالمحشة الآلية .

عامة الساق . منبتها الطوعي مناطق البلام الحارة || اوراقها معتقة اهليلجية اتصال يتخللها معاليق متوجة بحبوب حقيقة الشكل ، مصراعية الاغلاق تنفتح وتغلق عند الحاجة . جيوها تفرز مادة سكرية تجذب الحشرات حيث يقضى عليها بعد وصد الاغلاق . ازهارها شبه سنبل التجميع يرتكز على شمراخ نحيل ليفي المادة . ثمارها أخينية || تزرع للزينة في المراكن وفي المواقع التي لا تخشى الصقيع في الشتاء .

٤٩٨ - أجينيات
Cephalotaceae (S). Céphalotacées (F). Cephalotaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القعالات . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . اعطائها بعض مناطق البلاد الحارة والمنحرفة نحو الاستوائية . يكثر وجودها على ضفاف المناقع والقدان || جميع انواعها اعشاب فريشة ، عديمة السوق ، اهليلجية الاوراق المعتقة المختلطة بحبوب حقيقة الشكل مصراعية الاغلاق . ازهارها عديمة التويج ، صغيرة الحجم ، سداسية البتلات الشخينة اتصال ، سنبلية التجميع ترتكز على شمراخ منتصب ليفية التركيب . ثمارها اخينية ، فقيرة . || اشهر اجناسها الاجينة .

٤٩٩ - آح ، آحين ، البومين ، سويداء

Albumine (F). Albumin, Albumen (E).

مادة لزجة بيضاء اللون مالحه المذاق تعتبر من المصادر المباشرة للاجسام المركبة || وهو تركيب تألفي عضوي عيم الانتشار يؤلف بياض البيضة ومصل الدم ويدخل في تركيب الكيلوس واللغا وبعض الافرازات الجسدية . وهو كذلك مادة ازوتية توجد في انسجة الحيوان والنبات . تكثر في حبوب النباتات الزيتية وفي اللوباء والفاصوليا والفول والهلين .

٥٠٠ - أحاث

Paléontologiste, Paléontologue (F).

Palaeontologist (E).

الاحاث من تعاطى الإحاثه اي علم مطورات الارض من حيوان ونبات .

٥٠١ - إحاثه
Paléontologie (F). Palaeontology (E).

الاحاثه او علم الاحاثه هو علم انواع مطورات الارض من النبات وغيره .

٥٠٢ - أحادي المحور
Uniaxe (F).

Uniaxis, Monaxial, Monaxonie (E).

٥٠٣ - أحادية الفروع
Monactinellidés (F).

Monactinellidae (E).
حيوانات بحرية من الاسفنجيات .

٥٠٤ - إحاشة
Rabattage (F). Beating (E).

حصر الصيد وتسييره من جهة الصيادين .

٥٠٥ - أحافير ، متحجرات
Fossiles (F). Fossils (E).

هي البقايا العضوية المتحجرة في مختلف الطبقات الارضية .

٥٠٦ - أحافير أصلية
Fossiles de la couche primitive (F). First fossils (E).

هي احافير الطبقة الارضية الاصلية تدرج فيها احافير ذوات الارجل المهنحة والحيوانات شبه المفصلي والحيوانات الشعاعية والاسفنجية .



إحتشاش

٥٢٠ - إحتكاكية Tribométrie (F).

Tribometry (E).

الاحتكاكية فرع من الفيزياء يبحث في مقاييس الاحتكاك ، قوتها ومفاعيلها .

٥٣١ - إحتلاب ، حَلَب Traite, Mulsion (F).

Draw milk (E).

إخراج الحليب من ضروع اناث الدواجن وقد يتم ذلك اما باليد او بواسطة حلابات آلية .

٥٣٢ - إحتياطي Réserve (F) Reserve (E).

هو حفظ الحق وقد يستعمل في عدة صيغ يتبع أشهرها .

٥٣٣ - إحتياطي الضمان Réserve de garantie

وهو المال المحبب في التأمينات لمواجهة الفرق بين الواقع والمتوقع ومن الواجب ان يصل الى ١٠ ٪ من الإحتياطي الحسابي .

٥٣٤ - إحتياطي حسابي Réserve mathématique

هو المبلغ المأخوذ من قسط التأمين على الحياة والمفروض على المؤمن رسمته حفظاً للتأثران بين قيمة تعهداته وبين تعهدات المؤمن له .

٥٣٥ - إحتياطي قانوني Réserve légale

هو المال الذي يجب على كل شركة مساهمة تجهيزه من ارباحها الصافية بنسبة ٥ ٪ على الاقل حتى يصل مجموعه الى عشر رأس المال .

٥٣٦ - إحتيال Escroquerie (F). Swindling (E).

الاحتيال هو ابتزاز مال الغير بالخدعة .

٥٣٧ - أحداث جوية Phénomènes

météorologiques (F). Meteorological phenomena (E).

هي مجمل الظواهر الجوية المميزة الموصوفة

٥٣٨ - إحدائي Coordonnée (F). Co-ordinate (E).

تعريف للقضايا الاحتمالية المتناظرة او المتناسبة .

٥٣٩ - أحدل Anorchide (F). Anorchid (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ذكر من الانسان والحيوان تنقصه خصية او تليسة .

٥٤٠ - أحد

أحد م. حذاء: خفيف شعر الذنب ، فرس أحد . قطاة حذاء: لقصر ذنبها وقلة ريشها وسرعة طيرانها . قال النابغة يصف القطا :

« حذاء مقبلة سكاء مدبرة

للماء في النحر منها فوطه عجب »

٥٤١ - إحرىض

اطلب قرطم .

٥٤٢ - إحساب ، إغراب Albinisme (F).

Albinism (E).

حصول حذول مفاجئ في لون النبات او في الحيوان . يقال اغرب النبات فهو مغرب واحسب الفرس .

٥٤٣ - أحسب ، مغرب Albinos (F). Albino (E).

من يكون قد احسب او اغرب من الدواب والنبات

٥٢١ - إحتضان ، ترخيم Accoupage (F).

Hatching (E).

هو حضن البيض للتفقيس . لذلك يحسن تنظيف الحاضنة او السل او الصندوق المعد لاقتبال البيض قبل وضع البيض ومن الافضل رشه بمسحوق الغريدب او الكبريت الناعم لوقايته من القمل والقراد .

٥٢٢ - إحتطاب Affouage (F).

The communal right of cutting wood (E).

يكون حق الاحتطاب اي جمع الحطب نافذاً عند اعلان اللائحة الاسمية بالسكان الذين يحق لهم الاحتطاب من حرج القرية المشاعي .

٥٢٣ - إحتفار ، تقفير Excavation

٥٢٤ - إحتقان ، تبثج Congestion

الاحتقان تدفق الدم بكثرة على محل معين من الجسم .

٥٢٥ - إحتقان الرجل Fourbure (F).

Foundering, Inflammation of the feet (E).

احتقان ويليه التهاب في النسيج الحي من حافر الفرس وظلف البقرة || اسبابه عديدة منها ثقل الجسم والاستراحة الطويلة يعقبا العناء والعلف الغني بالمواد الازوتية . عوارضه : اكتئاب وقه ثم انحطاط ورجفة وحرارة . العناية : فصد الحيوان ، تمرير قوائمه بالحدول ، تجريعه نقيع الالوة اي المقر بمعدل ٣٠ او ٤٠ غرام .

٥٢٦ - إحتقان رئوي Congestion pulmonaire (F).

Pulmonary congestion (E).

مرض يصيب الحيوان سببه تدفق الدم بكثرة على الرئة . عوارضه : جود عن الحركة ، فج في القوائم ، استرسال الرأس على العنق ، اكتئاب وحرارة ، استعجال في التنفس ، امتداد في المنخرين ، سيلان راغ لا يخلو من بعض خيوط الدم || العناية : بذل المستطاع لتسهيل التنفس وذلك بتمرير القوائم وسلسلة الظهر بمسحوق الحدول .

٥٢٧ - إحتقان معوي Congestion intestinale (F).

Intestinal congestion (E).

اصابة الامعاء بالاحتقان الذي سببه تدفق الدم على هذا العضو || عوارضه : مغص أليم ينتاب الحيوان فيرتمي ارضاً ثم يقوم بنزقة ليرتمي من جديد ويطش في التنفس وانخفاض وتقطع في النبض وعرق غزير || العناية : فصد الحيوان وتمرير جسمه بالحدول ثم تجريعه بعض السوائل المسكنة .

٥٢٨ - إحتكار ، حصر Monopole (F).

Monopoly (E).

هو حق يؤثر به شخص واحد او جماعة او شركة مغلقة تستقل به ولا ينافسها فيه احد . والاحتكار قد يكون نسبة الى مصدره : قانوني ، واقعي ، خاص ، عام ، مالي ، اداري .

٥٢٩ - إحتكار ، حكر Accaparement (F).

Monopolizing, Forestalling (E).

هو ان تحصر البضائع او الاطعمة او السندات المالية عامة او خاصة حصراً مفتعلاً على يد فرد او جماعة للاستطاعة من فرض الثمن وكسب الارباح الباهظة .



احتلاب



أحقب



أحيون



أخاطة



أخبل

٥٦٠ - إحياء ، عِمَارَة Défrichement (F).
Clearing, Breaking up (E).
اعداد الارض للزراعة وذلك بمسد تنظيفها من مختلف النباتات البرية او الحرجية التي لا تلائم الزراعة المرغوب فيها.

٥٦١ - أحيائي ، عالم أحيائي ، بيولوجيست Biologiste (F). Biologist (E).
الأحيائي من تعامل في البيولوجية اي علم الاحياء .

٥٦٢ - آحين Myosine (F). Myosin (E).
مادة آحية تستخرج من النسيج العضلية الموجودة في الجثث والجيف .

٥٦٤ - آحيثي Albumineux (F). Albuminous (E).
حاوي الآحين من مختلف المصادر اخصها النباتات .

٥٦٥ - آحيون* ، كرشون ، رأس الأفقي ، أثنأ Othonna cheirifolia (S).
Souci d'Afrique (F). Barbary ragwort (E).
Fiorrancio d'Africa (I).
نبات عشبي طبي معمر من فصيلة المركبات وهو نوع من الاثنا يزرع للتزيين || سوقه فرعاء يبلغ ارتفاعها نحو المتر . أوراقه قرنفلية الشكل باهتة الخضار . ازهاره هامية وتاجية الارتكاز || يتكاثر بالبذر والمقل . يوجد في جميع الأتربة المعتدلة التركيب ولا يخشى سوى الرطوبة المستحكة .

٥٦٦ - أخاذ Préhensile (F). Prehensile (E).
نعت وصفي يطلق على كل عضو يتميز بخاصة الاقتلاف والاخذ كاللسان والذنب في بعض الحيوانات والحشرات .

٥٦٧ - أخاطة* Achatina (S).
Achatine, Agathine, Agatine (F).
جنس حيوانات برية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الحلزونيات . انواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد الحارة اخصها افريقية . تعيش في الموائع الرطبة || اصداؤها كبيرة شبه اهليجية الشوزن جميلة الالوان الزاهية المتجانسة . اجسامها كبيرة لا تختلف عن اجسام الحلازين . جميع انواعها مأكولة || اشهر انواعها أخاطة مدغسكر بيضاء اللون مجذعة بالبنفسجي .

٥٦٨ - أخبع ، أُرْجَن Apprivoiser (F).
To tame (E).
أخبع الطائر جعله أليفاً والوحش كذلك .

٥٦٩ - أخبل* Sula (S). Fou (F). Gannet (E).
جنس طيور مائية من كفيات القدم وفصيلة البجديات . انواعه ستة جميعها كبيرة الجثة . بسطة سقطها نحو ٢٠٠ سم . انواها الى البياض والبياض الازرق . مناقيرها كبيرة مقلطحة . أرجلها قصيرة السيقان || تعيش اسراباً كبيرة العدد . تتميز بطيشها وخجلها .

٥٧٠ - أخت الرومال Apter (F). To ravish (E).
خطف . اختات الصقر الطائر : خطفه .

٥٧١ - إختات Ravir (F). To ravish (E).
خطف . اختات الصقر الطائر : خطفه .

٥٤٤ - إحشاش Fauchaison (F). Mowing-time (E).
زمن الاحشاش او الحش وذلك عندما يصح قطع النباتات العلفية او الكلاء .

٥٤٥ - أحص ، حصيص قليل شعر الشنة والذنب وهو عيب في الخيل . الاسم الحصص .

٥٤٦ - إحصاء ، تعداد Recensement (F).
Census (E).
هو اجراء يراد به معرفة عدد الشيء المقصود او بعض الوقائع المعينة .

٥٤٧ - إحصائي ، باني Staticien, Statisticien (F).
Statistician (E).
من تخصص بعلم الاحصاء .

٥٤٨ - إحصائية ، بابة Statistique (F).
Statistical, Statistics (E).
علم يبحث في جمع الشوارد وترتيبها وتفصيلها .

٥٤٩ - أحفوري Paléozoologique (F).
Paleozoologic (E).
نعت تعريفية يطلق على كل ما هو مختص بالحفارة .

٥٥٠ - أحقب* Onagre (F). Onager, Wild ass (E).
حمار الوحش سمي بذلك لبياض في حقويه والانثى حقباء .

٥٥١ - أحقل أحقل الزرع : تشعب عصفه قبل ان تغلظ سوقه .

٥٥٢ - إحلال ، إستبدال ، إبدال ، تغيير الإحلال هو امكان سلطة او فرد من إحلال سلطة اخرى او فرد آخر فيما لها من قدرة .

٥٥٣ - أحلظ أحلظ وأخلط الرجل البعير : ادخل قضيبه في حياء الناقة .

٥٥٤ - إحليل Canal du pis (F).
الإحليل : مخرج البول من الانسان او الحيوان او مخرج اللبن من الثدي . ج إحليل .

٥٥٥ - إختام اطلب آس .

٥٥٦ - أحمق ، طارئ ، عارض Adventif (F). Adventitious (E).
نعت وصفي لبعض اعضاء النبات كالبزاعم مثلاً التي تظهر عرضاً في مواضع من النبات لم تألفها .

٥٥٧ - أحتاز غذائية* Equivalents nutritifs (F).
Equivalents nourishing (E).
هي معادلات المقادير اللازمة من اعلاف معينة تحوى العناصر المنسوبة الى وحدة مقررة من الشعير او الش . راجع جدول المواد الغذائية .

٥٥٨ - أحتج يقال أحتج الفرس اي ضرر .

٥٥٩ - أهور Jupiter (F). Jupiter (E).
الاحور كوكب من مجموعة النظام الشمسي . ويدعى المشتري والبرجيس . اطلب مشتري

٥٨٣ - إختداج ، إستقاط ، إختفاد

Avortement (F). Abortion, Miscarriage (E).
هو القاء الدابة ولدها قبل تمام الايام . فان كان تام
الخلق فهو خديج وهي خادج وان كان ناقص الخلق
فهو مخدج وهي مخدج .

٥٨٤ - إختداج معدي (F). Avortement épizootique (F).
مرض معدي يصيب الابقار . Epizootic abortion (E).

٥٨٥ - أختدر* ، أختدري Equus asinus onager,
Asinus indicus (S). Onagre (F). Onager, Wild ass (E).
نوع من حمر الوحش وفصيلة الخيليات . اكبر جثة
من العير واسرع منه ، موطنه بلاد فارس والهند الشرقية .
يقال ان تصالبه مع الحمار العادي كان دائماً جيد النتائج .

٥٨٦ - أختدريات (S). Oenotheraceae, Onagraceae (S).
Oenothéracées, Onagrées, Onagrarilées (F).
Oenotheraceae, Onagraceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القعالات .
انواعها نحو ٣٠٠ جميعها اعشاب وجنبات صغيرة .
منبتها العالم بمختلف اصقاعه || اوراقها بسيطة
متقابلة او متعاقبة . ازهارها خشوية رباعية الخدر .
ازهارها سنبل التجميع ، ناجي الارتكاز || معظمها
نباتات برية ومنها انواع تستعمل للتزيين ونوع آخر يزرع
لثماره التي تشبه الكماة وتؤكل .

٥٨٧ - أختدريّة* Oenothera biennis (S).
Oenothère, Enothère, Onagre, Herbe aux ânes (F).
Evening primrose, Large ramplon (E). Echte
nachtkerze (D). Enagra, Rapunzia, Erba asina (I).
نوع من الاختدريات وهي جنبة محولة مستندقة السوق
والفروع نحسة الهندام . اوراقها حاشية بيضيه متعاقبة .
ازهارها جميلة زاهية لا قياسية التجميع والارتكاز ، رباعية
البتلات الكبيرة ، فواحة العرف المستحب . لونها ابيض
ومنها ضروب تميل الى الاصفر || تتكاثر بالبذر ،
تبذر مشاتلها في اذار وتنقل الى مستقرها في ايار . تزهّر
ابتداء من ايلول || تجود في جميع الأتربة العميقة الغور
القليلة او المتوسطة الاندماج . تفضل المواقع الجنوبية
الكثيرة الشمس .

٥٨٨ - أختدود ، خدّ ، خدّة Billion (F).
Ridge thrown up by plough (E).

حفرة سطحية ضيقة تحفرها في الارض مستطيلة .

٥٨٩ - آخر الشهر Akharnar, Achernard (F).
Acamar, Achernar (E).
آخر النهر نجم من المرتبة الاولى من كوكبة النهر المعروفة
ايضاً بكوكبة اريدانوس . يبعد عن الارض نحو ٧٠ سنة
ضوئية . مركزه في اواسط مؤخر النهر ويليه على مسافة
قريبة نجم آخر يدعى العظيم .

٥٩٠ - إختراج ، رفع ، نشل Déterrage (F).
Disinterred (E).

إخراج المحراث من التراب في آخر التلم .

٥٩١ - أختراس Pyrus silvestris, Achras (S).
Achras, Poirier sauvage (F). Achras, Wild pear (E).
Wolliger birnbaum (D). Pero salvatico (I).

ويدعى اجاص بري وكثري بري . نوع بري من الاجاصيات

٥٧٢ - إختبار Expérimentation (F).

Experimentation (E).
هو تجربة الشيء للوصول الى معرفة كل ما يمكن ان علمياً
او زراعياً او اقتصادياً وخاصة اذا كان ملائماً للغاية التي
من اجلها صار الاختبار .

٥٧٣ - إختباز ، خبازة Panification
صناعة الخبز . تحويل الطحين أي الدقيق خبزاً .

٥٧٤ - إختبتار Condensabilité (F).
Condensability (E).
هي قابلية التختير .

٥٧٥ - إختزال Réduction (F). Reduction (E).
الاختزال ، اصطلاح كيمائي يقصد به فقد الاكسجين
من مادة من المواد ليتحد مع مادة اخرى مكوناً بذلك مخلوطاً
كيمياوياً جديداً . فلهيدروجن اذا مر على اكسيد النحاس
الساخن ينتزع منه اكسيجه ويتحد معه ليكون الماء .
فلهيدروجن يسمى عندئذ عامل اختزال اذ انه المادة التي
تنزع الاكسجين .

٥٧٦ - إختصاص Compétence (F).

Competence, Cognizance (E).
هو اهلية الشخص للقيام بالعمل المنوط به او المولج بعمل ما .

٥٧٧ - إختصاص Spécialisation (F).
Specialization (E).

تفرد سلالة حيوانية بوجه واحد من اوجه الانتفاع .

٥٧٨ - إختصاص عقاري Affectation hypothécaire (F).

هو حق رهن خوله القانون من صدّر له حكم يلزم
خصمه بدفع مبلغ معين له فيقيد على عقار مديته هذا الحق
وفاء لمطلوبه بطريق التفضيل على سائر الدائنين غير
المقيدين او المقيدين بعده .

٥٧٩ - إختيار Fermentation

الاختيار هو التحلل وتحول المواد العضوية بتأثير الخمائر .
وقد يأتي الاختيار على عدة اوجه : اختيار غلي ، اختمار
نشادري ، اختمار لبني ، اختمار زبدي ، اختمار كحولي الخ .

٥٨٠ - إختيار سمّي Fermentation butyrique (F).
Fermentation butyric (E).

هو تحول بعض المواد العضوية كالسكر والنشا والآح الخ .
الى حامض سمّي . وقد يتم ذلك تحت تأثير بعض العوامل
المجهريّة ولا سيما قضيعة الزيدة فيما يختص بالحامض اللبني .

٥٨١ - إختناق ، بثق ، رصع Asphyxie (F). Asphyxia (E).

اختناق تستعمل للحيوان . بثق ورصع تستعملان للنبات . وهو
بطء التنفس او امتناعه وسببه كثرة الماء في التربة او
عمق غرس النصبوب في التربة المتأسكة الشديدة الاندماج .

٥٨٢ - إختياريّة Electisme (F).

Electism (E).
الاختياريّة مذهب فلسفي قوامه اختيار الآراء المستحسنة
والنظريات الصائبة من مصادرها المختلفة .




أختدر



أختدريّة



أخراس أمريكي



أخروس



أخروط امرط



إخریط مجنح

٥٩٦ - أخروس صغير

Pirola minor (S).

Pirole petit (F).

نوع من الاخروس . منبته قم الهضاب . ساقه تعلو من ٥ الى ١٥ سم . اوراقه معنقة وشبيهة باوراق الاجاص . ازهاره عديدة ، صغيرة القد ، وردية اللون || تنويره يستمر من حزيران الى آب .

٥٩٧ - أخروس متوسط القد

Pirola media (S). Pirole intermédiaire (F).

نوع من الاخروس . منبته الهضاب والروابي . ساقه تعلو من ١٥ الى ٣٠ سم . اوراقه معنقة قريبة الشبه باوراق الاجاص . نصالها منشارية الحثار . ازهاره كثيرة العدد ، وردية اللون ، تتميز بفصلها المستطيلة || تنويره يستمر من تموز الى آب .

٥٩٨ - أخروس مستدير الورق

Pirola rotundifolia (S).

Pirole à feuilles rondes (F).

نوع من الاخروس . منبته يمتد من الروابي الى الجبال . ساقه تعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم . اوراقه معنقة ، شبه مستديرة الشكل . نصلها بحيل الخضار العابق . ازهاره عديدة ، بيضاء اللون او وردية . فصلها مستطيلة || تنويره يستمر من حزيران الى تموز .

٥٩٩ - أخروس وحيد الزهرة

Pirola uniflora (S). Pirole uniflore (F).

نوع من الاخروس . منبته الجبال العالية . ساقه تعلو من ١٠ الى ٢٠ سم . اوراقه رهلة . زهرته واحدة ، كبيرة ، طرفية الارتكاز ، بيضاء اللون || تنويره يستمر عدة اسابيع ابتداء من اواسط ايار .

Pirolaceae (S).

Pirolacées (F). Pirolaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها وانواعها قليلة العدد . جميعها نباتات عشبية معمرة ، معظمها بري وبعضها زراعي تزييني || أشهر اجناسها الاخروس والكيا فيل .

٦٠١ - أخروط امرط

Beckerella inermis (S).

Achorute inerma (F).

حشرة مؤذية من الكهدليات ، قافزات اللذب . جسمها صغير نحيل . طولها نحو واحد مليمتر وثلاثة خطوط . ثوبها الى الطحلة يعلوها موج بنفسجي . جهازها القفزي نحيل ودقيق || يكثر وجودها على الباطاطا المحزونة السائرة نحو الانحلال من جراء اي سبب كان .

٦٠٢ - إخریط

Ammobium (S).

Ammobie, Ammobion (F).

جنس نباتات عشبية ليفية برية من فصيلة المركبات ، مهدها البلاد الحارة || منها أنواع تزيينية كالأخريط المجنح .

٦٠٤ - إخریط مجنح

Ammobium alatum (S).

Ammoble ailée (F). Winged everlasting (E).

Australische papierknöpfchen (D). Sempervivi (I).

نوع من الاخريط الزراعي التزييني . ازهاره كبيرة الحجم بيضاء اللون لا تذبل . يرغب في الاربة الرملية والمواقع الجنوبية المعرضة لأشعة الشمس . يتكاثر بالبذر .

الورديات . اشجاره متوسطة الحجم شديدة المناعة تصلح لتطعيم معظم الانواع الزراعية . تعيش نحو ٨٠ سنة لكنها بطيئة النمو ولا تثمر قبل عمر عشر سنوات .

٥٩٢ - أخراس أمريكي ، سبوتة ، زعرور أمريكي

Achras sapota, Sapota achras (S). Sapotillier, Sapotier, Néflier d'Amérique (F). Sapota, Sapodilla plum, Naseberry (E). Sapota apfel, Gemainer breiapfel (D). Sapotiglia, Sapotillizio, Sapota (I).

شجرة كبيرة دائمة من فصيلة السبوتيات . مهدها امريكة الجنوبية وقد انتشرت زراعتها في جميع البلاد الحارة . ثمارها - شجرة عظيمة الهيكل غليظة الساق والاغصان الافقية الارتكاز المنتبجة الصفوف . كثيفة الافناد والافان مستديرة القمة . افانها وأهن ثمارها زغية القشور وزغبها اصفر اللون || اوراقها اهليلجية الشكل معنقة متقابلة تكثر في اطراف الافان . نصلها جلدي امرد عابق الخضار : عروقه متوازية الابعاد || ازهارها فردية ، ابطية سداسية الفصالات . تويجها جربي الشكل ابيض اللون بداسي الفلقات التي تقابلها من الداخل ست حراشف . اسديتها ست وخذور مبيضها ١٢ || ثمارها مستديرة او بيضية الشكل بقدر البرتقالة الصغيرة . بشرتها رقيقة خشنة طحاء اللون . لبانها بلون النار كثير المادة السكرية ، لذيق الطعم والتكهة ، مستحب العرف يذوب في الفم . بزورها مستطيلة مفلطحة سوداء اللون طويلة الانقود الابيض تستعمل لدر البول ولطرد الديدان المعوية || زراعتها تتكاثر بالبذر والتعجيل والتدريج . ترغب في الاربة المتوسطة الاندماج العميقة الغور . تحشى الرطوبة المستحكمة والبرد . لذلك يجدر غرسها في المواقع المعرضة للجنوب والممكن ردها . زراعتها لا تتطلب عناية خاصة لانها من النباتات البرية التي يضيئها التشذيب والتقليم || منافها : ثمارها المأكولة هي على موسمين في السنة . ثم عصارتها الصمغية الملوكية الشائعة الاستعمال التي تدعى شيكل (Chicle) والتي تستخرج من حر السوق واستزافها .

٥٩٣ - إخرج

كل فرس ابيض البطن والجنبين الى منتهى الظهر فقط . وكل فرس خرج تحجيلها من الزراعين والساقين . والاخرج من المعزى الذي نصفه ابيض ونصفه اسود .

٥٩٤ - أخروس

Pirola (S).

Pirole (F). Pirola (E).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الاخروسيات . انواعها المعروفة عديدة معظمها بري وبعضها زراعي تزييني || سوقها قصيرة تعلو من ١٠ الى ٤٠ سم . اوراقها معنقة جلدية النصال . شماريخها الزهرية مضلعة . ازهارها بيضاء اللون او وردية ، مستطيلة المعاليق ، متدلية || زراعتها تتطلب عناية خاصة لانها تستوجب وجود بعض القطور المجهرية في التربة || اعرف انواعها واشهرها الخمسة التالية .

٥٩٥ - أخروس أخضر

Pirola chlorantha (S).

Pirole verdâtre (F).

نوع من الاخروس . منبته الجبال . ساقه تعلو من ١٠ الى ٣٠ سم . اوراقه معنقة قريبة الشبه باوراق الاجاص . نصالها غبراء اللون ، ضيقة التسنين الحثاري . ازهاره كثيرة العدد لونها الى الخضار الزيتي . فصلها متساوية الطول والعرض || تنويره يستمر من تموز الى آب .

٦١٧ - **أخطبوط جبّار** ° Architeuthis (F).
هو الارشيطوط ، حيوان بحري من القشريات ، اطلبه .

٦١٨ - **أخطبوط شائع * ، دَوَلَة**
Octopus vulgaris (S). Poulpe commun, Pleuvre (F).
Common devil-fish, C. octopus, C. poulpe (E).
نوع من الاخطبوط كبير القد عدو المنع و سرطان البحر يطاردهما بدون هودة .

٦١٩ - **أخطبوطيات**
Octopodes (F).
Octopodan, Octopedes (E).

رتبة حيوانات مائية من الرخويات المزدوجات الحيشوم
الرأسيات الارجل || اجناسها خمسة جميعها تحمل في
رؤوسها ثمانية جراميز تكسوها المحاجم اللاصقة التي تمكنها
من امتلاك فريستها .

٦٢٠ - **أخطوديوم ***
Ochthodium (S).
Ochthodie (F).

جنس نباتات عشبية برية حولية من الصليبيات ، قليلة
الانواع ، سوقها فرعاء . اوراقها السفلى ريشية او قيثارية
والعليا رحيمة متعاقبة || ازهارها صفراء اللون . ثمارها
خريشات مستطيلة ثنائية الغريفات عرضاً . بزورها فردية
في الغريفات .

٦٢١ - **إخفاائية °**
Esotérisme (F).
Esoterism (E).

الاخفاائية مذهب الذين يقولون ان الجهارة لا تجوز إلا
للذين أَلَمُوا بالمبادئ الاولى في العلم المنشود .

٦٢٢ - **إخفاد**
Avortement (F). Abortion (E).
أخفدت الناقة : أَلقت ولدها قبل ان يتم وهي خفود .

٦٢٣ - **أخفى الشرطين**
Mesartim
أخفى الشرطين نجم نير من كوكبة برج الحمل . مركزه
على القرن بالقرب من انور الشرطين .

٦٢٤ - **أخفى العوائد**
Grumium
أخفى العوائد نجم نير من كوكبة التنين مركزه على رأس
التنين .

٦٢٥ - **أخفى الفرقدين**
Pherkad
أخفى الفرقدين نجم نير من كوكبة الدب الاصفر مركزه
ازاء انور الفرقدين .

٦٢٦ - **إخلاء**
Exponse
هو ان يترك المستأجر الارض المؤجرة له ليتخلص من
دفع البدل المتفق عليه الذي يعد مقابل الايجار .

٦٢٧ - **إخلاف**
Repeuplement (F).
Repeopling, Restocking (E).

الاخلاف هو العمل على إعادة الحرج الى ما يجب ان
يكون عليه وذلك اما بتعهد الاخلاف التي قنبت واما بغرس
النصوب اللازمة او ببذر البذور المطلوبة .

٦٢٨ - **أخمي**
Scalène (F). Scalene (E).
مثلث مختلف الاضلاع .

٦٢٩ - **إخنيم** : اطلب نفس مصري .

٦٠٥ - **أنخل** ° Brevicaule (F).
Short-stemmed (E).

الانخل من النبات القصير الساق .

٦٠٦ - **أخشم °**
Dicranobranche (F).
نعت تعريفي يطلق في علم الحيوان على من كانت خياشيمه
منشعبة مفترقة .

٦٠٧ - **إخشيشاب**
Lignification
نشاف يحصل في بعض النسيج النباتية اخصها الليفية
يقودها الى التصلب .

٦٠٨ - **إخصاب**
Fécondation (F). Fecundation (E).
هي العملية التناسلية الطبيعية التي تتم بعد تأبير الزهرة ان
تفطرحاً او تنبيها . قوامها اندغام جيلة الخلية الذكرية في
جيلة الخلية الانثوية لتكوين الرشم الذي به يستمر النسل ويتتابع .

٦٠٩ - **أخصب ، أمرع**
Fertiliser (F).
To fertilize, To manure (E).
هو اضافة المواد الخصبه ان عضوية او معدنية الى التربة
لتصير خصبة او لزيادة خصبها .

٦١٠ - **أخضر** : عصفور يعرف بالخضيري ، اطلبه .

٦١١ - **أخضر النحاس**
Verdet (F). Verdigris (E).
اسم شامل لانواع اسيتات النحاس وقد اطلق عليه اسم
أخضر النحاس لاختصار لونه || أكثر انواعه تستعمل
في الحبال الزراعية لمعالجة الامراض الفطرية في النبات .

٦١٢ - **إخضيرار**
Verdissement
مرض يعترى خمر التفاح فيعطها . سببه تدني نسبة الحامض
وتحويل بعض املاح الحديد الى املاح حديدية .

٦١٣ - **أخط**
Agate
ضرب من المرمر يتميز برسف طبقاته المتلفة الشكل ،
المختلفة الالوان المتداخلة ، الوحيدة الظل || منه العقيق
اليافى والبشم .

٦١٤ - **أخطب**
الأخطب الشقراق وقيل الصرد لان فيها سواداً وبياضاً .
اما الديميري فيقول انه الصرد وانشد لبعضهم :
« ولا أنثى من طيرة عن مريرة
إذا الاخطب الداعي على الدوح صرصراً »
والاخطب هو الحمار الذي يعلو ثبج ظهره خط اسود .
والأنثى خطباء .

٦١٥ - **أخطب**
تلون . الخطب المنظل : اصفر وصار فيه شطوط خضر .
حنظلة خطباء . وكذلك في الحنظلة اذا لونت (اللسان) .

٦١٦ - **أخطبوط**
Octopus (S). Poulpe (F).
Octopus, Devil-fish (E).
جنس حيوانات بحرية هلامية من الاخطبوطيات العالية من
الهيكل الفقري . انواعه عديدة منتشرة في جميع البحار .
رؤوسها شبه كروية ، عيونها كبيرة جاحظة . تحمل ثمانية
جراميز مستطيلة تقوم عليها من الداخل محاجم كثيرة العدد
تمكنها من الالتصاق بفريستها || من انواعها الدولة .



أخطبوط شائع



أخطوديوم



أخوين



أخيرانتوس



أخيرانتوس شرقي



أخيليا أغيراطن



أخيليا بقلة العطاس



أخيليا سوداء



أخيليا طريفة



أخيليا عطرة



أخيليا منعشة

نبات طبي بري معمر يعلو من ٢٥ الى ٨٠ سم. يوجد في مختلف الأماكن والأقاليم المعتدلة. يرغب في المواقع الرطبة || أوراقها بسيطة، أهليلجية، مسنة، خشنة، دابقة. نصلها امرط وكثيف الجيوب العطرية || ازهارها صفر. ازهارها يدوم من ايار الى آب || أوراقها وازهارها تفيد المعدة وتقويها.

٦٤٢ - أخيليا أم الف ورقة

Achillea millefolium (S). Achillée millefeuilles, Herbe aux charpentiers, Saigne-nez (F). Milfoil, Nose bleed, Yarrow (E). Schafgarbe, Tausend-augbraun, Achillenkraut (D). Millefoglia, Erba da Carpentieri, E. da tagli (I).

عشبة برية وزراعية معمرة، رندية الارومة، نلر من ٣٠ الى ٧٠ سم. أوراقها مستطيلة. ازهارها كثيفة البتلات القرصية، عديدة الالوان فيها الابيض والوردي والكرزي والاحمر. ازهارها يدوم من ايار الى تشرين || تتكاثر بالبذر وتجود في جميع الأتربة المتوسطة الاندماج والرطوبة.

٦٤٣ - أخيليا بقلة العطاس، سَعُوط

Achillea ptarmica (S). Achillée sternutatoire, Herbe à éternuer, Ptarmique, Bouton d'argent (F). Sneezewort, Bastard pellitory (E). Betramgarbe, Niesgarbe (D). Achillea starnutatoria, Bottone d'argento, Erba da starnuti (I).

نبات عشبي بري معمر يعلو من ٣٠ الى ١٠٠ سم. سوقه فرعاء. أوراقه ضيقة لسنة مسنة. ازهاره بيض. ازهاره يدوم من تموز الى آب || يوجد في معظم المناطق المعتدلة. يكثر في الارض البور وقرب انصخور.

٦٤٤ - أخيليا سوداء

Achillea atrata (S). Achillée noire (F). Black milfoil (E). Trauergarbe (D). Achillea nera (I).

نبات بري طبي معمر. يعلو من ١٥ الى ٣٠ سم. أوراقه ضيقة، نصلها امرط البشرة مسنة الحافة || ازهاره قرصية كثيفة التجميع حنطية الكأس. ازهاره يدوم من تموز الى ايلول || يرغب في الاراضي الكلسية.

٦٤٥ - أخيليا طريفة

Achillea nobilis (S). Achillée noble, Achillière élégante (F). Showy milfoil (E). Edelgarbe, Edle garben (D). Achillea elegante, A. nobile (I).

نبات زراعي تزييني معمر جميل الشكل والازهار. يتكاثر بالبذر ويجود في جميع الأتربة الزراعية || يعلو من ٢٠ الى ٨٠ سم. ازهاره عديدة الالوان منها الابيض والاصفر والوردي والاحمر. ازهاره يدوم من اوائل تموز الى اواخر آب.

٦٤٦ - أخيليا عطيرة، قيسون

Achillea moschata (S). Achillée musquée, Gènepl, Gènepl musqué (F). Musk milfoil, Swiss genepi (E). Bisamgarbe, Genepi, Moschus-garbe (D). Erba livia, Millefoglia muschiato (I).

نبات بري طبي معمر عديد الفوائد الصحية. يوجد في الارض البور حيث تكثر نسبة الرمل || يعلو من ١٠ الى ٣٠ سم. ارومته مدادة، أوراقه مستطيلة مسنة، مرطاه النصل الاخضر الزاهي تملوه الجيوب العطرية العابقة. ازهاره وردية اللون. ازهاره يستمر من تموز الى آب.

٦٤٧ - أخيليا منعشة، قيصوم جبلي، بعيشتران

Achillea fragrantissima (S). Achillée suave, Garde-robe, Santoline, Aurone femelle (F). Lavender

٦٣٠ - آخور اطلب اسطبل.

Pernoptère (F).

Egyptian vulture (E).

الاخوق طائر من الكواسر مشهور باسم رخمة، اطلبها.

٦٣٢ - أخوي

Engraisser (F). To fatten (E).

أخوي المال من بقر وغنم وماعز وطير الخ... بلغ غاية السن.

٦٣٣ - أخوين

Cineraria, Senecio cineraria (S). Cinéaire, Cendriette (E). Cineraria, Sea-sid ragwort (E). Aschenpflanze, Aschenkraut (D). Ceneraria, Cineraria, Cenerina (I).

جنس نباتات من سبط الشرونيات وفصيلة المركبات. انواعه كثيرة العدد جميعها اعشاب او جنبيات صغيرة. منبتها افريقية الجنوبية. سوقها زغبية اللحاء رمادية. أوراقها متقابلة، حاضنة، نصلها خلي البشرة الفضية. ازهارها نورية التجميع، تاجية الارتكاز، صفراء اللون، يجمعها زناد دقيق طويل || اشهر ضروبه التزيينية تلك التي نتجت عن التهجين. يوجد منها الآن في البستنة الزهرية عدة ضروب مختلفة الاحجام والالوان تزدهر في جميع المناطق المعتدلة الحرارة.

٦٣٤ - أخيدناز

Echidnase (F). Echidnase (E).

مادة جمالية مؤذية توجد في سموم الافاعي.

٦٣٥ - أخيرانتوس

Achyranthes (S). Achyranthe, Cadelari, Irésine (F). Chaff flower (E). Spreblume (D). Sciamito, Sciamitro (I).

نبات طبي عشبي من سبط الفطيفيات وفصيلة السرمقيات. ساقه فرعاء منتصبه تملو نحو ٥٠ سم. أوراقه معنقة، متقابلة، بيضية الشكل، منسجة النصل. ازهاره سنبلية، هامية، وردية اللون.

٦٣٦ - أخيرانتوس شرقي، محوط، نعيم

Achyranthes aspera (S). Achyranthe aspère, Herbe d'Inde (F). Rough chaff tree (E). Sciamitro (I).

هو نوع من الاخيرانتوس يتصف بذات التحلية العلمية الا انه اكبر قدماً وأوراقه أكثر زغباً وأعم لوناً. يكثر في اقليم البحر المتوسط.

٦٣٧ - أخيفير

هو الدراج النافط، اطلبه.

٦٣٨ - أخيل

نوع من الشقراق، اطلب شقراق.

٦٣٩ - أخيلابين

Achilléine (F).

غلوكوزيد مر المذاق يستخرج من الاخيليا ام الف ورقة.

٦٤٠ - أخيليا

Achillea (S). Achillée (F). Milfoil (E). جنس نباتات عطرية عشبية معمرة من سبط الشعاعيات وفصيلة المركبات || انواعه كثيرة معظمها بري ينبت في مختلف المناطق والاصقاع ومنها تزيينية تزرع لزهرها وعطرها الفواح || اشهر انواعه ما يتبع.

٦٤١ - أخيليا أغيراطن

Achillea ageratum, Achillea viscosa (S). Achillée agératoire, Eupatoire de Mésué (F). Sweet maudlin, Milfoil (E).

Balsamgarbe, Gewürzgarbe (D). Achillea viscosa, Eupatoria di Mesué, Erba zolfina (I).

de plantain (F). Purple viper's bugloss (E). Wege-
richnatterkopf (D). Viperina (I).

نوع من الاخيون وهو من النباتات المحولة . ساقه وحيدة
تعلو من ٢٠ الى ٦٠ سم . اوراقه رحيمة ، لسنة تشبه اذان
الثور . ازهاره ليلية او بنفسجية اللون ، يبلغ طولها نحو
٣ سم . ازهاره يدوم من ايار الى تموز || يوجد في
الاراضي الرطبة .

٦٥٥- أَخِيُون تَحْرِي* ، أَلْكَحَالِي

Echium rubrum (S). Vipérine rouge (F). Red
flowered viper's bugloss (E). Natterkopf (D).
Viperina color di rosa (I).

نوع من الاخيون العشبي الحولي ، ساقه وحيدة تعلو نحو
المتر . اوراقه ضيقة مستطيلة حاضنة . ازهاره حر خمرية .
ازهاره سنبل يدوم من حزيران الى تموز || يتكاثر
بالبر . يوجد في اكثر الاودية المتوسطة الاندماج والرطوبة .

٦٥٦- أَخِيُون معروف* ، حشيشة الافعى ، إقريطشية

Echium vulgare (S). Vipérine commune, Herbe
aux vipères (F). Snake flower, Blue weed, Viper's
bugloss (E). Gemeiner natterkopf (D). Echio, Erba
delle vipere, Viperina (I).

نوع من الاخيون المحول . تعلو من ٣٠ الى ٨٠ سم . ازهاره
جميلة القالب زرقاء اللون . ازهاره سنبل التجميع يدوم
من ايار الى تموز || يزرع للتزيين . يوجد في جميع
الآودية ولا يخشى الرطوبة .

- وهناك انواع اخرى من الاخيون نكتني بسرد اسماء
اعرفها وهي :

٦٥٧- أَخِيُون إكربتِي

E. Creticum (S).
Vipérine de Crète (F).

نبات بري حولي . ساقه متشعبة حزمية . ازهاره بنفسجية

٦٥٨- أَخِيُون إيطالي

E. Italicum (S).
Vipérine d'Italie (F).

نبات بري محول . ازهاره سنبل متشعب . ازهاره وردية .

٦٥٩- أَخِيُون بسيط

E. simplex (S).
Vipérine simple (F).

نبات بري محول . ساقه زباء . ازهاره بنفسجية او بيضاء اللون .

٦٦٠- أَخِيُون جبَّار

E. giganteum (S).
Vipérine géante (F).

نبات بري محول تعلو من مترين الى ثلاثة . ازهاره بيض .

٦٦١- أَخِيُون حريري

E. sericeum (S).
Vipérine soyeuse (F).

نبات بري محول . ساقه ليفية تعلو نحو المتر . ازهاره ليلية .

٦٦٣- أداة

Engin (F). Engine (E).

لفظة شاملة تستعمل للدلالة على مختلف الادوات والاجهزة
فتقول مثلاً أداة زراعية وأداة صيد وأداة رصد .

٦٦٤- أَدَاج

Odag
حاشور زراعي يرتكز على مادة الرتينون . يستعمل
تغذية على النبات بمعدل ٢ كيلو للواحد في مكافحة
الحشرات .

cotton (E). Cypressengarbe (D). Guarda roba,
Abrotano femina, Santolina (I).

نبات بري طبي معمر زكي الرائحة لفواحة . يوجد في
الارض البور ويرغب في الآتربة الكنسية || تعلو من
١٥ الى ٤٠ سم . اوراقه مفروضة ، مسننة ، زباء متصل ،
كثيفة الجيوب المطرية . ازهاره صفر . ازهاره يدوم من
ايار الى تموز .

٦٤٨- أَخِين ، فقيرة

Achaine, Achène,
Akène (F). Achène, Akene (E).

ثمرة صغيرة جافة صلبة مفردة الخلية والحببة مصمتة لا
فتحة لها .

٦٤٩- أَخِينُوس*

Echinus (S).
Oursin (F). Sea-urchin (E).

جنس حيوانات بحرية صدفية كروية او صناعية الشكل ،
كثيرة الشوك . سماها بعض كتاب العرب قنفذ الماء
والقنفذ البحري في حين ان القنفذ البحري هو غير هذا .
انواعه عديدة مختلفة الحجم والشكل بعضها سام مميت وبعضها
مأكول نافع يستعمل في الطب لادرار البول || اشهر
انواعه المأكولة التوتيا والسفور .

٦٥٠- أَخِينُوفُور*

Echinophora (S).
Echinophore (F). Sea-parsnip (E). Stacheldolde (D).
Finocchio cervone (I).

جنس نباتات عشبية برية معمرة من الفصيلة الصيوانية .
انواعه قليلة منبتها حوض البحر المتوسط ، جميعها شائكة .
اوراقها صغيرة . ازهارها صفراء اللون .

٦٥١- إَخِيُور

Echiurus (S).
Echiure (F). Echiurus (E).

جنس دويبات بحرية من الجفريات المسلحة وفصيلة
الاخيوريات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض
مناطق البحر الابيض المتوسط والبحار المحيطة باروبة .
اجسامها صغيرة القد ، دودية الشكل ، عادية السكم ،
يملوها في مؤخراتها هلب دقيق مستطيل يستعمل للدفاع
وللوخز .

٦٥٢- إَخِيُورِيَّات

Echiuridae (S).
Echiuridés (F). Echiuridae (E).

فصيلة دويبات بحرية من الجفريات المسلحة . اجناسها
وانواعها المعروفة متوسطة العدد . اعطائها معظم بحار البلاد
المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، دقيقة ، مسلحة
اما بمحارج او بهلب دقيق || اشهر اجناسها الاخيور
والثلاثمة والبونيلية .

٦٥٣- أَخِيُون

Echium (S). Vipérine (F).

من اليوناني بمعنى الافعى . جنس نباتات طبية عشبية
وجنية من فصيلة الحمحميات . يقال انها مدرة للبول ،
تفتت الحصى وتنفع من المفاصل || جذورها حراء اللون .
اوراقها متعاقبة رحيمة منقطة ، عنقها قصير اسمر اللون .
سوقها واوراقها زغبية وزغبها دائم الثور || ازهارها سنبل
التجميع ، ابطي وهامي الارتكاز . بتلات زهرها عديدة
الالوان منها الازرق والليلكي والبنفسجي والاحمر والايض .
انواعها عديدة لا تقل عن الثلاثين . اشهرها الثلاثة الآتية .

٦٥٤- أَخِيُون آذان الثور*

Echium plantagineum (S). Vipérine à feuilles



أخينوس



أخينوفورا



أخينون آذان الثور



أخينون خري



أخينون معروف

٦٦٥ - إدّاد هو نبات الاشقيص . اطلبه .

٦٦٦ - إدّارة Gestion (F). Management (E).

هي تدبير ذمة مالية او اموال معينة يقوم بها صاحبها او من انتدب للمهمة .

٦٦٧ - إدّاسة Dépiqueage (F).

Threshing or treading out (E).

احدى طرق الدراس اي فصل الحب عن السنابل . تم عادة بواسطة الثورج .

٦٦٨ - إدّام ، أدّم ، تابيل Condiment

هو ما استعمل لتبيل الاطعمة كالملح وغيره .

٦٦٩ - إدّباس ، ثنّط Levée des semis (F).

هو اول ظهور النبات على سطح التربة . Seedling (E).

٦٧٠ - إدّبال ، تدّبيل Humification

نقل وبسط الدبال على المساكب بعد تحضيرها او على كامل التربة ان كان من لزوم .

٦٧١ - أدّبج ، عانيس Anthropoïdes (S).

Anthropoïde (F). Anthropoïdes (E).

جنس طير من طوائ الساق وفصيلة الكركيات . انواعه المعروفة اربعة ، جميعها من القواطع . تألف السهول والقيافي والمناقع . قوتها الحشرات والجراد والديدان والضفادع والعطاء والافاعي والبزور والحبوب والثمار || اجسامها كبيرة القدر متاقيدها مخززية الشكل . رؤوسها مزينة بكششتين جانبيتين . الريش الناعم المستطيل . اجنحتها كبيرة ، رافلة ، تلحق اذنانها الصغيرة المخروطية الشكل . اعرف انواعه واشهرها أدّبج نميدة .

٦٧٢ - أدّبج نميدة * ، عانيس نميدة *

Anthropoïdes virgo (S). Anthropoïde demoiselle, Demoiselle de Numidie (F).

طائر من الادبج . اعطانه فسيحة الارعاء تشمل معظم مناطق البلاد الاسيوية والافريقية . وهو من القواطع التي تجوب مناطق الشرق الاوسط في رحلتها الصيفية والشتوية || يألف السهول والمناقع . قوته الحشرات والجراد والوزغ والعطاء والافاعي والبزور والحبوب || جسمه كبير القد . طوله نحو ١٠٠ سم . ثوبه الى الرعدة الزرقاء المواج . محسراه ومقدم عنقه الى السواد اللامع . قوادمه الى السواد العابق . كششتا رأسه الى البياض الناصع . حدقة عينه حرام اللون . منقاده اسود يعلوه مواج اخضر يصفر عند الملقط . ساقاه الى السمرة السوداء || يدشن في الفيافي . عشه كومة من العيدان الدقيقة تعلوها فرشاة مقعرة من القش والحشيش الناعم . الانثى تضع من بيضتين الى ثلاث بيضات تحضنها بمنابرة الذكر نحو اربعة اسابيع || يألف حياة الاسر ويدجن بسهولة ويستعمل كحارس في مزارع الدجاج والبط والحيش والفرغر .

٦٧٣ - أدّبس * Ourebia (S).

Ourébi, Scopophore (F). Ourebia (E).

جنس حيوانات لبونة مجترة من الايليات . انواعه المعروفة خمسة موطنها يمتد من الصومال الى الحبشة وكنية والكونغو والسنغال والترمغال ... تألف التهام والهضاب والجبال

والانجاد . ملجئها الحياتي جماعي . آجالها تعد من ٥ الى ٩ انفار تقودها ذكور مائة . قوتها الاعشاب وبعض اوراق الاشجار || اجسامها صغيرة . شوزنها يماثل شوزن الاروس . اطوالها تراوح من ٩٥ الى ١٢٠ سم . بما فيه الاذنان التي تطول من ٩ الى ١٢ سم . ارتفاعها يراوح من ٦٠ الى ٦٤ سم . قرون ذكورها تطول من ١٠ الى ١٣ سم . وهي مخروطية الشكل ، حيدية الزام الاول ثم ملساء حتى الاطراف المنحرفة قليلاً نحو الامام . عيونها كبيرة مطوقة بالاسود . اذانها كبيرة كاسية مدببة الاطراف السود . دواربها شديدة النشاط . اظلافها الامامية محرمة الاطراف . اثوابها متباينة الالوان تسود فيها الدبسة || اناثها بجاء الرؤوس ، رباعية الاخلاف ، فردية التناج . ترضع يعافيرها نحو اربعة اشهر . انواعه الخمسة تتبع .

٦٧٤ - أدّبس أسود الذكّب °

Ourebia nigricauda (S).

Ourébi à queue noire (F).

نوع من الاديس . موطنه يمتد من جنوب الصحراء الكبرى الى السنغال . جسمه يطول نحو ١٠٠ سم . ذنبه ١٠ سم . ارتفاعه ٦٢ سم . ثوبه الى الدبسة الشقراء المواج يعبق في الرأس والظهر والفخذين ويشقر ويبيض في البطن والحوافي . ذنبه اسود اللون وينتهي بضمة حالكة السواد .

٦٧٥ - أدّبس جبلي ° Ourebia montana (S).

Ourébi montagnard (F).

نوع من الاديس . موطنه نجاد وجبال الحبشة . جسمه يطول نحو ١٢٠ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ ١٢ سم . ارتفاعه ٦٤ سم . ثوبه الى الدبسة يعلوها مواج اسود في الرأس والظهر ، يتحول الى صنائي في الايطلين والفخذين . بطنه وخوافيه الى البياض العاجي . ذنبه جزوي الضمة الصغيرة .

٦٧٦ - أدّبس ذو مكائيس °

Ourebia scoparia (S). Ourébi à balais (F).

نوع من الاديس . موطنه يمتد من جنوب الصحراء الكبرى الى الترنسفال . جسمه يطول نحو ١٠٥ سم . ذنبه ١١ سم . ارتفاعه ٦٣ سم . ثوبه الى الصحمة الصنابية المواج بطنه وخوافيه الى البياض العاجي . ركبته الاماميتان مجللتان بكششتين من الوبر الجليل مما دعى الى نعته بذي المكائيس .

٦٧٧ - أدّبس رُمحري ° Ourebia hastata (S).

Ourébi hasté (F).

نوع من الاديس . موطنه يمتد من كينيا الى اوغندا وروديزية . جسمه يطول نحو ٩٥ سم . ذنبه ٩ سم . ارتفاعه ٦٠ سم . ثوبه الى الدبسة تشد سمرته في الرأس والظهر والفخذين وتنحرف الى البياض التبي في البطن والحوافي . ذنبه صغير الضمة المخروطية الشكل ، اتم الصفحة الخارجية ابيض الداخلية ، يشبه الرمح مما دعى الى نعته بالرمحي .

٦٧٨ - أدّبس هَجّار ° Ourebia Haggardi (S).

Ourébi de Haggard (F).

نوع من الاديس . موطنه تهام وجبال الصومال في مقلها البحري . جسمه يطول نحو ١٠٥ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ ٩ سم . ارتفاعه نحو ٦٠ سم . ثوبه الى الدبسة السمره تشد سمرتها في الرأس والظهر وتنحرف في الايطلين . بطنه الى الصفار التبي . ذنبه يرمعي الضمة الشديدة السمرة .



ادبج نميدة



أدّبس

٦٩١ - أدزَع Cap-de-maure (F).
نعت وصفي يطلق على الفرس الذي رأسه اسود دون سائر جسمه.

٦٩٢ - أدزَع * Dama (S). Dalm vulgaire,
Cerf mégacère, Platycerque (F). Deer,
Fallow-deer, Buck (E).

طبي اغبر اللون أبقع ، احمر العنق والصدر ، امفر الرأس ،
عيناه مظلوتان بإطار اسود . قوائمه اصفر وأنخل من قوائم
الاييل وكذلك عنقه واذناه وذنبه . ومنه سلالات ثوبها الى
السمره وغيرها الى الحسبة . علوه يراوح من ٩٠ الى ١٠٠
سم . وطوله من ١٤٥ الى ١٥٥ سم . || موطنه بلاد حوض
البحر المتوسط ، يرغب في الاراضي الحرجية وفي الهضاب
المتوسطة الارتفاع .

٦٩٣ - إدرياس هو الدرياس نبات بري طبي .

٦٩٤ - أدسَم Boucher à l'émeri (F).
To cork, To shut up (E).

استعمل الدسام في سد الاناء والقارورة وما اشبه .

٦٩٥ - أدعَل Apneume (F). Apneumous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل حيوان لا رئة له كبعض
الصفدييات .

٦٩٦ - أدغَال الصيد Couverts (F). Covereds (E).
الغابات والاحراج وغيرها التي اقتطعت للصيد .

٦٩٧ - أدقَى الادق من البقر والغنم والماعز من كانت
قرونها مستطيلة ومنعقدة نحو الارض .

٦٩٨ - إدل Lait caillé (F). Curdled milk (E).
هو الحليب الرائب المعروف باللبن . وله اسماء كثيرة
منها الصرب والخائر .

٦٩٩ - إدلاف Ionisation (F). Ionization (E).
الادلاف انتاج الايونات . راجع ايون .

٧٠٠ - أدلَم Adlumia cirrhosa, A. fungosa (S).
Adlumie fongueux, Fumeterre fongueuse (F). Clim-
bing fumitory, C. colicweed, Mountain fringe (E).
Klimmender erdrauch (D). Fumaria fungosa (I).
نبات محمول طبي وحيد الجنس والنوع من فصيلة الحشخاشيات
ساقه عارشة تطول نحو ٥ امتار . اوراقه مركبة ريشية ،
نفصلها بحيل الخضار . ازهاره بحيلة الشكل وردية اللون .
يزرع للتزيين يتكاثر بالبزور والعقل .

٧٠١ - أدلية Adelia (S).
Adélie (F). Adelia (E).

الاسم العلمي من اليوناني بمعنى « وضعي القدر » جنس
شجيرات برية وزراعية تزيينية معمرة من فصيلة الزيتونيات .
مهداها بعض مناطق امريكا الشمالية . سوقها فرعاء تملأ
من متر الى ثلاثة امتار . اوراقها عابلة ، متقابلة بسيطة .
ازهارها ثنائية المسكن ، الذكورية منها رباعية النصل
والاسدية ، الانثوية وحيدة المتك . ازهارها ضمي التجميع ،
محوري الارتكاز .
انواعها المعروفة قليلة العدد أشهرها التالية .

٦٧٩ - أدبو ، نين مدغسسكر Ficus sakalavarum (S).
Adabo, Figuier de Madagascar (F).

شجرة مشرة من التوتيات . مهدا مدغسسكر . ضرورها
المشهورة سبعة جميعها اشجار كبيرة الحجم ، ضخمة الساق ،
منبسطة الاغصان . ثمارها مختلفة الاشكال والاحجام
يغلب فيها الشكل التيني واللون الاصفر والاحمر . طعمها
حلو المذاق حامز اللدغة || ثمارها مأكولة ويستخرج
منها بالتخمير والتقطير كحول لا بأس بها . ومنهم من
استعملها كعلف للخيل والبقر التي تأكلها بشهية .

٦٨٠ - أدقة Scinque (F). Skink (E).
هو السقنقور والاسقنقور ينشط الباء والانعاظ . كانوا
يعتقدون في الماضي انه يشي من داء الفيل والجذام .

٦٨١ - أدجن ، دجن Domestiquer (F).
To domesticate To tame (E).
جعل الحيوان الوحشي حيواناً أليفاً داجناً

٦٨٢ - أدجي Oudji
نوع من الذباب الصغير الذي يؤذي دود القز في بلدان
الشرق الاقصى كاليابان والصين .

٦٨٣ - أدحوة مبيض النعام في الرمل . ومدحى النعام : موضع بيضها .

٦٨٤ - أدحى النعام Azha
ادحى النعام خمسة انجم في المنعطف الرابع من كوكبة
النهر المعروفة ايضاً بكوكبة اريدانوس .

٦٨٥ - إدخار ، توفير Epargne (F). Saving (E).
نظام تتبعه مصارف خاصة قوامه حل الناس على الاقتصاد
وتشجيعهم على توفير .

٦٨٦ - إدخال ، غرز Implantation (F).
Implantation, Grafting (E).
هو وضع الفرزة في المحل المناسب من النسيج الخلوي تحت
الجلد .

٦٨٧ - إدخالية Interventionnisme (F).
Interventionism (E).
مذهب سياسي يفرض تدخل الدولة بشؤون الرعية او تدخل
الدولة بشؤون دولة اخرى .

٦٨٨ - إدراج ، نشر Insertion
الادراج هو اقحام صيغة او شرط خاص في تعاقب محرر
كادراج شرط الفسخ في عقد اجارة || اما النشر فهو
الاعلان او الاذاعة بواسطة الصحف عملاً بما يفرضه القانون
كاعلان بيع الممتلكات بالمزاد او نشر حكم الافلاس الخ .

٦٨٩ - إدراك Début maturité, Pré maturité (F).
Prematurity (E).
بلوغ الشرة كماها الصنفي ويكون ذلك عند ابتداء النضج .

٦٩٠ - أدرة ، قبيلة Hydrocèle (F).
Hydrocele (E).
هو انتفاخ يحصل من تجمع المصل في الحبل المنوي .



أدجي



أدرع



أدلم




أدلية باسمية الورق



إدليس



آدم ، غزال الصحراء



إدميرة نيلة



أدهاتودة

متراصفة متساكة يكسوها غلاف خارجي دقيق يدعى بشرة .

Adsorption

٧٠٩ - إدمصااص

هو التبلل والتشرب .

Epidermique (F).

٧١٠ - أدمي

Epidermic, Epidermal (E).

٧١١ - إدميرة نبيلة * (S). Oedemera nobilis

Oedémère noble (F). Oedemera nobilis (E).

حشرة واسعة دامتة من فصيلة الإدميريات ورتبة مقدمات الاجنحة . تألف المروج والمراعي . والادغال . خنافسها تعيش على الازهار . يرقاتها دامتة قوتها المواد النباتية المنحلة والسائرة نحو الانحلال || جسمها صغير القد يطول من ٨ الى ١٠ مم . ثوبها الى الخضار الالمن . رأسها كبير الجرم . فكاهها نسيطان . زباناها خيطيان . عيناها بارزتان . ظهرانها فارق النمدن . روشاها الى الصفار الاخضر الوردى الموج || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملة في نيسان وتعيش حتى اواخر تموز . تسرح في النهار . تسافد في حزيران . اناتها تهريق المكن بين قشور الاشجار اليابسة وتحت اللحاء وفي الجفالة والعلل || البرقة ، عند تمام نموها ، تطول نحو ١٦ مم . جسمها وردني الشكل ، سداسي الرواجب ، ضليع التأشير الفكية ، حنطي اللون ، اصفر الموج ، جؤوي الرأس والشرح ، اسمر الرواجب || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٢٥ يوما ينقضي في الجفالة او تحت اللحاء .

٧١٢ - إدميريات * (S). Oedemeridae

Oedémérédés (F). Oedemeridae (E).

فصيلة حشرات واسعة دامتة من رتبة غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة معظمها من حشرات البلاد المعتدلة الحرارة . تألف ازهار النباتات الدغلية والجنينية . مسرحها لاقياسي الزمن ، منها الضوئي والدغوشي والدجوي || اجسامها صغيرة القد او متوسطة . جميعها مستطيلة الشكل ، مستعرضة الرؤوس ، ناشرة الاخطام ، غيظية الزباني المركبة من ٩ الى ١٢ فصلة . كواسلها واغمادها وجرامزها متباينة الاشكال . ارساغها الخلفية رباعية العقل ، ارساغها الوسطى والامامية خماسية || يرقاتها دامتة تعيش حيث تنقف ، على الاخشاب السائرة نحو الانحلال || اشهر اجناسها الادميرة والانكوميعة .

٧١٣ - أدنسُون ، أدنسي (S). Adansonía

هو البوباب اي الحبب . جنس نبات افريقي المنبت معقود التعريف العلمي على اسم الباحث المواليدي ميشال ادنسون .

٧١٤ - أدهاتودة * (S). Adhatoda vasica

Carmantine, Justice, Noyer de Malabar (F). Malabar nut tree (E). Malabarische nuss, Malabarnuss (D). Noce del Malabar, Justicia (I).

جنية طيبة من فصيلة الاقنشيات . منبتها الاصقاع الحارة . ساقها اسطوانية فرعاء . اوراقها معنقة اهليلجية متقابلة . ازهارها زنبقية الشكل ، أبطية وهامية الارتكاز || اوراقها تفيد الامراض الجلدية واخصها الحصف . نقيع اوراقها يفيد الرجفة والتشنج . جذورها مقيئة || تستعمل للتزيين لكنها تخشى المواقع المعرضة للرياح والبرد .

٧١٥ - أذهان طيارة ، زبوت طيارة

Huiles volatiles (F). Volatiles oils (E).

٧٠٢ - أدلية مذبذبة الورق *

Adelia acuminata (S).

Adélie à feuilles acuminées (F).

نوع من الادلية ، جنية سبروتية تزيينية . ساقها فرعاء تغلو من متر الى ثلاثة امتار . افنادها شائكة . اوراقها ضيقة القواعد والاطراف ، تطول نحو ٨ سم . وتعرض نحو ٣ سم . نصالها ملسة ، جميلة الخضار الالمن . ازهارها الى الصفار الكبيرتي || تنويرها يستمر من آذار الى نيسان .

٧٠٣ - أدلية ياسمينية الورق *

Adelia ligustrina (S).

Adélie à feuilles de troène (F).

نوع من الادلية التزيينية السبروتية . ساقها فرعاء تغلو من ١٥٠ الى ٣٠٠ سم . افنادها مزغبة اللحاء ، حمراء اللون . اوراقها شبيهة باوراق الياسم . تطول نحو ٥ سم . وتعرض نحو ٣ سم . نصالها بحرية الخضار ، خلية البشرة على الصفحتين . ازهارها الى الصفار الباهت || تنويرها يستمر طوال فصل الربيع .

٧٠٤ - إدليس * (S). Acanthocinus aedilis

Aedile (F). Aedilis (E).

جنس حشرات من فصيلة القرنبيات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعه المعروفة قليلة العدد . اجسامها صغيرة القد تطول من ١٥ الى ١٨ مم . قرونها الاستشعارية تطول عند الذكور من ٧٥ الى ٨٥ مم . وتطول عند الاناث من ٣٠ الى ٣٥ مم . اثوابها الى السمرة الطحلاء يعلوها تجذيع معرض جؤوي . كواسلها شبه كروية الشكل ، رباعية النقط الصفر . بطون اناتها تنتهي بقصيصات مرزية تستعمل في متع المكن داخل الخشب || مسرحها ناري . تظهر في اوائل الربيع وتبقى حتى اواخر الصيف . رتمها احراج الصنوبر || يرقاتها خاشبة تعيش تحت لحاء اشجار فصيلة الصنوبريات .

٧٠٥ - آدم * ، غزال الصحراء (S). Gazella dorcas

Gazelle dorcade (F).

نوع من الظباء من ذوات الاظلاف المحبوبة القرون . ضروره عديدة منشرة من تركيا حتى الجزيرة بما فيها ايران والعراق وسورية . ومن افريقية الشرقية حتى الشمالية . جسمه رشيق القوام ، منسوب التكوين ، جميل الخلقة . طوله من ١١٥ الى ١٥٠ سم . ارتفاعه نحو ٦٥ سم . ثوبه الى الصهبة الغبراء ، ظهره يميل الى السمرة ، بطنه الى البياض ، عنقه طويلة ، قرناه اسودان احيدان ، قوائمه نحيلة || يالغ الصحاري الرملية حيث يكثر السنت التتوفي .

٧٠٦ - إدماج

هو العمل الطبيعي اي الفيزيائي الذي يحصل عند ولوج جسم في آخر .

٧٠٧ - أدمان (F). Khamedj du dattier

هو خنج النخيل ، وصم يصيب قلب النخلة وكافورها . اطلب خنج النخيل .

٧٠٨ - أدمة (F). Epiderme (F). Epidermis (E).

هي في الحيوان غشاء خارجي رقيق يحيط بالجلد . وهي في النبات الجزء الخارجي منه . تألف من مجموعة خلايا

bâtard (F). False hellebore, Ox-eye (E). Früh-
lengsadonisblume, Falsche meswurz, Adonisroschen
(D). Elleboro bastardo (I).

نبات عشبي بري وزراعي معمر. ازهاره صفراء اللون
كبيرة تنور في آذار ونيسان .

٧٢٧- أدونيس صغير* ، زخليل ، دم النعسان
Adonis microcarpa (S). Adonide, (F). Adonis (E).
Adonis (D). Adonide (I).

نبات عشبي بري حولي . ازهاره صغيرة حمراء اللون . منه
ضروب زراعية تزيينية تبذر في أوائل الربيع فتتور في
الصيف .

٧٢٨- أدونيس صيفي ، عين الحجل ، عين التدرج
Adonis aestivalis (S). Adonide estivale, Adonide
d'été, Œil de perdrix (F). Summer adonis, Tall
adonis (E). Sommeradonisblume (D). Adonide
d'estate, Occhio del diavolo, O. di fagiano (I).

نبات عشبي حولي يكثر في الحقول البور والمزرعة . منه
ضروب زراعية تزيينية تزرع في الحدائق ، ازهارها حميلة
حمراء اللون . تنور في الربيع وفي الصيف .

٧٢٩- أدونيس حلبي
Adonis aleppica (S).
يكثر في منطقة حلب وضواحيها .

٧٣٠- أدونيس طويل المنقار
Adonis longirostra (S).
يوجد في منطقة بعلبك .

٧٣١- أدونيس فلسطيني
Adonis palestina (S).
يوجد في فلسطين والاردن .

٧٣٢- أدونيس لهبيبي
Adonis flammea (S).
يوجد في مرجعيون وفي شمالي سورية .

٧٣٣- أدونيس مسنّن
Adonis dentata (S).
يوجد في رمل السواحل من صور حتى غزة وفي باديه التيه
وقرب الاسكندرية وفي منطقة تدمر .

٧٣٤- أدونيس وبّري الكأس
Adonis eriocalycina (S).
يوجد في ضواحي بيروت .

٧٣٥- أدوية
Traitements (F). Treatments (E).
هي مجمل العلاجات المستعملة في تطبيب الحيوان وإسائه.
النبات شافية كانت ام واقية او قاضية على الحشرات
والامراض الفطرية والطفيليات . اطلب علاجات .

٧٣٦- أدوية زراعية
Traitements
anelparasitaires (F). Parasiticide treatments (E).

الادوية الزراعية كثيرة العدد وازدياد عددها يسير باطراد
مستمر غير ان هذا لا يحول دون ترتيبها ولا يغير شيئاً من
اقسامها الرئيسية الخمسة وهي :

(١) قسم الحواشير وهو يشمل جميع الادوية المستعملة ضد
الحشرات من اي نوع كانت وفي اي موقع كان .

(٢) قسم المواكين وهو يشمل جميع الادوية المستعملة
للقضاء على مكن الحشرات

(٣) قسم الفواطير وهو يشمل جميع الادوية المستعملة
ضد الفطور والامراض الفطرية من اي نوع كانت

٧١٦- أدھان عطريّة ، زيت عطريّة

Huiles aromatiques (F). Aromatic oils (E).

٧١٧- أدھم
Noir (F). Black (E).
من اثواب الخيل هو الاسود وقد يكون ايضاً :

٧١٨- أدھم غيھب
Noir de jais (F).
هو الاسود الذي يلمع من فرط سواده
Jet-black (E).

٧١٩- أدھم شاحب
Noir mat (F). Mat-black (E).
هو الاسود الذي لا يلمع .

٧٢٠- أدوات ، آلات
Outillage (F). Stock of tools (E).

٧٢١- أدوكسا
أدوكسا هي عشبة المسك ، نبات طبي من الفويات .

٧٢٢- أدوكسيات
Adoxaceae (S).
Adoxacées (F). Adoxaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وحيدات القملات اجناسها
وانواعها قليلة العدد ، موطنها معظم اقاليم البلاد المعتدلة
الحرارة || جميع انواعها جذورية تفرخ وتنو في الربيع .
جذورها واوراقها وازهارها فواحة العرف المسكي العطر ||
اشهر انواعها عشبة المسك .

٧٢٣- أدوميس* ، عفاصة العنب

Polychrosis botrana (S). Tordeuse de la grappe,
Eudémis de la vigne (F). Vine moth, Grapeberry
moth (E). Bunter Traubenwickler, Bokreuzter
Wickler (D).

حشرة من الفاتلات ورتبة حرشفيات الاجنحة . طولها نحو
١٠ مم . موطنها من ١٢ الى ١٤ مم . روشناها الاماميان
الى الرمادي يعلوها تدبج بني او حنطي || تسرح من
الشفق الى الليل . اجيالها الحولية ثلاثة . انثاها تمتح
مكنها في اسفل زمرعات الكرمة واقربها من التربة فينتف
عن يرقات دقيقة لونها الى الخضرة تلثم الاوراق وتفتلها
وتنخر الحب وتمنطقه بنواصها الحريري العنكبوتي .
تكافح عند ظهورها باستعمال احد الحواشير الفعالة .

٧٢٤- أدونيس

جنس نباتات عشبية حولية ومعمرة من فصيلة الخوذانيات
سوقها اسطوانية فرعاء ، تعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم . اوراقها
مزراقية متعاقبة ، ازهارها تشبه زهر الشقار وهي فردية
التجميع طويلة الزناد خماسية البتلات . ثمارها تشبه ثمار
الخوذان || انواعه عديدة منها ما يزرع لزهرة ومنها بري
تنبت الطبيعية في اماكن مختلفة || المعمر يتكاثر بالعقل
والاخلاف . اما الحولي فيالبذر . ان بذري الخريف نور في
الربيع وان بذري آذار نور في تموز . اشهر انواعه مايتبع .

٧٢٥- أدونيس خريفي* ، حنّون البزاز ، ناب
الجممل ، نقطة دم
Adonis autumnalis (S).

Adonide automnale, Goutte de sang (F). Pheasant's
eye, Autumn adonis (E). Herbstadonisblume,
Gartenadonis (D). Adonide d'automne, Occhio di
cimice, Goccia di sangue (I).

نبات عشبي بري حولي . ازهاره الى الحمرة القانية . منه
ضروب زراعية تزيينية تزهر في الخريف .

٧٢٦- أدونيس ربيعي ، عين البز ، عين الثور
Adonis vernalis (S). Adonide printanière, Hellebore



أدوميس



أدونيس خريفي



أدونيس صغير

(٤) لسم العواشب وهو يشمل جميع الادوية المبيدة للاعشاب الضارة ان في الاراضي المزروعة أو المستحالة .

(٥) قسم الديدانيات وهو يشمل جميع انواع الطعوم والسموم والمستحضرات المستعملة للقضاء على الفئريات الضارة كالغربان والجردان والمنساجذ وفتران الزرع والذئبات والمرائب الخ.

٧٣٧ - أديم ، أدمة Surface de la terre (F).
الاديم والادمة : وجه الارض (E). Surface of the earth (E).

٧٣٨ - أذاب ، أمساح Dissoudre (F).
To dissolve (E).

٧٣٩ - اذار Mars (F). March (E).
يعرف ايضاً بمارس . الشهر الثالث من السنة الشمسية وهو من شهور الشتاء والربيع . مدته واحد وثلاثون يوماً . في الرابع منه آخر ايام العجوز وفي الحادي والعشرين يعتدل الليل والنهار وهو اول فصل الربيع .

تقويمه الزراعي - اعماله الزراعية عديدة ومختلفة اخصها :
(١) في الزراعات العامة : يصار الى بذر الذرة الصفراء والفصة وفستق العبيد وعباد الشمس الخ ... والى زرع البطاطا في المناطق الداخلية وذلك بعد تحضير التربة بحراثة جيدة وبعد ذر الاسمدة الكيماوية المركبة اللازمة . والى متابعة استعمال العواشب للقضاء على الاعشاب الضارة في جميع الزراعات الحقلية واخصها الحنطة التي تبدأ بالاسهال في اواخر العقد الثالث . والاعتناء بمشاتل التبغ من تعشيب وترييب وسقاية وتغذية . ويصار ايضاً الى حرث الباقية والترمس وغيرها من النباتات المزروعة للتسميد الخضري . والى توزيع الاسمدة الكيماوية المركبة على الحواكير المعدة لزراعة التبغ والتبناك

(٢) في الاشجار المثمرة : كشط قشور الاشجار وتنظيفها . متابعة غرس النصبوب في المناطق الجبلية العالية ومتابعة التطعيم . المباشرة بالمكافحة الوقائية ضد الامراض الفطرية والحشرات التي تصيب وتركب هذه الاشجار مع بدء اوراقها وانقصاد ازهارها . ويصار الى غرس الموز بعد تحضير التربة وتسميدها بالاسمدة العضوية والكيماوية المركبة

(٣) في الحمضيات : متابعة وانجاز جميع الاعمال التي بوشرت في شباط مع التشذيب والتقليم وذر الاسمدة الكيماوية المركبة الكاملة

(٤) في البقول : متابعة زرع البقول والخضار الصيفية بما فيها الباذنجان والبندورة والخيار والكوسى والباية والكرفس والرشاد والبقودونس الخ ... ومتابعة العناية بما قام منها
(٥) في الزهور : متابعة زرع الزهور والعناية بها بعد نقلها من المشاتل الى المراكز او الى امكنتها الثابتة
(٦) في النحل : اعداد وتحضير القفران والخلايا المهجورة والمستحدثة وتثبيتها لاقبال الاثوال الجديدة .

٧٤٠ - آذان الارنب اطلب لسان الكلب .

٧٤١ - آذان البحر ، حلتزونييات البحر

Haliotidae (S). Haliotidés (F). Haliotidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل امايات الحياشيم . خياشيمها في تجاويف طيلسانية تنفتح من الامام || اجناسها وانواعها المعروفة عديدة ، تعيش لاصقة بالصخور البحرية . معظم انواعها يحمل اصداًفاً

لؤلؤية الصفحات الداخلية .
احرف اجناسها واشهرها آذن البحر .

٧٤٢ - آذان الجدي اطلب لسان الحمل .

٧٤٣ - آذان الحمار * Knautia arvensis (S).
Knautie, Scabieuse des champs, Orelles d'âne (F).
Field scabious, Field knautia (E). Ackergindkraut, Feldscabiose (D). Orecchio d'asino (I).

نبات عشبي بري طري من فصيلة الدبسيات كانوا يستعملونه قديماً في معالجة الامراض الجلدية والزهرية ومنها السفلس .

٧٤٤ - آذان الدب اطلب بوصير .

٧٤٥ - آذان الدب الوحشي ، آذان الضبع هي الزعدة الأذينية ، اطلبها .

٧٤٦ - آذان العتر اطلب مزار الراعي المائي .

٧٤٧ - آذان الفأر ، ميوزوتيس Myosotis

جنس نباتات عشبية حولية محولة وبعمرة من فصيلة الحمحميات . انواعه عديدة منتشرة في جميع الاصقاع المعتدلة . سوقها عشبية زباء ومنها مخشوشة . اوراقها سنائية صغيرة لاطئة متعاقبة . ازهارها ابوية وقاجية الارتكاز . الابوية منفردة ، اما الناجية فمذكولة او عنقودية التجميع . يغلب فيها اللون الازرق ثم الابيض ثم الوردى || اشهر انواعه الثلاثة التالية .

٧٤٨ - آذان الفأر البري * Myosotis arvensis,
Myosotis stricta (S). Myosotis des champs, Orelles de souris (F). Field forget me not, Mouse ear (E). Feldmauseohr (D). Orecchio di sorcio (I).

نبات عشبي بري يكثر في الاماكن الرطبة . يقال انه من النباتات الطبية . يفيد في تفتيت الحصى ، ينفع من السموم ، يضاد الاسهال . عصارته شابة .

٧٤٩ - آذان الفأر الجبلي * Myosotis alpestris (S).
Myosotis des Alpes, Myosote (F). Forget me not, Rockscorpion grass (E). Alpenvergissmeinnicht (D). Myosotide, Orecchio di pipistrello (I).

نبات عشبي بري منبته الجبال الرفيعة . يقال انه طربي لكنه مهم المنافع . منه ضرور زراعية تزيينية تجود في حدائق البلاد الباردة .

٧٥٠ - آذان الفأر المنقي * Myosotis palustris (S). Myosotis palustre, Gremillet, Souvenez-vous de moi (F). Water forget me not (E). Echte vergissmeinnicht, Sumpfvergissmeinnicht (D). Talco celeste, Non ti scordar dime (I).

نبات عشبي بري وزراعي يكثر في المناقع وعلى ضفاف الانهر . ضروره الزراعية التزيينية عديدة جميعها جميلة الازهار الصغيرة النحيلة .

٧٥١ - آذان الفيل راجع ابو درقة .

٧٥٢ - آذان الكتبخ اطلب لسان الحمل السناني .

٧٥٣ - إذخير ، طيب العرب ، تين مكة

Andropogon schoenanthus (S). Citronnelle, Junc odorant, Schénanthe, Vétiver (F). Camel's hay, Scenanth (E). Cameleshov, Citronengras (D).



آذان الحمار



آذان الفأر البري



آذان الفأر الجبلي



آذان الفأر المنقي

مستنقعات البلاد المعتدلة الحرارة ، ساقه اسطوانية قصيرة .
اوراقه ملازمة معلاقية ، أحادية ، قليلة النصل العائق
الخضار . أزهاره تاجية مثلثة وطويلة الزناد . بتلاتها
خاسية . بيضية الشكل صفراء اللون تستعمل في تلوين الزبدة .

٧٦٠ - آذريون مخزني* ، آذريون الحدائق ، قرقنهان ، زبيدة ، جهنجان

Calendula officinalis (S). *Calendule officinale*, *Souci*
des jardins (F). *Pot marigold*, *Hen and chickens* (E).
Garteringelblume (D). *Calta dei giardini*, *Flor*
rancio, *Calendola* (I).

نوع من الاذريون وهو نبات عشبي بري طبي . منبته
حوض البحر المتوسط . اوراقه لاطئة متعاقبة . نصلها
رحي الشكل ، ازغب البشرة . أزهاره تاجية فردية مكتنزة
البتلات الصفرة || كان ولا يزال يستعمل في بعض
المستحضرات الطبية . وهو ينبت عادة في معظم الاراضي
المزدرة || اما الاذريون التزييني المعروف باسم «سوسي»
فهو هجين من الاذريون المخزني والقوقحاني ثبت استمرار
الاستنخاب والتأصيل بعد ان جملة اطول زناداً واكبر زهراً
واسرع نمواً || يتكاثر بالبذر ويجود في جميع الارربة الغنية .

٧٦١ - أذن

Oreille (F). *Ear* (E).
عضو من اعضاء الجسم مختص بالسمع . يختلف مظهرها
الخارجي بالنسبة الى الحيوان غير انها جميعها تحس الاصوات
وتدركها وتميز مصدرها || وهي تنقسم تبعاً لوظيفتها
وتركيبها ثلاثة اقسام :

- (١) الأذن الخارجية التي تتركب من الصيوان الاذني ومن
القناة السمعية المعروفة بالصباح
- (٢) الأذن الوسطى المعروفة بالتجويف الطبلي تعوي الطبلية
والطرقة والسندان والعظييات الهلالية السمعية
- (٣) الأذن الداخلية التي تتركب من التيه العظمي الذي
يحتوي الياف العصب السمعي || وللأذن وظيفة اخرى غير
السمع هي حفظ التوازن في الوقوف وفي جميع الحركات التي
يقوم بها الحيوان || والحيوان الفقري اذنان موجودتان على
جانبي الرأس . اما في الحشرات ، ومعظمها صماء . فتركزها
عند وجودها يختلف باختلاف الرتبة والفصيلة . اذن الجرادة
مثلاً وهما تجويفان كاملا العدد يرتكزان على جانبي الحلقة
البطنية الاولى . ومن الحشرات من قامت زباناها مقام الاذن .

٧٦٢ - أذن الأرنب اطلب حبلاب مخشوب .

٧٦٣ - أذن البحر* ، حلتزون بحري

Halotis (S). *Halotis*, *Haliotide*, *Oreilles de mer* (F).
Sea-ear, *Ear-shell* (E).

جنس حيوانات بحرية من المعديات الرخويات ذوات
الصدفتين . انواعه لا تقل عن ٧٥ بعضها مأكول . تعيش
لاصقة بالصخور البحرية . تصاد لاصداقها اللؤلؤية
المربوب فيها والكثيرة الاستعمال الصناعي .

٧٦٤ - أذن الحمار* ، أنوسما

Onosma echioides (S). *Onosma* (F). *Hairy onosma* (E). *Sandlotwurz* (D).
Borrana salyatica, *Onosma* (I).

نبات عشبي بري معمر من سبط الانشوصيات وفصيلة
الحمحميات . منبته الجرد العالية . اوراقه سنانية زغبية
لاطئة . أزهاره قنابية صفراء اللون ، عنقودية التجميع .
ينبت عادة في الاماكن الجافة . رائحته كريهة فواحة .

Spigo digitato, *Fieno di camello*, *Giurco odorato* (I).
نبات عشبي حولي من فصيلة النجيليات يكثر في المناطق
الحارة || اوراقه عطرة ليمونية الرائحة وأزهاره كذلك .
يستعمل استعمال الشاي وفي بعض المستحضرات الطبية .
الهند يسمونه سنبل الطيب ويحضرون اوراقه فتحدث تنبيهاً
شديداً . يستخرج منه بالتقطير زيت عطري جيد الفائدة
وكثير الاستعمال في صناعة الروائح العطرية || يقال ان
سوقه مدرة للبول وعلى كل فهو من النباتات العلفية التي ترغب فيها
الماشية || ومن قائل انه كان معروفاً في زمن الفراعنة وكانوا
يستعملونه في الاطياب وان اسمه الهير وغلبي «دحرت» .

٧٥٤ - إذخير مكّي* ، سنبل هندي ، طيب مأموني ، حلفاء مكة

Andropogon nardus (S). *Nard indien*, *Spicanard* (F).
Spikenard, *Ginger grass* (E). *Indianscher nardus*,
Spikenard (D). *Spigo nardo*, *Nardo indiano*, *Nardo*
siriaco, *Gramigna cedrata vera* (I).

نبات عشبي حولي من فصيلة النجيليات . منبته المناطق
الحارة . يكثر في الهند . رائحته عطرة . يستعمل في بعض
المستحضرات الطبية ولوقاية الثياب الصوفية من عبث العث .

٧٥٥ - أذرع

Vêler (F). *To calve (of cows)* (E).
أذرع البقرة : صارت ذات ولد فهي مذرع . والذرع
هو ولد البقرة الوحشية .

٧٥٦ - أذرنج

Bulbe de cyclame (F).
Cyclamen bulb (E).
هو درنة السكع . حجمه حجم قبضة اليد ، مستدير الشكل
مفلطح ، لونه حنطي اسمر . كان ولا يزال من المواد الطبية
يستعمل كسهل وماسط وطارد للدود . وهو غني بجوهر السكمين
وبالمواد النشوية والمنيت والحامض السكيني .

٧٥٧ - آذريون

Calendula (S). *Calendule*, *Souci* (F). *Marigold* (E). *Ringelblume* (D). *Calendola* (I).
جنس نباتات عشبية حولية ومحولة من فصيلة المركبات
الانبوية الزهر . انواعه نحو ٢٠ معظمها من نباتات حوض
البحر المتوسط . اوراقها حاضرة متعاقبة . نصلها رحى
الشكل خلي البشرة . أزهارها هامية شعاعية حيلة الصفار
الزاهي . ثمارها فقيرة || أشهر انواعه الاذريون المخزني
واذريون البر .

٧٥٨ - آذريون البر* ، آذريون الحقل ، قوقحان ، كحلته

Calendula arvensis (S).
Souci des champs, *Fleur de tous les mois* (F).
Goois, *Field marigold* (E). *Wilderingelblume*,
Feldringelblume (D). *Fioranco*, *Calta dei campi* (I).

نوع من الاذريون وهو نبات عشبي بري حولي . منبته
حوض البحر المتوسط . اوراقه متعاقبة ، نصلها رحى
الشكل ، خلي البشرة لونه الى الخضار الاغبر . أزهاره
هامية الارتكاز ، عديدة البتلات البرتقالية اللون || يكثر
في البور والمروج وفي بعض الاراضي المزدرة فيصبح
اذ ذلك من الاعشاب الضارة .

٧٥٩ - آذريون الماء* ، ضرغوس

Caltha palustris (S). *Caltha*, *Populage*, *Souci d'eau*
(F). *Marsh-marigold*, *Water butter-cup*, *King-cup*
(E). *Sumpfdotterblume* (D). *Caltha palustre*, *Far-*
faruglio, *Margheritina gialla* (I).

نبات عشبي حولي بري من فصيلة الشقيقيات . يكثر في



إذخير مكّي



آذريون البر



آذريون الماء



آذريون مخزني



أذن البحر



أذن الحمار



أذن الدب



أذن الشيطان



أذن يهوذا



أذينة



آرا حمراء



أرايمه

٧٧٧ - أذينة* ، عيزارة لرجة

Phlomis viscosa, *Phlomis orientalis* (S). *Phlomis visqueuse* (F). Syrian wick weed (E). *Syrische flammenlippe* (D). *Salvia dei Syria* (I).

نوع من العيزارة وهي بحلة سبروتية جبلية عطرية من فصيلة الشفويات . منبتها جبال لبنان وسورية . ساقها ليفية ، تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . أوراقها أهليلجية مستطيلة لرجة . أزهارها ضمية متتابعة متباعدة الرتاج لوها الى البياض الاخير ، قناباتها وفصلها مدببة شائكة || أزهارها يستمر من حزيران الى تموز .

٧٧٨ - أذينيةات *Auriculariaceae* (S). *Auriculariacées* (F). *Auriculariaceae* (E).

هي فصيلة الفطور الدفرية من رتبة الدعاميات . اطلب دفریات .

٧٧٩ - آرا *Are* (F). *Square of ten metres* (E). قياس سطحي يساوي مئة متر مربع .

٧٨٠ - آرا *Sittace* (S). *Ara* (F). *Ara* (E).

جنس طير من المتسلقات وفصيلة الببغاوات . انواعه المعروفة خمسة موطنها امريكا الجنوبية || تألف الغابات النائية . ملجئها الحياتي جماعي . افواجها قليلة العدد الذي يراوح من ٥ الى ٧ أزواج . قوتها الثمار والحبوب || اجسامها كبيرة القد . تتميز بكبر المنقار وباستطالة الجناح والذنب الرتاجي الشكل . اثوابها تختلف مع الانواع ، جميعها جميلة الالوان الزاهية || اعرف انواعها واشهرها الآرا الحمراء .

٧٨١ - آرا حمراء* *Sittace coccinea* (S). *Ara macao*, *Macao* (F). *Macaw* (E).

اشهر انواع الآرا . موطنها البرازيل . تألف الغابات وضياف تجاري الماء . ملجئها الحياتي جماعي . قوتها الثمار والحبوب وبعض الحشرات || جسمها كبير القد يطول نحو ٦٨ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ ٣٣ سم . بسطتها نحو ١٠٠ سم . ثوبها براكب الالوان يكثر فيه الاخضر . رأسها وعنقها وصدرها وبطنها الى الحمرة الارجوانية . ظهرها وذنبها الى الزرقاء السفهاء . جناحها الى الزرقاء الخضراء المواج . رفال ذنبها ١٢ ، الوسطى منها وعددها ٤ حمراء اللون || تألف القفص لكنها لا تقتبس الكلام بسهولة .

٧٨٢ - أرايمه* *Arapaima gigas* (S). *Arapaima géant* (F). *Arapaima gigas* (E).

الاسم العلمي والفرنسي والانكليزي والبرازيلي . سمكة نهريه وحيدة الجنس والنوع من مفتوحات المشاة عظميات الرؤوس . موطنها نهر الامازون || جسمها كبير القد ، يطول نحو خمسة امتار اما وزنها فيراوح من ١٧٠٠ الى ٢٥٠٠ كيلو . ثوبها الى الطحلة الرصاصية المواج . تتميز بضخامة الرأس المصفتح وبكبر الفم وبذراية الاسنان الكثيرة العدد . زعنفتها الظهرية خلفية الارتكاز ، صغيرة الجرم ، مستطيلة الشكل ، تناخم الزعنفة الذيلية ، تقابلها وتماثلها الزعنفة الشرجية || لحمها فاخر الصنف ، مرغوب فيه .

٧٨٣ - إرانة *Topographie* (F). *Topography* (E). هي رسم الموقع ووصف حالته الطبيعية اخصها الانحدارات

٧٦٥ - أذن الدب* ، يفض الشيخ *Arctotis grandis* (S). *Arctotide* (F). *Bear's ear*, *Wind seed* (E). *Barenohr*, *Windsamenkraut* (D). *Orsa*, *Arctotis* (I).

نبات عشبي بري من سبط القوسيات وفصيلة المركبات . منبته افريقية الجنوبية وبلاد الحبشة . أوراقه لحمية سنانية زغبية وزغبها ابيض اللون اسفح المواج . أزهاره بحيلة الشكل فستقية اللون .

٧٦٦ - أذن الراهب اطلب لوف الحية .

٧٦٧ - أذن الشيطان* ، لقمة القاضي *Otella alismoides* (S). *Ottelle* (F). *Ottelle* (E). *Otella* (I).

نبات رمي نجمي بري من فصيلة كلويات الماء يعيش على ضفاف الأنهر المغمورة بالماء . يكثر وجوده في افريقية والهند واسترالية || أوراقه رحيمة طويلة المعلق . أزهاره زنادية فردية قرصية الارتكاز ، بحيلة الشكل .

٧٦٨ - أذن الغزال اطلب لسان الكلب .

٧٦٩ - أذن الفارة اطلب سيراسيوم مزغبر .

٧٧٠ - إذن القبض *Bon* (F). *Bond* (E).

هي ورقة تقرر لصاحبها حقاً في قبض مبلغ من المال أو المطالبة بالتزام معين .

٧٧١ - إذن لدى الاطلاع *Bon à vue* (F). *Sight draft* (E).

تدفع قيمة هذا الاذن لدى تقديمه دون اخطار سابق .

٧٧٢ - أذن يهوذا* ، سرّة النجف *Fungus sambuci* (S). *Auriculaire*, *Oreille de Judas* (F). *Jew's ear*, *Judas ear* (E). *Holunder*, *Judasohr* (D). *Auriculare* (I).

جنس فطور مأكولة سمراء اللون من الأذينيةات . انواعه عديدة تعيش على جذوع واغصان الاشجار القديمة العهد اخصها الخابور وبعض اشجار المواقع الرطبة .

٧٧٣ - أذنتاب الخليل

انظر سلسفيل المرج وهي عشبة تحمد عصارته .

٧٧٤ - أذنة ، زئمة *Stipule* (F).

Stipule, *Stipula* (E).

زائدة ورقية مزدوجة تكون في قاعدة معلق الورقة في بعض النباتات كالورد والسنت والفلو . وقد تكبر فتصير غمداً ملتصقاً كما في عصفة الخنطة أو تستحيل شوكة أو حائلاً .

٧٧٥ - أذنين *Oreillette* (F). *Auricle* (E).

تجويف علوي في تركيب القلب ينقسم الى ايمن وايسر . يدخل الدم بواسطة الاذنين الايسر الذي يدفعه الى البطين الايسر ويخرج عن طريق الاهر . اما الاذنين الايمن فيصل اليه الدم عن طريق الوريد الاحدب العلوي .

٧٧٦ - أذينة *Auricule* (F). *Auricula* (E).

زائدة نصلية النسيج مختلفة الحجم والشكل تكتنف ضلع الورقة عند انتشائها . وها اذنتان || والأذينة قد تكون بالنسبة الى شكلها وارتكازها جالسة ، مستديرة ، قدية ، متعوجة ، عمودية ، أفقية ، حاضنة ، الخ .

غبراء اللون || ثمارها عنبية مأكولة صفراء اللون
أغصانها وأغصانها مستحبة الطعم والعرف يستاك بها .

٧٩٨- آرآكيات (S).

Salvadoraceae (S). Salvadoracées, Salviniacées (F). Salvadoraceae (E).

فصيلة نباتية ثنائية الفلقة . وحيدة الجنس ، عديدة الأنواع .
نباتاتها شجيرات ونباتات متقابلة الاوراق الرخمية المستطيلة .
نصلها لحمي النسيج باغت الحصار || ازهارها عنقودية
التجميع ، هامة الارتكاز .

٧٩٩- آرآليات (S).

Araliaceae (S). Araliacées (F). Araliaceae (E).

تعرف أيضاً بالقسوسيات والعشقيات . فصيلة نباتية من
ذوات الفلقتين عديدة القعالات . مهدا جميع المناطق
الحارة الاسيوية والامريكية || أنواعها عديدة جميعها
نباتات عشبية او نضوشية الالياف . اوراقها معنقة او
لاطئة ، كاملة او مفرصة . ازهارها صغيرة قلسوية الشكل
لاقياسية الارتكاز يجمعها زناد ابطي || سوقها دماعة
غزيرة العصارة والمادة الراتنجية || جذورها مستحبة الطعم ،
عطرة ، تستعمل في بعض المستحضرات الطبية || اشهر
أنواعها الاربعة التالية .

٨٠٠- آرآلية جنسية* ، آرآلية خماسية الورق

Aralia quinquefolia (S). Aralie, Ginseng (F).
Ginseng (E). Gensang (D). Aralia (I).

جنبه من الاراليات بحيلة الشكل والازهار . تزرع للتزيين
غير انها تحشى المواقع الباردة || تتكاثر بالبذور والمقل .
تميش في المراكز لكنها تبقى صغيرة . وهي من النباتات
الطبية المعروفة .

٨٠١- آرآلية شجرة الملاك* ، آرآلية شائكة

Aralia spinosa (S). Angélique épineuse, Angélique
sauvage (F). Angelica tree, Hercule's club (E).
Angelikbaum, Falsche esche (D). Angelica
spinosa (I).

جنبه برية وزراعية تزيينية ، غزيرة العصارة والمادة
الراتنجية ، كثيرة الشوك .

٨٠٢- آرآلية عارية* ، فشاع امريكيه ، عشبة برية

Aralia nudicaulis (S). Salsparilla d'Amérique (F).
Sarsaparilla, Wild sarsaparilla (E). Amerikanische
krafwurzel (D). Aralia a stelo nudo, Salsaparilla
della virginia, S. falsa (I).

عشبة زراعية وتزيينية . مأكولة الاوراق والجذور .

٨٠٣- آرآلية عاامرة (S).

Arallia papyrifera (S). Angélique à papier (F). Rice paper plant (E).
Fatsia (I).

جنبه زراعية صناعية يستخرج من اليانها ورق جيد
الصف من مرغوب فيه .

٨٠٤- آرآم ، آرآم الطباء البيض البطون .

٨٠٥- آرآلب البحر (S).

Aplysiidae (S). Aplysiidés (F). Aplysiidae, Sea hares (E).

فصيلة حيوانات صدفية بحرية من الرخويات . اجناسها
وانواعها كثيرة العدد جميعها ضارية ومنها السامة والتي تفرز
اخلاطاً قمرية تصبغ الماء حولها || اشهرها الارنب البحري .

٨٠٦- أرآولة هي الكريرنم ، اطلبها .

٧٨٤- أرآد (F).

Tuft of shoots from a pollarded stump (E).

هي سجاع النواهي التي تفرخ حول ارومة الشجرة المقطوعة .

٧٨٥- أرآرو هو الأشبور ، اطلبه .

٧٨٦- أرآسان

مسحوق ناعم يرتكز على مركبات خاصة ، يستعمل لوقاية
بذار الشوندر من الامراض الفطرية والنخر || يلزم
٦٠٠ غرام لكل ١٠٠ كيلو بذار .

٧٨٧- أرآرض أولية (F).

Primary grounds (E).

هي اول اراض جيولوجية رسوبية تعقب الارض الاصلية .

٧٨٨- أرآرض بركانية (F).

Volcanic grounds (E).

هي الاروض الجيولوجية المتأثرة عن ثوران البراكين وقد
تكون غنية غالباً بالحامض الفسفوري وبالبيوتاس .

٧٨٩- أرآرض ثالثة (F).

Tertiary grounds (E).

من الاحقاب او الاراضي الجيولوجية . تأتي بعد الحقبة الثانوية .

٧٩٠- أرآرض ثانوية (F).

Secondary grounds (E).

من الاحقاب او الاراضي الجيولوجية . تأتي بعد الحقبة الاولى .

٧٩١- أرآرض رابعة (F).

Quaternary grounds (E).

من الاحقاب او الاراضي الجيولوجية . تأتي بعد الحقبة الثالثة .

٧٩٢- أرآرض زراعية (F).

Agricultural grounds (E).

هي جميع الاراضي المزروعة والممكن زرعها لان تركيب
عناصرها الحكمية والكيمياوية يسمح بذلك .

٧٩٣- إرآضة (F).

Géodésie (F). Geodesy (E).

علم هيئة الارض ومساحتها .

٧٩٤- إرآضي (F).

Géodésien (F). Geodesic (E).

علم هيئة الارض ومساحتها .

٧٩٥- أرآط (F).

Azoospermie (F). Azoospermia (E).

هو عدم وجود الحويثات المنوية في المني .

٧٩٦- أرآفيلدا (F).

Orphie de castraine (F).

سمكة بحرية تدعى خرمان المتوسط ، اطلبها .

٧٩٧- آرآك* ، كبات ، شجر السواك

Salvadora persica (S). Salvadore, Arac, Mésuak (F).
Tooth brush tree (E). Senfkorn (D). Salvadora (I).

جنبه من الاراكيات تعتبر من النباتات الطبية ، مهدا
يلاد المعجم والهند . جذورها حريفة منقطة . ساقها قصيرة
اغصانها قليلة ، افنادها فروع متشعبة كثيرة الافنان
الطويلة المنتصبة || اوراقها متقابلة ، معنقة ، رخية
النصل ، شبه لحمية النسيج ، لونها الى الرماد الاطلحل .
مقوية المعدة ومسهلة || ازهارها عنقودية التجميع ، هامة
الارتكاز ، رباعية البتلات والاسدية ، صغيرة الحجم



آراك



آرآلية جنسية



آرآلية شجرة الملاك



آرآلية عارية

٨١٧ - إربيس ربيعي *Arabis verna* (S).
نوع من الأربيس . الساق قليلة الزغب والفروع . الاوراق
بيضية مسننة . الازهار بنفسجية . الحرنبيبة منضغطة
منتصبة . البزور عادية || يوجد في السواحل اللبنانية
السورية وفي فلسطين .

٨١٨ - إربيس سماقي *Arabis thyrsoidea* (S).
نوع من الأربيس وهو نجمة صغيرة . اوراقها بيضية قليلة
التسني ، ازهارها بنفسجية ، حرنبيباتها قصيرة منتصبة .
توجد في محيط ظهر القضيبي .

٨١٩ - إربيس سهمي *Arabis sagittata* (S).
نوع من الأربيس . الساق عفاية . الاوراق مستطيلة
منفرجة التسني . الازهار بيض . الحرنبيبات خطية
منتصبة ، البزور ضيقة الحواجب || يوجد في جميع
المناطق اللبنانية .



أربيد

٨٢٠ - إربيس قصير الاوراق *Arabis brevifolia* (S).
نوع من الأربيس . الساق حزمية قصبة . الاوراق صغيرة
قليلة التسني كثيفة الزغب لينة ، الحرنبيبات منتصبة .
يوجد في لبنان والجبل الشرقي .

٨٢١ - إربيس مُستَرسِل *Arabis laxa* (S).
نوع من الأربيس . الساق عالية فرعاء . الاوراق مستطيلة لسنة
عريضة الأذينات . الازهار كبيرة بيض . الحرنبيبات رباعية
الزوايا المنفرجة . البزور محرفة || يوجد في الجبل الاقصر .



إربيس

٨٢٢ - أربش ، أربش ، أربش
أربش وأربش الشجر : اوراق وثقلار وقيل اخرج ثمره
كانه حمص .

٨٢٣ - أربغ *Hydrophyte* (F).
كل نبات يعيش في الماء . وهي مربغة .

٨٢٤ - أربنغ ثلاثي اللخاص *Chasmarhynchus tricarunculatus* (S).
Araponga à trois caroncules, Sonneur (F).
طائر من فصيلة القطنجيات . موطنه الفويان . يألف



أربنغ ثلاثي اللخاص

الغابات النائية . صوته يشبه رنين الجرس || جسمه كبير
القد يطول نحو ٣٠ سم . عند الذكر ونحو ٢٧ سم . عند
الانثى . والذكر يتميز بثلاث لخاص سود مستطيلة ترتكز
على قاعدة الافك العلوي من المنقار . ثوبه الى السمرة
الكستنية السفعاء باستثناء الرأس والعنق والصدر فانها
عاجية البياض . عيناه كبيرتان مكحلتان بالاسود . حدقة
عينه الى الخضار الزيتي . منقاده كبير القد ، عريض
القاعدة ، واسع الشدق . ساقه الى السمرة الخنطية . ثوب
الانثى الى الخضار الزيتي . علاطها وصدرها مشيزان
بالاصفر . عيناها مملوكتان بالخنطي || يعتبر من الطيور
الشديدة الخلد . مجسه العادي فن الاشجار الرفيعة . قوته
الثمار والحبوب || يدشن عشه في اعالي الاشجار الرفيعة بين
الافنان الكثيفة . الانثى تضع من ٣ الى ٤ بيضات
تحضنها وحدها نحو ١٧ يوماً بينما الذكر يؤمن لها الغذاء .

٨٢٥ - أربونين *Arbutine* (F).
غلوكوزيد يستخرج من ورق العيسران . يستعمل طيباً
لإدرار البول .

٨٠٧ - أرب *Nouveau-nés* (F). *New-born* (E).
الأرب : صغار الهم ساعة تولد (القاموس) .

٨٠٨ - أوت أرب بالمكان : لزمه واقام به . طير مرب .

٨٠٩ - أربة *Laisse, Lesse* (F). *Leash, String* (E).
قلادة الكلب التي يقاد بها وكذلك الدابة (لسان العرب) .

٨١٠ - إربجان *Alyxia* (S). *Alyxia* (F).
Brushland box (E). *Alyxienbaum* (D). *Allissia* (I).
جنس نباتات دماغة معمرة من فصيلة الدفليات . مهدا
البلاد الاسيوية الحارة . انواعها عديدة جميعها شجيرات
او شجيرات . سوقها منتصبة فرعاء . اوراقها معمة متقابلة
نصلها سناني الشكل ، لونه الى الخضار الاليس . ازهارها
عشكولية التجميع يغلب فيها الابيض .

٨١١ - أربد* ، عربد* ، شجاع *Echis carinata* (S).
Echis à carène, Vipera des pyramides (F). *Echis* (E).
افعى سامة خبيثة طولها نحو ٧٠ سم . رأسها نوزي الشكل ،
عنقها دقيق مستطيل ينتفخ عند الغضيب . ثوبها بلون الرمل
المابق يعلوه تدبيج اغبر ورقشة وخطوط كدر || موطنها
اواسط افريقية ومصر واليمن . وهي من الافاعي التي يستعملها
الحاوي ولا يخشى منها لانه يقتلع او يسحق انيابها العاطبة .

٨١٢ - إربيس* *Arabis* (S). *Arabette* (F).
Araby, Wall-cress (E).
جنس نباتات عشبية برية من سبط الحيرانثوسيات وفصيلة
الصليبيات . انواعه عديدة منها المرطاء والزباء والحولية
والحولية والمعمرة . اكثرها من اشباب الجرود والمناطق
الداخلية وبعضها ينبت على الساحل || اوراقها صغيرة
مستطيلة . ازهارها بنفسجية او بيضاء اللون . كؤوسها
منتصبة . بثلاثها ذات محالب ، سماتها غير منقسمة .
بزورها على صف واحد ومنها على صفين . معظمها مجنح
الخيار || اشهر انواعه الشرقية ما يتبع .

٨١٣ - إربيس أبيض *Arabis albidia* (S).
نوع من الأربيس . الساق قصيرة قليلة الفروع . الاوراق
بيضية منفرجة التسني . الازهار كبيرة . البتلات بيض .
البزور ضيقة الحواجب || يكثر وجودها تحت جرود لبنان .

٨١٤ - إربيس أذيني *Arabis auriculata* (S).
نوع من الأربيس . الساق فرعاء . الاوراق مستطيلة ، غير
منتظمة التسني . الزيدة اطول من الكأس . الازهار صغيرة .
البتلات بيض . البزور مطوقة بخط || يكثر وجودها
في جبل الشيخ والجبل الشرقي .

٨١٥ - إربيس أوشري *Arabis aucheri* (S).
نوع من الأربيس . الساق فرعاء كثيفة الزغب . الاوراق
مستطيلة مسننة . الزيدة صغيرة اقصر من الكأس . الازهار
صغيرة بيضاء اللون || يكثر وجودها بين عيتاب ودمشق .

٨١٦ - إربيس برجي *Arabis turrita* (S).
نوع من الأربيس . الساق قليلة الزغب والفروع . الاوراق
مستطيلة مستدقة الاسنان . الازهار صغيرة بنفسجية .
الحرنبيبات طويلة مفلطحة ومعقدة . البزور عريضة الجناح .
يكثر وجوده في جبل اللكام .

٨٤٠ - إِرْتِفَاع (F). Hauteur (F). Height (E).

٨٤١ - إِرْتِفَاق ، حَقِّق ، مُرْتَفَق (F). Servitude (F). Easement (E).

تكليف مرتب على عقار لمنفعة عقار آخر يملكه الغير .
والارتفاق قد يكون تكليفاً بالفعل فهو اذ ذلك ايجابي
او بعدم الفعل فهو سلبي || اما الارتفاقات فمديدة
اهما ما يتبع .

٨٤٢ - إِرْتِفَاقُ إِتِّفَاقِي (F). Servitude conventionnelle (F).
هو الذي أنشأ اتفاق بين اصحاب الشأن .

٨٤٣ - إِرْتِفَاقُ الشِّفَةِ ، حَقِّقُ الشِّفَةِ (F).
Servitude d'abreuvement, Servitude d'abreuvoir (F).
هو ارتفاق يلزم صاحب عقار فيه مورد ماء بان يترك
جيرانه يسقون مواشيهم منه .

٨٤٤ - إِرْتِفَاقُ النِّظَرِ (F). Servitude de visibilité (F).
هو ارتفاق قانوني مستحدث يراد به رفع الحواجز والشجار
التي تعوق النظر عند منعطفات الطرق ومنعرجاتها وتقاطعها
لاجل سلامة المرور .

٨٤٥ - إِرْتِفَاقُ خَطِّ التَّنْظِيمِ (F).
Servitude de reculement (F).

هو ارتفاق اداري يمنع من له عقار خارج عن التنظيم
ان يزيد عليه في البناء ويوجهه على تركه كما هو حتى
ينداعى ويضطر الى هدمه فتستولي الادارة حينئذ على
ارض الجزء الخارج عن التنظيم وتدفع له التمييز المستحق .

٨٤٦ - إِرْتِفَاقُ زِرَاعِي (F). Servitude rurale (F).
هو الذي يكون محله ارضاً زراعية .

٨٤٧ - إِرْتِفَاقُ طَبِيعِي (F). Servitude naturelle (F).
هو الذي ينشأ من طبيعة العقارين كحق مسيل مياه المطر .

٨٤٨ - إِرْتِفَاقُ ظَاهِر (F). Servitude apparente (F).
هو الارتفاق الذي تنبئ عن وجوده اعمال ظاهرة كارتفاق
مرور المياه .

٨٤٩ - إِرْتِفَاقُ عَدَمِ الْبِنَاءِ (F). Servitude non
aedificandi (F).
هو الالتزام بعدم اقامة بناء على ارض معينة .

٨٥٠ - إِرْتِفَاقُ مُسْتَمَرٍّ (F). Servitude continue (F).
هو الذي يظهره وضع العقارين فلا يقتضي استعماله مجهوداً
كارتفاق مرور المياه وعدم التعلية ...

٨٥١ - إِرْتِفَاقُ (F). Evolutionnisme (F).
Evolutionism (E).

الارتقاء نظرية بيولوجية تقول بارتقاء الانواع الحية وبعدم
استقرارها على حالة معينة ، وهي بذلك تعاكس نظرية
الركانة .

٨٥٢ - إِرْتِكَّاسٌ (F). Récidivité (F). Recidivated (E).
هو الرجوع ، بالزروع العدائي ، في السلالات النباتية
المتحدرة الى بعض الصفات الدفينة .

٨٥٣ - إِرْتِكَّافٌ (F). ارتكف الثلج : وقع فثبت على الارض .

٨٥٤ - إِرْتِهَاشٌ (F). Atteinte (F). Affected (E).
جرح القائمة بان يصك الفرس بعرض سافره عرض عجايته

٨٢٦ - أَرْبُوعَاتٌ (F). Tetraspores (F).

هي الارباع الرباعية التركيب .

٨٢٧ - أَرْبِيَانٌ* ، رُوبِيَانٌ ، قُرَيْدِسٌ ، عَجَبَارٌ ،
جَمْبَرِيٌّ ، جَمْرِيٌّ ، قُرُونٌ

Crevettes (F). Prawn, Shrimp, Crangon (E).
مجموعة اجناس وانواع من القشريات المشاريات الاقلام
منها نهريه وبحيرية تعيش في المياه الحلوة ومنها بحرية .
اكثر الانواع النهريه تنتمي الى جنس غمروس (Gamarus)
اما البحرية فانها من القريدسيات (Caridides)

٨٢٨ - أَرْبِيَّةٌ ، خُرَاجٌ ، دُمْلٌ ، هَبَسَجٌ ، وَرَمٌ (F).
Tumeur (F). Tumor, Swelling (E).

عطب عارض او دائم يصيب الحيوان . اسبابه مختلفة منها
خارجية تعود الى رضة او صدمة او ضربة او جرح ومنها
داخلية تعود الى عوامل شتى يرجع تقريرها ومعالجتها الى
الطبيب البيطري .

٨٢٩ - أَرْبِيَزُولٌ (F). Arbolol

ماكون زراعي سائل التركيب يرتكز على زيت القطران
يستعمل محلولاً بالماء بمعدل ٦ ٪ في المكافحة الشتوية ضد
مكن الحشرات وضد بعض الامراض الفطرية .

٨٣٠ - إِرْتِبَاطٌ (F). Association

هو في العرف العدائي الصلة التي تربط الصفات والعوامل
الخلقية .

٨٣١ - إِرْتِبَاطٌ ، عِلَاقَةٌ (F). Corrélation (F).

هو نسبة تجمع بين شيئين .

٨٣٢ - أَرْتَمَةٌ (F). الشمر الذي على رأس الحرباء .

٨٣٣ - أَرْتَجٌ (F).

يقال أرتجت الاتان وهي مرتج اذا حملت . وارتجت الناقة
وهي مرتج اذا قبلت ماء الفحل فاغلقت رحمها عليه .
ويقال للحامل من الحيوان مرتج لانها اذا عقدت على ماء
الفحل انسدت فم الرحم (لسان العرب) .

٨٣٤ - إِرْتِجَاجٌ ، إِهْتِزَازٌ (F). Vibration

حالة الشيء الذي يتحرك بسرعة .

٨٣٥ - إِرْتِجَاجِيٌّ ، إِهْتِزَازِيٌّ ، زَلْزَلِيٌّ (F). Séismique, sismique (F). Seismic (E).

نعت تعريفي يطلق على ما هو منوط بالزلزال والاهتزاز
الارضى .

٨٣٦ - إِرْتِشَاحٌ ، نَتَحٌ (F). Exsudation (F).

Exudation, Sweat, Perspiration (E).

هو ما ترشحه او تلتحه الاجسام الحيوانية والنباتية

٨٣٧ - إِرْتِشَاحٌ خَبِيثٌ (F). Septicémie gangréneuse (F).

تقيح يسبب عن الدم .

٨٣٨ - إِرْتِشَاحَاتٌ (F). Transudats

هي ما تفرزه بعض الاجسام من سوائل خاصة .

٨٣٩ - إِرْتِفَاحٌ ، إِنْفَاحٌ (F). Gonflement (F).

Swelling (E).

خاصة طبيعية تتحلل بها بعض النسيج الحيوانية والنباتية
تجعلها مستعدة لقبول الزايد الحيواني والامستيعابي .



أربيان

من اليد الأخرى فيدميها .

٨٥٥ - أرثوزي

Artésien (F). Artesian (E).

نعت يطلق على المياه الجوفية التي ترتفع عن مركز تفجيرها عملاً بالنظرية الطبيعية القائلة : أن السوائل ، من مياه وغيرها ، المتصلة السطح تميل إلى التساوي النسبي .

٨٥٦ - أرثوسيد

Orthocide

فاطور زراعي يحوي ٥٠ ٪ من مادة كابتان (Captan) الفعالة . وهو مسحوق ناعم يذوب في الماء ويستعمل في معالجة عدة أوصام فطرية تفتك بالخضار وبالأشجار المثمرة . يحل بمعدل ٢,٥ ٪ .

٨٥٧ - أرثو فلتان

Ortho-Phaltan

فاطور زراعي -حديث العهد شديد الفاعلية يستعمل في مكافحة عدة أوصام نباتية أخصها الأعداء والتسنة والريفة والبلاكروت والدغلة والقاروية التي تتركب الأشجار المثمرة والكرمة والبقول ونباتات الزينة .

٨٥٨ - أرثو كرس

هي الجاكا أي شجرة الخبز .

٨٥٩ - أرثوليت الخلتج *

Ortholitha mucronata (S).

Ortholithe des bruyères (F).

Ortholitha mucronata (E).

حشرة من فصيلة الأرفيات ورتبة حشرقيات الاجنحة . موطنها بعض أصناف حوض البحر الأبيض المتوسط . فراشاتها جارسة قوتها رحيق الأزهار . أساريعها تعيش على أوراق الخلتج والزنان . جسمها صغير القند يطول من ١١ إلى ١٢ مم . بسطتها تراوح من ٣٢ إلى ٣٦ مم . رأسها معتدل الجرم حنطي اللون . عيناها زهميتان صغيرتان . زبانها مشطيان عند الذكر ، خيطيان عند الأنثى . جوشنها وبطنها إلى الحنطي الاكلف الموج . روشنها الامايمان إلى الحنطي تعلوه ثلاثة خطوط معرصة عنابية وخط من النقط يكتنف الحثار الخارجي . روشنها الخلفيان إلى الحنطي تعلوه مشعة سمراء || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في أيار وتبقى حتى تموز . تسرح من الغروب إلى فحمة الليل . تعاظم بعد ظهورها بنحو ستة أسابيع وتمتد الممكن على الصفحات السفلى من نصال الأوراق || السرعة عند بلوغها الإدراك التام تطول من ٢٤ إلى ٢٨ مم . جسمها اسطواني الشكل : نوبها إلى الحنطي الوردي الموج تعلوه رقشة غبراء وثلاثة خطوط قاطبة سمراء اللون || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوم يتقضي في الجثالة ضمن صلجة تنفلق عند انطلاق الفراشة .

٨٦٠ - أرث ، كهر

الأرث نبات له قضيب واحد في وسطه وفي رأسه مثل الفهر المصنوب غير أن لا شوك فيه فإذا جف لطاير . ليس في جوفه شيء وهو مرعى للابل تسمن عليه (لسان العرب) .

٨٦١ - أرث

Borner (F). To limit, To bound (E).

أرث الارضين : جمل بينها أرثة أي حداً (الشاح) .

٨٦٢ - أرثة ، متار

Borne (F).

Limit, Boundary (E).

الحد بين الارضين

٨٦٣ - إرثد* ، سرساد ، بنجنگشت ،

فنجنگشت ، شجرة ابراهيم ، كف مريم

Vitex agnus-castus (S). Gattilier commun, Agneau-chaste, Arbre au poivre (F). Chaste tree, Agnus-castus, Hemp tree, Abraham's balm (E). Kenschbaum müllen, Abrahamsbaum (D). Agno-casto comune, Pepo falso, Vitice, Peperella (I).

جنبية طبية وتزيينية معمرة من فصيلة رعي الحمام . ساقها فرعاء تعلو من ٢ إلى ٤ أمتار . عودها صلب كعود الزمان . أوراقها متقابلة معنقة زباء النصل . أزهارها جميلة الشكل عطرية العرف ، زرقاء اللون ، يستمر أزهارها من حزيران إلى آب || ثمارها حب كالفلفل يقال له حب الفقد لأن استعماله يفقد شهوة الجماع ويمنع النسل لذلك فهو لا يزال رمز الطهارة وكانت الراهبات تتخذنه فيما مضى فراشاً لمن في الأديرة وهذا سبب تسميته حب الفقد وكف مريم || نقيعه حاضم وطارد للغازات . أما بزوره فتدفع السموم حتى القتالة .

٨٦٤ - إرثد الصين

Vitex incisa (S).

Gattilier Incisé, G. de Chine (F).

نوع من الإرثد وهو جنبية طبية معمرة مهدها الصين . ساقها فرعاء تعلو من المتر إلى المترين . عودها صلب ، أوراقها متقابلة ، معنقة ، أذينية ، زباء النصل . أزهارها صغيرة زرقاء اللون خلية الكأس والبتلات . أزهارها يدرم من تموز إلى أيلول .

٨٦٥ - إرثين ، جين

Gène (F). Gene (E).

عامل الوراثة الأول وهو اصغر وحدة فيزيولوجية حية .

٨٦٦ - إرثيني ، جيني

Génique (F).

Genic (E).

نعت تعريفي يطلق على ما هو مختص بالارثين أو الجين .

٨٦٧ - أرج

Vestibule (F). Hall (E).

جزء من نباك الأرضة قوامه دهليز فسيح مستطيل يتأخم قاعة الملك تأوى إليه الشرطة .

٨٦٨ - أرج

Odoriférant (F). Odoriferous (E).

فاحت منه رائحة طيبة .

٨٦٩ - أرجاء

Parturition

الارجاء والاضراع دنو نتاج كل حامل من اناث الخيل والبقر والابل والغنم ... وإذا دنت أن تخرج ولدها فهي مرجى .

٨٧٠ - أرجاب

Intestins (F). Bowels (E).

هي امعاء البهم أي مذاخرها .

٨٧١ - إرجاس

Sondage (F). Sounding (E).

تجري عمق وعناصر الطبقات الأرضية .

٨٧٢ - أرجان

اطلب أركان .

٨٧٣ - أرجة القرون

اطلب بوهينيا .

٨٧٤ - أرجحية

Probabiliorisme (F).

Probabiliorism (E).

الارجحية مذهب فلسفي اجتماعي يقول بلزوم السالك حسب الرأي الأرجح .

٨٧٥ - أرجن

Apprivoiser (F). To tame (E).

ارجن الطائر والحيوان جعله أليفاً داجناً .



ارثوليت الخلتج



إرثد

جسمها متوسط القد يطول من ٢١ الى ٢٣ م. بسطها تراوح من ٥٦ الى ٦٠ م. رأسها معتدل الجرم. عيناها زهميتان ، كبيرتان . زباناها صولجانيان مستطيلان . مرشفها دقيق مستطيل . جوشنها وبطنها كثيفا الحمل ، بنيا اللون . روشنها الاماميان الى الصحرة الصنابية يعاوها بجذيع وتقليم ورقشة وزرا كش كستنية . روشنها الخلفيان الى الصحرة تعلوها مشحة كستنية وخطان قاطبان وبعض النقط والزرا كش . لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في ايار . تسرح في النهار . تعاطل بعد ظهورها بثمانية اسابيع وتمتدح المكن على نصال اوراق النباتات العائلة . السرفة عند بلوغها الادراك تطول نحو ٣٨ م. جسمها شبه اسطواني الشكل ، مبعثر الهلب . ثوبها الى السواد الجوزي الموج يعلوه خطان اصفران وعشرة اطواق سكمية خضراء وثمانية ازواج من الثعول الحمر . طور الاكمال يستمر نحو ثلاثة اسابيع وينقضي في التربة .

٨٨٢ - أرخ

هو الوعل المنبسط الظلف والاثنى رحاء ج. رُح .

٨٨٣ - أرخ، ماريّة

Oryx جنس حيوانات لبونة مجترة من بقر الوحش . انواعه خمسة . جميعها كبيرة الجثة ، ثوبها الى الجؤوة الغبراء ، بطنها ابيض ، رأسها مستطيل يحمل سيالة سوداء ويعلوه قرنان طويلان كسيفين احدين . عنقها قصير غليظ ، ذنبا متوسط الطول اسود الشعر . الاثنى قرناء وضرها رباعي الاختلاف كالبحر . تألف الحياة الجماعية . آجالها كبيرة العدد تأوى القفر والبيداء . مهدا افريقية والجزيرة والعراق وسورية . الذكر يدعى الارخ والاثنى أرخة وقيل هي الفتيّة دون سواها .

٨٨٤ - أرخ افريقي * ، ماريّة افريقية ، بئسة ،

متهمة Oryx beisa (S). Beisa antelope (E). موطنه الحبشة والصومال والكردفان الشمالي حتى علو ١٠٠٠ متر . وحوض البحر الاحمر . يتميز بكثافة عرفه الاسود ويخلو صدره من الور الطويل . جهته موشحة بالاسود ، سيالته تبتدى ضيقة ثم تعرض . طول قرن الذكر نحو ٣٠ سم. والاثنى ٣٣ . اجله كبير العدد يراوح من ٣٠ الى ٦٠ . يألف السهول والاماكن الكثيرة العشب . ينفر من الادغال والاحراج .

٨٨٥ - أرخ البادية * ، ماريّة البادية .

Oryx callotis (S). Oryx callotis (F). Oryx à pinceaux (F). موطنه السهول الافريقية وجوانب الصحاري . قد قد الارخ الافريقي لكنه اغبس اللون وسواد جهته اقل انتشارا .

٨٨٦ - أرخ الجزيرة * ، ماريّة الجزيرة ، وضيحي ،

أبو سوتع Oryx Beatrix (S). Oryx Béatrix, Antilope Béatrix (F). Princess Beatrix's antelope (E). موطنه البلاد العربية . جثته اصفر من جثث رفاقه . ارتفاعه نحو ٨٦ سم. ثوبه اغبر ، رأسه ابقع وقوائمه كذلك . طرف ذنب اسود . قرنه نحو ٣٧ سم. . اجله من ٢٠ الى ٣٠ . يألف الصحاري والهضاب الوعرة .

٨٨٧ - أرخ الصحراء ، ماريّة الصحراء ، أبو حوآب

Oryx gazella (S). Oryx gazelle, O. algazelle, O. du Cap, Pasan (F). Gemsbok, White oryx (E). حشرة من فصيلة البشوريات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها بعض المناطق المعتدلة الحرارة من الشرق الادنى واروبة . فراشاتها تعيش على رحيق الازهار وطللمها . اساريها خاضعة تركب اوراق الموسج والبلان والقراص .

٨٧٦ - أرجوان * ، أرجوان العرب ، أرغوان

خزريق ، زهمريق ، سجرريق ، شجرة اليهود Cercis (S). Gaiier, Arbre de Judée (F). Red bud, Judas tree, Love tree (E). Echter Judasbaum (D). Chiantanella, Tregano, Arbero di Giuda (I).

نوع اشجار حرجية من فصيلة السقييات . منبتها حوض البحر المتوسط . ضرورها ثلاثة حيمها حرجية وزيمية . سوقها ملساء اللحاء منتصب . اخشابها موشحة بالسمرة ، شديدة الصلابة تستعمل في صناعة الادوات الخشبية . اوراقها منقطة متعاقبة ، نصلها قلبي الشكل قائم الخضار . ازهارها محورية الارتكاز تنضج على الافناد والاغصان وهي وردية اللون ، ارجوانية الموج ، مستدة يحممها زناد قصير . ثمارها قرنية ، مفلطحة ، رقيقة ، عقفاء المقصة المدببة الحادة . نقيع زورها يرطب المدة . تتكاثر بالبذر ، تعيش في جميع الاثربة . تفضل المواقع الرطبة .

٨٧٧ - أرجيا

Orgyia (S). Orgyie (F). جنس حشرات فراشية من فصيلة القزيات ذكورها مجنحة . اناثها عديمة الجناح . اساريها زباء ، تلتهم اوراق الاشجار المثمرة والخرجية . اشهر انواعه : أرجيا أنتيكا .

٨٧٨ - أرجيا أنتيكا * ،

Orgyia antiqua (S). Orgyleantiqua, Bombyx étoilé, Étoilé (F). Vapourer moth (E). Schlehsenspinner, Aprikosenspinner (D). نوع من الارجيا . فراشها صغيرة القد عنابية اللون زباناها مشطية . عروق رواشها سمر . لطفة روشنها الاماميين كلوية الشكل ، صغيرة القد ، بيضاء اللون . برقتها تدعى « الدورة الزباء » لانها كثيرة الهلب الدقيق . تركب الاشجار المثمرة والحرجية فتعبلها وتؤذيها . لها جيلان في السنة . اما بياتها الشتوي فكني والاثنى تمتدح مكنها في غالب الظروف على الصلجات القارغة وبين شقوق لحاء السوق والاغصان . الزيوت الشتوية نقضي على المكن والحواشير تبدي اليرقات .

٨٧٩ - أرجير

Argyrolobum (S). Argyroloba (F). Silver-leaf (E). Silber blatt, Silberhülse (D). Argirofilla (I).

جنس نباتات عشبية وجنية من سبط اللوتيات وفصيلة القرنيات . مهده البلاد الافريقية الحارة . انواعه عديدة منها برية علفية ترغب فيها الماشية ومنها زراعية تزيينية ، ازهارها جميلة مستحبة العرف والالوان .

٨٨٠ - أرجيرية

Argyreia (S). Argyrée (F). نبات زراعي تزييني عارض من فصيلة المحموديات . اوراقه بيضيه كبيرة او مفصصة ، نصلها امس الصفحة العليا الجميلة الخضار ، ازغب الصفحة السفلى الموشحة تحمل فضي . ازهاره خشتوية جميلة الشكل حراء اللون . يتكاثر بالبذر والمقل ، سريع النمو ، يوجد في جميع الاثربة ، يخشى المواقع الباردة الرطبة .

٨٨١ - أرجيفيس البراري * ، لولاية

Argynis aglaja (S). Grand Nacré (F). Argynis aglaja (E).

حشرة من فصيلة البشوريات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها بعض المناطق المعتدلة الحرارة من الشرق الادنى واروبة . فراشاتها تعيش على رحيق الازهار وطللمها . اساريها خاضعة تركب اوراق الموسج والبلان والقراص .



أرجوان



أرجيا أنتيكا



أرجير



أرجيفيس البراري



أرخ افريقي



أرخ البادية



أُرْخ الجزيرة



أُرْخ سوداني



أُرْخيس



أُرْذرية



أُرْز

٨٩٧- أُرْزوت Arrow-root

مادة نشوية غذائية تستخرج من جذامير المرتطة .
تحتوي على : مواد ازوتية من ١ إلى ١٧٠ ٪
مواد دهنية من ١٥ إلى ٢٥ ٪
مواد نشوية وسكرية من ٨٢ إلى ٨٦ ٪

٨٩٨- أُرْزوتته اطلب مرتطة قصية .

٨٩٩- أُرْز * وُرْز Oryza sativa (S). Riz (F).

Rice plant (E). Reis (D). Riso (I).
نبات زراعي عشبي متعمر من فصيلة النجيليات . يقال ان موطنه الاصلية كانت بعض مناطق الصين واليابان والهند . وهو يزرع الآن في معظم البلاد الحارة والمعتدلة كاليابان والصين والهند وسريلانكا والعراق وسورية ومصر والسنگال وفرنسا وإيطاليا وأمريكا والبرازيل ... || أنواعه المعروفة الشائعة اربعة منها ثلاثة تعيش في الماء وهي :

الارز المزروع المعروف بالارز O. sativa (S).
Riz cultivé (F). Cultivated rice (E).

الارز الصمغي O. glutinosa (S). Riz gluant (F).

الارز الطواف O. fluitans (S). Riz flottant (F).

اما الرابع وهو المعروف بالارز الجبلي O. montana (S).
Riz de montagne (F). Mountainous rice (E).

فانه من النباتات التي تكتفي بالري العادي والتي يمكن زرعها عذبة حتى علو ١٨٠٠ م || ضروب الارز كثيرة العدد وقد صار ترتيبها بالنسبة الى بلادها المنتجة لذلك يقال الضروب اليابانية والصينية والهندية والمصرية والاطالية والامريكية . ولكل منها ميزات خاصة وفوارق شكلية || جذوره خفية سطحية ، سوقه قائمة سلامة دقيقة اسطوانية فارغة طولها يراوح من ٨٠ الى ١٥٠ سم . فأكثر || شرافقه مستطيلة سهمية خشنة مسننة الحافة || ازهاره عنقودي هامي منتصب زهرته مخضونة . بعصيفتين مستطيلتين || حبتة تدعى شلبة وهي مستطيلة مبرزية يابسة مغلفة بعصيفتين تلحفاً كالباس . حبة المقشور المعروف بالرز مأكول شائع الاستعمال . غني بالمواد النشوية ، يحوي نحو : ٨٥ ٪ من النشا او المواد الهيدروكربونية - ٢ ٪ من المواد الازوتية - ١ ٪ من المواد الدهنية - ١٢ ٪ من الماء || انتاج الرز العالمي السنوي لا يقل عن ١٠٠ مليون طن وقد يأتي بعد الحنطة والذرة الصفراء . وتقدر الشعوب التي تعتبر الرز غذاء اساسياً بنحو نصف سكان العالم || يستخرج من شلب الارز بعد تخميره وتقطيره نوع من الكحول القليل الضرر يدعى «سكي» يستعمل استعمال جميع المشروبات الكحولية ، ومن المعروف ان ١٠٠ كيلو من الشلب تقطر ٣٠ ليتراً من الكحول عيار ٣٦ درجة ستيفراد .

زراعته : يزرع ويجود في الارربة الطينية الرملية والطينية الكلسية وهو لا يخشى الاراضي المالحة ولا يقصيه اندماج التربة . ولكنه يتطلب الري الغزير المستمر اي الغمر بالماء وقد يزرع في المكان الواحد بضع سنين متوالية دونما ضرر او نقص في المحصول شرط ان يسمد سنوياً بالاسمدة الكيماوية المركبة المناسبة || اما التربة المعدة لزراعة الارز فيجب ان تكون جالسة مستوية لتمكين غمر الماء واستقراره واستبداله . وبعد حرثها وتقسيمها الى مساكب (احواض) مربعة او مستطيلة الشكل ، مساحة واحدتها من ١٠٠٠ الى ٥٠٠٠ م ، تحضن باعصاد عريضة وقوية تحميها من انسياب الماء . ثم يصار الى ريها ولا يندر الشلب الا بعد تقلص الماء . اما كمية البذار فمعدلها نحو ٨ كيلو للواحد

موطنه صومالي وسهول افريقية الشاسعة الفسيحة . جثته كبيرة طولها نحو ٢٣٥ سم . وارتفاعها لا يقل عن ١١٥ ، قرنه من ٩٠ الى ١١٠ سم . ثوبه ارمي اغبر ، رأسه ابلق مؤذر . بطنه ابيض || اجله من ٥٠ الى ٨٠ . ذكوره لا تخالط انثاه الا في زمن السفاد .

٨٨٨- أُرْخ سوداني * ، ماريّة سودانية ، ناشيط ، هَيْطَلَة

Oryx leucoryx (S). Oryx de Nubie (F). Sabre-horned antelope (E).
يكثر في صنار والكردفان وبلاد النوبة والسودان . وهو بطيء الحركة ، ريع الجثة غليظها . طولهُ نحو ٢٠٠ سم . وارتفاعه ١٣٠ || ثوبه اصهب اغبر ، رأسه ابلق تعلوه ست بقع سود ، عنقه عابق اللون . بطنه ابيض . طرف ذنبه اسود . قرنه نحو المتر || اجله من ٢٥ الى ٤٠

٨٨٩- أُرْخيس * Archaeopteryx.

Archéoptéryx (F). Archaeopteryx (E).
هو اقدم طائر معروف حتى الآن . وجدوا حفيرته في شس* ابشتاد في بافاريا . من هيكله يتبين انه قريب الصلة بالزحافات . قد قد الغراب الحالي . ذنبه مؤلف من ٢٠ فقره وكل فقره تحمل زوجاً واحداً من الريش . منقاده مسنن واسنانه مخروطية الشكل . جناحاه وقائمتاه مجهزة بمخالب .

٨٩٠- أُرْخَم

هو من الخيل ما كان رأسه ابيض وسائرته اسود وهي رخاء .

٨٩١- إِرْدَب

- الإردب مكبال يأخذ اربعة وعشرين صنعا . والأردب اربعة وستون مناً || الإردب القناة التي تجري فيها الماء على وجه الارض .

٨٩٢- أُرْدَسِيمُون هو الاريسيموم ، اطلبه .

٨٩٣- أُرْدَع

الاردع من الغنم الذي صدره اسود وباقيه ابيض . يقال كبش اردع وشاة ردعاج . ردع .

٨٩٤- أُرْدِيَة Brique refractaire (F).

Fire-brick (E).
هي الاجرة او القرميدة النارية التي تستعمل في الافران والتي تتحمل اقصى درجات الحرارة .

٨٩٥- أُرْدِيَّات Ardisiaceae (S).

Ardisiacées (F). Ardisiaceae (E).
سبط من فصيلة انقتميات . اجناسه وأنواعه قليلة العدد جميعها جنبايات متوسطة او صغيرة القد منبها فسيح الاربعاء يشمل اكثر الاصقاع الجبلية الاسيوية والافريقية .

٨٩٦- أُرْدِيَّية * Ardisia crenata (S).

Ardisia, Téneller (F). Spear-flower (E). Spitzblume, Ardisia (D). Ardisia (I).
جنبة تزيينية من الاردييات . ساقها اسطوانية ملساء . اوراقها منقطة متقابلة ، نصلها يبيضي الشكل ، مأروف الطرف . ازهارها عنقودي التجميع ، محوري وتاجي الارتكاز . ازهارها خاسية البتلات والاسدية ، وردية اللون . ثمارها عنبة صفراء اللون لا تؤكل || كانت ولا تزال تستعمل ضد الحميات في بعض البلاد الشرقية ومنها سرنديب .

٩٠٦ - أرزوز* Oiseau des Cèdres (F).

Cedar bird (E).

جنس طيور من الجواثم . قليل الانواع . لونه زيتوني احمر الموج والجناح ، اقم الصدر ، ارجل المؤخر ، اصفر البطن ، اسود اللحيين ، ابيض الزمكي || يدثن في شجر الارز والدوح . يعيش اسراباً كبيرة ويعطير بسرعة فائقة بمعان في الجو || من انواعه الارزوز الامريكي الذي تنطبق عليه التحلية المذكورة والارزوز الياباني الاطلس الجناح .

٩٠٧ - أرزوم* Arisema (S).

Arisème (F). Arisema (E).

جنس نباتات عشبية عسقلية معمّرة من فصيلة القلقاسيات . منبتها يمتد من الهند الى اليابان وامريكا الشمالية || اوراقها مركبة مستطيلة الوريقات الورتية العدد . شرايفها مضلعة ، ملونة . ضبابها اسطوانية الشكل . شرايفها محدودة تنعطف على ضبابها || تزرع للتزيين ولا تخشى البرد . ترغب في الاتربة المتوسطة الاندماج ، المتناسبة التركيب العنصري ، الغنية بالمواد العضوية والازوت . انواعها عديدة اشهرها الثلاثة التالية :

٩٠٨ - أرزوم أرجواني العنبر

Arisema atropurpureum (S).

Arisème brun-pourpre (F).

نوع من الارزوم . عشبة سبروتية عسقلية معمرة . منبتها امريكا الشمالية . تملو من ٢٠ الى ٣٠ سم . اوراقها مستطيلة المعاليق ، ثلاثية الوريقات الضيقة . شرايفها يتلون من ١٠ الى ١٥ سم . شرايفها ارجواني العنبر || تنويرها يستمر من حزيران الى تموز .

٩٠٩ - أرزوم أعقف Arisema tortuosum (S).

Arisème tortueux (F).

نوع من الارزوم . عشبة سبروتية عسقلية معمرة . منبتها بعض جبال الهند والافغان . تملو نحو ٣٥ سم . اوراقها مستطيلة المعاليق تتألف من ١٣ او ١٥ او ١٧ او ١٩ او ٢١ وريقة سنانية النصل . شرايفها اقصر من ضبتها المقوسة الشكل . شرايفها يتلون نحو ٣٠ سم . || تنويرها يستمر من حزيران الى تموز .

٩١٠ - أرزوم تيليشي

Arisema dracontium (S). Arisème dragon (F).

نوع من الارزوم . عشبة سبروتية عسقلية معمرة . منبتها اليابان . تملو من ٨٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها مستطيلة المعاليق ، خماسية او سباعية او تساعية الوريقات السنانية النصل ، المستدقة الرأس . شرايفها اقصر من ضبتها المقوسة الشكل . شرايفها معتدل الطول || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

٩١١ - إرزيز Grêle fine (F). Thin hail (E).

البرد الصغير بحجم العدس وما دونه .

٩١٢ - أرز Exerger l'agriculture (F).

تعاطى الزراعة عملياً .

٩١٣ - إرس Essence

إرس الطيب : اصله وجوهه .

٩١٤ - أرز Ars الشئ جعل له علامة .

(اي للألف م) وبعد نثر الشلب يصار الى طمره ثم الى نحره بالماء ولا تصرف عنه الماء الا مرة في الاسبوع او مرة كل خمسة ايام اذا كانت الارض صالحة || وزراعة الارز تستقيم في التربة نحو ١٦٠ يوماً . يبذر في نيسان وايار ويحصد في ايلول وتشرين || اما انتاج الدمن فيراوح بين ٣٠٠ و ٥٠٠ كيلو من الشلب . ونسبة الرز اي الحب المقشور الى الشلب تراوح من ٦٠ الى ٧٠ ٪ .

٩١٥ - أرز ، أرزة Cedrus (S).

Cèdre (F). Cedar (E).

جنس اشجار حرجية كبيرة القد ، دائمة ، أبدية من التنوبيات . انواعه المعروفة اربعة : ارز لبنان والاطلس وحمايا وقبرس .

٩١٦ - أرز الأطلس Cedrus atlantica (S).

Cèdre de l'Atlas (F). Atlas cedar, Atlantic cedar (E). Atlasceder (D). Cedro affricano (I).

ويدعى الارز الفضي والمداد . نوع من الارز هرمي الشكل ، منبسط الاغصان كبيرها . شجرته عظيمة ، دائمة ، تملو من ٣٠ الى ٤٥ م . اوراقها عروية فضية اللون . اكرازها يرمية الشكل تطول نحو ٥ سم . لونها الى الجؤوة البنفسجية || منبتها جبال الاطلس في افريقية الشمالية . يستخرج منه بالحز دهن رائحي شفاف يدعى دهن الارز .

٩١٧ - أرز حملايا ، أرز الهند ، شجرة الجن

Cedrus deodara (S). Cèdre déodar, C. de l'Himalaya, Déodar (F). Deodar, Himalaya cedar, Indian cedar (E). Indische cedar (D). Cedro deodara (I).

نوع من الارز منبته جبال حملايا في الهند . اشجاره ضخمة ، هرمية ، ملتوية القنة ، تملو نحو ٥٠ م . اغصانها منبسطة متدلية الاطراف . اوراقها هدية قصيرة بحرية اللون يحلوها موج اغبر . اكرازها مردنية تطول نحو ١٠ سم . اخشابها خفيفة الوزن النسيبي ، ناعمة الرقة ، متوسطة الصلابة لونها الى الصفار التبي .

٩١٨ - أرز لبنان Cedrus Libani (S).

Cèdre du Liban (F). Cedar of Lebanon (E). Libanonzeder (D). Cedro del Libano (I).

ارزة لبنان شعار الجمهورية اللبنانية || نوع من الارز . منبته جبل لبنان وقد رافق اسمه وذكره تاريخ الأمم منذ التاريخ وهو لا يزال تلك الشجرة الضخمة الشاحنة الجليدة التي لا يقل متوسط ارتفاعها عن الخمسين متراً ومتوسط قطر دوحها عن الثلاثين . ساقها ضخمة ، منتصبة ، مستقيمة دقيقة عند قننها المستمرة الانحناء والاتجاه نحو الشمال . لحاء ساقها حرشة وخشفة . اغصانها غليظة افقية الانبساط ، كثيفة الظل الوارف || اوراقها عروية ، متراصة ، دقيقة ، لونها الى الخضار الاغبر . ازهارها وحيدة المسكن تبشر بالربيع . ثمارها اكراز مسطحة يرمية الشكل كستنية اللون . بزورها مفلطحة مجنحة ، جناحها عريض المادة الغشائية . وهو من الاشجار الشاحنة البطيئة النمو ، المديدة العمر . خشبه ناعم الرقة ، متوسط الصلابة ، يبقى على الدهر لا تشوبه شائبة لانه وافر المواد الراتنجية والادهان الطيارة . لونه الى الصفار الامر . عرفه رائحي فواح .

٩١٩ - إرزاح Echalassage (F). Propping (E).

غرز المرازح بجانب الجفة لدعها .

٩٢٠ - أرزن الأرن شجر صلب تتخذ منه العصي .



أرز الأطلس



أرز حملايا



أرز لبنان



أرزوز



أرزوم

من حدود الألسكا الى الاريزونا والمكسيك || يألف الاحراج الكثيفة . يتسلق الاشجار بخفة ورشاقة . قوته نوامي ولحاء قن الاشجار اخصها الحور والدردار والاسوخة . جحره وكن يديره في صدع جذع شجرة غليظة . انشاء تحمل اربعة اطباء وتضع من الدوصين الى الثلاثة ادراص مرة واحدة في العام .



أرسول

٩٢٦- **أرسيتوكس** Arsetox
حاشور زراعي وهو لمسحوق ناعم يرتكز على زرنبيخات الكلس يستعمل محلولاً بالماء بمعدل ٥٥ سم. / في مكافحة اكثر الحشرات واخصها خنفساء البطاطا .

٩٢٧- **أرسينه ور نحاسي** Arsedor cuprique (F).
فاطور زراعي يستعمل سائلاً محلولاً ١٥٢ / في مكافحة الامراض الفطرية التي تصيب البطاطا .

٩٢٨- **أرسينوكس** Arsenox
فاطور زراعي يستعمل في مكافحة اوصام البطاطا يحل ١ / وتنضج به الاوراق .

٩٢٩- **أرسير** Arseor
حاشور زراعي يرتكز على زرنبيخات الرصاص يستعمل سائلاً محلولاً بمعدل ٨ / في مكافحة دودة الثمار وغيرها من الديدان والحشرات .

٩٣٠- **أرشم** Débouerrer (F). To burst (E).
أرشم الشجر : اخرج ورقه .

٩٣١- **أرشون** Hydnum repandum (S).
Hydne sinuée, Arresteron, Baquette, Barbe-de-vache, Brouquichon, Erinace, Eurchon, Pied-de-mouton, Farinet, Lurchon, Moissins roux, Penchenille, Rignoché, Urchin (F).

نوع من الفطور الصالحة للأكل ينتمي الى فصيلة الابريات ورتبة الدعاميات || ضروريه عديدة مختلفة الالوان والاحجام منها الاصفر والاغير والاطحل والاشهل والبني . جميعها صغيرة القد تعلو الارض من ٤ الى ٨ سم . ارسونها لا قياسية الاستدارة والاحديداب ، تطرها يراوح بين ٤ و ٨ سم . لهاها وافر السماكة ، جامد المقطع ، ابيض اللون ، مستحب الطعم || يكثر وجوده في الادغال والاحراج . يظهر في آب ويبقى حتى تشرين الثاني .

٩٣٢- **أرشبة** ، حاليق ، عطفة .

Vrille (F). Tendril (E).
ورقة تحول فصلها الى ضلع لبني التركيب خيطي الشكل يمكن النبات من التعلق كما في الكرمة واليقطين وما اشبه .

٩٣٣- **أرشيطوط** ، أخطبطوط جبّار Architeuthis (S). Architeuthis, Poulpe géant (F). Giant devil-fish (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الارجل . انواعه المعروفة قليلة العدد ، جميعها لجية قل ما تقترب من الشطوط || اجسامها تطول من ٣ الى ٥ امتار ، اما بسطها اي بسطة جرامزها فتراوح من ١٠٠ الى ١٦ متراً .

٩٣٤- **أرضوصة**

ترايد طبيعي مكور او بلوطي او طبي او درني الشكل يكون عند خاتم الثمرة .

٩١٥- **إرساء المزاد** Adjudication (F).

Adjudication, Auction (E).

هو ان يرسم المبيع بعد المناقصة على من يعرض ادنى ثمن يلتزم به القيام بالعمل على الوجه المشروح في دفتر الشروط وفي المقايضة اي البيان التفصيلي المعروف لتنافس المتنافسين .

٩١٦- **إرساب** Débouillage (F).

Cleansing, Clearing (E).

عملية صناعية تقوم على ترك السوائل بعض الوقت ليذهب سفاً كل ما فيها من لواقظ وزغل .

٩١٧- **أرسان** Arsan

حاشور زراعي يرتكز على زرنبيخات الرصاص يستعمل سائلاً محلولاً بمعدل ٨ / في مكافحة دودة الثمار وغيرها من الديدان والحشرات .

٩١٨- **أرسطولوجية** ، أرسطولوجية

هو الزراوند من النباتات الطبية ، اطلبه .

٩١٩- **أرسطولوجية ثعبانية**

هو الزراوند اشعثاني نبات طبي نافع ، اطلبه .

٩٢٠- **أرسطولوجين**

هو الزراوند جوهري فعال يستخرج من جذور الزراوند .

٩٢١- **أرسوسة** ، رسة ، قلنسوة ، كمة

Calotte (F). Brain-pan (E).

٩٢٢- **أرسوسي** ، رسي ، قلنسوي

نعت تعريفي زراعي يطلق على اشكال الازهار التي تقارب شكل الارسوسة .

٩٢٣- **أرسول** Urcaeola (S). Urcéole (F).

جنس نباتات متسلقة معمرة برية من فصيلة الدفليات . مهدها بعض احراج برمانية وماليزية || ساقها متسلقة فروعها . اوراقها متقابلة ، معتقة ، اهليلجية النصال الجامدة . ازهارها عذقي التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهارها صغيرة لونها الى الخضار الباهت || يستخرج من سوقها بالخز عصاره لزجة مطاطة تستعمل في صناعة بعض انواع المطاط .

٩٢٤- **أرسون** Erethizon (S). Urson (F).

جنس حيوانات لبونة قاضية من فصيلة الثدييات . انواعه قليلة موزنها البلاد الامريكية . اجسامها ضخمة . رؤوسها غليظة . مقاضها مقطوعة . اذانها مسترة بالهلب . خناياها صغيرة صامية المنشق . جرامزها الامامية رباعية الاصابع والخلفية خماسية . اطرافها قوية مستطيلة . اذانها قصيرة كاسية لا أخاذة || اعرف انواعه أرسون كوكو .

٩٢٥- **أرسون كوكو** Erethizon dorsatus (S).

Urson coquau, U. dorsal (F).

نوع من الارسون كبير الجثة غليظها وزنه نحو ١٠ كيلو طوله يراوح من ٦٠ الى ٩٥ سم . وذنبه من ١٨ الى ٢٠ ، هلبه كاس دقيق يتخلله شوك كالمسال يطول نحو ٨ سم . بينما يبلغ طول الهلب اكثر من ١٠ سم . ثوبه مزيج من الاسود والابيض والاسمر || موطنه فسيح الارزاء يمتد



أرسون كوكو



أرشون



أرشية

Termes grandis (S). **٩٤٢ - أرضة كبيرة***

Termite grand (F).
موطنها البلاد الحارة . نياكها يشبه نياك الأرضة العظيمة .
غير أنها ترغب في المرتفعات وفي اطراف الغابات

٩٤٣ - أرضة ناقضة* ، أرضة مخربة

Termes destructor (S). Termita destructeur (F).
أرضة صغيرة القد شديدة الاذى تنقض الاكواخ والبيوت .
نباكها برج مستدير رفيع متراكب القباب المظلية الشكل .
موطنها البلاد الشديدة الحرارة . تقضي على كل ما تصل
اليه من اخشاب وورق وثياب وجلود وجيف وعظام .

٩٤٤ - أرضة ° Géognosle (F). Geognosy (E).

هي علم طبقات الارض .

٩٤٥ - أرضي Agraire, Terrestre (F).

Agrarian, Earthly (E).
كل ما له صلة بالارض او كل ما يتعلق بها .

٩٤٦ - أرضي شوكي* ، خرشوف Cynara scolymus (S).

Artichaut (F). Artichoke (E). Echte artichoke (D).
Artichocco, Cardo senza spine (I).

نبات بقلي من سبط الحرشفيات وفصيلة المركبات الانبوية
الزهر . ضرره عديدة جميعها صالحة للأكل . وهو من
المأككل الصحية السريعة الهضم الغنية ببعض الفيتامينات
والمعادن الضرورية للجسم || يتكاثر بالبذر وبالفسائل
والطريقة الاخيرة هي الافضل لانها تنقل جميع صفات
وميزات الضرب وتحفظ بها . تزرع البذور في مشاتل
خاصة غنية بالدبال والسرقي ، اما في ايلول او في شباط
واذا رُم ثم تنقل الى مستقرها حيث تنرس انفاقاً ، تراوح
مسافاتها البينية والمتخللة من ٨٠ الى ١٠٠ سم . وكذلك
تعالل الفسائل لكنها تنرس في مستقرها ابتداء من كانون
الثاني || والارضى شوكي يفضل الاتربة المتوسطة الاندماج
العبيقة النور الغنية بالدبال وبالعناصر الغذائية .
زراعته تستوجب بعض العناية اهمها العزق والري عند
الحاجة . ثم مكافحة الحشرات واخصها الأرق .

٩٤٧ - أرضيات Termitidés (F). Termitidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة العقفاليات . اجناسها وانواعها
عديدة معظمها من الحشرات الدالة السياء لها يافوخ
وشفران . كلها قارض وبعضها مفترس . اشهر اجناسها
الارضة .

٩٤٨ - أرضيني ° Géodésique (F). Geodesic (E).

كل ما هو مختص بعلم هيئة الارض .

٩٤٩ - أرضاء* Gelsemium sempervirens (S).

Gelsémie, Jasmin de la Caroline (F). Carolina
jasmine, Yellow jasmine (E). Gelber Jasmin,
Glanzen Jasminbignonia (D). Gelsemino della
Carolina, G. giallo odoroso (I).

جنية فرعاء برية وزراعية تزيينية من فصيلة اللوغانيات .
ازهارها لوري التجميع ، زهرتها تشبه زهرة الياسمين وهي
صفراء اللون مستعبة العرف . ج . أرضيات وأراطى وأراط .

٩٥٠ - أرضاء أنيقة* Gelsemium elegans (S).

Gelsémie élégante (F).

جنية معمرة ملتفة برية وزراعية تزيينية من فصيلة
اللوغانيات . مهدا امريكة وقد انتشرت زراعتها في معظم

٩٣٥ - أرض Terre (F). Earth (E).

الارض كوكب يدور في الفلك الشمسي . يتميز بموقعه
المتوسط من الطاقة الشمسية اذ أنه أبعد من مرمى الحرارة
القوية التي تطغي على عطارد واقرب من زحل الذي يكتنفه
البرد والصقيع . ومركزه المتوسط هذا كان الحافز الى
الحياة فثبت على سطحه وتنوعت عليه الكائنات || والارض
كرة مفلطحة تدور اولاً حول الشمس ودورانها هذا يسبب
الفصول المعروفة من ربيع وصيف وخريف وشتاء . وتدور
ايضاً حول نفسها وهذا ما يسبب الليل والنهار . والارض
مغطاة بقشرة صلبة جامدة لا يقل سمكها عن ٥٠ كم .
يعلوها غلاف مائي يغمر اكثر من ثلاثة ارباعها ، وهو
المحيطات وبحاره . ويمتلئها غلاف شفاف غازي
هو الجو || محور الارض قائم بين القطبين وينتهي بهما .
اما قطرها فيبلغ نحو ١٢٨٧٠ كم . ومحيطها يبلغ نحو
٤٠٠٠٠ كم . اما وزنها فلا يقل عن ستة آلاف مليون
مليون مليون طن . ويبلغ طول دورة الارض حول الشمس
نحو ١٤٩ مليون كم . وسرعة سيرها تفوق ٢٧ كم . في
الثانية اي ما لا يقل عن ٩٨٤٧٠ كم . في الساعة || اما
الارض من الوجهة الزراعية فهي تلك الطبقة السطحية
المعروفة بالتربة التي يعيش فيها النبات ، اطلب تربة .

٩٣٦ - أرض بؤر Terre inculte, Vaine, Friche (F).

Waste or fallow land (E).
الارض التي تترك بلا زرع لأسباب .

٩٣٧ - أرض مستحالة ، خيرس Jachère (F).

Fallow (E).
هي التي تركت حولا أو اكثر بلا زرع .

٩٣٨ - إرضاع Allaitement (F). Suckling (E).

التغذية بالخليب من الولادة حتى الفطام .

٩٣٩ - أرضة Termes (S). Termita (F).

White Ant (E).
جنس حشرات من فصيلة الارضيات ورتبة العقفاليات .
انواعها عديدة معظمها غساء اللون طولها نحو السني .
بطنها مستطيل مؤذر ، لها مشفران تقرض بها الخشب ونحوه .
تبني لنفسها نياكاً رفيعة فسيحة عديدة الدهاليز والارجاء
والصحون المتتابعة المتراكبة || موطنها البلاد الحارة
وبعض الاقاليم المعتدلة . نظامها نظام النمل والنحل .
تعيش داخل نياكها تحت امرة ملك وملكة ومجلس شوري
يدبر حالتها الاقتصادية وشرطة تحافظ عليها من الاعداء
وتؤمن نظافة النياك وراحة المقيمين فيه . يقال للانثى المالكة
ياروض ومنهم من استعمله للذكرايضاً || اشهر انواعها يتبع .

٩٤٠ - أرضة شرسة* ، أرضة شجاعه

Termes bellicosus (S). Termita belliqueux (F).

موطنها البلاد الحارة . تتميز بنياكها الفسيحة الرفيعة التي
تبنيها على الارض بالتراب واللحاف والتي تتألف من عدة
قاعات متراكبة وما لا نهاية له من السرايب والدهاليز .
تقضي على جميع انواع الاخشاب والورق والثياب والجلود .

٩٤١ - أرضة عظيمة* Termes giganteus (S).

Termite gigantesque (F).

اجسم انواع الارضة واقلها بطشاً . موطنها البلاد الحارة .
نباكها قليلة الارتفاع ، فسيحة الدوحة ، عديدة الارجاء
والقاعات والدهاليز والسرايب المتتابعة المتراكبة .
تعيش على المواد الخشبية ولا تعف عن شيء .



أرضة شرسة



أرضة عظيمة



أرضة كبيرة



أرضة ناقضة



أرضي شوكي



أرضاء



أرضاء أنيقة



أرطس



أرطلان



أرطاسيا جبيلة



أرطاسيا



إرغات



أرغش الطير

Calligonum (E). Hackenkopf (D). Calligono (I).
جنس جنبات برية وتربينية من فصيلة اللبنيات . مهدا
بعض المناطق الاسيوية الشمالية وافريقية القطبية || انواعه
قليلة منها واحد تزييني يتكاثر بالبذر والعقل . ازهاره
زاهية اللون جميلة الشكل .

٩٥٨- أرطمون Erythrochiton

جنس جنبات وشجيرات حرجية من القسياريات وفصيلة
السذابيات . انواعه ستة اشهرها الارطمون الاحمر ساقه
فرعاء ملساء جرداء . اوراقه كبيرة بحرية انخضار ازهاره
جميلة التكوين لونها الى الاحمر القرمزية .

٩٥٩- إرعاء Palissance, Dépaissance (F).

Forest-pasture (E).
هو ان تربي الحيوانات الالهية في الغابة بدون اذن صاحبها .

٩٦٠- إرعاع Eborgnage (F).

Nipping off of useless buds (E).
الغاية من الارعال اي نزع البراعم هي تحويل النسج بمقدار
اوفر الى الاغصان او الى الزيمات الباقية .

٩٦١- أرعل

الارعل ما تهدل من النبات وما انثى من العشب وطال .
نبت ارعل : طويل مسترخ .

٩٦٢- أرعوة Joug (F), Yoke (E).

الأرعوة : نير الفدان .

٩٦٣- أرعى ، أفرج ، أفرج

Faire paitre (F).
To graze, To feed (E).
ارسل اندابة في المرج .

٩٦٤- إرعغات Ergates faber (S).

Ergate, Ergate forgeron (F).

حشرة من فصيلة القرنييات ورقة نغدييات الاجنحة .
ذكرها اكبر قدأ من انثاها ، طولها نحو ٤٥ سم . رأسه
وصدره الى السمرة المفراء . بردها وصاير الى الجؤوة . زبانه
خيطية طويلة منعكفة الى الوراء || اما الانثى فطولها نحو
٤٠ سم . لونها حنطي يعلوه موج اسفع . رأسها وصدرها
الى السمرة القاتمة || تمتح مكها في قشور جذوع الصنوبر
فيفق عن يرقات خاشبة تنخر وتمطب الشكير والحشب .

٩٦٥- أرغالة طائر من اللقلق . اطلب ابو سن .

٩٦٦- أرغش الطير * ، أرغش عجمي

Argas persicus, A. reflexus (S). Argas de Perse (F).

قراد من الارغشيات بيضي الشكل ، مفلطح الخثة يركب
الطير وخاصة الدجاج فيمتص دمه ويضعفه وقد ينقل اليه
بعض الامراض الوبائية الوخيمة العاقبة || يكافح
باستعمال التريديب ومشتقاته تفييراً في صناديق خاصة
تنضبط على الطائر دون رأسه .

٩٦٧- أرغشيات Argasidae (S).

Argasidés (F), Argasidae (E).

فصيلة من القراديات . اجناسها وانواعها كثيرة العدد .
جميعها صغيرة القد بيضية الشكل مفلطحة . طول ذكورها
نحو ٤ مم . واناثها نحو ٧ مم . تتميز بخلوها من الدقة
وباختباء رأسها وتوابعه تحت مقدم الجسم || معظم انواعها
من القراد الذي يتطفل على الطير والحيوان .

حداث العالم || سوقها مرطام تطول من ٤ الى ٦ امتار .
اوراقها ابدة متقابلة ، مننقة ، سنائية النصال ، ازهارها
محوري الارتكاز . ازهارها شبه بوقية الشكل ، خماسية
الفلق والاسدية ، لونها الى البياض العاجي تعلوه مشعة
وردية . تنويرها يستمر من اوائل حزيران الى اواخر تموز .

٩٥١- أرطس * ، ألوريت

Aleurites moluccana (S). Aleurite, Bancoulier,
Arbre à vernis (F). Candle nut, Varnish-tree (E).
Bancoulnuss, Mehlbaum (D). Albero della vernice (I).

شجرة حرجية من فصيلة الفريونييات ، يستخرج من ثمارها
الدهنية اللوز نوع من الطلاء الصيني الفاخر الصنف يدعى
بنكول . ولثاها ايضاً خواص طبية نافعة اعلمها استعمالاً المشاء .
وقيل ان نقيع ازهارها منه للباه ، وبعض المتود يصفون
بذوره التي تتضمن مواد صمغية فيها شيء من المنبهات .

٩٥٢- أرطل الارطل من الحيوان ما كانت اذناه متدليتين .

٩٥٣- أرطلان * ، بلبل الشعير ، صعوة الخطب

Emberiza hortulana (S). Ortolan, Bruant ortolan (F). Ortolan (E).

عصفور غريد من الدخليات ورقة الجواثم المشرومات
المناكير . يتكاثر في لبنان . طوله من ١٥ الى ١٦ سم .
رأسه وعنقه واعل جوشنه الى الصبهة الرمداء . ظهره الى
الصبهة العابقة ، اسفل جوشنه وبطنه الى الصفار الاطلحل
جناحاه موشان وموشان بالجؤوة العابقة . زمكاه الى
الصبهة الزاهية . ذيله بلون الاباهر والقوادم . منقاره احمر
اللون ورجلاه كذلك || قوته الحشرات والحيوب . يألف
الادغال والمراعي . يعيش من المرتين الى الثلاث مرات في
السنة . انشاء تبيض نحو ٤ بيضات تحضنها منوبة مع
الذكر . يبيضها وردي اللون يعلوه وشم اسمر ونقط سود .

٩٥٤- أرطماسيا ، أرطميس ، أرطميسيا

هو الشيح ، اطلبه .

٩٥٥- أرطماسيا جبالية * Artemisia glacialis (S).

Génépi glacal, Artémise glaciale (F). Silky
wormwood, Glacier wormwood (E). Silberrauce,
Alpen beifuss (D). Genepl (I).

نوع من الارطيس وهي عشبة برية معمرة من فصيلة
المركبات الانبوية الزهر . تنبت في الجبال العالية ، يقال
انها لا تخلو من الخواص الطبية النافعة التي تفيد الامعاء .

٩٥٦- أرطنسية * ، إيدراجه ، يابانية

Hydrangea hortensia (S). Hortensia, Rose du
Japon (F). Hydrangea, Chinese guilder-rose (E).
Hortensia, Japanische rose (D). Idrangea, Ortensia,
Rosa de Giappone (I).

جنبية تربينية من فصيلة القلييات . منبها الاصلي بعض
الاقاليم اليابانية الصينية . سوقها كثيرة متفرعة . اوراقها
مننقة متقابلة شبه بيضية . ازهارها تاجية الارتكاز عشكولية
التجميع لبدة . ضروبها عديدة مختلفة الالوان || وهي
من النباتات التي تخشى البرد القارس وأشعة الشمس اللاذعة ،
ترغب في المواقع القليلة التمرض للشال والجنوب || تتكاثر
بالتعقيل وتجود في المراكن وفي الاتربة القليلة الاندماج
الغنية بمعدني النحاس والحديد .

٩٥٧- أرطس ، رسو Calligonum (S).

Calligone, Oblone Ptérocoque, Trachytelle (F).

٩٧٦- أرغوس جبّار* Argus giganteus (S).

Argus géant (F). Gigantic argus (E).

طائر من الارغوس يشبه الطاووس ويختال اختياله وهو مثل موهور الريش المرقط الملون الجميل. طوله يراوح من ١٨٠ الى ٢٠٠ سم. بما فيه الافنيك الذي يبلغ ١٢٠ او ١٣٠ سم. || مهدد ملقه وسومته وسيام. يألث الغابات الجبلية الكثيفة || قوته الحشرات على اختلافها والبذاق والخزون والديدان والنوامي النباتية ويختلف البزور والحبوب انشاء تبيض من ٨ الى ١٢ بيضة تخصبها وحدها نحو الشهر. تدثن عشها في مكان رفيع بين الادغال وفي الظل.

٩٧٧- أرغول Argulus (S). Argule (F). Argulus (E).

جنس دويبات من القشريات المجذافيات الارجل تتطفل على الاسماك البحرية والنهرية.

٩٧٨- أرغوليات Argulidae (S).

Argulidés (F). Argulidae (E).

فصيلة دويبات حشرية من مجذافيات الارجل اجناسها وانواعها عديدة، اشهرها الارغول.

٩٧٩- أرغون Argon

غاز خامل يؤلف احد عناصر الهواء بنسبة ١٪ يستخدم في صناعة الاضواء الكهربائية القليلة العنف المعروفة بنصف وات.

٩٨٠- أرغوني Urganien

ساف من الطبقة الطباشيرية يعرف بالبرماني، اطلبه.

٩٨١- إرغيس Ecorce du vinettier (F).

Bark of barberry (E).

لحاء اصول شجر عود الريح (ابن البيطار). تستعمل في الطب كقابضة ومقوية وقد تنفع موضعياً في التهاب الملتحمة وباطنياً في بعض الحميات اخصها الملاريا..

٩٨٢- أرقة، جالون Jalon (F).

Levelling-staff, Picket (E).

علامة من خشب او حديد على شكل العصا تستعمل في مسح الاراضي.

٩٨٣- أرفش

الارفش من الحيوان ما كانت اذناه كبيرتين، م. رَفْشاء ج. رُفْش.

٩٨٤- إرفنجية* Irvingia (S).

Irvingie (F). Irvingia (E).

عوبة هو الاسم المشهور في الغابون. جنس اشجار برية وزراعية من فصيلة السمروبيات. انواعها المعروفة لا تتجاوز الستة اعطائها بعض المناطق الاستوائية والحارة من العالم القديم اخصها الغابون في افريقية والانام في آسيا || اشجارها معتدلة الارتفاع مرطام اللحاء. افتادها الفتية محفوفة العقد باطواق تبدو كالدمالج. اوراقها متعاقبة، معنقة. نساها اهليلجية الشكل، سنائية الاطراف، جامدة الوثل. ازهارها عشكولي التجميع، ابطي الارتكاز. ازهارها صغيرة القد، خماسية البتلات، عشارية الاسدية، صفراء اللون، عطرية العرف. ثمارها نووية مأكولة قدرها قدر البيضة الكبيرة. عجائها دهنية المادة يستخرج منها سمن «الديكا» الذي يماثل سمن الكاكاو. اما دهن

٩٦٨- أرغل Monter en graines (F).

أرغل الزرع: جاوز سنبله الاحلام. والاسم الرغل.

٩٦٩- أرغمون* Argemone (S). Argémone (F). Devil's fig, Yellow

thistle, Prickly poppy (E). Doppelklappen, Stachelmohn (D). Argemone (I).

جنس نباتات عشبية طيبة حولية من فصيلة الخشخاشيات. انواعه نحو ١٢ معظمها بري وبعضها تزييني. سوقها هليبية شائكة. اوراقها متعاقبة، حاضنة، ريشية، مخزومة. فصلها مزركش، ابيض التصليع. ازهارها فردية مختلفة الالوان. ثمارها كمار بيضية الشكل، بزورها دقيقة حنطية اللون || يستخرج من سوقها عصارة لينة، لزجة كاوية، صفراء اللون، تستعمل في تطبيب بعض الامراض الجلدية || اشهر انواعه الزراعية التزيينية ما يلي.

٩٧٠- أرغمون أبيض Argemone alba (S).

Argémone blanche (F).

نوع من الارغمون. مهدد امريكة الشمالية. يعلو من ٥٠ الى ٨٠ سم. ازهاره مستطيلة الزناد، كبيرة القد، قطرها نحو ١٠ سم. لونها الى البياض العاجي || ازهاره يستمر من ايار الى حزيران.

٩٧١- أرغمون المكسيك* Argemone mexicana (S).

Argémone du Mexique (F).

نوع من الارغمون. مهدد بلاد المكسيك. يعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. ازهاره صفر، قطرها نحو ٦ سم. ازهاره يستمر من حزيران الى تشرين.

٩٧٢- أرغمون كبير الزهر Argemone

grandiflora (S). Argémone à grandes fleurs (F).

نوع من الارغمون. مهدد امريكة الجنوبية. ساقه واوراقه قليلة الشوك. يعلو من ٧٠ الى ١٠٠ سم. ازهاره كبيرة القد، قطرها نحو ١٠ سم. لونها ابيض او وردي. ازهاره يستمر من تموز الى ايلول.

٩٧٣- أرغن بحري* Tubipora (S).

Tubipore, Orgue de mer (F).

Tubipore, Organ-pipe coral (E).

مجموعة حيوانات بحرية ركنية من المجوفات. قوامها انابيب كلسية التركيب، مترابطة، حراء اللون، تعيش في داخلها حيوانات مزهارية. || مدنها، اي مجموعات انابيبها، يطول ويعرض مئات الامتار ويرتفع من مترين الى عشرة امتار واكثر || يكثر وجودها في بعض مناطق المحيط الهندي.

٩٧٤- إرغوتين Ergotine (F). Ergotin (E).

هي العاكوبين والدابرين مادة شبه قلوية توجد في الحبوب المصابة بالعاكوب.

٩٧٥- أرغوس Argus

جنس طير من فصيلة التدرجيات. كبير الحجم، يتميز بكشته الدقيقة المنتصبة، بطول عنقه، بوفرة ريشه الجميل، باستطالة خوافيه الناعمة الريش وبافنيكه المهدب المهدل المترامي || انواعه المعروفة قليلة اشهرها الارغوس الجبار.



أرغون المكسيك




أرغن بحري



أرغوس جبّار



إرفنجية



أرقيّة الختان



أرقيّة الخوخ



أرقيّة الشتاء



أرقيّة الصنوبر



أرقيّة الكشمش



أرقيّة عابلة



أرق أسود

Cheimatoble, Phalène hiemale, Verreau (F). Common wintermoth (E). Kleiner frostspanner (D).

فراشة صغيرة ثوبها ورواشنها الى الصهبة الحنطية. يرقاتها يمداء اللون تركب جميع انواع الاشجار الحرجية والمشمرة. تلهم البراعم والاوراق الفتية || تكافح كغيرها باستعمال احد الحواشير الفعالة.

٩٩١- أرقيّة الصنوبر*، صندل

Bupalus piniarius (S). Phalène du pin (F).

Pine looper moth (E).

Gemeiner Kiefernspanner (D).

فراشة صغيرة القد، حنطية اللون، عابرة الرواشن التي تعلوها في وسطها بقع صفراء. الانثى اكبر حجماً من الذكر واقتم لوناً. تمتع مكناها، الذي يراوح عدده من ٣ الى ١٥، صفراً مستقيماً واحداً على نصل الورقة الهديئة. فينقف عن يرقات صغيرة تعيش كامل حياتها اليرقية على اهداب الصنوبر فتقتضها وتؤذيها.

٩٩٢- أرقيّة الكشمش*، Abraxas grossulariata (S).

Phalène du groseillier, Zérène du groseillier (F). Common magpie moth (E). Stachelbeerspanner (D).

حشرة صغيرة حنطية اللون يعلو ثوب ظهرها نقط سود. رواشنها الى الغبار الازرق تعلوه رقشة سوداء. تظهر في حزيران وتموز. الانثى اكبر حجماً من الذكر وأعم ثوباً وأقل رقشة || اليرقة صغيرة، دقيقة، حنطية المدب، بيضاء الجانب رقشاء الظهر، تركب الكشمش واللوز فتعريهما من الاوراق || تكافح عند ظهورها قبل تفاقم شرها.

٩٩٣- أرقيّة عابلة*، Hybernina defoliaria.

Erannis defoliaria (S). Hibernia, Phalène défeuillante (F). Mottled-umber moth (E). Grober frostspanner (D).

فراشة صغيرة حنطية الثوب، مزرقة الرواشن المرقشة. الانثى عديمة الجناح. اليرقة بنية اللون يعلو ظهرها وبطنها خضوط سود مستطيلة. رأسها احمر. مدبها اسمر || تفتك بالاوراق فتعبلها وتعري الاشجار منها.

٩٩٤- أرقيط*، Aerophyte

هو كل نبات يعيش في الهواء بعكس النباتات المائية التي تعيش في المياه.

٩٩٥- أرق*، Aphidiphage (F). Aphidiphagous (E).

كل حشرة نافعة من غشائيات الاجنحة تفتك الأرق.

٩٩٦- أرق، من، أفييس، ندوة عسليّة

Aphis, Puceron (F). Aphidis, Aphis (E).

جنس حشرات من فصيلة الارقيات ورتبة متجانسات الاجنحة. معظم انواعه تعمل، حيث تستقر على النبات، مادة لزجة حلوة تعرف بالبن او الندوة العسلية ولذلك اطلقوا عليها اسم فعلها || يكافح الأرق باستعمال النيكوتين ومشتقاته وبعض انواع الحواشير || اما انواع الارق فعديدة لا تقل عن ٧٥ تخص منها بالذكر:

٩٩٧- أرق أسود*

Aphis rumicis, Doralis rumicis (S).

Puceron noir, Puceron de l'oseille (F).

Dock aphid (E). Ampferblattlaus (D).

حشرة صغيرة من الارقيات طولها من ٣ الى ٤ مم. تركب ما لا يقل عن ٢٠٠ نوع من النبات وقد تؤذيها جميعها.

الانواع الانثامية ويدعى «كاي كاي» فانه يستعمل في صناعة الشمع.

٩٨٥- أرقي، مساح

Géomètre, Arpenteur, Chaîneur (F). Geometer, Land-surveyor, Surveying (E).

هو من اخص بعلم المساحة. فيمسح الارض والمقار ويعين الحدود...

٩٨٦- أرقيّات، ذارعات، Geometridae (S).

Géométridés, Phalénidés (F). Measuring worms, Inchworms, Spanworms, Loopers (E). Spanner (D).

فصيلة حشرات من مختلفات القرون ورتبة حرشفيات الاجنحة. اجناسها وانواعها عديدة معظمها صغير الحجم يغلب فيها اللون الرمادي تعلوه الزراكن الجميلة النقش. يرقاتها مستديرة الجسم تتميز بخلو حلقاتها البطنية الوسطى من الارجل لذلك فهي تنقوس عند الانتقال. اما لوانها فمختلفة منها الاخضر والاكر والاسمر والمخطط.

٩٨٧- أرقيّة، ذارعة، Phalène (F). Phalaena (E).

جنس حشرات فراشية من الارقيات. انواعه عديدة جميعها صغيرة القد، لوانها الى السمرة، رواشنها الى الغبرة تعلوها زراكن مختلفة || يرقاتها صغيرة، دقيقة، مستطيلة. تركب اوراق النبات على اختلاف فصائله واجناسه. اشهر انواعه وأعمها ضرراً ما يتبع.

٩٨٨- أرقيّة الختمان*

Ourapteryx sambucaria (S).

Phalène du sureau (F).

Ourapteryx sambucaria (E).

حشرة من الارقيات ورتبة حرشفيات الاجنحة. موطنها معظم الاقاليم المعتدلة الحرارة من الشرق الاوسط واروبة. تألف المواقع الرطبة. فراشاتها جارية قوتها رحيق الازهار. اساريها خاضعة قوتها نصال الاوراق || جسمها متوسط القد، يطول من ١٩ الى ٢١ مم. بسطها تراوح من ٥٦ الى ٦٠ مم. رأسها معتدل الجرم. عينها كبيرتان، ناشزتان. زباناها خيطيان مستطيلان. مرشفها معتدل الطول والفلاظة. جوشنها وبطنها الى الصفار الاشقر الموج || رواشنها الاماميان الى الصفار الكبريتي تعلوه خضوط معتدلة سمراء اللون. رواشنها الخلفيان الى الصفار الكبريتي يتوسطه خط معترض اسمر ونقطة جزوية قريبة من الطرف || لها جيل واحد في الحول. تظهر الفراشة في اواسط الربيع وتبقى حتى اواسط الصيف. تسرح في الليل. تعاغل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتدح الممكن لطخاً تغلفها مادة غروية تثبتها على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة عند ادراكها الكمال تطول من ٥٠ الى ٦٠ مم. جسمها شبه اسطواني الشكل يبدو كأنه قطعة من قضيب مالمس القشار، ثلاثي الشعول. رواجها البطنية الوسطى شديدة القص مما يحدو بها الى التقوس ثم الشب عند الانتقال. ثوبها يمانن البيئة التي تعيش فيها.

٩٨٩- أرقيّة الخوخ*

Lygris prunata (S).

Phalène du prunier (F).

يرقاتها خضراء اللون في اول عهدها ثم طحلاء واخيراً زراية. تركب عدة نباتات اخصها الخوخ فتقرص اوراقه. تكافح عند ظهورها باستعمال احد الحواشير الشديدة الميوعة والاتصاق.

٩٩٠- أرقيّة الشتاء، ماشوط

Cheimatobia brumata, Operophtera brumata (S).

١٠٠٧- أرق الدرة * *Aphis sorghi* (S).

Puceron du sorgho (F).

يركب الدرة ويضر بها كثيراً اذا صادف غزوه وقت الازهار.

١٠٠٨- أرق الدرة الاسمر * *Aphis maydis*.

A. avenae (S). *Puceron sombre des céréales* (F).

Corn leaf aphid (E). *Maisblattlaus* (D).

حشرة صغيرة مستطيلة سمراء اللون خضراء البطن ، طولها من ١ الى ٢ مم. يكثر وجودها في البلاد الحارة ، تتركب الدرة والذرة الصفراء والقصب والحنطة والشعير والشوفان .

١٠٠٩- أرق الرمان * *Aphis punicae* (S).

Puceron du grenadier (F). *Pomegranate aphid* (E).

يركب اوراق الرمان وازهاره وهو صغير القد اخضر اللون اسود العوينات .

١٠١٠- أرق الزان * *Phyllaphis fagi* (S).

Puceron du hêtre (F). *Woolly beech aphid* (E).

Buchenzerlaus, *Buchenblattbaumlau* (D).

حشرة صغيرة صفراء اللون مغطاة بخيوط زغبية شمعية بيض . تتركب اوراق الزان وتؤذيها .

١٠١١- أرق الزرع * *Paracletus cimiciformis* (S).

Puceron des céréales (F). *Grain aphid*, *Greenbug* (E). *Getreidelau* (D).

يركب جذور الزروع واخصها الحنطة والشعير والشوفان فيمتص عصارتها ويؤذيها .

١٠١٢- أرق الزرع المجنح * ، أرق النجيليات

Anoecia corni (S). *Puceron ailé* (F).

حشرة صغيرة القد ضخمة الشكل كبيرة الاجنحة ، طولها نحو ٢ مم. زباناها مركبة من ٦ فواصل . لونها اخضر فاتح يعلو ثليج ظهرها خط اخضر عابق || تتركب جميع انواع الزروع اخصها القمح والشعير .

١٠١٣- أرق الزيتون * *Aphis tilliae*.

Eucallipterus tilliae (S). *Puceron du tilleul* (F).

Brasswood aphid (E). *Lindenzerlaus* (D).

حشرة صغيرة القد مجنحة لونها الى الصفار الوردي . رأسها اسود ، زباناها خيطية مستطيلة ، ارساغها سمر || تتركب اوراق الزيتون فتؤذيها كثيراً .

١٠١٤- أرق الصقلاب * *Aphis asclepiadis*.

Anuraphis nerli (S). *Puceron du laurier* (F).

حشرة صغيرة طولها نحو ٢ مم. لونها اصفر ذهبي . تتركب اوراق الصقلاب وتؤذيها .

١٠١٥- أرق الفول * *Aphis fabae* (S).

Puceron de la fève (F). *Bean aphid* (E). *Schwarze bohnenoder*, *Rübenblattlaus* (D).

يركب السوق والاوراق والازهار وقد يحول دون العقد او يمنع النمو .

١٠١٦- أرق القت الاسود * ، أرق البقول ، من البقول

Aphis laburni, *A. crassivora*, *A. medicaginis*,

A. robiniae, *A. leguminosae* (S). *Puceron noir de la luzerne* (F).

حشرة صغيرة ناهمة من الارقيات ، شائعة الانتشار ، لونها الى السواد اللامع ، رأسها وجوشنها اشد اسوداداً من سائر جسمها . ارجلها سمر ، اما سيقانها فغبراء اللون . يرقاتها صغيرة القد ، تبدو خضراء اللون ثم تميل تدريجياً الى ان تستقر على اللون البني القاتم || وهو من اضر

٩٩٨- أرق الاجاص * *Aphis pyri* (S).

Puceron du poirier (E). *Pear aphid* (E).

يركب الافنان النضرة والتوامي وجديد الاوراق فيؤخرها عن النمو ويعرضها لانتقال الامراض .

٩٩٩- أرق البازيلا * ، أرق البستة

Aphis pisti, *Macrosiphum pisti* (S). *Puceron du pois* (F). *Pea aphid* (E). *Erbsenblattlaus* (D).

يركب الفروع النامية والاوراق المستجدة والازهار فيحد من نشاطها الحيوي وقد يسبب سقوط الزهر قبل عقده .

١٠٠٠- أرق التبغ * *Aphis tabaci* (S).

Puceron du tabac (F). *Tobacco aphid* (E).

يركب هامة الشتل مع اوراقها العليا . فيمتص النسغ ويعمل منه اللزج . يشل النشاط الحيوي ويؤذي الازهار ويحول دون سلامة التجفيف الصحيح .

١٠٠١- أرق التفاح * *Aphis pomi*, *Aphis mali* (S).

Puceron du pommier, *P. vert du pommier* (F).

Green apple aphid (E). *Grüne apfelblattlaus* (D).

يركب الزيمعات النامية والاوراق الفتية فيؤذيها .

١٠٠٢- أرق الجوز * *Callipterus juglandis* (S).

Puceron du noyer (F). *Dusky-veined walnut aphid* (E). *Gestrelfte Walnusszerlaus* (D).

حشرة صفراء اللون مؤذرة باربعة خطوط سود . طولها من ٣ الى ٤ مم . زباناها الى الصفار القاتم ، عويناتها الى الحمرة المرجانية || تتركب نوامي الجوز وازهاره واوراقه الفتية .

١٠٠٣- أرق الدراقن الاخضر * *Hyalopterus*

arundinis (S). *Puceron vert du pêcher* (F). *Mealy peach aphid* (E). *Mehlige pfirsichblattlaus* (D).

حشرة صغيرة مستطيلة طولها نحو ٢ مم. لونها الى الخضار الاطحل . عويناتها سمر ، زباناها خيطية مستطيلة . المجنحة منها سوداء الرأس || تتركب نوامي واوراق الدراقن فتتوقع بها اشد الاذى .

١٠٠٤- أرق الدراقن الاسود * *Anuraphis persicae*.

Anuraphis persicae-niger (S). *Puceron noir du pêcher* (F). *Black peach aphid* (E). *Schwarze Pfirsichblattlaus* (D).

حشرة صغيرة القد مكورة الشكل متعددة الالوان التي يغلب فيها الاسود والبني الاسفع || تتركب الدراقن وجميع الاشجار اللوزية فتتوقع بنواميها واوراقها الفتية شديد الاذى .

١٠٠٥- أرق الدراقن الأطحلى * *Myzodes persicae*.

Aphis persicae, *A. vulgaris* (S). *Puceron gris du pêcher* (F). *Green peach aphid*, *Peach aphid* (E). *Grüne pfirsichblattlaus* (D).

حشرة صغيرة القد بيضية الشكل طولها نحو ٢ مم. تتركب جميع الاشجار اللوزية اخصها الدراقن ولا تعف عن التبغ والبطاطا .

١٠٠٦- أرق الدراقن البني * *Pterochlorus persicae*.

Lachnus persicae (S). *Puceron brun du pêcher* (F).

Peach aphid (E). *Pfirsichblattlaus* (D).

حشرة صغيرة اجاصية الشكل طولها من ٤ الى ٥ مم. لونها بني ، ظهرها يحمل ٧ اتيق متوازية من النقط السود . مهداها الشرق الاوسط ، تتركب الدراقن ولا تعف عن المشمش والتفاح والسفرجل .

١٠٠٧- أرق الدراقن البني * *Pterochlorus persicae*.

Lachnus persicae (S). *Puceron brun du pêcher* (F).

Peach aphid (E). *Pfirsichblattlaus* (D).

حشرة صغيرة اجاصية الشكل طولها من ٤ الى ٥ مم. لونها بني ، ظهرها يحمل ٧ اتيق متوازية من النقط السود . مهداها الشرق الاوسط ، تتركب الدراقن ولا تعف عن المشمش والتفاح والسفرجل .

١٠٠٨- أرق الدراقن البني * *Pterochlorus persicae*.

Lachnus persicae (S). *Puceron brun du pêcher* (F).

Peach aphid (E). *Pfirsichblattlaus* (D).

حشرة صغيرة اجاصية الشكل طولها من ٤ الى ٥ مم. لونها بني ، ظهرها يحمل ٧ اتيق متوازية من النقط السود . مهداها الشرق الاوسط ، تتركب الدراقن ولا تعف عن المشمش والتفاح والسفرجل .



أرق الدرة



أرق الاجاص



أرق الدرة الاسمر



أرق البازيلا



أرق الرمان



أرق التبغ



أرق الزان



أرق التفاح



أرق الزرع



أرق النجيليات



أرق الزيتون



أرق الدراقن الاخضر



أرق الصقلاب




أرق الدراقن الاسود



أرق الفول




أرق الدراقن البني




أرق البقول



أرق الدراقن البني



أرق القت الاسود




أرق الدراقن البني



أرق القت الاسود




أرق الدراقن البني



١٠٢٤- أرق النجيليات *
Aphis graminum,
Toxoptera graminum (S). Puceron des graminées (F).
Spring wheat aphid (E). Getreideläus (D).

حشرة صغيرة لونها أخضر تظهر في أواخر الشتاء وأوائل الربيع فتركب حذف النجيليات على اختلاف أنواعها وأخصها الزروع فتتمتص عصارتها وقد تمنعها عن الإنبال.



١٠٢٥- أرق الورد الأخضر *
Macrosiphum rosae,
Siphonophora rosae (S). Puceron vert du rosier (F). Rose aphid (E). Rosen blattlaus (D).

حشرة صغيرة القد مستطيلة الجسم والأرجل والزباني. طولها من ٣ إلى ٤ مم. لونها الغالب الأخضر وقد تكون ليلكية. رأسها أخضر عابق وقرونها سود. تركب أزهار الورد وأوراقه الفتية.



١٠٢٦- إرقاق ، إلماص *
Véraison (F). Ripening (E).
حال حبة العنب بعد الحصرمة وقبل الإنباع.

١٠٢٧- أرقان * ، أرجان ، لوز البربر
Argania sideroxylon (S). Arganier, Olivier du Maroc, Bois de fer (F). Argan tree, Morocco Iron wood (E). Arganbaum, Eisenholz (D). Argania, Albero legnoferro (I).

شجرة حرجية شائكة من فصيلة السبوتيات منبها بلاد المغرب تكثر في الأحراج المراكشية. أخشابها قاسية شديدة الصلابة. أوراقها معنقة متعاقبة. نصلها صغير القد، رمحي الشكل، جلدي النسيج. أزهارها أبطية الارتكاز، خنثوية، خاسية البتلات والأخية. ثمارها نووية، جوزية الحجم. سؤذقها يغلّف عجة صلبة تحوى في داخلها لوزة يستخرج منها زيت البربر أو زيت الأرقان الكثير الاستعمال في البلاد المراكشية.

١٠٢٨- أرق قطنية * اطلب من قلبي.

١٠٢٩- أرقط *
Moucheté (F). Flea-bitten (E).
الرقطة هي نكت شعر اسود مبعثرة في ثوب الفرس. والفرس أرقط.

١٠٣٠- أرقطيون * ، عمي خذني معك

Arctium lappa, A. tomentosum, A. bardana (S).
Bardane, B. tomenteuse (F). Burdock, Beggar's buttons (E). Filzklette, Grossbergk, Klette (D).
Bardana, Lappolone, Cappellacci (I).

نبات طبي بري معمر من فصيلة المركبات. يكثر في البور وعلى حافة الطرقات. جذوره درياء، غليظة وطويلة. ساقه فرعاء اسطوانية، ليفية. أوراقه معنقة، متعاقبة، نصلها كبير الصفحة القلبية الشكل المجددة. أزهاره رؤسية التجميع، تاجية الارتكاز. رؤسيتها تعلق بثياب من اقرب منها || جذوره تستعمل في معالجة الأمراض الجلدية.

١٠٣١- أرقطيون رأس الحمامة *

Arctium lappa major (S). Bardane majeure, Glouteron, Herbe aux teigneux (F). Bachelor's buttons (E). Grosse klette, Dockenkrout (D).
Lappola, Persolata (I).

ضرب من الأرقطيون. يجلته كبيرة الحجم، جذوره تستعمل في علاجات الأمراض الجلدية. يحوى بعض المواد الحريفة وعلى زيت عطري ينفع السعال. وقد قيل عنه انه « لا يعده شيء في أمراض الفم والاسنان ».

أنواع الأرق لانه لا يعف عن نبات. يركب جميع نباتات الفصيلة القرنية والقطن والائل والورد الخ.

١٠١٧- أرق القطن * ، أرق الشمام * ، من القطن من الشمام

Aphis frangulae, A. gossypii,
A. citrifolii, A. citrulli, A. cucumeris, A. cucurbitae, A. malvoides, A. parvus (S). Puceron du cotonnier, P. du melon (F). Cotton aphid, Melon aphid (E). Gurkenblattlaus (D).

حشرة صغيرة من الأرقيات. اسمائها العلمية عديدة. طول الحشرة المجنحة نحو ٢ مم. لونها إلى الخضار الأزرق. رأسها اسود بطنها برتقالي. اما غير المجنحة فلونها إلى الصفار الليموني. وهذه الحشرة شلأمان عند مؤخر بطنها تفرز منها مادة شمعية تستعملها لحماية نفسها من الإعداء. تركب الأوراق والأفنان فتتمتص العصارة النسفية وتنشي النسج بمادة سكرية لزجة تسبب عدم استمرار النمو وسقوط الأزهار قبل مناعة معاليقها || اما النباتات التي تركبها فعديدة أخصها القطن والقرعيات.

١٠١٨- أرق القوقحان *

Macrosiphonella chrysanthemi, Macrosiphum Ch. M. samborni (S). Puceron des chrysanthèmes (F). Chrysanthemum aphid (E). Dunkle chrysanthemenlaus (D).

حشرة صغيرة مستطيلة مفلطحة طولها من ٢ إلى ٣ مم. لونها لون الأكاجو اللامع، زباناها عابقة، أرجلها سود || تركب الكرزينم وجميع أنواع القوقحان.

١٠١٩- أرق الكرز *

Myzus cerasi (S).
Puceron noir du cerisier (F). Cherry black fly (E). Schwarze kirschenblattlaus (D).

حشرة صغيرة سوداء اللون طولها ٢ مم. تركب الأوراق الفتية فتجمدها وتلفها، تعمل الكثير من المن لذلك فالنمل لا يفارقها وقد يربها.

١٠٢٠- أرق الشمش *

Capitophorus ribis,
Aphis ribis (S). Puceron jaune du groseillier (F). Currant blister aphid. (E). Gallenblattlaus der Johannisbeere (D).

حشرة صغيرة القد مستطيلة، طولها أقل من ٢ مم. لونها من الاصفر إلى البرتقالي. عويناتها حر، زباناها مستطيلة. تركب الشمش فتجمد أوراقه وتؤذيه.

١٠٢١- أرق اللوز *

Rhopalosiphum nymphaceae (S).
Puceron de l'amandier (F). Almond aphid, Plum aphid, Waterlily aphid (E). Sumpfpflanzenlaus (D).

يركب اللوز والشمش والخوخ فيؤذي الأوراق ويجمدها.

١٠٢٢- أرق الملقوف *

Aphis brassicae (S).
Puceron cendré de chou (F). Cabbage aphid, Mealy cabbage aphid (E). Kohlblattlaus, Mehliges Kohlblattlaus (D).

يركب الملقوف وأكثر النباتات الصليبية. لونه رمادي. طولها نحو ٢ مم. رأسه احمر، عويناته سود، زباناها قصيرة مركبة من ٦ فواصل.

١٠٢٣- أرق الموز *

Pentalonia nigronervosa (S).
Puceron des bananiers (F). Banana aphid (E). Bananenblattlaus (D).

حشرة صغيرة مستطيلة، لونها أخضر، طولها نحو ٣ مم. تركب الموز وتنقل اليه مرض تورّد القمة.



أرقطيون



أرقطيون رأس الحمامة

١٠٣٧ - إَرْكَان ° ، تَرْكِين °
Investissement (F). Investment, Investing (E).
الاركان او التركين ، توظيف المال واستثماره .

١٠٣٨ - أَرْكَة *
Orca (S). Orque, Epaulard (F).
Orc, Whale or grampus (E).

جنس دلافين كبيرة من الحوتيات اللبونة . له نوعان فقط المقتال والمستأنف . موطنها جميع البحار . جثتها غليظة وطويلة ، حجمها العادي من ٥ الى ٦ أمتار وبعضها يبلغ عشرة أمتار || تعيش جماعات وتنتقل بسرعة مذهلة . تلهم كل ما وصلت اليه .

١٠٣٩ - أَرْكَة مِسْتَأَف
Orca rectispina (S).
Epaulard armé (F).

نوع من الأركة يكثر في المحيط الهادي . ضخم الجثة طوله نحو خمسة أمتار . ثوبه الى السمرة الكدرة ، ظهره شديد السواد يتميز بكبر وارتفاع زعنفته الظهرية .

١٠٤٠ - أَرْكَة مِقْتَال
Orca gladiator (S).
Epaulard commun (F).

نوع من الأركة يوجد في جميع البحار غليظ الجثة مستطيلها طوله يراوح من ٦ الى ١٠ أمتار ، ابلق اللون سواد ظهره ادهم غيب وبياضه لا يخلو عن الصفار . وهو شرس الخلق جسور لا يعف عن شيء .

١٠٤١ - أَرْكَوتِين
Arkotine D. 10
حاشور زراعي يرتكز على مادة « د.د.ث. » يستعمل سائلاً محلولاً بمعدل ١٪ في مكافحة دودة الثمار وغيرها من الديدان والحشرات .

١٠٤٢ - أَرْكُوم ° ، أَبْغُمْبَة °
Bucorvus (S).
Bucorve, Bucorax (F). Bucorvus (E).

أركوم وأبغمبه هما اشيع اسماء هذا الطائر في بلاد الحبشة والنوبة || جنس طير من فصيلة الاركوميات . انواعه قليلة العدد ، اعطانها بعض البلاد الافريقية اخصها الحبشة والسودان وكنيه وأوغندا ... جميعها كبيرة الاجسام ، غليظة المناقيد المتوجة بخوذ قرنية مجلوبة الطرف الامامي الاجوف . وتتميز ايضاً برعائتها الجرابية الجفوية اللون الممتدة والمتدلية من اشدائها الى اطراف اعناقها || اشهر انواعه واعرفها أركوم الحبشة .

١٠٤٣ - أَرْكُوم الحَبَشَة °
Bucorvus abyssinicus (S).
Bucorve d'Abyssinie (F).

نوع من الاركوم . اعطانه الحبشة والبلاد المجاورة الخاضعة لنفس العوامل التنوخية والمناخية || جسمه كبير القد يطول نحو ١١٠ سم . ثوبه الى السواد الفصحي الاسفع الموج باستثناء القوازم فانها الى البياض المظوب ببعض الصفار || يعيش ذكراً وانثى لا يفترقان حتى الموت . يعدو على الارض بسرعة ويحلق في الفضاء بعيداً . وهو اذا غضب يصفق بجناحيه ثم يرفع ذنبه كما يفعل ديك الحبش ويرفخ جراب رعته فتبدو كالضرب الاحمر || قوته الحشرات والديدان والحللاذين والعظام والصفادع والافاعي والقنار والجردان وبعض حبوب وجذور النباتات البرية || يدشن عشه في صدوع جذوع الاشجار الضخمة او بين انقاضها المنبطحة . الانثى تضع من ١٠ الى ١٢ بيضة صغيرة القد ، كروية الشكل ، بيضاء اللون ، تحضنها بمثابة الذكر نحو ثلاثة اسابيع .

١٠٣٢ - أَرْقَم ، أَيْم ، أَيْن
Zamenis
جنس حيات من فصيلة الثعبانيات ، انواعه عديدة منتشرة في جميع الاصقاع العالمية . جميعها حفت رقباء طويلة دقيقة ربداء مريقة بحمرة وسواد وكدره وبذبة ، مرقطة الجانبين . مدنها الى البياض او منقط بالسواد . ولها خط اسود تحت كل من عينيها .

١٠٣٣ - أَرْقِيَّات ° مَنِّيَّات °
Aphididae (S).
Aphidides, Aphidiens, Pucerons (F). Aphids, Plant lice, Green flies (E). Echte Blattläuse (D).

فصيلة حشرات من رتبة متجانسات الاجنحة وطبقة نصفية الجناح . اجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها صغيرة القد عديمة الاجنحة وفي حال وجودها تكون شفافة قليلة العروق . قرونها الاستشعارية مركبة من ٣ الى ٦ فواصل . ارساغها مزدوجة العقل . جميعها تحمل زوائد بطنية تفرز مادة قلووية . وبعضها يحمل غدداً خاصة تفرز مادة شمعية بيضاء كندف القطن او كالحبوط الدقيقة || اثوابها مختلفة الالوان يغلظ فيها الاسود والاسمر والاخضر والاصفر || تركيب النبات وتغذى من نسفه . اشهرها وأفتكها الفيلوكسرا والأرق والمن القطني .

١٠٣٤ - إَرْقِيس * ، مَتْن ، مَفْصَلِيَّة
Desmodium gangeticum (S). Desmodie (F). Tick trefoil (E). Bündelhülse (D). Desmodio (I).

جنية تزيينية معمرة من فصيلة القرنيات الفراشية ، منبتها البلاد الاستوائية ، سوقها ليفية منتصب ، اوراقها معنقة طويلة المعاليق ، متعاقبة ، رحيمة ، جلدية ، مسترسلة نحو الارض . ازهارها عثكولي التجميع تاجي الارتكاز . زهرتها جميلة الشكل مستحبة العرف || ثمارها قرنية شرافية مستطيلة تضم عدة بزور مفلطحة جوزية اللون .

١٠٣٥ - إَرْقِيس هندي ، دَسْمُودِيوم ، مَفْصَلِيَّة البنغال
Desmodium gyrans (S). Desmodie du Bengale, Sainfoin oscillant (F). Moving plant, Telegraph plant (E). Telegraphen bündelhülse (D). Sanofiemo viva (I).
نوع من الارقيس مهدد البنغال من اعمال الهند . وهو جنية صغيرة محولة تزرع للترزين ترتفع نحو المتر . تتميز بوريقاتها المعلاقية العنق ، الصغيرة أنصل التي تدور على نفسها دورة كاملة . مدة من الزمن لا تقل عن الدقيقتين ولا تزيد على الخمس . هذا عندما تكون الحرارة البيئية من ٢٢ درجة سنتيغراد وما فوق .

١٠٣٦ - أَرْكَتَارِي °
Pteroglossus aracari (S).
Pteroglosse, Aracari commun (F).

طائر من المتسلقات وفصيلة الطوقانيات . موطنه غابات البرازيل . يألف اوحش المواقع القاصية ولا يقترب من الحدائق والاماكن الآهلة الا في فصل الشتاء . ملجئه الحياتي جماعي . جماعته قليلة العدد . قوته الثمار والحشرات الكبيرة والوزغ ... جسمه كبير القد يطول نحو ٤٥ سم . يتميز بكبر منقاده الغليظ المحدودب وباستطالة ذنبه المستدير الطرف . ثوبه متراكب الالوان يكثر فيه الاصفر والاخضر ثم الاحمر والابيض || الانثى اكبر قدماً من الذكر وأهت ثوباً منه || يدشن عشه في تجاويف الاشجار . الانثى تحضن وحدها من بيضتين الى ثلاث بيضات بينما الذكر يؤمن لها الغذاء . الترخيم يستمر نحو ثلاثة اسابيع .



إَرْقِيس



أَرْكَارِي



أَرْكَة



أَرْكُوم الحَبَشَة

فطر مجهري يركب الاوراق وزلساد الازهار. مظهره الخارجي، كتل من المشيج الأرمد اللون، لا قياسي التجميع والحجم يسبب اسمرار وجفاف وسقوط الاعضاء الموصومة. يكافح باستعمال السوائل الفاطورية المركزة على اوكسيكلورير النحاس.

١٠٥٣- إرمِداد التبغ *Erysiphe cichoracearum*, *Oidium ambrosiae* (S). *Oidium du tabac* (F). فطر شديد الاذى واسع الانتشار يصيب نباتات الفصيلة الباذنجانية اغصنها التبغ والباذنجان والبطاطا والبندورة. ويصيب ايضاً نباتات فصيلة المركبات ومنها الخس والهندباء والديبج والطرخشقون والطرطون والاذريون وعباد الشمس والاسطر الخ... مظهره الخارجي يقع بيض خلية مبعثرة بدون انتظام تركب نصل الاوراق السفلى ثم تنتشر على كامل النصل ومن ورقة الى اخرى اعلى منها اذا لامتها العوامل الجوية. اضراره في التبغ فادحة لانه يعطب نسيج النصل ويفقده جميع خواصه المميزة. يكافح بالكبريت تعفيراً على الثرية فقط او بالكبريتان على الشتول.



أرياك

١٠٥٤- إرمِداد التفاح *Podosphaera leucotricha*, *Sphaerotheca mali* (S). *Oidium du pommier*, *Blanc du pommier* (F). *Apple mildew* (E). *Apfelmehltau* (D). فطر اغبر اللون يركب نواحي التفاح والاجاص والسفرجل قيمنطق الاوراق الفتية بوشاح من الحمل يعطب نسيج النصل ويسبب جفافه. وهو في التفاح اشد وقعاً منه في الاجاص والسفرجل. يكافح باستعمال الكبريت او الفوطايم النحاسية او السوائل السلفوكلسية.



إرمِداد

١٠٥٥- إرمِداد الثوت *Phyllactinia moricola* (S). *Oidium du mûrier* (F). فطر اغبر اللون الاطحل يركب اوراق الثوت فيؤذيها ويسبب عطلها لامتناع دود القز عن أكلها. مظهره الخارجي يقع فسيحة خلية غبراء اللون تركب صفحة النصل السفلى فتعطبها بعد القضاء على خلايا نسيجها.



إرمِداد الثوت

١٠٥٦- إرمِداد الحمحميات *Erysiphe horridula* (S). *Blanc des borraginées* (F). يركب نباتات فصيلة الحمحميات. مظهره الخارجي يقع مستديرة خلية تبدو بيضاء اللون ثم تنحرف الى السمرة. تسبب جفاف نسيج الاوراق وقد تعطب الازهار وتسبب انملاصها. يكافح باستعمال احد المركبات الكبريتية.

١٠٥٧- إرمِداد الحمضيات *Oidium tingitanum* (S). *Oidium des citruses* (F). فطر مجهري يركب الاوراق في زامها الاخير وعلى صفحة النصل العليا. مشيجه لبد النواص ارمد. يعرقل سير النسج الطبيعي وقد يسبب سقوط الاوراق. يكافح باستعمال السوائل السلفوكلسية.

١٠٥٨- إرمِداد الخرنوب *Oidium ceratoniae* (S). *Oidium du caroubier* (F). فطر مجهري يركب اوراق الخرنوب فيمنطقها بمشيجه اللبد الذي يسبب جفافها وسقوطها. يكافح باستعمال الكبريت ومنهم من فضل استعمال الفوطايم المركزة على مادة النحاس.

١٠٥٩- إرمِداد الزُّعُرُور *Podosphaera oxyacanthae*, *Oidium crataegi* (S). *Oidium de l'Aubépine* (F). فطر ابيض اللون يركب اوراق الزعرور والسفرجل

١٠٤٤- أرُمِيَّات *Bucerotidae* (S). *Bucérotidés* (F). *Bucerotidae* (E). فصيلة طير من الجواثم. اجناسها قليلة العدد تتميز بكبر اجسامها وبضخامة مناقيدها الغليظة وما يعلوها من نتوءات مستغربة الاشكال. نخيها مباشرة قوتها المواد الحيوانية والنباتية. اعطانها تشمل معظم المناطق الحارة من البلاد الاسيوية والافريقية والاسترالية. اشهر اجناسها الاركوم والبوقير والخنو والطق.

١٠٤٥- أرُمَة *Prépuce* (F). *Prepuce, Foreskin* (E). الارلة هي الغرلة عند الحيوان.

١٠٤٦- آرم *Improductif* (F). *Unproductive* (E). الارض الآيلة هي التي لا تثبت شيئاً

١٠٤٧- أرُمَاك*، لُطُر عَقُودِي *Symplocos racemosa* (S). *Symplocos en grappe* (F). *Lohd tree* (E). *Lotbaum* (D). *Lotoura* (I). نوع من اللطير وهو شجرة حرجية من فصيلة الاصطركيات. مهدها الاقاليم الاستوائية يستخرج من لحاء جذوعها واغصانها مادة قلوية تدعى لطرين (Loturine) تدرب في الكحول والايتير والاسيتون.

١٠٤٨- أرُمَة *Dent* (F). *Tooth* (E). أرمة ج اوارم: هي السن عند الحيوانات الضارية.

١٠٤٩- إرمِداد*، رَمَد، بَيَاض دَقِيقِي *Oidium* وسم يعترى اكثر النباتات الزراعية سببه فطر مجهري من النوسيات وفصيلة الوطحيات. مظهره الخارجي غبار اطحل اللون يغزو نصل الاوراق وبشرة الثمار ولحاء الاقان والقضبان فيمنطقها بوشاح خلي الهشة يفسد عليها وظائفها الحياتية ويؤذيها اشد الاذى. يكافح باستعمال الكبريت ومشتقاته كما والكبريتان.

١٠٥٠- إرمِداد أَبْقَع، إرمِداد البندق *Phyllactinia guttata*, *P. corylea*, *P. suffulta* (S). *Oidium du noisetier* (F). فطر اطحل اللون اغبر يركب اوراق البندق والمران والكستنة والبتولا. يتكاثر في تموز وآب. مظهره الخارجي يقع صندرة مختلفة الاشكال والقدر مبعثرة بدون انتظام تنتشر على صفحة النصل السفلى فتسبب احمرارها ثم يباسها. يكافح باستعمال احد السوائل السلفوكلسية.

١٠٥١- إرمِداد أَرَقَع *Oidium leucoconium*, *Sphaerotheca pannosa* (S). *Oidium du rosier*, *Blanc du rosier* (F). *Powdery mildew of roses* (E). *Rosenmehltau* (D). فطر ابيض اللون اطحل يركب الورد والدراقن واللوز. مظهره الخارجي يقع صندرة غبراء اللون تركب النواحي والاوراق الفتية فتعجبها وتوقف نموها ثم تركب الازهار والثمار فتعطبها وتسبب جفاف البشرة واللحاء. اضراره في الورد والدراقن فادحة اذا تملك منها. يكافح باستعمال احد الفوطايم الفعالة الكثيرة العدد. ومنهم من استعمال برمنغنات البوتاس بمعدل ٢ / ١٠٠ او بيكرينات الصودا بمعدل ٧ / ١٠٠.

١٠٥٢- إرمِداد البيغونيا *Oidium begoniae*, *O. chrysanthemi* (S). *Oidium du begonia* (F). *Echter mehltau*, *Chrysanthemum mehltau* (D).

وقد يصيب الأزهار فيسبب انملاصها || يكافح بالكبريت وبالمركبات النحاسية .

١٠٦٦- إرميداد النجيليات
Erysiphe graminis, Oidium monilioides (S). Oidium des graminées, Blanc des graminées (F). Powdery mildew of cereals (E). Getreidemehltau (D).

فطر يركب معظم النجيليات اخصها الحنطة والشعير والشوفان والشيلم . يبدو في اواخر الربيع على الشرائف التي تلامس التربة . مظهره بقع بيض مبشرة على النصل بين الشرايين ثم تعم القصبه وتمتد من شراف الى شراف حتى السبلة . هذا اذا واثته ونشطته العوامل الجوية .

١٠٦٧- إرميداد مضلع
Erysiphe polygoni, Oidium erysiphoides (S). Oidium du pois (F). Powdery mildew of peas (E). Erbsenmehltau (D).

فطر شديد الاذى واسع الانتشار يصيب ٣٥٧ نوعاً من النبات تنتمي الى فصائل القرنيات والقرعيات والصليبيات . مظهره الخارجي بقع متعددة الاشكال ، من نقطة صغيرة الى بقعة ، تتركب نصل الاوراق ومعاليقها فتبدو بيضاء اللون ثم يملوها موج وردي وتستقر على الاطلح . وقد يصيب السوق والفروع والازهار والثمار اذا وافقته العوامل الجوية . يكافح في الصليبيات والقرنيات باستعمال احد الفواطير المركزة على الكبريت والنحاس . ويكافح في القرعيات اخصها البطيخ والشام باستعمال بنتاسلفور البوتاسيوم . بمعدل ١ %

١٠٦٨- إرميداديات
Erysiphaceae (S).

Erysiphacées, Erysiphées (F). Erysiphaceae (E). مجموعة فطور مجهرية طفيلية ورمية عديدة الاجناس والانواع معظمها من الفطور التي لا علاقة لها بالزراعة وبعضها يركب النباتات فيؤذيها .

١٠٦٩- أرميدات
Vélé (F). To bring forth (E). ارمدت الشاة والبقرة والناقة : اضرعت .

١٠٧٠- أرميديل
هو التاتو او المدرع حيوان من الثدييات ، اطلبه .

١٠٧١- أرمش
١٠٧٢- أرمش راجع أجدر .

١٠٧٢- أرمش هو الغاليون الابيض نبات بري طبي .

١٠٧٣- أرمشور
هو اللذان نبات ترابي من الزنبقيات ، اطلبه .

١٠٧٤- أرموش
Eremostachys (S). Erémotachys (F).

جنس نباتات عشبية ، برية ، معمرة من فصيلة الشفويات . انواعه المعروفة قليلة العدد ، منها الشرق الادنى || سوقها منتصب ، قليلة الفروع ، تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقها متعابلة ، كبيرة ، شبه كفية النصال الجميلة الخضار . ازهارها سنبل التجميع ، مستطيل السنابل . ازهارها ارجوانية ، صغيرة . اوراقها وازهارها خافتة العرف المستحب . تنويرها صيفي .

١٠٧٥- إرموفيلس
Eremophilus (S). Erémophile (F). Eremophilus (E).

جنس اسماء نهريه من مفتوحات المشاة وفصيلة السورديات انواعه المعروفة قليلة العدد ، اعطانها بعض انهر امريكة

والاكيدنيا والكياكي والغبراء وقد يركب ايضاً الكرز والعناب || مظهره الخارجي بقع بيض نسيجه تكتنف صفحة النصل العليسا فتعطب النسيج وتسبب جفافه . يكافح باستعمال احد السوائل السلفوكلسية بعد ان يضاف اليه نحو ٦ . ١ / من سلفات الحديد لان وجوده يحول دون شعث النسيج .

١٠٦٠- إرميداد السنديان
Microsphaera alphitoides, M. quercina, M. alni (S). Oidium du chêne (F). Oak mildew (E). Eichenmehltau (D). فطر اغبر اللون اهر يركب نواحي السنديان واوراقه الفتية فيغشيها ببقع نسيجه متقاطعة لينة خلية تعطب نسيج النصل وتمعجه وتوقف نموه وتسبب يباسه || وقد شوهد على الكستنه وهو يفعل فيها فعله بالسنديان .

١٠٦١- إرميداد الكرمة* ، رمد الكرمة
Erysiphe Tuckeri, Uncinula necator, Erysiphe necator, Uncinula spiralis (S). Oidium de la vigne (F). Powdery mildew of grape (E). Echter mehltau der weinstocks (D).

فطر مجهري يعترى اوراق وازهار وثمار الكرمة فيغشيها بوشاح من الغبار الابيض الاطلح الذي لا يلبث ان يتحول الى ارمد || وهو شديد الاذى وخيم العواقب لانه يشنج الاوراق ويفقد لها لونها ، يعقم الازهار ويسبب سقوطها ، يصيب الثمار فتتخلص او تتشقق ويتغير طعمها || يكافح باستعمال الكبريت الميكروني تعفيراً على جميع اعضاء الكرمة . تبتدى المكافحة مع الازهار وتقوم حتى الحصرمة . قوامها التعفير الشامل من ست الى سبع مرات .

١٠٦٢- إرميداد الكريزانتيم
Oidium chrysanthemi (S). Oidium du chrysanthème (F).

فطر مجهري يتطفل على اوراق الكريزانتيم فيسقطها بوشاح خفيف النواص يبدو اغبر اللون ثم ينحرف الى الرعدة فيسبب جفاف الاوراق وسقوطها || يكافح باستعمال الكبريت الميكروني وغيره من الفواطير المركزة على الكبريت . كما وانه يحسن اجتناب كثرة الرطوبة ونضج او رش الاوراق بالماء .

١٠٦٣- إرميداد الكشمش
Erysiphe mors-uvae, Sphaerotheca mors-uvae (S). Oidium brun du groseillier, O. américain du groseillier (F). Powdery mildew of currants (E). Amerikanischer stachelbeermehltau (D).

فطر ارمد اللون يظهر عند اواخر الربيع ويستمر حتى الخريف . يركب نواحي الكشمش واوراقه الفتية ثم يمتد الى سائر الاعضاء فيسقطها بوشاح . قطبي الشكل فضي الموج || يكافح عند ظهوره باستعمال احد الفواطير القمالة .

١٠٦٤- إرميداد المضاض الياباني
Oidium evonymi Japonici (S). Oidium du fusain du Japon (F).

فطر مجهري يركب اوراق المضاض الياباني على صفحتها . مظهره الخارجي بقع حر لا قياسية الشكل والحجم والترتيب الى ان يملوها مشيج القطر اللبد الكثيف فتبدو بيضاء اللون ثم يمداء || وقد يصيب الافنان والنواحي فيسبب ذبول اوراقها || يكافح باستعمال الكبريت الميكروني او بعض السوائل السلفوكلسية .

١٠٦٥- إرميداد المطاط
Oidium heveae (S). Oidium des hévées (F).

فطر مجهري يركب اطراف نصل الاوراق فيمعجها ويقودها الى الجفاف بعد ان يمتلئها بنواص مشيجه اللبد الاصفر ،



إرميداد الكرمة



إرموفيلس

ووبرها فهي من أجل ذلك تقسم الى ثلاثة أقسام :

(١) قسم الارانب المنتجة اللحم . أشهر ضروبها وعروقها :

Lapin géant des Flandres	الارنب العليج البلجيكي
Lapin géant blanc	الارنب العليج الابيض
Lapin beller	الارنب الكبشي
Lapin normand	الارنب النورمدي
Lapin hollandais	الارنب الهولندي
Lapin commun	الارنب المبدول
Lapin papillon	الارنب الفراشي
Lapin japonais	الارنب الياباني

(٢) قسم الارانب المنتجة الفراء . أشهرها :

Lapin argenté	الارنب الفضي
Lapin bleu	الارنب الازرق
Lapin poionais	الارنب البولوني
Lapin russe	الارنب الروسي
Lapin chinchilla	ارنب شنشيله
Lapin rex	ارنب ركس

(٣) قسم الارانب المنتجة الوبر ، وهو يشمل ضرباً واحداً تحدثت منه بعض السلالات . اما الضرب فهو :

Lapin angora	ارنب انقره
--------------	------------

هذا من الوجهة الاقتصادية الشاملة . اما من الوجهة الجسورية العلمية والعملية فاننا سنقتصر في البحث على وصف وتحلية بعض الضروب والعروق المشهورة . منها :

١٠٨١- أرْنَب أَزْرَق*
Lapin bleu
متوسط القد وزنه من ٤ الى ٥ كيلو . ثوبه الى الزرقة الرصاصية الجميلة . وبره قصير ناعم الملمس . وهو من الارانب السهلة التربية ، القوية البنية ، الجيدة التاج والفائدة .

١٠٨٢- أرْنَب أَنْقَرَه
Lapin angora
كانت تربيته لبضع سنوات تحتل مركز الصدارة . وهو متوسط القد طويل الوبر جميل الشكل يربى للاستفادة من وبره الناعم الطويل الكثير الاستعمال الصحي والصناعي لانه يفيد الاوجاع العصبية || اما الانتاج الوبري السنوي للارانب الواحد فيراوح من ٣٠٠ الى ٣٥٠ غرام يقتف على سبع او ثمان مرات في السنة . أجوده ما استخراج من العنق والصدر ووبر الاناث افخر صنفاً من وبر الذكور || ويطلب من يتعاطى هذه التربية ان يعتني بنظافة المرنية وان يسهر بدقة على الارانب ويسرح ووبرها من مرتين الى ثلاث مرات في الاسبوع .

١٠٨٣- أرْنَب بَرِّي ، أرْنَب وَحْشِي
Lièvre (F) Hare (E).
هو القواع ، اطلبه .

١٠٨٤- أرْنَب بُورْغُونِي
Lapin de Bourgogne
معتدل القد شديد النشاط والحياة . ثوبه الى الكهية الصهباء بطنه ابيض اغبر . وزنه يراوح من ٤ الى ٥ كيلو . لحمه جيد الصنف || وهو من العروق المرغوب فيها لانه سهل التربية ، جيد التاج .

١٠٨٥- أرْنَب بُولُونِي
Lapin polonais
من الارانب التي تربى لفرائها . صغير الجثة وزنه نحو ٢ كيلو . ابيض الثوب ، اكليج الخلق ، شرس الطباع ، ناعم الوبر الحريري الملمس . فروته تشبه فروة القاقم (الهرمين) .



أرْنَارِيه



أرْنَب أَزْرَق

الجنوبية || اجسامها تطول من ٥٠ الى ٧٠ سم . رؤوسها مخروطية الشكل . اعظامها معتدلة الجرم . رباعية المذبات . اشداقها متوسطة الانفراج زعانفها الظهرية فردية ، صغيرة ، تقابل الشرجية وتمائلها ، زعانفها الذيلية مخددة ، مستطيلة || انوابها الى الرمكة الخضراء تسمر في الظهر وتنحرف الى الفضي في البطن || لحومها مأكولة ، مبتذلة الصنف .

١٠٧٦- أرْمُولَة Rhizome (F). Rhizoma, Rhizome (E).
الارمولة : الجذمور القصير . ج أرامل وأراميل .

١٠٧٧- أرْمِيرِيَة اطلب عود احمر .

١٠٧٨- أرْنَارِيَة* ، زَهْرَة الرِمَال ، رَمْلِيَة

Arenaria (S). Arénario, Sabline, Sablinier (F). Sea purslane, Sea chickweed, Sand-wort (E). Dicke salzmier (D). Arenaria, Morgellina (I).

نبات عشبي بري حولي من فصيلة القرنفلية . يعيش في الاراضي الرملية . ساقه فرعاء سلامية . اوراقه لسنة حاضنة قرنفلية . ازهاره صغيرة جميلة الشكل لونها الى الحمرة الوردية .

١٠٧٩- أرْنَب
Lièvre (F). Lepus (E).

الارنب كوكبة نجوم جنوبية الموقع مركزها تحت الجبار . وجه الارنب الى المغرب ومؤخره الى المشرق || عدد نجومها ١٩ والعرب تسمي الاربعة ، التي اثنان منها على يديه واثنان على رجله ، عرش الجوزاء || جميع نجوم هذه الكوكبة من المرتبة الخامسة والسادسة باستثناء نجم واحد من المرتبة الثالثة يدعى « الارنب » .

١٠٨٠- أرْنَب ، أرْنَب أَهْلِي ، أرْنَب دَاجِن

Oryctolagus cuniculus, Lepus domesticus (S). Lapin, Lapin domestique (F). Rabbit, Tame rabbit (E).

حيوان لبون قاضم من فصيلة الارفليات وهو وحيد الجنس والنوع ، عديد الضروب والعروق والسلالات || وكلمة ارنب تطلق على الذكر والانثى ومع ذلك فلذكر الارنب يدعى خنز وقيل الجمع قعال وأخزة وخزان والانثى تدعى عكرشة . وأخرنق ولد الارنب فهو اولاً دروس الى ان يبصر ويكتسي ثم خرنق فسخله فارقب . وخرنق تطلق على الذكر والانثى وقد يقال للانثى خرنقة || والارنب يعيش جماعات . والانثى تضع بعر ثمانية اشهر . يحملها يدوم من ٣١ الى ٣٢ يوماً وعدد ادراسها يراوح من ٣ الى ١٢ تخلق عيها مرطاه . تبصر وتكتسي بعد اسبوع || وهو من الحيوانات الاقتصادية السريعة النمو والادراك . يربى في المنازل وفي حظائر خاصة تدعى مخززة او مرنية للحصول على لحمه وفرائه ووبره || يتميز بخفته وسرعة عدوه وهو طويل الرجلين ، قصير اليدين ، حاد البصر قوي السمع له عينان جاحظتان تكتمان المرئيات في كل اتجاه وأذنان طويلتان تحسان اخفت الاصوات . ينام مفتوح العين . وهو من الحيوانات الشابة . انشاء نشوة وقد تساقد وهي حيل فيؤدي بها ذلك ، في بعض الاحيان ، الى الاستلجاب اي الى محبل ثان ووضع ثان يعتب الاول باسبوع واكثر وهي المدة الفاصلة بين الكومين || والارنب حيوان تعود حياة الدجن . وهو يعيشها ولا توله لكنه لا يالفها وان استطاع الهرب من مرنيته يذهب ولا يعود || ضروبه وعروقه وسلالاته عديدة منتشرة في جميع اقطار العالم وبعضها أبد واستوحش فأصبح من الآفات الزراعية كما هي الحال في بعض مناطق استراليه || تربى الارانب للحومها وفرائها

وضروها وأنواعها كثيرة العدد تنتمي الى جنسين: الارنب والقواع. جميعها عاشبة، دجوية، جامة. انماها سريعة النمو مبكرة، نشوة كثيرة الولد.

١٠٩٥- أرنب، روبة
Caillé (F).
Coagulum, Curd (E).
هو اللبن الحامض الذي يضاف على الحليب فيروب

١٠٩٦- أرنبه اطلب نخلة السكر.

١٠٩٧- أرنبود*
Alucita pentadactyla (S).
Ornéode (F).

فراشة من فصيلة القويقيات. صغيرة القد، اسطوانية الجسم تتميز برواشها الريشية التركيب المذعة بالاسود. زباناها حنطية دقيقة. لها جيلان في الحول الواحد. يرقتها تعيش على اللبلاب وحب المي.

١٠٩٨- أرنبوس*، أرنبوس، أرنبه

Erinus (S). Erine, Mandeline (F). Erinus, Liver balsam (E). Alpenbalsam (D). Erinus (I).

نبات عشبي نجسي بري معمر من فصيلة الخنازريات يصلح للزينة. اقليمه المناطق المعتدلة من اسيا الصغرى واروبه. وهو عشبة ابدة رائحة الجبال. سوقها دقيقة فراء، اوراقها ضمية زغبية مسنة لونها الى الاحمر البنفسجي ازهارها صغيرة وردية. يتكاثر بالتبذير والتعجيل والتدريج، يزرع في الحواشي وعلى جوانب الممرات.

١٠٩٩- أرنبه هي الاطن، اطلبه.

١١٠٠- أرنبسين*
Arnicine (F).

غلوكوزيد حامض الطعم يوجد في ازهار الارنيكا وفي اوراقها وجذورها.

١١٠١- أرنيكا*، حناق الفهد، زهرة العطاس

Arnica (S). Arnique, Aronique, Bétoine des montagnes, Tabac des Vosges, Plantain des Alpes (F). Arnica, Mountain alkanet, M. tobacco (E). Arnika, Echtes wolferlei, wohlverleih (D). Arnica, Polmonaria di montagna (I).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المركبات الشعاعية. اكثر انواعه بري ومنها طبي وبعضها زراعي زينة. ساقه ثنائية او رباعية الفروع تعلق من ٢٠ الى ٧٠ سم. اوراقه متقابلة. ازهاره كبيرة القد هامة الارتكاز لونها الى الصفرة. بزوره ريشية القنبرة القطبية. يقال انه من النباتات الطبية العديدة المنافع المهمة. يتكاثر بالبذر والمقل. يرغب في الاتربة المتوسطة الاندماج والرطوبة.

١١٠٢- أرهاب، رهام مالا يصيد من الطير كالبغات.

١١٠٣- إرهام
Luxuriance
تناهي النبات في الخصب والنضارة.

١١٠٤- أرهم
Luxuriant
نمت تعريبي يدل على فرط النمو في النبات.

١١٠٥- أروا، تنجير
Agrostis (S).
Agrostide (F). Agrostis (E).

جنس نباتات عشبية برية وزراعية من فصيلة النجيليات. انواعها عديدة جميعها من النباتات الصغيرة القد اوراقها

١٠٨٦- أرنب روسي
Lapin russe
صغير الجثة وزنه نحو ٢ كيلو. ثوبه ناصع البياض حريري الملمس. اما انفه واذناه وذنبه واطراف جرابه فسود واسودادها حالك. وهو سهل التربية لكنه يفضل المراتب القليلة الاشعاع الضوئي ويفضل الحبوب على العشب والخضار.

١٠٨٧- أرنب علج*، أرنب مارد
Lapin géant
مهده بلجيكية وهو كبير الجثة مستطيلها. وزنه يراوح من ٧ الى ٩ كيلو. ثوبه اكهب اطحل ينحرف عند بطنه الى الشبهة الغبراء. اذناه كبيرتان مستقيمتان. وهو من الارانب الشديدة النشاط والحوية يستعمل في تهجين بعض العروق المتوسطة القد لتحسينها وزيادة حجمها ووزنها.

١٠٨٨- أرنب فضي*
Lapin argenté
معتدل الجثة وزنه من ٣ الى ٤ كيلو. ثوبه فضي اللون حريري الملمس. سلالاته عديدة تختلف باختلاف موج وبرها الفضي. وهو سهل التربية، قوي البنية، حسن النتائج.

١٠٨٩- أرنب كبشي*
Lapin bélier
اكبر الارانب جثة واوزنها لحماً. رأسه صمغوري الشكل عيناه كبيرتان جاحظتان، اذناه مستطيلتان متدليتان. ثوبه العادي اكهب اغبر ومنه الاسمر والاسود والابيض. وهو من الارانب البطيئة النمو الضعيفة النتائج الهادئة الكسولة.

١٠٩٠- أرنب نورمندي*
Lapin normand
معتدل القد، سريع النمو والادراك، شديد النشاط والحوية. ثوبه الى الكهبة الريداء. بطنه ابيض اصفر. وبره بالغ القصر، حريري الملمس. وزنه من ٥ الى ٦ كيلو. لحمه جيد الصنف. وهو من العروق الواسعة الانتشار لانه سهل التربية، كثير النتائج والفائدة قوي البنية قليل العطب.

١٠٩١- أرنب هفانه*
Lapin de Havane
صغير الجثة وزنه نحو ٢ كيلو. ثوبه اصهب بني قريب الشبه من لون التبغ. يعتبر من العروق النشيطة الجيدة النتائج، السهلة التربية.

١٠٩٢- أرنب هولندي*
Lapin hollandais
متوسط القد، ابلق الثوب يمتاز بكثرة تناسله وسرعة ادراكه. وزنه من ٢ الى ٣ كيلو. وهو من الضروب القنوعة الصبورة الشديدة الاحتمال التي لا تضيحها حالة عابرة ولا يؤذيها رطاب مستمر.

١٠٩٣- أرنب بحري
Aplysia depilans (S).
Aplysie (F). Sea hare (E).

حيوان رخوي صدف من فصيلة ارانب البحر يكثر في المتوسط. وهو بطي الرجل كالحلزون. رأسه كرامس الارنب، ثوبه عديد الالوان التي تختلف باختلاف المكان. يقال انه هو ومسحوق صدفه يبرطان الشعر. وهو من ذوات السموم يفرز عند شعوره بالخطر مادة سامة حمراء اللون تخفب الماء حوله من المثر الى المترين.

١٠٩٤- أرنبيات
Leporidae (S).
Léporidés (F). Leporidae (E).
فصيلة الارانب من رتبة القواضم. موطنها العالم سلالاتها



أرنب علج



أرنب فضي



أرنب كبشي



أرنب نورمندي



أرنب هفانه



أرنبود



أرنبوس



أرنيكا



أروا أبيض



أروا أحمر



أروا عابق



أروس القطب



أروس دربي



أروفيلا



أروكارية

الانتظام . أزهارها بيض . ثمارها خريشمية . بزورها صغيرة مستديرة || أشهر أنواعه :

- Erophila minima (S). أروفيلا صغرى
Erophila vulgaris (S). أروفيلا عادية
Erophila praecox (S). أروفيلا مبكرة
Erophila setulosa (S). أروفيلا هليبية

١١١٤- أروكاريات

Araucariées (F).
Araucariae (E).
جنس اشجار حرجية شائخة هرمية الشكل من فصيلة الصنوبريات . منبتها أمريكا الجنوبية وجزر أوقيانيا حيث يوجد منها أحراج شائعة الاطراف || يستخرج من سوقها بالحز عصارة رائحة شائعة الاستعمال .

١١١٥- أروكارية

Araucaria excelsa (S).
Araucarie (F). Bunya, Bunya pine (E). Bunya tanne, Zimmertanne (D). Altingia (I).
شجرة حرجية من الأروكاريات وفصيلة الصنوبريات . وهي شجرة كبيرة شائخة ، هرمية الشكل ، متقابلة الاغصان الاسطوانية ، الافقية الانتشاب والارتكاز ، الحرفقية الاوراق . يستخرج من جذعها عصارة رائحة شائعة الاستعمال . تزرع للتزيين في الحدائق والمراكن . ترفع في المواقع الحارة الرطبة .

١١١٦- أروم ، تريباق ابيض ، لوف مبقة

Arum maculatum (S). Arum, Pied de veau, Couque-rot, Arum maculé (F). Calf's foot, Cuckoo-pint, Wake robin, Water robin (E). Fleckenzebrwurz, Aronenkraut, Aronswurz (D). Aro comune, Giglio d'oro, Pié di vitello. (I).
نبات عشبي تزييني معمر من اللوفيات القلقاسيات . ضروبه عديدة . يرغب في الاراضي الرملية الرطبة ، ساقه قرصية ارضية . اوراقه منتصبه سهمية مستطيلة . ازهاره شمراخية زنادية مغلفة بلقافة تنتهي كالمزراق يكثر فيها اللون الابيض والابيض المرقش || يتكاثر بشحفه القرصية . يرغب في التربة الرطبة القليلة الاندماج .

١١١٧- أروم ايطالي ، لوف جعد ، ذريعة

Arum italicum (S). Arisare, Gouët d'Italie (F). Italian arum, Large cuckoo-pint (E). Italienische zehrwurz (D). Aro d'Italia, Cavolaccio di macchia, Gicaro (I).
نوع من الاروم وهو نبات عشبي معمر بري وزادعي تزييني . يتكاثر كالاروم ويرغب في التربة الرملية الرطبة .

١١١٨- أرومة

Racine principale (F).
Principal Root (E).
هو الاصل الذي يكون مقابل الساق وامتدادا لها . وفي الغالب هو الجذير الاصل الذي يتحول الى ارومة . ولا ارومة في النباتات ذوات الفلقة الواحدة ولا في النباتات ذوات الجذور المتفرعة الا في بدء حياتها .

١١١٩- أرومة

Souche (F). Stump (E).
هو ما يبقى في الارض من الشجرة بعد قطعها .

١١٢٠- أرومية مسكية ، قرنسي مسكية

Aromia moschata (S). Aromie musquée, Capricorne musqué (F). Aromia moschata (E). Moschusbock, Grüner weidenbock (D).
حشرة من فصيلة القرنبيات طولها من ٢٠ الى ٢٥ مم . لونها اخضر نحاسي يعلوه موج ذهبي . يفوح منها عند لمسها رائحة مستحبة كالمسك || يرقاتها تركب سوق

عصفية الشكل والتركيب . ازهارها عشكولي منتصب بزورها صغيرة لا حستك فيها .

١١٠٦- أروا أبيض ، نجير أبيض

Agrostis alba, A. palustris (S). Agrostide blanche, Traine, Fiorin, Pavine (F). White bent grass, Fiorin grass (E). Weisses strausgrass, Fioringras (D). Agrostide blanca, Pennacchini (I).
نوع من الاروا وهو نبات عشبي بري علي . وجوده وكثرته في المراعي تفيد الماشية ، اما كثرته بين الزروع وفي الاراضي المروية فضره .

١١٠٧- أروا أحمر ، نجير أحمر

Agrostis rubra (S). Agrostide d'Amérique, Foin rouge (F). Herd grass, Red top grass (E). Herden-grass (D). Fieno rosso (I).
نوع من الاروا وهو نبات عشبي بري علي وقد يبذر ويحصد في المراعي الرطبة .

١١٠٨- أروا عابق ، نجير عابق

Agrostis nebulosa, A. capillaris (S). Foin capillaire (F). Bird grass, Cloud grass (E). Pratchvoti (D). Agrostide capillare, Erba d'uccello (I).
نوع من الاروا وهو نبات عشبي بري وزراعي تزييني ، يزرع في الحواشي والممرات . يتكاثر بالبذر .

١١٠٩- إرواء

Abreuvement (F). Watering (E).
هو اسقاء الحيوانات الداجنة .

١١١٠- أرويس ، إيلند ، بقعة ، مجع

Taurotragus orias (S). Oréas, Taurotrague, Antilope élan (F). Eland (E).
جنس حيوانات لبونة عاشبة من فصيلة الايليات . موطنها مراعي وغابات افريقية . جشها كبيرة يبلغ ارتفاعها نحو ١٧٥ سم . وزنها ٧٥٠ كيلو . ثوبها اصهب احمر . عيونها مكحلة كبيرة ، قرونها لولبية الانتشاب مستقيمة . غيها فضفاض في الذكر والانثى . خصر الانثى رباعي الاخلاف كالبقرة . ذنها دقيق طويل ينتهي بضمة من الشعر الاسود . تعيش جماعات ، اجلها لا يقل عن العشرة وقد يفوق المئة || منها نوعان اروس القطب و اروس دربي .

١١١١- أرويس القطب

Oreas canna.
Taurotragus oryx (S). Oréas canna, Elan du Cap, Taurotrague oryx, Antilope oryx (F).
كبير الجثة ضخما ، ارتفاعه نحو ١٧٥ سم . وزنه نحو ٧٥٠ كيلو . موطنه افريقية الجنوبية . يكثر في الترسفال والثائال . يعيش على مراعيها الطبيعية وبين ادغالها وغاباتها .

١١١٢- أرويس دربي

Oreas Derbians (S).
Oréas de Derby, Bosélaphe de Derby, Elan de Derby, Elan du Sénégal (F).
اصغر جثة من اروس القطب واجمل شكلا وافتح ثوبا . موطنه واسع الارحاء يعم لصف افريقية . يألف المراعي الطبيعية والغابات المبعثرة الاشجار .

١١١٣- أروفيلا

Erophila (S).
Erophile (F). Nailwort, Withlow grass (E). Gemeines hungerblümchen (D). Erofila (I).
جنس نباتات عشبية برية من الصليبيات . انواعه قليلة جميعها نجمة عديدة الساق . اوراقها صغيرة مستطيلة ضمية

١١٢٩- **أرؤية الهند، أوريال** (S). *Ovis cycloceros* (S).
Mouflon des Indes (F). **Urial** (E).
 موطنه السند والبنجاب والافغان وإيران . وهو متوسط القد ،
 صغير القرن أصهب اللون يألف الجبال العالية من ارتفاع
 ٢٠٠٠ الى ٤٥٠٠ م.

١١٣٠- **أرؤية أمريكية** (S). *Ovis cervina*, *O. montana* (S).
Mouflon d'Amérique, **Bighorn** (F). **Bighorn** (E).
 هو النوع الأمريكي الوحيد . موطنه أمريكا الشمالية
 وكندا . ضروبه خمسة جميعها كبيرة القرون الغليظة .
 تعيش جماعات اجلها من ٨ الى ١٢ . تألف الغابات
 والاحراج الوعرة || ثوبه ابيض اسفع . طوله نحو ٢٠٠
 سم . وارتفاعه ١٠٠ سم . الانثى اصغر جثة من الذكر .

١١٣١- **أرؤية كورسكة* ، مقلون**

Ovis musimon (S). **Mouflon d'Europe** (F).
 موطنه جبال كورسكة وسردنييه . صغير الجثة ربع القامة
 ثوبه الى الصهبة ، بطنه ابيض اللون . الانثى جماء الرأس
 واصغر جثة من الذكر . اجله من ٥ الى ٩ انفار .
 يألف الجبال الوعرة .

١١٣٢- **أرزي** هو العسل ، اطلبه .

١١٣٣- **إرياس إينسولانا* ، قرأشة كتافج القطن**
Earias Insulana (S).

قرأشة من فصيلة الليليات موطنها إقليم القطن . توجد في
 آسيا وأفريقية وأروبه وأمريكا وأستراليا || طولها نحو
 ٩ م . بسطها من ٢٠ الى ٢٢ م . رأسها وصدرها الى
 الخضار الاصفر يعلوه موج حنطي . بطنها فضي اللون
 والمواج . زباناها خيطية مستطيلة . روشناها الاماميان
 بلون صدرها تتعرضها ثلاثة خطوط سم . روشناها الخلفيان
 الى البياض الصدفي الاسمر المواج || تسرح في الليل
 وتستقر في النهار وقد تستكن في اكمام الباعم الزهرية .
 الانثى اكبر حجماً من الذكر . تمتح افرادياً نحو ٢٠٠
 مكنة على أي جزء كان من النبات فتتغذى بعد اربعة ايام
 في الصيف وتسعة ايام في الربيع والخريف و بعد نحو
 ثلاثة اسابيع في الشتاء . يرقها تدعى « دودة القطن الشوكية » .
 اطلبها . تنسلخ خمس مرات وتتحول الى عذراء داخل شرنقة
 حريرية شكلها كالزورق لونها الى السمرة || اجيالها
 الحولية من الخمسة الى الستة . الصبي منها يدوم نحو ٥
 اسابيع والربيعي ٨ والخريفي ١٠ والشتوي نحو ١٥

١١٣٤- **أريال**

الاريا على نوعين رقم ١ ورقم ٢ ، وهو فطور زراعي
 يرتكز على سلفات النحاس و كربونات الصودا . يستعمل
 سائلاً في مكافحة التسة فتتضخ به جميع اوراق النبات .
 الاريا على رقم ١ يحل بمعدل ٤ ٪ / ورقم ٢ يحل بمعدل ٣ ٪

١١٣٥- **أريية**
Box, stalle (F). **Box, stall** (E).
 الارية والمرقد والحبس والبكس وشقة الفرس هو الحبل
 تحبس فيه الجياد منفردة بدون رباط .

١١٣٦- **أريترون* ، أسنان الكلب** *Erythronium*
dens-canis (S). **Erythron**, **Dent de chien** (F).
Dog's tooth (E). **Hundszahnlilie**, **Hundszahn** (D).
Dente di cana, **Mitridacea**, **Ermodattilo falso** (I).
 نبات بصلي من الفصيلة الزنبقية يشبه التوليب . ساقه فردية
 قنية شراخية جوفاء تنهي بزهرة كبيرة ساجدة او منكسة
 سداسية البتلات والاسدية وردية اللون || تزرع لجمال

واغصان الصفصاف فتتغرها وتعطبها .

١١٢٢- **أرون** (F). **Violent poison** (E).
 الأرون هو السم الصاعق من اي مصدر كان .

١١٢٢- **أرؤية* ، آرونية** (S).
Aronie (F). **Red chokeberry** (E). **Kanadische fel-**
senbeere (D). **Aronia** (I).

جنس جنات برية وتزيينية من فصيلة الورديات . انواعه
 قليلة شديدة الشبه بالغيراء . منبها البلاد الامريكية .
 تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . ساقها وفروعها زباء اللحاء .
 اوراقها اهليلجية مفصصة . نصلها خلي الصفحة السفلى ،
 مسن الحافة . ثمارها عنبية ، ارجوانية اللون غير مأكولة .

١١٢٣- **أرويا** اطلب قوقحان ذهبي .

١١٢٤- **أرؤية** (F). **Mouflon**, **Wild sheep** (E).
 جنس حيوانات عاشبة بحجرة لبونة من قسم الضأنات
 وفصيلة الفتيات . انواعه المعروفة لا تقل عن ١٩ أشهرها
 واعها وارقاها الاروية الاعلية اي الضأن ج . اروي واروي .

١١٢٥- **أرؤية الاناضول** (S).
Mouflon anatolien (F).

من اكبر انواع الاروي جثة واغظها قرناً . يبلغ ارتفاعه
 نحو ٨٥ سم . ثوبه الى الصهبة العابقة التي تميل الى الجؤوة
 عند ثبيج الظهر || الانثى اصغر حجماً من الذكر وهي
 جماء الرأس بيضاء الظهر من الحاروك الى الاطل || موطنه
 جبال الاناضول وارمينيا والكرديستان والعراق وشرقي ايران .
 يعيش جماعات صغيرة . اجله لا يزيد على الثانية . يألف
 الجبال والادوية المرتفعة .

١١٢٦- **أرؤية الثلج** (S).
Mouflon nivicole, **M. des neiges** (F).

موطنه منشوريا وسبيريا . اجله من العشرين وأزود .
 وهو ربع الجثة ، كبير القرن وغليظه ، اربد الثوب ، اسمر
 الظهر ، اشهب البطن والعنق ، صغير الأذن مستديرها
 قصير الذنب ، كبير الأظلاف المفلوجة .

١١٢٧- **أرؤية الشرق*** (S).
Ovis ammon, **O. argali** (S). **Mouflon argali**, **Argli**, **Archar** (F). **Archar**, **Argaly** (E).

اكبر انواع الاروي واصلبها عوداً واسمها انتشاراً .
 موطنه الشرق من الهند والافغان وإيران وبحر قزوين الى
 سبيريا والصين . يعيش جماعات صغيرة . اجله من ١٢
 الى ٢٠ || كبير الجثة طوله نحو ٢١٥ سم . وارتفاعه
 ١٣٠ ، وزنه نحو ١٥٠ كيلو . له قرنان كبيران وزنها
 لا يقل عن ١٥ كيلو || ثوبه اربد اسفع يزداد سمرة
 مع اقترابه من الرأس . بطنه الى البياض . قوائمه بلون ثوبه
 تنحرف نحو البياض . قوته الاعشاب والحشائش والطحالب .

١١٢٨- **أرؤية المغرب*** ، **أرؤية الأرذان**

Ovis ammatragus (S). **Mouflon à manchettes**,
M. de Barbarie (F). **Barbary wild sheep** (E).
 موطنه شاسع الاطراف يمتد من مراکش حتى النوبة . قريب
 الشبه من الماعز . جثته كبيرة ، طوله ٢٠٠ سم . وارتفاعه
 نحو ١٠٠ ثوبه اربد اسفع . عنقه طويل الصوف المتدلي
 كالاردان . قرنه غليظ أعقف || يعيش جماعات قليلة
 العدد اجلها من ٤ الى ٧ انفار .



أرون



أرون ايطالي



أرؤية مسكية



أرؤية



أرؤية الشرق



أرؤية المغرب



أرؤية كورسكة



إرياس إينسولانا



أريترية



أريترية



أريترية مرجانية



أريترية الشحم



أريترية الغاب



أريترية خاتلة



أريترية



أريغارون

١١٤٥ - أريترية خاتلة* ، دُبابَة خاتلة

Phaonia erratica (S). Aricle vagabonde (F).
حشرة من الذبابيات طولها من ١١ إلى ١٣ مم. زباناها
حديدية اللون. ملامسها سود. يكثر وجودها من أيار
إلى تشرين الثاني. تسرح في الشمس. مرتعها الأعشاب
وسوق الأشجار البرية والزراعية.

١١٤٦ - أريترية شوكية

Aristotelia (S).
Aristotèle, Aristotélie (F). Wine berry (E).
Aristotelle (D). Aristotelia (I).
جنس جنات وشجيرات برية وزراعية من فصيلة اليزفونيات
أنواعها قليلة ، أوراقها بسيطة متقابلة . ثمارها عنبية .
أشهرها النوع الشيلي ثماره مأكولة تعتبر من المرطبات النافعة .

١١٤٧ - أريترية

Aristée (F). Aristate (E).
شكل خاص من أشكال القرن الاستشعاري تتميز به
الحشرات التابعة إلى قصيرات الزباني من ذوات الجناحين .

١١٤٨ - أريترية* ، أريترية

Erysimum (S).
Erysimum, Vêlar, Erysimon (F). Erysimum (E).
جنس نباتات عشبية برية طيبة حولية ومعمرة من فصيلة
الصليبيات . أنواعه عديدة . أوراقها مستطيلة ، زغبية
التصل . أزهارها صفراء اللون أو أرجوانية . ثمارها خريشبات
رباعية الزوايا ومنها المفلطحة والاسطوانية . بزورها
بيضية الشكل || أشهر أنواعه :

أريترية أحمرش Er. scabrum (S).
أريترية أرجواني Er. purpureum (S).
أريترية أزرق Er. smyrnaeum (S).
أريترية أشهب Er. crassipes (S).
أريترية ثولولي Er. verrucosum (S).
أريترية جوني Er. repandum (S).
أريترية شصني الورق Er. uncinatifolium (S).
أريترية طبي ، حشيشة الحفر Er. barbarea (S).

١١٤٩ - أريترية

Plumeux (F). Plumous (E).
لمت تعريبي يطلق على بعض الأعضاء النباتية التي شكلها
يشبه الريش .

١١٥٠ - أريغارون* ، شبنج الويع

Erigeron (S).
Erigéron, Vergeretta (F). Erigeron, Flea-bane (E).
جنس نباتات عشبية برية وزراعية من فصيلة المركبات
الانبوبيات الزهر. أنواعه لا تقل عن ٧٠ معظمها نباتات
عشبية نجمية زغبية. سوقها فرعاء ليفية زنادية تنتهي بالأزهار.
أوراقها حاضرة متعاقبة مستطيلة لونها إلى الخضار الأخضر.
أزهارها فردية تاجية طويلة الزناد عديدة الألوان || أشهر
أنواعه الزراعية التزيينية :

أريغارون أموط Er. glabellus (S).
أريغارون برتقالي Erigéron glabrescent (F).
أريغارون برتقالي Er. aurantiacus (S).
أريغارون برتقالي Erigéron orangé (F).
أريغارون بهي Er. speciosus (S).
أريغارون نفلي Erigéron gracieux (F).
أريغارون نفلي Er. hybridus (S).

أريغارون Erigéron hybride (F).
وأعرف أنواعه البرية الطيبة التي تستعمل في المستحضرات
المضادة للسعال والمدرية للبول : الأريغارون الأزرق
والأريغارون الجبلي .

زهرها الذي يبشر بالربيع . ومن الشعوب من يأكل بصلها
بعد سلقه بالماء .

١١٣٧ - أريترية* Erythrée (F). Erythraea (E).

جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة الجنطيانيات . أنواعه
المعروفة ٢٥ جميعها برية ، منبها المناطق المعتدلة من
القطب الجنوبي . أوراقها لاطئة متقابلة ، نصلها ضيق
الصفحة اللثة البحرية اللون . أزهارها عثكولي التجميع ،
تاجي الارتكاز أزهارها صغيرة القد وردية اللون أو بيضاء.
منه أنواع طبية دافعة للحميات . اطلب مراره الخشخ .

١١٣٨ - أريترية Erythrina (S).

Erythrine (F). Erythrina (E).
جنس نباتات من الفصيلة القرنية القراشية . أنواعه عديدة
تبلغ ٦٠ منها أعشاب ومنها جنات وشجيرات شائكة مختلفة
القدر يبلغ ارتفاع بعضها خمسة أمتار وهي « الأريترينا
الخالدة » || أوراقها ثلاثية معنقة بيضية رمحية زاهية
الخضار || أزهارها كبيرة الحجم جميلة وعديدة ، عنقودية
منصبة ومستطيلة ، غالباً قرمزية اللون . والأزهار في جميع
أنواعها يسبق الإزهار بعدة أيام || بزورها كروية حمراء
لامعة تعلوها فكتة سوداء واحدة صغيرة ومستديرة . وبزورها
هذه تستعمل في صناعة القلائد والعقود والسبحات || أخشابها
صلبة صفراء اللون سهلة الاستعمال لا يؤثر فيها الزمن ولذلك
لقبها بالخالدة || أشهر أنواعها وأفخرها وأكثرها طلباً
هي الأريترينا المرجانية .

١١٣٩ - أريترية مرجانية* Erythrina cristagalli (S). Erythrine crête de coq (F).

Cock's-spur, Coral tree (E). Hahnenkammkorallen
baum (D). Eritrina, Albero del corallo (I).
أفخر أنواع الأريترية وأعمها زراعة . أزهارها مرجانية
جميلة . خشبها أصفر أفرثمين القيمة || تتكاثر بالبذر
ترغب في الأتربة الخوارة العميقة الغور المتوسطة الاندماج .

١١٤٠ - أريج ، عُرْف ، رائحة Arôme (F). Aroma (E).

نفحة الشيء تفوح منه فتدركها حاسة الشم .

١١٤١ - أريدانوس Eridan (F).

Eridani, Eridanus (E).
كوكبة نجوم جنوبية الموقع مشهورة باسم النهر ، اطلبها .

١١٤٢ - إريس Agriculteur (F).

Agriculturist, Husbandman (E).
الإريس والإريس ج . إريسون وإريسون وإريس وإريسة .
من تعاطى الزراعة .

١١٤٣ - أريترية الشحم* ، دُبابَة الشحم

Polietes lardaria (S). Aricie du lard (F).
حشرة من الذبابيات طولها من ٩ إلى ١٢ مم. عويناتها
إلى الحمرة . سرية الطيران . يكثر وجودها من نيسان
إلى تشرين . تسرح في الحقول وقرب الطرقات . تبيت
على الأشجار . لا تدخل البيوت ولا تقرب الشحم ، وقد
دميت غلطاً بدبابَة الشحم .

١١٤٤ - أريترية الغاب* ، دُبابَة الغاب

Mydaea lucorum (S). Aricie des bois (F).
حشرة من الذبابيات . طولها من ٧ إلى ٨ مم . يكثر
وجودها من نيسان إلى أيلول . مرتعها الأعشاب والأزهار
البرية والحدائقية من أي نوع كانت .

١١٦١ - أريغريسة

عشبة شبيهة بالنصي إلا أنها ارق وأضعف وألين وهي ناجمة في المال جداً ولها إذا جفت سقى كلما حرك تطاير فارز في العيون والمناخر (اللسان).

١١٦٢ - أريغريسة راجع أرنوس .

١١٦٣ - إريغريسة

هي الرفنا نبات عشبي من النجيليات .

١١٦٤ - أريغريسة ، شهباء . Erino (F). Erinos (E).

آفة تسببها بعض أنواع الحاشية عندما تلتصق بقاتها نصل الورقة لامتصاص نسغها فتلف المسام والبشرة وتحدث في النصل تنفطاً وتعمجاً وانتفاخات قوبية تضم النسيج وتؤدي النبات .

١١٦٥ - أريغريسة هو الأرنوس ، راجعه .

١١٦٦ - أريغريسة Eriode

فرد امريكي من فصيلة السيوسيات ، اطلب براكتيل .

١١٦٧ - أريغريسة Eriostème, Erlostémon, Crowéa

جنس جنات وشجيرات برية وزراعية تريينية من فصيلة السدييات ، منبتها أستراليا . أزهارها جميلة الشكل زغبية الاسدية وحاملها || تتكاثر بالبزور والعقل ، ترغب في الاماكن المتوسطة الاندماج المعتدلة الرطوبة .

١١٦٨ - إزاج Hangar (F). Outhouse, Cart-shed (E).

سقيفة تستعمل دريئة ومرأباً للمحاصيل والآليات الزراعية .

١١٦٩ - أزاد ، آزاد هو الزنبق الأبيض .

١١٧٠ - إزار ، درقة Clypeus, Epistome (F).

Clypeus, Epistoma (E).

هو في الحشرات الغمدية الجناح الجزء الامامي من الرأس ينتدئ عند البهق ويتهي عند الجاهض .

١١٧١ - إزار Murette de soutien

حويط يلزق بالخائط لتقويته ج أزر .

١١٧٢ - إزالة اللون Achromatisme (F).

Achromatism (E).

هي ازالة اللون الصورة بواسطة العدسة او الموشور .

١١٧٣ - أزاليه

جنس نباتات معمرة من الخلنجيات يعرف بالجلسان .

١١٧٤ - أزب

أزيت الابل : لم تجر فهي آزية . وقد يكون السبب اعياء او مرض .

١١٧٥ - أزب Pubescent (F). Pubescent,

Downy (E).

كل عضو يغشا زغب دقيق وقصير .

١١٧٦ - إزباب ، تزيب Passerillage

اسدى عمليات تجفيف العنب ليصير زيباً .

١١٧٧ - أزج أزج العشب : طال .

١١٧٨ - أزج

ذكر النعام الذي فوق عينيه ريش ابيض . واما الانثى فزجاء .

١١٥١ - أريغارون أزرق Erigeron acris (S).

Erigéron âcre, Vergerette âcre (F). Blue fleabane (E). Berufskraut, Echtes beschreikraut (D). Cespita acre, Cespita salvatica (I).

نوع من الاريفارون البري . ينبت في المواقع الرطبة . أزهاره الى الزرقة اليلكية || يقال انه طبي يفيد الصدر والمعدة .

١١٥٢ - أريغارون الجبل Erigeron linifolius (S).

Erigéron à feuilles ligneuses, Erigère (F). Flea-bane (E). Beschreikraut, Flohkraut (D). Cespita campestre, Erba della cimici (I).

نوع من الاريفارون البري الجبل ينبت قرب الصخور وفي الاماكن الرطبة . اوراقه مستطيلة ليفية النصل . يقال انه طبي يفيد الرأس والصدر .

١١٥٣ - أريغريسة Columelle (F). Columella (E).

دعامة صغيرة وحيدة تقوم كالشاهد في بعض اجناس وانواع الفطور المجهرية .

١١٥٤ - أرييل ، جفت Arille (F). Aril, Arillus (E).

غشاء ثانوي لاحق مفروض الاطراف مهدبها ينشب قرب أنقور بعض بذور النباتات .

١١٥٥ - أرييل * Gazella soemmeringi (S).

Gazelle de Soemmering (F).

ظبي متوسط الجثة ، منعطف القرن . الاحيد ، حنطي الظهر الاسمر الموج ، ابيض البطن والعجز ، اكحل العين والحد .

١١٥٦ - أرييل * ، طقطق ، فشقاش

Statice Armeria (S). Statice (F). Statice (E). Wied-erstoss, Sandhelke, Strandflieder (D). Statice (I).

نبات عشبي نجمي عسقولي معمر من الاريليات وفصيلة الرصاصيات ، يزرع للزينة . اوراقه قرصية التجميع جميلة الخضار الفاتح الزاهي . أزهاره صغيرة القد ضية التجميع مختلفة الالوان ترتكز على زناد قرصي الانتشاب . يتكاثر بالبزور .

١١٥٧ - أرييل أحمر ، عرق إنجبار

Statice limonium (S). Statice maritime, Béhen rouge, Safradelle, Lavande de mer (F). Sea lavender, Wild marsh beet (E). Echter widerstoss (D). Statice maritimo, Behem, Butola d'acqua (I).

نبات عشبي عسقولي من فصيلة الرصاصيات يزرع للزينة . اوراقه كبيرة جميلة الخضار . أزهاره الى الحمرة القرمزية .

١١٥٨ - أرييلان Arilane

ساجوم لاصق يزيد ميوعة الحواشير وانتشارها وثبيتها على مختلف اجزاء النبات الظاهره || يستعمل بنسبة ١ / ١٠٠

١١٥٩ - أريليات Staticées

سبط نباتات عشبية معمرة من فصيلة الرصاصيات . اشهرها الأريل . جميعها عسقولية نجمية . اوراقها حزامية جامعة بيضية مستطيلة لاطئة . أزهارها نوري التجميع يرتكز على زناد لبني دقيق قرصي الانتشاب يعلو الاوراق على قدرها ثلاث مرات . أزهارها صغيرة متعددة الالوان يغلب فيها الازرق .

١١٦٠ - أريما مرجيناتا * ، نصارية الزوفا Arima marginata (S).

خنفساء صغيرة القد من فصيلة النصاريات . طولها نحو ٨ مم . لونها الى السمرة . لها غمدان قصيران احمر الحافة الخارجية . ترتكز مع يرقاتها اكثر انواع الشفويات اخصها الزوفا والحزام .



أريل



أريل ، طقطق



أريما مرجيناتا

١١٧٩- إزْدَج : إزْدَج الثبت : اشتدت خصاصه .

١١٨٠- إزْدَرَحَتْ* ، زَلَزَلَتْ ، زَنْزَلَتْ ،

شجرة مُرَّة Melia azadirachta (S).

Azédarach, Margousier, Lilas des Indes (F). Bead tree, Margosa tree, Indian lilac, Azedarach (E). Zederach, Margoza, Indianischer lilak (D). Azadarac, Perlaro, Lilacco delle Indie (I).

شجرة برية كثيرة الاستعمال الصناعي والزراعي من فصيلة الازدرخيات . جذعها مستقيم الساق . أوراقها مركبة متعاقبة شديدة الخضار اللامع ، تستعمل بعد ازديابها في تخضير الابزار لكنها تؤخر في طعم الحليب ولونه . ازهارها عشكولية ليلكية اللون صغيرة القد . ثمارها نورية مرة الطعم لا تؤكل يستخرج منها مادة فعالة سامة . نقيع قشورها يدفع بعض الحميات ويقتل الحشرات . اخشابها صناعية كثيرة الاستعمال || تشكأ بالبنور . تعيش في جميع الأتربة لكنها تفضي الأقاليم الباردة .

١١٨١- إزْدَرَحَتْ : Meliaceae (S).

Méliacées (F). Meliaceae (E).

نباتات فصيلة الازدرخت وهي من ذوات الفلقتين العديدة الفعالات . جميعها أشجار وجنابات ، مهدا البلاد الحارة والاستوائية || سوقها مستقيمة ، قشورها ليفية غزيرة المصارة تجف وتلفظ وتتشق طولاً مع العسر || أوراقها مركبة معنقة متعاقبة . ازهارها محوري فردي أو جماعي الارتكاز ، عنقودي أو سنبل التجميع . ازهارها صغيرة مختلفة الألوان الزاهية . ثمارها عنبية سامة . بزورها صغيرة كروية سماء اللون || يعرف من أنواعها نحو ٢٥٠ تنتمي الى ٣٦ جنساً تعود الى أربعة أسباط || يستخرج من أكثر أنواعها مواد طبية ذات شأن وتستعمل اخشاب بعضها في مختلف الصناعات الخشبية .

١١٨٢- إزْدِوَج الاسدية Diandrie (F).

Diandrous (E).

من صفات بعض النباتات التي تزودج فيها الاسدية .

١١٨٣- إزْدِوَج شكلي Dimorphisme (F).

Dimorphism (E).

الازدواج الشكلي أو اختلاف الهيئة الفصلي أو الشقي ظاهرة جسمورية طبيعية تتميز بها اشكال بعض الحيوانات والنباتات التي تختلف بين الذكور والاناث أو التي تتبدل في مختلف فصول السنة .

١١٨٤- أَرْ ، أَرْ

أَرْ وأَرْ الثبت الأرض : غطاها . قال الاعشى :

« يضاحك الشمس منها كوكب شرق »

مؤذر بعميم الثبت مكمل »

١١٨٥- إَرْ Episterne (F). Episternum (E).

هو في معظم الحشرات كل جزء من الأقسام الامامية الطرفية من خوشر الجوشن . ومنهم من سماه أعلى القص وامام القص .

١١٨٦- إَرْب

أَرْب البقل اذا بدا فيه اليبس بخضرة وصفرة .

١١٨٧- إَرْبَاب Maturité des feuilles (F).

Maturity of leaf (E).

بلوغ الورقة كامل ادراكها ودخولها في طور القمامة .

١١٨٨- أَرْم Chat (F). Cat (E).

الازرم هو السنور المرقط الثوب الصغير القد .

١١٨٩- أَرْم Brévicaude (F).

Brevicaudate (E).

الازرم من الحيوان القصير الذنب .

١١٩٠- أَرْعَب Petit de taille (F). Dwarf (E).

الازعب من الحيوان ما كان صغير قداه فاضحاً وبمبدأ عن متوسط قد نوعه . م زعباء . ج زعب .

١١٩١- أَرْعَب Pubescent

نعت لاعضاء النبات التي يكسوها الور الناعم الدقيق .

١١٩٢- أَرْعَب الكرم

جرى فيه اللسع وبدأ يورق . أو صار في أبن السروع التي تخرج منها العنايد .

١١٩٣- أَرْغَل ، أَرْقَم ، زَق

Abecquer, Abéquer (F). To feed (E).

أرغل وأرقم وزق الطائر فرخه : اطعمه بمنقاره وأبلعه الاكل فابتله .

١١٩٤- أَرْلام Membres (F). Members (E).

أزلام البقر والغنم والاعز : قوائمها .

١١٩٥- إَرْعَب

إَرْعَب الطائر : شوك ريشه قبل أن يسود ويتلون .

١١٩٦- أَرْلق Glabrescent (F). Glabrous (E).

ما كان من النبات مالمس البشرة ناعماً . م زلقاء .

١١٩٧- أَرْمَع ، مَرْسَقَل Hétérogène (F).

Heterogeneous (E).

نعت وصفي للنبات الذي يشذ ان وعشاً أو شكلاً عن رفاقه من نباتات الضرب الواحد أو الهجين الواحد .

١١٩٨- أَرْمُوم Asemum (S).

Asemum (F). Asemum (E).

جنس حشرات من فصيلة القرنبيات ورتبة غمديات الاجنحة . أنواعه المعروفة قليلة العدد ، اعطائها مناطق الصنوبر || اجسامها صغيرة القد تطول من ١٢ الى ٢٠ مم . اثوابها سوية الألوان العابقة اعتمها الاسود والاطحل والاسمر ، خرمها فضية الحمل الدقيق || تسرح في النهار . تظهر في اواسط الربيع وتبقى حتى اواخر الصيف . مرتعها ازهار النباتات الحرجية || يرقأها خاشبة تركب الجلود اليابسة من جميع انواع الصنوبر باستثناء الصنوبر البحري .

١١٩٩- أَرْمُوم مُخَدَّد*

Asemum striatum (S). Asemum strié (F).

Asemum striatum (E).

حشرة غاضلة خاشبة من فصيلة القرنبيات ورتبة مغمذات الاجنحة . موطنها بعض اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط . تألف احراج الصنوبر . خنافسها تعيش على ازهار واوراق النباتات البرية . يرقأها خاشبة تعيش على الجلود والاغصان اليابسة || جسمها متوسط القد يطول من ١٤ الى ٢٠ مم . ثوبها الى السواد الكامد يملوه خل اربد . رأسها صغير القد . عينها صغيرتان بارزتان . زباناها خيطيان مقوسان . فكها صغيران ذربان . غمداها



إزدرخت



أزرم

غير ان كثرة تحد من الأثمار وتؤدي الصنف فتبيخته .
اما الأزوت النيتريكي المعروف تجارياً تحت اسم نيرات
الجير ونيرات الشيلي ونيرات الصودا فانه يوافق مزاج
جميع النباتات ويصلح لجميع الأتربة وينوع خاص للأتربة
التي تفتقر الى الكلس ولكنه يشكو من قلة استقراره وشدة
انجذابه الباطني في التربة . لذلك ينصح باستعماله سطحياً
وعلى دفعات متتابة . يذر على التربة قبل الزراعة
وبعدا وفي اثناء الطور الخضري وقبل الازهار وبعده .
ثم الأزوت الأمونيكي المعروف بسلفات الأمونيك فانه
يطي الانحلال والترجة وسبب ذلك ما يتخلل هذه العملية
من تحاويل وانفعالات عامة وموضعية تقرر حاله التربة
الكيمية وظروفها الحكيمة وبيئتها الجرثومية بعد الرطوبة
والحرارة ودرجة الحمضية . وسلفات الأمونيك يصلح مبدئياً
لكافة النباتات ولجميع الأتربة التي لا تفتقر الى الكلس
بنسبة فاضحة والتي مقياسها الحمضي يشير الى ست درجات .
ومن الواجب استعماله باكراً قبل حاجة النبات اليه ليتمكن من
اجتياز شتى التحاويل والاختارات اللازمة لتربته وتمثيله .
ومن الواجب ايضاً طمره في التربة بعد ثمره لئلا تجرفه الأمطار
او تسربه مياه الري في الزراعات المروية . و أخيراً
الأزوت المركب والمعروف تجارياً تحت اسم نيرات
الأمونيك ونيترا مونيكال وسلفونيرات الخ... فهذا الأزوت
يجمع بين صفات النيرات التي تقوم على سرعة الزوبان
وقابلية التمثيل المباشر وبين صفات الأمونيك التي ترتكز
على الانحلال التدريجي وطول مدة الاستقرار النفعي .
وبعد هذا الموجز عن ماهية الأزوت ، ودوره في حياة
النبات ، وأخص مركباته ، لا بد من ذكر بعض الشيء
عن مقدوره العنصري وما ينجم عن سوء استعماله . لقد
اثبت العلم والاختبار ان قوة انطلاق المحرك النباتي اي
طاقة النشوء الاندفاعية يستمدتها النبات ، لجميع اعضائه ،
من الجذور حتى الاوراق والخلايا ، من الأزوت . وان
الأزوت هو العنصر الرئيسي الذي يقرر مصير كل نبات .
غير ان كثرة تنشيط النمو الخضري والارهام وتطوح بالازهار
فتتخلص وقد تمنع تكوينها او تحول دون اكتماله . وقد
تكسب الثمار قشوراً سمكية وبشرة خشنة الملمس ولباً
ناشفاً او قليل العصارة . واما قلته فتفقد الاغصان والافئان
بعض زهورها وكامل غضاصتها وتسبب شحوب لون الاوراق
بعد اجهادها وادبار نضارتها . لذلك فخير ما جاء
مطابقاً لواقع الحال بعيداً عن التفتير الذي يعقبه الضعف
والسقم وبعيداً عن الافراط الذي ينجم عنه الاسراف
والانحطاط الصنفي .

١٢٠٥ - أزوت أمونيكي (F). Azote ammoniacal (F).

Ammoniacal nitrogen (E).
ومهم من قال ازوت نشادري ونوشادري . هو الأزوت
المرتكر على الأمونيك وهو بطي الانفعال يفيد النبات من
اي جنس كان لانه يمد تدريجياً بالأزوت اللازم لنموه
وحياته . اصنافه التجارية عديدة ، اعلمها استعمالاً
سلفات الأمونيك (اطلبها) .

١٢٠٦ - أزوت عضوي (F). Azote organique (F).

Organic nitrogen (E).
هو الازوت غير المعدني كالذي في الروث والبول واللحم
والكسب الى آخره .

١٢٠٧ - أزوت مُطلق (F). Azote libre (F).

Nitrogen free (E)

معتدلاً الصلابة ، متتابعاً التحزير القاطب . ارساغها
خماسية التكوين ، رباعية العقل الظاهرة . الانثى اكبر
قدماً من الذكر واضخم بطناً منه واقصر زبناً . جيلها
ثلاثي الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواخر ايار وتبقى
حتى اوائل آب . تسرح في النهار وتبيت في الليل .
البرقة مرقاة ، بطيئة النمو ، تدرك الكمال الجسموري بعد
النقف بنحو ٣٢ شهراً فيصبح طولها نحو ٤٠ مم . جسمها
مستغلق المقدم مستدق المؤخر . ثوبها الى الصفار التبي .
رأسها اسمر . طور الاكمال يستمر نحو ٤٠ يوماً
ويتنضي ضمن صلجة مركبة من فئات المواد النباتية
المجمونة بالريال .

١٢٠٠ - أزوت أزمن البقل : صار صالحاً للاستعمال .

١٢٠١ - إزهار ، تنوير (F). Fleuraison, Floraison (F).
Efflorescence, Flowering season (E).

هو تفتح الزهر او الالوان الذي يزهر فيه النبات وينوع
خاص الالوان الذي يتفتح فيه المبر لخروج طلع التفطيط .

١٢٠٢ - أزهر (F). Taureau sauvage (F). Savage bull (E).

هو الثور الوحشي ذكر الابقار الوحشية .

١٢٠٣ - إزهار (F). Inflorescence
هو نظام وشكل تجميع وارتكاز الازهار على النبات .
اوفره السنبل والمتقودي والعشكولي والنوري والصيواني
التجميع ثم الهامي والتاجي والابطي الارتكاز .

١٢٠٤ - أزوت ، نيتروجين (F). Azote, Nitrogène (F).

Azote, Nitrogen (E).
جسم بسيط غازي (اطلب ازوت مطلق) وهو من العناصر
الاساسية التي ترافق النبات في جميع اطواره من الانتاش
والنمو الخضري حتى الاثمار واكتمال الدورة الحياتية .
وهو الذي يدخل في تركيب الخضيب ، مختبر الغذاء
الطبيعي ، وفي تركيب النسيج ومختلف المواد الحيوية
والزلاية التي لا نشوء بدونها ولا اقبال . كانت مشكلة
الأزوت لمدة سنوات خلت تعتبر من اعظم المشاكل
الاقتصادية البشرية . حتى توصل العلم الى فك حصار
الانتاج المحدود المقتن فزال شبح قحط الأزوت وتقلص
معه خطر جود وتقهقر الاقتصاد البشري . يعتبر الأزوت
او النيتروجين من اهم العناصر الطبيعية الحياتية وهو موجود
في الهواء الذي يغمر الكرة الارضية ويوجد في اللحم والدم
والحليب ويدخل في تركيب جميع الحميرات الحيوانية
والخلايا النباتية لذلك فانه من الزم ضروريات الكائنات
الحية مهما كانت الشعبة التي تنتمي اليها والصف الذي
يميزها . ورغم كثرة وجوده في المحيط الجوي وبلوغ
حجمه اربعة اضعاف حجم الهواء . فالنبات لا يستطيع
اليه وصولاً ولا يستفيد منه الا جزئياً ذلك لان النباتات
المهوية التي منحها الطبيعة خاصية امتصاصه المباشر وقدرة
خزنها هي نباتات الفصيلة القرنية وبعض الطحالب والاشنة
دون سواها . اما الأزوت الذي يستفيد منه النبات فهو
الذي يمكن النبات منه ويصله عن طريق المركبات القابلة
التشيل . والمركبات الأزوتية اربعة وهي العضوية والنيترية
والامونيكية والنيترية - الامونيكية . فالأزوت العضوي
يوجد في سلح الطير وروث الخيل والدواب ونخي البقر
والجاموس ووبر الضأن والماعز . وفي الدم المخفف ونفايات
الجلود وقامة المدن وجذور النباتات القرنية الخ... استعماله
شائع عام . منافعه عديدة جميعها في صالح التربة والنبات

غاز شفاف عديم اللون والطعم والرائحة . يكون أربعة
الخماس حجم الهواء || رمزه (N) ، وزنه الاتومي ١٤.٠٠٨
رقه ٧ وهو ثنائي التكافؤ أي أن ذرته تتألف من اثنين .

١٢٠٨ - أزوت نيتريكي

Azote nitrique (F).
Nitric nitrogen (E).

هو الازوت الصناعي المعدني الذي يرتكز على النيترات
السريع الانفعال والتحويل || اسمائه واصنافه التجارية
عديدة . أهمها نيترات الشيلي ونيترات البوتاس ونيترات
الجير ونيترات الصودا ، اطلبها .

١٢٠٩ - أزوتوبكتيري

Azotobacter

اطلب بكتيرييه الازوت .

١٢١٠ - أذور

Diagonale (F). Diagonal (E).

هو الخط الجاري من زاوية الى اخرى مقابلة لها . ويدعى
خط الزاوية .

١٢١١ - أذوم

هو التساح الهندي .

١٢١٢ - أزيب

Vent du Sud-Est (F).

South-easterly wind (E).

هي الريح الجنوبية الشرقية . ريح مهبها بين الجنوب والشرق
وجهتها بين الغرب والشمال .

١٢١٣ - أزيب البحر

راجع ابو مخيط .

١٢١٤ - أزيدا *

Asida

خنفساء صغيرة القد من فصيلة النبشيات طولها من ١١
الى ١٤ مم . لونها الى الصهبة الكدراء يعلوها موج احمر .
تكثر في الاربة الرملية وبين الحجارة ، تركب الكرمة
ولا تؤذيها لان اضرارها النافهة لا تتعدى قضم اطراف
بعض الاوراق .

١٢١٥ - أزيدة راملة *

Asida sabulosa (S).

Aside des sables, Aside sablonneux (F).

Asida sabulosa (E).

حشرة خاضعة دامتة من فصيلة النبشيات ورتبة غديات
الاجنحة . موطنها يشمل معظم اقاليم الكرمة من الشرق
الايوسط واروبة . تألف الاراضي القليلة الاندماج . خنافسها
تعيش على اوراق النباتات البرية ولا تعف عن خلب
الكرمة . يرقاتها دامتة تعيش على المواد النباتية والعضوية
المتحللة || جسمها متوسط القد يطول من ١١ الى ١٤ مم .
ثوبها الى الصهبة الكدراء يعلوها موج جوري في الرأس
والكوسل وموج حنطي في الظهران . رأسها صغير الحجم
يبدو كأنه مفروس في قوس الكوسل . زباناها خيطيان
مستطيلان . عيناها صغيرتان بارزتان . ظهراتها قليل
الاحديداد ، رباعي التحزيز الغمدي . ارساغها الامامية
والوسطى خفاسية العقل اما الخلفية فرباعية . الانثى اكبر
قدأ من الذكر واهبت ثوباً منه واقصر زياناً || لها جبل
واحد في الحول . تظهر الحشرة الجمالانة في نيسان وتبقى
حتى اواخر كانون الاول . تسرح من العصر الى فحمة
الليل || والبرقة عند باوغها الكمال الجسموري تطول نحو
٢٠ مم . جسمها مبطل الشكل ، سداسي الواجه ،
مستغلظ الرأس ، ضليع التأشير ، اغبر اللون ، اطحل
المواج ، يسر في الرأس والسرك .

١٢١٦ - أزيمنشة *

Asimina (S).

Asiminier (F). Papaw (E). Pappawbaum (D).
Porcellia (I).

جنس نباتات معمرة من فصيلة القشديات . انواعه عديدة
جميعها اشجار وشجيرات وجنبات مهدا الاقاليم المعتدلة
الامريكية . اشهرها الازيمية المفصصة (*) (A. Triloba)
التي يستخرج من عصير ثمارها بعد الاختار شراب لذيد
الطعم والنكهة قليل المادة الكحولية . ثمارها عتيبة مستطيلة
طولها من ٥ الى ٨ سم . تصفر مع الادراك وتنفوخ منها
رائحة مستحبة . والثمرة تحوى من ٤ الى ٧ بذور غليظة .

١٢١٧ - آس ، حبلاس ، حبلاس ، ريحان

Myrtus (S). Myrte (F). Myrtle (E). Echte myrte (D).
Mirto, Martellina, Mirtella (I).

جنس نبات من فصيلة الآسيات . انواعه كثيرة تقرب
من الستين جميعها شجيرات وجنبات متقابلة الاوراق المنفة
الريحية المدببة || ازهارها بيضاء اللون او لرجوانية زاهية ،
خفاسية البتلات المنفرجة ، عديدة الاسدية ، احادية الميسم .
ثمارها شبه نووية بنفسجية او حمراء اللون والابيض
فيها قليل || جميعها من نباتات المناطق الحارة والمعتدلة
الحارة . تعيش وتنمو في معظم الاربة . تتكاثر بالبذر
والتعقيل والترقيد || اوراقه وثماره عافصة قابضة تستعمل
في ضعف المعدة وتفيد الاسهال . الفسيل بتقيعه يقوي
الاعضاء المسترخية وينشط الباه || يستخرج من ازهاره
واوراقه بالتقطير عطر يدعى ميرتول (Myrtol)
زيتي التركيب قوي العرف الفواح || ومن فوائد الآس
ان ورقه يطيب رائحة البدن ويقال انه يقوي اصل الشعر
ويطيله ويسوده ويمنع تساقطه . ورماد الآس ينقي الكلف
ويجلى البق وينفع من عضة الرتيلاء || اشهر انواعه يتبع .

١٢١٨ - آس جوتي *

Myrtus communis (S). Myrte commun (F).

نوع من الآس ينبت برياً في بعض المناطق اللبنانية السورية
يزرع لثماره المأكولة رغم عفوصتها وكثرة بزرها .
يتكاثر بالتعقيل والتدريج . يعيش في جميع الاربة .
اجوده ما غرس في تربة مروية معتدلة الاندماج || اما
ثمره فيدعى حب الآس وحبلاس ولفلس وشمون وتكمام .

١٢١٩ - آس قطني ، أنجم

Myrtus tomentosa (S).

Myrte cotonneux (F).

جنبية صغيرة جميلة الشكل والهندام تستعمل في التزيين .
ثمارها الى الحمرة البنفسجية .

١٢٢٠ - آس لومة ، مرء

Myrtus luma (S).

Myrte luma (F).

جنبية كبيرة القد فرعاء . اوراقها زباء . ثمارها شديدة
الحمرة والمفوصة تستعمل في الصناعات الخمرية .

١٢٢١ - آس محدب الورق ، قمام

Myrtus bullata (S). Myrte builleux (F).

جنبية فتاء متوسطة الحجم . ثمارها حمر ، اجاصية الشكل مأكولة .

١٢٢٢ - آس مسكي *

Myrtus ugni (S). Myrte musqué (F).

جنبية برية صغيرة كثيرة الفرائيق . ثمارها صغيرة باذنجانية
اللون شديدة العفوصة . تستعمل في الصناعات الخمرية



أزيدا



أزيدة راملة



أزيمنشة



أزيمنشة مفصصة



آس جوتي



آس مسكي

نسيجي لا متجانس وأما نقص في بعض العناصر المعدنية .

١٢٣٢- إسبكال ، سنبلثة Epiage, Epilaison (F).
هو تكون السبل في النبات اخصه الزرع . Earing (E).

١٢٣٣- إسبانخ* ، سبانخ ، إسفاناخ ،
إسفانخ ، رحي Spinacia oleracea (S).

Epinaud (F). Spinage, Garden spinach (E). Echter spinat, Garten spinat (D). Spinace, Spinacci (I).
بقلة من فصيلة السرمقيات . مهدا المقدار بلاد العجم .
منها البري الشائك الذي قل استعماله الآن ، ومنها
البستاني العديم الشوك الواسع الانتشار الزراعي والمأكول
من أكثر شعوب العالم || يعيش أينما زرع ولكنه يفضل
الآتربة الحوارة الغنية بالمواد الأزوتية التي تنشط الورق .
يتكاثر بالبذر ، زراعته تستوجب بعض العناية وخصصها
العزق والري || والاسبانخ يحوي بعض الحديد الذي
يفيد الاجسام السلية ويحوي أيضاً سلات البوتاس التي
ترسب في الكلى وتضر المصابين بالحصى || وكما أنه
يتزعم البقول الشتوية من حيث وفرة الحديد فانه يتزعمها أيضاً
بما يحويه من فيتامين « آ » وفيتامين « ث » وفيتامين « ك »
وهو الفيتامين الذي يساعد على تجلط الدم تجلطاً طبيعياً .

١٢٣٤- إسبانخ أبيض اطلب بازيله بيضاء .

١٢٣٥- إسبانخ بري*

Chenopodium Bonus Henricus (S). Epinaud sauvage, Bon-Henri (F). Allgood, English mercury, Good king Henry, Wild spinach (E). Allgut, Heinrichsgansse fuss (D). Chenopodio untuoso, Bono Enrico, Mercorello lunga, Spinacio salvatico (I).
نوع من رجل الأوز وهو نبات عشبي بري وزراعي من
فصيلة السرمقيات يزرع لأوراقه المأكولة المستعملة استعمال
السبانخ || يتكاثر بالبذر ويعود في جميع الآتربة الغنية
بعنصر الأزوت .

١٢٣٦- إسبانخ زيلثدة اطلب ترغون .

١٢٣٧- أسبد

أسبد النبات اذا نبت منه شيء حديث فيما قدم منه .

١٢٣٨- أسبراجين Asparagine (F). Asparagin (E).
هو الهليونين شبه قلوي الهليون .

١٢٣٩- أسبرولة هي الجويسة : اطلبها .

١٢٤٠- أسبوب Générateur (F). Generator (E).
هو ميكانيكياً كل آلة تحول طاقة الفاعلية الى قوة كهربائية .
وهو رياضياً الخط الذي تولد حركته سطحاً مستوياً .

١٢٤١- أسبور* Sparus (S).
Spare (F). Sparid fishes (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة الاسبوريات . انواعه عديدة
جميعها مأكولة تكثر في البحر المتوسط || أشهرها الحفارة
والسرب والتجاج والكندارة .

١٢٤٢- أسبوريات Sparidae (S).
Sparidés (F). Sparidae (E).
فصيلة اسماك من رتبة شائكات الزعانف تشمل الفريدي
والجريدي والسرغوس والسرب ونحوها .

والروحية ، اما غرائيقها فتستعمل في تزيين القبور في
الاعباد الاسلامية .

١٢٢٣- أس* Exposant (F). Exponent (E).
عدد يدل على مقدار الازدياد المطلوب .

١٢٢٤- أس ، أسس Fondations (F). Foundation (E).
أس الدار واسسها : حدودها وقواعدها . وأس الدار
واسسها : بني حدودها ورفع من قواعدها .

١٢٢٥- إساءة الاستعمال ، إستباحة ، تعمسف
Abus (F). Abuse, Grievance (E).

تعبير شامل يطلق للدلالة على حالات مختلفة منها :
استباحة الحق
استغلال القاصر
تجاوز السلطة
تجاوز حد الانتفاع
خيانة الامانة
خيانة التوقيع على بياض
Abus de droit
Abus d'un mineur
Abus d'autorité
Abus de jouissance
Abus de confiance
Abus du blanc seing

١٢٢٦- أسارون* ، ناردن بري

Asarum europaeum (S). Asaret, Nard sauvage, Cabaret (F). Asarabacca, Cabaret, Wild nard (E). Gemeine haselwurz, Wilde narde (D). Asaro, Orchio d'uomo, Nardo salvatico, Baccaro (I).

عشبة طيبة معمرة من فصيلة الزرافديات . سوقها مدادة
جارية حرشفية عند نهايتها . أوراقها كلوية طويلة الزناد .
أزهارها صغيرة عديدة الاسدية وحيدة الميسم رباعية البتلات
اللحمية القوية المنقصة المدبة القمة . جذورها فواحة
الرائحة الغلفلية . طعمها حامز مر . تستعمل في بعض
المستحضرات الطبية ويستخرج منها لون اخضر تفاحي
يستعمل في الدروس المجهرية || اما بذورها فقيئة تستعمل
حتى يومنا في روسيا وفي بعض البلاد الشرقية لحالات السكر
الشديد . ولهذا السبب تسمى بالفرنسية الحمار (cabaret)
والاسارون يعتبر من المنبهات الجنسية الشديدة الوقع
ولكنه ملهه ومؤذ للأنسجة . ويستعمل في الطب البيطري
لمرض السراجة عند الخيل .

١٢٢٧- أساس ، قاعدة ، عماد Base

جسم كماوي كالصودا أو الكلس ... مركب من امتزاج
معينه بالاكسجين . تعريفه الكياوي اصل يتحد مع
حامض ليكون ملحاً .

١٢٢٨- أساس اللستب Base d'un logarithme (F).
Radix of logarithm (E).

١٢٢٩- أسافة Sol peu profond
الأسافة هي الارض الرقيقة يهيج نبتها بسرعة .

١٢٣٠- أسب أسب الكبش : كثر صوفه فهو كبش مؤسب . والاسب
شعر الركب . ج أسوب (الجوهري) .

١٢٣١- أسبباب المرض Causes de la maladie (F).
Illness motives (E).
يتحلل النبات كالحايوان وكل مخلوق حي بمناعة ذاتية
تختلف قوتها باختلاف النبات ومؤهلاته ومدى استعداده
وهذا ما يدعى درجة المناعة || فالنبات القوي يقاوم
المؤثرات الخارجية ويدفعها اما الضعيف فيتأثر بها وتصرعه .
والضعف مصدره اما بنية ركيكة واما تركيب خلوي او



أسارون



إسبانخ



إسبانخ بري



أسبور



أسبيديسترا



ورقة زيزفون تركبها الاسترومة

١٢٥٩ - إستخطاب ، إقطاع . Exploitable (F).
إمكان قطع الاشجار أو تحطيمها . Work-ability (E).

١٢٦٠ - إستحقاق . Echéance (F). Falling due (E).
الاستحقاق أو حلول الاجل هو التاريخ الذي يصبح فيه الالتزام واجب التنفيذ .

١٢٦١ - إستخدام . Emploi (F). Employ (E).
يراد بها عادة الاشتغال تحت امرة رئيس سواء اكان العامل أجيراً أم مستخدماً أم موظفاً .

١٢٦٢ - إستخلص . Dédouaner (F). To clear (E).
استخرج البضاعة من الجمرك بعد تميم الاجراءات المطلوبة ودفع الرسوم .

١٢٦٣ - إستدّر .

يقال للمعزى اذا ارادت الفحل : قد استدرت .

١٢٦٤ - إستدراك ، رجوع . Rétraction (F).
Retraction (E).
رجوع المرء عن عمل قام به بمحض ارادته تفادياً من اثاره القانونية .

١٢٦٥ - إسترداد ، سحب . Retrait (F).
Right of pre-emption (E).
عمل يصرح به القانون ، في بعض الاحوال ، للمسترد ان يحل محل المسترد منه . وهو من كان قد اكتسب ملكية مال او اموال . فيأخذ لنفسه ملكية هذا المال ويتحمل اعباءه ويكون عليه ان يدفع للمستهلك الثمن والمصاريف .

١٢٦٦ - أستردية ، أستريديا . هو الحمار ، اطلبه .

١٢٦٧ - إسترونه ، قوبة زرفين . Sternite
هي مفصل من مفاصل بطن الحشرة الذي يتركب من عدة استرنات او قوب او زرفينات .

١٢٦٨ - أسترومه . Asteroma
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصفييات . انواعه المؤذية قليلة تتطفل على الاوراق فتوشها ببقع سماء او جزوية اللون تبدو صغيرة ثم تنتشر فيبلغ قطرها نحو ١٠ مم . يركب اوراق الزيزفون والموز والآنناس .

١٢٦٩ - إستريكنين ، ستريكين . Strychnine (F).
Strychnin, Strychnina (E).
مادة شبه قلوية سامة جداً وطبية تستخرج من بعض انواع الستريكينوز اخصها جوز القى وقول اينياس .

١٢٧٠ - إستسبار . Doxométrie (F).
Doxometry (E).
الاستسبار نوع من الاستفتاء الشعبي تقوم به بعض الاجهزة للوقوف على ردود فعل الرأي العام في قضية معينة .

١٢٧١ - إستسقاء ، حبن . Hydropisie,
Hydramnios (F). Dropsy (E).
تجمع مصل في بعض انسجة او تجاويف الجسم عند الحيوان || يصيب بنوع خاص اناث الخيل والحمير . عوارضه : ضيق وطف في التنفس ، عدم الاتبال على العلف ، عدم الاجترار ، امساك شديد ، ثم ضعف وهزال .

١٢٧٢ - إستسقاء الدماغ . Hydrocéphalie (F).
Hydrocephalus (E).
مرض يصيب الخيل في بعض اغشية الدماغ .

١٢٤٣ - إسفيداج ، إسفيداج . Céruse.
Céruite (F). Ceruse, Cerusite, Lead carbonate (E).
هو كربونات الرصاص الطبيعي . ثقله النوعي ٦,٥ وصلابته ٣,٥ . مظهره الخارجي بلورات ابرية الشكل متراصة التجميع لونها الى البياض وقد يكون لامعاً شفافاً .

١٢٤٤ - إسفيدار . هو الصمصاف الابيض .

١٢٤٥ - أسبيديسترا . Aspidistra (S).
هي الدريقة نبات تزييني ينمو في المراكن .

١٢٤٦ - إست ، سرم ، شرج . Anus
طرف المعي المستقيم وهو مخرج البعر والثقل .

١٢٤٧ - إستاجر ، إستكرى ، أكرى . Arreter (F). To rent, To let out (E).

١٢٤٨ - إستباحة الحق . Abus de droit
هو الإساءة في استعمال الحق وقد يكون تصرفاً قانونياً او عملاً مادياً يلحق الضرر بالغير فيتوجب على المتصرف ازالة الضرر بالتعويض عنه .

١٢٤٩ - إستبار . Sondage (F). Sounding (E).
تحري عمق الطبقات الارضية .

١٢٥٠ - إستيقاقي . Préoral (F).
نعت تعريفي يطلق في الزوولوجية ، علم الحيوان ، على كل زائدة تتقدم الفم عند الحيوان .

١٢٥١ - إستبدال . Conversion
هو ان يزيل الدائن ديناً قديماً ويستبدل به ديناً آخر يقوم على شروط تختلف عن شروط الدين الاول .

١٢٥٢ - إستبدال السند . Conversion de titre (F).
هو ان يحول حامل السند شكله . مثال ذلك ان يكون لحامله فيجعله اسماً او اسماً فيجعله لحامله .

١٢٥٣ - أستبون . اطلب موزده .

١٢٥٤ - إستثمار ، إستغلال . Exploitation (F).
Working, Improving, Cultivation, Using (E).
هو استخراج منافع الارزاق على انواعها وقد يكون ذلك بالزراعة والصناعة والتجارة الى آخره .

١٢٥٥ - إستجلاء البيض . Mirage des œufs (F).
Try eggs (E).
هو تمييز البيض المكوش بواسطة آلة خاصة تدعى مستجلي . ومن المستحسن اجراء هذه العملية على مرتين الاولى قبل الترخيم وذلك لنفي البيوض غير المكوشة . والثانية بعد الحضان بثلاثة ايام للتأكد من وجود الكيشة .

١٢٥٦ - إستجلى . Mirer (F). To try (E).
هو فحص البيض او استشفافه على الضوء .

١٢٥٧ - إستحالة . Convertibilité (F).
Convertibility (E).
صفة ما هو قابل التحويل .

١٢٥٨ - إستحرآم . Rut
زمن اشتها الفحل عند ذوات الظلف . يقال استحرمت البقرة عندما تسعى الى الثور .

المعلومات التي تعتبر دعامة المعارف البشرية ان في الحقول التقنية المختلفة الاهداف او الاجتماعية . وهذه المعلومات ، علمية كانت ام غير علمية ، يقوم بها جهاز آلي خاص يستوعب كل ما يتلقاه للاستفادة .

١٢٨٨ - **إِسْتِسْقَاب** (F).
Polarimétrie (F).
Polarimetry (E). قياس زوغان أو تقطيب الضوء .

١٢٨٩ - **إِسْتَقْطَر** ، **قَطَر** (F). To distil (E).
استخراج المادة تبخيراً على النار .

١٢٩٠ - **إِسْتِكْفَاء** (F).
Autarcie (F).
Autarchy (E). حالة الشعب الذي ينعم بالاستقلال الاقتصادي .

١٢٩١ - **إِسْتِكْنَان** (F).
Diapause (F).
Diapause (E). هو وقوف كل نشاط أو نمو أو تحوير عند الحشرة في أي مرحلة كانت من مراحل تطویرها الأربع ان جملاء أو عذراء أو يرقة أو مكنة .

١٢٩٢ - **إِسْتِلْعَاب** ، **نَقْل** (F).
Superfétation (F).
Superfétation, Superfaetation (E).
إستلعت النحلة اذا اطلعت طلعاً وفيها بقية من حملها الاول .
والاستلعب يحصل في بعض الحيوان كالارنب مثلاً اذا تلد الانثى على دفعتين بين الاولى والثانية نحو الاسبوع وأكثر وهي المدة الفاصلة بين كونهما الاول والثاني . وهو ما يدعى « حل على حل » أي اخصاب بويضة بعدد اخصاب اخرى من طمث سابق .

١٢٩٣ - **إِسْتِمْتَاع** (F).
Hédonisme (F).
Hedonism (E). مذهب فلسفي يقول ان اللذة هدف الحياة . اللذة بجميع مفاهيمها ومنها المصلحة .

١٢٩٤ - **إِسْتِمْرَاء** اطلب اغتذاء .

١٢٩٥ - **إِسْتِمْرَائِي** (F).
Nutritionnel (F).
Nutritional (E). راجع اغتذائي .

١٢٩٦ - **إِسْتِمْنَال** (F).
Sérothérapie (F).
Serothérapie (E).
المعالجة بالمصل . اتقاء مرض خبيث أو مداواته بالمناعة ويتم ذلك بحقن الحيوان بالمصل المقصود الحاوي على مقدار معين من جراثيم المرض المتوقع .

١٢٩٧ - **إِسْتِمْلَاك** (F).
Expropriation (F).
الاستملاك أي نزع الملكية هو سلب المالك ملكه قانونياً للنفع العام على أن يدفع ثمنه المقدم اليه .

١٢٩٨ - **إِسْتِمْنَاء** (F).
Insemination (F).
Artificial Impregnation (E).
نكاح اصطناعي عم استعماله في الابقار ، يقوم على نقل ذنين الثور أو بعض الذنين المحفوظ الى رحم البقرة المستحرة

١٢٩٩ - **أَسْتِن**

ربما كان اليبروج . قال أبو حنيفة : « الاستن شجر

١٢٧٣ - **إِسْتِسْقَاءُ الصَّفْنِ** (F).
Sarcocèle (F).
Sarcocèle (E).
علة تصيب الخيل والحمار سببها ورم في الخصية يكون رخواً ثم يتصلب فيؤلم الحيوان ويؤذيه .

١٢٧٤ - **إِسْتِسْقَاءُ المَفْصَل** (F).
Hydathrose (F).
Hydathrosis (E).
علة تحصل من تجمع سائل مصلّي في أحد المفاصل فتسبب العرج . تكثر في الخيل التي يجهدتها التعب .

١٢٧٥ - **إِسْتِسْقَاءُ عام** (F). Anasarque (F).
Anasarque (F).
مرض عضال يصيب الخيل والبقر والغنم في نسجهما الحجرية || عوارضه : سيلان اغبر اخر يعقبه ورم في الرأس وفي جميع الاعضاء الامامية .

١٢٧٦ - **إِسْتَشَال** (F).
Anglaiser (F).
To dock (a horse's) tail (E).
الاستشالة هي ازالة بعض عضل الذنب الخافضة لتظل الذنب شائلة . وقد تستعمل هذه العملية في الخيل .

١٢٧٧ - **إِسْتَشْرَاد** (F).
Transmutabilité (F).
Transmutability (E).
الاستشراء خاصة ما هو قابل الشروء أي التحول .

١٢٧٨ - **إِسْتَشْفَاف** (F).
Chandelage (F).
هو استجلاء أو نقد البيض بالفضوء الصناعي كالشمعة والتنديل والكهرباء استيضاحاً لكوشه .

١٢٧٩ - **إِسْتَصْرَاد** (F). Cryoscopie (F).
Cryoscopie (F).
معرفة درجة جمد المائعات المشتتة على مواد مذابة أو معلقة فيها .

١٢٨٠ - **إِسْتِعْجَالِيَّة** (F). Activisme (F).
Activisme (F).
الاستعجالية نظرية فلسفية تربط الفكرة بالعمل الفعلي .

١٢٨١ - **إِسْتِعْدَاد** (F).
Aptitude, Disposition (F).
Natural disposition (E).
هي القابلية والاهلية الذاتية التي تمكن الاستيعاب المعنوي والمساوي .

١٢٨٢ - **إِسْتَعْرَق** ، **إِعْشَرَق** ، **شَرَش** (F).
Enraciner (F).
To take root (E).
هو بروز وامتداد جذور النبات في التربة . فيقال نصوب مشرقة ومعرقة .

١٢٨٣ - **إِسْتِغْلَال** راجع استئجار .

١٢٨٤ - **إِسْتِغْلَال الخرج** (F).
Aménagement d'une forêt (F).
Management of a forest (E).
هو فن تنظيم الاستغلال من قطع وخلافه للحصول على مقدار من الخشب في كل سنة أو سنتين أو أكثر على الشكل الاجدى والانفع .

١٢٨٥ - **إِسْتِغْلَال مُبَاشَر** (F).
Faire-valoir direct (F).
هو أن يستغل صاحب الارض أرضه بنفسه أو لحسابه .

١٢٨٦ - **إِسْتِفْوَاع** ، **إِسْتِنْفَاد** (F).
Épuisement (F).
Exhaustion (E).
إستنفاد أو إستفواء

١٢٨٧ - **إِسْتِقْصَائِيَّة** ، **مَعْلُومَاتِيَّة** (F).
Informatique (F).
Informatic (E).
الاستقصائية أو المعلوماتية علم حديث محوره اجلاء



سا يظهره إستشفاف البيض

١٣١٤ - **إِسْتَنْصَال ، جَثَّ**
Dessouchage,
Dessouchement, Essouchage (F). Grubbing up (E).
قلع أرومة الشجرة من الأرض بعد قطعها .

١٣١٥ - **إِسْتَنْصَال ، بَثَر**
Ablation (F).
Ablatio. Ablation (E).
هو قطع جزء من عضو أو انتزاع عضو بكامله . فَبَثَر
الذنب هو قطع جزء منه واستئصال الخصى هو انتزاعها .

١٣١٦ - **إِسْتَنْي ، سُرمي ، شَرْجِي**
Anal
نعت وصفي يطلق على كل ما له صلة بطرف المعى المستقيم .

١٣١٧ - **أَسْتِيرُول**
Esterol
حاشور زراعي يرتكز على مادة الباراسيون يستعمل سائلاً
محلولاً بالماء بمعدل ٢,٥ ٪ في مكافحة جميع أنواع القراد
والحلم ومنها الترانيك والاكاروس .

١٣١٨ - **إِسْتَيْعَاب السَّفِينَة**
Jauge (F). Gauge (E).
هو مقدار ما تستطيع خزنة ونقله من بضاعة وخلافها .

١٣١٩ - **أَسْتِيكْس**
Astix
حاشور زراعي يرتكز على زرنبيخات الرصاص يستعمل
سائلاً محلولاً بمعدل ٧,٥ ٪ في مكافحة دودة الثمار
وغيرها من الديدان والحشرات .

١٣٢٠ - **أَسْتِيكْس نحاسي**
Astix cuprique A.F.
فاطور زراعي يرتكز على مادتي النحاس والزنك . يستعمل
سائلاً محلولاً بمعدل ١,٥ ٪ في مكافحة التسنن .

١٣٢١ - **إِسْتِيْلَاء ، إِشْغَال ، وَضْع البِد**
Occupation
مقدمة للتصرف بالمغار أو لتملكه .

١٣٢٢ - **أَسْتِيلِب *٥**
Astilbe (S).
Astilbe, Hoteia (F). Astilbe, False goat's beard (E).
Prachtspiere (D). Astilbe (I).
جنس نباتات معمرة من فصيلة القليليات . مهدبا الصين
واليابان . أنواعه عديدة معظمها بري وبعضها زراعي
تزييني جميل الأزهار الملونة الزاهية .

١٣٢٣ - **إِسْتَحَار**
قال أبو حنيفة : « نبات يشبه الفجل غير أن لا فجلة
له وهو خشن يرتفع في وسطه قصبة في رأسها كعبرة فيها
حب له دهن يؤكل ويتداوى به رفي ورقه حروقة » .
وقال الأزهرى : « الاسحارة بقلة حارة تنبت على ساق لها
ورق صغار ولها حبة سوداء كأنها الشهيذة » || ونحن
نرجح أنه السحار ، اطلبه .

١٣٢٤ - **أَسْتُفَان**
نبت له قرون كاللوبياء لا يؤكل ولا يعى يتداوى به
(عن أبي حنيفة) .

١٣٢٥ - **إِسْتِجَل**
شجر يستاك به . « اتخذ مساويك إسجل » (اللسان) .

١٣٢٦ - **أَسْحُمَان**
قال ابن سيده : « الاسحمان ضرب من الشجر » (اللسان) .

١٣٢٧ - **أَسَد**
Felis leo (S). Lion
حيوان مفترس من فصيلة السنوريات . يلتب بملك الحيوان

يفشو في منابته ويكثر ، فإذا نظر الناظر إليه من بعد
شبهه بشخص الناس « (اللسان) .
وقال النابغة :

« تحيد عن استن سود أسافله
مثل الإماء الفوادي تحمل الحزما »

١٣٠٠ - **أُسْتَنْة**
الأستنة ج . استنان : أصول الشجر البالية .

١٣٠١ - **إِسْتَنْجَاء** اطلب انجاء .

١٣٠٢ - **إِسْتَنْزَال**
Délibation (F). Delibation (E).
تعبير يدل على حسم أو اقتطاع جزء من المجموع كحسم
الموصى به من أصل التركة .

١٣٠٣ - **إِسْتَنْفَاد الحق**
Abusus
هو تصرف مادي أو معنوي يستنفد المالك به حقه على
العين فيبيعها أو يتلفها .

١٣٠٤ - **إِسْتِهْلَاك**
Amortissement (F).
Redemption, Buying up (E).
الاستهلاك شرعاً هو دفع الدين اقتساطاً مؤقتة حتى يتم
وفاءه . وهو أيضاً ما يلحق بالموجودات والأدوات الميكانيكية
وخلافها من هبوط في ثمنها بسبب القدم والاستعمال ، لذلك
فالاستهلاك يعني كل مبلغ يقتطع أو يجب من الأرباح
مقابل تراجع قيمة الأشياء الموجودة .

١٣٠٥ - **إِسْتَوَائِي**
Equatorial
نعت تعريفي يطلق على كل ما هو تابع للمناطق الاستوائية .

١٣٠٦ - **إِسْتَوَائِي**
Tropical
مختص بدائرة الانقلاب .

١٣٠٧ - **إِسْتَوْبَائِي *٥**
Epidémiologique (F).
Epidemiologic (E).
ما كان له صلة بالوباء .

١٣٠٨ - **إِسْتَوْفِي ، سُدُّ**
Acquit (F).
Receipt, Received (E).
لفظة بصينة المجهول يذيل بها سند دين للدلالة على وقائه .

١٣٠٩ - **إِسْتَوْكَح** استوكحت الفراخ : كبرت وغلظت .
١٣١٠ - **إِسْتَوْلَبَ**
يقال للغسان إذا ارادت الفحل : قد استولبت .

١٣١١ - **إِسْتَوْلَى ، شَغَلَ**
Occuper (F).
To occupy (E).
وضع يده على مال سائب أو مرسل أو لا مالك له بغية امتلاكه .

١٣١٢ - **أَسْتَوْمَة *٥**
Astoma (S).
Astome (F). Astoma (E).
نبات عشبي بري بضياضي الجذور من سبط الامينييات
وفصيلة النيميات . ساقه ملساء فرعاء . أوراقه ريشية
ثنائية التفصيل . أزهاره صغيرة . ثماره كروية مفلطحة
منحنية . بزوره منبعجة توأمية || يوجد في البقاع
قرب الماء .

١٣١٣ - **إِسْتِثْجَار**
Location (F).
Letting out, Hiring, Renting (E).
هو اكتراء المنازل والأراضي والأعيان المنقولة .



أستيلب

١٣٣٢ - أسد العجم *
Felis leo persicus (S).
Lion de Perse (F).
ربع الجثة ، صغير القد ، كثيف العفرة السمراء . ثوبه الى الصهبة الكادرة . موطنه إيران والهند وأفغان كان معروفاً في الجزيرة وفلسطين ولبنان وتركيا .

١٣٣٣ - أسد الهند * ورْد
Felis leo googratensis (S).
Lion du Guzerat (F). Manelass lion of Guzerat (E).
كبير الجثة ، أزعر اللبدة القليلة الكثافة . اصهب اللون من منكبته الى ذيله . بطنه الى البياض التبي . موطنه الهند والبلاد المجاورة حتى الجزيرة .

١٣٣٤ - أسد أصغر
le Petit Lion (F).
Leo minor (E).
الأسد الاصغر كوكبة نجوم شمالية الموقع مركزها بين برج الاسد والدب الاكبر || عدد نجومها ٥٣ أشهرها «المليك» و«رأس الأسد» و«قلب الأسد» و«عرف الأسد» و«ظهر الأسد» و«صغيرة الأسد» .

١٣٣٥ - أسد أمريكي
اطلب كوجر .
١٣٣٦ - أسد الارض *

Cardopatum corymbosum (S). Cardopate, Cardopatie, Caméléon noir (F). Black chameleon (E).
Schwarze eberwurz (D). Cardopate (I).
نبات عشبي بري من الشوكيات وفصيلة المركبات الانبوية الزهر . ينبت في الاراضي المذحاة والبور . تأكل بزوره العنايف .

١٣٣٧ - أسد الأرق *
Hemerobius (S).
Chrysopie, Hémérobe. Lion des pucerons (F).
جنس حشرات مفيدة من عصبيات الجناح . انواعه ٧ جميعها نافعة . انشاء تعلق مكنها على حافة فصل الاوراق التي يركبها الارق فتتقف عن دعاميص آفة تفرس الارق .

١٣٣٨ - أسد البحر
Otaria jubata, O. stellari (S).
Otarie à crinière, Lion marin (F). Sea lion (E).
نوع من الاتارية الشعراء العنق . ذكره كبير الجثة غليظها طوله نحو ٤٠٠ سم . ودوحته ٢٥٠ سم . ثوبه الى البني العايق الالامع . انشاء نحيلة الجسم ، هيفاء القد ، ثوبها الى الصهبة . يعيش في بعض مناطق المحيط الهادي . يكثر قرب شواطئ البيرو والشيلي والريو .

١٣٣٩ - أسد آف
Mélanisme (F).
Melanism (E).
تلوين اسود او اسمر يصيب الجلد في بعض المواقع .

١٣٤٠ - أسد ف
Mélanos (F). Melanous (E).
من يكون قد اصابه الاسداف في جلده .

١٣٤١ - أسديات الأرق
Chrysopidae,
Hemerobidae (S). Chrysopidés, Hémérobidés (F).
Chrysopidae, Hemerobidae (E).
فصيلة حشرات نافعة تشبه الذباب من عصبيات الجناح . اجناسها وانواعها عديدة . ألوانها مختلفة يكثر فيها الاسود . تتميز باستطالة اجسامها وبقرورها الاستعمارية الحيطية . دعاميصها مفترسة ، آفة ، نافعة .

١٣٤٢ - أسر الأسر هو الزبحاج .

١٣٤٣ - إسراب
Encavement (F). Cellaring (E).
الاسراب وضع النبيذ وسائر الخمور في الاتية المخصصة لها .

وهو اشدها قوة وبأساً واعظمها بطشاً وانبلها خلقاً . يقال وليس بثبت انه لا يدنو من المرأة الحائض ولو بلغ الجهد . طوله من قة رأسه حتى طرف ذيله يراوح من ٣٢٠ الى ٣٥٠ سم . وذيله نحو ٨٠ سم . ارتفاعه نحو المتر ووزنه من ٢٣٠ الى ٢٧٠ كيلو . طفرته تفوق ٤ امتار وقطرته من ١٢ الى ١٥ متراً . يعيش من ٣٠ الى ٤٠ سنة . يبلغ كامل نشاطه بعد الثلاث سنوات ، يتميز بلبدته الكثيفة . ثوبه الى الصهبة ، سري اللون يعلوه موج يختلف باختلاف النوع ولكنه يتحرف نحو الصفرة || للأسد اسماء كثيرة اكثرها مشتق من صفاته . قال ابن خالويه : للأسد خمائة اسم وصفة وزاد عليه علي بن قاسم بن جعفر اللغوي مائة وثلاثين اسماً ، فن أشهرها : أسامة ، البيس ، التاج ، الجحذب ، الحرث ، حيدرة ، الدواس ، الرثيال ، الزفر ، السبع ، الصعب ، الضرغام ، الضيفم ، الغنياس ، العوف ، الغضنفر ، الفرافصة ، القسورة ، الكهمس ، الليث ، المتبيب ، الهرماس ، الهزبر والورد || ومن كناه المشهورة ابو فراس ، ابو الابطال ، ابو حفص ، ابو الاخيف ، ابو شبل ، ابو العباس ، ابو الحرث وابو الفرهد || ويقال للثلاثي اسدة ولبوة ولبوة || ويقال لولده الشبل والحفص والفرهد || وللأسد من الصبر على الجوع وقلة الحاجة الى الماء ما ليس لغيره من السباع . وهو محموم وكسول في النهار يستعيد نشاطه وشجاعته ويطشه في الليل من غروب الشمس حتى بزوغها . ومن أكل نهس من غير مضغ ولعابه قليل جداً ولذلك يوصف بالبحر . ويقال انه لا يأكل من فريسة غيره فاذا شبع من فريسته تركها ولم يعد اليها واذا جاع ساءت اخلاقه واذا امتلأ من الطعام ارتاض ولا يشرب من ماء ولغ فيها كلب وقد اشار الى ذلك الشاعر بقوله :

«واترك حبها من غير بغض
وذاك لكثرة الشركاء فيه
اذا وقع الذباب على طعام
رفعت يدي ونفسي تشبهه
وتجتنب الأسود ورود ماء
اذا كان الكلاب ولعن فيه»
انواعه ستة : اربعة منها افريقية واثنان اسيويان .

١٣٢٨ - أسد البربر * ، أسد الصحراء
Felis leo barbarus (S). Lion de barbaria (F). Lion (E).
كبير الجثة ، شامخ الرأس ، كثيف العفرة السمراء . ثوبه صحر أصهب ، اغصبر الموج . موطنه الصحراء الكبيرة وجبال الاطلس .

١٣٢٩ - أسد الرأس * ، أسد القطب
Felis leo capensis (S). Lion du Cap (F).
ربع الجثة ، غليظ العفرة الكثيفة . ثوبه صحر عابق . موطنه افريقية الجنوبية .

١٣٣٠ - أسد السنغال *
Felis leo senegalensis (S).
Lion du Sénégal (F).
اكبر الأسود جثة واشدها بطشاً . كثيف اللبدة . ثوبه صحر أصهب . موطنه افريقية الشمالية والشرقية . يكثر في السنغال .

١٣٣١ - أسد الصومال *
Felis leo somaliensis (S).
Lion de la Somalie (F).
ربع الجثة شديد البطش ، كثيف اللبدة السمراء الممتدة حتى الاسدرين ، ثوبه اكهب اربد تغشاء غيرة سمراء . موطنه الصومال والحبشة وافريقية الشرقية .



أسد البربر



أسد الرأس



أسد السنغال



أسد الصومال



أسد العجم



أسد الهند



أسد الارض



أسد الارق



أسروع

١٣٥٢ - **أَسْطَرُ كَبِيرُ الزَّهَر** (S). *Aster grandiflorus* (S). *Aster à grandes fleurs* (F).
نوع من الأسطر قليل الفروع ، بعيد الفواصل ، كبير الأزهار جميلها . يزرع للتزيين .

١٣٥٣ - **أَسْطَرُ كَثِيرُ الزَّهَر** (S). *Aster multiflorus* (S). *Aster multiflore* (F).
نوع من الأسطر متوسط القد ، حزمي الفروع عديدها كثير الأزهار الكثيفة التجميع . يزرع للتزيين .

١٣٥٤ - **أَسْطَرُ يُخْتَصُّوَرِي** (S). *Aster caespitosus* (S). *Aster gazonnant* (F).
نوع من الأسطر الحزمي الشكل ، صغير القد ، قصير الفواصل ، جميل الأزهار . يزرع للتزيين .

١٣٥٥ - **أَسْطَرُ أَطَقُوس * ، خُرَام**

Aster Tripolium (S). *Astère attique*, *Astère maritime*, *Tripolium* (F). *Sea-starwort*, *Sea aster*, *Tripoly* (E). *Strandaster*, *Sternblume* (D). *Astero* (I).
نبات عشبي معمر من فصيلة المركبات الأسطورية الزهر . ينبت طوعياً في بعض المناطق والأراضي الرطبة . يقال انه طيب ويدخل في تركيب بعض العقاقير النافعة . منه ضروب زراعية تستعمل في التزيين ، تتكاثر بالبذر والعقل وتجود في جميع الأتربة الرطبة .

١٣٥٦ - **أَسْطَرُ أَغَالُوس ، مَخْلَبُ الْعُقَاب ، عَنَزَرُوت ، قَدَادَ ، أَسْطَرَاغُلُس**

Astragalus (S). *Astragale* (F). *Astragal*, *Milk vetch* (E). *Astragal* (D). *Astragalo* (I).
جنس نباتات عشبية وجنية حولية ومحولة ومعمرة ، معظمها بري وبعضها طيب وصناعي وزيني وهي من فصيلة القرنيات الفراشية . يوجد منها في جميع المناطق المعتدلة ومنها أنواع مبادلة في جبال لبنان وسورية || أزهارها قد تكون عنقودية أو سنبلية أو عثكولية التجميع ونادراً فردية . وهي غالباً بيضاء اللون ومنها الأصفر والبنفسجي والقرمزي || يعرف منها ما لا يقل عن الألف نوع أشهرها الأسطراغالوس العربي الذي يستخرج منه الصمغ ثم الأسطراغالوس اللبناني ثم الأسطراغالوس النجمي المستعمل في مكافحة السفلس . ومن أنواعها الشائعة :

١٣٥٧ - **أَسْطَرَاغَالُوسُ الْحَلِيب** (S). *Astragalus glaucus* (S). *Glauce*, *Galax*, *Glaux* (F). *Sea milkwort*, *Milkwort* (E). *Astragalo*, *Galega* (I).
نبات عشبي بري دماغ يستخرج منه جوهر فعال يستعمل في الصيدلة .

١٣٥٨ - **أَسْطَرَاغَالُوسُ جَبَلِي * ، حَمَصُ جَبَلِي**

Astragalus cicer (S). *Chiche de montagne* (F). *Vetch Mountain chickpea* (E). *Kichertragant*, *Wilde kichern* (D). *Astragalo a frutto rotondo*, *Cece di terra* (I).
نبات عشبي بري يستخرج منه جوهر فعال يستعمل في الصيدلة .

١٣٥٩ - **أَسْطَرَاغَالُوسُ دَبِيق * ، كَثِيرَاءُ بَيْضَاء ، قَتَادُ الصَّمْغ**

Astragalus gummifera (S). *Astragale gommifère* (F). *Astragal*, *Milk vetch* (E). *Tragant*, *Astragal* (D). *Astragalo*, *Dragante* (I).
نوع عديد الضروب منبتها الشرق الأوسط ، يستخرج من سوقها عصارة صمغية طيبة مشهورة الاستعمال .

١٣٦٠ - **أَسْطَرَاغَالُوسُ عِرْقِ السُّوس * ، عِرْقِ السُّوس البري**
Astragalus glycyphyllos (S). *Astragale réglisse*, *Réglisse sauvage* (F). *Liquorice*

١٣٤٤ - **أَسْرَار**

قال داود الانطاكي انه نبات بسواحل البحر ينبت في الصخر الى ذراع له ورق وزهر يخلف ثمرأ كاليندق ومنها مستطيل وله صمغ لزج اذا جف يشبه الكندر . وهو نبات طبي .

١٣٤٥ - **أَسْرَب**

Graphite (F). *Graphite*, *Plumbago*, *Black lead* (E).
الأسرب والأسرب والأسروب والبرغشت والغرافيت والغملول والقملول والكملول : معدن مركب من الكربون رمزه «C» مثل الألماس . صلابته تراوح من ٥ الى ١ بينما هي ١٠ في الألماس . وزنه النسبي يراوح من ١٠٩ الى ٢٠٣ . يتميز بخاصية تكليس الذهب وتحزيز الألماس وإصالية الكهرباء || يستعمل في صناعة الأقلام الرصاصية .

١٣٤٦ - **إِسْمَرْنَج**

هو الزرقون والزرقون والسليقون : أكسيد الرصاص الاحمر . وزنه النسبي ٤٠٦ ، صلابته من ٢ الى ٣ . محلوله بزيت البويا يستعمل في دهان الحديد لانه يمنع الصدأ .

١٣٤٧ - **أَسْرُوع * ، يَسْرُوع ، سُرْفَة**

Chenille (F). *Caterpillar* (E).
اسم تعريفي يطلق على جميع يرقات وديدان الفراشات الحشرية الاجنحة منذ نفقها حتى دخولها في طور الخادرة .

١٣٤٨ - **أَسْمَرُوعِي * ٥**

Larvaire (F). *Larva*, *Immature* (E).
اسروعى ودعوصى ويرقى ، ثلاثة اسماء تطلق على طور معين تكون فيه الحشرة بين النقف والانسلخ الاخير .

١٣٤٩ - **أَسْط**

Acesta (S). *Aceste* (F). *Acesta* (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات الصفحيات الحياثيم يتميز بقنابه العميق الهزبة وبالشوك المسطوح المقوس القائم عند فجوة القناب مع العديد من المصبات .

١٣٥٠ - **إِسْطَبِل * ، إِنْطَبِل ، آخُور ، يَأْخُور**

Ecurie (F). *Stall* (E).
هو المسكن المعد لربط الدواب من فصيلة الخيليات . الشروط الصحية والاقتصادية الواجب مراعاتها في هذا المبنى هي :
(١) انتقاء موقع الاستبل في مكان يصرف الماء بسهولة معرضه الشرق اذا امكن . (٢) جعل سقف المبنى على علو ٣٥٠ أو ٤٠٠ سم . (٣) إمالة أرض المبنى نحو ١,٥ أو ٢ ٪ تسهيلاً لصرف البول والماء . وتبليطها أو تويرها بأحدى المواد الصلبة التي لا تمتص الماء .
(٤) تفريق الخيل عن بعضها بمحاجز من خشب معلقة غير ثابتة . (٥) تخصيص المساحة الضرورية للرأس . أفضلها طول ٢٥٠ سم . بمرص ١٥٠ سم . ما عدا المعلق الذي يراوح عرضه من ٥٠ الى ٦٠ سم . (٦) فتح النوافذ الضرورية لتجديد الهواء مع الانتباه الكلي لعدم تعريض الخيل لهجاري الهواء .

١٣٥١ - **أَسْطَر * ، نَجْمِيَّة**

Aster (S). *Aster* (F). *Starwort* (E). *Aster*, *Asterblume*, *Sternblume* (D). *Astero* (I).
جنس نباتات زراعية زهرية معمرة من الأسطريات وفصيلة المركبات . أنواعه وضروبه عديدة جميعها تزيينية تختلف بأحجامها وأشكالها وألوانها || يتكاثر بالبذر والتعجيل والتدريج . يعيش في جميع الأتربة .



إسطبل



أسطر



أسطراطيقوس



أسطراغالوس الحليب



أسطراغالوس جبلي



أسطراغالوس دبق

١٣٨١ - أستراغالوس فصلي، خنصر العروس
Astragalus trimestri (S).

١٣٨٢ - أستراغالوس فضي الورق
Astragalus argyrophyllus (S).

١٣٨٣ - أستراغالوس قيد آدي.
Astragalus echinus (S).

١٣٨٤ - أستراغالوس قزم
Astragalus nanus (S).

١٣٨٥ - أستراغالوس قزي، دريس
Astragalus bombycinus (S).

١٣٨٦ - أستراغالوس قشبي.
Astragalus tramineus (S).

١٣٨٧ - أستراغالوس كثير الزوايا
Astragalus angulosus (S).

١٣٨٨ - أستراغالوس لبّادي
Astragalus tomentosus (S).

١٣٨٩ - أستراغالوس لحافي
Astragalus stromatodes (S).

١٣٩٠ - أستراغالوس لسان الزمزر
Astragalus epiglottis (S).

١٣٩١ - أستراغالوس لكّامي
Astragalus amarus (S).

١٣٩٢ - أستراغالوس متصالب، خزام القط
Astragalus cruciatus (S).

١٣٩٣ - أستراغالوس مجعد.
Astragalus corrugatus (S).

١٣٩٤ - أستراغالوس مزدوج
Astragalus conduplicatus (S).

١٣٩٥ - أستراغالوس مشطي
Astragalus pectinatus (S).

١٣٩٦ - أستراغالوس مقدّس
Astragalus sanctus (S).

١٣٩٧ - أستراغالوس ملتبس
Astragalus ambiguus (S).

١٣٩٨ - أستراغالوس نجمي.
Astragalus excapus (F).

١٣٩٩ - أسترأون اطلب محار.
١٤٠٠ - أسترلاب *

Astrolabe (F).
Astrolabe (E).

آلة يقيس بها الفلكيون ارتفاع الكواكب مع تحديد دوائر
الطول والعرض. كما وانها ركيزة مراجع الابحاث المتعلقة
بدوران الارض وبسير الكواكب.

١٤٠١ - أسترديات (F), Asteroidae (E).
سبط من فصيلة المركبات، أنواعه زهاء ٤٠٠ مهددا
العالم معظمها بري وبعضها زراعي تزييني.

١٤٠٢ - إسطفيلين اطلب جزر ابيض.

١٤٠٣ - أسطوانات بشروية
Cylindres épithéliaux (F), Epithelial cylinder (E).

١٤٠٤ - أسطوانة
Cylindre (F), Cylinder (E).

١٤٠٥ - أسطوانة دائرية
Cylindre circulaire (F), Circular cylinder (E).

vetch (E). Barentragant, Lackritzwicke (D). Rego-
lizia bastarda, Astragalo liquirizia, Falsa liquirizia,
Liquirizia salvatica (I).

نبات عشبي بري يستخرج منه مادة طبية تدفع الحميات.

١٣٦١ - أستراغالوس كثيراء*، كثيراء، حلويسيا
Astragalus tragacantha (S). Adragant, Tragacanth

(F). Gum-tragacanth plant, Goat's thorn (E). Adra-
gant, Bocksdistel (D). Dragante, Spina di becco,
Barba di volpe (I).

نبات طبي يستخرج منه جوهر فعال يستعمل ضد الحميات
أخصها المعودة والبردية.

١٣٦٢ - أستراغالوس نوارس، نوارس، شجرة
Astragalus arnacantha (S). القُدس، عَصَب

Astragale arnacanth (F). Small goat's thorn (E).
Kicherarnakant (D). Astragalo aracanta (I).

نبات بري طبي يستخرج منه جوهر فعال يستعمل ضد
الغصن والديدان.

ومن اشهر انواعه المبدولة نخس بالذکر:

١٣٦٣ - أستراغالوس أرزي.
Astragalus cedreti (S).

١٣٦٤ - أستراغالوس بيروني
Astragalus berytheus (S).

١٣٦٥ - أستراغالوس ثلجي القرنة
Astragalus aulacolobus (S).

١٣٦٦ - أستراغالوس حرْموني
Astragalus hermoneus (S).

١٣٦٧ - أستراغالوس حَلبي
Astragalus aleppicus (S).

١٣٦٨ - أستراغالوس حَلقي، حُرْبُث
Astragalus annularis (S).

١٣٦٩ - أستراغالوس درزي، قُطْبُط
Astragalus drusorum (S).

١٣٧٠ - أستراغالوس درلي
Astragalus tuberculatus (S).

١٣٧١ - أستراغالوس دمشقي
Astragalus damascenus (S).

١٣٧٢ - أستراغالوس ذهبي الورق
Astragalus chrysophyllus (S).

١٣٧٣ - أستراغالوس رحال، كُرَيْشَة الحمام
Astragalus peragrinus (S).

١٣٧٤ - أستراغالوس سياري، أصابع العروس
Astragalus sieberi (S).

١٣٧٥ - أستراغالوس شصبي، قرين
Astragalus hamosus (S).

١٣٧٦ - أستراغالوس صَنْبُوري
Astragalus pinetorum (S).

١٣٧٧ - أستراغالوس صوفي
Astragalus lanatus (S).

١٣٧٨ - أستراغالوس ضيق الورق
Astragalus angustifolius (S).

١٣٧٩ - أستراغالوس عَففي
Astragalus hirsutissimus (S).


١٣٨٠ - أستراغالوس عَنْدَمِي
Astragalus cruentiflorus (S).



أستراغالوس عرق السوس



أستراغالوس كثيراء



أسترولاب



أسطوانة البحر

خمسة تكثر في مياه البحار الحارة وهي كبيرة القد مستطيلة الجسم والحطم ، حادة الاسنان القوية ، مأكولة مستحبة الطعم ، مبدولة في السواحل اللبنانية السورية .

١٤١٨ - إسفيريات ، إسفيريات

Sphyræna (S). Sphyræna (F). Sphyræna (E). فصيلة اسماك بحرية من رتبة شالكانات الزعانف تشمل جنساً واحداً يدعى الاسفري .

١٤١٩ - أسفوق

أسفوق الماشية : لم يحلبها في اليوم إلا مرة واحدة .

١٤٢٠ - إسفننج

Spongia (S). Eponge (F).

Sponge, Spongia (E).

حيوان مائي بسيط التركيب من الاسفنجيات المجوفات ، انواعه عديدة معظمها يعيش ملتصقاً بصخور القاع في المياه المالحة الضحلة . لونه الطبيعي يراوح بين الاصفر والاصفر والبني . ومنه انواع تعيش في المياه العذبة لونها الى الخضرة . والاسفنج يتغذى بانطافيليات المائية التي يدفعها التيار الى تجاويفه حيث تدخل من الفتحات الصغيرة فيضم منها ما هو بحاجة اليه ويطرد ما هو بغنى عنه من فتحاته الواسعة . يصطاد بالنطس على السواحل البحرية . يكثر وجوده في المياه اللبنانية وعلى بعض السواحل المصرية وفي اليونان وايطاليا .

١٤٢١ - إسفننجيات

Eponges, Spongiaires (F).

Spongiae (E).

شعبة حيوانية من المجوفات او اللاحشويات تشمل عدة اقسام منها الصالحة للاستهلاك ومنها تزيينية وغيرها لا حاجة لها حتى الآن .

١٤٢٢ - أسفند

هو الخردل الابيض .

١٤٢٣ - أسفندان

هو القيقب .

١٤٢٤ - أسفند النبات

هي القيقبات فصيلة نباتية .

١٤٢٥ - إسفيداج

Céruse, Cérusite (F).

Ceruse, White lead, Cerusite (E).

هو كربونات الرصاص الطبيعي . حجر شفاف لا يخلو من اللعنة . لونه الى البياض أو الصفرة . وزنه النسبي ٦,٥ ، صلابته ٣,٥ || يستعمل في عدة صناعات اخصها دهان الخشب والجبس .

١٤٢٦ - إسفيدار

هو الخردل الابيض . اطلبه .

١٤٢٧ - إسفيني ، سفروطي

Cunéiforme (F).

Cuneliform (E).

نعت وصفي لشكل خاص هيئته كالاسفين .

١٤٢٨ - إسقاء ، إرواء ، سقي ، ري

Arrosage, Irrigation (F). Watering, Sprinkling, Irrigation (E).

الاسقاء هو اعطاء المزروعات ما يلزمها من ماء . اما طرق الاسقاء فعدة اخصها :

Irrigation

الري

وهو سقي الزراعات الواسعة

par aspersion

الاسقاء بالرش

par infiltration

الاسقاء بالرشح

par déversement

الاسقاء بالسيح

par submersion

الاسقاء بالغمر

١٤٠٦ - أسطوانائي

Cylindrique (F). Cylindrical (E).

١٤٠٧ - أسطوخودوس

اطلب خزامى بحرية .

١٤٠٨ - أسطوانة البر

Tenebrionides mauritanicus, Trogosita mauritanica (S). Cadelle (F). Cadelle (E). Gemeiner Brotkäfer (D).

خنافس من فصيلة الاسطوانيات طولها نحو ٨ مم . لونها اسود تعلوه ماجة حنطية لامعة . تعيش بين محاصيل الحنطة والشعير والذرة الصفراء حيث تفترس الحشرات التي تتركب هذه الاغلال . يرقها تعيش على الحبوب التي صار نحرها من قبل غيرها ، وهذه البرقة تدعى « كادل » .

١٤٠٩ - أسطوانة الصنوبر

Temnochila caerulea (S).

حشرة من الاسطوانيات طولها نحو ١٥ مم . لونها اسود تعلوه ماجة زبرجدية لامعة . تعيش تحت لحاء الصنوبر وفي حطبها اليابس تفترس الحشرات .

١٤١٠ - أسطوانة الصوفان

Thymalus limbatus (S).

خنافس من الاسطوانيات طولها نحو ٦ مم . شكلها مستدير ، لونها اسفح لامع تشوبه زغبة خفيفة . تعيش على الصوفان حيث تفترس ما وصل اليها من هوام وحشرات .

١٤١١ - أسطوانة اللحاء

Nemosoma elongatum (S). Némosome élongé (F).

حشرة من الاسطوانيات طولها نحو ٥ مم . مستطيلة الشكل رأسها وصدرها الى السرة ، عندها متباينة الالوان نصفها الى الشقرة ونصفها الآخر الى السمرة السوداء || تعيش تحت اللحاء في سرايب السكوليت وغيرها .

١٤١٢ - أسطوانيات

Ostomatidae (S).

Ostomatidés, Ostomidés (F). Ostomatidae (E).

فصيلة حشرات نافعة من رتبة عمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها عديدة . اجسامها مستطيلة الشكل . قرونها الاستشعارية مركبة من ١٠ او ١١ فاصلة . ارساغها خاسية ، مكها اسطواناني الشكل ، اغبر اللون . يرقاتها صغيرة . اجسامها غبراء اللون . رؤوسها وشروجها سود . تعيش تحت اللحاء وبينها وعلى الصوفان . تفترس ما وصل اليها من حشرات .

١٤١٣ - إسقاء ، ترأصع ، كوش

Reproduction des oiseaux (F). Reproduction of birds (E).

هو تزاج الطير من دجاج وغيرها . يقال تسافت الطيور وسفد بعضها على بعض .

١٤١٤ - أسفاقس

اطلب قويسة مخزنية .

١٤١٥ - إسفانج

راجع اسبانج .

١٤١٦ - أسفراج

هو المليون منه الزراعي والتزييني والبري . اطلب هليون .

١٤١٧ - إسفري ، إسفري ، سفرة ، بركودة

Sphyræna (S). Sphyrène, Brochet de mer, Lussi, Espet (F). Barracuda, Spet (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الاسفريات . انواعه المعروفة



أسطوانة الصنوبر



أسطوانة الصوفان



أسطوانة اللحاء



اسفري



اسفنج

فصيلة اسماك بحرية من العظميات الشائكات الزعانف .
اجناسها خمسة وهي :

Scombres	الإسقمري
Pélamydes	البكورة
Bonites	البونيت
Thons	التن
Germons	الكنعد

١٤٣٧ - إسقنقور* ، سقنقور ، أدّة

Scinque (F). Skink (E).
الاسقنقور عظاية بقدر الشبر شبيه بالورل يكثر في الرمال التي تلي النيل في نواحي الصعيد . راجع سقنقور وقد وصف الدميري الاسقنقور فقال : « قال ابن بختيشوع : انه التساح البري . وقال ابن زهر هي دابة بمصر شكلها شكل الوزغة . ومن المعروف ان التساح يبيض في البر فا وقع من بيضه في الماء صار تساحاً وما بقي في البر صار اسقنقوراً » .

١٤٣٨ - أسقورديون بري* ، منضار

Teucrium scordioides (S). Germandrée sauvage (F). Garlic sage, Wood germander, Wood sage (E). Waldgamander, Waldsalvi (D). Teucro salvatico, Camendrio salvatico (I).
نوع من الطوقريون من فصيلة الشفويات . وهو نبات عشبي لبني طربي متقابل الاوراق الزغبية النصل المسن . كان ولا يزال يستعمل في بعض المستحضرات الطبية .

١٤٣٩ - أسقورديون مائي* ، ثوم الحبة

Teucrium scordium (S). Germandrée aquatique, Scordion (F). Scordium, Water germander (E). Lauchgamander, Wassergamander (D). Camendrio zquatico, Teucro acquatico, Scordio (I).
نوع من الطوقريون من فصيلة الشفويات يكثر في المناطق وعلى ضفاف الماء وهو من الاعشاب الطبية الجزيلة النفع .

١٤٤٠ - أسك

كل حيوان قصير الأذن صغيرها فهو اسك وبني سكاء .
ج سك .

١٤٤١ - أسك ٥ Asque (F). Ascus, Sporangium (E).

هو الزق ، اطلبه .

١٤٤٢ - إسكاه Esca

هو الصوفان الكاذب فطر من السيات ، اطلبه .

١٤٤٣ - أسكاكوير Ascacuire sacfa

فاطور زراعي يرتكز على مادتي النحاس والزنك . يستعمل سائلاً محلولاً ١٪ في مكافحة القسنة (الميلديو) .

١٤٤٤ - أسكريد Ascaride (F). Ascaride, Thread-worms (E).

هو الصفر ، اطلبه .

١٤٤٥ - أسكرين ٥ Ascarinus (S).

Ascarine (F).
جنس نباتات برية ، جنينية ، معمّرة من فصيلة العطروريات . انواعه المعروفة ثلاثة منها بعض جزر المحيط الهادي || سوقها منتصبه فرعاء . اوراقها بسيطة ، متقابلة . ازهارها ثنائية المسكن ، سنبلية التجميع . ثمارها نووية ، آحية اللباب المتناسك .

ويسمى هذه الطريقة الترييض والرباص .
الاسقاء بالنضج par pulvérisation (tourniquet)

١٤٢٩ - إسقاط راجع اسداج

١٤٣٠ - إسقاط Défalcation (F). Ded iction (E).

الاسقاط حذف شيء من كمية معينة .

١٤٣١ - أسقع

طائر كانه عصفور في ريشه خضرة ورأسه ابيض ، يكون بقرب الماء - ج . اسقع (لسان العرب) .

١٤٣٢ - إسقمري ، طراخور

Scomber (S). Maquereau scombre (F). Mackerel (E).
جنس سمك من العظميات الشائكات الزعانف ينتمي الى فصيلة الاسقمريات . انواعه عديدة جميعها من سمك البحار الحارة والمعتدلة . وهي من الاسماك القواطع التي تجوب البحار في اوقات معينة فتعبر مثلاً مضيق جبل طارق عند دخولها البحر المتوسط في اوائل الربيع من كل عام . والاسقمري بوجه عام ، سمكة مستطيلة الشكل . يبلغ طولها نحو ٥٠ سم . ظهرها مختلف الالوان الزاهية التي يعلوها الاخضر والازرق والاسود ، بطنها بلون اللؤلؤ ولحمته لحمها لذيذ مرغوب فيه برغم وفرة زيتته || اشهره نوعان وهما :

١٤٣٣ - إسقمري طراو* ، طزر

Auxis thazard, Scomber thazard (S). Scômbre thazard, Tazard, Bonitou (F). Scomber thazard (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة الاسقمريات شائكات الزعانف . اعطانها البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي . تعتبر من الاسماك اليمية القواطع . اسرارها وافرة العدد || جسمها وشبي الشكل بطول من ٣٠ الى ٥٠ سم . ثوبها الى الزرقه يخالطها الاخضر تشتد وتعتق في الرأس والظهر وتعلوها زركشة سوداء في القسم الاعلى من الجانبين ، ويدخلها الفضي والذهبي في القسم الاسفل . يطنها الى الفولاذي الفضي المواجه . وتحمل تحت كل من عينيها بقعة صغيرة زرقاء اللون . زعانفها الصدرية والحوضية والشرجية الى الطحلة الفضية . زعنفتها الظهرية الاولى الى الزرقه اما الثانية فالى الرعدة وكذلك الذيلية || لحمها دمعك . تبني اللون ، مستحب الطعم ، مرغوب فيه .

١٤٣٤ - إسقمري كلناس* ، بيار

Scomber colias (S). Maquereau colias, Biar, Cava-luca (F). Colias mackerel (E).

نوع من الاسقمري العابق اللون ، طوله يقارب ٤٥ سم . يكثر قرب السواحل اللبنانية السورية وهو من الاسماك التي تصاد في الليل .

١٤٣٥ - إسقمري معروف* ، طراخور شائع

Scomber scomber (S). Maquereau commun, Bizet (F). Common mackerel (E).

نوع آخر من الاسقمري لونه اخضر ازرق لامع المواجه طوله يراوح من ٣٠ الى ٥٠ سم . يصاد في الليل على الشواطئ اللبنانية السورية .

١٤٣٦ - إسقمريات Scomberidae (S). Scomberidae (E).



اسقمري طراو



اسقمري كليات



اسقمري معروف



اسقنقور



اسقورديون بري



اسقورديون مائي



أسل الهند



أسل عربي



أسل كولاني



إسليخ

١٤٥٨ - أسلييات
Joncaceae (S).
Joncaceae, Joncinées, Juncacées (F). Juncaceae (E).
فصيلة الاسل من ذوات الفلقة الواحدة. اجناسها ١٥
اما انواعها فكثيرة العدد جميعها منقعية منبها الاقاليم المعتدلة
والباردة. نباتاتها معمرة، جذاميرها مدادة، اوراقها
متعاقبة عصفية النصل المستطيل المنتصب. ازهارها عنقودي
كثيف التجميع. ازهارها خشوية.

١٤٥٩ - إسليخ، إسليحة، كُرْدُون، طُفْيُون
عشبة تشبه الجرجير تنبت في حقوف الرمل. وقيل هو نبات
سهلي ينبت ظاهراً وله ورقة دقيقة لطيفة وسنفة محشوة حباً
كحب الخشخاش يسليح الماشية (لسان العرب).
وقال الانطاكي: «هو نبات قصي دقيق الاوراق اغبر
اصفر ومنه مزغب مراكم الاكاليل بغلف كالبنج محشوة
بزراً اسود مر الطعم حريف».

١٤٦٠ - إسليخ*، لِسْرُون
Reseda asolaich (S). Réséda sauvage (F). Wilder reseda (E). Wilder wau (D). Reseda salvatica (I).
هو الخزام البري نبات طبي عطر مهدد بلاد حوض البحر
المتوسط.

١٤٦١ - أسماك
Poissons (F). Fishes (E).
الاسماك صف من الحيوانات الفقارية المتباينة الاشكال
والاحجام. جميعها تعيش في الماء. فصائلها واجناسها
وانواعها كثيرة العدد كان التصنيف الماضي يقسمها الى
خمس اقسام: الماصات والغضروفيات والزعانف والمزدوجات
التنفس واللامعات والعظميات | اول تصنيف تمهيدي
للأسماك يعود الى ارسطو في الجيل الرابع قبل الميلاد. ثم
جاء العلامة «لينه»، في الجيل الثامن عشر، فوضع
هيكلية التصنيف التي لا تزال قائمة حتى اليوم مع بعض
التعديلات التي فرضتها المعارف الشوزبية والاعلامية
الحديثة || التصنيف المعمول بها الآن ثلاثة. اما
التصنيف المختصر الذي نورد في هذا يلي فهو اشيعها منذ
عام ١٩٧٠.

١٤٦٢ - إسماك
Empoisonnement (F). Poisoning (E).
اعمار الخوض او النهر بالسك.

١٤٦٣ - إسماكية
Ichtyologia (F). Ichthyology (E).
مبحث الاسماك وطبائعها.

١٤٦٤ - أسمر
Lait de gazelle (F). Milk of gazella (E).
الأسمر: لبن الظبية.

١٤٦٥ - إسمرار
Brunissure (F). Burnishing (E).
وصم سببه الاشعاع الشمسي يعطب المادة الخليوية في الورقة
يفسدها ويسبب استمرار نسيجه. يصيب بعض النباتات
اخصها الكربة.

١٤٦٦ - إسمنت، تَرَابَة
Ciment (F). Cement (E).
ضرب من الكلس يحصل من طين احجار كلسية تحوي
نحو ٢٠ او ٣٠٪ من الغضار الصفر. وهو اذا ما
جبل بالماء يقسو ويحجر فيستعمل على اشكال شتى في
البناء وفي صنع الحجارة والبلاط الخ.

١٤٤٦ - أسكوشيتا
Ascochyta (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصغيات يعرف بالحنكلة
(اطلب حنكلة).

١٤٤٧ - أسكوشيتولا
Ascochyta (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصغيات يعرف بالحنكيلة
(اطلب حنكيلة).

١٤٤٨ - أسكوشيتولا
Ascochyta (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصغيات يعرف بالحنكولة
(اطلب حنكولة).

١٤٤٩ - إسكينومين
Aeschynomène
اطلب صولة

١٤٥٠ - أسل، سَمَار، رَش
Juncus (S). Junc (F). Rush (E).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الاسليات منبها
المناطق والاراضي الرطبة في جميع اقاليم البلاد الباردة والمعتدلة.
اوراقها عصفية الشكل طويلة منتصبة تستعمل في صناعة
الحصر والسلاسل وما اشبه.
انواعه عديدة، اشهرها العربي والكولاني.

١٤٥١ - أسل الهند*، قَصَب دَرَاكُو
Calamus rotang (S). Rotang, Rotin, Junc de l'Inde (F).
Chair-bottom cane, Rattan cane (E). Rotang, Ro-
tangpalme (D). Canna d'India, Giunchi, Rotang (I).
جنس نباتات جذمورية معمرة من فصيلة النخلات مهددا
البلاد الحارة. سوقها قصبة الشكل طويلة منتصبة شائعة
الاستعمال الصناعي.

١٤٥٢ - أسل عربي*، سَمَار الحصر، تَمَص
Juncus arabicus (S). Junc, Junc des natières (F). Ruch,
Sea rush (E). Arabischer binse (D). Giunco marino,
Giunco (I).
نوع من الاسل الضيق الورق ترعاه الماشية فيسمب ان
كان عذياً ويؤذيها ان كان منقعيًا || ثماره مدرة للبول..
اوراقه عطرية تستعمل في صناعة الحصر والسلاسل.

١٤٥٣ - أسل كولاني*، سَمَار شائك
Juncus acutus (S). Junc aigu, Junc piquant (F). Sharp
rush, Dutch rush (E). Binse (D). Giunco spinoso,
Giunco rigido, G. che buca (I).
نوع من الاسل ومنهم من سماه فتايل الرهبان. ثماره مدرة
للبول واوراقه تحلل الاوجاع ضحاً حيث كانت. ويقال
انه ينفع من الاستسقاء.

١٤٥٤ - إسلا ب
Défeuillaison (F). Defoliation (E).
اسلب الشجر فقد اوراقه وقد يكون اما طبيعياً وذلك عند
الاعبال او اسراً من جراء آفة او حشرة.

١٤٥٥ - إسلاس
Ameublissement (F). Loosening, Mellowing (E).
تنعيم التربة بالحرث او بالدمل لجعلها خوارة.

١٤٥٦ - أسلة
أسلة البعير: طرف قضيه.

١٤٥٧ - أسلي
Junciforme (F). Rush-shaped (E).
نعت وصفي يطلق على مختلف الاعضاء النباتية الأسلية الشكل.

Les Poissons Classification sommaire actuelle

الاسماك
موجز التصنيف الحديث

جدول الاسماك

Genre	الجنس	Famille	الفصيلة	Ordre	الرتبة	Super-Ordre	الطائفة	Sous-Classe	الطائفة
Myxine	ميكسين	Myxiniidés	عاطيات					Cyclostomes	حلقيات الافواه
Lamproie	جلكي	Petromyzontidés	جلاكيات						
Chondrichthyeus									
غضروقيات									
Requin à colerette	جذر مطوق			Hexanchiformes	جذريات الشكل	Pleurotrèmes	جائيات العذاف	Sélaciens	اشلاقي ، شلاقيات
Perlon	رئاعة حمراء								
Requin de Port-Jackson	جذر جاكسون			Hétérodontiformes	منابات الاسنان				
Requin-tapis	كوسج زربي	Orectolobides	كوسجيات	Galéiformes	خوذيات الشكل				
Odontaspe	دروس	Odontospidés	دروسيات						
Touille	قصف ، لباء	Isuridés	قصفيات						
Requin blanc	لخم ابيض								
Requin-pèlerin	جواب	Cétorhinidés	جوايات						
Requin-baleine	ايلس	Rhincodontidés	ايلسيات						
Roussette	غزراء	Scythorhinidés	غزرايات						
Requin bleu	بنك ازرق	Carcharhinidés	بنكيات						
Requin-marteau	مطارق البحر	Sphyrnidés	سفيريات						
Squaliformes									
Aiguillat	قوش شالك	Squalidés	قوشيات		قوشيات الشكل				
Laimargue	مريفة	Seymourhinidés	سمودييات						
Pristiophore	مشار	Pristiophoridés	مشاريات						
Ange de mer	سقطين	Squatinidés	سقطينيات						
Squaliformes									
guiare de mer	غناط	Rhinobatidés	غناطيات	Raiformes	شفتيات الشكل	Hypotrèmes	سفاتيات العذاف		
Scie (Poisson-Scie)	ابو منشار	Pristidés	منشاريات						
Raie	شفتين	Rajidés	شفتيات بحرية						
Pastenague	طرقون	Trygonidés	طرقونيات						
Aigle de mer	عقاب البحر ، موريثة	Myliobatidés	موريثيات						
Diable de mer	كواجة	Lophiidés	كواجيات						
Torpediniformes									
Torpille	رئاعة	Torpedinidés	رئاعات		رئاعات الشكل				

جدول الاسماك

Chimère	خُرْأَة	Chimérîdes	خُرْأِيَّات		كاملات الرؤوس
Coelacanthé	قَلْدَة	Coelacanthidés	قَلْدِيَّات		Holocéphales
Cératode	سُرْقُود	Cératodidés	سُرْقُودِيَّات		Crossoptérygiens
Lépidorène	دَفَّاقَة	Lépidosirenidés	دَفَّاقِيَّات		Dipneustes
Protoptère	رَحاشَة	Protoptéridés	رَحاشِيَّات		مزدوجات النفس
Esturgeon	حَفْشِي	acipensérîdes	حَفْشِيَّات		شعاعيات الزعانف
Spatulaire	رَاحَة	Polyodontidés	رَاحِيَّات		Chondrostéens
Lépisostée	لَبِوسَة	Lépisostéidés	لَبِوسِيَّات		جَنَائِات
Anie	آبِيَة	Amniidés	آبِيَّات	Amniiformes	Actinoptérygiens
Polyptère	شَم	Polyptéridés	شَمِيَّات	Polyptérimorphes	Holostéens
Tarpon	شُجُولَة	Elopidés	لُجِيَّات		كاملات الاسنان
Aragaina	أَرَايَا	Osteoglossidés	عظْمِيَّات الرؤوس		
Mormyre	مُورْمِي	Mormyridés	مُورْمِيَّات		
Hareng	رَنَكَة	Clupéidés	صَابُوعِيَّات		
Sardine	سَرْدِين				
Anchois	بَلَم	Engraulidés	بَلَمِيَّات		
Truite	تُرُوتَة			Clupéiformes	
Saumon	سَلْمُون	Salmonidés	سَلْمُونِيَّات		
Ambie	لَفَافَة				
Ombre	عَلُوس				
Eperlan	رُذَائَة	Osmeridés	رُذَائِيَّات		
Poisson abyssaux	أَسْهَالَة بَحْرَة	Stomiariidés	رَعَائِيَّات		Téléostéens
Brochet	زُجُور	Esocidés	زُجُورِيَّات		كاملات العظام
Piranha	بِرَهَة	Characidé	فَرَسَائِيَّات		
Gymnote	جَمْنُوت رَعَّاش	Gymnotidés	جَمْنُوتِيَّات		
Carpe	شَبُوط	Cyprinidés	شَبُوطِيَّات	Cypriniformes	
Loche	لَح	Cobridés	لَحِيَّات		شبهومات الشكل
Poisson électrique	مُفْرِقَة	Malapteruriidés	مُفْرِقِيَّات		
Silure	جَرِي	Siluridés	سَلُورِيَّات		

نصلها كامل بسيط تغشاء نقط دهنية شفافة || ازهارها قياسية ، خنثوية ، مندعمة البتلات ، عديدة الاسدية ، فردية الاقلام والسمات . سفلية المبيض الكثير الغريقات . ثمارها بمعظمها شبه نووية مأكولة ويستخرج من بعضها ادوية مقوية وقوابض وزيتون وعطور .

١٤٨٠ - أسبانتوس* Acianthe

نبات من الشحاريات جميل الوراق والزهر يزرع للتزيين في الحدائق والبيوت .

١٤٨١ - آسية Myrthées (F). Myrtus (E).
سبط من فصيلة الاسيات اشهر اجناس الآس .

١٤٨٢ - أسيتات ، خلقة Acétate (F). Acetate (E).
كلمة شاملة تستعمل للتعريف عن المركبات المشتقة من الحامض الخلي والمعروفة تجارياً بالاملاح .

١٤٨٣ - أسيتات النحاس Verdet (F). Verdigris (E).
ويعرف ايضاً بالمسحوق الاخضر . هو مركب نحاسي كثير الاستعمال الزراعي تداوى به عدة اوصام فطرية .

١٤٨٤ - أسيتال Acétal, Ethidene diethylate (F).
Acetal (E).
سائل عديم اللون ، عذب الرائحة ، ثقله النوعي ٨٢١ ، يغلو عند ١٠٤ °سغ . يذوب في الكحول والايتر . قليل الذوبان في الماء || يوجد في الخمر وتكثر نسبته مع العتق .

١٤٨٥ - أسيتون ، خلتون Acétone (F).
Acetone (E).
سائل طيار حريف ، لا لون له ، قابل للاشتعال . يذيب المواد الدهنية والصغية والراتنجية . يستعمل كمخدر وقاتل للدود . يوجد في بعض المشروبات الروحية بمقدار قليل .

١٤٨٦ - أسيتيلان Acétylène (F).
Acetylene, Kiumene (E).
غاز عديم اللون كريه الرائحة قابل للاشتعال يستعمل للانارة يصطنع بطرق عديدة اخصها تأثير الماء على كربور الكلسيوم .

١٤٨٧ - أسيس Aborigène (F). Aboriginat pi.
ما كان من حيوانات البلاد او نبتها .

١٤٨٨ - أسيل Homozygote
هو الجنيس أي جنيس الزغطة . اطلب جنيس .

١٤٨٩ - أسينكة Acineta (S). Acinète (F).
نبات من الشحاريات . جذموري الجذع ، وحيد الورقة المستطيلة . ازهاره جميلة الشكل لونها الى الجؤوة يملوها وشم قرميدي . ازهاره قرصي الانتشاب يرتكز على زناد لبني دقيق يستطيل استطالة الورقة .

١٤٩٠ - آشاعة Rejet (F). Spring (E).
الاشاء صغار النخل .

١٤٩١ - إشابة Croisement (F).
Cross-breeding (E).
هي في الحيوان تهجين سلالتين مختلفتين من نوع واحد كإزاء ثور هولندي على بقرة بلدية .

١٤٦٧ - أسميوم Osmium
معدن شديد الصلابة يوجد في الطبيعة مع البلاتين (الذهب الابيض) رمزه « Os » ، ثقله النوعي ٢٢,٤ لذلك فهو من اثقل المعادن المعروفة . يذوب عند ٢٥٠٠ °سغ .

١٤٦٨ - إسنان Dentition
هو تكوين الأسنان ونموها وبروزها وحالتها .

١٤٦٩ - أسنان الكلب
راجع اريترون .

١٤٧٠ - أسنجة Stagonospora (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصغيات . انواعه قليلة غير ضارة تتميز ببيكنيدات المردنية الشفافة ، الشغية الانقسام الطولي .

١٤٧١ - أسنجة Stagonosporopsis (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصغيات يتميز ببيكنياته الاسطوانية الشكل التي تعيش منفردة تحت بشرة النسيج الآدمي . بويغاته تكون في اول عهدها ثنائية الخلية ، متوثرة ، شاذية الاخبية ثم تصبح عند نضجها ثلاثية الخلايا وذلك بعد انقسام الخباء الكبير على نفسه .
انواعه قليلة تتطفل على بعض القرنيات . اشهرها واعرفها اسنجة هورتنسي .

١٤٧٢ - أسنجة هورتنسي* Stagonosporopsis hortensis (S).
فطر مجهري واسع الانتشار يركب اوراق اللوبياء فيوصم النصل في مستوى عروقه ببقع مستديرة راوح قطرها من ٨ الى ١٢ مم . تبدو شبيهة اللون ثم رمداء . تقضي على اللون الذي يحف ويبس .
يكافح بالكبريت ومشتقاته . مع اجتناب اكثار الماء لان الرطوبة تشجع انتشاره .

١٤٧٣ - أسند ، أحال ، وجة Déferer (F).
To confer, To bestow (E).
يقال اسند المنصب واحال القضية ووجه اليمين .

١٤٧٤ - أسهاء Radiation lumineuse (F).
Luminous radiation (E).
اسهاء النور او اشعة الشمس .

١٤٧٥ - إسهال Diarrhée (F). Diarrhoea (E).
خلل عارض يقع في عمل جهاز الهضم ينتج عنه خروج براز مائع في فترات قصيرة .

١٤٧٦ - أسهر Canal déferent (F).
Canalis deferent (E).
هي القناة ناقلة المذي .

١٤٧٧ - أسهران ، حالب الزكبة Canaux déferents (F). Vas deferens (E).
هما القناتان ناقلتا المذي .

١٤٧٨ - أسّي Exponentiel (F). Exponential (E).

١٤٧٩ - آسيات Myrtaceae (S).
Myrtacées (F). Myrtaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين تشمل زهاء ١٨٠٠ نوع يجمعها ٨٠ جنساً تنتمي الى ٥ اسباط : الآسية والخويرية والرمائية واللطية والشرمية . جميعها اشجار وشجيرات وجنبات مهددة البلاد الحارة والمعتدلة . اوراقها سحائية معنقة



أسنجة هورتنسي



أسيانوس

القد . مستطيلة السقط والذنب . جالسة المنسر المنعطف
البهرة . عارية الرشح . حادة الخالب || قوتها ما تصيبه
من جيف وقامة عضوية مع ما تحويه من ديدان وحشرات .
صوتها بازق مزعج . موطنها الشرق الأقصى وأفريقية وأمريكية .
أما أجناسها فهي الاشبور والاكد والقوقش .

١٥٠٣ - **أشتر** Défectueux (F). Defective (E).
من به عيب .

١٥٠٤ - **إشتراط حصّة الاسد ، إشتراط ضحية**
Clause léonine (F).
هو شرط تكون نتيجة تنفيذه أن يحصل أحد المتعاقدين
أو بعضهم على فوائد عظيمة جداً على حساب المتعاقدين
الآخرين .

١٥٠٥ - **إشتراك** Cotisation (F). Assessment (E).
هو ما يدفعه المشترك في التقابلات والتعاونيات .

١٥٠٦ - **إشتراك** Abonnement (F). Subscription (E).
هو تعاقد الى أجل معين بثمن إجمالي يخول صاحبه تسلم
ما اشترك به كمنشرة دورية ومقدار من الماء أو الكهرباء
وغيرها .

١٥٠٧ - **إشتراك بالفاصل** Mitoyenneté (F).
Joint property (E).
هو الإشتراك بالحاجز القائم بين أرضين متاخمتين . وقد
يكون هذا الحاجز حائطاً أو حفرة أو سياجاً .

١٥٠٨ - **إشترائية** Socialisme (F). Socialism (E).
الاشتراكية مذهب اجتماعي سياسي ينادي بإبدال الملكية
الخاصة بالملكية العامة .

١٥٠٩ - **أشترِب أبيض** Rascasse blanche (F).
سمكة بحرية تدعى كورب اخشن ، اطلبه .

١٥١٠ - **أشترِب أحمر** Rascasse rouge (F).
سمكة بحرية تدعى جلاخ رثي ، اطلبه .

١٥١١ - **أشترِب أسمر** Rascasse brune (F).
سمكة بحرية تدعى جلاخ عفري ، اطلبه .

١٥١٢ - **أشترغار** Alhage (F). Alhagi (E).
هو العاقول ، شوك معروف تأكله الابل بشهية . وقد قيل
فيه انه جيد للمعدة ويفتق الشهوة ويعين على الهضم .

١٥١٣ - **إشترار العسل** Récolte du miel (F).
هو استخراج الشهد وجمعه .

١٥١٤ - **أشجار حرجية** Arbres forestiers,
Essences forestières (F). Forest-trees (E).
الاشجار الطوعية أو المزروعة في الاحراج كالصنوبر
والتنوب والسنديان والبطم والمرعر الخ .

١٥١٥ - **أشجار زينة** Arbres d'ornement (F).
Ornament-trees (E).
هي الاشجار التي تزرع للزينة .

١٥١٦ - **أشجار صناعية** Arbres industriels (F).
Industrial-trees (E).
هي الاشجار التي يستفاد من بعض اجزائها في الصناعات
المختلفة كاللطاخ والكيما والخور الخ .

١٤٩٢ - **أشاعر**

اشاعر الحجر والناقة والبقرة : جوانب حياتها .

١٤٩٣ - **إشاعية** Collectivisme (F).
Collectivism (E).

مذهب اقتصاد سياسي يركز على المشاركة في وسائل
وامكانيات الانتاج .

١٤٩٤ - **إشال** * Cordons

شكل من اشكال القيادة الشجرية قوامه فروع متقنة
التشذيب والتقليم ترتكز على مساند من السلك || والإشال
قد تكون افقية وعمودية ومعترضة . أما الاشجار التي تنصاع الى
هذه الطريقة فهي بعض ضروب الاجاص والقليل من التفاح .

١٤٩٥ - **إشامة** Régression (biol.) (F).
Regression, Recesson (E).

عودة بعض الصفات البيولوجية الى ما كانت عليه قبل
التجهين الذي قادها الى التحسين .

١٤٩٦ - **إشباع ، ترؤيع** Saturation

١٤٩٧ - **أشباه الانسان** Anthropomorphes (F).
Anthropomorphous (E).

فصيلة قرود من سفليات المنخرين تشمل اربعة اجناس :
البماة والجبون والسلاة والفول . جميعها كبيرة القد ،
مستطيلة الايدي . موطنها احراج المناطق الحارة الاسيوية
والافريقية .

١٤٩٨ - **أشباه الديدان** Vermidiens (F).
Vermineous (E).

١٤٩٩ - **أشباه الشحوم** Lipoides (F). Lipoid (E).

١٥٠٠ - **أشباه عصيات الأجنحة** Archiptères, Orthonévoptères, Pseudo-
névoptères (F). Pseudo-neuroptera (E).

فئة من الحشرات تنتمي الى رتب مختلفة تجمعها بعض
الصفات والعوامل المشتركة اخصها : اجنحة غشائية ناعمة ،
جهاز فكي ساحق ، اكمال ناقص || أما الرتب التي
تنتمي الى هذه الفئة فهي : الرعاشات ، العقفانيات ،
القلديات ، القهلسيات ، اليوميات (بنات يوم) .

١٥٠١ - **أشبور* ، أرارو** Polyborus (S).
Caracaras (F). Polyborus (E).

طائر من الجوارح وحيد الجنس والنوع من فصيلة
الاشبوريات . وهو مستطيل السقط . ربيع الجثة ، طوله
٤٥ سم . ثوبه الى الصبغة يملوها توشيم أبيض وخطوط
معترضة تميل الى القبرة . يحمل على رأسه قنبرة صغيرة
سوداء اللون || موطنه البلاد الاسيوية والامريكية . يعيش
ازواجا لا يفصلها سوى الموت || قوته الجيف والحشرات
والحيات لا يفت عنها ايما شامدا || انشاء تبيض اربع
رفات تحضنها بمناوبة الذكر نحو اربعة اسابيع .

١٥٠٢ - **أشبوريات** Polyboridae (S).
Polyboridés, (F). Polyboridae (E).

فصيلة طير من الصقور تنتمي الى فئة كواسر النهار
تشمل ثلاثة اجناس وبعض الانواع . جميعها متوسطة



إشال



أشبور

يستخرج من بعضها الشراس المعروف بلبن الطير . ومنها أنواع تزرع للتزيين . أشهرها ما يلي .

١٥٢٦ - إشراس الحنّش* ، صاصل الحنّش

Ornithogalum tenuifolium (S). *Ornithogale vipérine* (F). *Fine leaved star of Bethlehem* (E). *Vogel milch* (D). *Ornithogalo a foglie strette* (I).

نوع من الاشراس ازهاره وردية اللون . ينبت برياً في أكثر المناطق اللبنانية ويزرع للتزيين || يستخرج من بصله نوع من الشراس الجيد الصنف .

١٥٢٧ - إشراس حنّشي* ، *Ornithogalum stachyoides*, *Ornithogalum arabicum* (S). *Ornithogale d'Arabie*, *Etoile de Bethléem* (F). *Star of Bethlehem* (E). *Milchstern* (D). *Ornithogalo, Stella di Betlemme* (I).

نوع من الاشراس كبير الازهار . ازهاره خضر . ينبت برياً في بعض المناطق اللبنانية الفلسطينية السورية . يزرع للتزيين ويستخرج من بصله نوع من الشراس الجيد الصنف .

١٥٢٨ - إشراس صاجي* ، صاصل حنّشي* ، زينة

Ornithogalum umbellatum (S). *Ornithogale en ombelle*, *Belle de onze heures*, *Dame de onze heures* (F). *Eleven o'clock lady*, *Common star of Bethlehem* (E). *Doldiger milchstern* (D). *Bella di undici ore*, *Latte d'uccello* (I).

نوع من الاشراس . ازهاره صاجي التجميع . ازهاره بيض . يزرع للتزيين .

١٥٢٩ - أشران ، سرّة ، طغلق (S). *Cotylédon* (F). *Cotyledon* (E).

جنس نباتات عشبية حصىمة معمرة من فصيلة المخلدات . انواعه المعروفة ٦٠ معظمها بري وبعضها تزييني . اوراقها خمية متقابلة او متعاقبة . ازهارها سنبل التجميع او عنقودي . ازهارها انبوية ، مستطيلة ، متدلية بحيلة الالوان الزاهية || أشهر انواعه : اشران السحر والاشران السري .

١٥٣٠ - أشران السحر ، سرّة السحر ، زلائف الملوكة

Cotyledon horizontalis (S). *Cotylédon horizontal*, *Cotylet*, *Nombrii de Venus* (F). *Kidney-wort*, *Venus' navelwort* (E). *Venusnavelkraut* (D). *Ombellico di venere*, *Erba bellica* (I).

نوع من الاشران البري والزراعي التزييني . اوراقه لحمية عريضة فارشة . شمرخه يعلو من ٢٥ الى ٥٠ سم . ازهاره سنبل التجميع . ازهاره صغيرة القند ، قصيرة الالهان ، اقنية الجلوس . تطول نحو ١٠ م . لونها الى الحمرة الزاهية الجميلة || ازهاره يستمر من اوائل ايار الى اواخر تموز .

١٥٣١ - أشران سري ، سرّة الارض ، خببر القاق

Cotyledon umbilicus (S). *Cotylédon ombillique*, *Gobelets* (F). *Navelwort*, *Pennywort* (E). *Gemeines navelkraut* (D). *Cappelloni*, *Ombellini*, *Scodelijne* (I).

نوع من الاشران يكثر في الجبال بين الصخور . شمرخه يعلو من ١٥ الى ٤٠ سم . ازهاره عنقودي منتصب . ازهاره متدلية لونها الى الخضار الفستقي يعلوه موج وردي . ازهاره يستمر من ايار الى تموز وهو من النباتات الطبية ، عصيره مضاد للصرع ، يثير الشهوة الجنسية ويدبر البول .

١٥٣٢ - أشرة ، هرز ، طوي

Oviscapte, *Tarière* (F). *Ovipositor* (E).

١٥١٧ - أشجار مُثمرة* ، Arbres fruitiers (F).

Fruit-trees (E).

الاشجار التي تغرس لثمرها كالتفاح والاجاص والكرز والخوخ والبرتقال .

١٥١٨ - إشراس* ، أفبوس ، شلجم بري ، رحل

Euphorbia apios (S). *Euphorbe à racine de navet* (F). *Pear-rooted spurge* (E). *Knollige wolfsmilch* (D). *Euforbio per terra* (I).

نبات بري طهي من فصيلة الفربيونيات . جذوره غليظة يستخرج منها زيت طيار يشبه زيت الخردل . وهو من اقوى مضادات الحفر ، يسيل اللعاب وينضج العرق ويدبر البول وقد يفيد في الاوجاع العصبية المزمنة .

١٥١٩ - أشختر* ، دُتزيّا ، Deutzia (S). Deutzie (F).

جنس نباتات برية . وتزيينية معمرة من فصيلة القليبات مهدها الهند والصين واليابان . انواعها المعروفة نحو ١٥ بعضها تزييني . جميعها جنبات فناء تعلو من ٦٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقها متقابلة بيضيه او مستطيلة الشكل نصلها جامد النسيج ، بارز العروق ، منشاري الحافة . ازهارها عنقودي او عنكولي التجميع ، ابطي الارتكاز ازهارها بيضاء اللون او وردية .

١٥٢٠ - إشراس* ، إداد ، شوك العلك

Atractylis gummifera (S). *Atractyle*, *Carthame gommifère*, *Caméléon blanc* (F). *Spindle wort*, *White chameleon* (E). *Mastixdistel* (D). *Cameleone bianco* (I).

نبات شوكي من فصيلة المركبات . حراشفه كثيفة ، طويلة ، خلية ، غبراء اللون . اوراقه مختلفة الالوان لانها تأخذ لون النبات الذي يحاورها وهذا ما دعا الفرع الى تسميته بالحرباء . ويسمى ايضاً اسد الارض لانه يقضي على اكثر النباتات القريبة منه . ومنهم من سماه قاتل الاسد لان بذوره اذا خلطت باللحم وأكلها الاسد قتله || جذوره سامة وطاردة للديدان . ويستخرج من عصارة سوقه مادة علكية تدخل في عدة مستحضرات طبية .

١٥٢١ - أشدق ٥ ، Sénestre (F). Sinister (E).

نعت تعريفي يطلق في علم الحيوان على كل التفاف لولبي يسير نحو اليسار اي بعكس سير عقارب الساعة .

١٥٢٢ - أشدق ٥ ، Mégastome (F). Megastomous (E).

الاشدق من كان مستعرض الفم واسع الشق .

١٥٢٣ - آشر

شوكه ساق الحشرة اخصها الجرادة ، ج أشراه .

١٥٢٤ - إشراب ، Imprégnation, Télégone (F).

Impregnation (E).

هو في الوراثة عند الحيوان ان تلد الانثى من ذكر ثان اولاداً فيها صفات الذكر الذي سفدها قبل ولدت منه .

١٥٢٥ - إشراس ، صاصل ، صوصلاء

Ornithogalum (S). *Ornithogale* (F). *Ornithogalum* (E). جنس نباتات بصلية من فصيلة الزليقيات . سوقها قرصية ، شمرخها منتصب اجوف يحمل الازهار . اوراقها لحمية شبه خيطية طويلة جامدة . ازهارها عنقي التجميع . ازهارها سداسية البتلات منها البيض والخضر والصفر .



إشراس



إشراس حنّشي



إشراس صاجي



إشراس حنّشي



إشراس حنّشي



إشراس صاجي

العضو الذي تستعمله بعض الحشرات كالجراد مثلاً لتغرز بيوضها في التربة .

١٥٣٣ - أشرج

هو من الدواب الذي له خصية واحدة .

١٥٣٤ - أشرف

Nésonyctéris (F).

هو الحبوش نوع من الطوايط . موطنه الشرق الأدنى . قوته البار على اختلافها .

١٥٣٥ - أشرف أبتر

Nésonyctéris tronqué (F).

حيوان من فصيلة الطوايطيات يدعى حبوش أبتر . اطلبه .

١٥٣٦ - أشريبات

Térébrants (F).

Terebrant, Burrowing (E).

مرتبة حشرات من رتبة هديبات الاجنحة . تتميز بكبر روشنيتها الاماميين وبمرز الانثى المنشاري الشكل .

١٥٣٧ - أشص

أشصت البقرة اذا قل لبنها وهي شصوص .

١٥٣٨ - إشقطاء

Tailage (F). Tilling, New shoots, Stools (E).

حصول سرق عرضية من براعم جانبية تنشأ في جنث الزرع الاصلي يقال لها الوالبة || وعدم الاشطاء في الزرع يدعى سمرة . ويقال سمهر الزرع .

١٥٣٩ - إشعاع

Irradiation (F).

Irradiation (E).

الاشعاع كل حركة تنطلق من مركز وتشتع في جميع الاتجاهات .

١٥٤٠ - إشعاع

Radiation, Rayonnement (F).

Radiation, Radiance (E).

خاصة في الاجسام وهي ان تطلق حولها الحرارة التي تجتمعت فيها || يقال لاشعاع النهار : الاشعاع النوري والضياء .

Rayonnement diurne, Radiation diurne

Diurnal radiance (E).

ويقال لاشعاع الليل : الوضاء .

Rayonnement nocturne, Radiation nocturne

Nocturnal radiance (E).

١٥٤١ - إشعاعي

Radioactif (F). Radio-active (E).

١٥٤٢ - إشعاعية

Radioactivité (F).

النشاط الاشعاعي او الاشعاع الذاتي . Radio-activity (E).

١٥٤٣ - أشعة بارزة

Rayons émergents (F).

Emergent rays (E).

١٥٤٤ - أشعر

Villeux (F).

Villous, Villose (E).

من الحيوان ما هو كثيف الشعر .

١٥٤٥ - أشف

Jus de fruit (F). Juice (E).

الاشف هو عصارة نباتات الفصيلة القرعية . ومنهم من خصه بعصارة النار فقط .

١٥٤٦ - أشق

هو الدورم ، اطلبه .

١٥٤٧ - أشق

Sagapénium, Gomme sérapique (F).

عصارة صمغية طبية لزجة تستخرج من القننة الفارسية . ويدعونها لزاق الذهب لانها تلحمه .

١٥٤٨ - أشقح

اشقح البسر : لون واحمر واصفر . وشقح النخل : حسن باحماله (اللسان) .

١٥٤٩ - أشققر

Alezan (F). Chestnut (E).

من اثواب الخيل وهي صخرة ضاربة الى صفرة . واطراف الاشقر شقراء وكذا العرف والذنب .

١٥٥٠ - إشقيل ، عنصل

Scilla (S). Scille (F).

Scilla, Squill (E).

جنس نباتات بصلية معمرة من فصيلة الزنبقيات . اوراقها قرصية مستطيلة وشاحية الشكل . ازهارها ساقى الاوتكاز ، ازهارها فردية التجميع ، قصيرة الزناد ، سداسية البتلات ، يكثر فيها اللون الازرق وفيها الابيض والاحمر || انواعه المعروفة لا تقل عن ٨٠ اكثرها اسيوية ومنها افريقية واروبية || انواعه البرية الطبية كثيرة وعديدة المنافع تدخل في تركيب عدة مستحضرات وعقاقير . وهي تدرك البول وتنشع الصدر || اما انواعه الزراعية فتستعمل للتزيين وهي كثيرة الضروب جميلة الشكل مختلفة الالوان .

١٥٥١ - إشقيل الخريف ، عنصل جرسى ، بصل الحبة

Scilla autumnalis (S). Scille

d'automne (F). Autumnal squill, Winter hyacinth (E).

Herbstbläustern (D). Scilla autumnale (I).

نوع من الاشقيل البري قوامه بصلة غليظة اجاصية الشكل بيضاء اللون . اوراقه قرصية مستطيلة ضيقة شديدة الخضار لامعة المواج ازهاره عنقودي التجميع يرتكز على ساق وحيدة . ازهاره صغيرة لبدية وردية اللون . بصله طبي لكنه اقل جودة من بصل الاشقيل البحري .

١٥٥٢ - إشقيل الغاب ، عنصل منحن

Scilla nutans, Scilla nonscripta (S). Scille penchée,

Jacinthe des bois (F). Blue bell, Wild hyacinth (E).

Hasenbläustern (D). Giacinto die boschi, Giacinto piccolo (I).

نوع من الاشقيل البري والزراعي قوامه بصلة متوسطة القد يرمعية الشكل بيضاء اللون . اوراقه قرصية غيولة مستطيلة ضيقة شديدة الخضار . ازهاره صغيرة زرقاء اللون فواحة العرف المستحب || ومنه ضروب زراعية زهرها الى الابيض والوردي والبنفسجي || زراعته لا تتطلب عناية خاصة غير انه يرغب في الاتربة القليلة الاندماج لانه يخشى الرطوبة المستحكمة كما يتضرر من الاسمدة العضوية الجديدة .

١٥٥٣ - إشقيل بحري ، عنصل بحري ، بصل الفار

Scilla maritima, Urginea maritima (S). Scille mari-

time, Squille, Charpentaire, Oignon marin (F).

Medicinal squill, Sea onion (E). Echte meerzwiebel,

Mauszwiebel (D). Scilla marina, Squilla, Cipolla ma-

rina (I).

نبات طبي بري وزراعي وهو اشهر انواع الاشقيل واعرفها . بصلتها كبيرة الحجم هرمية الشكل يبلغ طولها نحو ٢٠ سم وقطرها ١٥ سم . || منها ضربان يختلفان بلون اسطحها وبسميتهما التجارية . الضرب الاحمر السفط المعروف



إشقيل الحريف



إشقيل الغاب



إشقيل بحري

يستعمل للفسل كالصابون ويستخرج منه بالحريق والترييد ملح القلي .

١٥٦٢ - **أشنان القصارين** هو الخرض ، اطلبه .

١٥٦٣ - **إشنان القلي** * ، قلي ، أبو قباس ، خريس

Salicornia herbacea (S). Salicorne herbacé (F). Glasswort, Marsh samphire (E). Eches glasschmalz (D). Salicornia herbacea (I).

نوع من الاشنان وهو نبات عشبي مداد يكثر على الشواطئ البحرية . كانوا يستعملونه استعمال الصابون ويستخرجون منه بالحريق والترييد ملح القلي .

١٥٦٤ - **أشنان داود** اطلب زوفا .

١٥٦٥ - **أشنة** Usnea (S). Usnée (F). Usneae (E).

جنس من الحزاز ، انواعه عديدة جميعها نباتات خيطية تعيش وتنمو على الاشجار والصخور || ومن اسمائه كشة العجوز وشية العجوز ومسوك القروء .

١٥٦٦ - **أشنة الصباغين** ، سادر وان

Orseille tinctoriale (F). Dyer's moss (E).

نوع من الحزاز يعيش وينمو على الصخور البحرية والجبلية . يستخرج منه صبغ احمر ارغواني . اجوده البحري وهو ما جاء من جزر المحيط ومدغسكر والهند .

١٥٦٧ - **أشنة خسية** هو الحس البحري ، اطلبه .

١٥٦٨ - **أشنة مهازية** * ، دكران Dicranum (S).

Dicrane, Bifurque (F). Dicranum, Forkmoss (E). Gabelzahnmoos (D). Dicrano (I).

جنس نباتات طحلبية من سبط المهازيات . انواعه زهاء ١٠٠ جميعها برية تكثر في الغابات والخراج وعلى ضفاف الانهر . اوراقها صغيرة خيطية متقابلة ثنائية التصنيف . ازهارها جرابية الشكل ترتكز على زناد دقيق وتنتهي بقلنسوة محرابية مدببة مفلوجة الجانب .

١٥٦٩ - **أشنج**

هو من الدواب الذي احدى خصتيه اصفر من الاخرى .

١٥٧٠ - **أشنيات** Usnaceae (S).

Usnéacées (F). Usnaceae (E).

فصيلة من الحزاز عديدة الاجناس والانواع تتميز بمشراها الدقيق المستطيل . تعيش طفيلية على الاشجار فتتدلى من الاغصان .

١٥٧١ - **أشهب** Gris (F). Grey (E).

لون من اثواب الخيل وهو اجتماع شمرات بيض وسود .

١٥٧٢ - **أشياء مباحة** Choses sans maître (F).

الاشياء المباحة هي التي لا مالك لها بينما هي بطبيعتها مقدورة التملك كالحیوانات الآبدة .

١٥٧٣ - **إشنيات** Notopteridae (S).

Notoptères (F). Notopteridae (E).

رتبة حشرات من طبقة مستقيمت الجناح . فصائلها واجناسها وانواعها عديدة . اقليمها المناطق الجبلية المرتفعة . ارساغها مفصلي لخامسة العقل . اناثها مسلحة بممرز قوي .

١٥٧٤ - **أشيب** Hétérozygote (F). Heterozygote (E).

هو من الهجن ما كان زامع الصفات المتباينة البعيدة عن الاعتدال الوسطي .

بالاشقييل البحري الذكر او الاشقييل الاسباني . والضرب الابيض السقط المعروف بالاشقييل البحري الانثى او الاشقييل الايطالي || يستخرج من بصله جواهر ومواد وسوامض طيبة شائعة الاستعمال عديدة المنافع || والاشقييل الذكر انفع من الانثى واوفر مادة وخواصا .

١٥٥٤ - **إشقييل نجمي** * ، عئصل نجمي ، عئسلان

Scilla Amaena (S). Scille agréable, Jacinthe étoilée (F). Star hyacinth, S. flowered squill (E). Liebllicher blaustern (D). Scilla dei giardini, Giacinto di maggio Giacinto stellato (I).

نوع من الاشقييل الزراعي وهو نبات تزييني قوامه بصلة مستديرة الشكل بنفسجية اللون . اوراقه قرصية غيولة مستطيلة شاحبة الخضار ، سوقه الزهرية عديدة وكل منها يحمل من الزهرة الى الثلاث زهرات ، لونها الى الزرقاء السماجونية || ازهاره يدوم من نيسان حتى اواخر ايار .

١٥٥٥ - **أشكال الشجر** Formes des arbres

الهيئة الخارجية التي تأخذها الاشجار او نعطيها لها بالتشذيب والتقليم . ومن هذه الاشكال القدحي والهرمي والمردني والصيواني الى آخره .

١٥٥٦ - **أشكة** ، كولب Coulomb

وحدة قياسية معقودة التعريف على اسم العالم الفرنسي كولب . تستعمل في قياس كمية الكهرباء التي تمر مدة ثانية واحدة في موصل مقاومته اوم واحد وقوته المحركة فولت واحد .

١٥٥٧ - **إشلاخ** Spermatogone (F).

Spermatogonium (E).

هو الاثمار الثانوي في بعض الفطور المجهرية .

١٥٥٨ - **أشلاق** Sélaciens (F).

Selachian, Cartilaginous fishes

هي الشلفيات رتبة من السمك عديدة الفصائل والاجناس والانواع ، تتميز بخلوها من الهيكل العظمي ، باقحافها واعدهتها الفقرية الفصروفية ، باعكامها الخشوية الخماسية الازواج ، بكبر زعانفها الصدرية ، بعظم جثتها وبكونها باكترينها من السمك الولود || اشهر اجناسها الكوسج .

١٥٥٩ - **إشماس** ، سطرع ، ضبح Insolation (F).

Insolation, Sunstroke (E).

هي المدة من الزمن النهاري التي تتعرض فيها التربة ونباتها الى اشعة الشمس المباشرة .

١٥٦٠ - **إشنان** Salicornia (S). Salicorne (F).

Salewort (E).

جنس نباتات عشبية برية من فصيلة السرمقيات . انواعه ثمانية ، اقليمها شواطئ حوض البحر المتوسط والمحيط الاطلسي || سوقها مفصلي امصوخية دقيقة . فروعها متقابلة عديدة الورق ، ازهارها سنبلية التجميع لا تويع لها ولا بتلة . ثمارها حقبة الشكل صغيرة . يستخرج منها بالترييد ملح القلي .

١٥٦١ - **إشنان أبو ساق** * ، غاسول ، غسول ، أبو

حلتا

Salicornia fruticosa (S).

Salicorne corail de mer (F). Lead grass, Crab grass, Frog grass (E). Glassch malz, Seekrappe (D). Salicornia legnosa, Erba kali (I).

نوع من الاشنان ينبت طبيعياً على الشواطئ البحرية .



إشقييل نجمي



إشنان أبو ساق



إشنان القلي




أشنة مهازية



أصابع العروس



أصبعية



أصدف



أصطرك

وفصيلة المحاريات ، أنواعها المعاصرة لا تتجاوز الخمسة اعطائها تمتد من البحر الاحمر الى المحيط الهندي فبحار الصين || اصداقها مستطيلة الشكل ، قرينة الشبه بالاصابع ، لامتناهية المصاريح ، اغشيتها الداخلية لؤلؤية المادة . تكثر فيها الزرقاء الخضراء الموج || تعيش كامل حياتها على الاسفنج .

١٥٨٩ - إصداق Critère, Critérium (F).

Criterion (E).

الاصداق هو طابع الصواب الفاصل أو سمة الحقيقة الحاسمة . ج اصداقات ومصادق .

١٥٩٠ - أصدف Panard (F).

With out-turned feet (E).

الفرس الذي التوى سنيكاه الى الخارج . وعكسه الاقصد . يقال اصدف اليدين واصدف الرجلين ، وهو من عيوب الخيل .

١٥٩١ - أصيرة Affinité (F). Affinity (E).

الأصرة والالفة والتجانس هي القرابة الشكلية مهما كان مصدرها .

١٥٩٢ - أصيرة Goujon (F). Gudgeon (E).

رباط من حديد يستعمل في البناء لتقويته .

١٥٩٣ - أصيص Empoter (F). To pot (E).

زرع في أصيص أو في مكن .

١٥٩٤ - أصطرك * ، لبني ، مبيعة

Styrax officinale (S). Aliboufier, Storax (F). Officinal storax, Styrax tree (E). Echter storaxbaum (D). Storace, Mellaina, Meluzzo salvatico (I).

جنية معمرة من فصيلة الاصطركيات مهددا الاقاليم الحارة . اوراقها متعاقبة معنقة بيضيه . ازهارها خشوية ابطية صفراء اللون . تزرع لاستخراج صمغها الشهير المعروف باسم المبيعة والذي يستعمل في تثبيث العطور . وهي تعرف ايضا باسم اسطراسه والسطس واسترك ولبنى عنبر ولبنى الرهبان ولبنى مسك .

١٥٩٥ - أصطركيات Styraceae (S).

Styracées (F). Styraceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة القعالة ، مرتفعة المبيض . اجناسها ٧ والنوعها ٢٢٠ جميعها من نباتات المناطق الحارة والاستوائية || منها الاشجار والشجيرات والجنبات . ازهارها نظامية خشوية . اوراقها مختلفة الاشكال .

١٥٩٦ - إصطفاة Consanguinité (F).

Consanguinity (E).

الاصطفاة هو احدى طرائق الاسفاد . قوامه ان يكون الذكر والانثى من نوع حيواني واحد وسلالة واحدة وعرق واحد كالأزواج جواد معني على حبر معنقة .

١٥٩٧ - إصطفاق Fluctuation

هو عدم الاستقرار على حالة معينة او التغير الدوري المتناوب من حالة الى حالة .

١٥٩٨ - إصطفاة اطلب جزر .

١٥٧٥ - أشليم ، ناكص Regressif (F).

Regressive (E).

نعت تعريفي يطلق في علم الاحياء على من يرتد الى ما كان عليه قبل تطوره وارتقاءه .

١٥٧٦ - أص هو الفنك الفضي .

١٥٧٧ - إصابات العمل Accidents du travail (F).

Injuries to workmen (E).

هي اصابة العامل ويراد بها وقوع اصابة في جسم العامل من جراء عمله ولتناسبة عمله . ويشترط ان يكون العامل مرتبطاً بعقد العمل او باجارة النفس . وتختلف اصابة العامل عن مرضه لان المرض حالة لا تقع نتيجة مباشرة لحادث بعينه على ان من الامراض ما يسمى مرض الحرفة او المهنة وهو يجري مجرى الاصابات ويكون رب العمل مسؤولاً عنه وان لم يخطئ . وتقتضيه مسؤوليته تعويضاً للمصاب .

١٥٧٨ - إصابة ، حادث ، طارئ Accident

هو حادث عارض يقع فجأة ويسبب ضرراً بالنفس أو بالمال ويكون للمصاب الحق في مطالبة فاعله بتعويض اذا كان مسؤولاً قانوناً عن الاصابة .

١٥٧٩ - إصابة ، عدوى ، ممرائية Infection

انتقال الجراثيم المعدية الى جسم الحيوانات واصابتها بالمرض الذي تحدثه تلك الميكروبات بتكاثرها .

١٥٨٠ - أصابع العروس ، قرنبوش ، بسلة سكرية

Tetragonolobus (S). Lotier cultivé, Lotier pourpre (F). Four winged pea (E). Garten spargelerbse (D). Loto dei giardini (I).

نبات بري وزراعي من سبط اللوتيات وفصيلة القرنيات الفراشية . ثماره قرنية حبها حلو الطعم مأكول ومنهم من يستعمله ، بعد تمام أدراكه وتجفيفه وتخمينه ، استعمال البن . وهو من النباتات العلفية وازهاره تنفع في معالجة البواسير ونفيعها يفيد من التهابات العين .

١٥٨١ - أصابع الفينات اطلب ريحان بري .

١٥٨٢ - أصابع صفر اطلب كركم صباغي .

١٥٨٣ - أصابع هرئيس اطلب شليل .

١٥٨٤ - إصادة ، إصادة Chape (F). Cap. Cover (E).

غطاء الانبيق وكل غلاف يمنع ترشيع الماء او نفوذه .

١٥٨٥ - إصار Herbe (F). Herb, Grass (E).

الاصار والاصارة : الخشيش .

١٥٨٦ - إصبع العذراء اطلب ديجيتال .

١٥٨٧ - إصبعي Dactylé, Dactyloïde, Digital (F).

Dactyloid, Digital (E).

نعت نباتي وصفي يدل على ما شكله شكل الاصبع .

١٥٨٨ - إصبعية * Vulsella (S). Vulselle (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم

١٦١٢ - أصليّ ، خلقيّ ، فرجيّ (F). Congénital (F).
Congenital (E).
الأصلي كالحلق والفرجي نعت يدل على صفة حنة أو سيئة يتصف بها الحيوان منذ ولادته .

١٦١٣ - أصليّات (S). Pythonidae (S).

Pythonidés, Pythoniens (F). Boidae (E).
فصيلة حيات من عديمات الاخاديد فيها البواء والأصلة وغيرها .

١٦١٤ - إصماغ اطلب تصنع .

١٦١٥ - أصوف ، صائف (F). Lanifère, Lanigère (F).
Laniferous (E).

١٦١٦ - أصول مباشة (F). Principes immédiats (F).
Immediate elements (E).
آخر مواد يمكن تجزئتها أفراداً بوسائل ميكانيكية دون حلها بالوسائل الكيماوية . كالسكر والنشا والآح والدهن .

١٦١٧ - آصى

آصى وابن آصى : طائر من الخداء يعرف بالخدأة الحمراء .

١٦١٨ - أصيص (F). Pot, Vase en terre, Terrine (F).
Pot, Earthen pan, Dish (E).
الاجانة الصغيرة التي تزرع فيها الرياحين . وقد يسمى نسبة الى ما هو منه كما يلي : أصيص اذا كان من فخار . مكن وغضسارة اذا كان من خزف . صواع اذا كان من معدن .

١٦١٩ - أصيل (F). Pur-sang (F). Thorough-bred (E).
نعت يطلق على كل حيوان اهلي صريح السلالة الصافية المنتخبة .

١٦٢٠ - أصيل ، بازيد ، دعامه (F). Baside (F).
Basidium (E).
خلية فطرية طرثوية كبيرة مستطيلة محمولة على الغشاء الارثوئي تتكون فيها البزور .

١٦٢١ - إضاءة ، إنارة (F). Luminescence (F).

١٦٢٢ - إضاضة (F). Géophysique (F).
Geophysis (E).

الاضاضة علم يبحث في وثل الكرة الارضية .

١٦٢٣ - أصاليا ، دهلية (S). Dahlia (S).
Dahlia, Georgine (F). Dahlia, Georgina (E). Gärten-dahlia, Georgine (D). Dalia, Glorgina pruinosa (I).
جنس نباتات عشبية عشقوية معمرة من فصيلة المركبات . انواعه عديدة جميعها مكسيكية المهد وقد صار تهجينها وتأصيلها واستنخابها بعد ان شاع استعمالها التزييني نظراً لضخامة زهرها وجمالها وبهاء الوانه || يستخرج من عساقها الاهليلجية الشكل مادة نشوية تجانس الانولين وتستعمل استعماله تدعى دهلين (Dahline) || تتكاثر الاصاليا عادة بزرع درناتها خلال شهري نيسان وايار ، وقد تتكاثر بالبذر بيد انه لا ينتج الا ازهاراً طاقية قليلة البتلات || اما انواعها المشهورة التي كانت ولا تزال محور التهجين والتصلب واساس معظم الضروب الحالية المعروفة فهي ما يتبع .

١٥٩٩ - أصعل (F). Brachycéphale (F).
Brachycephalic (E).
من نعوت تصنيف الدواجن معناه قصير الرأس .

١٦٠٠ - أصغريّات ، صغروريّات (S). Ptilidae (S).
Ptilidés (F). Ptilidae (E).

فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة تضم اصغر انواع الغمديات . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد ، منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها شبه بيضية الشكل ، شديدة الصغر . أطوالها لا تتجاوز ١ سم . رواشها مهدبة . اعماؤها لاحقة || تعيش في الجثالة والدردى النباتي . يبدو ان قوتها بوج العفنيات || اشهر اجناسها الصغورور .

١٦٠١ - أصف (F). Oreille de lapin (F).
Ear of rabbit (E).

الاصف هو اذن الارنب وكل اذن ضيقة مستطيلة منتصبة .

١٦٠٢ - أصف الاصف والأصف هو الكبر الشائك .

١٦٠٣ - إصفاق (F). Soutirage (F). Drawing off (E).
الإصفاق والصفق والتصفيق تحويل الحمر وما اشبه من اناء الى اناء لتصفو .

١٦٠٤ - إصفرني سمكة بحرية مأكولة ، اطلب اسفرني .

١٦٠٥ - أصفع أصفع الزرع : افرك وبلغ الإدراك .

١٦٠٦ - أصفق القوادم (F). Crassipenne (F).
نعت تعريفي يطلق على كل جناح كثيث القوادم والريش .

١٦٠٧ - أصل (F). Sélectionner (F). Select (E).
أصل النبات تأصيلاً أصلحه وحسنه .

١٦٠٨ - أصل ، مهّد ، منشأ (F). Origine (F).
Origin (E).
مرتكز الشيء ومستنده الطبيعي الطوعي .

١٦٠٩ - إصلاحات زراعية (F). Améliorations agricoles (F). Agricultural améliorations (E).
هو التعبير عن كل تحسين من شأنه الإصلااح لزيادة الفائدة ان في البذار او الزرع او البقول او الموائج او الآلات الى آخره .

١٦١٠ - أصلة* Python
جنس ثعابين كبيرة من فصيلة الاصليات . انواعها ٩ جميعها من ثعابين المناطق الحارة وهي اكبر واضخم زحافات هذه الفصيلة ، يبلغ طول بعضها الثمانية امتار وقطرها لا يقل عن ٢٥ سم . وهي غير سامة تبتلع فريستها وتسحقها ثم تهضمها . تعيش بين اسل المناقع وفي وحل الانهر . تسرح وتصيد في الليل . ترغب في السمك لانها تقضي معظم اوقاتها في الماء .

١٦١١ - أصلم (F). Essorillé (F). Ears-cut (E).
الأصلم من الحيوان هو المقطوع الاذنين . ج صلّم .



أصلة



أضاليا أرجوانية

nule odorante (F). Gland bell-flower (E). Liliender usenglocke (D). Campanula odorosa (I).

نبات عشبي زراعي تزييني جميل الأزهار العطرية من فصيلة الجريسيات . جذوره درلية . أوراقه صغيرة مستطيلة . أزهاره يدوم نحو أربعة أشهر . يتكاثر بالبزور والدرن . يرغب في الأتربة الحوارة . يخشى أشعة الشمس اللاذعة .

١٦٣٦ - إطار Cadre (F). Frame (E).
الإطار هو كل محيط بشيء .

١٦٣٧ - إظام داء يصيب البهم فلا تبول ولا تبعر .

١٦٣٨ - إطمان Echan
حاشور زراعي سائل يرتكز على مادة الباراسيون يستعمل محلولاً بالماء بمعدل ٢,٥ ٪ في مكافحة دودة الثمار وغيرها من الديدان والحشرات .

١٦٣٩ - أطباء الكلبة اطلب دبق .

١٦٤٠ - أطلد هو الخفض ، اطلبه .

١٦٤١ - أطر ، عثر ، بدلية Buddleia (S).
Buddleie, Buddleie (F). Orange ball-tree, Buddle (E). Sommerfließer, Buddleie (D). Budleja (I).

جنس نباتات برية وتربينية معمرة من فصيلة الخنازيريات . مهدها البلاد الحارة . أنواعها نحو ٥٠٠ منها الأشجار والشجيرات جميعها قدحجية الهيكل والشكل فناء الفروع . أوراقها متقابلة معنقة سنانية النصل . أزهارها نورية تاجية الارتكاز سنبلية التجميع رباعية البتلات ، مأنوسة العرف . تخشى البرد لذلك يحسن غرسها في المواقع الدافئة مع اجتناب المعارض الشمالية .

١٦٤٢ - أطرأوندي هو الراوند الذكر .

١٦٤٣ - أطرُب اطلب بلادون .

١٦٤٤ - أطرّة Couronne (F). Crown (E).
هي اكليل الحافر مركزها اعلى الحافر تحت الرسغ .

١٦٤٥ - أطررد

اطرد النعم والماعز : ارسل ليها الاكباش والنيوس .

١٦٤٦ - أطرُعلة هي الرغبة ، اطلبها .

١٦٤٧ - أطرور * Atherurus (S). Achérure (F).
جنس حيوانات لبونة قاضة من فصيلة الشبميات . انواعه قليلة موطنها بعض المناطق الاسيوية والافريقية . اجسامها ربعة تطول من ٣٠ الى ٤٥ سم . اذنانها كاسية تطول نحو ١٥ سم . وتنتهي بخصلة من الهلب سنبلية الشكل مبطلة || رؤسها مستطيلة . مقاضها مقطومة . اذنانها بادية منتصبة . جرامزها قصيرة . اطافرها قوية حادة . ظاهرها اجسامها يكسو الهلب والشوك الذرب القصير . تالف الحقول والمراعي والقباني والقيعان . احجرتها اتفاق تلشي بردها تغور في التربة نحو ٦٠ سم . ترح في الليل . قوتها الاعشاب والجذور وجميع المواد النباتية والحشرات والوزغ والعطاء والافاعي || انثاها تضع من درصين الى اربعة ادراص تخلق باصرة كاسية .

١٦٤٨ - أطرووط Truite (F). Trout (E).
سمكة نهريّة من السلمونيات تعرف بالتروته .

١٦٢٤ - أضاليا أرجوانية * Dahlia coccinea (S).

Dahlia écarlate, D. cocciné (F).
نوع من الاضاليا عديد الضروب والسلالات . يعلو من ٤٠ الى ١٣٠ سم . ساقه وفروعها بحرية اللون . أوراقه مركبة متقابلة . وريقاته مدببة الاطراف ، نصلها الى الخصار القاتم . أزهاره كبيرة القد مستعرضة البتلات المتماوجة الكثيرة العدد الزاهية الالوان احمر . يكثر فيها الارجواني .

١٦٢٥ - أضاليا إمبراطورية * Dahlia imperialis (S).
Dahlia impérial (F).

نوع من الاضاليا وهو جنبه كبيرة القد تعلو من ٢٠٠ الى ٥٠٠ سم . ساقها غليظة ، فروعها عديدة متشعبة . أزهارها متدلية ، جرسية الشكل تطول من ٦ الى ٨ سم . بينا قطرها لا يقل عن ١٠ سم . لونها الى البياض العاجي . طرفها اصفر . أزهارها خريفي .

١٦٢٦ - أضاليا شائعة ، أضاليا حدائقية

Dahlia variabilis, D. pinnata (S). Dahlia commun, D. des jardins (F).

تعلو من ٥٠ الى ١٥٠ سم . ساقها فرعاء . أوراقها باعثة الخصار اللامع . أزهارها كبيرة القد ، متباينة الاشكال والالوان ، مستطيلة البتلات المنبسطة او الملتفة على نفسها ضروبها كثيرة العدد منها المكسبة والطاوية . أزهارها خريفي .

١٦٢٧ - أضاليا وردية * Dahlia rosea (S).

Dahlia rose (F).
نوع من الاضاليا عديد الضروب والسلالات . يعلو من ٥٠ الى ١٥٠ سم . ساقه عديدة الفروع ، خضراء اللون . أوراقه مركبة متقابلة شديدة الخصار . أزهاره كبيرة القد ، وردية اللون . أزهاره خريفي .

١٦٢٨ - إضبارة نباتية ، إضبارة نباتية ، إضبارة

Herbier (F). Herbarium (E).
مجموعة اعشاب او نباتات مختلفة جففت وحفظت للدرس والاستشهاد . ج اضابير واضاميم واحاشيش .

١٦٢٩ - إضحيان نبات كالاتحون .

١٦٣٠ - أضرار Dégâts (F). Havoe (E).

هي الخسارة المادية التي تقع من جراء عمل ما او جائحة مماثلية .

١٦٣١ - أضراس الكلب اطلب بسبايج .

١٦٣٢ - إضرّاع ، ترميد Parturition (début) (F).

Parturition (lead) (E)
اضرعت البقرة والشاة والعنز : اشرق ضرعها قبل الشاج وعظم ، فهي مضرع .

١٦٣٣ - إضرام Caloricité (F). Caloricity (E).

الاضرام خاصة يتمتع بها كل حيوان ، من ذوات الاعضاء . تمكنه من نشر بعض الحرارة .

١٦٣٤ - أضنفور Adénophore (F).

حامل صغير يعقد الغدة الرحيقية الزهرية في بعض النباتات .

١٦٣٥ - أضنفوره ، غرّ الجميل ، فطومه

Adenophora communis (S). Adénophore, Campa-



أضاليا إمبراطورية



أضاليا وردية



أطر



أطرور

Feeding (E).

هو مد النجسل الذي خلت قفرانه من العسل بالقوت
الضروري أثناء فصل الشتاء .

١٦٥٧ - إطفار

الاطفار نجم نير صغير يتقدم النسر الواقع في كوكبة
نجوم القيثارة .

Flanc (F). Flank (E).

١٦٥٨ - إطل

جزء الجسم ما بين الاصلع والحجبة .

Loup argenté (F). Silver wolf (E).

١٦٥٩ - أطلّس

هو الذئب الذي في لونه غيرة الى سواد .

Atalantia

١٦٦٠ - أطلنثيا

جنس اشجار وجنبات شائكة من الحمضيات السذابيات .
انواعها قليلة مهدا آسية الاستوائية وبعض مناطق استراليه .
ثمراها لا تؤكل وهي برتقالية الشكل والحجم واللها ،
طعمها الى المارة الحامزة كما في النارج . || تزرع لزهورها
العطرية وتستعمل كطعامات لمختلف انواع البرتقال .

Atlanta (S).

١٦٦١ - أطلنطة

Atlante (F). Atlanta (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل
اللامتجانسة وفصيلة الاطلنطيات . انواعها المعروفة قليلة
العدد جميعها يمية لا تقرب الشطوط . اسرابها وافرة العدد ||
اصداؤها نحيلة شفافة ثنائية الجراب الخلزوني الاكثر .
دورتها الخلزونية يمينية تنتهي عند السرة . سفاطها دقيق
جامد شفاف . زعنفتها وحيدة ورقية الشكل بمجهزة بمحجم .
رأسها كالخطم ، لها يحتل المقدم . لوامسها انبوبية .
عيونها جاحظة . خياشيمها مشطية الشكل .

Atlantidae (S).

١٦٦٢ - أطلنطيات

Atlantides (F). Atlantidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل
اللامتجانسة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد بعضها
من متحجرات الحقبة الكربونية والبعض الآخر يمي لا
يقرب الشطوط || اعطانها معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة
الحرارة . تسبح وتعم على ظهورها . تتميز باصداؤها
الرقية الشفافة وبالوانها القسطنائية || اعرف اجناسها
وأشهرها الاطلنطة والاكسيجيرس والبلرفون .

١٦٦٣ - أطماط هو الكوئل من النخلات ، اطلبه .

١٦٦٤ - أطموط اطلب عند قارح .

١٦٦٥ - أطن* ، فهنة ، أرنبية

Arnebia (S). Arnébie (F). Russian bugloss (E). Arne-
bie (D). Arnebia (I).

جنس نباتات عشبية من فصيلة الحمحميات انواعها عديدة
منها البرية والصباغية والتزيينية التي تزرع لزهورها .

١٦٦٦ - أطوم* ، زليخة ، ملىصة ، ناقة البحر

Halcore cetacea (S).

حنفاء

Dugong (F). Halicore, Dugong (E).

جنس حيوان بحرية لبونة عاشبة من نبات الماء ، الخيلان .
مؤخرها كؤخر الحوت ولها يدان كأنها زعنفتان . موطنها
المحيط الهندي والبحر الاحمر وجوارها . تعيش جاعات ،
سرحها الليل . ترعى الاعشاب البحرية الساحلية . اجسامها

Buddleiées (F). Buddleae (E).

١٦٤٩ - أطريات

سبط من فصيلة الخنازيريات . انواعه زهاء ٧٥ جميعها
اشجار وشجيرات وجنبات . اقليمها المناطق الاستوائية
والجنوبية الاسيوية والامريكية || اشهر انواعه الزراعية
الأطر ، اطلبه .

١٦٥٠ - أطريال* ، سرفل ، جزر الشيطان

حشيشة البرص ، حشيشة البهاق ، رجل الغراب

Carum ammioïdes (S). Cerfeuil (F). Cerfollum,
Chervil (E). Kerbel (D). Cerfoglio (I).

نوع من الاطريلال وهو نبات طبي بري جزيل النفع
لانه يشفي البهاق ويدخل في عدة علاجات اخصها علاجات
الصدر والكلبي والمثانة || اوراقه متعاقبة معتقة مركبة
شديدة التفريص . ازهاره صيواني التجميع طويل الزناد .
ازهاره بيض . ثماره بزور صغيرة سرد البشرة الملساء .
السوق والاوراق والازهار والبزور جميعها عطرية العرف
المستحب .

Eleotris (S).

١٦٥١ - إطرير

Eléotris (F). Eleotris (E).

جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة
القوبيونيات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار
المناطق الحارة . معظمها يعيش قرب مصبات الأنهر ||
اجسامها مستطيلة الشكل ، معتدلة التبطيط ، متفاوتة
الطول الذي يراوح من ٧ الى ٣٠ سم . تتميز بظهورها
الجالسة الخط وبزعانفها الكبيرة المزخرفة التي تبدو كأنها
مطرزة . زعانفها الذيلية كبيرة القد ، مستديرة الاطراف .
اخطامها قصيرة ، منفرجة الاشدق || لحومها كاعنة
الصنف ، قل من يرغب فيها .

Menyanthes (S).

١٦٥٢ - إطريرفل

Ményanthe (F). Menyanthes (E).

جنس نباتات عشبية مائية معمرة من فصيلة الجنطيانيات .
انواعه قليلة . سوقه جذمورية . اوراقه مركبة ثلاثية
الفصوص ، متعاقبة معتقة طويلة المعاليق . ازهاره عشقودي
او سنبل التجميع يرتكز على زناد امرط طويل . ازهاره
بحيلة الشكل لونها الى البياض الوردى || مهدا سناع
البلاد المعتدلة ، اشهرها الاطريفل النقلي .

١٦٥٣ - إطريرفل نفلي* ، نفل الماء ، بوسم الماء

Menyanthes trifoliata (S). Ményanthe, Trèfle d'eau,
Trèfle des marais (F). Buck-bean, Bog-bean, Marsh
trefoil (E). Sumffiebertree, Fiebertree, Bocksboh-
ne (D). Scarfano, Trifoglio d'acqua (I).

نوع من الاطريفل وهو نبات عشبي بري طبي معمر
يكثر وجوده في المناطق ويزرع في احواس المساء .
يستخرج من اوراقه مادة طيبة فعالة تدعى مينانثين
(Ményanthine) || وفي بلاد الانكليز والمانيا
يحققون الاوراق ويستعملونها استعمال الجنجل .

Carum

١٦٥٤ - أطريلال

جنس نباتات محولة او معمرة من فصيلة الخيميات ، انواعه
نحو ٥٠ معظمها بري وبعضها زراعي . اشهرها الاطريلال
والسرفل والكراويه والكمون والبقدونس والتفوطه .

١٦٥٥ - أطريون هو القشاة البري .

Nourrissement (F).

١٦٥٦ - إطعام النحل




أطريال



إطرير



إطريرفل نفلي



أطلنطة



أطن



أطوم

١٦٧٦ - أَظْفَار الذِّئْب

كوكبان أبيضان صغيران قدام الذئبين من كوكبة التنين ، بين العوازل والفرقدين .

١٦٧٧ - أَظْفُور

Crampon (F). Cramp-iron (E). جذر عرضي هوائي دقيق وقصير يتخذ النباتات المتسلق أداة للتشبث بالجدران وغيرها من العوائل .

١٦٧٨ - أَظْلَف

Bisulque (F). نعت تعريفي يطلق على كل حيوان من ذوات الظلف .

١٦٧٩ - إِعَارَة

Prêt (F). Loan (E). عقد يدفع به المرء الى غيره منقولاً او عيناً او شيئاً معيناً بنوعه ليستعمله زمناً محدداً ثم يرد .

١٦٨٠ - إِعْبَال

Effeulaison, Effeullement (F). Fall of the leaves (E). سقوط الورق الطبيعي او اقتزاعه والقائه أرضاً .

١٦٨١ - أَعْبَل * ، غرانيت

Granit (F). Granite (E). حجر متبلور شديد الصلابة مختلف الالوان اعماها الوردي والاشهب والاسود .

١٦٨٢ - إِعْتْدَاء

Empiètement (F). Encroaching (E). هو وضع اليد على جزء من ملك الغير وضه الى ملكه .

١٦٨٣ - إِعْتِدَال

Equinoxe (F). Equinox (E). مدة معادلة الليل والنهار .

١٦٨٤ - إِعْتِدَالِي

Equinoxial (F). Equinoctial (E).

١٦٨٥ - إِعْتِدَالِي ، تَوَازُي

Statique (F). Static (E).

١٦٨٦ - إِعْتَرَق

راجع استغرق .

١٦٨٧ - إِعْتَشَاب

Herborisation (F). جمع النباتات ودرسها وتصنيفها . Herborization (E).

١٦٨٨ - إِعْتَمَد

Accréditer (F). To give credit (E). الاعتماد في لغة التجار هو ارسال كتاب الى احد المعاملين مع الطلب او الرجاء بفتح ائتمان مالي لاحد العملاء .

١٦٨٩ - أَعْثَل

Acère (F). Acerous, Hornless (E).

نعت تعريفي يطلق على الحيوان العادم القرون وعلى الحشرة العادمة الزباني وعلى الدويبة العادمة اللوامس . م . عثلاء .

١٦٩٠ - أَعْجَف ، جَعَف ، نَكَد

Dépaissance, Pacage (F). Pasture-land (E). المرعى القليل الكلا أو الرديئ الانواع العشبية .

١٦٩١ - أَعْجُوبَة ، مِيرَا

Etonnante, Mira (F). Mira (E).

الاعجوبة او اعجوبة قيطس او ميرا ، نجم نير من كوكبة قيطس مركزه في العنق . راجع قيطس .

١٦٩٢ - إِعْدَاء ، عَدَوِي ، دَتَس

Contamination الممرض من جسم مصاب الى جسم سليم لا يتمتع بالمناعة الذاتية .

غليظة ، متوسط طولها نحو ٣٠٠ سم . لحمها مأكول . جلدها يصلح للتعال || وهي من الحيوانات الشديدة الخدر تصعد الى سطح الماء للتنفس فقط ثم تغوص . تزواجها خفي تمارسه في البحر . يقال ان الانثى تحمل نحو ١٢ شهراً .

١٦٩٧ - أَطُومِيَّات

Halicoridae (S).

Halicoridés (F). Halicoridae (E).

فصيلة حيوانات بحرية لبونة عاشية من رتبة الخيلان اي بنات الماء || انواعها عديدة يجمعها جنس واحد الاطوم . اعطانها تمتد من البحر الاحمر الى المحيط الهندي وشطوط استراليا وغينيا الجديدة || ملجئها الحياقي جماعي . تخرج في الليل مرتعها الاعشاب البحرية الساحلية || ذكورها اكبر قدماً من اناثها . ويتميز الذكر ايضاً بنباب كبير بارز يخرج من الفك العلوي || اعرف انواعها واشهرها الاطوم ويدعى الزالحة والحنفاء وناق البحر .

١٦٩٨ - أَطْيَار

Oiseaux (F). Birds (E).

الاطيار والطيور والطيء صف حيوانات من الفقاريات يقسم الى الجوزجريات والموادي .

١٦٩٩ - أَطْيَرَة *

Avicula (S).

Avicule (F). Avicula (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الحياشيم عادات المتاعب وفصيلة الاطيريات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم || اصداقها متباينة الاشكال والاحجام ، بعضها مستدير الشكل قريب الشبه بالثمنج . مصاريعها محدبة لامتناهية صفيحية الخارج ، لؤلؤية الداخل || تعيش لاصقة بالصخور المغورة .

١٦٧٠ - أَطْيَرِيَّات

Aviculidae (S).

Aviculidés (F). Aviculidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الحياشيم عادات المتاعب . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منها الغابرة المبعثرة في الاراضي الجورية والطلاشيرية ومنها المعاصرة المنتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصداقها شبه مستديرة ، صفيحية ، محدبة ، لامتناهية المصاريح ، لؤلؤية الغشاء الداخلي المتفاوت السماكة || معظم انواعها يعيش لاصقاً بالصخور المغورة والبعض الآخر متنمناً في الرمال || اعرف اجناسها واشهرها الاطيرة والملانة والصيرم والملطاس والبرنة والشمع .

١٦٧١ - أَطْيَش

راجع ابله .

١٦٧٢ - أَطْيَمَة

Foyer (F). Fireplace (E).

الاطيمة : موقد النار . ج اطائم .

١٦٧٣ - أَطْيِي

اطلب شجعية .

١٦٧٤ - أَظْفَار

Aladfar

الاطفار وتدعى ايتا الشلياق مجموعة نجوم صغيرة من كوكبة القيثارة المعروفة ايضاً بالسلفافة .

١٦٧٥ - أَظْفَار الجَنِّ

قال داود الانطاكي : « هو نبات بلا نور ولا ورق ولكنه يخرج مصاليج الى الارض ما هي كأنها فراضة الظفر الى سواد وغبرة » || وهو من النباتات الطيبة العربية - اليونانية .



أطيرة



أعبل

١٧٠٣ - **إِعْصَال** (F).
Ridding of caterpillars (E).
القضاء على الاسباريج والديدان .

١٧٠٤ - **إِعْفَاء**
الاعفاء : كلمة شاملة عديدة المعاني اخصها .
إعفاء (F). Dispense (F). Dispensation (E).
هو ان يعفى المرء من القيام بعمل نيط به .
إعفاء (F). Exonération (E).
هو ان يعفى المرء من واجب فرضه القانون .
إعفاء (F). Acquittal (E).
هو الحالة المتوسطة بين التبرئة والادانة .

١٧٠٥ - **أَعْقَر* ، ظبي عَرَبِي** (S).
Gazelle de l'Arabie (F). Gazelle arabica (E).
نوع من الظباء وهو اضعفها عدواً . متوسط القد ، اهيف القوام ، قصير العنق ، صغير الرأس ، ثوبه الى الجؤوة الغبراء يزيد اسمراراً مع اقترابه من ثبج الظهر . بطنه الى البياض || اجله من ٥ الى ٥٠ ، موطنه الجزيرة ، شائع في الحجاز ويكثر في بيادية الشام .

١٧٠٦ - **أَعْقَى ، أَفْرَخَ ، أَمْلَحَ** (F).
Drageonner (F).
هي قابلية الاشجار الى الاعقاق والافراخ والملمخ .
Sucking (E).

١٧٠٧ - **إِعْقَال** (E).
Bouturage (E).
Propagation by slips (E).
الاعقالات اي غرس العقلة هو تكثير النبات بغرس اجزاء منه قطعت من اغصانه وفروعه وما اشبه .

١٧٠٨ - **أَعْقَى**
أعقت الفرس ، اذا لم تحمل وهي عقوق .

١٧٠٩ - **أَعْقَص**
الاعقص من التيوس ما التوى قرنائه على اذنيه من خلف .

١٧١٠ - **أَعْقَفَ ، مَعْقُوف** (F).
Crochu (F).
Hooked (E).
شكل بهمة منسر جوارح الطير .

١٧١١ - **إِعْطَافَ الماشية** (F).
Affouragement (F).
تقديم الحشيش والعلف للبهيم .
Foraging, Foddering (E).

١٧١٢ - **إِعْلَان ، إِقْرَار ، شَهْر ، تَصْرِيح** (F).
Déclaration, Notification, Signification (F).
Déclaration, Notification, Signification (E).
هو الابانة عن حالة قانونية او فعلية قائمة .

١٧١٣ - **أَعْلَفَ الماشية** (F).
Affourager (F).
قدم لها العلف ، راجع جدول العلف .
To fodder (E).

١٧١٤ - **إِعْلِيَط** (F).
Dénudé (F).
Dénudé (E).
ما سقط ورقه من الاغصان والقضبان .

١٧١٥ - **إِعْمَار** (F).
Mise en valeur (F).
Développement (E).
الاعمار القيام بالاعمال اللازمة للاستثمار .

١٧١٦ - **أَعْنَسَ ، أَعْنَشَ** (F).
Ayant six doigts (F).
Six-fingered (E).
من كان سداسي الاصابع .

١٦٩٣ - **أَعْرَاضُ الْمَرَضِ** (F).
Symptômes (F).
Symptoms (E).
هي العلامات غير الطبيعية التي تبدو في الحيوان او تظهر على بعض اعضاء النبات || اخصها في الحيوان عدم الشهوة الى الأكل او الامتناع عنه ، ارتفاع حرارة الجسم ، الكربة ، القلق ، الاضطراب ، اللهث ، العطش ، الامساك ... || اما في النبات فظهورها الخارجي يتبع في الاوراق او تجمع او ذبول . جفاف في بشرة النسيج . ظهور تزايدات او افرازات ، الخ .

١٦٩٤ - **أَعْرَقَ ، عَرَّقَ ، شَرَّشَ** (F).
Enraciner (F).
To root, To implant (E).
مكن النبات من ابراز جذوره ومدها .

١٦٩٥ - **أَعْرُوَان ، عُرُوَّة** (F).
Plante à feuilles persistantes (F).
Persistent leaf (E).
من النبات ما لا يسقط ورقه في الشتاء .

١٦٩٦ - **إِعْسَار ، تَوَى** (F).
Insolvabilité, Déconfiture (F).
Insolvency (E).
هي الحالة التي يكون فيها من لا يقوى على دفع ديونه .

١٦٩٧ - **أَعْسَامُه تَحْلِيَة** (F).
Zoomorphie, Morphologie externe (F).
Zoomorphy, External morphology (E).
هو التعريف الواقعي والوصف الشكلي للجسم والحلقة في الحيوان والنبات || اما درس التركيب الباطني فيسمى شوزبة .

١٦٩٨ - **إِعْشَاب** (F).
Essartage, Essartement (F).
Grubbing (E).
اقتلاع الاعشاب المضرة .

١٦٩٩ - **أَعْشَابُ مُضَرَّة*** (F).
Herbes nuisibles (F).
Hurtful herbs (E).
الاعشاب المضرة هي التي تنبت طبيعياً في الحقول والبساتين والحدائق وهي كثيرة الاجناس والانواع معظمها من النباتات الطوعية التي تستنزف عناصر التربة الغذائية وتمنعها عن الزروع والبقول || اضرها واعها انتشاراً ما يلي : الأخيليا أم الف ورقه والاريفارون والاسل والامسوخ والانجبار والانجرة والببش والتفاف والثوم البري والشيل والجمفيل والخرمل والحلبوب والحميمض وحميمض المناقع والحوذان والخردل البري وخرطال فتوا والخرم والمان والدوسر وذيل الثعلب والرينثوس وزهر الكشائبين والزوان والسراخس والسعادي والشقار وشقائق النمان وشر الكلب والشوك والشوكران والطحالب والعراوة وعشبة القوي والعليق وعمى الدجاج والغبيل والفجبل والفربيون والفرقار والفوننج والقرطب والقصوان والقنطريون والكرسنة البرية والكرفس النبطي والكشوث واللباب واللبن واللتين واللحاح ولسان الحمل واللوف المبقع والمشفيل والتجير والمهدال .

١٦٩٩ - **أَعْشَابُ مُضَرَّة*** (F).
Herbes nuisibles (F).
Hurtful herbs (E).

الاعشاب المضرة هي التي تنبت طبيعياً في الحقول والبساتين والحدائق وهي كثيرة الاجناس والانواع معظمها من النباتات الطوعية التي تستنزف عناصر التربة الغذائية وتمنعها عن الزروع والبقول || اضرها واعها انتشاراً ما يلي : الأخيليا أم الف ورقه والاريفارون والاسل والامسوخ والانجبار والانجرة والببش والتفاف والثوم البري والشيل والجمفيل والخرمل والحلبوب والحميمض وحميمض المناقع والحوذان والخردل البري وخرطال فتوا والخرم والمان والدوسر وذيل الثعلب والرينثوس وزهر الكشائبين والزوان والسراخس والسعادي والشقار وشقائق النمان وشر الكلب والشوك والشوكران والطحالب والعراوة وعشبة القوي والعليق وعمى الدجاج والغبيل والفجبل والفربيون والفرقار والفوننج والقرطب والقصوان والقنطريون والكرسنة البرية والكرفس النبطي والكشوث واللباب واللبن واللتين واللحاح ولسان الحمل واللوف المبقع والمشفيل والتجير والمهدال .

١٧٠٠ - **أَعْشَار ، عَوَاشِر** (F).
Rémiges primaires (F).
Wing primaries (E).
الأعشار والعواشر هي قوادم ريش الطائر .

١٧٠١ - **أَعْصَابُ الْحَيْس*** (F).
Sensilles tactiles (F).
Tactile sensils (E).

١٧٠٢ - **إِعْصَار** (F).
Cyclone
هي الزوبعة الهائلة السرعة والضغط التي تخرب كل شيء .



زوان



شوكران



فربيون



قرطب



لباب



تفاف



ثيل



حلبوب



حميض



خرطال فتوا

أَعْشَابُ مُضَرَّة



أعفر

١٧٣١ - إغثدَاء ، إستمراء ، تغذية Nutrition
حلة الظواهر التي تجعل الأحياء تغذي وتنمو.

١٧٣٢ - إغثدَائِي ، إستمَرَائِي
Nutritionnel (F). Nutritional (E).
ما كان له القدرة على تمثيل الاغذية وتحويلها.

١٧٣٣ - إغثدَائِي ، قُوتِي
Trophique (F). Trophic (E).
نعت تعريف يطلق على ما هو مختص بتغذية النسيج.

١٧٣٤ - إغثدَائِيَّة
Sitiologie (F).
Sitology (E).
الاغذية علم يبحث في الاطعمة وقيمتها الغذائية . اطلب قيمة غذائية .

١٧٣٥ - إغثصَاب ، إغثصَال
Usurpation (F). Usurpation (E).
كاغثصاب السلطة وانتحال الصفة والاسم واللباس ...

١٧٣٦ - إغثلام ، غُثْمَة ، شَبَق
Nymphomanie (F). Nymphomania (E).
ازدياد شهوة السفاد في اناث الحيوانات لاسباب داخلية عديدة . والانثى المغلوم لا تحمل .

١٧٣٧ - إغثمَاد ، غُثَل
Invagination
دخول جزء من نسيج في نسيج آخر . وهو اذا حصل في المصران يكون قتالاً (الامير مصطفى الشهابي) .

١٧٣٨ - أغشَر
قال ابن سيده : هو طائر من طير الماء ملتبس الريش طويل العنق .

١٧٣٩ - أغثدق
Très fertile (F). Very fertile,
Prolific fruitful (E).
صفة النبات الوافر الانتاج .

١٧٤٠ - أغرَّ
Marqué en tête (F).
كل فرس له غرة اي بياض في الجبهة .

١٧٤١ - إغْراب
Albinisme (F). Albinism (E).
راجع إحساب .

١٧٤٢ - إغْراب * ، شَمْعَلَة
Fasciation
تشويه يحصل في سوق او اغصان النبات فترق وتبدو كأنها مزدوجة . يكثر وجوده في سوق التبغ وشماريخ الورد وافنان البرتقال الهمة . عامله الرئيسي فرط النمو الذي يسبب ازدواج الخلايا الليفية دون غيرها .

١٧٤٣ - أغْراض ، مَطَالِب
Flas (F). End,
Design (E).
هي النهاية التي يذهب الطلب اليها ، فهي اذن موضوع الطلب والهدف الذي ترمي اليه .

١٧٤٤ - إغْرة
Algrette (F).
Algrette, Tuft or plume (E).
خصلة من الريش تعلو رأس بعض الطيور كالبلشون والقنبرة .

١٧١٧ - أعشش
الأعشش من له ست اصابع .

١٧١٨ - أعشُون
هو الحلبة نبات عشبي من فصيلة القرنيات .

١٧١٩ - أعْوَج
Oblique
هو الخط المنحرف المائل بين اتجاهين عمودي وأقي .

١٧٢٠ - أعْوَر ، مِمْرَغَة
Caecum (F).
Caecum (E).
الاعور هو القسم الرئيسي من المعى الغليظ ، يتميز بشكله الاسطواناني .

١٧٢١ - أعْيَار
الأعيار كواكب زهر في مجرى قديم سهل .

١٧٢٢ - أعْيَان
Biens corporels (F).
هي الاموال المادية .

١٧٢٣ - أعْيَر
Crassinervé (F).
الاعير من النبات ما كانت نصال اوراقه مستضخمة العير والاعصاب .

١٧٢٤ - أغاثوسْمَة ، زُكِيَّة
Agathosma (S).
Agathosme (F). Agathosma (E).
جنية برية وزراعية من السذابيات ، مهدها رأس الرجاء الصالح . اوراقها عطرية زكية العرف تستعمل في تحضير الشرابات الحاضمة والمقوية الشابة .

١٧٢٥ - أغاثي *
Agati
شجرة هندية من القرنيات الفراشية . سنف قرونها مرة الطعم حامزة طيبة تعتبر من المقويات وتدخل في تركيب عدة علاجات اخصها الصدرية || اوراقها تستعمل لتبييض النسيل . حبوبها مأكولة تشبه الفاصوليا .

١٧٢٦ - أغار ، عَصِيدَة نَبَاتِيَّة
Agar-agar
مادة غروية تستخرج من بعض الخثيات التي تكثر على شواطئ البحار الاسيوية كالهند وسرنديب وجاوا . تستعمل علمياً لزراع وتكاثر مختلف الفطور المجهرية والجراثيم كما تستعمل في عدة صناعات اخصها صناعات الاقشة والورق .

١٧٢٧ - أغْبَر
Rouan, Gris rouanné (F). Roan (E).
الفرس الذي شملت شهبته شقرة .

١٧٢٨ - أغْبَس
Isabelle (F). Isabel (E).
الفرس الذي شمل لون بياضه كدرة وهو لون الحليب خالطته القهوة .

١٧٢٩ - أغْبَس
Loup du Hedjaz (F).
Hedjaz wolf (E).
هو اللاب الاغبس .

١٧٣٠ - أغْبَش
Opalescent (F). Opa (E).
نعت يطلق على الاشياء المضيئة الالامعة او غير الالامعة دون ان تكون شفافة .



أغاثي



إغراب

١٧٤٥ - أغرؤان *، ليلك أزرق

Syringa vulgaris (S). *Lilac commun* (F). *Common lilac* (E). *Turkscher flieder* (D). *Lilacco comune, Ghianda unguentaria* (I).

ومنهم من قال أغرؤان. نوع من الليلك ينتمي الى فصيلة الزيتونيات وهو جنبة تزيينية جميلة الشكل. ازهارها عذقي التجميع تاجي الارتكاز. ازهارها عطرية، لونها الى الزرقة المستحبة. وله ضرورب ازهارها الى البياض وغيرها الى الحمرة. || يتكاثر بالبذر والتعقيل والتلقيح والتدريج. الزهارون يفضلون المملوخة لأنها انشط من الدريخة والعقلة. يوجد في جميع الاتربة لكنه يخشى الرطوبة المستحكمة.



أغرؤان

١٧٤٦ - أغرؤيس *٥

Agrotis

جنس حشرات فراشية من فصيلة الفسقيات. انواعه كثيرة العدد. اجسامها واثوابها مختلفة القد واللون طولها براوح من ٢ الى ٥ سم. يغلب فيها الرأس الاسمر الجفوي والصدر البني والبطن الرمادي. رواشها الامامية عابقة الالوان. مزركشة. رواشها الخلفية سوية الالوان الباهتة. عروقها الى السمرة. حثارها، عند وجوده، هلاكي الشكل عابق اللون || اناثها اكبر من ذكورها. تمتنع مكها بعد التسايف بأسبوع. متحها لا قياسي الترتيب يدوم نحو عشرة ايام تضع الانثى بخلاها نحو ٢٠٠٠ مكنة على صفحات الاوراق السفلى وعلى الاوراق الجافة والعابلة. مكها كروي الشكل يبدو اصفر اللون ثم يحمر ويسود. ينقف بعد اربعة ايام من متحه في الصيف وبعد اسبوع في الربيع والخريف وبعد ثلاثة اسابيع في الشتاء || يرقاتها تنسلخ ست مرات ثم تتحول الى عذارى داخل شراقي من الطين وبعض المواد العضوية || اجياها الحولية من الاربعة الى الخمسة || عوائل يرقاتها عديدة الاجناس والانواع تخص منها بالذكر النفل والبرسيم والغصه والخنطة والشعير والخرطال والعدس والحمص والفول والقطن والتبغ والذره ومعظم البقول والنباتات التزيينية. اشهر انواعه :

Agrotis angur (S).

Agrotis baja (S).

Agrotis brunnea (S).

Agrotis castanea (S).

Agrotis comes (S).

Agrotis glareosa (S).

Agrotis musiva (S).

Agrotis nigrum (S).

Agrotis orbona (S).

Agrotis plecta (S). *Cordon blanc* (F).

Agrotis pronuba (S). *Hilbou* (F).

Agrotis putris (S).

Agrotis rhomboldea, Stigmatica (S).

Agrotis rubi (S).

Agrotis triangulum (S).

Agrotis xanthographa (S).

Agrotis ypsilon (S).

١٧٤٧ - أغرؤيس إبسيلون *٥، غسقية قارضة

Agrotis ypsilon

Lycophotia ypsilon (S). *Noctuelle ypsilon* (F).

Lycophotia (agrotis) ypsilon (E).

حشرة مبدولة من فصيلة الفسقيات ورتبة حرشقيات الاجنحة. موطنها يشمل معظم اقطار العالم. فراشها تحبب المزارع والمباقل والحدائق قوتها رحيق الازهار.




أغرؤيس



أغرؤيس إبسيلون



أغرؤيس احلس



أغرؤيس زنجي

سرفها تدعى «الدودة القارضة» تسطو على سوق الكثير من النبات || جسمها متوسط القد يطول من ١٨ الى ٢٠ سم. بسطها تراوح من ٤٤ الى ٤٨ مم. رأسها معتدل الجرم. عيناها كبيرتان ناشرتان. زباناها مشطيان مستطيلان. مرشفها معتدل الجرم والطول. جوشها حنطي اللون بني المواج. بطنها اربد اللون، حنطي المواج. شرجها غليظ الاشارة عند الانثى. رواشها الاماميان الى الطحلة الخنطية يعلوها مواج اصهر وتبضع بني وتبقيج اسمر وحتار كستني يستبق الاهداب الفضية. رواشها الخلفيان الى البياض التبي المواج عند الذكر والى البياض الاغبر عند الانثى || لها ثلاثة اجيال في الحول. تسرح في الليل وتبيت في النهار. تعاظم بعد ظهورها بمدة قصيرة تراوح من اسبوع الى اسبوعين. تمتنع الممكن لطخاً تغلفها مادة غروية تشبهها بنصال الاوراق التي تلامس التربة || السرفة عند بلوغها الادراك تطول من ٤٥ الى ٥٠ سم. راجع دودة قارضة.

١٧٤٨ - أغرؤيس احلس *٥، غسقية حلساء

Agrotis baja (S). *Noctuelle baie* (F).

Agrotis baja (E).

حشرة من فصيلة الفسقيات ورتبة حرشقيات الاجنحة. موطنها بعض اقاليم حوض البحر الابيض المتوسط والمناطق الداخلية. فراشها تحبب البراري والاحراج قوتها رحيق الازهار. سرفها خاضلة قوتها اوراق النبات || جسمها معتدل القد يطول نحو ١٦ مم. بسطها تراوح من ٣٨ الى ٤٠ مم. رأسها متوسط الجرم، فاسي الشكل. عيناها كبيرتان. زباناها خيطيان، مستطيلان. مرشفها معتدل الطول. جوشها احلس اللون، بطنها حنطي اللون احلس المواج || رواشها الاماميان الى السمرة يعلوها مواج احس وبقجة مربعة شديدة السمرة وثلاث نقط سود وخط حثاري اسمر يستبق الاهداب الخنطية. رواشها الخلفيان الى الخنطي الاصهر يسمر عند الطرف الخارجي ويعود الى الصخرة في الاهداب || لها جيل واحد في الحول. تسرح في الليل. تعاظم بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتمتنع الممكن على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة تسرح في الليل وتطول عند بلوغها الادراك نحو ٣٠ مم. جسمها شبه اسطواني الشكل. ثوبها يستقر على الخضار الاليس بعد الخضار الزيتي ويعطو خط ثنجي اغبر وخطان جانبيين احمران وزوج من الدريئات السود في كل سكمة باستثناء السكم الصدرية. رأسها اسود || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي داخل جلاباب من الطين ينفلق عند انطلاق الفراشة

١٧٤٩ - أغرؤيس زنجي *٥، غسقية زنجية

Agrotis C. nigrum (S). *Noctuelle basanée* (F).

Agrotis C. nigrum (E).

حشرة مبدولة من فصيلة الفسقيات ورتبة حرشقيات الاجنحة. موطنها يمتد من اليابان الى اطراف اروبة وافريقية الشالية والولايات المتحدة الامريكية. فراشها تعيش على رحيق الازهار. سرفها خاضلة قوتها اوراق الاشجار الحرجية والمثمرة والنباتات البقلية والمرعوية || جسمها معتدل القد يطول نحو ١٥ مم. بسطها تراوح من ٢٦ الى ٤٠ مم. رأسها معتدل الجرم، فاسي الشكل. عيناها كبيرتان ناشرتان. زباناها خيطيان مهدبان. جوشها حنطي اللون اسمر المواج. بطنها احلس اللون، حنطي المواج. شرجها مستغلف الاشارة عند الانثى ||

١٧٥٧ - أغريل ٥
Agrilus (S). Agrile (F).
Twig girdlers (E). Heckenprachtkäfer, Schmal-
bauchkäfer (D).

جنس حشرات من الناصعات ورتبة غمديات الاجنحة .
انواعها لا تقل عن ٤٠٠ شائعة في جميع اقطار العالم .
جميعها مستطيلة الشكل مخضبة الجوشن الزغبى . اناها
اغلف من ذكورها تمتح مكنها على بشرة اللحاء فينقف عن
يرقات خاضعة خاشبة تلغم وتحفر جذوع واغصان الاشجار
الخرجية والمثمرة . || اشهر انواعه واضرها :

١٧٥٨ - أغريل الاجاص ٥
Agrilus sinuatus (S).

Agrile du poirier (F). Sinuate
pear-borer (E). Birnbaum-pracht- käfer (D).

نوع من الاغريل مستطيل القد طوله نحو ٨ مم . لونه الى
الزنجاري يعلوه موج اسفع . يرقتة خاضعة تركب اغصان
الاجاص فتلغم الشكير بين اللحاء والخشب وتحفر السرايب
الشبكية التي تقضي على مرور النسغ فتذوي الاغصان
وتموت || يكافح باستعمال الحواشير والمواكين للقضاء على
الحشرة او على مكنها قبل نقفه .

١٧٥٩ - أغريل الحور ٥
Agrilus Roberti (S).

Agrile du peuplier (F). Agrilus Roberti (E).

نوع من الاغريل صغير القد طوله نحو ٥ مم . رأسه وصدره
الى الجوزة العنابية . غمداه الى الخضرة السفعاء || يرقتة
تركب سوق الحور واغصانها الفروع الجديدة .

١٧٦٠ - أغريل السنديان ٥
Agrilus biguttatus (S).

Agrile du chêne (F). Oak borer (E). Schmal-
er Eichenprachtkäfer (D).

نوع من الاغريل طوله نحو ١٠ مم . لونه الى الخضار
الزرجدي تشويه زغبة غبراء || يرقتة خاشبة تركب شكير
جذوع وفروع السنديان فتسربها بانفاقها المتشابكة وتمطها .

١٧٦١ - إغريل العوسج ٥

Agrilus chrysoderes (S).

Agrile des ronces, Agrile du framboisier (F).

Agrilus chrysoderes (E). *

نوع من الاغريل ينتمي الى فصيلة الناصعات ورتبة
غمديات الاجنحة موطنه معظم اصقاع العالم القديم . يالف
المواقع التي يكثر فيها العوسج والنسرير خنافس ويرقاته
تقضم الاوراق || جسمه صغير القد ، نحيل الشكل ،
يطول من ٦ الى ٧ مم . ثوبه الى الخضار الزيتي تعلوه ماجة
سفعاء . رأسه قليل النشوز ، قصير الخطم ، ضليع
التأشير . عيناه صغيرتان . زبانه مستدقان || الانثى اميز
قدماً من الذكر واهت ثوباً منه واقصر زبانا || له جيل
واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في حزيران وتبقى
حتى ايلول . تسرح في النهار وتبيت في الليل || يرقتها
مرقالة ، عشارية السكم ، بيضاء اللون ، غليظة الرأس
الفائر ، ضليعة التأشير السود ، سمراء الزائدة القرنية التي
تعلو الشرج والتي يتألف منها الملقط الثلاثي الاسنان
الداخلية . طولها عند ادراكها التام يراوح من ١٥ الى

١٧ مم

١٧٦٢ - أغريل الكرمة ٥
Agrilus derafo-fasclatus (S).

Agrile de la vigne (F). Agrilus derafo-fasclatus (E).

نوع من الاغريل ، دقيق الشكل صغير القد طوله نحو
٥ مم . لونه الى الخضار الاسفع الشديد الموج || يرقتة
صغيرة نحيلة تركب سروع الجفنة تحت القلفة فتتخرها
وتسربها وتمطها .

روشناها الاماميان الى الجوزة السمراء يعلوها تمشيح ولطخة
سوداء واشعري بيضاء ردية الموج . روشنها الخلفيان الى
البياض الاغبر يطوقه حنار اسمر || لها ثلاثة اجيال في
الحول . تسرح في الليل . تعاقل بعد ظهورها باسبوعين
وتمتح المكن على الصفحات السفلى من نصال الاوراق ||
السرفة عند بلوغها الكمال تطول من ٢٠ الى ٣٥ مم . ثوبها
الى الخضار الاسمر . رأسها الى الجوزة . سكمها البنية
باستثناء التاسعة - مزرقة بالاسود على الجانبين . مذبها
ورواجه سمر . هلبها قليل العدد ، اصفر اللون يرتكز
على درينات دقيقة يراوح عندها من زوج الى زوجين في
كل سكمة .

١٧٥٠ - أغريتيس موشى ٥ ، غسقية مصاحبة

Agrotis pronuba, Triphaena pronuba (S).

Noctuelle fiancée, N. pronubée, «Hilbou» (F).

Yellow Underwing, Large Yellow Underwing
moth (E). Hausmütterchen (D).

حشرة من فصيلة الغسقيات ورتبة حرشقيات الاجنحة .
موطنها يمتد من اليابان الى اوروبا وافريقية الشمالية .
فراشتها تجوب البراري والمحاقل والمباقل قوتها رحيق الازهار .
سرفتها تعيش على النجيليات وحب الكرمة واوراق البطاطا
والجزر والملفوف || جسمها معتدل القد يطول من ٢٤
الى ٢٦ مم . بسطها يراوح من ٥٢ الى ٥٨ مم . رأسها
صغير الجرم . عينها كبيرتان . زباناها خيطيان . مرشها
معتدل الجرم والطول . جوشها وبطها الى الصخرة الكستنية
المواج . شرجها مستنقظ الاشارة عند الانثى || لها ثلاثة
اجيال في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في مطلع ايار
تسرح في الليل . تعاقل بعد ظهورها بنحو عشرة ايام
وتمتح المكن على سوق النبات العاقل او على الاوراق التي
تلامس التربة || السرفة عند ادراكها الكمال تطول من
٤٥ الى ٥٠ مم . جسمها اسطواني الشكل ، مشدود القشار ،
مبعثر الملب القليل ، اخضر اللون حتى الانسلاخ الرابع
ثم ينحرف الى الطحلة السمراء الحمراء الموج يعلوها خط
ثبجي اغبر وخطان جانبيان . رأسها الى الجوزة . مذبها
الى السمرة . تسرح في الليل وتتكاثر عندما تسمر بالخطر .

١٧٥١ - أغرولوجية
Agrologie (F). Agrology (E).

علم التربة اي دراسة التربة حكماً وكماوياً وميكانيكياً
وجيولوجياً . ودراسة التربة الزراعية وصلاتها بالزروع .

١٧٥٢ - أغروميذا الفاصوليا ٥
Mouche du haricot

اطلب لائمة اللوبياء .

١٧٥٣ - أغروميذا أندلسية ٥
Mineuse de l'artichaut

هي لائمة الارضي شوكي ، اطلبها .

١٧٥٤ - أغروميذا مبهمة ٥
Mineuse des céréales

اطلب لائمة الزرع .

١٧٥٥ - إغريفي
Pollen (F). Pollen (E).

الاغريفي والفريفي والطلع والصواح واحد . راجع صواح .

١٧٥٦ - إغريفي ٥
Pollinifère (F).

Polliniferous (E).

نمت تعريفية يطلق على كل نبات او عضو منه ، كالزهرة ،
يحمل اللويح او يحواه .



أغريل الاجاص



أغريل الحور



أغريل السنديان



إغريل العوسج



أغريل الكرمة

Productivité du sol (F). ١٧٧٠ - إغلال
Productiveness of soil (E). اطلب انتاج .

١٧٧١ - أغلوب تيميس*
Aglaope infausta (S). Aglaope malheureuse (F).
Aglaope infausta (E).

حشرة من فصيلة البرقيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها يشمل معظم الاقاليم المعتدلة الحرارة من حوض البحر الابيض المتوسط . تألف المواقع التي يكثر فيها اللوز والزعرور . قوتها رحيق الازهار . سرفها خاضعة تعيش على اوراق اللوز والبرقوق والزعرور || جسمها صغير قصيف بطول من ٩ الى ١٠ مم . بسطتها تراوح من ٢٤ الى ٢٦ مم . رأسها معتدل الجرم . عينها كبيرتان جيلتان . زباناها مشطيان ، مستطيلان . جوشها وبطنها قرفيا اللون ، كثيفا الحمل || روشناها الاماميان الى القرني الاكلف الاسفع الموج يعلوه طوق حثاري اسود . روشناها الخلفيان مخضبان بالقرني تعلوه بقعة حمراء تمتد من القاعدة الى اواسط الصفحة . اهدابها برتقالية || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في مطلع حزيران وتبقى حتى اواخر تموز . تسرح في النهار . تعاظم بعد ظهورها بخمسة اسابيع وتمتدح المكن على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة عند ادراكها الكمال تطول من ١٦ الى ١٧ مم . جسمها اهليلجي الشكل . ثوبها الى الرتبة السمرء يعلوها ثلاثة خطوط جؤوية قاطبة وثلاثة صفوف من الشعول المتوجة بالهلب || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي ضمن صالحة مباسكة النسيج تحبكه السرفة تحت القشور او بين شقوق اللحاء .

١٧٧٢ - أغلوج
Turion (F). Tip, Scion (E).
ساق الهليون النامية . ج أغاليج .

١٧٧٣ - أغلوصة نحاسية*
Aglossa cuprealis (S).
Aglosse cuivrée, Fausse teigne des cuirs (F).
فراشة من فصيلة الناريات ورتبة حرشفيات الاجنحة . الذكر اصفر قدام من الانثى ، طوله نحو ١٠ مم . وبسطته من ١٨ الى ٢٠ مم . الانثى تطول نحو ١٤ مم . وبسطتها من ٢٦ الى ٢٨ مم . || رأسها وجوشها الى السمرة النحاسية . روشناها الاماميان الى السمرة السفعاء تعرضها خطوط متعرجة حمراء اللون ، نحاسية الموج تتخللها نقط سود . روشناها الخلفيان الى الحمرة الخفيفة الزاهية . بطنها الى الحمرة الصنابية || يرقها مؤذية تقرض الجلود وسائر المواد الجلدية ايما كانت ، تبدو سبورية اللون ثم تنحرف نحو السواد اللامع مع اقترابها من زمن الاكمال حيث تنسج صلبة مردنية الشكل حباكها حرير ابيض || تظهر الفراشة من حزيران الى ايلول . مسرحها دجوي لذلك فهي تشاهد في النهار جاثمة على الحيطان وعلى مختلف انواع اثاث المنازل .

١٧٧٤ - أغن ، أرهم ، زخور
Luxuriant

١٧٧٥ - أغنام
الاغنام بعض نجوم كوكبة حور وحية ، مركزها في الروضة بين النسيق الشامي والياني .

١٧٦٣ - أغريل الوزال*
Agrilus cinctus (S).
Agrile des genêts (F). Agrilus cinctus (E).
نوع من الاغريل متوسط القد طوله نحو ٨ مم . لونه الى الخضرة النحاسية يعلوه موج اسفع اغبر . || يرقته تركيب الوزال وتعيش عليه من يوم متعها مكنة حتى نهاية طورها اليرقي || اما الحشرة فتعيش على جميع نباتات الفصيلة القرنية لانها تغتذي برحيق ازهارها .

١٧٦٤ - أغصن
الاغصن هو الثور بذنه بياض .

١٧٦٥ - أغصوم
Aegosome (F). Aegosome (E).

جنس حشرات من فصيلة القرنييات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعه المعروفة قليلة العدد ، اعطانها البلاد المعتدلة الحرارة من اوروبا الى الصين || اجسامها متوسطة القد تطول من ٣٠ الى ٤٥ مم . اثوابها الى السمرة الحنطية تعبق في بعض الانواع وتزهو في الاخرى || مسرحها دجوي . تظهر في تموز وتبقى حتى اواخر ايلول . تمتدح مكنها على طاء الاشجار التي تؤمن الغذاء لليرقة || يرقاتها متوسطة القد ، غليظة الصدر ، مستدقة الاطراف ، سمر الاجسام ، سود الرؤوس || تركيب السنديان والزبان والكستناء والبندق والزيزفون والاجاص والكركز ... فتتخر اللحاء وتتركز في الشكير فتعطيه وتسيء الى الاشجار .

١٧٦٦ - أغصوم حرش الزبان*
Aegosome scabricorne (S). Aegosome scabricorne (F). Aegosome scabricorne (E).

حشرة خاشبة من فصيلة القرنييات ورتبة مغمديات الاجنحة . موطنها بعض اقاليم البلاد المعتدلة الحرارة من الشرق الادنى واروبة . تألف الاحراج والحدائق والجنان . خنافسها ويرقاتها تعيش على مختلف انواع الاشجار اليابسة باستثناء الصنوبريات || جسمها كبير القد ، ضيق الكوسل والظهران ، يطول من ٣٥ الى ٤٢ مم . ثوبها الى الصهبة السمرء يعلوها موج اشقق تشد سمرته في الكوسل والرأس . رأسها مستطيل الجرم . عينها كبيرتان ، جاحظتان . زباناها مستطيلان حرشا الحثار المسن . فكاهها ضليمان ، ذربان ، متراكبان . غمداها شديدا الصلابة ، متنابعتا التحزيز اللدقيق . برداها . كبيرتا القد ، غشائيتا المادة الشفافة ، صنابيتا اللون . جرامزها مستطيلة الظنايب || الانثى اكبر قدما من الذكر راضخم بطناً منه واكد ثوباً واقصر زبانا . || جيلها ثلاثي الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواسط تموز وتبقى حتى اواخر ايلول . مسرحها دجوي يستمر من الشفق الى الفجر || اليرقة بطيئة النمو ، تساعة الانسلاخات ، تدرك الكمال الجسموري بعد النقف بنحو ٣٢ شهراً فيصبح طولها نحو ٦٥ مم . جسمها حيدري التركيب ، حنطي اللون ، سمر الموج ، اسود الرأس ، عادم الهلب .

١٧٦٧ - أغصف
الاغصف : الكلب المسترخي الاذن .

١٧٦٨ - أغفى
اغفى الشجر إغفاء : تدلت اغصانه .

١٧٦٩ - أغلاجون ، أغلوجن
Agalloche (F).
Agallochum (E).
الاغلاجون والاغلاجون ، وضع ابن سينا ، هو عود التند* اطلبه . عصيره حريف منقذ كان يستعمل دواء للبرص والجلد .



أغريل الوزال



أغصوم حرش الزبان



أغلوب تيميس



أغلوصة نحاسية

1788 - إفتراخ (F). Défleurlaison, Défloraison (F).
سقوط الازهار (E). Fall or withering of the blossom (E).

1789 - إفتسكال

هو تعقيل الاجزاء الناجمة عن الفسائل دون غيرها من اعضاء النبات .

1790 - أفستيمون اطلب كشوث السعتر .

1791 - أفصح الركبة * Cambré (F).
Cambering, Having a curved back (E).
من عيوب الخيل كما يبدو في الرسم .

1792 - أفلدع Distors (F). Distort (E).
نمت تعريفي يطلق على ما كان ملتور او اعوج .

1793 - إفراز Excreta (F). Excreting (E).
الافراز مجمل نفايات الاغذاء التي يدفع بها الجسم الى الخارج .

1794 - إفراز Sécration (F). Secretion (E).
هو ما تفرزه الاجسام الحية ، حيوانية ونباتية ، من مواد ضرورية لحياتها او للذود عنها || والافراز في النبات يدعى نتحاً .

1795 - إفراز ظاهري Exocrine (F). Exocrin (E).

1796 - إفراق النحل ، تفريخ Essaimage (F).
Swarming, Swarming-time (E).
هو خروج ثول النحل من الخلية الأم ليعمر خلية جديدة . والثول من النحل يدعى فرقا .

1797 - أفرخ راجع أعز .

1798 - أفرك

افرك السنبل صار فريكاً وهو حين يصلح ان يفرك فيؤكل || تقول للزرع اول ما يخرج من الارض: قصع ثم مقر او نجم ثم شطا وقصب وأعصف وسبل وسنبل وأحب وألب وأسفى ثم أفرك ثم أحصد .

1799 - إفريز ، كنة Auvent (F).
Pent-roof, Porch-roof (E).
نتوء لا قياسي المعرض يشرف على الحائط وما اشبه يبدو كأنه لوقاية ما استظله .

1800 - إفساد ، تعطيل ، تعيب ، عياب Dénaturation (F). Denaturing (E).
هو تغيير طبيعة الشيء .

1801 - أفسد ، شوه ، عيب ، عطّل Dénaturer (F). To denature (E).
هو ان يصار الى تغيير طبيعة الشيء وحالته لغرض ما .

1802 - أفسفور ، تصلب المتماصل

Aphosphorose
علة في الجسم مفصلية سببها نقص في كمية الفسفور الواجبة .

1803 - أفستين راجع أبست .

1804 - أفستين بحري راجع أبست بحري .

1776 - إغورار Résorption (F). Reabsorption (E).
امتصاص ثان تتصف به بعض الاعضاء .

1777 - أغوطي * ، أغوتي Dasyprocta (S).

Agouti (F). Dasyprocta (E).
جنس حيوانات لبونة قاضمة عاشبة من الشرفيات . انواعه ١٣ ، مهدها البلاد الامريكية . جشها جثة الارنب الكبير . رأسها أقطم . لها اذنان صغيرتان مستديرتان . قوائمها رفيعة رباعية الاصابع في الاماميتين وثلاثية الاصابع في الخلفيتين . صوفها كثيف قصير لونه الى الشبهة || تعيش منفردة في جحرها الذي تحفره بين جذور الاشجار . تألف الاحراج والغابات الكثيرة العشب || تدجن بسهولة لكنها لا تستأنس الانسان وتفر من اللبس || أشهر انواعها وافخرها لحماً وصوفاً الاغوتي المذهب .

1778 - أغوطي مذهب Dasyprocta aguti (S).
Agouti commun, Lièvre doré (F). Dasyprocta aguti, Common aguti (E).

أشهر انواع الاغوتي واكبرها جثة وألذها لحماً . طوله نحو ٥٠ سم . ثوبه اشقر مذهب . صوفه كثيف ناعم . يألف المراعي الطبيعية وصفاف الأنهر . يسرح في الليل . يمدو بسرعة فائقة . انشاء نشوة تضع أربع مرات في السنة وفي كل مرة من الجروين الى الاربعة جراء .

1779 - أغيان Asperion
هي السقاية الآلية بواسطة الآلية او الاواقي .

1780 - آخية Tourniquet (F).

Turnstile, Turnpike (E).
الآخية والآخية : مفعلة مروحية تدور بتأثير ضغط وجريان الماء فتثريه كوثم المطر || تستعمل في حدائق التزيين وفي بعض البساتين . ج اواقي .

1781 - أغيد ، أملة ، رخص ، مرن Flexible

1782 - أف ، صملاخ Cérumen (F).
Cerumen, Ear-wax (E).
ما تفرزه الأذن من وسخ .

1783 - آفاقي * ، دندران Vicia cracca (S).
Vesce craque, Pois à crapaud (F). Tufted vetch, Cracca, Cowvetch (E). Vogelwicke (D). Vecchia multiflora, Cracca, Vecchia spicata (I).

ضرب من البقية وهو نبات عشبي بري حولي من فصيلة القرنيات القراشية يكثر في بعض الاصقاع الجبلية . رعاء البهم . ازهاره بنفسجية زاهية وافر الرحيق تجرسه النحل .

1784 - أفانية Morelle noire (F).

هي الربرق ، اطلبه . وقد جاء في رسالة النفراو للمري : « ان في مسكني حياطة ما كانت قط أفانية ولا الناكزة بها غالية » .

1785 - إفتجاء ، فجء Mutation (biol.) (F).
Change (E).

هو كل تغيير او تبدل فجائي في الانتقال الوراثي لصفة او لصفات نوع او ضرب من الاحياء .

1786 - إفتسحار Déléction (F). Deletion (E).

الافتسحار حادث تعرض له النطشة فيسبب تلف بعض اجزائها ويقودها الى الانتحاء .

1787 - إفتراض ، فرضية ، رجم ، حدس

Hypothèse (F). Hypothesis (E).



أغوطي



آفاقي



أفصح الركبة

غليظ الجرم ، مستدق العنق والذنب ، يطول من ١٣٠ الى ١٤٠ سم. ثوبها الى الصبهة الطحلاء يعلوها من رأسها الى طرف ذنبها بقع حنطية مطوقة باطار جزوي مفتوح الحلقات اللانظامية الترتيب . رأسها كراس الافعى المبدولة غير انه اكبر حجماً . عيناها مستديرتان فاشرتان . عدد اسنانها ٥٢ منها ٢٦ في الفك الاسفل و ٢٦ في الاعلى من اصلها عقافتان اماميتان متحركتان || تبلغ كامل نموها بعمر عشر سنوات وتعيش نحو ٨٠ سنة . تألف البراري والاحراج والبيوت المأهولة . تسرح في الليل وفي النهار . قوتها الدويبات من الجرذ الى العفاه والصفادع والحيات || تعتبر من الافاعي الخبيثة الشديدة الاذى .

١٨١٦ - أفعى مبدولة * ، عققد الجوز

Vipera vulgaris (S). Vipère commune (F). Common Viper (E).

حية سرلودة سامة خبيثة من الافاعي انبوبيات الاخاديد . جسمها يطول نحو ٦٥ سم. الذكر أغلظ من الانثى . ثوبها الى الكهبة المنمعة يعلوها من رأسها الى طرف ذنبها سلسلة سوداء من التعاريج والتجاذيع المعترضة وصفتان ايمن وايسر من النقط السود . رأسها حرسامي الشكل . عيناها حادتان لامعتان . لسانها جزل الطرف يندفع من غمده ويعود اليه كالسهم . عدد اسنانها ٥٠ منها ٢٤ في الفك الاسفل و ٢٦ في الفك الاعلى من اصلها عقافتان ذلقتان متحركتان . عنقها محذوقة قصيرة || يقال انها تعيش من ٦٠ الى ٦٥ سنة . تبلغ كامل نموها بعمر ٨ سنوات وتسافد بعمر اربع سنوات || تسرح في النهار قوتها كل ما دب وطار .

١٨١٧ - أفعى نميرة * ، غطرب

Vipera aspis, Vipera maculata (S). Vipère aspic, Vipère tigrée, Aspic (F). Asp. (E).

حية سرلودة سامة خبيثة من الافاعي انبوبيات الاخاديد . جسمها يطول نحو ٩٠ سم. رأسها لوزي الشوزن . عنقها المعتدلة القصير والشخانة . عدد اسنانها ٥٠ منها ٢٤ في الفك الاسفل و ٢٦ في الفك الاعلى من اصلها عقافتان اماميتان متحركتان . || ثوبها الى السمرة الصنابية المواج يعلوها ثلاثة خطوط من البقع المتباينة الاشكال الحنطية اللون المطوقة بالاسود || وهي سريعة الغيظ ، نزقة . انذارها فحيح خافت متقطع . بياتها الشتوي يستمر نحو ١٤٠ يوماً . تبلغ كامل نموها بعمر ١٢ سنة وتعيش نحو ٩٥ سنة || قوتها كل ما دب وتمكنت منه ولا تعف عن العصافير . تسافد بعمر خمس سنوات . جراب الانثى يحوى من ١٤ الى ١٨ بيضة تنقف وتخرج ، في اواخر الصيف ، جوارن صغيرة طولها من ١٠ الى ١٢ سم. تسرح وتسمى حينها || تعتبر من الافاعي الخبيثة الشديدة الاذى .

١٨١٨ - أفعيّات

Viperidae (S). Viperidae (F). Viperidae (E).

الافعيّات والافاعي فصيلة من الحيات الانبوبيات الاخاديد . اجناسها وانواعها عديدة جميعها سامة . قلما تتعرض للانسان . وقد تكون مؤذية عند اضطرابها الى الدفاع .

١٨١٩ - أفقى

Tanner (F). To tan (E).

أفق الجلد : دبهه فهر افق .

١٨٢٠ - أفقة

Flanc (F). Flank (E).

الأفقة والآفة هي الحاصرة .

Synchronisme (F).

١٨٠٥ - إفشان

هو الفشن : اطلبه .

١٨٠٦ - أفشع هو الكبش ذهب قرناه يمين ويسرة .

١٨٠٧ - أفصح

يقال أفصحت البقرة والشاة والعنز والناقة اذا انقطع لبوها وجاء اللبن خالصاً .

١٨٠٨ - أفصح

أفصح البسر اذا بدت الحمرة فيه .

١٨٠٩ - أفطح

Eurycéphale (F).

الافطح المريض القحف اي الرأس .

Camard, Camus (F).

١٨١٠ - أفطس ، أقعم

Flat-nosed, Snub-nosed (E).

نعت وصفي لأنف الحيوان المنتشر عرضاً .

Ophisure (F).

١٨١١ - أفطور

هو الرستان من الاسماك البحرية ، اطلبه .

Vipera (S). Vipère (F). Viper (E).

١٨١٢ - أفعى

هي الحية السامة من اي نوع كانت .

١٨١٣ - أفعى سوداء * ، غطرب أسود

Vipera nigricans (S).

Vipère noire (F). Black viper (E).

حية سرلودة سامة خبيثة من الافاعي انبوبيات الاخاديد . جسمها يطول نحو ٦٥ سم. رأسها وعنقها قريباً الشبه من الافعى المبدولة . ثوبها الى السمرة السوداء يعلوها تجذيع معترض فحمي المواج . شدقاها مطوقان ببعض النقط البيض . عيناها فريحتان حادتا البصر / عدد اسنانها ٥٠ منها ٢٤ في الفك الاسفل و ٢٦ في الفك الاعلى من اصلها عقافتان اماميتان متحركتان || تبلغ كامل نموها بعمر ٨ سنوات وتعيش نحو ٦٥ سنة . تعتبر من ابطش الافاعي واسرعها غيظاً . تألف الجبال الوعرة والادوية الدغلة وقلما تقترب من المساكن الآهلة . تسرح في النهار وفي الليل . بياتها الشتوي لا يتجاوز خمسة اشهر || قوتها الدويبات والعصافير || تعتبر من الافاعي الخبيثة الشديدة الاذى .

Vipera cherssea (S).

١٨١٤ - أفعى شرسة *

Vipère cherssea, Aesping (F). Aesping (E).

حية سرلودة سامة خبيثة من الافاعي انبوبيات الاخاديد . جسمها يطول نحو ٧٠ سم. رأسها حرسامي الشكل . عنقها محذوقة معتدلة الطول . ثوبها الى الكهبة الفولاذية المواج . ظهرها منمش بخط قاطب من البقع السود المستديرة المتتابعة بدون قياس من العنق الى طرف الذنب || عدد اسنانها ٥٠ منها ٢٤ في الفك الاسفل و ٢٦ في الفك الاعلى من اصلها عقافتان اماميتان متحركتان || تألف الادغال والاحراج . تسرح في النهار وفي الليل . تبلغ كامل نموها بعمر ثماني سنوات . وهي شرسة سريعة الانفعال ، شديدة البطش || تعتبر من الافاعي الخبيثة الشديدة الاذى .

Bitis arietans (S).

١٨١٥ - أفعى عبرية *

Vipère hébraïque (F). Hebraic Viper (E).

حية سرلودة خبيثة من الافاعي انبوبيات الاخاديد : جسمها



افعى سوداء



افعى شرسة



افعى عبرية



افعى مبدولة



افعى نميرة



أفلوس أمرد



أفلوس تلجي



أفلوس غاري



افلوس اسود



أفنون

١٨٣٣ - أفلوس منثني الورق
V. plicatum.
V. à feuilles plissées

١٨٣٤ - أفلوطن، بِلُتُون
Pluton (F). Pluton (E).
كوكب سيار يتبع النظام الشمسي. دورته حول الشمس تستمر نحو ٢٤٨ سنة و ١٥٥ يوماً. سرعة انطلاقه في الفضاء نحو ١٧٠٢٨ كيلومتر بالساعة.

١٨٣٥ - أفلورنس التفاح
Aphelinus mali (S).
هو دنفصة المن، اطلبها.

١٨٣٦ - أفن
Déséquilibre (F). Want, Lack (E).
الافتقار لعدم التوازن.

١٨٣٧ - أفنوس
Euphone (F).
طائر من التنغريات يدعى عزاف، اطلبه.

١٨٣٨ - أفلوس أسود
Aphanisticus ater (S).
Aphanistique noir (F). Aphanisticus ater (E).

حشرة ناهمة من فصيلة الزقنوتيات ورقبة مخمدات الاجنحة. موطنها بعض مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة من العالم القديم. تألف البراري والرياض وضفاف مجاري الماء. خنافسها تعيش على الاذخر والسمار والاسل والقصب والغزار. يرقاتها تسردب الارومات وقلما تقترب من الكعابر. جسمها صغير القديطول من ٤ الى ٦ مم. ثوبها الى السمرة السوداء. رأسها معتدل الجرم، مدبب الحطم. عيناها كبيرتان. زباناها خيطيان، منشاريا التركيب. غدها شديدة الصلابة، متشابها التحيز التحيل. ارساغها خماسية العقل. الاثنى اميز قدأ من الذكر واهت ثوباً منه واقصر زبانا. لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في ارائل ايار وتبقى حتى اواخر آب. تسرح في النهار وتبيت في الليل. اليرقة مرقالة تطول نحو ١٠ مم. جسمها سلمي التركيب، مستطيل الرأس المدبب الطرف، مستدق المؤخر التحيل. ثوبها الى البياض الاغبر. تأشيرها وفواصل سكها بنية. طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي ضمن صانجة غاوية الغشاء المركب من مواد نباتية معجونة بالريال.

١٨٣٩ - أفنون، ثعبان ابو جرس
Crotale (F).
Crotalus (E).

حية سامة خبيثة من الافنونييات.

١٨٤٠ - أفنونييات
Crotalidae (S).
Crotalidés (F). Crotalidae (E).

هي الصنجيات فصيلة حيات سامة من انوبييات الاخايد. اطلب صنجيات.

١٨٤١ - إفنيك
Rectrices de la queue (F).
Tail-feathers (E).

الافنيك هو ريش زمكي الطائر ومنهم من قال الزمكي ومن قال منبت ذنب الطائر.

١٨٤٢ - أفوديوس
Aphedius
جنس خنافس من فصيلة الجعلليات. انواعه اكثر من ٢٠٠ جميعها صغيرة القد نافعة يكثر فيها اللون الاسود

١٨٢١ - أفقي
Horizontal

١٨٢٢ - أفقية
Horizontalité (F). Horizontality (E).

١٨٢٣ - أفك
Mâchoire, Mandibule (F).
Mandibular (E).

هو فك متقار الطائر. وهما اثنان الافك الاعلى والافك الادنى.

١٨٢٤ - إفلاس
Faillite (F). Bankruptcy (E).
حالة التاجر او الصناعي الذي توقف عن الدفع وحكمت بذلك المحكمة المختصة. || والافلاس قد يكون واقعي او فعلي.

١٨٢٥ - أفلوس، رباطية، جنبه الرباط
Viburnum (S). Viorne (F). Viburnum, Wayfaring tree (E).

جنس جنبات معمرة برية وزينية من فصيلة الجانيات. انواعه زهاء ١٠٠ معظمها اسيوي وبعضها امريكي. اوراقها متقابلة، معنقة، كفية، مفصصة. ازهارها عادية، خنثوية، صغيرة القد، عشكولية التجميع، خماسية البتلات والاسدية. || اشهر انواعه العالمية ما يلي.

١٨٢٦ - أفلوس أمرد، خيمان الماء، بلسان الماء
Viburnum lobatum (S). Viorne lobé, Aubier, Obier, Bureau d'eau (F). Water elder, Guelder-rose, Dog elder (E). Schingbaum, Schneeball-schlinge (D). Viburno loppo, Maggio, Palla dineve (I).

نوع من الافلوس البري الصناعي. قضبانته مرنة، سهلة الالتواء، كثيرة العدد، تستعمل في صناعة المذارى والسلال وما أشبه. اوراقها منفطة.

١٨٢٧ - أفلوس تلجي، بلسان ابيض، كرة الثلج، متقار الكركي
Viburnum opulus roseum (S).

Boule de neige, Pain blanc, Rose de Guelder (F). Red Guelder-rose, Snow ball tree, Rose elder, Cranberry tree (E). Deutscher schneeball, Gelder-rosen (D). Palla di neve, Rosa di Gueldra (I).

نوع من الافلوس يزرع للتزيين عشكوله الزهري لبد التجميع، جميل الشكل، ابيض اللون كالثلج. وهو دواء نافع لنفص البطن ووجع الرحم.

١٨٢٨ - أفلوس غاري، رباطية غارية
Viburnum tinus (S). Viorne tin, Laurier tin (F). Laurestine, Wild bale tree (E). Lorbeerschlinge (D). Viburno lauro-timo, Alloro tino (I).

نوع من الافلوس يستعمل للتزيين وهو من الجنبات العررية الجيلة الوراق الشديدة الخضار. نقيع اوراقه سهل. وفي الافلوس انواع تزيينية عديدة لكنها اقل شهرة نفص منها بالذكر.

١٨٢٩ - أفلوس شرقي
V. orientale,
V. d'Orient

١٨٣٠ - أفلوس قيقبي الورق
V. acerifolium,
V. à feuilles d'érable

١٨٣١ - أفلوس كبير الزهر
V. macrocephalum,
V. à grosses inflorescences

١٨٣٢ - أفلوس محزّز الورق
V. dentatum,
V. à feuilles dentées

القد يطول من ٣ الى ٥ مم. ثوبها لاقياسي اللون معظمه سوي الاسوداد العابق وبعضه اسمر الظهران وبعضه الآخر مرقوش جوانب الكوسل بالاحمر القرميدي. رأسها مستعرض الجرم، قصير الخطم، ضليح التأشير. عيناها صغيرتان، بارزتان. زباناها صفيان، دقيقان. غمداها متتابعتا التحزيز القاطب. ارساغها خماسية العقل || لها جيلان في الحول. تظهر خنفساء الجيل الاول في اواسط نيسان وتعيش حتى اواسط ايلول. وتظهر خنفساء الجيل الثاني في اواخر ايلول وتعيش حتى اواسط شباط || اليرقة عند الادراك التام تطول من ٨ الى ١٢ مم. جسمها مقوس الشكل، عشاري السكم، سداسي الرواجب، اسمر اللون. رأسها صغير اسود. فكها قويان اسمران. رواجبها ومدبها الى السمرة. || يستمر طور الاكمال في الجيل الاول نحو ٢٥ يوماً، ويستمر من ٣٥ الى ٤٠ يوماً في الجيل الثاني.

١٨٤٦ - أفون الرمال *
Ophonus sabulicola (S). Ophonus sabulicola (E).

حشرة خاضعة من فصيلة الهربوسيات ورتبة غمديات الاجنحة. تألف الاتربة الرملية والكلسية ولا تقترب من الاراضي المروية. خنفسها تعيش على بزور نباتات الفصيلة الصوانية. يرقاتها خاضعة || جسمها متوسط القد يطول من ١٤ الى ١٧ مم. ثوبها ثنائي اللون. رأسها وكوسلها الى السمرة السوداء. غمداها وبطنها الى الزرقة. زباناها خطيان دقيقان. عيناها صغيرتان. ظهرانها معتدل الاحديداب، مستدير الطرف اللاحف، متتابع التحزيز الغصدي الهزيل الخطوط. ارساغها خماسية العقل || الانثى اصغر قدماً من الذكر واكد ثوباً منه واقصر زبانا || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في حزيران وتبقى حتى ايلول. تسرح في الليل. تسافد في تموز. تمتح الممكن على صفحات الاوراق التي تلامس التربة || اليرقة، عند بلوغها الادراك التام، تطول من ٢٢ الى ٢٦ مم. جسمها شبه اسطواني الشكل، سداسي الرواجب، اسمر اللون، تعلوه وتقطعه خمسة خطوط صفر || طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع ينقضي في التربة على عمق ٥ او ٦ سم.

١٨٤٧ - أفياء
Nounat (F).

سمكة صغيرة دقيقة تدعى نونه، اطلبها.

١٨٤٨ - أفياء *
Spizaète (F). Spizaetus (E).

الافياء والفي، طائر من العقبان وفصيلة الصقريات. يتميز بقزاعته الطويلة الريش المنعطف على المنق. جشته مستطيلة، طوله نحو المتر. عيناها عسلتان، سقطاء متوسطا الطول، رأسه وظهره الى الكهبة الريداء، تغشاها خطوط ضيقة مستعرضة غبراء اللون. صدره وبطنه الى البياض المرقش يعلوه موج ازرق. زمكه طويلة تعترضها ستة خطوط سمر. نحاله الى الخضرة السمر. || موطنه البلاد الافريقية. من مراكش الى الحبشة والبحر الاحمر والجزيرة وفلسطين والاقليم السوري || وهو من الطيور الاوابد التي تعيش ازواجاً لا يفرقها غير الموت. يبني عشه في رؤوس الاشجار الباسقة او بين الصخور الناقلة || انشاء تبض دفنتين كبيرتين طول الواحدة من ٨ الى ٩ سم. والافياء تعيش من قنصها اذ تصيد الغزال والارانب والمصافير وماشبه.

والبي والاحمر. || تعيش على المواد العضوية وعلى جميع انواع الزبل.

١٨٤٣ - أفوديوس أزرق الكوسل *

Aphodius luridus (S). Aphodius livide (F).
Aphodius luridus (E).

حشرة نائلة تنتمي الى فصيلة الجعليات ورتبة غمديات الاجنحة. موطنها معظم اصقاع العالم القديم. تألف الاماكن التي يكثر فيها الماعز والغنم لانها تعيش على المواد العضوية الموجودة في البعر || جسمها صغير القد، مفلطح الشكل، يطول من ٧ الى ٩ مم. ثوبها ثنائي اللون، اترأس والكوسل الى الزرقة العابقة، الغمدان الى السمرة الخنطية تعلوها رقشة سوداء. رأسها مستعرض الشكل، قصير الخطم، ضليح التأشير. عيناها صغيرتان مائمتان. زباناها صفيان دقيقان. ظهرانها مستدير الطرف اللاحف، متتابع التحزيز الدقيق القاطب. ارساغها خماسية العقل || الانثى اميز قدماً من الذكر وافتح ثوباً منه || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في نيسان وتعيش حتى اواسط ايلول. مسرحها دجوي يستمر من الغروب الى قمحة الليل ومن الفجر العميق الى الشروق || اليرقة عند الادراك التام تطول من ١٤ الى ١٦ مم. جسمها مقوس الشكل، عشاري السكم البنية، سداسي الرواجب، اغبر اللون الدنس. رأسها صغير الجرم، اسود اللون. فكها ضليعان. رواجبها ومدبها الى السمرة || طور الاكمال الذي يستمر من اواخر شباط الى اوائل نيسان ينقضي في التربة.

١٨٤٤ - أفوديوس تائه *

Aphodius erraticus (S). Aphodius errant (F).
Aphodius erraticus (E).

حشرة نائلة تنتمي الى فصيلة الجعليات ورتبة غمديات الاجنحة. موطنها معظم اصقاع العالم القديم. تألف الاماكن التي تكثر فيها الدواب لانها تعيش على روث الخيل والبغال والحمير... || جسمها صغير القد، شبه بيضي الشكل، يطول من ٥ الى ٧ مم. ثوبها ثنائي اللون، اترأس والكوسل الى السمرة السوداء، الظهران الى الصفار الخنطي الدنس. رأسها مستعرض الجرم، قصير الخطم. عيناها صغيرتان بارزتان. زباناها صفيان دقيقان. ظهرانها مستدير الطرف اللاحف. غمداها متتابعتا التحزيز. ارساغها خماسية العقل || الانثى اميز قدماً من الذكر وافتح ثوباً منه واقل حركة || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتعيش حتى ايلول. تسرح في الليل اما في زمن التسافد فسرحتها يستمر طول الليل والنهار || اليرقة تطول من ١٢ الى ١٥ مم. جسمها مقوس الشكل، عشاري السكم، سداسي الرواجب، ابيض اللون الاغبر الدنس. رأسها اسود فكها ضليعان. تعيش على المواد العضوية في الروث وفي التربة حتى اوائل اذار حيث تتحول الى حورية ومنها الى حشرة جملانة تظهر في ايار.

١٨٤٥ - أفوديوس مبدول *

Aphodius granarius (S). Aphodius commun (F).
Aphodius granarius (E).

حشرة نائلة من فصيلة الجعليات ورتبة غمديات الاجنحة. موطنها يشمل معظم اقاليم العالم القديم. تألف الاماكن المأهولة لانها تعيش على مختلف انواع البراز من الغائط الى الروث والخي والجلة والبعر... || جسمها صغير



أفوديوس أزرق الكوسل



أفوديوس تائه



أفوديوس مبدول



أفون الرمال



أفياء



أفيقطة



أفيو



أفي

١٨٦٢ - أفيون Opium

هو العصارة اللبنة اللزجة المستخرجة من جراء الخشخاش الحلوية بعض المواد المخدرة والمنومة ، أشهرها المورفين ثم التركوتين والكوداين والنرسين والتباين والخشخاشين واللودنين || أجوده نوعاً ما كان أوفر اللون وهو الذي يستنزف من جراء الخشخاش الأحمر ، وأما النوع الأبيض الذي يستنزف من جراء الخشخاش الأبيض فهو أقل جودة . والافيون يستعمل في الطب مخدراً ومسكناً للألام . تعاطيه ممنوع ويمنع محرم لانه وخيم العواقب يحطم الاعصاب ويسبب الى الصحة .

١٨٦٣ - أفينونكس Avionex

طعم زراعي يرتكز على مادة مثاليدهيد . وهو مستحضر معد للاستعمال يحوى ٥ ٪ من جوهر المادة . يستعمل في مكافحة جميع أنواع الرخويات من حلزون وبزاق وغيرها .

١٨٦٤ - أفاقية Endigage.

١٨٦٥ - إقامة السدود Endiguement (F). Damming in, Damming up (E). هي أن تبنى السدود في وجه المياه الجارية منعاً لطفائها .

١٨٦٦ - أقب هو الفرس الدقيق الحصر الضامر البطن . والاثني قب . ج قب .

١٨٦٧ - أقبج Hanneton commun (F). Common may-bug (E). هو الجمل الشائع ، اطلبه .

١٨٦٨ - أقبى Akebia (S). Akébie (F). Akebia (E). جنس نباتات ليفية عارشة معمرة من فصيلة اللريزياليات . مهدها الشرق الأقصى . تكثر في الصين واليابان . أشهر أنواعها : الأقبى الخماسية الورق (Akebia Guinata) . تزرع للتزيين . أزهارها عنقودي التجميع ، أزهارها وردية . ثمارها قرون . بزورها كلبية الشكل مقطوعة .

١٨٦٩ - إقتباس Réceptivité (F). Receptivity (E). امكانية التقاط الشيء .

١٨٧٠ - إقتصاد Economie (F). Economy (E). الإقتصاد هو التوفير وهو علم يبحث في ترتيب النفقات والدخل وإدارتها وفقاً لمقتضيات الحال .

١٨٧١ - إقتصاد زراعي Economie rurale (F). Rural economy (E). الإقتصاد هو التدبير وحسن الادارة . والإقتصاد الزراعي هو فرع من الإقتصاد السياسي . يختص بطرق إنتاج مختلف أنواع الثروة الزراعية ووسائل توزيعها واستهلاكها .

١٨٧٢ - إقتطاع Avulsion هو أن يقتطع تيار الماء قطعة من أرض ويضيفها على الأرض المجاورة أو المقابلة لها .

١٨٧٣ - إقتلاع Déplantage, Déplantation (F). Displanting (E). قلع الأشجار ونقلها .

١٨٧٤ - إقتناص Chasse (F). Hunting (E). الإقتناص هو الصيد البري ويملك الصائد قنصه بالاستيلاء .

١٨٤٩ - أفيقطة Epipactis grandifolia (S).

Epipactis, Helleborine (F). Epipactis (E). Grüne dingelwurz (D). Elleborina (I). ضرب من الشحاريات التي تزرع للتزيين . ساقها مستقيمة اسطوانية جوفاء . أوراقها متعاقبة رحيمة حاضنة . أزهارها سنبلية التجميع هامي الارتكاز . أزهارها جميلة الشكل أرجوانية البتلات ، فواحة العرف العطر الذي يشبه الفينيلة .

١٨٥٠ - أفيت Ophite

الأفيت ونهم من قال حجر الحية نوع من الرخام الأخضر المبقع .

١٨٥١ - أفيتامين Avitaminose

علة في الجسم سببها عوز الفيتامين .

١٨٥٢ - إفيجينية Iphigenia (S). Iphigénie (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة الدونسيات . أنواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصداؤها مثلثة الزوايا ، سميكة الاصفاد ، متساوية المصاريح لامتناهية الاضلع . مثاعها انبوية الشكل ، طليقة ، مستطيلة || تعيش بين الرمال والاسمال عند مصبات الأنهر .

١٨٥٣ - أفيدوس الخرطال Aphidius avenae (S). هو دهمور الأرق ، اطلبه .

١٨٥٤ - أفيس Aphis هو الأرق .

١٨٥٥ - أفيقة Peau tannée (F). Fell, Hide (E). الجلد المدبوغ ويقال له السبت .

١٨٥٦ - أفيقون Aphyllon اطلبه هيبقون .

١٨٥٧ - أفيل Chamelet (F). Young camel (E). الأفيل : صغير الابل .

١٨٥٨ - أفيرور Ophiure

جنس حيوانات بحرية من فصيلة الأفيوريات توجد في معظم البحار ، تدب زحفاً وتعيش في العمق || قوامها رأس اسطواني الشكل مصفح الغلاف يحمل جرامز مستطيلة دقيقة هلية شائكة .

١٨٥٩ - أفيرورات Ophiuridés (F).

Ophiuridae (E). صف حيوانات بحرية من الشوكيات الزواحف : فصائله واجناسه وأنواعه عديدة منتشرة في جميع البحار واطرها بحار البلاد الحارة .

١٨٦٠ - أفيرور راجع إشخاص .

١٨٦١ - أفيرور Ophiocladium

جنس فطور مجهرية من عمارة الزيكيات وفصيلة الطحنيات . أنواعه قليلة منها نوع يتطفل على الشجر وبعض النجيليات الأخرى . يتميز بشيجه الخيطي الشكل ، الرزمي التجميع ، الذي يركب بشرة النصل تحت السمة . أما كنيذاته ففردية شفافة || مظهره الخارجي على نصل العصف بقع ضيقة مستطيلة رداء اللون تعلوها بثور بيض . || أضراره قليلة جداً لا تستوجب المكافحة .

١٨٨٣ - **أَقْحُونُ المُرُوجِ** Marguerite des prés
اطلب بابونج ابيض .

١٨٨٤ - **أَقْحُونُ خَمِينِ * ، قَحُونُ ، مَارُوت ٥**
Anthemis cotula (S). Camomille puante, Maroute (F). Dog's fennel, Stinking may-weed, Stinking chamomile (E). Stinkhunds-kamille, Hunds-kamille (D). Camomilla fetida, Cotula fetida (I).

نوع من الاقحوان وهو نبات عشبي بري حولي . منافعه الطبية عديدة فهو مضاد للتشنج ، طارد للديدان ، مدر للطمث ويستعمل منبهاً في حالات انقباض الرحم . ومنهم من قال انه يسقط الاجنة ويفتت الحصى .

١٨٨٥ - **أَقْحُونُ شَرِيفِ * ، بَابُونَج ، بَهَارِ نَبِيلِ**
Anthemis nobilis (S). Anthémis noble, Camomille odorante, C. romaine (F). Camamel, Chamomile, Roman chamomile (E). Edle hunds-kamille, Romische kamille (D). Camomilla odorosa, C. romana, C. noble (I).

نبات عشبي بري حولي عديد المنافع الطبية والصحية فواح العرف المستحب || يقوي المعدة ويساعد على الهضم ويمنع الغازات ويخفض الحرارة ويذهب بالسعال الخفيف وبإسهال الاطفال || ومنهم من نسب اليه زيادة القوة الجنسية وقد تكون المدأومة على استعماله وما تحدثه من تنظيف الامعاء هي السبب في ذلك .

١٨٨٦ - **أَقْدُوم** Accidium
مدرج من مدارج الباء في بعض الفطور .

١٨٨٧ - **إِقْرَارُ ، إِعْتَراف** Aveu (F). Avowal (E).
هو ان يعترف من عزى اليه امر بصحة هذا الامر .

١٨٨٨ - **إِقْرِيطَشِيَّة** راجع اخيون معروف .

١٨٨٩ - **أَقْرَامُ القُرُودِ** Hapallidae (S).
Arctopithèques, Hapallidés (F). Hapallidae (E).
هي القروود الدبية ، اطلبها .

١٨٩٠ - **أَقْرَلَان** Pennes médianes (F).
Middle feathers (E).
الاقزلان : ريشتان وسط ذنب العقاب .

١٨٩١ - **أَقْسُونُ * ، رَأْسُ الشَّيْخِ ، شُكَاَعِي ، طُوبِيَّة ، قَصَّ الحَمَارِ** Onopordon acanthium (S).

Chardon acanthe, Artichaut sauvage, Cardonnette, Chardonnette sauvage, Pet d'âne (F). Cotton thistle, Scotch thistle, Wild artichoke (E). Gemeine eselsdistel, Wilde artichoke (D). Cardaccone, Acantino, Peto d'asino (I).

نبات عشبي بري طليي معمر من الحشيشيات وفصيلة المركبات وهو أشبه شيء بالباذورد والارضي شوكي الا انه أقصر قدماً منها له ساق غليظة واوراق مفرصة متموجة هدية الحافة || يقشر طرياً ويؤكل فيدفع التشنج والكزاز . يوجد في الاراضي البور وعلى جوانب الطرقات .

١٨٩٢ - **أَقْسِيَان * ٥** Adenogramma (S).
Adénogramme (F).

جنس نباتات عشبية برية مرعوية من فصيلة المغيريات . منبهاً بعض مناطق افريقية الجنوبية . انوعها المعروفة قليلة العدد . سوقها نحيلة . اوراقها متعابلة ، خاسية العدد ، عصفية النصال ، صغيرة القد . ازهارها عنقودي

١٨٩٥ - **أَقْتَنِي * ، أَقْطِي**

Actaea (S). Actée, Herbe de St. Christophe (F). Baneberry, Grapewort, Herb Christopher (E). Ahriges Christophskraut, Schwarzwurz (D). Actea d'Europea, Cristoforiana (I).

جنس جنبات وجنبيات معمرة من سبط الحشيشيات وفصيلة الخوذائيات . اوراقها مركبة ثلاثية مفصصة متعاقبة طويلة الزناد بحيلة الاخضرار || ازهارها صغيرة عنقودية التجميع تاجية الارتكاز لوها الى الخضار الارجواني . بتلاتها صغيرة خطية شفوية افقية . اسديتها عديدة . ميسمها وحيد ثمارها عنبية ، شبه كروية ، سوداء اللون ، سامة || انواعه عديدة معظمها بري ينبت في جميع الاصقاع المعتدلة وبعضها يستعمل للتزيين . اشهرها واعمها :

١٨٩٦ - **أَقْتَنِي بَيْضَاء** Actaea alba (S).
Actée blanche (F).

تزرع للتزيين . ازهارها بيضاء اللون . ثمارها سامة .

١٨٩٧ - **أَقْتَنِي سُنْبُلِيَّة** Actaea spicata (S).
Actée en épis (F).

تزرع للتزيين . ازهارها سنبلية التجميع ارجوانية اللون . ثمارها سامة .

١٨٩٨ - **أَقْتَنِي عُنُقُودِيَّة ، قَاتِلُ البَقِّ**

Cimicifuga racemosa (S). Actée à grappe, Cimicaire (F). Bug-bane, Rattle-root, Black snake-root (E). Schwarzes wanzenkraut (D). Actea cimicifuga (I).
نوع من الاقنى وهو نبات عشبي بري يقال انه يقتل البق وبعض الحشرات .

١٨٩٩ - **إَقْنِيَّات** Trophisme, Trophie (F).
Trophism (E).

حالة التغذية .

١٨٨٠ - **أَقْحُونُ** Anthemis

ومنهم من قال بهار وهو غلط فافصح || جنس نباتات عشبية حولية او معمرة من سبط العذقيات وفصيلة المركبات الانبوية الزهر . || انواعه عديدة معظمها اسبوي واروبي المنبت . جميع اعضائها عطرية . قناها مستدير يتألف من حراشف مرصوفة شفاقة الاهداب الناشفة . قرص الزهرة مغمم بالشذور تتوسطه زهيرات نخشوية صفراء اللون من انواعه المشهورة ما يتبع .

١٨٨١ - **أَقْحُونُ أَصْفَر * ، عَيْنُ القَط ، بَهَارِ حَقْلِي**

Anthemis arvensis (S). Camomille des champs, Fausse camomille (F). Corn chamomile (E). Ackerhunds-kamille, Feldkamille (D). Camomilla dei campi, Banbagella campestre (I).

نبات عشبي بري يكثر في بعض الحقول وبين الزروع فيصبح من النباتات الضارة || يستخرج منه زيت طيار يستعمل في الطب .

١٨٨٢ - **أَقْحُونُ الصَّبَاغِيْن * ، عَيْنُ الثَّور ، بَهَارِ الصَّبَاغِيْن ، بَابُونَج أَصْفَر**

Anchemis tinctoria (S). Camomille des teinturiers, Œil de bœuf (F). Golden Margaret, Dyer's anthemis, Yellow camomile (E). Farberhunds-kamille, Gold-blumen (D). Camomilla dei tintori, Bambagella, Occhio bovino (I).

نبات عشبي بري يستخرج منه صباغ أصفر اللون وزيت طيارة طبية .



أقنى



أقحوان أصفر



أقحوان الصباغين



أقحوان خمن



أقحوان شريف



أقسون



أَقْصَبَان



أَقْصُور



أَقْطَبَان



أَقْفَد



أَقْلَحُ الشَّوْاطِي

الاجنحة . تألف المناطق وضفاف الأنهر ومجاري الماء .
خنافسها ويرقاتها تعيش على ما يتيسر لها من الحشرات
الدنيا والهوماء || جسمها صغير القدر بطول من ٦ إلى ٨ مم .
ثوبها إلى الخضار النحاسي الاسفع الموج . ظهراتها
مزخرف السطح . رأسها مستعرض الجرم ، قصير الخنصر .
عينها صغيرتان جاحظتان . زباناها محيطيان مستطيلان .
غنداها ثمانية الاحاديد المتوازية . جرامزها إلى الخضار
الانعمس . افخاذها إلى الحمرة . ارساغها خماسية العقول || الانثى
اصغر قدماً من الذكر واهت ثوباً منه واقصر زبناً || لها
جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجمالنة في اواسط
الربيع وتعيش حتى اواسط الخريف . تسرح في النهار .
تسافد في اوائل ايلول . تتمتع المكن بين لحاء الاشجار
وتحت قشورها || اليرقة مردنية الشكل ، سداسية الرواجب ،
تطول عند تمام الادراك نحو ١٢ مم . ثوبها إلى الطحلة
الفراء . رأسها وشرجها ورواجبها إلى السمرة القاتمة || طور
الاكتمال الذي يستمر من ٥٠ إلى ٦٠ يوماً ينقضي
في نفق تحتفره في التربة .

١٩٠٧ - أَقْلَحِيَّات ٥ Elaphridae (S).

Elaphridés (F). Elaphridae (E).

فصيلة حشرات قانصة نافعة من رتبة غمديات الاجنحة .
اجناسها وانواعها كثيرة العدد معظمها من حشرات الاقاليم
الباردة . تألف الشطوط وضفاف الأنهار ومجاري الماء ||
جميعها صغيرة القد ، مستعرضة الرؤوس ، مستطيلة
الزباني المركبة من ١١ فصلة . اغنداها ثمانية الاحاديد
المتوازية . جرامزها دقيقة . مستطيلة الساق في الزوج
الخلفي . تجاويها الحرقفة الامامية ملحومة اما الخلفية
فمنفصلة . وهي سريعة الحركة ، خفيفة الطيران ، تسرح
في النهار وتبيت في الليل . تغرس ما تيسر لها من الحشرات
الصغيرة والديدان والهوماء || اشهر اجناسها الاقلم .

١٩٠٨ - إَقْلَرَقِيَّة Clarkie, Eucharidie (F).

اطلب كلاركيه .

١٩٠٩ - أَقْلَم Acclimater (F). To acclimatize (E).

كيف النبات او الحيوان بشئ الوسائل ليألف اقليماً
جديداً لم يتعوده بعد .

١٩١٠ - إَقْلِيد Euclidium (S). Euclidion (F).

جنس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة الصليبيات .
انواعه المعروفة قليلة العدد منها بعض مناطق الشرق الأدنى ||
سوقها منتصبه فروعاً تعلو من ٢٠ إلى ٤٠ سم . اوراقها
متعاقبة ، سنانية النصال الصغيرة . ازهارها صغيرة بيضاء
اللون || اشهر انواعه الاقلم السوري E. syriacum (S).

١٩١١ - إَقْلِيم ، مَنَاح Climat, Climatologie (F).

Climate, Climatology (E).

هو في العرف العام تقسيم واقعي لختلف بقاع الارض
يرتكز على العوامل الطبيعية اخصها الحرارة والامطار
والرياح || لذلك فالاقليم كثيرة وقد حددها العلم بعدد
خطوط العرض || اما الاقليم من الوجهة الزراعية فهو
تعبير خاص يدل على امكانية زراعة جنس معين من
النبات كقولك اقليم الزيتون واطليم الكرمة واطليم البرتقال
الخ... || والاقليم من الوجهة العامة ، بصرف النظر
عن الترتيب الزراعي ، يقسم الى ستة اقسام او اقاليم :

Climat maritime (F).

Maritime climate (E).

الاقليم بحري

التجميع . ازهارها خماسية التركيب بيضاء اللون او خضراء .
ثمراها عجميات صغيرة شبه مخروطية الشكل .

١٨٩٣ - أَقْصَلِيص هو الحماض .

١٨٩٤ - أَقْصَلِيص صغير اطلب حماض العيد .

١٨٩٥ - أَقْصَلِيص عسقلي اطلب حماض عسقلي .

١٨٩٦ - أَقْصُور * Oxyure (F). Oxyuris, Pin-worm (E).

منهم من سماها حادة الذيل . جنس ديدان من السلكيات
الاسطوانية المستدقة الطرف . انواعه عديدة تصيب الانسان
وبعض الدواجن كالخيل والدجاج . طول ذكورها يبلغ
٦ مم . واناثها نحو ١٢ مم || تعيش طفيلية في الامعاء .

١٨٩٧ - إَقْطَاع راجع استقطاب .

١٨٩٨ - إَقْطَاعَة Latifundium (F).

Latifundium (E).

الاقطاعة اراض اميرية او مملوكة فسيحة الارعاء مترامية
الاطراف مهمة لا تستثمر . ج . إقطاعات .

١٨٩٩ - أَقْطَبَان * ، طَوَلَق Stratiotes (S).

Stratiote (F). Water soldier, W. house leak (E).
Wasserfeder (D). Erba coltella, Stiletti d'acqua (I).
عشبة مائية من الاقطبانيات وفصيلة كلويات الماء . وهي
نجمه عسقلية الجذور ، قرصية الاوراق الخزمية الرخية
الالوية . زهرتها وحيدة يحملها شراخ دقيق يعلو الاوراق .
بتلاتها ثلاثية التركيب ، وردية اللون . اسديتها تساعية
تعيش في المياه العذبة وفي المستنقعات .

١٩٠٠ - أَقْطَبَانِيَّات ، طَوَلَقِيَّات

Stratiotées (F). Stratiotae (E).

سبط النباتات الاقطبانية او الطولقية التي تنتمي الى فصيلة
كلويات الماء . اكثرها نباتات نجمية عديمة السوق تعيش
في المياه العذبة .

١٩٠١ - أَقْطَة Gésler (F). Gizzard (E).

هي القانصة من جيوب الجهاز الهضمي في الطير .

١٩٠٢ - أَقْطَع الاقلم هو كل حمام في بطنه بياض .

١٩٠٣ - إَقْطَاء Ttirer au renard (F).

عيب في الخيل يحملها على شد الرمن للاقواء اي الجلوس
على اسبها .

١٩٠٤ - إَقْطَال Débourrement (F).

Brusting of the down of the buds of trees (E).

اقطال الزهر : انشق عن قعائلته . ويقال اقل التفتح
واقطال الكرم .

١٩٠٥ - أَقْطَد * Cagneux (F).

Knock-kneed, Splay-footed (E).

الققد هو التواء السنبيكين الى الداخل . وهو من عيوب
الخيل . ويقال فرس اققد لمن كان كذلك .

١٩٠٦ - أَقْلَحُ الشَّوْاطِي * Elaphrus riparius (S).

Elaphre des rivages (F). Elaphrus riparius (E).

حشرة قانصة من فصيلة الاقلميات ورتبة نممات

فاطور زراعي يستعمل سائلاً محلولاً ١.٢٥ ٪ في مكافحة امراض البطاطا الفطرية .

١٩٦١ - إكزودرم Exoderme (F). Ectoderm (E).
اطلب بشرة خارجية .

١٩٦٢ - إكزوران Exoran
مسحوق ناعم يرتكز على مركبات الزئبق . يستعمل لوقاية البذار المخزون من النخر وذلك بمعدل ٢٠٠ غرام لكل ١٠٠ كيلو بذار .

١٩٦٣ - إكزيمه ، قوباء Eczéma (F).
Eczema, Tetter, Moist tetter (E).
مرض جلدي يعترى معظم الحيوانات الداجنة اخصها الخيل والابل .

١٩٦٤ - إكزيمه رطبة ، ومحة ، حصف Impétigo, Eczéma humide (F). Impetigo (E).
هي القوباء الرطبة ، مرض جلدي .

١٩٦٥ - إكس Aix
جنس طير من البط البري يتميز بهاء اهابه الريشي ، باستطالة جسمه وذنبه ، بكبر رأسه ، بدقة عنقه ، بقصر منقاره الاعقف الملقط ، باعتدال وضيق جناحه ، بصغر ساقه وبوفرة ألوانه الزاهية المتراكبة || انواعه عديدة منها اثنان شهيران : الاكس الشرقي والاكس الامريكي .

١٩٦٦ - إكس أمريكي Aix Sponsa (S).
Aix de la Caroline, Canard de la Caroline
لا يختلف عن الشرقي الا بثوبه الذي ينحرف فيه الاخضر نحو الجؤوة وبأغرته الزرقاء المحفوفة بالبياض .

١٩٦٧ - إكس شرقي Aix galericulata (S).
Aix mandarin, Canard mandarin (F).
موطنه اليابان وشمال الصين وحوض نهر الأمور . يعيش قرب المياه العذبة . يتميز بحسن وجمال ريشه الزاهي وبأغرته الفستقية اللون || قوته النباتات المائية والحشرات والضفادع والحبوب والثمار العنية || وهو كالحمام الفة ووداً يألف الذكر انثاه ولا يقترب من غيرها || يدثن في الاشجار ويحضن البيض مناوبة .

١٩٦٨ - أكسع
هو الطائر الذي اجتمع تحت ذنبه ريش ابيض . ج كسع يقال حمام اكسع .

١٩٦٩ - إكسور اطلب مغريب .

١٩٧٠ - إكسوس صيني Yxos Sinensis (S).
Yxos de Chine (F).

طائر غريب من الجواثم سنيات المناقير ينتمي الى فصيلة الكميقيات . موطنه يمتد من الصين الى بورنيو . يألف البراري والادغال . ملجئه الحيائي جماعي . افواجه قليلة العدد الذي يراوح من ١٠ الى ٣٠ زوجاً . قوته الحشرات والبروز البرية والحبوب والثمار اليانعة || جسمه صغير النقد يطول نحو ١٧ سم . ثوبه العلوي الى الشقحة المسنجة بالاسود . جبهته وقفنه ومخسراه وجناحاه وذنبه الى السمرة السوداء . صدره وبطنه الى الغبرة . ذنبه معتدل القد ، مفلوق الطرف || يدثن عشه في الادغال على ارتفاع يراوح

١٩٤٩ - أكر Acre
مقياس مساحي ، يستعمل في انكلترا والولايات المتحدة ، يعادل ٤٠ آر ونصف الآر اي ٤٠٥٠ م ٢ او ١٦٠ قسبة انكليزية مربعة او ٤٨٤٠ ياردة مربعة او ٤٣٦٥٠ بوصة مربعة .

١٩٥٠ - إكترار Hélotrope
اطلب هليوتروب .

١٩٥١ - إكترالية * Aposphaeria (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصغبيات ، انواعه عديدة قليلة الأذى تعيش باكثريتها على اللحاء والاعضاء الخشبية . يتميز بغلاظة بكنيده الذي يتكون وينمو داخل القشرة ثم يرقى حتى البشرة فيسبب انتفاخها وانفجارها اعرف واشيع انواعه اكرالية التفاح .

١٩٥٢ - إكترالية التفاح * Aposphaeria pomi (S).
فطر يركب ثمار التفاح والاصاص المحفوظة فيعفنها ويهرها مظهره الخارجي بقع مبعثرة طحلاء اللون صفيرة الحجم تمتد وتنتشر بسرعة فتسبب انكماش وتجميد البشرة ثم انحراف لونها الى السمرة والسواد .

١٩٥٣ - إكتراه ، ضغط Contrainte (F).
Constrained, Forced, Affected (E).
هو حل المرء على ان يعمل او لا يعمل تحت تأثير شديد يسلبه حرية ارادته .

١٩٥٤ - أكرون Acron (F). Acron (E).
الأكرون الطرف الامامي من الجسم عند الحيوانات متماثلات الاجزاء . اما الطرف الخلفي فيدعى تلسون .

١٩٥٥ - أكرونيكتا درامة Acronycte lièvre (F).
حشرة تدعى عسقودة درامة ، اطلبها .

١٩٥٦ - أكرونيكتا هزيلة Acronycte décharnée (F).
حشرة تدعى عسقودة هزيلة ، اطلبها .

١٩٥٧ - أكريبتول Acryptol
ماكون زراعي سائل التركيب يرتكز على زيت القطران يستعمل محلولاً بالماء بمعدل ٦ ٪ في مكافحة الشتوية للقضاء على مكن الحشرات من اي نوع كانت .

١٩٥٨ - أكريسيد Acricide
حاشور زراعي يحوي ٢٥ ٪ من مادة هكزاكلورو - سيكلوهكزان اي ما يربو على ٣ ٪ من الايزوبير غاما . وهو مسحوق اغبر اللون يستعمل تعفيراً او مزوجاً مع النخالة المرطبة بالماء || ويستعمل في مكافحة الجراد والجنادب والنمل والديدان بمعدل ١٥٠٠ غ للأنم الواحد .

١٩٥٩ - إكزام Exam
حاشور زراعي يرتكز على مادة الليندان ، يستعمل اما تعفيراً على النبات بمعدل ٢ كيلو للأنم الواحد اما سائلاً محلولاً ١.٢٥ ٪ .

١٩٦٠ - إكزام نحاسي Exam cuprique



إكرالية



إكرالية التفاح



إكس شرقي



إكسوس صيني

من مترين الى ثلاثة امتار . الانثى تحضن بمنابرة الذكر من ٤ الى ٦ بيضات || يألف حياة الاسر وقد يجاري البلبل في التفريد .

١٩٧١ - أكسيات ° Axiidae, Cimeliidae (S). Axiidés, Cimeliidés (F). Axiidae, Cimeliidae (E).

فصيلة حشرات فراشية من رتبة حرشفيات الاجنحة . اجناسها المعروفة خمسة جميعها من حشرات حوض البحر الابيض المتوسط || اجسامها صغيرة ، قضيعة ، وشعبة الشكل . رؤوسها معتدلة الجرم . عيونها صغيرة . قرونها الاستشعارية مشطية مزدوجة عند الشقين . ملاسها قصيرة منفرجة الزوايا . مراشها متوسطة الطول . بطونها سفيفة الزغب . حذقاتها صغيرة تقع على جانبي السككة البطنية السابعة . رواشها متوسطة الحجم ، جملونية الاسر سال عند الراحة ، الامامية منها مزخرفة متراكبة الالوان ، اما الخلفية فوحيدة اللون . جرامزها تامة النمو . ظنايبها الخلفية مجهزة بمناخس مستطيلة || اساريها مفضنة ، متقبضة ، مثعلمة . خادراتها ملحونة بفيالنج بيضية الشكل ، متينة النسيج الناعم .

١٩٧٢ - أكسيّة مرغريت °

Axia margarita, Cimelia margarita (S).
Axie marguerite, Cimelie marguerite (F).
Axia margarita, Cimelia margarita (E).

حشرة من فصيلة الاكسيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها بعض اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط . فراشها جارة قوتها رحيق الازهار . سرفتها خاضعة تعيش على اوراق الفربيونيات || جسمها صغير قضيف يطول نحو ١٠ مم . بسطها تراوح من ٢٨ الى ٣٠ مم . رأسها معتدل الجرم حنطي اللون . عيناها كبيرتان . زباناها مشطيان مزدوجان عند الشقين . جوشها حنطي اللون . بطنها اصفر . روشناها الاماميان الى الوردي تعلوه بقعة طرفية كبيرة صفراء وبقعة وسطى فضية وبقعة قاعدية صفراء مذهبة . روشناها الخلفيان الى البياض العاجي القديم الدنس || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في ايار وتبقى حتى حزيران وتظهر فراشة الجيل الثاني في آب وتبقى حتى تشرين الاول . تسرح في الليل . تعاظم بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع . تمتح الممكن لطخاً تلففها مادة غروية تثبتها على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة عند بلوغها الكمال الجسموري تطول نحو ١٨ مم . جسمها مفضن مثعل ، اطحل اللون اسمر الموج . رأسها مكور ، احمر . مدبها الى الطحلة . رواجبها الى السمرة || طور الاكمال يستمر نحو ١٥ يوماً وينقضي ضمن صلجة مثينة النسيج تحببها السرفة تحت الاوراق والفضبان والاشخاب التي تلامس التربة .

١٩٧٣ - أكسيجن ، أكسيجين ° Oxygène (F). Oxygen (E).

ويدعى مولد الحموضة ، جسم بسيط غازي عادم اللون والرائحة والطعم . رمزه (O) وزنه الاتومي ١٦ وزنه اللاري ٣٢ . يكثر في الهواء ويمتزج بمعظم الاجسام البسيطة . قليل الذوبان في الماء . نسبة وجوده في الجو تقارب خمس حجم الهواء || فوائده عديدة واستعماله الصناعي واسع الانتشار .

١٩٧٤ - أكسيجيروس ° Oxygyrus (S). Oxygyre (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل اللامتجانسة وفصيلة الاطلنطيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بحار البلاد الحارة . جميعها يمة لا تقرب الشطوط || اصداها بوقية محلزة نحيلة مستعرضة السقاط الشفاف المثلث الزوايا .

١٩٧٥ - أكسيد ، أوكسيد ° Oxyde (F). Oxid, Oxide (E).

هو المادة الناتجة من اتحاد بعض العناصر بغاز الاكسيجن او بالاكسيجين الموجود في الهواء . وهذه العملية تعرف بالتأكسد . والاكاسيد على نوعين منها ما يتكون من اتحاد المعادن بالاكسيجن وتسمى اكاسيد قلووية مثل اكسيد الكالسيوم ومنها اكاسيد حمضية وهي التي تتكون من الاتحاد بغير المعادن مثل الكبريت ، فاذا وضعت في الماء يكون لها طعم لاذع .

١٩٧٦ - أكسيد الكربون ° Oxyde de carbone (F). Carbon oxide (E).

غاز لا لون له ولا رائحة يحترق فيولد غاز الكربون .

١٩٧٧ - أكسيلوب ، أكسيلويوم ° Oxylobium (S). Oxylobe (F). Oxylobium (E).

جنس نباتات ترينية من فصيلة القرنيات الفراشية . منبتها استراليا . انواعه الزراعية المعروفة لا تقل عن الثمانية . جميعها جنات رجنيات متقابلة الاوراق البسيطة . ازهارها عشكولي التجميع ابطي او طرفي الارتكاز . ازهارها مختلفة الالوان الزاهية || تنكأثر بالزور والعقل . تجود في جميع الاثربة ، تختلئ المواقع الرطبة الباردة .

١٩٧٨ - أكسيلية عتيقة °

Axylla vetusta, Calocampa vetusta (S).
Axyllie vétuste (F). Axylla vetusta (E).

فراشة مبدولة من فصيلة النسقيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اروبة وافريقية الشمالية . فراشها تجوب البراري والاحراج قوتها مغثر الازهار . سرفتها تعيش على اوراق النباتات الحولية والمحولة || جسمها كبير القدر يطول نحو ٢٣ مم . بسطها تراوح من ٥٦ الى ٦٠ مم . رأسها صغير الجرم . عيناها كبيرتان ناشزان . زباناها مشطيان عند الذكر ، خيطيان عند الانثى . مرشفا معتدل الجرم والطول . جوشها ويطنها الى الحنطي الاشقمع الموج . روشناها الاماميان الى الحنطي يعلوه تمشيع اسمر وتبضيع اغبر وطوق حناري اسود . روشناها الخلفيان الى الحنطي الاشقمع الموج ينتهي بختار اغبر . اهدابها ثبينة || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في آب وتبقى حتى نيسان . تسرح في الليل || السرفة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ٤٥ مم . جسمها اسطواني الشكل ، اطحل اللون يعلوه تجذيع معترض جزوي . رأسها اسمر ، مدبها اغبر ، رواجبها الى السمرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي في التربة حيث تنغم السرفة على عمق ٦ سم . ملتصقة بجلباب من الطين .

١٩٧٩ - إكسين ° Exine

هو غلاف الجذرة الخارجي الذي يغطي الأنثين .



اكسيّة مرغريت



أكسيجيروس



أكيلوب



اكسيلية عتيقة

١٩٩٣ - آكلات النمل ، ناملات °

Myrmecophagidae (S). Myrmecophagidés, Fourmilliers (F). Myrmecophagidae, Ant-eaters (E).
فصيلة حيوانات من رتبة الدرد الحشرية قوتها النمل .

١٩٩٤ - آكلات الورق ، خاضيات °

Phyllophages, Phytophages, Mélolonthidés (F).
Phyllophagous, Phytophagous, Melolonthidae (E).
هي الحشرات المضرّة من أي نوع كانت تركب أوراق النبات وزعماته فتقرضها وتؤذيها .

١٩٩٥ - إكلّاس °

Chaulage (F). Liming (E).
هو اصلاح التربة بالكلس . فوائده التي يحققها في التربة مع الادوار الرئيسية التي يهيمن عليها فوجزها بما يلي :
(١) يخفف صلابة التربة الطينية واندماجها ويؤهلها لزيادة استيعاب الماء ولنشاط البؤرة الجرثومية ؛ (٢) يفيد انسجام التركيب الغذائي لان نسبته الغذائية تراوح من ١ الى ٤ ٪ ؛ (٣) يدمل التربة باعماله التحليلية العضوية وينشط الترجمة ويقودها الى التمثيل ؛ (٤) يذكي قوة الامتصاص وهي خاصة في التراب تجعله يحتفظ بين ذراته بأكبر كمية ممكنة من العناصر الغذائية البوتاسية والأمونيكية .

١٩٩٦ - آكلّة °

Chancre (F). Chancre, Canker (E).
اسم شامل يطلق على عدة امراض نباتية ناجمة عن فطور مجهرية مختلفة || مظهرها الخارجي قرحة في اللحاء تمتد الى الشكير وتغور في الخشب || وصفها وطرق مكافحتها مذكورة مع المرض الذي يسببها .

١٩٩٧ - آكلّة ، أكلان ، هرّشان °

Prurigo (F).
مرض جلدي يعترى البقر .

١٩٩٨ - آكلّة التفاح °

Chancre du pommier (F).
اطلب هدكة حنطية .

١٩٩٩ - آكلّة الحور °

Chancre du peuplier (F).
اطلب هدكة قرمزية .

٢٠٠٠ - آكلّة الزان °

Chancre du hêtre (F).
اطلب هدكة سوداء .

٢٠٠١ - آكلّة الصنوبريّات °

Chancre des conifères
اطلب هدكة صنوبرية .

٢٠٠٢ - إكليل ، أطرة °

Couronne (zoot.) (F).
من اعضاء الفرس . اكليل الحافر وهي بين الرسغ والحافر .

٢٠٠٣ - إكليل °

الإكليل منزل من منازل القمر البانية . وهو رأس العقرب . ويتألف من ثلاثة انجم زاهرة مصطفة معترضة . رقيب الاكليل يدعى الثريا .

٢٠٠٤ - إكليل الجبل ° ، حصا البان ، ندّى

البحر ، قيرمانا Rosmarinus officinalis (S).
Romarin, Encensier (F). Common rosemary, Old-man (E). Echter rosmarin (D). Rosmarino, Rame-rino, Tresmarino (I).
نبات عطري طبي معمر عرووي دائم الاخضرار . من فصيلة الشفويات . وهو جنبة صغيرة شابة مخشوشة الساق دقيقتها . اوراقها متقابلة لسنة ضيقة كثيفة . ازهارها

١٩٨٠ - أُكْسِين °

Auxine
مادة نباتية لها تأثيرها المباشر على الجهاز الحليوي من حيث الاستطالة والضخامة والتكاثر .

١٩٨١ - أُكْشُوث °

Cuscuta (F). Dodder (E).
اطلب كَشُوث وهو نبات طفيلي لا ورق له سر الطعام جداً . يقال ان نقيعه عجيب لليرقان وانه يدر البول والحيض وينفع من المغص .

١٩٨٢ - إكْعَال ° ، كَعْل °

Métamorphose (F). Metamorphosis (E).
هو التغير من شكل الى شكل آخر . وهو التحول الشوزي الذي يحل بالاسماك وبالحشرات عند خلودها العذري بعد اكتمال دورتها الحياتية الاولى .

١٩٨٣ - أُكْعَل ° ، كَعْل °

Métamorphoser (F).
To metamorphose, transform (E).
غير طبيعة الشيء او شكله .

١٩٨٤ - آكل °

Corrodant (F). Corroding (E).
هو كل حامض او مادة اكلة تقرض المعادن .

١٩٨٥ - آكل العسل °

هو الراتل : حيوان من السرعويّات .

١٩٨٦ - آكل النطاط الأنمر °

Locustella tachetée (F).
هو الشندل الأنمر ، اطلبه .

١٩٨٧ - آكلات الثمر ، ثاميرات °

Frugivores (F).
Frugivorous (E).
هي الحيوانات او الحشرات من أي نوع كانت تأكل الثمار او قوتها الثمر .

١٩٨٨ - آكلات الحبوب ، حابيات °

Granivores (F). Granivorous (E).
هي الطيور من أي نوع كانت تفتدي بالحب . بعضهم يطلق عليها اسم حبيات .

١٩٨٩ - آكلات الحشرات ، حاشرات °

Insectivores (F). Insectivorous (E).
هي الحيوانات والطيور والدويّات من أي جنس كانت تقتس الحشرات .

١٩٩٠ - آكلات الخشب ، خاشبات °

Xylophages (F). Xylophagous (E).
هي الحشرات من أي نوع كانت تفتدي من الياف النبات الخشبية حية كانت او ميتة .

١٩٩١ - آكلات الكرّوم ، جافنات °

Ampelophages (F). Ampelophagous (E).
الحشرات من أي نوع كانت تقضم وتقرض الكرمة .

١٩٩٢ - آكلات اللحوم ، لاحمات ، لواحم ، لحيمات

Carnassiers, Carnivores, Fauves (F). Carnivorous, Flesh-eating, Fallow-deer, Fawn-coloured (E).
رتبة من الحيوانات الثدييات عديدة الفصائل والاجناس والانواع . أشهر فصائلها : السنوريّات والكليبيات والضبعيات والزباديات الخ .



أكشوث



أكلة



إكليل الجبل

الهند وفي المناطق الامريكية الجنوبية الحارة . يقال انه يحوى خاصية حل عقدة اللسان لذلك يعطونه للاطفال الذين يتأخرون بالنطق فيلوكونه ويمضغونه وهو يستعمل في المستحضرات الطبية ضد فساد الدم .

٢٠١٢ - **أكْمَة** Aveugle de naissance (F). Blind from birth (E).
نمت تعريفي يطلق على من كان عادم البصر خلقة .
راجع كنه وطلبس .



إكليل الملك

٢٠١٣ - **أكْمَة** Achaine (F). Achene, Achenium (E).
هي كل ثمرة يابسة مطبقة وحيدة البذرة اللامتنصة بغلافها كالبندقة واللوزة ... راجع ثمرة فقيرة .

٢٠١٤ - **أكْوَارِيوم** Aquarium
هو حوض أو أناء كبير الحجم يملأ ماء وترى فيه الاسماك أو النباتات المائية .

٢٠١٥ - **أكْوَبَة** Aucuba japonica (S).
Aucube du Japon (F). Japan laurel, Gold leaf plant (E). Goldorange (D). Aucuba, Foglio dorata (I).
جنية تريينية معمرة من فصيلة الشؤميات . مهدا اليابان .
ساقها مستقيمة ، اغصانها شاعبة ترتفع نحو المتر . اوراقها دائمة ، ملساء النصل ، لونها الى الخضار القاتم الموشم بعدة نقط صفر . وهذه الاوراق معنقة بيضية مستطيلة مشرفة . ازهارها ثنائية المسكن صغيرة عذقية ابطية وقاجية ، قصيرة الزناد مقطوعة الكأس الرباعية الغرف ، رباعية البتلات والاسدية وحيدة الميسم والمدقة || تستعمل للتزيين . تعيش في الاصيص والمركز منها بلغ عمرها . تخشى الاماكن الباردة . تكثيرها يكون بالتعقيل والتشكير .

٢٠١٦ - **أكْوَرُكْس** Accorox
حاشور زراعي يحوى ٥٠٪ د.د.ت. وهو مسحوق ناعم اغبر اللون قابل الذوبان في الماء . يستعمل محلولاً بالماء بنسبة ٥ ٪ في مكافحة أكثر الديدان وانحصها دودة الثمر وقاطوع العنب وديدان الملفوف والبندورة والبطاطا والشوندر والتبغ ... ويستعمل تعفيراً بمعدل ٣ كيلو للدم .

٢٠١٧ - **إكْوَرُسُول** Ecorsoil
ماكون زراعي سائل التركيب يرتكز على زيت القطران . يستعمل محلولاً بالماء بمعدل ٦ ٪ في مكافحة الشتوية للقضاء على مكن الحشرات من اي نوع كانت كما يستعمل ضد بعض الامراض الفطرية .

٢٠١٨ - **أكْوَمَاس** * Acomas
جنية برية طيبة من فصيلة البكاسميات . مهدا المناطق الحارة الامريكية . اوراقها متقابلة معنقة ، بيضية الشكل مسننة الحافة لونها الى الخضار القاتم . ازهارها عنقودي التجميع تاجي الانتكاز . ازهارها غبراء اللون منتصبه صغيرة الحجم قصيرة الرجيلة عديدة البتلات الافقية الانتشاب كثيرة الاسدية وحيدة الميسم غليظة المدقة || تستعمل في علاج الامراض المهبيلة والتناسلية .

٢٠١٩ - **أكْوَيْت** * ، **أكْوَيْطُن** ، **بيش** ، **أنثله** Aconitum (S). Aconit (F). Aconitum, Aconite (E).
جنس نباتات عشية معمرة سامة من فصيلة الخوذانيات منتشرة في جميع الاصقاع والاقاليم ، انواعها عديدة اشهرها واعها بيش البهر أو قاتل النمر || وهي نباتات جنية

فردى أو ثنائى التجميع ابطى الانتكاز . ازهارها جميلة اللون الازرق وافرة الرحيق تجرسها النحل || بعد من الافاويه . خواصه الطبية عديدة . نقيع ازهاره ناعوظ معروف . يستخرج من ازهاره واوراقه عطر عزيز شائع الاستعمال || يتكاثر بالبذر والتعقيل والترقيد . تبذر مشاتله في اذار وتغرس عقله في كانون وشباط || يعيش ويحوى في جميع الاثرية الزراعية لكنه يخشى الرطوبة المستحكمة .

٢٠١٥ - **إكليل الملك** * ، **عَرَّار قَيْصَرِي** Fritillaria imperialis (S). Fritillaire impériale, Couronne impériale (F). Crown imperial, Crown imperial fritillary (E). Kelzerskroon (D). Giglio regio, Corona imperiale (I).
نبات يصلي من الزليقيات يزرع للتزيين يعلو نحو ١٠٠ سم . ازهاره عشكولي التجميع يرتكز على شمراخ اجوف املس مستطيل . ازهاره متدلية جرسية الشكل جميلة القلب لونها الى الحمرة البودية ومنها ضروب صفراء اللون وبعضها حنطى مرقوش بالابيض || يزرع كسائر انواع الزنبق ويزهر من نيسان الى ايار . ازهاره فواحة العرف المستهجن الرائحة . عصارته سامة .

٢٠١٦ - **إكليل جنوبي** Couronne australe (F).
Corona australis (E).
الإكليل الجنوبي كوكبة نجوم جنوبية الموقع مركزها تحت برج الرامي ، تظهر في اوائل تموز || عدد نجومها ثلاثة عشر . بعض نجومها من المرتبة الخامسة . ومن العرب من يسمي هذه الكواكب « القبة » لاستدارتها ومنهم من يسميها « ادحى النعام » وهو عشه لانها على جنوب النعامين الصادر والوارد .

٢٠١٧ - **إكليل شمالي** Couronne boréale (F).
كوكبة نجوم شمالية الموقع تدعى الفكّة ، اطلبها .

٢٠١٨ - **إكليل شوكي** * ، **فَرْيُون بَهِي** Euphorbia splendens (S). Euphorbe splendide (F).
Crown of thorns (E). Euforbo lattaria (I).
نوع من الفرييون وفصيلة اليتويعيات وهو جنية شائكة برية وزراعية تريينية . منبها أكثر الاقاليم الحارة من حوض البحر المتوسط . ترغب في المواقع المعرضة للجنوب . تعيش في جميع الاثرية لكنها تخشى الرطوبة || ازهارها جميلة الشكل لونها الى الحمرة القرمزية || تتكاثر بالعقل ولا تغرس النقلة الا بعد انقطاع حوضها وجفاف جرحها . وهي تعيش وتجد في المراكن والقصع .

٢٠١٩ - **إكْمَاح** ، **إكْمَاح** ، **تَقْطُن** Débourrement, Efflorescence (F).
هو تحرك الزيمات للاوراق . يقال اكح الكرم اذا تحرك للاوراق . واكسحت الزيمة اذا ابيضت وخرج عليها مثل ندف القطن .

٢٠١٠ - **أكْمَة** Colline, Monticule, Butte (F).
Hill, Hillock, Knoll, Mound (E).
تل أو مكان ارفع من الرابية واعرض ظهراً .

٢٠١١ - **أكْمَلَة** ، **أَبْجَدِيَّة** Acmeila (S).
Acmeila, Abécédaire (F). Alphabet plant (E).
Fleckenblume (D). Acmeila (I).
نبات بري عشبي حولي من فصيلة المركبات . يوجد في



إكليل شوكي



أكربة



أكوماس

٢٠٢٥ - أكيدنيا*، إيكى دنيا، مُشملة يابانية

Eriobotrya japonica (S). Bibacier, Bibassier du Japon, Néflier du Japon (F). Loquat, Japan medlar (E). Japanische mispel (D). Nespola del Giappone, Pruno de Giappone (I).

شجرة مثمرة من فصيلة الورديات سبط الاجاصيات. مهدا اليابان وقد انتشرت زراعتها وعت جميع البلاد المعتدلة الحرارة. وهي شجرة ائشة متوسطة الارتفاع مستديرة القمة، جذورها عمودية، جذعها قصير، ساقها منتصبه، افنادها وافنادها كثيرة. اوراقها معنقة اذينية كبيرة الحجم مستطيلة رحية جلدية مسنة، سطح نصلها العلوي اخضر ارمد والسفلي بحري اللون يكسو الزغب || ازهارها عنقودي التجميع، ازهارها قصيرة الزناد وردية اللون || ثمارها كروية او يرمية الشكل لحية مأكولة اللب || زراعتها مبذولة على الشاطئ* اللبناني حيث يوافقها الاقليم. وهي تحشى المعارض الجنوبية الشديدة الحرارة والمواقع الرطبة والأتربة الطينية المندجة || تتكاثر بالبذر والتطعيم. تزرع انباقاً او مخمسات بابعاد بينية تراوح من ٦ الى ٨ امتار. ومن المستحسن تطعيم الاكيدنيا على الزعرور في الاراضي الخفيفة الجافة وعلى الاجاص في الاراضي الخصبة العميقة الغور وعلى السفرجل في الاراضي الرطبة القدر اما ضرورها فعديدة نخص منها بالذكر :

الضرروب البلدية وعددها سبعة

اكيدنيا الابيض، مستكاوي، رازبان الشجرة متوسطة انقد وافرة المحصول مبكارة ثمارها تدرك عند منتصف نيسان. الثمار كبيرة الحجم بيضية الشكل لونها الى البرتقالي الاصفر. لها سميكة غزير العصارة لذيد النكهة. نواها من ٢ الى ٣.

اكيدنيا الاجاصي

الشجرة متوسطة القد، جيدة المحصول الذي يدرك في العقد الثالث من نيسان. الثمار اجاصية الشكل لونها الى الصفرة لها سميكة غزير العصارة الحلوة لذيد الطعم والنكهة. نواتها فردية كروية صغيرة.

اكيدنيا الاحمر، باكير

ان شجرة كبيرة القد وافرة المحصول، مبكارة ثمارها تدرك في العقد الاخير من اذار. الثمرة كبيرة الحجم لونها الى البرتقالي العايق. لها اصفر اللون سميكة غزير العصارة مستحب النكهة. نواها من ٢ الى ٤.

اكيدنيا الاصفر، خوري

الشجرة متوسطة القد وافرة المحصول ثمارها تدرك في العقد الاول من نيسان. الثمرة كبيرة الحجم لونها الى الصفار الناري. لها اغبر سميكة غزير العصارة لذيد النكهة. نواها من ٣ الى ٢.

اكيدنيا الخضري

الشجرة كبيرة رقيقة متوسطة المحصول ثمارها تدرك في العقد الثاني من ايار. الثمرة كبيرة الحجم بيضية الشكل لونها الى الخضار الزاهي يعلوه موج اصفر. لها ابيض اللون سميكة جامد لذيد الطعم والنكهة. نواها من ٢ الى ٣.

اكيدنيا العادي

الشجرة متوسطة القد وافرة المحصول ثمارها تدرك في ايار. الثمرة كروية الشكل صغيرة الحجم لونها الى الصفار الناري. لها اغبر اللون قليل السماكة والمصير. نواها من ٣ الى ٤.

الجذور غليظتها، طويلة الساق التي يبلغ ارتفاعها نحو المتر. اوراقها ريشية معنقة متعاقبة لونها الى الخضار القاتم. ازهارها عنقودية التجميع، محورية وهامية الارتكاز كثيرة الانوان من اليلكي والازرق الى الاحمر بعد الابيض. عصارتها تحوي على سم زعاف تزداد فاعليته مع حرارة الاقليم || يستخرج منها مادة قلووية تدعى اكونيتين (Aconitine) تستعمل طبياً ضد الامراض العصبية والصداع... || اشهر انواعه الطبية والزراعية ما يلي.

٢٠٢٠ - أكونيت أحجن*

Aconitum uncinatum (S). *
Aconit d'Amérique (F). Monk's-hood, American wolf's-bane (E). Amerikanischer sturmhut (D). *Aconito d'America* (I).

نوع من الاكونيت، مهدا البلاد الامريكية. يزرع للزينة. ازهاره جميلة المنظر منعطفة الارتكاز || يتكاثر بالبذر يفضل الأتربة المتوسطة الاندماج الننية بالعنصر الكلبي.

٢٠٢١ - أكونيت أسود

Aconit anthora, Maclou
اطلب أنتله سوداء.

٢٠٢٢ - أكونيت خالق الدئب*

Aconitum luteum, *
A. lycoctonum (S). *Aconit tue-loup*, *Etrangle-loup* (F). Dog's-bane, Wolf's-bane (E). Gelber sturmhut, Wolfs-gift (D). *Aconita luparia*, *Erba della volpe* (I).

نوع من الاكونيت البري والزراعي، ازهاره جميلة صفراء اللون. ازهاره يدوم نحو الثلاثة اشهر. يتكاثر بالبذر. يرغب في الأتربة المعتدلة الاندماج يحشى المواقع الجنوبية الكثيرة الاشعاع الشمسي.

٢٠٢٣ - أكونيت هرمي*

Aconitum napellus (S). *Aconit napel*, *Napel*, *Casque de Jupiter*, *Char de Vénus*, *Capuchon de moine*, *Tue-loup bleu* (F). *Aconite*, *Helmet flower*, *Monkshood* (E). *Echter sturmhut*, *Wolfs wurz*, *Heimblom* (D). *Aconito napello*, *Carro di Venere*, *Erba luparia* (I).

اشهر انواع الاكونيت منه البري والزراعي. ينبت طبيعياً في الاماكن الظليلة والمواقع الرطبة. اوراقه وازهاره وجذوره وافرة المادة القلووية التي تجعله من النباتات الطبية || ازهاره الى الزرقة الشديدة، ازهاره هرمي الشكل يدوم من تموز الى تشرين || يتكاثر بالبذر كجميع انواع الاكونيت. وتغرس الشتول في مستقرها عند اواخر حزيران || وهو من النباتات التي ترغب في الأتربة الطينية الجصية المتوسطة الاندماج والرطوبة والتي لا تتعرض كثيراً لأشعة الشمس.

٢٠٢٤ - أكونيت هلهل*

Aconitum ferox (S). *Aconit féroce*, *Aconit d'Inde* (F). Indian aconite, Bikhpoison (E). Indische aconitknollen (D). *Aconita d'India* (I).

هو اسم انواع الاكونيت واغناها مادة قلووية. مهدا بلاد الهند وقد عمت زراعته جميع البلاد الحارة والمعتدلة || ازهاره جميلة الشكل ليلكية اللون || وهناك انواع زراعية تزيينية أخرى، منها :

Ac. rubicundum (S).

الاكونيت الاحمر

Ac. autumnale (S).

الاكونيت الخريفي

Ac. cammarum (S).

الاكونيت السرطاني

Ac. variegatum (S).

الاكونيت الموشم

Ac. japonicum (S).

الاكونيت الياباني



أكونيت أحجن



أكونيت خالق الدئب



أكونيت هرمي



أكونيت هلهل



أكيدنيا

ومهم من دعاها حشيشة الاسد في حين ان حشيشة الاسد هي نوع من الجعجيل يعرف أيضاً بالهالوك الريحي . الاكيلاجيا جنس نباتات عشبية نجمية معمرة برية وزراعية تزيينية من الحوذانيات وفصيلة الشقيقيات اوراقها معنقة ، كبيرة الحجم ، مفرصة ، لونها الى الاخضر البحري || ازهارها هامية الارتكاز ، متعددة الالوان ، جميلة الشكل ، فردية التجميع منعقفة نحو الارض || ترغب في الاماكن الظليلة وفي الاثرية المعتدلة التركيب المتوسطة الاندماج || تتكاثر بالبذر والتفصيل . تبذر في مشاتل رملية التربة من نيسان الى ايار وتنقل الى مستورها في الربيع المقبل اي بعد بذرها بعام واحد || اما الفسائل فتقطع وتغرس في اوائل الربيع وقد يجوز اقتطاعها وغرسها في الخريف || اشهر انواعها الزراعية ما يلي :

٢٠٢٨ - أكيلاجيا اولبية °
Aq. olympica (S).
Ancolie de l'Olympe (F).

٢٠٢٩ - أكيلاجيا جبلية °
Aq. alpina (S).
Ancolie des Alpes (F).

٢٠٣٠ - أكيلاجيا ذهبية °
Aq. chrysantha (S).
Ancolie dorée (F).

٢٠٣١ - أكيلاجيا زرقاء °
Aq. caerulea (S).
Ancolie bleue (F).

٢٠٣٢ - أكيلاجيا سيبيرية °
Aq. siberica (S).
Ancolie de Sibérie (F).

٢٠٣٣ - أكيلاجيا عطرية °
Aq. fragrans (S).
Ancolie odorante (F).

٢٠٣٤ - أكيلاجيا عقابية °
Aq. vulgaris (S).
Ancolie des jardins, Colombine commune, Aiglantine, Gants de Notre Dame
ضروبها عديدة والوانها كذلك وسها مكسبة الزهر الموشع بالازرق والابيض .

٢٠٣٥ - أكيلاجيا كندية °
Aq. Canadensis (S).
Ancolie du Canada (F).
جميع انواعها تستعمل للتزيين اما العقابية فزينة وطبية وهي معروفة ومدرة البول ومضادة للحفر .

٢٠٣٦ - آل °
Aal (F). Aal (E).
الآل شجرة وحيدة الجنس والنوع من فصيلة الراتنجيات منبتها بمض الجزر الهندية || لجاء سوقها وأغصانها من الافاوية تستعمل في تطيبب الخمر وبعض المأكول .

٢٠٣٧ - آل °
يقال آل القرس اذا نصب اذنيه وحددهما . وآل الصقر اذا ابي ان يصيد .

٢٠٣٨ - آلات زراعية °
Instruments agricoles (F).
Agricultural Implements (E).
الآلات الزراعية تشمل جميع الماكينات والمعدات الممكن استعمالها او استخدامها في الزراعة .

٢٠٣٩ - إلهة ، إلهة °
Cytogénie (F).
Cytogeny (E).
هي تناسل او تكاثر الحجيرات الحيوانية او الخلايا النباتية .

أكيدنيا الماوي

الشجرة متوسطة القد مظلية الشكل وافرة المحصول ثمارها تدرك في العقد الثاني من نيسان . الثمرة صغيرة كروية لونها الى البرتقالي الزاهي . لبها متوسط السمك كثير العصارة . نواها من ٣ الى ٥ .
وبن الضروب العالمية نخص بالذكر اعرفها وهي :

أكيدنيا ادفنس °
E. Advance
الثمره كبيرة الحجم اجاصية الشكل . لبها سميك سكري الطعم .

أكيدنيا آرونل °
E. Arronel
الثمره متوسطة الحجم كروية الشكل . لبها رقيق البشرة سميك وردي اللون سكري الطعم عطري الرائحة غزير العصور .

أكيدنيا برونل °
E. Brunel
الثمره كبيرة الحجم كروية الشكل . لبها سميك قوي البشرة اصفر اللون سكري الطعم عطري الرائحة . تتحمل الاسفار البعيدة .

أكيدنيا براون هول °
E. Brouwing Holl
الثمره كبيرة الحجم بيضيه الشكل تتحمل الاسفار البعيدة . لبها جامد سكري عطري .

أكيدنيا تاناكا °
E. Tanaka
الثمره كبيرة كروية برتقالية اللون تتحمل الاسفار البعيدة وتأخر في الادراك . لبها جامد اصفر اللون سكري الطعم .

أكيدنيا دون كارلوس °
E. Don Carlos
الثمره كبيرة كروية تتحمل الاسفار . لبها جامد اصفر اللون سكري الطعم عطر .

أكيدنيا سكولا °
E. Scola
الثمره متوسطة الحجم مستديرة تتحمل الاسفار . لبها اصفر اللون جامد . طعمها سكري لذيق النكهة .

أكيدنيا كنكا دورو °
E. Conca d'oro
الثمره متوسطة الحجم اجاصية الشكل ذهبية اللون تدرك باكراً وتتحمل الاسفار . لبها اصفر اللون ذكي الطعم السكري مستحب العرف .

أكيدنيا لوكات °
E. Lequat
الثمره متوسطة كروية ذهبية اللون بطيئة الادراك . لبها اصفر اللون سميك غزير العصارة لذيق الطعم . تحمل نواة واحدة .

أكيدنيا ليموجللو °
E. Limogello
الثمره كبيرة الحجم بيضيه الشكل ناعمة البشرة صفراء اللون . لبها لذيق الطعم غزير العصارة اغبر اللون .

أكيدنيا نربون °
E. Narbonne
الثمره كبيرة مستطيلة ناعمة البشرة برتقالية اللون . لبها اغبر اللون لذيق الطعم . نواها قليلة العدد صغيرة الحجم .

٢٠٢٦ - أكيسته فضية °
Elachiste argentée (F).
هي قوبعة النجيليات ، اطلبها .

٢٠٢٧ - أكيلاجيا °* ، أنكوليه ، كولمبين °
Aquilegia (S). Ancolie, Colombine (F). Columbine (E). Akelei (D). Aquilina, Amor nascosto (I).
سمها الامير مصطفى الشهابي « حوضية وزهرة الحوض »



أكيلاجيا

نصلها خيلي البشرة ، مسن الحافة . أزهارها جميلة ، كبيرة ، يغلب فيها اللون الوردي . ثمارها مأكولة لذيدة الطعم اهليلجية الشكل لونها الى الصفار التني .

٢٠٥٠ - **آلامية زرقاء** * ، **زهرة الآلام الزرقاء** ، **زهرة الساعة**
Passiflora coerulea (S).

Passiflore bleue, *Grenadille bleue*, *Fleur de la Passion* (F). *Common blue passion flower* (E). *Blau-passionsblume* (D). *Passiflora*, *Fiore della passione* (I).
 جنبه تزيينية عارشة معمرة تطول نحو ١٥ م . ضرورها عديدة . أوراقها عروية خماسية التفصيص ، نصلها عابق الخضار ، عنقها رباعي الغدد محجن الاذينات . أزهارها محورية الارتكاز عطرية الرائحة قطرها يراوح من ٦ الى ٨ سم . اسديتها الخيطية ثلاثية اللون ، المحورية منها أرجوانية والوسطى بيضاء اللون ، اما الخنارية فالى الزرقة الجميلة || أزهارها يستمر في فصلي الصيف والخريف .

٢٠٥١ - **آلامية غارية الورق** *
Passiflora laurifolia (S). *Passiflore à feuilles de laurier*, *Pomme llane* (F).
 جنبه عارشة معمرة متوسطة النشط . أوراقها غارية الشكل . أزهارها كبيرة القد ، جميلة اللون الزاهية المتراكبة ثمارها بيضية صغيرة الحجم ، لونها الى الصفار الكبيري جذورها طيبة تحوي بعض المواد الجحالية الفعالة .

٢٠٥٢ - **آلامية لسيئية** *
Passiflora ligularis (S). *Passiflore ligulée* (F). *Sweet granadilla* (E).
 جنبه عارشة معمرة شديدة النشط تلحف مساحات كبيرة . أوراقها لافسية ، قلبية النصل المدب الزام الاخير . اذينات عنقها لسيئية الشكل . أزهارها كبيرة القد ، فصلها ويتلاتها خضراء اللون . اسديتها الخيطية بيض الانتشاب ، أرجوانية الاطراف || ثمارها مأكولة لذيدة الطعم اهليلجية الشكل لونها الى البرتقالي العابق .

٢٠٥٣ - **آلامية مأكولة** * ، **شرخ الفلك**
Passiflora edulis (S). *Passiflore comestible*, *Grenadille* (F). *Granadilla*, *G. vine* (E). *Granadilla* (D). *Granadiglia* (I).
 جنبه عارشة معمرة شديدة النشط تزرع لثمارها المأكولة . أوراقها ثلاثية التفصيص نصلها مسن الحافة . أزهارها بيض اسديتها الخيطية بيضاء الجسم ، أرجوانية القاعدة . ثمارها بيضية الشكل قدرها قدر بيض البط لونها عند النضج احمر أرجواني . || وهي من النباتات السبروتية التي تجود في جميع الآرية غير أنها تخشى الصقيع .

٢٠٥٤ - **آلامية مضلعة** *
Passiflora quadrangularis (S). *Passiflore à tige carrée*, *Barbadine* (F).
 جنبه عارشة معمرة متوسطة النشط . ساقها رباعية الاضلع . أوراقها كاملة قلبية الشكل . أزهارها وردية البتلات أرجوانية الاسدية الخيطية || ثمارها مأكولة بيضية الشكل ، كبيرة القد ، لونها الى الصفار الاخضر || جذورها طيبة تحوي بعض المواد الفعالة النافعة .

٢٠٥٥ - **ألب**
 Union
 راجع اتحاد .

٢٠٥٦ - **ألب**
 الالب شجرة شائكة كأنها شجرة الأترج . نباتها ذري الجبال وهي خبيثة يؤخذ خضبها واطراف افنانها فيدق رطباً ويقشبه به اللحم ويطرح للسباع (اللسان) .

٢٠٤٠ - **الآرية** *
Alaria
 جنس نباتات مائية من فصيلة اللسناريات ورقبة الخث السفح . موطنها شواطئ الاقيانوس الاطلسي والبحر المتوسط . يكثر وجودها في الشواطئ البريطانية || منها نوع ضلوعه سكرية الطعم مأكولة .

٢٠٤١ - **الآرية مأكولة** *
Alaria esculenta (S).
Alaria, *Alaire*, *Alarie* (F). *Bladder lock*, *Honeyware* (E). *Essbareer riementang* (D). *Alaria*, *Varecco* (I).
 نوع من الآرية تتميز بمشربتها الضخمة المتباينة الارتكاز الغليظة الضلع الرئيسية الوسطى . وصلعها هذه سكرية الطعم مأكولة .

٢٠٤٢ - **الإلغة** *
Algologie (F). *Algology* (E).
 الإلغة علم يبحث في ماهية الانغيات وتصنيفها وانتشارها .

٢٠٤٣ - **ألاف المروج** *
Coulevre d'Esculape (F).
 هو الخث الحنطي ، اطلبه .

٢٠٤٤ - **ألاف مشرط** *
Coulevre à échelons (F).
 هو الخث الاشقر ، اطلبه .

٢٠٤٥ - **إلالة** *
Automation (F). *Automation* (E).
 اسم يطلق على جميع الاساليب والاعمال الآلية .

٢٠٤٦ - **الآميات** *
Passifloraceae (S). *Passifloracées* (F). *Passifloraceae* (E).
 فصيلة نباتية من ذوات الفلقين العديدة القملات . أجناسها وأنواعها كثيرة العدد ، مهدا البلاد الامريكية منها البرية والتزيينية والطبية والمأكولة الثمار . جميعها عارشة معمرة جميلة الأزهار الكبيرة المستديرة المتعددة اللون .

٢٠٤٧ - **آلامية** * ، **زهرة الآلام**
Passiflora (S). *Passiflore* (F). *Passion flower* (E).
 جنس نباتات ليفية عارشة معمرة من فصيلة الآليات . أنواعها ١٨٠ معظمها بري وبعضها زراعي تزييني أو مأكول الثمار . أوراقها كفية ورية التفصيص الثلاثي أو الخماسي أو السباعي . أزهارها كثيرة الفصل والبتلات التي يراوح عددها من ٥ الى ٨ . اسديتها الخيطية كثيفة التجميع نعم كامل سطح الزهرة . مآبرها المخصبة خماسية . سماتها ثلاثية التركيب مستطيلة . ثمارها بيضية الشكل . بزورها مختلفة الاشكال يكثر فيها الاسطواني || اشهر أنواعه المأكولة والتزيينية ما يتبع .

٢٠٤٨ - **آلامية أرجوانية** * ، **زهرة الآلام الحمراء**
Passiflora incarnata (S). *Passiflore incarnat* (F). *Wild passion flower*, *Maypop* (E). *Wilder passionsblume* (D). *Granadiglia incarnata* (I).

جنبه تزيينية عارشة معمرة تطول نحو ١٠ أمتار . أوراقها ثلاثية التفصيص ، نصلها مسن الحافة ، عنقها ثنائي الغدد . أزهارها الى البياض الوردي . اسديتها الخيطية أرجوانية يغلوها موج بنفسجي || أزهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

٢٠٤٩ - **آلامية تكسوسو** * ، **تكسو** *
Passiflora mollissima (S). *Passiflore molleuse*, *Tacso* (F).
 جنبه عارشة معمرة شديدة النشط . أوراقها ثلاثية التفصيص .



آلامية أرجوانية



آلامية زرقاء



آلامية غارية الورق



آلامية مأكولة



آلامية مضلعة

٢٠٥٧ - ألب

ألب الزرع : إذا صار فيه حب ولب .

٢٠٥٨ - إلباد

السعي لتوفير شروط الاستمرار والنمو في بيئة معينة .

٢٠٥٩ - ألبكا *

Lama pacas, Auchenia pacas (S).

Alpaca, Lama alpaca (F).

ضرب من الالامة وهو حيوان داجن مجتر من فصيلة الجمال . مهده جبال امريكه الوسطى . يشبه الجمال الصغير العديم السنام . موصوف بدقة وبره الناعم وجلالة صوفه اللدن الذي يبلغ طوله نحو ١٤ سم . || ثوبه يأتي على ثلاثة اشكال : الابيض الصوف والاسود الصوف والمرقش . يعيش قطعان كبيرة العدد . يربي من اجل وبره الذي يجز مرة في العام || الانثى اصغر قدراً وانحل جسماً من الذكر . وهي رباعية الاخلاف ، محبها يدوم نحو ٣٠٠ يوم ، نتاجها اعزل .

٢٠٦٠ - ألبوب

Amande (F). Almond (E).

هو الصلصام المأكول الذي يوجد في داخل نواة النبتة واللوزة الحلوة والمشمشة اللوزية الخ .

٢٠٦١ - ألبومين

Albumine (F).

Albumin, Albumen (E).

هو الآح والزلال .

٢٠٦٢ - ألبيزية

Albizia (S). Albizzia (F).

جنس نباتات سنفية من فصيلة القرنيات . انواعه ثلاثة قريبة الشبه من الاقاقيا والسنت . منبتها الاقاليم الحارة والمعتدلة . جميعها جنبات تزيينية فرعاء الهيكل ، فناء ، زباء ، قليلة الشوك . اوراقها ريشية ، معلاقية ، مستطيلة الوريقات || ازهارها عنقودي التجميع . ازهارها جميلة الشكل كأسها جرسية او انبوية مسننة ، تويجها قمى ، بتلاتها نصفية الاتحاد . ثمارها قرنية . سنفتها مستطيلة مستقيمة مقلطحة ذات مصراعين طليقين || انواعه الثلاثة هي :

٢٠٦٣ - ألبيزية أبوسن *

Albizia anthelminthica (S). Albizzia anthelminthique, Acacie à musenna (F). Albizzia, Anthelminthica (E). Musennarinde (D). Albizzia (I).

نوع من الالبيزية وهي جنبه برية طبية وزراعية تزيينية .

سنت ثمارها ولحاء سوقها وفروعها طاردة للديدان وتستعمل في بعض العلاجات المعوية .

٢٠٦٤ - ألبيزية الحرير *

شجرة الحرير ، سنط

استنبول

Albizia julibrissin (S).

Albizzia julibrissin, Arbre de soie, Acacia de Constantinople (F). Silk tree, Bastard tamarind (E). Orientalische akazie (D). Albero della seta, Gaggia aborea (I).

نوع من الالبيزية البرية والزراعية التزيينية . تتكاثر بالبذر وتعيش في جميع الارربة .

٢٠٦٥ - ألبيزية اللبسخ *

لبسخ ، ذقن الباشا

Albizia lebbek (S). Albizzia lebbek, Lebbek, Lébec-kie, Bois noir (F). Lebbek tree, Siris tree (E). Siris acacia, Lebek baum (D). Lebbek (I).

نوع من الالبيزية البرية والزراعية التزيينية . جميلة الشكل والازهار . تتكاثر بالبذر وتعيش في جميع الارربة .

٢٠٦٦ - ألبيني ، غلطي

Albien, Gault

ساف من الطبقة الطباشيرية مركزه فوق الأبناسي وتحت الساني .

٢٠٦٧ - آلة

Machine

كل اداة او جهاز صنعه الانسان ليقوم بعمل من الاعمال بحيث تخفض القوة اللازمة للقيام به حتى تصبح في حدود طاقة الانسان || لذلك يمكن القول هذه صناعة آلية اذا صنعت بالآلة وهذه صناعة يدوية اذا صنعها الانسان بيده .

٢٠٦٨ - إلتحاق ، إنضمام

Affiliation

هو الدخول في شركة او الانساب الى جمعية زراعية وما اشبه .

٢٠٦٩ - إلتحام

Coalescence (F). Coalescing (E).

انضمام والتحام اجزاء متجانسة .

٢٠٧٠ - إلتحام الأصابع

Palmature (F).

Web-footed (E).

هو التكفف اي التهام الاصابع بغشاء بينها .

٢٠٧١ - ألترفارية

Alternaria

جنس فطور مجهرية من عمارة الزخيات وفصيلة اللطحيات يعرف بالريضة (اطلب ريضة) .

٢٠٧٢ - إلتزام

Obligation

اصطلاح قانوني يقصد به ارتباط بين شخصين او اكثر . والنرض منه حصول منفعة لاحدهم بالزام . الطرف الآخر القيام او عدم القيام بأمر معين . وتنقسم الالتزامات الى انواع كالمقود وغيرها .

٢٠٧٣ - إلتصاق

Adhérence (F). Adherence (F).

صفة خاصة تتصف بها بعض الاتربة التي تلتصق ان قليلاً او كثيراً بالآلات الحث في اثناء عملها .

٢٠٧٤ - إلتصاق

Accession

راجع إتباع .

٢٠٧٥ - إلتصاق طبيعي

Accession naturelle (S).

Natural accession (E).

هو ما يحدث بغير فعل الانسان .

٢٠٧٦ - إلتصاق صناعي

Accession industrielle (F).

Industrial accession (E).

هو ما يحدث بفعل الانسان كتشيد بناء .

٢٠٧٧ - إلتصاق مفتعل

Accession artificielle (F).

Artificial accession (E).

الالتصاق المفتعل كالصناعي هو ما يحدث بفعل الانسان كغرس غراس او اقامة ابنة .

٢٠٧٨ - إلتقاء

Convergence

الايلولة او المال الى مركز واحد .

٢٠٧٩ - إلتقام ، قلس

Merycisme, Regurgitation (F). Regurgitation (E).

عملية ارتشاف الطعام من الغير بعد انتقاله من البطن الى الفم .

٢٠٨٠ - إلتهاب

Inflammation

عارض يصيب نسيج الاعضاء فيؤذيها اسبابه مختلفة وعواقبه ايضاً .

٢٠٨١ - إلتهاب الأذن

Otite (F). Otitis (E).

مرض يكثر في الكلاب سببه القمل والقراد .



ألبكا



ألبيزية ابوسن



ألبيزية الحرير



ألبيزية اللبسخ

- ٢٠٩٦ - إلتهاب الغُدَد اللَنفِيَّة
Phlegmasia glandulosa (S). Adénite (F). Adenitis (E).
علة عديدة الاسباب تحل بالغدد اللنفية فتضخمها وتقرحها وتقيحها .
- ٢٠٩٧ - إلتهاب الغشاء الزَلَالِي
Synovite (F).
Synovitis (E).
مرض يصيب الاعضاء في اغشيتها الزلالية فيسبب الورم والحرارة والوجع والرج .
- ٢٠٩٨ - إلتهاب الفم ، حُنَاك
Stomatite (F).
Stomatitis (E).
هو التهاب غشاء الفم .
- ٢٠٩٩ - إلتهاب الفَوْت
Fourchet (F). Foot-rot (E).
التهاب ما بين اصابع البقر وغيرها من الحيوانات ذوات الظلف . وهذا الالتهاب الذي يعقبه التورم يؤدي الى المرج وقد يمتد الورم الى الركبة والعقوب .
- ٢١٠٠ - إلتهاب القَرْنِيَّة
Kératite (F). Keratitis (E).
إلتهاب قرنية العين .
- ٢١٠١ - إلتهاب الكَلِيَّة
Néphrite (F). Nephritis (E).
يصيب الحيوانات الاهلية من ذوات الحافر والظلف . اسبابه عديدة اخصها اكل بعض الاعشاب ومنها السامة كما والبرد ...
- ٢١٠٢ - إلتهاب اللِّسَان
Glossite (F). Glossitis (E).
يحصل عادة من العلف الشائك القاسي . يصيب بنوع خاص البقر .
- ٢١٠٣ - إلتهاب المَثَانَةِ
Cystite (F). Cystitis (E).
ويعرف أيضاً بالتهاب المثن .
- ٢١٠٤ - إلتهاب المخ الشوكي في الخنزير
Encéphalomyélite infectieuse du porc (F). Encephalo-myelitis of swine (E).
مرض جرثومي وبائي يصيب الخنازير .
- ٢١٠٥ - إلتهاب المخ الشوكي في الخيل
Encéphalomyélite infectieuse du cheval (F). Encephalo-myelitis of horse (E).
مرض جرثومي وبائي يصيب الخيل .
- ٢١٠٦ - إلتهاب المَشِيْمَةِ
Choroidite (F).
Choroiditis (E).
التهاب يعترى مشيمة العين اي الطبقة الوعائية الثانية للعين .
- ٢١٠٧ - إلتهاب المعدة
Gastrite (F). Gastritis (E).
التهاب يحصل في غشاء المعدة المخاطي .
- ٢١٠٨ - إلتهاب المُلْتَحِمَةِ
Conjonctivite (F).
Conjunctivitis (E).
التهاب ملتحمة العين .
- ٢١٠٩ - إلتهاب المهْيَل
Vaginite (F). Vaginitis (E).
مرض يصيب الحيوانات الداجنة في مهبلها وقد يكون معدياً .
- ٢١١٠ - إلتهاب الهُرْب
Péritonite (F).
Peritonitis (E).
مرض يصيب الخيل . اسبابه عديدة منها الجراح والحصاء والوضع والبرد وأبتلاع الماء البارد . || عوارضه : ارتفاع في الحرارة ، ضعف في النبض ، نفخة في البطن ، لث في التنفس وتقويض في الظهر .
- ٢٠٨٢ - إلتهاب الأظرفة
Crapaudine, Peigne, Mal d'âne (F). Toadstone (E).
التهاب وتشقق في اظرفة حافر الفرس والبغل والحمار فيسيل منها مائع صديدي .
- ٢٠٨٣ - إلتهاب الإِمْعَاء
Entérite (F). Enteritis (E).
التهاب الغشاء المخاطي في الامعاء . يصيب جميع الحيوانات الاهلية . سببه البرد أو الغذاء السيء أو الصفر .
- ٢٠٨٤ - إلتهاب الثَّرْب
Epiplote (F). Epiplottis (E).
علة تصيب الثرب في مختلف اجزائه فتضيقه .
- ٢٠٨٥ - إلتهاب الجَفْن ، سَلَاق
Blépharite, Palpébrite (F). Blepharitis, Palpebritis (E).
علة تصيب جفن العين فتؤذيها وقد تسبب سقوط اهدابه .
- ٢٠٨٦ - إلتهاب الجِلْد
Dermatite (F).
Dermatitis (E).
علة في الجلد سببها الحلم وغيره من القراد تحث الحموان على الحكاك فيلتهب جلده .
- ٢٠٨٧ - إلتهاب الحَنَجْرَةِ
Laryngite (F).
Laryngitis (E).
التهاب يحصل في غشاء الحنجرة ويمتد غالباً الى البلعوم وقد يكون حاداً او مزمناً .
- ٢٠٨٨ - إلتهاب الرِّجْل
Crapaud (F). Greasy heel (E).
التهاب الفسج الحية في رجل الدابة . يبدأ في النسر ويمم الصحن وله رائحة كريهة .
- ٢٠٨٩ - إلتهاب الرِّئَةِ
Périlpneumonie (F).
Peripneumonia (E).
مرض سار يصيب البقر فيميتها . وقد نص القانون الفرنسي بوجوب ذبح الحيوان المصاب فور تشخيص المرض وتحديد من قبل الطبيب البيطري .
- ٢٠٩٠ - إلتهاب السَّحَايَا
Ménigite (F).
Meningitis (E).
مرض شديد العدوى يصيب الدواجن في سحايا الدماغ .
- ٢٠٩١ - إلتهاب الشَّعْب
Bronchite (F).
Bronchitis (E).
مرض يصيب بعض الحيوانات الداجنة اخصها الخيل والاعنام .
- ٢٠٩٢ - إلتهاب الشَّعَاف
Péricardite (F).
Pericarditis (E).
ويعرف أيضاً بالتهاب التأمور . مرض يصيب البقر وقد يأتي عن بلع جسم صلب كسلك حديدي وما اشبه .
- ٢٠٩٣ - إلتهاب الصَّحْن
Aggravée (F).
التهاب يحصل في الصحن وفي اظرفة الحافر عند الخيل وقد يصيب أرجل البقر والكلاب من فرط التعب .
- ٢٠٩٤ - إلتهاب الضَّرْع
Mammite (F).
Mammitis, Mastitis (E).
مرض يحل بضرع اناث الدواجن اخصها الابقار الحلوبة فيعطب اخلافها الواحد تلو الآخر اذا لم يتدارك المرض عند ظهوره .
- ٢٠٩٥ - إلتهاب العَضَل
Myosite (F). Myositis (E).
داء يصيب خيل السباق وغيرها وقد يكون حاداً او مزمناً .

تركب اوراق الكتان فتقضي عليها . اجيالها الحولية ثنائية .
يرقاتها مؤذية تركب الجذور وتسرد نجها .



ألتيز البقول

٢١٢٣ - ألتيز الكرمة* ، دُقْسَة الكرمة ، قد أن الكرمة
Haltica ampelophaga, H. lythri, Graptoderma ampe-
lophaga (S). Altise de la vigne (F). Mediterranean
grape leaf beetle (E). Welnerdfloh (D).

خنفساء من الألتيز طولها نحو ٤ مم ثوبها زبرجدي شديد
اللمعان . قوائمها الخلفية قوية تمكها من القفز . اجيالها
الحولية ثنائية . تمتح مكها على قشور واوراق الكرمة
فينتف عن يرقات تبغية اللون لا تلبث أن تسمر بعد بضعة
ايام . يرقاتها نهمة تقضم اوراق الكرمة وقد تقضي عليها
تكافح عند ظهورها باستعمال احد الحواشير الفعالة اخصها
المرتكرة على انزنيخات .



ألتيز التبغ

٢١٢٤ - ألتيز الملفوف* ، دُقْسَة الملفوف ، قد أن الملفوف
Haltica brassicae (S). Altise du chou (F).

خنفساء من الألتيز صغيرة القد . طولها نحو ٢ مم . ثوبها
الى السمرة العابقة يعلو كل من نحتها خطان مستطيلان
لونهما الى الصفرة . يرقاتها سمراء اللون تكتنفها خطوط
مستعرضة . طولها نحو ٥ مم تلهم اوراق الملفوف فتعيها
وتؤذيها .



ألتيز الزروع

٢١٢٥ - ألتيز زرقاء* ، دُقْسَة زرقاء
Psylliodes dulcamarae (S). Altise bleue (F).

خنفساء من الألتيز طولها نحو ٤ مم . ثوبها الى الزرق
البنفسجية الشديدة اللعان . تركب جميع نباتات الفصيلة
الباذنجانية اخصها البطاطا حيث تنغذي من اوراقها .
يرقاتها تتعدى على السوق وتنخرها .



ألتيز الكتان

٢١٢٦ - ألتيز* ألت المطر : دام اياماً لا يقلع .

٢١٢٧ - ألتشي ، ألتشي ، إستصمغ
Extraire la gomme (F). To extract gum (E).

استخرج صمغ الاشجار .



ألتيز الكرمة

٢١٢٨ - ألتجم
Brider (F). To bridle (E).

الجم الفرس : ألتسها اللجام وجعله في فها ولا يقال لجمها .

٢١٢٩ - ألتجين
Algine (F). Algin (E).

مادة مخاطية تستخرج من بعض الخشيات البحرية تستعمل
كوسيط في بعض صناعات النسيج وفي تليين الزيت المعد
لتغليط الطرق .

٢١٣٠ - ألتجينات
Alginate (F). Alginat (E).

مادة ليفية تستخرج من بعض الخشيات تنضد مع بعض
الايان النباتية اللدقة فينجم عن اتحادها مادة صناعية
قابلة الاستعمال والحياكة .



ألتيز الملفوف

٢١٣١ - إلتاق
Annexion (F). Annexation (E).

هو ضم الشيء الى غيره .

٢١٣٢ - إلتام
Brassure (F). Brewing (E).

الصاق الشيء بالشيء بواسطة النار .



ألتيز زرقاء

٢١٣٣ - ألدركس
Aidrex

حاشور زراعي يرتكز على مادة الالورين . منه انواع
عديدة تختلف باختلاف نسبة المادة الفعالة . يستعمل
تغذية على التربة للقضاء على السالول والندرة البيضاء .

٢١١١ - إلتهاب الوريد . Phlébite (F). Phlebitis (E).
مرض سي' العواقب يستلزم وجود الطبيب البيطري منذ
اللحظة الاولى || عوارضه الظاهرة قليلة لا يمكن الركون اليها .

٢١١٢ - إلتهاب الوعاء اللفاوي . Lymphangite (F).
Lymphangitis (E). التهاب يحصل في اسفل قوائم الخيل .

٢١١٣ - إلتهاب بطنانة القلب . Endocardite (F).
Endocarditis (E).

مرض يصيب الحيوانات المستة في النشاء المبطن للقلب .

٢١١٤ - إلتهاب رئوي بلوري في الابقار ، ذات الرئة
الحيطية . Périlpneumonie contagieuse des
bovidés (F). Paripneumonia contagious of bovid (E).

مرض سار عضال يوجب الحذر والحماية .

٢١١٥ - إلتهاب رئوي بلوري في الماعز ، ذات الرئة

السارية ، قصبة . Pleuropneumonie
contagieuse des chèvres (F). Pleuropneumonia
contagious of goat (E). مرض سار يضيم الماعز اذا نفشى .

٢١١٦ - إلتواء ، إلتعطاف ، إلتواء . Flexuosité (F).
Flexuosity (E). الاعوجاج المتتالي في اتجمات متضادة .

٢١١٧ - ألتيز ، دُقْسَة ، قد أن

Haltica (S). Altise, Tiquet, Puce de terre, Pucerotte
(F). Haltica, Flea-beetle (E).

جنس حشرات من فصيلة النضاريات ورتبة مغذات
الاجنحة . انواعه كثيرة العدد جميعها قافزة ، وثابة ،
صغيرة القد ، زاهية الالوان . يرقاتها اسطوانية الشكل ،
ملونة ، سداسية القوائم تعيش على مختلف اوراق البقول
والاعشاب والنبات . وبعضها يركب السوق والجذور
فيلغها ويؤذيها || اشهر انواعه ما يشبع .

٢١١٨ - ألتيز البقول* ، دُقْسَة البقول ، قد أن البقول

Haltica oleracea (S). Altise potagère (F).

خنفساء من الألتيز صغيرة القد بيضوية الشكل طولها نحو
٤ مم . وعرضها ٢ مم . ثوبها الى الخضار الازرق اللامع .
يرقاتها سوداء ، هلبية الجلد ، تطول نحو ٦ مم . || الحشرة
واليرقة تركبان اوراق الملفوف واللفت والشوندر .

٢١١٩ - ألتيز التبغ* ، دُقْسَة التبغ ، قد أن التبغ

Haltica sinuata (S). Altise du tabac (F).

خنفساء من الألتيز طولها نحو ٢ مم . ثوبها الى السواد
العابق . يرقاتها حنطية الجسم ، سوداء الرأس || الحشرة
واليرقة تركبان بواذر التبغ في المشاتل .

٢١٢٠ - ألتيز الزروع* ، دُقْسَة الزروع ، قد أن الزروع

Chaetocnema aridula (S). Altise des céréales (F).
Cereal flea beetle (E). Halmerdfloh (D).

خنفساء صغيرة من الألتيز طولها نحو ٢ مم . ثوبها اسفع
قائم . تركب الزروع على اختلافها وتنغذي من الاوراق .
يرقاتها عابقة الخضار صغيرة القد تركب العصف لكنها
قليلة الاذى .

٢١٢١ - ألتيز الصليبيات اطلب خدوش .

٢١٢٢ - ألتيز الكتان* ، دُقْسَة الكتان ، قد أن الكتان

Aphthona virescens (S). Altise du lin (F).

خنفساء من الألتيز طولها نحو ٢ مم . ثوب اخضر قائم

٢١٤٣ - ألساريس Alsarex

حاشور زراعي يرتكز على مادة الروتينون وهو على نوعين . يستعمل تعفيراً على النبات بمعدل يراوح من ١٥٠٠ إلى ٢٠٠٠ غ. للدين الواحد في مكافحة الحشرات التي تتركب البقول وسائر النباتات الخضرية .

٢١٤٤ - أليستونيات Alstoniées (F). Alstoniae (E).

سبط من فصيلة الدفليات يشمل بعض الاجناس والانواع جميعها اشجار وجنبات حرجية منبها المناطق الاستوائية . يستخرج من بعضها عصارة مرة يقسال انها تقوم مقام الكينا .

٢١٤٥ - أليستونية * Alstonia (S). Alstonie,

Dita, Echite (F). Dita bark, Devil's tree, Alstonia (E). Schulhoizbaum (D). Alstonia (I). شجرة حرجية دائمة من الالستونيات وفصيلة الدفليات. منبها المناطق الاستوائية الاسيوية وجزر اوقيانية || تحوي عصارة مرة قريبة من الكينا تستعمل في بعض المستحضرات الطبية وهي طاردة للديدان المعوية .

٢١٤٦ - ألسين Alsine (F).

نبات عشبي معمر يعرف بالقلقلة ، اطلبها .

٢١٤٧ - إلتين Elatine (F). Elatin (E).

أطلب شجيرة .

٢١٤٨ - إلتينيات Elatinaceae (S).

Elatinacées (F). Elatinaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة القعالات. انواعها عديدة تنتمي الى جنسين. نباتاتها اعشاب وجنبات مدادة منقمية . اوراقها متقابلة . ازهارها رباعية او خماسية التركيب . ثمارها جراء سباعية الاخبية . بزورها صغيرة دهنية لا تخلو من الخواص الطبية .

٢١٤٩ - ألغ* ، ألغيات ، غث ، غثيات

Algues (F). Algae (E).

رتبة من المشريات عديدة الفصائل والاجناس والانواع . سماها مجمع مصر الطحالب في حين ان كلمة طحالب تعبر عن (Mousses) وقد سماها الامير مصطفى الشهابي أشنة بينما الاشنة هي (Usnée) كما ذكرها الامير نفسه . لذلك نعتمد كلمة ألغ وغث || والالغيات من النباتات المستورات الزهر التي لا تتميز فيها الجذور والسوق والاوراق تعيش بمعظمها في المياه العذبة والبحرية . ولما كان لون خضتها متعدداً فقد قسمت الى اربع مراتب وهي :

ألغيات حمراء Algues rouges, Floridées,

Rhodophycées (F). Rhodophyceae (E).

ألغيات خضراء Algues vertes, Chlorophycées (F).

Chlorophyceae (E).

ألغيات زرقاء Algues bleues, Cyanophycées (F).

Cyanophyceae (E).

ألغيات سفع Algues brunes, Phéophycées (F).

Phaeophyceae (E).

٢١٥٠ - إلهاء ، قسوخ Résiliation (F).

Cancelling, Annulement (E).

هو ابطال عقد بعد الشروع في تنفيذه .

٢١٥١ - إلهاء Abrogation

هو ابطال قانون او مرسوم فلا يعود تطبيقه مقدوراً . ولا

٢١٣٤ - ألدروفندا حويصلية * Aldrovenda vesiculosa (S).

Aldrovenda vésiculeuse (F).

نبات مائي معقود التعريف على اسم العلامة الايطالي « ألدروفندي » وهو نبات وحيد الجنس والنوع من فصيلة النيدماقيات . موطنه يمتد من اروبة الجنوبية والوسطى الى اطراف الهند . يعيش مغموراً في المناطق والاهوار والجاري القليلة الانحدار حتى زمن الازهار حيث يطوف على سطح الماء بواسطة جهاز من الحويصلات المنفوخة بالهواء تمكنه من العوم الوقت اللازم للازهار والاختصاص والعقد .



ألدروفندا حويصلية

٢١٣٥ - ألدريمول Aldremol

حاشور زراعي يرتكز على مادة الالدرين . يستعمل تعفيراً على التربة للقضاء على السالول والدودة البيضاء واشباهاها .

٢١٣٦ - ألددهيد Aldéhyde (F). Aldehyd (E).

سائل عديم اللون يحصل من تأكسد الكحول .

٢١٣٧ - ألدور Aldur (F). Aldur (E).

مادة مطيعة ركيبتها الفورمول واليولة . تستعمل في صناعة الزجاج اللاصيف ، غير قابل الانكسار ، وقد تحل محل المرو في بعض استخداماته لانها شفافة لاشعة ما وراء البنفسجي .



إلدونة ممسكة

٢١٣٨ - إلدونة Eledona (S).

Eledone (F). Eledona (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الارجل وفصيلة الالدونيات || انواعها المعروفة ثلاثة اعطائها البحر الابيض المتوسط || جميعها صغيرة القد تحمل اربعة ازواج من الجرامز المستطيلة ، المحظبة القواعد ، المتتابعة المحاجم التي تمكنها من الالتصاق بفرائسها || اشهر انواعها الالدونة الممسكة .



أليستونية

٢١٣٩ - إلدونة ممسكة * Eledona moschata (S).

Eledone musquée, Poulpe musqué (F).

نوع من الالدونة يكثر وجودها في البحر الابيض المتوسط || جسمها صغير القد . حطائها يكتنف كابل الزام الاول من الجرامز . يفوح منها خارج الماء عرف عطري اخاذ لا يختلف عن عرف المسك || لحمها مأكول رغم رائحة المسك القوية ويقال انه يقوي الاعصاب وينشط الياء .

٢١٤٠ - إلدونيات Eledonidae (S).

Eledonidés (F). Eledonidae (E).

فصيلة حيوانات مائية من الرخويات رأسيات الارجل . اجناسها المعاصرة المعروفة اثنان الالدونة والبليطة || تتميز حيوانات هذه الفصيلة بخلوها من الزعانف وباستطالة جراميزها المحجمة على صنف واحد .

٢١٤١ - إلهاء Acclimatation (F).

Acclimatization (E).

لهب بالمكان اقام به . والالهاء هو اخضاع الحيوان او النبات الى محيط اقليمي يختلف عن محيطه الاصلي .

٢١٤٢ - ألزق ، ألصق Agglutiner (F).

To agglutinate (E).

لزق او لصق الشيء بغيره .



ألغ



إلقى البساتين



إلقى الرمال



إلقى المتوسط



إلقى النحل



إلقى



ألكة

بطنها الى الصفار المزركش بالاسود || تقتنص النمل فتخدره وتحجره وترى عليه يرقاتها .

٢١٦١ - **إلقاح ، تطعيم** Vaccination
حقن الحيوان باللقاح الخاص انتقاء ميكروب ذلك اللقاح .

٢١٦٢ - **إلقاح ، تلقح** Inoculation
ادخال ميكروب مرضي في الجسم لاغراض طبية وقائية .

٢١٦٣ - **إلقة ، قيردة ، دحية** Guenon,
انثى القرد . Monine (F). Monkey, Ape (E).

٢١٦٤ - **إلقس *** Alocasia (S). Alocasie (F).
Tara plant (E). Tropenwurz (D). Alocasia (I).
جنس نباتات برية وتربينية من فصيلة الفلقاسيات .
مهداها البلاد الهندية . انواعها عديدة . اوراقها قرصية
طويلة الزناد . كبيرة النصل الاخضر الموشح والمخرج
والمنسج بمختلف الالوان المتجانسة .

٢١٦٥ - **إلقيات *** Sphegidae (S).
Sphégidés (F). Sphegidae (E).
فصيلة حشرات قانصة واثجة من رتبة غشائيات الاجنحة
المحصورة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . جميعها متوسطة
القد او كبيرة ، مستطيلة الجسم ، انبوبية الخصر ،
يغلب فيها اللون الاسود || اناثها بناءة تشيد وكرها بالطين
فتلصقه في المكان الذي يناسب من الحائط او تحت السقف
او تجعله في الارض المذحجة على عمق بضع سنتيمترات
وتقسمه الى عدة خلايا تقيم بينها الحواجز || تقتنص
العناكب والحشرات واخصها الديدان فتخدرها وتنقلها الى
وكرها حيث تمتح فيها مكها وتسد الحاجز فينقف المكن
ويتغذى بها .

٢١٦٦ - **ألكة *** Alces (S). Elan (F). Elk, Moose (E).
حيوان مجتر كبير الجثة وحيد النوع من فصيلة الايليات .
موطنه البلاد الشرقية الشمالية الباردة لذلك فهو لا يخشى
الصقيع ودميك الثلج || وهو كبير الجثة طوله من ٢٧٠
الى ٢٩٠ سم . بما فيه ذيله البالغ ١٠ سم . ارتفاعه يراوح
من ٢٠٠ الى ٢١٥ سم . ووزنه من ٤٠٠ الى ١٠٠٠
كيلو . الانثى اصغر قدأ من الذكر . رأسه مستطيل يشبه
رأس البغل ينتهي بحفلة غليظة شارقة مكتظة بالشعر .
عنقه غليظ وقصير يحمل بين لحبيه وزوره كتة كثيفة من
الشعر الطويل . صدره واسع عرم . ازلامه رفيعة وقوية .
ظلفه مشقوق الى فلقين تجمعها غشاة غضروفية مطاطة
تساعد عند السير على الدميك وفي المناقع الموحلة
يعيش جاعات . اجله من ٧ الى ٣٠ || قوته الاعشاب
العالية ولحاء الاشجار واثانها واوراقها . يألف غابات
الصفصاف والبتولا والخور والتنوب والصنوبر .

٢١٦٧ - **إلكترونيك** Electronique (F). Electronic (E).

٢١٦٨ - **ألفيل *** Schmidélie (F).
هي الشميلة ، اطلبها .

٢١٦٩ - **أليغاتور** Alligator
هو التمساح الامريكي ، اطلب .

٢١٧٠ - **ألم** Orme
اطلب بوقيسا .

يلغى نص الأ بنص مستو معسه او مرتفع عنه في الدرجة
مثلاً على ذلك : لا يلغى مرسوم الا بقانون .

٢١٥٢ - **ألم** Amalgamer (F). To amalgamate (E).
مزج الزئبق بمعدن آخر .

٢١٥٣ - **إلف الكلس** Calicole
اطلب جصي .

٢١٥٤ - **إلف الماء ، رزيغيات *** Hydrophilidae (S).
Hydrophilidés (F). Water scavenger beetles (E).
Kolbenwasserkäfer (D).

فصيلة حشرات من غديات الاجنحة عديدة الاجناس
والانواع . معظمها يألف الماء والمناقع وبعضها يعيش على
خشي الابقار || جميعها من الحشرات القليلة الاذى ،
صغيرة القد مستطيلة الشكل ، متعددة الالوان الزاهية ،
قصيرة الزباني النحيلة ، مقدافية الارساع || اناثها تحيك
صلجات مردنية الشكل تضع فيها مكها الذي يراوح عدده
من ٣٠ الى ٥٠ ثم تربطها ببعض الاعشاب فتطفو الصلجة
على صفحة الماء الى ان يتم النقف فتتفلق وتغوص .

٢١٥٥ - **ألفاسوفر** Alphasoufre
فاطور زراعي يرتكز على الكبريت الميكروفي القابل
للبلل يستعمل سائلاً محلولاً ٢ ٪ في مكافحة الارمداد على
الاشجار المثمرة والكرمة .

٢١٥٦ - **ألفا قنطورس** Alpha du Centaure (F).
نجم ثير من كوكبة قنطورس مركزه على البطن والعرب
تسميه « بطن » . يعتبر من نجوم المرتبة الاولى . يبعد عن
الارض نحو ٤٣ الف مليار كيلومتر .

٢١٥٧ - **إلقى البساتين *** Scolia flavifrons (S).
Scolie des jardins (F).
حشرة نافعة من الالقيات طول ذكورها من ٢٠ الى
٢٦ سم . واثانها من ٣٠ الى ٤٠ لونها الى السواد تملوه
اربع بقع صفر . يقتنص ويتطفل على يرقات غديات
الاجنحة .

٢١٥٨ - **إلقى الرمال *** Ammophila sabulosa (S).
Ammophile des sables (F).
حشرة نافعة من الالقيات . طول ذكورها من ١٣ الى
٢٢ سم . واثانها من ٢٠ الى ٢٨ سم . لونها الى السمرة .
تقتنص مختلف ديدان الفسقيات .

٢١٥٩ - **إلقى المتوسط *** Spheg
حشرة نافعة من الالقيات طولها نحو ٣٠ سم . ثوبها اسود ،
بطنها احمر . اجنحتها صفر . يكثر وجودها من نيسان الى
ايلول . تقتنص مختلف انواع الحشرات والديدان فتخدرها
وتنقلها وتحجر عليها في وكرها الارضي بعد ان تمتح فيها
المكن اللازم .

٢١٦٠ - **إلقى النحل *** Philanthus apivorus, Ph. triangulum (S). Philanthe
apivore (F).
حشرة من الالقيات القانصة الضارة . مستطيلة الشكل
يراوح طول ذكورها من ١٠ الى ١٢ سم . واثانها من ١٤
الى ١٧ سم . رأسها وجوشنها وارجلها سود . ظهرها مرقش ،

٢١٧٩ - ألنهور ، ملهتاب °
Lance flammes (F).
Flame thrower (E).

٢١٨٠ - ألنوة* ، سولع مخزني ، صبر ، صبارة ، مقصر
Aloe vera (S). Aloes officinal (F). Aloes (E). Aloe.
Achte aloe (D). Aloe epatica (I).

نوع من السولع وهو نبات معمر تابع لفصيلة الزنبقية .
أوراقه لحية ليفية النصل المستطيل المسن الحافة والمذيب
العقصة || يستخرج من أوراقه ، عدا الألياف الصناعية ،
عصارة طبية مرة الطعم تستعمل في بعض المستحضرات
المعوية || يتكاثر بالفسائل . يعيش في جميع الأتربة ،
لكنه يخشى البرد .

٢١٨١ - ألودور
Aludor

حاشور زراعي يرتكز على زرنبيخات الألومينيوم يستعمل
سائلا مخلولا بالماء بمعدل ٨ ٪ في مكافحة أكثر الحشرات
واخصها خنفساء البطاطا (دوريفور) .

٢١٨٢ - ألورون ، أليرون
Aleurone

مادة ازوتية تنشأ في البذور والحبوب عند إلباها فادراكها .
اشهرها غلوتين (Gluten) حبة القمح .

٢١٨٣ - ألوريت
Aleurite (F).

اطلب أرطس ، شجرة من الفريونيوات .

٢١٨٤ - ألوريه °
Aleuria vesiculosus

جنس فطور من الكعديات يعيش على المواد العضوية
الدبالية النباتية . اطلب كمدة جرابية .

٢١٨٥ - ألوزيا °
Elosia (S).

Elosie (F). Elosia (E).

جنس صفادع قازبة من فصيلة الكداميات . انواعه المعروفة
قليلة العدد مهدا بعض مناطق البرازيل || اجسامها صغيرة
القد تقول من ٤ الى ٦ سم . عند الذكور ومن ٥ الى ٧ سم .
عند الاناث . رؤوسها مسطحة الصفحة العليا التي تتقدم
السفل عند طرف الحظم من ٦ الى ٨ سم . فكوكها السفلى
عامة الاسنان || جلودها لماعة مبعثرة الشعول . انواها
مختلفة الألوان يكثر فيها الاخضر الاغيس || تعيش من
١٠ الى ١٢ سنة . تسرح في الليل وتبيت في النهار . قوتها
الحشرات والديدان || اناثها تسرا من ٤٠٠ الى ٦٠٠ دعبلة
في جراب تحملها الانثى على ظهرها حتى التقف .

٢١٨٦ - ألوسن
Alyssum

اطلب أليسم .

٢١٨٧ - ألوسينيوات
Alyssinées

سبط من فصيلة الصليبيات نباتاته عديدة الاجناس والانواع
اشهرها الالوسن والذحيان والجرباع والابريسيه .

٢١٨٨ - ألوسيت
Alucite des céréales

هو عنجول الحبوب .

٢١٨٩ - ألومين
Alumine (F). Alumina (E).

هو اكسيد الألومينيوم . جسم اساسي مركب من الاكسجين
والألومينيوم . يشمل بعض الحجارة الكريمة المختلفة الاسم
واللون نظرا لاختلاف الاكسيد المعدني . منها الياقوت الاحمر
واللازورد والقرند والسبازج الخ... || اما البوكسيت
وهو الألومين الهيدراتي فيستخرج من الطبيعة ويذبل في
صناعة اللك العديم الانحلال .

٢١٧١ - إلماص
Vérason (F).
Turning, Ripening (E).

راجع إرقاق .

٢١٧٢ - ألماندة*
Allamanda (S).

Allamande, Orélie (F). Alamanda (E).

Alamandbaum (D). Allamanda (I).

جنس نباتات من فصيلة الدفليات منبها امريكة الاستوائية
انواعها قليلة وهي جنبيات وجنبيات مدادة عارشة معمرة ،
سوقها اسطوانية ملساء ، أوراقها معنقة متقابلة رباعية
المحور سنانية النصل . ازهارها تشبه زهر الياسمين لكنها
ذهبية اللون ، كبيرة القدر لا عرف لها . تستعمل
في التزيين . تتكاثر بالبذر والعقل . تعيش في جميع
الأتربة القليلة والموسطة الاندماج . تخشى الرطوبة المستحكمة
وترغب في المواقع الجنوبية الكثيرة الحرارة والاشعاع الشمسي .

٢١٧٣ - ألنجوج ، ألنجج ، يلنججوج ، يلنجج
Aquilaria malaccensis (S).

عرد الطيب

Aquilare (F).

شجرة حرجية وتريينية من فصيلة المازريونيوات . منبها
البلاد الحارة . خشبها صلب فاخر يدعى خشب العقاب
وهو من الاخشاب الرائجة الفواحة العرف العطري
المستحب .

٢١٧٤ - ألنجيات
Alangiaceae (S).

Alangiacees, Alangiées (F). Alangiaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين ومنهم من جعلها سبطا
من الفصيلة الاهليلجية وهي باحقيقة تشبه الاهليلجيات
وتشبه ايضا الشمويات ولكنها مستقلة عنها || منبها
احراج الهند الجنوبية الغربية حتى جبال حلايا || اجناسها
وانواعها قليلة لكنها مختلفة القدر الشاسع اليون . منها
الشجرة الدائحة الباسقة ومنها العشبة النحيلة . اشهرها شجرة
الالنجية || اخشاب اشجار هذه الفصيلة جامدة الرقعة
الناعمة ، شديدة الصلابة ، بيضاء او تبينة اللون . فاخرة
الصنف تستعمل في الصناعات الخشبية الدقيقة .

٢١٧٥ - ألنجية*
Alangium (S). Alangier (F).

Alangium (E). Alangolambaum (D). Alangio (I).

شجرة حرجية من فصيلة الالنجيات منبها الاحراج الهندية
حتى سفوح جبال حلايا . ساقها ملساء رماء اللون . أوراقها
متعاقبة معنقة اهليلجية . ازهارها خنثوية فردية او ثلاثية
التجميع ، محورية الارتكاز ، بتلاتها خيطية . اسديتها
كثيرة العدد طويلة . ثمرتها عنبية لحية عافصة وجامضة
الطعم تحوي برة واحدة . جذورها عطرية مرة يستخرج
منها عطرها وجوهرها المر . خشبها فاخر الصنف ابيض
اللون شديد الصلابة .

٢١٧٦ - ألنصبة
Alonzoa

اطلب ألوزوا .

٢١٧٧ - ألنكوس*
Elenchus (S).

Elenchus (F). Elenchus (E).

حشرة من الحشبيات تمتع مكانها في بطون هدييات الاذنان
فينقف عن يرقات تعيش طفيلية الى ان تتم انسلخاتها
وتتحول الى حشرات كاملة .

٢١٧٨ - إلهاب ، تشويط
Flambage (F).

Singeing (E).

معالجة سوق الاشجار وفروعها باللهب لقتل الحشرات
والطفيليات الفطرية المعششة في شقوق لحائها .



ألمدة



ألنجية



ألنكوس



ألوة



ألوزيا



ألوزرا



آلت



أليسيم بحري



أليسيم جردى



أليسيم حقيقي



أليسيم ذهبي



أليسيم

متعاقبة . أزهارها عنقودي النجمية تاجي الارتكاز .
أزهارها صغيرة جميلة فواحة العرف متعددة الألوان || أشهر
أنواعه ما يتبع .

٢١٩٨ - أليسيم بحري * ، خيزم الإبرة

Alyssum maritimum (S). Alysse argentée, Corbeille d'argent, Alysse maritime (F). Sweet alison, Allison (E). Straudsteinkraut, Immergrüne alysse (D). Paniera d'argenteo, Filigrano (I).

نوع من الأليسيم البري ينبت في المواقع الصخرية من لبنان إلى جبل اللكام . أوراقه زباه طحلاء اللون . أزهاره إلى الازمرداد الفضي .

٢١٩٩ - أليسيم جردى *

Alyssum Alpestre (S). Alysson (F). Gold basket, Alpine mad-wort (E). Goldkörbehen, Steinkraut (D). Alisso (I).

نوع من الأليسيم البري الطبي ينبت في قم لبنان والجبل الشرقي . زهره أصفر اللون .

٢٢٠٠ - أليسيم حقيقي * ، حشيشة اللجأة

Alyssum genuinum (S). Alysse blanche (F). Hoary mad-wort (E). Welsse grankresse (D). Alisso della montagna (I).

نوع من الأليسيم الطبي البري يعيش في الجبال العالية يوجد منه في جبل الارز . يقال ان منافع الطبية عديدة أوراقه صغيرة مستطيلة زباه . أزهاره إلى البياض .

٢٢٠١ - أليسيم ذهبي * ، حشيشة السلحفاة ، شجرة الكلب

Alyssum saxatile (S). Alysse jaune, Corbeille d'or, Alysse des jardins (F). Golden tuft, Gold dust, Rock alysson (E). Gebirgssteinkraut, Goldkörbchen (D). Alisso giallo, Paniera d'oro, Alisso dorato (I).

نوع من الأليسيم البري الطبي والزراعي الترييني وهو عشبة نجمية فرعاء جميلة الأزهار الصفراء اللون || تتكاثر بالبذر وتعيش في جميع الأتربة . ومن أنواعه اللبنانية السورية :

٢٢٠٢ - أليسيم أقرعي

Alyssum cassium (S).

٢٢٠٣ - أليسيم شامي

Alyssum damascenum (S).

٢٢٠٤ - أليسيم صوفي الورق

Alyssum eriophyllum (S).

٢٢٠٥ - أليسيم صيواني

Alyssum umbellatum (S).

٢٢٠٦ - أليسيم علفاني

Alyssum dasycarpum (S).

٢٢٠٧ - أليسيم كوكبي

Alyssum constellatum (S).

٢٢٠٨ - أليسيم مندمج

Alyssum condensatum (S).

٢٢٠٩ - أليسيموس *

Elymus (S). Elyme (F). Elymus (E). جنس نباتات برية جذمورية معمرة من فصيلة النجيليات . أنواعه نحو ٢٠ متفرقة في جميع الاصقاع . أشهرها شعير الكتبان الذي يعيش في الرمال ويشبهها .

٢٢١٠ - آم

Enfumer (F). To smoke (E).

دخن على النحل ليشتر المسل .

٢٢١١ - أم أربع وأربعين * ، حريش

Scolopendra (S). Scolopendre, Mille-pattes (F). Scolopendra (E).

جنس دويبات زاحفة من الدخداخيات الشفويات الارجل .

٢١٩٠ - ألومنيوم Aluminium

معدن ابيض يتميز بوضائه الفضي وخفته النسبية اذ يبلغ ثقله النوعي ٢,٥٦ يذوب تحت ٦٥٠° سغ وهو من اخف المعادن وزناً . يقبل الطرق والصقل فتصنع منه الواح واسلاك في غاية الدقة . رمزه (لو) ، وزنه الاتومي ٢٦,٩٧ || يستخدم خالصاً او مركباً في صناعات مختلفة من صناعة الادوات المنزلية والطبية والكهربائية الى صناعة السيارات والطائرات || أكثر البلاد إنتاجاً لهذا المعدن هي امريكا وفرنسا والمانيا وسويسرا وإيطاليا .

٢١٩١ - ألونزوا * ، النضبة

Alonzoa جنس نباتات عشبية زهرية من السيسميات التابعة لفصيلة الخنازيرية . منبتها جبال البيرو والشيلي وقد كثرت زراعتها التزيينية نظراً لجمال شكلها ويختلف ألوان زهرها من البرتقالي الى الاحمر الحقيقي || تتكاثر بالبذر . تعيش في معظم الأتربة . أزهارها يدوم نحو أربعة شهور .

٢١٩٢ - أليزارية

Allaire officinale اطلب حشيشة الثوم .

٢١٩٣ - أليان

Mouton à queue grasse كل كبش او نعجة تحمل ألية . تعرف بضأن أليان .

٢١٩٤ - آلييت *

Alytes obstetricans (S). Crapaud accoucheur (F). Midwife-toad, Obstetric-frog (E).

ضفدعة من فصيلة الضفاديات . مهدا بعض الاصقاع الارربية الممتدة من البلقان الى فرنسا || جسمها صغير القد يطول نحو ٥ سم . جلدها كثير الشعول ينضج مادة زيتية قوية الرائحة القريبية الشبه براحة الثوم . رأسها قليل الاستطالة . عيناها مستديرتان ، نابشتان . حدقة عيناها عمودية الارتكاز . لسانها مستدير الشكل ، قليل الحركة . اصابع قوائمها الخلفية نصفية الخطاب || ثوبها الى السمرة الحنطية . يعبق في الظهر ويهت في البطن || تعيش في المناطق ومجاري الماء . مسرحها دجوي . قوتها الحشرات والديدان || تسافدها وهو فريد في نوعه يتم على الشكل التالي :

يعلو الذكر ظهر الانثى متمسكاً بقائمته الامامية داعكاً بقائمته الخلفية خاصرتها الى ان ينبجس الدليل تباعاً في سبحتين يرويها بشلخه المخصب ثم يلفها على فخذه ومؤخر ظهره حتى زمن النقف الذي لا يطول اكثر من ثلاثة اسابيع . عند ذلك يتمرغ في الوحل المغفور بالماء فتخرج البلاعيط من اغشيتها ويتخلص من حمل .

٢١٩٥ - أليثة

Alioth (F). Alioth (E). الألية نجم من كوكبة الدب الاكبر ويدعى ايضاً حور . اطلبه .

٢١٩٦ - ألية

Queue grasse (F). Obese-tail (E). الألية والية ما ركب العجز وتدل من الشحم .

٢١٩٧ - أليسيم ، أليسيم

Alyssum (S). Alysse (F). جنس اعشاب برية وطبية وتريينية من فصيلة الصليبيات . منبتها حوض البحر المتوسط وآسية الجنوبية . كان اطباء اليونان ومن عاصريهم وجاء بعدهم يعتقدون ان بعض انواع هذه الاعشاب يشي من الكلب || معظمها اعشاب نجمية فرعاء السوق المخشوشة الدقيقة . أوراقها لاطقة لسة

٢٢٣١ - أُمّ سَكَمَكَع ، أُم عَجَلَان

اطلب ذُعرَة بِلَقَاء .

٢٢٣٢ - أُمّ شَبَقُونَة * Pique-boeuf (F). Beef-eater (E).

طائر يكون مع الحمر والنعم يلتقط النعر والقراد والذباب .
اطلب نغاف .

٢٢٣٣ - أُمّ صُفَيْدَة Lavandière jaune (F).

طائر من الأعر القواطع يدعى ذُعرَة ومدا ، اطلبها .

٢٢٣٤ - أُمّ عِزْرَة هي القلبية وعزّة ابنتها .

٢٢٣٥ - أُمّ عَوَيْف * ، أُمّ قَيْس Fourmi-lion (F).

Ant-lion (E).
اطلب ليث عفرين . حشرة ضخمة الرأس مستطيلة الجسم لها أربعة أجنحة إذا رأت الانسان قامت على ذنبها ونشرت أجنحتها . ويقال لها ناشرة برديها .

٢٢٣٦ - أُمّ غَيْلَان Acacia gommier (F).

اطلب سنط صمغي . وهي شجرة من عضاء البادية كثيرة الشوك . قال ابن سينا أصله يسمى ينك إذا بخر به طيب رائحة البدن وقطع رائحة الثوم .

٢٢٣٧ - أُمّ قِرْقَرَة * Manis (S). Pangolin (F).

جنس حيوانات لبونة من القرشيات ورتبة الدرد . أنواعه سبعة ، اقليتها البلاد الاستوائية الآسيوية والأفريقية جلدها كجلد السمك تكسوه الحراشف الغضروفية الصلبة المرصوفة المرصوفة من الأنف إلى آخر الذيل طولها من ١٠٠ إلى ١٧٠ سم . رأسها مردئي الشكل صغير . لسانها طويل لزج . جرابها قصيرة ، أظفارها حادة مستطيلة || تحفر جحرها بين الصخور وفي الأراضي الصلبة تأوى اليه في النهار وتخرج طلباً للقوت في الليل قوتها النمل والأرضة والحشرات والحبوب والنار وهي سريعة العدو وبعضها يتسلق الأشجار .

٢٢٣٨ - أُمّ كَلَب

« شجرة شاذة تنبت في غلظ الأرض وجبالها ، صفراء الورق ، خشناء ، فإذا حركت ، سقطت بأتان رائحة واخبثها ؛ سميت بذلك لأنها تنبت كالكلب إذا أصابه المطر . » (اللسان)

٢٢٣٩ - أُمّ مَكَب

شجرة شاذة تنبت في غلظ الأرض وجبالها ؛ صفراء الورق خشناء فإذا حركت سقطت بأتان رائحة (اللسان) .

٢٢٤٠ - أُمّ نَضَارَة

طائر من الدخيل - اطلب دخلة نضارة .

٢٢٤١ - أُمّ نُوح اطلب هازجة السعد .

٢٢٤٢ - أُمّ هَنُوس Lophomys d'Imhaus (F).

حيوان لبون قاضم يدعى لقيوم ، اطلبه .

٢٢٤٣ - إمَاء Miaulement (F). Mewing (E).

الإماء : صياح السنور (القاموس) وهو المؤاء .

أنواعه عديدة جميعها من دويبات المناطق الحارة . طولها يراوح من ٨ إلى ٣٠ سم . || تسرح في الليل . عضتها سامة مؤلمة وقد تكون مميتة في بعض الأنواع .

٢٢١٢ - أُمّ التَّلَافِيْف Feuillet-livret (F).

Third stomach of ruminants (E).
أحد الأقسام الأربعة التي يتركب منها كرش المجترات وقد تتصل بالقنسوة وبالأنفخة .

٢٢١٣ - أُمّ الحَيَات * ، رَضَاعَة البَقَر Eumeces

جنس عطاء من فصيلة السقنقوريات ورتبة العظائيات . أنواعه المعروفة ١٢ جميعها من عطاء البلاد الحارة . ضخمة الشكل طولها لا يفوق ١٨ سم . لونها الغالب إلى الصفرة وبعضها أرقش . وغيرها مؤزرة بالأسود ، حراشفها ملساء .

٢٢١٤ - أُمّ الخَلُول * ، قَلَك Arca (S). Arche (F).

Arca, Arc, Ark shell (E).
جنس محار مأكولة صغيرة القد ، شبه بيضي الصدف ، تكثر في البحر المتوسط .

٢٢١٥ - أُمّ الزَّرْد Pleuronecte zèbre (F).

هي السجاس المؤذر ، اطلبه .

٢٢١٦ - أُمّ السَّهَر ، أُمّ قُوَيْق Chevêche (F).

Little owl (E).
هي الصدى ، اطلبها .

٢٢١٧ - أُمّ الشَّعُور Saule pleureur (F).

Weeping willow (E).
اطلب صفصاف ستح .

٢٢١٨ - أُمّ الصَّخْر هي البهفة ، اطلبها .

٢٢١٩ - أُمّ جَعْرَان اطلب جعل مقدس .

٢٢٢٠ - أُمّ حُبَيْن اطلب حردون .

٢٢٢١ - أُمّ حِسَان

يقول الجاحظ هي دويبة على قدر كف الانسان .

٢٢٢٢ - أُمّ حَسْرَد Aspe

اطلب مقلقة سمكة من الشبوطيات .

٢٢٢٣ - أُمّ حُسَيْن

يقول الديري هي دويبة سوداء من دواب الماء لها أرجل كثيرة .

٢٢٢٤ - أُمّ حِفْصَة هي الدجاجة الأهلية .

٢٢٢٥ - أُمّ حَمَارَس هي الفزالة عن ابن الأثير .

٢٢٢٦ - أُمّ حَنُور هي الضبع .

٢٢٢٧ - أُمّ دِنْفِيس هي الزريقية .

٢٢٢٨ - أُمّ رُمَيْل هي الذفرة العربية .


٢٢٢٩ - أُمّ رِيَّاح

طائر أغبر أحمر الجناحين والظهر يأكل العنب . هذا ما جاء عنه في المصع عن الديري .

٢٢٣٠ - أُمّ زُبَيْبَة هو خروف البحر .



أُمّ أربع وأربعين



أُمّ الحيات



أُمّ الخلول



أُمّ شبقونة



أُمّ عويف



أُمّ قرقة



أمارنطون



أماريلس أحمر



أماريلس زنبق يعقوب



امازونة



أمانيت أحمر



أمانيه

الى اربع بيضات تحضنها نحو ١٩ يوماً بينا الذكر يؤن لها الغذاء .

٢٢٥٦ - إماعة ، إنباع Liquéfaction (F).
Liquefaction (E).

٢٢٥٧ - إمام Etalon de mesure (F).
Standard of measures (E).
النموذج المثالي الذي حدده القانون في مختلف المقاييس .

٢٢٥٨ - أمانيات الأخاديد Protéroglyphes (F).
Proteroglyph (E).
رتبة من الحيات تشمل الزواحف الخشبية من ذوات الأنياب الجوفاء الانبوية السامة كالصل والناشر والرحا والافى الخ.

٢٢٥٩ - أمانيات الخيشوم Prosobranches
صف من الرخويات المعديات الارجل وهي حيوانات برية وبحرية أرجلها في بطونها || فصائلها وأجناسها وأنواعها كثيرة العدد معظمها مائي بحري.

٢٢٦٠ - أممان Planteur (F). Planter (E).
الأممان هو الزراع (القاموس وأشاج) .

٢٢٦١ - أمانيات Amanite (F). Amanita (E).
جنس فطور من فصيلة الفاريقونيات أنواعه عديدة بعضها مأكول فأخر الصنف وبعضها سام مبيت || أشهر أنواعه المأكولة الامانيات الابيض والاحمر .

٢٢٦٢ - أمانيات أبيض Agaricus alba (S).
Amanite blanc (F). Agaricus abius (E).
فطر من الامانيات وفصيلة الفاريقونيات . لونه الى الأبيض الاغبر الاطحل الموج . يكثر في المواقع الظليلة . يعيش على المواد النباتية المنحلة . وهو من الفطور المأكولة الجيدة الصنف المستحبة الطعم .

٢٢٦٣ - أمانيات أحمر * Agaricus aurantiacus (S).
Amanite orangé, Oronge (F). Agaricus orange-colour (E).
فطر من الامانيات وفصيلة الفاريقونيات . لونه الى الحمرة الوردية الطحلاء الموج || يعتبر من الفطور المأكولة الجيدة الصنف .

٢٢٦٤ - أمانيات Amanitine
مادة قلوية طيارة تستخرج من الامانيات تذوب في الماء كريهة الرائحة شديدة السم || تستعمل في بعض المستحضرات الطبية من ١ الى ١٠ في معالجة الجحاف ورشح العرق .

٢٢٦٥ - أمانيه * Ammania (S). Ammanie (F).
Tooth-cup (E). Ammanistplantze (D). Ammannia (I).
جنس نباتات عشبية حولية من الفصيلة الحنانية . أنواعه قليلة . أوراقها متقابلة ، أزهارها نورية التجميع ، ابطية الارتكاز ، وردية اللون توجد في الاماكن الجبلية . أوراقها حارقة قاتمة ، تستعمل في بعض العلاجات الجلدية . ومنها نوع منقهي يتعمل بذات الصفات .

٢٢٦٦ - إماهة Hydrolyse
هي ازدواج ذرة بعض المركبات العضوية عند تماس الماء .

٢٢٦٧ - أمبرَبَاريس اطلب برباريس .

٢٢٤٤ - أمارة ، أنديس ، ميدلال Indice (F).
Index, Sign, Token (E).

هي علامة التبيان الظاهرة او المحتملة .

٢٢٤٥ - أمارنطون * ، بزاز العذراء ، خالدة الجوز Helichrysum stoechas (S). Hélichryse stoechade, Immortelle stéchéade, Gnaphale citrine (F). Golden tufts, Cassidony, Gold flower (E). Sonnenstrohblume, Goldblume (D). Steca citrina, Immortale giallo, Trespini (I).

نوع من الخالدة وهو نبات عشبي تزييني معمر من فصيلة المركبات . يكثر في بعض جزر البحر المتوسط . يعلو نحو ٥٠ سم . أوراقه متعاقبة لسنة زغبية ضيقة النصل الاطحل الصفحة العليا الابيض السفلى || أزهاره تاجية ، عذقية ، عديدة البتلات الحرفية الصفراء اللون || يزرع للتزيين . يتكاثر بالبذور والعقل . يرغب في التربة الجصية الخفيفة ، يخشى الرطوبة .

٢٢٤٦ - أماريليس ، شبيبك Amaryllis
جنس نباتات بصلية زهرية من فصيلة النرجسيات جميعها زراعية تزيينية . أزهارها كبيرة مختلفة الالوان جميلة المنظر ، عذبة العرف . لكنها من النباتات التي تخشى البرد وهو ما يجد من انتشار زراعتها . أشهر أنواعها :

٢٢٤٧ - أماريليس ابيض Am. candida (S).
A. blanche (F).

٢٢٤٨ - أماريليس أحمر * Am. belladonna (S).
A. Belladone (F).

٢٢٤٩ - أماريليس أرجواني Am. purpurea (S).
A. pourpre (F).

٢٢٥٠ - أماريليس جوزفين Am. Josephinae (S).
A. Joséphine (F).

٢٢٥١ - أماريليس زنبق يعقوب * Am. formosissima (S). A. St. Jacob (F).

٢٢٥٢ - أماريليس مائج Am. undulata (S).
A. ondulée (F).

٢٢٥٣ - أماريليس موشح Am. vittata (S).
A. bandée (F).

٢٢٥٤ - أمارين ٥ Amarine (F).
مادة قلويدية تشتق من عطر اللوز المر .

٢٢٥٥ - أمازونة * ، كوريك ، بيبغاء خضر Chrysotis (S). Amazone, Courique,
Perroquet vert (F). Amazona (E).

كوريك هو الاسم البرازيلي . جنس طير من المتسلقات وفصيلة الببغاوات . أنواعه المعروفة نحو ٣٠ جميعها أمريكية . أعطانها تمتد من البرازيل الى المكسيك . تألف الغابات وضياف مجاري الماء اخصها ضفاف الامازون . ملجأها الحياتي جماعي . افواجها كثيرة العدد . قوتها النار والحبوب والبزور والخشرات . تألف القفص لكنها تقتبس الكلام بحسنة وتردده في أي ظرف كان || اجسامها تراوح بين الاعتدال والكبر . اثوابها متراكبة الالوان الزاهية يكثر فيها الاخضر والاصفر الازرق الموج جميعها موشحة بالاحمر او بالاصفر . مناقبها وارساغها واصابعها سود || الانثى ترصع عشها في تجويف شجرة نخرة وتضع من بيضتين

٢٢٨٠ - أمبروسيا ، مزاولة العمل

Vacations هو الوقت الذي يقضيه بعض الموظفين أو بعض الأشخاص المنوط بهم عمل معين في دراسة هذا العمل أو القيام بأعباء الوظيفة كزاولة الخبير مهمة العمل المنوط به أو اجراء وكيل الافلاس جرد موجودات المفلس .

٢٢٨١ - أمدرينان* ، دمع أيوب ، بدرانج

Coix, Lachryma-Jobi (S). Coix-larmes, Larmes de Job, Larmille (F). Job's tears, Coix millet, Gromwell reed (E). Hlobstränen gras (D). Lacrima di Giobbe, Erba da corone (I).

عشبة برية طيبة معمرة من فصيلة النجيليات . حبوب مستطيل صغير بني اللون يستعمل في صناعة السباحات والعقود .

٢٢٨٢ - أمندود ، طلاله ، كسم

Habitus رسم هيئة النبات الخارجية . مثالنا على ذلك قولك في وصف الاجاصة مردنية الشكل وفي التفاحة مظلية الشكل . فالشكل المردني أو المظلي هو الامدود .

٢٢٨٣ - أمراض النبات

Maladies des plantes, Pathologie végétale (F). Pathology vegetable (E). هو العلم الذي يبحث في جميع الامراض النباتية مهما كان مصدرها || كانوا يعتقدون في الماضي ان سبب الامراض النباتية يعود اما الى تغيرات كيميائية لا تلائم النبات كقلة الغذاء أو رداءته ، واما الى عوامل داخلية تحول دون انتظام عملية التغذية || الى ان جاء العالم « ده باري de Bary » واثبت ان الامراض النباتية متأتية عن طفيليات أو فطريات طفيلية تعيش حياتها الخاصة ولا تتولد من النبات . ثم جاء الكثيرون بعده فرفعوا شأن هذا العلم وأوضحوا دقائق نواحيه فظروا لأهميته الاقتصادية العالية وما قد تسببه الامراض من خسائر فادحة في المحاصيل النباتية || فهذا العلم يشغل اذاً الامراض الطفيلية واللافطيلية والجراثومية والميكروبية .

٢٢٨٤ - أمراض جراثومية

Maladies à virus (F). Malady of virus, Diseases of virus (E). هي الامراض التي يسببها كائن جراثيمي حي يدعى فيروس « Virus » وينتقل من نبات مريض الى آخر سليم .

٢٢٨٥ - أمراض دودية

Maladies vermineuses (F). Vermineous malady, V. diseases (E). جميع الامراض الصادرة عن دود الامعاء كالصفر وغيرها .

٢٢٨٦ - أمراض طفيلية ، أمراض ضيفائية

Maladies parasitaires (F). Parasitic diseases (E). هي الامراض الناشئة عن كائنات حية تعيش متطفلة على عوائل حية وتمتص منها غذاءها وتسبب مرضها .

٢٢٨٧ - أمراض لا طفيلية

Maladies non parasitaires (F). No parasitic diseases (E). هي الامراض المتأتية عن عوامل وظروف خاصة لا تلائم النبات في المحيط الذي يعيش فيه .

٢٢٨٨ - أمراض ميكروبية

Maladies microbiennes (F). Microbian diseases (E). هي الامراض التي يسببها كائن ميكروبي حي .

٢٢٨٩ - إمراع ، خصب

Fertilité (F). Fertility (E). قابلية التربة لانتاج الكثير من الثلة .

٢٢٦٨ - أمبروسيا* ، دميسيس

Ambrosia maritima (S). Ambrosie, Absinthe bâtarde (F). Sea ambrosia, Oak of Cappadocia (E). Traubenkraut (D). Ambrosia maritima (I).

نبات عشبي بري من فصيلة المركبات وهو من نباتات المناطق والارض الرطبة . اوراقه مركبة طويلة الزناد اللامطي الانتشاب ، عطرية الرائحة تحافظ عليها في جفافها يقال انه من النباتات المنبهة ، المقوية والمضادة للحيات .

٢٢٦٩ - أمبير

Ampère (F). Ampere (E). الوحدة العملية لوغرة المجرى أو التيار الكهربائي .

٢٢٧٠ - إمبيق* ، إلبيق ، كركة

Alambic (F). Alembic (E). جهاز تقطير يستعمل لاستخراج السوائل الطيارة كالكحول وغيرها .

٢٢٧١ - أمت

Accident de terrain (F). Undulation in the ground (E). الأمت ج . إمت وأمت هو التصدع الحضيضي الطبيعي مع ما يرافقه من ارتفاع وانخفاض .

٢٢٧٢ - إمتهق

Desséché (F). Dry (E). امتهق النبات : هاج ويبس من شدة الحر .

٢٢٧٣ - إمتراج

Fusion (F). Fusion, Melting (E). هو ادماج ومزج اشياء مختلفة بعضها ببعض .

٢٢٧٤ - إمصاص

Absorption هو مرور المواد الغذائية المائلة من خلال بعض الاجسام التي توصلها للاستعمال . والامتصاص يكون حيواني أو نباتي || الامتصاص الحيواني قوامه دخول المواد الغذائية المهضومة المعروفة بالكيموس في اوعية دوران الدم اي اعضاء الامتصاص وهي بمثابة جذور النبات . وهذا الامتصاص يحصل عن طريقين طريق الاوعية الدموية وطريق الاوعية اللبنية . فالوعية الدموية تمتص المسواد الزلالية والهيدروكربونية . والوعية اللبنية تمتص المواد الشحمية || واما الامتصاص النباتي فيقوم على تمثيل الماء ثم الاملاح التي يحتاج اليها كل نبات ويتمكن منها .

٢٢٧٥ - إمزالاخ

Effort (F). Strain (E). تمدد والتهاب في اوتار أو عضل الفرس سببه اجهاد العضو المصاب .

٢٢٧٦ - إمتناع

Abstention هو ان يعطل المرء حقاً له أو مهمة منوطة به وقد يكون الامتناع مباشراً أو واجباً أو محظوراً .

٢٢٧٧ - إمتيار ، إلتزام

Concession هو تصرف اداري تحول الادارة بمقتضاء بعض الافراد حقوقاً وفوائد خاصة على الاملاك العامة أو على الجمهور مقابل تنفيذ التزامات تفرضها عليهم .

٢٢٧٨ - إمجاج

Montée de la sève (F). Rising of the sap (E). من أمج العود : جرى فيه الطل ودخل في زمن الابلال .

٢٢٧٩ - أمخ

أمخ حب الزرع : جرى فيه الدقيق .



أمبروسيا



إمبيق



أمدرينان



أمروس أرقش




أمروس أغبر




أمروس الزهارين



أمريد بلسمي



أمسة سمراء



أمسة فستقية

الاصناف وافخرها || يدخل في عدة تركيب ومستحضرات طبية وصناعية .

٢٣٠١ - أمريديات Amyridaceae (S). Amyridacées, Amyridées (F). Amyridae (E).

سيط من الفصيلة السذابية يشمل بعض الاجناس والانواع. جميعها شجيرات راتنجية حرجية وزراعية تزيينية .

٢٣٠٢ - إمساك ، قَبْض Constipation

مرض طارئ او مقدور الوقوع سببه اختلال في الجهاز الهضمي مظهره الخارجي صلابة في البراز تفوق الصلابة الطبيعية .

٢٣٠٣ - أمسة سمراء* ، أمسة الحور

Amathes albula, Orthosia albula (S).

Amathe brune, Orthosie brune (F).

Amathes albula (E).

حشرة من فصيلة الفسقيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها حوض البحر الابيض المتوسط . فراشها جواله قوتها رحيق الازهار . سرقها خاضعة تعيش في اول عهدها على اوراق الحور والصفصاف ثم على الاعشاب البرية والمرعوية || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٤ مم . بسطها تراوح من ٣٤ الى ٣٦ مم . رأسها صغير الجرم . عيناها كبيرتان . زباناها خيطيان . مرشفها معتدل الطول . جوشنها وبطنها الى الخططي الاسمر الموج . روشنها الاماميان الى الكهبة السمراء يعلوها نقطة سوداء واخرى كستنية وخط معترض عنابي وخط حثاري يستبق الوشم الاسود الذي يزين الاطار الخارجي . روشنها الخلفيان الى الطحلة تعلوها مشحة حنطية تنتهي بمستوى الخط المعترض في الروشن الامامي || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في آب وتبقى حتى تشرين الاول . تسرح في الليل . تعازل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع || السرفة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ٢١ مم . جسمها اسطواني الشكل ، مائل القشار ، اكهب اللون ، اسمر الموج ، يعلوه من الرأس الى الشرج تنقيط اسود . رأسها الى الجؤوة . مدها ورواجها الى السمرة القائمة || طور الاكمال يستمر نحو ١٥ يوماً وينقضي في التربة حيث تنغمن السرفة على عمق ٣ او ٤ سم .

٢٣٠٤ - أمسة فستقية* ، أمسة الخوخ

Amathes pistacina, Orthosia pistacina (S).

Amathe pistache, Orthosie pistache (F).

Amathes pistacina (E).

حشرة من فصيلة الفسقيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اروبة وافريقية الشمالية . فراشها جواله تعيش على رحيق الازهار . سرقها خاضعة تعيش على اوراق الورديات والنباتات المرعوية باستثناء النجيليات || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٤ مم . بسطها تراوح من ٣٨ الى ٤٠ مم . رأسها كبير الجرم . عيناها كبيرتان ناشرتان . زباناها خيطيان . جوشنها حنطي اللون اشقق الموج . بطنها الى الطحلة . روشنها الاماميان الى الخططي الاشقق يعلوه تمشيع اسفر وتنقيط وتبضع اخضر وبنفسجي . روشنها الخلفيان الى الطحلة يعلوها موج اصهب وطوق حثاري اسمر || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في آب وتبقى حتى تشرين الاول . تسرح في الليل . تعازل بعد ظهورها بستة اسابيع . تمتح المكن لطعاً تفلحها مادة غروية تشبها على نصال الالوارق ||

٢٢٩٠ - أمرج

امرج الدابة : تركها تذهب وترعى حيث تشاء . ويقال مرجت الناقة وهي مرج اذا القت ماء الفحل بعد ان يكون غرساً ودماً .

٢٢٩١ - أمرد Glabre (F). Glabrous, Smooth (E).

خال من كل خل وزغب .

٢٢٩٢ - أمرد ، سرح Inerme, Mutique (F).

Thornless (E).

خال من الزغب والهلل .

٢٢٩٣ - أمرع Fertiliser (F).

To fertilize, To manure (E).

راجع اخصب .

٢٢٩٤ - إمروس ، كرونلا Coronilla (S).

Coronille (F). Coronilla (E).

جنس نباتات عشبية نجمية حولية من فصيلة القرنيات . انواعه نحو ٢٠ معظمها بري ترعاه الماشية وبعضها زراعي تزييني . منبتها حوض البحر المتوسط وبعض المناطق الاروبية . اشهرها ما يلي .

٢٢٩٥ - إمروس أرقش* ، كرونلا مرقشة

Coronilla varia (S). Coronille bigarrée (F). Crown-vetch (E). Bunte kronwicke (D). Coronilla variata (I).

نوع من الامروس البري الزراعي والتزييني ، ازهاره موشحة ومرتقة بمختلف الالوان || يتكاثر بالبذر ويعيش في جميع التربة .

٢٢٩٦ - إمروس أغبر* ، كرونلا غبراء

Coronilla glauca (S). Coronille glauque (F). Seven-headed crown-vetch (E). Weisse kronwicke (D). Coronilla glauca, C. bianca (I).

نوع من الامروس الزراعي التزييني . اوراقه بحرية اللون ازهاره الى البياض الاغبر || يتكاثر بالبذر ويجود في جميع التربة .

٢٢٩٧ - إمروس الزهارين* ، كرونلا الزهارين

Coronilla emerus (S). Coronille des jardins, Emère, Séné bâtard (F). Scorpion senna (E). Skorpions senna, Strauchkronwicke (D). Coriarella, Emero (I).

نوع من الامروس الزراعي التزييني وهو عشبة نجمية صديرة القد كثيرة الازهار الجميلة || يتكاثر بالبذر ويجود في جميع التربة لكنه يخشى الرطوبة .

٢٢٩٨ - أمريد ، لامي Amyris (S). Amyride (F).

جنس شجيرات راتنجية حرجية وتزيينية من الامريديات وفصيلة السذابيات . مهدها البلاد الحساسة الامريكية اشهر انواعه ما يلي .

٢٢٩٩ - أمريد المكسيك ، لامي المكسيك

Amyris elemifera (S). Amyride élémifère (F). Amyris, Mexican elemi tree (E). Elemibalsam (D). Elemi falso (I).

نوع من الامريد يكثر في بعض الاحراج المكسيكية . يستخرج منه مادة راتنجية ذكية العرف صناعية .

٢٣٠٠ - أمريد بلسمي* ، لامي البلسم

Amyris plumieri (S). Amyride gommiifère, Arbreaumastic (F). Gum-elemi tree (E). Gemeiner balsambaum (D). Albero del balsamo (I).

نوع من الامريد العزيز الصنع الراتنجي الذي يعتبر من اجود

٢٣١٣ - إمّع
Epiphyte
كل نبات يرتكز ويعيش على غيره من النبات دون أن ينشأ فيه أو يتطفل عليه .

٢٣١٤ - أمّعز
Rupestre, Rupicole (F).
Rupestral, Rupicolous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات يعيش وينمو على الصخور .

٢٣١٥ - أمّعز ، حَجِر ، حَصِيّ
Pierreux (F).
Stony, Flinty, Gravelly, Calculous (E).
كثير الحجارة . يقال أرض معزاة أو محجرة أو حصية .

٢٣١٦ - إمّغاد ، إمّلاج
Allaitement (F).
Nursing, Suckling (E).
ارضاع النجاس من الحيل والبقر ونحوها . وملج وأمتلج : رضع .

٢٣١٧ - إمّغال
Prolifération, Proligération (F).
Proliferation (E).
هو كثرة النتاج وتعداده في الحيوان وكثرة الانتاج في النبات .

٢٣١٨ - أمّغر
Alezan cuivré (F).
Coppery chestnut (E).
من اثواب الخيل وهو الذي تملو شقرته مغرة .

٢٣١٩ - أمّقلود ، حشيشة السرة
Omphalodes (F).
جنس نباتات عشبية برية وتربينية من فصيلة الحمحميات .
انواعه عديدة منها الحولية والحولة والمعمرة جميعها صغيرة القد . اوراقها معنقة متعاقبة سنانية النصل . ازهارها عنقودي التجميع هامي الارتكاز . ازهارها صغيرة عديدة الالوان || اشهر انواعه ما يتبع .

٢٣٢٠ - أمّقلود ربيعي ، حشيشة السرة الربيعية
Omphalodes verna (S). Omphalodes printanier, Cynoglosse printanière, Petite bourrache (F). Navelwort (E). Gedenkemein (D). Erba a ombellico (I).
عشبة معمرة تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . سوقها شبه مرطاه . اوراقها قلبية الشكل مستطيلة الزام الاخير المدبب . نصلها جميل الخضار الزاهي . عنقودها الزهري متوسط القد . ازهارها سماوية اللون . ازهارها يستمر من نيسان الى آخر ايار || يقال انها لا تخلو من المنافع الطبية الا انها مبهمة .

٢٣٢١ - أمّقلود ساطع
Omphalodes nitida (S).
Omphalodes luisant (F).
عشبة معمرة تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم . سوقها منتصبه فرعاء . اوراقها مستطيلة بحيلة الخضار الزاهي . نصلها املس الصفحة العليا ، ازغب السفلى . عنقودها الزهري كبير القد . ازهارها الى الزرقة الالامعة . ازهارها يستمر شهراً واحداً .

٢٣٢٢ - أمّقلود كبدوس
Omphalodes Cappadocica (S). Omphalodes de Cappadoce, Cappadoce (F).
عشبة معمرة تملو نحو ٣٠ سم . جذورها مدادة . سوقها زباء . اوراقها قلبية الشكل بحيلة الخضار . ازهارها الى الزرقة السانجولية || ازهارها بديهي .

٢٣٢٣ - أمّقلود كئاني الورق
Omphalodes linifolia (S). Omphalodes à feuilles de lin, Argentine, Corbeille d'argent, Cynoglosse à feuilles de lin (F).
السرفه عند بلوغها الادراك الثام تطول نحو ٢٧ مم . جسمها اسطواني الشكل ، اطحل اللون ، زيتي المواج ، يملو من الرأس الى الشرج تنقيط اسود واصفر واخضر يطوق كامل السكم . رأسها اسود مدبها الى الغبرة السمره . رواجها الى السمرة || طور الاكمال يستمر نحو ١٥ يوماً وينقضي في التربة حيث تنغم السرفه على عمق ٣ او ٤ سم .

٢٣٠٥ - أمسوخ * ، كئبات الحقل ، ذئب الخيل ، شباله
Equisetum arvense (S). Equisette, Prêle des champs, Queue de cheval (F). False horse-tail, Horse-pipe, Bottle brush (E). Ackerschachtelhalm (D). Raspetrella, Equiseto del boschi, Coda equina (I).
نبات عشبي جذموري معمر من فصيلة الامسوخيات يوجد في جميع الاصقاع ويكثر في المواقع الرطبة الظليلة يقال انه يمنع الربو والسعال ويقطع النزف ويحمر الالوان . يصفيها ويفتت الحصى .

٢٣٠٦ - أمسوخ شتوي * ، كئبات الشتاء ، حشيشة الطوخ ، ذئب الفرس
Equisetum hyemale (S). Prêle d'hiver, P. des tourneurs (F). Shave-grass, Dutch-rush, Rough horse-tail (E). Winterschachtelhalm (D). Equiseto invernale, Asprella, Palparello (I).
نوع آخر من الامسوخ يظهر في اواخر الشتاء ويبقى حتى اواخر الربيع . يكثر في المواقع الرطبة وعلى جوانب الاقنية وضفاف الأنهر .

٢٣٠٧ - أمسوخيات ، كئباتيات
Equisetaceae (S). Equisétacées (F). Equisetaceae (E).
فصيلة نباتية من مستورات الزهر الوعائيات . اشهر اجناسها وانواعها الامسوخ اي الكئبات .

٢٣٠٨ - أمّسول
Amsol
عاشوب زراعي يحوي (٢,٤٠ د . امين 2,4 D. Amine) وهو سائل شديد الفاعلية يستعمل رشاً بواسطة المنضخات للفضاء على الاعشاب الضارة في مختلف الزروع واخصها الحنطة .

٢٣٠٩ - أمّسونية
Amsonia (S). Amsonia (F).
جنية تربينية سبروتية معمرة من فصيلة الدفليات . ساقها فناء تملو نحو ٨٠ سم . عصارها لبنية . اوراقها لاطقة ، متعاقبة ، كاملة . نصلها سناني الشكل يطول نحو ١٢ سم . ويعرض ٣ ، صفحته السفلى خلية البشرة . ازهارها قمية الشكل ، زرقاء اللون ، سبلية التجميع هامية الارتكاز . ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٣١٠ - أمطار
Précipitations (F). Rain (E).
هي مجموع ما اغدقت به السحب ، في وقت معين ، من مطر وبرد وثلج .

٢٣١١ - أمطي
Iclquier (F).
اطلب لبابة .

٢٣١٢ - أمظ
أمظ العود : ذهب نضارته وندوته وقد يكون ذلك عند دخوله في دور الاستراحة الحولية الذي يدوم من الشهر الى الثلاثة اشهر .



أمسوخ



أمسوخ شتوي



أمقلود ربيعي



أمقلود ساطع

وبعض جزر المحيط الهادي . انواعه قليلة العدد . يعلو نحو ٢٠٠ سم . ثوبه الى السمرة الباهتة . رأسه رثيج ظهره وعنقه الى السمرة العابقة . عيناه عسليتان . منقاره حنطي . رشفه صغيبي ، رجله ثلاثية الاصابع . اطافره حادة قوية . يألف المروج والمراعي . قوته الاعشاب والحبوب انشاء تبيض من ٢٠ الى ٣٠ بيضة ، خسلها اخضر اللون وزن الواحدة منها من ٧٠٠ الى ٨٠٠ غرام . قيمتها الغذائية توازي نحو ١٨ بيضة دجاج .

Blens (F).

Property, Asset, Wealth, Goods (E).

هي الاشياء المادية او الاعيان التي يصح امتلاكها .

Biens accessoires (F).

٢٣٣٩ - أَمْوَالُ تَابِعَةٌ

هي التي لا تكون مستقلة كالثمار على الشجر .

Biens domaniaux,

Domaine public (F).

هي الاملاك والاموال التي تمتلكها الدولة وتعتبرها ضرورية للمنفعة العامة . تخضع لنظام قضائي خاص وهي غير مقدورة التملك والحجز .

Biens Immeubles (F).

٢٣٤١ - أَمْوَالُ ثَابِتَةٌ

هي كل مال ، من عقار وعين ثابتة وغير ذلك ، لا يمكن نقله من مكانه بحكم طبيعته او بتخصيصه .

٢٣٤٢ - أَمْوَالُ سَائِبَةٌ ، أَمْوَالُ مُرْسَلَةٌ

Biens sans maître, Biens vacants (F).

هي التي يصح امتلاكها بطبيعتها الخاصة سواء اكانت مسبوقة الملكية كالاشياء المتروكة ام لا كالصيد البري والبحري .

Biens indivis (F).

٢٣٤٣ - أَمْوَالُ شَالَعَةٌ

هي الاموال المملوكة لعدد من الناس بلا تعيين ولا تمييز لنصيب كل منهم .

Biens libres (F).

٢٣٤٤ - أَمْوَالُ مُبَاحَةٌ

هي التي لا مالك لها بينما هي بطبيعتها مقدورة التملك كالحوانات الآبدة والمنقولات المتروكة .

Biens de main-morte (F).

٢٣٤٥ - أَمْوَالُ مَرْصُودَةٌ

هي اموال تمتلكها بعض الشخصيات ولا تنتقل بالارث وذلك لتخليد شخصية اصحابها .

٢٣٤٦ - أَمْوَالُ مَقْدُورَةٌ الاسْتِهْلَاك

Biens consommables (F).

هي التي لا يمكن استعمالها الا باستهلاكها كالاشرية والاطعمة ، او بتمليكها للغير كالنقود .

٢٣٤٧ - أَمْوَالُ مَقْدُورَةٌ الانْقِسَام

Biens divisibles (F).

هي التي تقبل التجزئة كالاراضي وغيرها .

Biens meubles (F).

٢٣٤٨ - أَمْوَالُ مَنَقُولَةٌ

هي كل عين جاز نقلها . وقد تكون منقولة بطبيعتها كالحيطان والاثاث او منقولة بتعيين القانون كالتاجر والديون واسهم الشركات .

Biens nuls (F).

٢٣٤٩ - أَمْوَالُ مُهْمَلَةٌ

وتدعى المهملات .

عشبة حولية تعلق من ٢٠ الى ٦٠ سم . اوراقها مستطيلة . نصلها بحري اللون مهدب الحافة . عنقودها الزهري رهل . ازهارها بيض او ليلية . ازهارها يستمر من اذار الى حزيران .

Omphalodes Lucillae (S).

Omphalodes de Lucile (E).

عشبة محولة تعلق من ٥ الى ١٥ سم . سوقها مدادة فرعاء . اوراقها اهليلجية مدببة ، نصلها بحري اللون الداكن . ازهارها تبدو زرق ثم تنحرف نحو الليلي || ازهارها صيفي .

Seis (F). Salt (E).

٢٣٢٥ - أَمْلاح

اسم شامل يطلق على عدة مركبات تشبه الملح . والاملاح ككأويأ : مركبات ناتجة عن ابدال معدل ما بالهيدروجين في محيط حامضي .

Domaine (F). Domain (E).

٢٣٢٦ - أَمْلاك

اراض زراعية فسيحة يملكها شخص معين .

Biens domaniaux (F).

٢٣٢٧ - أَمْلاك الدولة

Domanial estate (E).

Emblique officinale (F).

٢٣٢٨ - أَمْلُج

هو فيلنتور السنابر ، اطلبه .

٢٣٢٩ - أَمْلُخ راجع أعق .

Glabrifolié (F).

٢٣٣٠ - أَمْلُط

Glabrifoliate (E).

أملط م . ملطاء . نعت تعريفي يطلق على كل نبات نصال اوراقه عادمة الزغب .

Pousse souterraine (F).

٢٣٣١ - أَمْلُوج

Subterranean sprout (E).

هو الرئذ الذي يفرخ وينمو تحت التراب طبيعياً كان او صناعياً . ج اماليج .

٢٣٣٢ - أَمْلُول

قال ابن سيده : هي دابة تكون في الرمل تشبه العظاءة .

Alaterne (F).

٢٣٣٣ - أَمْلِيس ، أَمْلِيس

هو زفرين الجرد ، اطلبه .

٢٣٣٤ - أَمْنَح

أمنحت الناقة والبقرة والشاة اذا دنا نتاجها . وهي منوح .

Amansia (S).

٢٣٣٥ - أَمْنَصِيَّة *٥

Amansia (F). Amansia (E).

نبات بحري من مستورات الزهر ينتمي الى رتبة المشريات ومرتبة الخثيات الحمر . يتميز بمرجته الجامدة كأنها غضروفية وبضلعوه البارزة وبكثافة عروقه الدقيقة المتعرجة || اعطانه مجادح البحر الاحمر والمحيط الهندي . ينمو على الصخور المغمورة ويتشبت بها بمقاطع مستديرة الاطراف .

Blanc mat (F).

٢٣٣٦ - أَمْهَق ، أَرْشَق

White mat (E).

هو الابيض الداكن .

Dromaeus (S). Dromé, Emou,

٢٣٣٧ - أَمْو *٥

Emeu, Casoar d'Australie (F). Emu (E).

جنس طير من الموادي وفصيلة النعاميات . موطنه أستراليا



أَمْنَصِيَّة



أَمْو

٢٣٥٧ - أَمِيدَات Amides

مواد ازوتية عضوية متوسطة بين الاملاح الامونياكية والمواد الآحية. وهي من حيث القيمة الغذائية قريبة من الهيدروكربون.

٢٣٥٨ - أَمِير يَاسِر Carisse (F).

هو العرم نبات طبي بري من الدفليات.

٢٣٥٩ - أَمِيرِي ، جِيَانِي Fiscal

٢٣٦٠ - أَمِيلَاز Amylase (F).

اطلب شعيراز .

٢٣٦١ - أَمِينَات Amines

تراكيب ازوتية عضوية لها خواص القواعد توجد في الطبيعة اما طليقة او متحدة مع غيرها من العناصر بشكل املاح والامينات قد تكون احادية او ثنائية او ثلاثية وذلك بالنسبة الى ذرات الامونياك التي تدخل في تركيبها .

٢٣٦٢ - أَمِينِي Aminé (F). Amino (E).

هو ما كانت صفاته وخواصه صفات وخواص الامينات .

٢٣٦٣ - أَمِينِيَّات Amminées (F).

سبط من الفصيلة الصيوانية عديد الاجناس والانواع معظمها بري .

٢٣٦٤ - أَمِيَهَة Clavelée (F). Sheep-pox (E).

هي النخ اي جذري الغنم ، اطلبه .

٢٣٦٥ - أُنَابَاز ، بَاقِل ، سَعْرَان ، نَشْمَة

Anabasis articulata (S). Anabase (F). Berry bearing glasswort (E). Kalikraut, Beerige salzpflanze (D). Anabaside (I).

جنس جنات والنجم برية معمرة ين فصيلة السرمقيات . مهدها البلاد المعتدلة . انواعه قليلة منها طيبة تستعمل في بعض العلاجات المحلية ومنها صناعية كاناباز العجم الذي يستعمل في تنظيف الخسيل وتبييضه .

٢٣٦٦ - أُنَابِيْب شَعْرِيَة Vaisseaux capillaires (F).

Capillary-tubes (E).

هي الانابيب الدقيقة المستمرة النمو القائمة على جذور النبات والتي ترشف المياه وما حوته من عناصر واملاح .

٢٣٦٧ - أُنَابِيْب مَلِيْنِي Tubes de Malpighi (F).

Malpighian tubes (E).

هي شبكة القنوات الدقيقة التي ترد المبهولة وتصدر عنها .

٢٣٦٨ - أُنَارِف * ، أُنْجَبَار

Polygonum bistorta (S). Bistorte, Serpentaire (F). Bistort, Adder-wort, Snake-weed (E). Matterknöterich (D). Bistorta, Poligono ritorta (I).

نبات عشبي جذموري بري طبي من فصيلة البطباطيات . اوراقه قرصية التجميع معنقة طويلة المالحق ، سنانية النصل . ازهاره سنبل التجميع يرتكز على زناد منتصب طويل تحضنه بعض الوريقات . ازهاره صغيرة مرصوفة الصفوف المتتابة || يعد من القوابض ويستعمل في التطبيب .

٢٣٦٩ - أَنَاسِيْكُلُوس * ، قُنَيْطَسَة

Anacyclus (S). Anacycle (F). Long-wort (E). Ringkorbchen (D). Anacielo (I).

٢٣٥٠ - أُمُودَرُومٌ بَحْرِيٌّ * Ammodromus maritimus (S).

Ammodrome maritime (F).

طائر من فصيلة الشرشوريات . موطنه بعض مناطق المكسيك . يألف الشواطئ البحرية وضفاف مجاري الماء . يتسلق قصب الابهاء بحفة الهوازج || جسمه صغير القد يطول من ١٧ الى ١٨ سم . رأسه وظهره وذنبه الى السرة الزرقية الموج . عنقه وبطنه الى البياض العاجي . صدره الى الربعة . جناحه الى الصفار الكبريتي تعرضهما جدة سمراء . ويعملوه في رأسه من الجهة الى القفن جدة ربداء . حاجباه الى الصفار الزاهي . حدقه عينه بنية اللون . متقاده اسمر . زفده اريد . رسفاه الى السرة القائمة || قوته الحشرات والقشريات والرخويات || يدثن عشه في افحوص يحتفزه في التربة بين الاعشاب الكثيفة . الاثني تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٤ يوما .



أُمُودَرُومٌ بَحْرِيٌّ

٢٣٥١ - أُمُومَة Matriarcat (F).


Matriarchata, Matriarchy (E).

الأمومة او نظام الامومة ، ملجن اجتماعي ، يسود عند بعض الشعوب ، يخول المرأة السلطة المنزلية واعطاء اسمها لاولادها .

٢٣٥٢ - أُمُومِن اطلب هال حماما .

٢٣٥٣ - أُمُونِيَاك ، نَشَادَر ، نُوَشَادَر Ammoniac

غاز تركيبه الكيماوي ذرية من الأزوت وثلاث ذريات من الهيدروجن || يحصل طبيعياً في المراحيض والاصطبلات ويستخرج من ملح الأمونياك .



أَمِيْب

٢٣٥٤ - أَمِيَّات Amlidae (S).

Amiides (F). Amlidae (E).

فصيلة اسماك من اللامعات . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة معظمها من متحجرات الحقبة الطباشيرية واولئل الاباج الثاني . اما المعاصرة منها فاعطانها انهر وبحيرات امريكة الشمالية || اعرف اجناسها واشهرها الآمِيَة .



آمِيَة

٢٣٥٥ - أَمِيْب * ، نَغَاضَة Amlbe (F).

Ameba, Amoeba (E).

حيوان مجهرى من الاوالي الجذريات وهو ادنى وابسط حيوان مخلوق . جسمه كتلة من الجبلة ، مجهرية ، شبه مائعة كاهلام || يتكون من خلية واحدة وخليته مركبة من طبقتين من البلازما في وسطها نواة وفجوة لحفظ الغذاء اللازم لها . والأميب يتغذى ويتكاثر كغيره من الكائنات الحية ويكون تكاثره بالانقسام الى خليتين بعد استطالة النواة وانقسامها ثم اختناق جسم الخلية من الوسط حتى يتم الانفصال .

٢٣٥٦ - آَمِيَّة * Amia (S).

Amie (F). Amia (E).

جنس اسماك نهريه من اللامعات وفصيلة الآميات . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم انهر وبحيرات امريكة الشمالية || اجسامها كبيرة شبه وشعية الشكل تطول من ٤٥ الى ٦٥ سم . زعانفها الظهرية فردية مستطيلة . زعانفها الذيلية مستديرة الطرف . اسنانها صغيرة حادة عديدة الصفوف . سفها كبير القد ، مقوس الشكل || لحومها مأكولة وتستعمل استعمال الطون .



أُنَارِف

٢٣٨٢ - أنبار ، شونة ، قداء ، هري

Grenier (F). Loft (E).

هو المكان المد لحفظ الغلة وخزنها . الجمع انابير وشوان وأفدية وأهراء .



أناسكلوس

٢٣٨٣ - أنباس

Anabas (S).

Anabas (F). Anabas (E).

جنس اسماك نهريه من شائكات الزعانف وفئة البلعوميات التيهية . انواعه المعروفة قليلة موطنها نهر الهند والهند الصينية والصين . جميعها تخرج من الماء وتسرح من ساعتين الى ست ساعات دون او تتأذى || اعرف انواعه واشهرها الانباس المتسلق .

٢٣٨٤ - أنباس متسلق

Anabas scandens (S). * Anabas grimpeur, Anabas sennal (F).

نوع من الانباس يكثر وجوده في نهر الهندوس . جسمه شبه اهليلجي الشكل ، معتدل التهييط ، يطول نحو ١٧ سم . رأسه صغير القد ، قصير الخطم ، معتدل الشدق . عيناه صغيرتان ، ناشرتان . زعنفته الظهرية مستطيلة ، كثيرة المناخس الخادة . زعنفته الشرجية كثيرة المناخس ايضاً مما يؤهلها على تسلق النبات والانتقال من مكان الى مكان . ثوبه الى الخضار البحري القضي الموج || لحمه جيد الصنف ، مرغوب فيه .



أناكدة

٢٣٨٥ - أنبة ، بادنجانة

Aubergine (F).

Mad-apple (E).

الأنتب والأنتب : الباذنجان ، واحده ابة عن ابي حنيفة .

٢٣٨٦ - أنسج ، منغا ، منجا ، منغو ، منجو عنباً

Mangifera indica (S).

Manguier, Mango (F). Mango, Mango tree (E).

Mangobaum (D). Mango, Mangifera comune (I).

جنس اشجار مثمرة من سبط الراتنجيات وفصيلة البطليات . انواعه قليلة يقال انها ثلاثة او اربعة . اما ضروريه فعديدة لا تقل عن ٤٠٠ وهي على ازدياد مستمر . اشهرها الضروب الهندية المؤصلة والامريكية المستنخة والافريقية المهجنة . الشجرة كبيرة دائمة طناية الامدد يراوح ارتفاعها من ١٠ الى ٢٥ م . الساق منتصبة متوسطة الغلط . القشور ملساء الجراة في دوري النشوء والنمو السريعين ؛ ثم صلف اللحاء من دور البلوغ حتى القحمة || الفروع والاغصان كبيرة ، الافناد والافناد متشابكة . الاوراق كثيفة متقابلة معنقة سنانية النصل الاخضر القاتم || الازهار عنقودي التجميع ، محوري وطرفي الارتكاز . الازهار صغيرة القد حمر . الثمار نووية ، كلوية الشكل ، كبيرة الحجم يراوح وزن الواحدة منها من ٩٠ الى ١٠٠٠ غرام . قشورها جلدية سميكة لونها الى الخضار الاحمر والخضار الاصفر . لبها ليني التركيب لاصق بالعصارة ، اصفر اللون ، غزير المادة والعصارة . وهو لذيق الطعم . يؤكل ويربب ويمصر شرباً الى آخره ، يحوى بعض الفيتامينات واخصها فيتامين « آ » وفيتامين « ث » || يستخرج من جذوع الانسج صمغ يستعمل في معالجة الامراض التناسلية واخصها السفلس . لباب عجمته طارد للديدان المعوية . ويستخلص من بول الحيوان الذي يعتلف اوراقه صباح اصفر يعد من اثبت الصباغات وازهارها لوناً || يتكاثر بالبذر والتدريج غير ان البزور لا تصدق دائماً في نقل الصفات والميزات الخاصة لذلك يجب الاعتماد على التطعيم || وهو من الاشجار المعمرة



أنباس متسلق



أنبة

جنس نباتات عشبية برية من فصيلة المركبات . انواعه قليلة بعضها حولي والآخر معمر . ومنها الزباء والمرطاء . موطنها اوروبية الجنوبية وبعض مناطق حوض البحر المتوسط .

٢٣٧٠ - أناص

حل النخل المدرك . أناص النخل : اينع .

٢٣٧١ - أناغورس

اطلب ينبت .

٢٣٧٢ - أناغورس طبي

اطلب ينبت ثن .

٢٣٧٣ - أنافج

Withania (S).

Withanie (F). Withania (E).

جنس نباتات جنبية ، طبية ، معمرة من فصيلة الباذنجانيات . انواعه المعروفة قليلة العدد منها بعض المناطق الحارة من البلاد الاسيوية والافريقية والامريكية || جميعها جنبات متباينة الحجم . سوقها فرعاء . اوراقها متعاقبة ، أبدية ، نصائح سنانية الشكل ، جامدة اللون ، جميلة الخضار الانس . ازهارها محورية غشوية صفراء اللون . ثمارها نووية . بذورها صلبة مستديرة سمراء اللون || اشهر انواعها الثلاثة التالية .

٢٣٧٤ - أنافج كدن

Withania frutescens (S).

Withanie frutescente (F).

نوع من الانافج . منها بعض مناطق افريقية الشمالية . تكثر في جنوب المغرب || جنبها داسية فرعاء . مسحوق بذورها يستعمل استعمال المسوة في تجميد الحليب . نقيع اوراقها يدر البول .

٢٣٧٥ - أنافج مسوي

Withania coagulans (S).

Withanie coagulante (F).

نوع من الانافج . منها يمتد من الافغان الى الهند الشرقية || جنبها كبيرة فرعاء تعلو نحو اربعة امتار . اوراقها مدرة للبول . مسحوق بذورها يستعمل استعمال المسوة .

٢٣٧٦ - أنافج مسوم

Withania somnifera (S).

Withanie somnifère (F).

نوع من الانافج . مهدا الهند والشرق الاوسط وامريكية الجنوبية || جنبها معتدلة الارتفاع ، كثيرة الفروع والاوراق . اوراقها وبزورها تخدر الاعصاب وتنوم . نقيع اوراقها يدر البول . مسحوق بذورها يجمع الحليب كالمسوة .

٢٣٧٧ - أناكندة* (الكولة)

Eunectes murinus (S).

Anaconda, Eunecte murin (F). Anaconda (E).

اصلة عظيمة مبتلعة غير سامة رقتاء الثوب ، طولها نحو العشرة امتار . مهدا امريكة . تقتنص طريقتها في البر والبحر وقد تقتحم البيوت المنفردة حيث لا تمنع عن شيء حتى الاولاد .

٢٣٧٨ - أناس

اطلب أناس .

٢٣٧٩ - أنب

هو الباذنجان ، اطلبه .

Germination

٢٣٨٠ - إنبات

اطلب انتاش .

Centrifugation (F).

Centrifugalization (E).

٢٣٨١ - إنباد ، نبذ

تفريق الاجسام بواسطة القوة النابذة .

التي تعيش أكثر من ١٢٠ سنة والتي يمكن تقسيم أدوارها الحياتية على الشكل التالي :

دور النشوء البهي* الذي يدوم نحو ١٠ سنوات .
دور النمو السريع الذي يدوم نحو ٢٠ سنة .
دور البلوغ والاستقرار الذي يدوم نحو ٥٠ سنة .
دور الانحطاط الذي يدوم نحو ٣٠ سنة .
دور القحامة الذي يدوم نحو ١٠ سنوات .

أفضل تربة تصلح لزراعته التربة الخوارة أو الرسوبية الخفيفة المتوسطة الاندماج وقد يعيش في التربة الرملية ولا يخشى سوى الآتربة المندجة الشديدة التماسك || زراعته في لبنان تعود الى أربعة عقود ولا تزال محصورة في بعض المواقع الساحلية ، قرب الشواطئ* . لانه من الاشجار التي تخشى الصقيع والرياح الباردة .

٢٣٨٧ - أنبج Brun terne (F).
هو اللون الاسمر الاكدر . تراب انبج (اللسان) .

٢٣٨٨ - أنبج Centrifuger (F). To centrifugalise (E).
فرق ، بعضها عن بعض ، الاجسام المختلفة الكثافة والوزن النسبي بالقوة المسماة القوة النابذة .

٢٣٨٩ - أنبجباريس اطلب برباريس .

٢٣٩٠ - أنبجس مالنيس Tamier commun (F).
هو الفاشرشين المبدول ، اطلبه . اما اسم انبلس مالنيس فن وضع ابن البيطار .

٢٣٩١ - أنبجوب وعاء Vaisseau (F). Tube, Duct (E).
قناة دقيقة توجد في نسيج جميع النباتات الوعائية ، وظيفتها نقل النسج والطل والمصاراة ...

٢٣٩٢ - أنبجوب التنفس Trachée (F). Trachea (E).
عضو من اعضاء جسم الحشرات .

٢٣٩٣ - أنبجوب شعري Tube capillaire (F).
ج . انابيب شعرية ، اطلبها . Capillary tube (E).

٢٣٩٤ - أنبجوب Tubulaire, Tubuleux (F).
ما كان شكله كالانبوب . Tubuliform, Tubulate (E).

٢٣٩٥ - أنبجوبات الأحاديد Solénoglyphes (F).
Solénoglyphes (E).

رتبة من الحيوانات الزاحفة تضم اليها اخبث الحيات التي تنتمي الى فصائل الافاعي الحنثية والجلجليات وغيرها .

٢٣٩٦ - أنبجوبة الزهر Tubuliflores (F).
سبط من فصيلة المركبات التي تعد ثلاثة اسباط . اجناسه وافواحه كثيرة العمد تتميز بازهارها الانبوية الشكل اشهر انواعه القنطريون والأبسلت والحرف .

٢٣٩٧ - أنبجور* Alphitophagus

جنس خنافس من فصيلة الغبشيات جميعها صغيرة القد تطول من ٢ الى ٥ سم . ثوبها حنطي يملوه بقع او خطوط عرضية شديدة السمر || يرقاتها صغيرة مؤذية تعيش تحت لحاء الاشجار وفي مخازن الحنطة وعسل الحبوب المكسورة تكافح باستعمال بعض الحواشير المعدة للحبوب المخزونة المأكولة .



أنبور



أنبور معصب

٢٣٩٨ - أنبور معصب* Alphitophagus bifasciatus (S).
Alphitophage double bande (F).
Alphitophagus bifasciatus (E).

حشرة مؤذية من فصيلة الغبشيات ورتبة معمدات الاجنحة . موطنها معظم اصقاع العالم القديم والجديد . يرقاتها مؤذية تعيش تحت لحاء الاشجار وفي مخازن الحنطة والاهراء على الحبوب المكسورة || جسمها صغير القد يطول من ٢ الى ٣ سم . رأسها مربع الشكل ، اسمر اللون . عيناها صغيرتان . زباناها خيطيان ، اشعثان . ظهرانها الى السمر الحنطية العابقة تعلوها جدة وسطى مستعرضة سوداء ، وجدة ثانية قليلة العرض ، قريبة من الطرف ، اقل اسوداداً من الاول || لها جيلان في الحول . تسرح في الليل وتبيت في النهار || تظهر خنفساء الجيل الاول في اوائل نيسان ويندم هذا الجيل نحو ١٦ اسبوعاً || وتظهر خنفساء الجيل الثاني في اوائل شهر آب ويندم هذا الجيل نحو ثمانية اشهر || طور الاكمال ، في الجيل الاول ، يستمر نحو ١٢ يوماً ، ويستمر في الجيل الثاني نحو عشرة اسابيع .

٢٣٩٩ - أنبوش ، أنبوشة Arrachis (F).
Plant rooted up, Rooting-up of young trees (E).
هي الاغراس او الاشجار المقلوعة من التربة .

٢٤٠٠ - أنبج راجع إنبج .

٢٤٠١ - إنتاج ، إغلال Productivité du sol (F).
Productiveness of soil (E).
صفة التربة ومقدورها الانتاجي من مختلف المحاصيل .

٢٤٠٢ - إنتاج ، إنبات Germination
الانتاش هو ظهور نثيط البزرة بعد تطور حياتها من الحالة الكامنة الى حالة النشوء . ولا يتم الانتاش الا بظروف خاصة ملخصها : ان تكون البزرة حية وان تتوفر لها حاجتها من الماء والاكسيجن في وسط يلم بالحرارة الضرورية || راجع قابلية الانتاش وقوة الانتاش .

٢٤٠٣ - إنتاجي ، نسائي ، رشيمي ، إنباتي Germinatif (F). Germinal (E).
كل ما له علاقة بالانتاش ومقدوره الحيوي الكامن .

٢٤٠٤ - إنبج Forjet (F). Jatting out (E).
ننوء يخرج عن التوازن العمودي .

٢٤٠٥ - إنبج Transhumance (F).
The custom of moving the flocks (E).
ذهاب الماشية لطلب الكلأ وارتباده في مواضعه .

٢٤٠٦ - إنبج Dirigisme (F).
Dirigism (E).

مذهب سياسي يدين بالاقصاد الموجه تدير شؤونه السلطة الحاكمة .

٢٤٠٧ - إنبج Sélection (F). Selection (E).
الانتخاب هو تجري وانتقاء اجود السلالات . وعندما يقصد به احدى طرائق الاسفاد يكون قوامه اسفاد ذكر وانثى من نوع واحد وسلالة واحدة كإزاء جواد عربي صقلاوي على حبر عربية صقلاوية .

٢٤٢٣ - **إنتقال** Mutation (F). Transfer (E).
انتقال الملكية أو التصرف بالوراثة أو بالبيع أو بالمبادلة أو بالهبة .

٢٤٢٤ - **إنتقال** Locomotion

٢٤٢٥ - **إنتقال** Translation (F).
Translation (E).
ومنها السرعة الانتقالية والدورة الانتقالية .

٢٤٢٦ - **إنتقالية** Locomotilité (F). Locomotility (E).

٢٤٢٧ - **إنتقائية** Selectionnisme (F).
Selectionnism (E).
نظرية علمية تستصوب وجود الانتقاء الطوعي أي الطبيعي في البيولوجية .

٢٤٢٨ - **أنثلة** اطلب أكونيت .

٢٤٢٩ - **أنثلة سوداء** * ، جندوار أندلسي ، طواره

Aconitum anthora (S). Aconit anthora, Anthore, Maclou (F). Yellow helmet flower, Wholesome aconite (E). Fahler sturmhut, Anthorenwurz (D). Aconito salutifero (I).

نوع من البيش ، الأكونيت ، ينتمي إلى فصيلة الجوزانيات وهو نبات عشبي معمر ، يزرع للتزيين . || يتكاثر بالبذور والفسائل . يرغب في الأتربة الحوارة القليلة الاندماج || يبذر في أوائل الربيع ويشتل في أواخر حزيران فيزهر بعد عام وازهاره يدوم طوال الصيف .

٢٤٣٠ - **أنثوسبوريوم** Entomosporium
جنس فطور مجهرية من فصيلة الهدكيات يعرف بالغضاء ، اطلب غضاء .

٢٤٣١ - **أنثولوجية** Entomologie (F).
Entomology (E).
هي علم الحشرات يبحث في تركيب وأطوار وطبائع وتصنيف الحشرات وأضرارها ومكافحتها .

٢٤٣٢ - **إنتهاب** اطلب إيذاء .

٢٤٣٣ - **إنتهائية** Opportunisme (F).
Opportunism (E).
سلوك الأشخاص الذين ينتهزون كل فرصة ملائمة غير مباليين بالمبادئ .

٢٤٣٤ - **إنتهائية** Violabilité (F).
Violability (E).
حال الاتساق وصفت .

٢٤٣٥ - **أنثوريث** * ، شينزيا Entorhiza, Schinzia
جنس فطور مجهرية من فصيلة النخريات تتميز بدمائها النامية في نسج الجذور حيث تبدو كأنها بشور قرنية قطر البيرة نحو السنتي || بوغها غليظ الغلاف اللاتياسي تكثر فيه الأشكال الريمية المحيطية || أنواعه عديدة تتطفل على الأسليات والسعديات .

٢٤٣٦ - **أنثوفيت** Entophyte
اطلب طفيلي باطني .

٢٤٠٨ - **أنثرائين** Anthracénine (F).
ماكون زراعي سائل التركيب يرتكز على زيت القطران يستعمل محلولاً بالماء بمعدل ٦ ٪ في المكافحة الشتوية ضد مكن الحشرات من أي نوع كانت وضد بعض الأمراض الفطرية .

٢٤٠٩ - **أنثراسيت** Anthracite
نوع من الفحم الحجري قصير اللهب بطيء الاشتعال ، لا رائحة له ولا دخان .

٢٤١٠ - **أنثريل** Anthryl
ماكون زراعي سائل التركيب يرتكز على زيت القطران يستعمل محلولاً بالماء بمعدل ٧ ٪ في المكافحة الشتوية ضد مكن الحشرات من أي نوع كانت وضد بعض الأمراض الفطرية .

٢٤١١ - **إنتشار** Diffusion (F).
Diffusion, Diffusiveness (E).
خاصة في بعض الاجسام وهي أن تنتشر في كتلة مائعة وان تحترق أغشية النافذ .

٢٤١٢ - **إنتظام الاوراق** Phyllotaxie (F).
Phyllotaxis (E).
هو نظام ترتيب الاوراق على الفصيص .

٢٤١٣ - **إنتظام العروق** Nervation (F).
Nervation, Nervature (E).
هو ترتيب وشكل عروق النصل في الورقة .

٢٤١٤ - **إنتفاخ** Gonflement (F). Swelling (E).
اطلب ارتفاع .

٢٤١٥ - **إنتفاخ** Hygroma
عارض يصيب اطراف الدابة فيسبب الانتفاخ المصلي او الفيحي .

٢٤١٦ - **إنتفاخ العرقوب** Capelet (F).
Capped hock (E).
انتفاخ رخو يحصل في رأس العرقوب عند الخيل .

٢٤١٧ - **إنتفاس** Foisonnement (F). Expansion (E).

٢٤١٨ - **إنتفاع ، إستمتاع** Jouissance (F).
Enjoyment, Use (E).
هو الانتفاع من دخل المال في مختلف وجوه استخدامه .

٢٤١٩ - **إنتفاع وقتي** Recréance (F).
Recredence (E).
هو الاستمتاع الوقي بأرباح ايراد متنازع فيه .

٢٤٢٠ - **إنتقادي** Criticiste (F).
Critical philosopher, Kantian (E).
من كان يدين بمذهب الانتقادية .

٢٤٢١ - **إنتقادية** Criticisme (F).
Critical philosophy (E).
مذهب فلسفي يشتر به العلامة « كانت » قوامه ان محور الابحاث الفلسفية هو انتقاد مطالبها .

٢٤٢٢ - **إنتقاص** Réduction (F). Reduction (E).
اطلب تخفيض .



أنثلة سوداء



أنثوريث

من البراز والمواد النباتية ينفلق عند انطلاق الحشرة. تسرح نحو سبعة أيام ثم تتوارى عن الانظار وتستكن في كل مكان يؤمن لها الحماية حتى مطلع شهر نيسان حيث تعود الى نشاطها فتتابع ادوارها الحياتية المرسومة.

٢٤٤٢ - أنتونوم الزعرور *

Anthonomus rectirostris (S). Anthonomie de l'aubépine (F).

حشرة من فصيلة السوسيات ، طولها نحو ٤ مم. تعيش على ازهار اللوز والكرز والمشمش والزعرور. تمتنع مكثراً على الزهرة العاقدة بعد سقوط التويجات فينقف عن يرقات تدخل النار وتعيش فيها || يكافح باستعمال احد الحواشير عند سقوط التويجات الزهرية.

٢٤٤٣ - أنتونوم الشيلك *

Anthonomus rubi (S). Anthonomie du fraisier (F). Strawberry blossom weevil (E). Himbeerblütens techer (D).

حشرة من السوسيات صغيرة القد ، طولها نحو ٣ مم. لونها الى السواد الدكن يعلوها رقشة الى الصهبة وزغب خفيف اطحل. تعيش على الشيلك والكشمش والعليق والورد والنسرير || تمتنع الانثى مكثراً داخل الازهار وفي كل زهرة مكثرة تنقف عن يرقة تسبب الملاحها || يكافح عند ظهوره باستعمال احد المساحيق الفعالة تمهيداً على الازهار.

٢٤٤٤ - أنتونوم اللوز *

Anthonomus ornatus (S). Anthonomie de l'amandier (F). Almond Weevil (E).

حشرة خاضعة من فصيلة السوسيات ورتبة مغمدات الاجنحة. موطنها الضفة الشرقية من حوض البحر الابيض المتوسط. تألف الملازم من السواحل الى اعالي الوسط. خنافسها تعيش على نصال الاوراق وضلعها. يرقاتها تعيش داخل البراعم الورقية والزهرية || جسمها صغير القد يطول من ٣ الى ٤ مم. ثوبها الى السمرة العابقة. رأسها صغير الجرم ناقى الارتكاز. عيناها صغيرتان. زباناها مرفقيان ، صولجانيا الاطراف. غمداها منتظمتا التحريز || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في اذار. تسرح في النهار وتطير من شجرة الى شجرة ، قوتها نصال الاوراق وضلعها، نحو ٥ يوماً ثم تتوارى عن الانظار وتستكن في كل مكان يؤمن لها الاختباء الى ان ينقضي زمن البيات فتعود الى الظهور في تشرين الثاني. تعاظم بعد ظهورها باسبوع واحد ثم تبشر الانثى رز المكن في البراعم فتثقب البرعمة وتأكل ما تقضمه ثم توجه اشرتها نحو الثقب وترز فيه المكنة || اليرقة عند تمام ادراكها تطول نحو ٦ مم. وهي مرقالة ، مقوسة ، مستغلظة البطن ، عاجية اللون ، سمراء الرأس والشرح ، قوية التأشير ، تعيش على ما تلهمه من محتويات البرعمة ثم تتحول في المكان نفسه الى حورية ومنها الى حشرة جلانة تظهر في اذار.

٢٤٤٥ - أنتونوم قبرص *

Anthonome de Chypre (F).

حشرة من السوسيات تدعى انتونوم الدراق ، اطلبها.

٢٤٤٦ - أنتياريس *

Antiaris (S). *Antiaris* (E).

جنس نباتات شجرية برية من فصيلة الانجريات. انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض المناطق الحارة من الهند

٢٤٣٧ - أنتوكريس الصليبيات

Anthocharis des crucifères (F).

فراشة تدعى غرة بحيلة ، اطلبها.

٢٤٣٨ - أنتوكسانت * ، تجيل عطر

Anthoxanthum odoratum (S). Anthoxanthe, Flouve odorante (F). Spring grass, Sweet vernal grass (E). Ecthes ruchtgras, Wilder lavendel (D). Antossano, Paleino odoroso (I).

عشبة برية مرعوية معمرة من فصيلة النجيليات تكثر في المراعي الطبيعية وتوجد في الاراضي البور. ترغب فيها الماشية ولا سيما الاغنام || ازهارها فستقية اللون ، عرفها فواح منعش. يستخرج منها جوهر الانثوكسانتين «Anthoxanthine» وهو خضاب النبات الاصفر لستري الشكل يشبه الراتنج لا يذوب في الماء بل في الايتر والكحول.

٢٤٣٩ - أنتونوم الإجاص *

Anthonomus piri (S). Anthonomie du poirier (F). Apple bud weevil (E). Birnknochenstecher (D).

حشرة من فصيلة السوسيات ورتبة غمديات الاجنحة. طولها نحو ٤ مم. لونها امغر عابث. يرقاتها تعيش داخل البرعمة الزهرية فتتقضي عليها || تكافح باستعمال احد الحواشير واخصها الد.د.ت. وذلك في خلال شهر ايلول عندما تجتمع الحشرات للكوم وقبل متع مكثراً.

٢٤٤٠ - أنتونوم التفاح *

Anthonomus pomorum (S). Anthonomie du pommier (F). Apple blossom weevil (E). Apfelblütenstecher (D).

حشرة من فصيلة السوسيات ورتبة غمديات الاجنحة. طولها نحو ٤ مم. لونها الى السمرة يعلوها بقع بيض وزغب اطحل تمتنع الانثى مكثراً في البراعم الزهرية عند اكتمالها فينقف عن يرقات صغيرة تدخل النورة وتعيش فيها فتتقضي على الزهرة || يكافح باستعمال احد الحواشير عند الاكاح وذلك للقضاء عليه قبل ان يتمكن من متع مكثراً.

٢٤٤١ - أنتونوم الدراق * ، أنتونوم قبرص *

Anthonomus cyprus (S). Anthonomie du pêcher, An. de Chypre (F). Peach weevil (E).

حشرة من فصيلة السوسيات. يبدو ان موطنها الاصلي كان جزيرة قبرص وقد انتقلت الى تركيا واليونان وسورية ولبنان || جسمها صغير القد ، اهليلجي الشكل ، يطول من ٤ الى ٦ مم. ثوبها الى الكستني الاشقق الموج. رأسها مخروطي القاعدة ينتهي بخطم مستقيم مستطيل. زباناها مرفقيا الشكل ، عشاريا الفصل ، حقيقا الاطراف || الانثى اميز قدماً من الذكر اطول خطماً منه واهت ثوباً. لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة ابتداء من شهر نيسان وتبقى حتى اواخر ايار. تسرح في النهار وتبيت في الليل. قوتها الخلايا النباتية والمواد الخاضعة || تسافد بعد ظهورها بمدة قصيرة وتبشر متع المكن في البراعم الخشبية والزهرية منذ اليوم التالي للكوم ولكنها لا ترز في اليوم الواحد والثقب الواحد اكثر من مكثرة. زمن التمكث يستمر نحو ثلاثة اسابيع || ينقف المكن بعد رزّه بنحو ٧ ايام عن يرقات دقيقة نحيلة تتطور بسرعة وتبلغ الادراك بعمر ٢٤ او ٢٦ يوماً. فيصبح طولها نحو ١٠ مم. وهي مرقالة سكرية اللون ، شبه اسطوانية الشكل ، مستدقة الرأس الجذوري ، مقطوعة الطرف الاسمر || طور الاكمال يستمر نحو ٨ ايام وينقضي ضمن غشاء



أنتوكسانت



أنتونوم الإجاص



أنتونوم التفاح



أنتونوم الدراق



أنتونوم الزعرور



أنتونوم الشيلك



أنتونوم اللوز



أنتياريس



أنثياس



أنثيلوم الأحموان



أنثيلوم الحشخاش



أنثيلوم الذهبية



أنثيمس



أنثيليس

تبدو طحلاء ثم بيضاء ثم وردية وتستقر على السمرة الحنطية المايقة الاطار || وهو من الاوصام الكثيرة الشيوع القليلة الاضرار التي لا تستوجب المكافحة الجذرية .

٢٤٥٥ - أنتيلوم الحشخاش * Entyloma fuscum

فطر مجهري يصيب اوراق الحشخاش . مظهره الخارجي يقع مستديرة قطرها يراوح من ٣ الى ٦ مم . تبدو بيضاء اللون ثم حنطية فسمراء تكتنفها أطواق مضر || طيالس الفطر حنطية تغلفها غشاوة دقيقة شفافة البشرة الخارجية ملونة الداخلية . بوعها ملمس سريع الجفاف والانتشار .

٢٤٥٦ - أنتيلوم الذهبية * Entyloma dahliae (S).

فطر مجهري يصيب الذهبية (الاصالية) على اختلاف انواعها || مظهره الخارجي يقع صغيرة تعلو نصل الاوراق السفلى فتبدو مبعثرة على صفحة النصل ثم تنتشر وتلتحم بدون قياس كالترنج المختلف الالوان من الاطحل الى الفستقي فالحنطي فالاسمر الرصاصي الموج || يكافح أولاً بقطع الاوراق المصابة حين ظهور الوصم . ثانياً بنضج الشتول المصابة اما بسائل يورده المحلول ١٪ او بكميوات النحاس المحلول ٠.٣٪ || ومن الضروري اجتناب زرع الذهبية في المواقع القليلة الرطبة .

٢٤٥٧ - أنتيمس * Entimus (S). Entime (F).

جنس حشرات من غديات الاجنحة وفصيلة السوسيات . انواعه المعروفة ستة . اعطائها المناطق الحارة من العالم الجديد . جميعها خاضعة تركيب الكثير من النباتات الحرجية || اجسامها كبيرة القد تطول من ٥ الى ٦ سم . رؤوسها صغيرة قرونها الاستشعارية مرققة . كوائها مقرنة . اغمارها محنية محدودة المؤخر يعاوها تخديد قاطب وتخزين معترض . اوائها تراوح من الاخضر المذهب الى النحاسي والذهبي .

٢٤٥٨ - أنتيموان هو الأثم ، اظله .

٢٤٥٩ - أنتين Intine

هو غلاف الجذرة الداخلي الذي يبطن الاكسين والذي توجد في جوفه خليتا التناسل والزاد ضمن السيئوبلازمه .

٢٤٦٠ - أنتيناريه اطلب رجل القط .

٢٤٦١ - أنثيليس * Anthyllis cretica.

Ebenus cretica (S). Anthyllis, Ebenier de Crète, Polyporon (F). Cretan silver bush (E). Cretisch wolblume (D). Ebano di Creta, Ebano di Candia (I).

جنية برية حرجية شائكة من فصيلة القرنيات . يكثر وجودها في مرتفعات حوض البحر المتوسط || اوراقها مركبة طويلة المعاليق . ازهارها الى الحمرة . ثمارها قرون مستدقة رقيقة تغلف بذور صغيرة مفلطحة حادة الرائحة ازهارها منثرية تجرسها النحل . بذورها قابضة كانت تستعمل في التهابات الرحم مزوجة بدهن الرد .

٢٤٦٢ - إنشياء ، إنشياء Flexion (F).

Bending (E). حالة الشيء المنعطف ، المنثي .

٢٤٦٣ - أنشور يوم * Anthurium (S).

Anthurium, Anthurium (F). Tall flower, Flamingo plant (E). Schwanzblume, Blüten-schwanz (D). Anthura (I). جنس نباتات عشوية معمرة برية وزينية من فصيلة

وجاوا واسترالية || سوقها منتصبه ، جالسة . اوراقها معتقة ، متعاقبة ، اهليلجية النصال . ازهارها محورية وحيدة المسكن . ثمارها ثنوية وحيدة البزرة || اشهر انواعه الانتياريس الجحالي .

٢٤٤٧ - أنتياريس جحالي Antiaris toxicaria (S). Antiaris toxique (F).

نوع من الانتياريس . شجرته منتصبه ، رفيعة ، تعلو نحو ٢٥ م . منبها جاوا . فروعها متباعدة ، صغيرة . اوراقها معتقة ، متعاقبة ، سنانية النصال . ازهارها محورية الارزكاز ، وحيدة المسكن ، صفراء اللون || يستخرج من لحائها بالحز عصارة لبنة صفراء اللون جحالية المادة تدعى « أنتيار » كانوا يستعملونها في طلاء الحراب والنبال .

٢٤٤٨ - أنثياس * Anthias sacer (S).

Barbier lutjan, Anthias, Barbier de la Méditerranée (F). Anthias sacer (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة الصرانيات ورثة شائكات الزعانف . اعطائها تشمل معظم خلجان واصواج البحر الابيض المتوسط وتعتبر من اجل اسماكها || جسمها اهليلجي الشكل يطول نحو ١٥ سم . ثوبها الى الوردي الزاهي يعلوه موج ذهبي باستثناء البطن الفضي الموج . قمة رأسها ومحررها مبقجة بالحنطي الازرق التوشيح . زعنفتها الظهرية مستطيلة ، شائكة النصف الاول . الحوضية تنتهي بسنان ذرب مستطيل . الذيلية هلالية الشكل ، دقيقة الطرفين اللامتساويين || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

٢٤٤٩ - أنتيروش Antibruche

حاشور زراعي يرتكز على مادة تتراكلورير الكربون . يستعمل لوقاية الحبوب المعدة للحفظ والاكل من عيش الحشرات بمعدل ٣٠٠ سم ٣ لكل مائة كيلو من الحب .

٢٤٥٠ - أنثيجين Antigène (F). Antigen (E).

نعت تعريفي يطلق على كل مادة تتحلل بطاقة الاحداث عند ادخالها في الكائن الحي .

٢٤٥١ - أنتيريئسم

هو السيم جنس نباتات برية وزراعية تر ييشية عديد الانواع والضروب ، اطلب سيم .

٢٤٥٢ - أنتيكور Anticorps (F). Antibody (E).

مادة نوعية خاصة تظهر في مصل الكائن الحي عندما تحاطه مادة غريبة .

٢٤٥٣ - أنتيلوم Entyloma

جنس فطور مجهرية من فصيلة النخريات يركب نباتات فصائل المركبات والحشخاشيات والحوذانيات والنجليات البرية وبعض الخيميات || يصيب النسيج النباتية في الميزوفيل حيث ينمو ويتكاثر فيسبب انفجار بشرة النسيج وظهور بوعه الفحشي الهبابي || انواعه عديدة ، اشهرها الثلاثة التالية :

٢٤٥٤ - أنتيلوم الأحموان * Entyloma calendulae (S).

فطر مجهري يصيب جميع انواع الاحموان . مظهره الخارجي يقع مستديرة قطرها نحو ٧ مم . تعلو نصل الاوراق .



أنثوريوم



أنجاذن



أنجاذن المعجم



أنجاذن رومي



أنجهر هندي



أنجونه الخوخ



أنجيلونية

جنبه ترينية معمرة من فصيلة الخبازيات. أوراقها متعاقبة حاضنة بيضيه النصل منشارية الحافة || أزهارها ابلي او تاجي الارتكاز. أزهارها كبيرة بحيلة الشكل خماسية البتلات تبدو عند انبلاجها برتقالية اللون ثم تتحول الى ارجوانية.

٢٤٧٥ - أنجرونه الخوخ *

Angerona prunaria (S). Angerone du prunier (F). Angerona prunaria (E).

حشرة من الارليات ورتبة حرشفيات الاجنحة. موطنها بعض اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط والاقاليم الداخلية المتاخمة. فراشتها جause قوتها رحيق الازهار. سرفتها خاضعة قوتها اوراق الخوخ البري وسائر الورديات || جسمها متوسط القد يطول من ١٥ الى ١٧ سم. بسطتها تراوح من ٤٨ الى ٥٢ سم. رأسها معتدل الحجم، برتقالي اللون. عيناها كبيرتان ناشزتان. زباناها مشعطان مزدوجان عند الذكر، خيطيان عند الانثى. جوشنها وبطنها الى البرتقالي عند الذكر، والى المغرة الصفراء الموج عند الانثى || روشنها الاماميان الى البرتقالي المشيط بالاكلف عند الذكر والى المغرة الصفراء الموج عند الانثى. روشنها الخلفيان كالامامين. اهدابها الى الشققة || لها جيل واحد في الحول. تظهر الفراشة في ايار وتبقى حتى تموز. تسرح في الليل. تسافد بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع. تمتع المكن لطفاً تغلفها مادة غروية تثبتها في مكانها || السرفة. عند الادراك التام تطول نحو ٣٤ سم. جسمها اسطواني الشكل تعلوه ثلاثة ازواج من الشمول المتعاقبة. ثوبها يماثل الموقع وهو غالباً بلون الاغصان. رأسها وثعوطا الى السمرة القائمة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينتضي ضمن صلتجة تحبكها السرفة بين ورتين او عدة اوراق تجمعها الى بعضها.

٢٤٧٦ - أنجربيات، غارغاجيات (S). Ulmaceae

Ulmacées (F). Ulmaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديمة القعالات تشمل سيط البوقيصيات وسيط الميسيات. انواعها عديدة جميعها عسيمة اللحاء (خالية من العصارة). معظمها اشجار حرجية وبعضها صناعي وزيني.

٢٤٧٧ - أنجلينه Ferreira spectabilis (S).

Angéline (F).

شجرة راتنجية حرجية من الصفيراء وفصيلة القرنيات الفراشية. يكثر وجودها في الاحراج البرازيلية. يستخرج منها بالخر صمغ راتنجي تجاري لا بأس به.

٢٤٧٨ - إنجهداد، إستصراد Congélation,

Cryoscopie (F). Congelation (E).

يتجمد الماء الصافي عند بلوغ حرارته درجة الصفر تحت ضغط جوي معلوم مقداره ٧٦٠ مليمتراً. اما اذا اضيف الى الماء بعض الملح فتتخفض نقطة الانجهداد الى ما دون الصفر. لذلك فتعين نقطة الانجهداد يرتكز على هذا الاساس.

٢٤٧٩ - أنجيلونية Angelonia (S). Angélonie (F).

Angelonia (E). Angelsblume (D). Angelonia (I).

جنس نباتات عشبية ليفية معمرة من فصيلة الخبازيات مهدا امريكة الوسطى || انواعه وضروبه عديدة جميعها من النباتات التزيينية. أوراقها متعاقبة، أزهارها سنبلية او عنقودية التجميع، بحيلة الشكل، مختلفة الالوان الزاهية.

القلقاسيات. مهدا الاقاليم الاستوائية. الامريكسية انواعه عديدة بعضها يصلح للتزيين. أوراقها كبيرة قلبية النصل الملون الجميل، معلاقية الارتكاز. أزهارها عنقودية التجميع يقوم على زناد اسطواني طويل لونه الى الحوة || أزهارها متعددة الالوان الزاهية الجميلة الانسجام.

٢٤٦٤ - إنثيرة Anthéridie, Cystide (F).

Antheridia (E).

العضو الذكري في بعض الفطور يقوم بوظيفة المثير.

٢٤٦٥ - إنجاء اطلب إنفا.

٢٤٦٦ - إنجاء، إستنجاء، قصف، جعف، قعر

Dérachement, Extirpation (F).

Rooting up, Extirpation (E).

هو قطع الاشجار واستخراجها مع اصولها.

٢٤٦٧ - إنجاص راجع إجاص.

٢٤٦٨ - أنجبا هو الشنجبار.

٢٤٦٩ - إنجبار Bistorte (F).

Bistort, Snake-weed (E).

الانجبار: « نبات نفاع يتخذ منه شراب مفيد » (التاج) راجع أنارف.

٢٤٧٠ - أنجذان*، شجرة الحلتيت، حلتيت، حلتيت

Ferula assa-foetida (S).

Férule assafétide (F). Assafoetida plant (E). Asan-disteckenkraut (D). Assa foetida, Ferula del sagapeno, Merda del diavolo (I).

نبات عشبي طبي بري من فصيلة الخيميات. أوراقه مركبة عريضة. أزهاره صغيرة القد صفر || يستخرج من ساقه صمغ يدعى الحلتيت كان ولا يزال كثير الاستعمال في مختلف المستحضرات الطبية وأخصها الطبابة البيطرية.

٢٤٧١ - أنجذان العجم*، سكيننج، حلتيت

Ferula scowitziana (S).

Férule de Perse (F). Persian giant fennel (E).

Persische steckenkraut (D). Ferula di Persia (I).

ضرب من الانجذان مهد بلاد العجم. تستخرج منه اجود اصناف الحلتيت. يعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. ساقه غليظة قليلة الفروع. أوراقه ملتفة الاطراف. فصلها خلي الصفحة السفلى. أزهاره الى الصفرة.

٢٤٧٢ - أنجذان رومي*، كاشن، كاشم، كاشم رومي

Levisticum officinale (S).

Livèche, Ache de montagne (F). Lovage, Mountain hemlock (E). Echter liebstöckel (D). Ligustico, Levistico, Sesell comune (I).

نبات عشبي بري معمّر من فصيلة الخيميات. أوراقه مركبة ثلاثية التفريض لاطئة العنق || أزهاره عذقي التجميع هامي الارتكاز. أزهاره الى الصفار الجميل بزوره صغيرة مستدقة سوداء اللون تعتبر من المقويات النافعة. أوراقه مأكولة طازجة ومطبوخة.

٢٤٧٣ - أنجرة هو القراص.

٢٤٧٤ - أنجرة هندي*، ورد الصين

Hibiscus Rosa-Sinensis (S). Rose de Chine (F). Shoe flower, China rose, Blacking plant (E). Chinesische rose (D). Rosa della China (I).

٢٤٩٣ - إنخضاب ° ، لشن °

Homochromie (F). Procrispis (E).

خاصة تتميز بها بعض الكائنات الحية من حيوان ونبات تمكنها من الاختضاب بلون الاشياء التي تحيط بها .

٢٤٩٤ - إنخضاد

Meurtrissure (F). Bruise (E).

انخضدت الثمار الرطبة . اذا خلت من موضع الى موضع فتشذخت . « تأتهم ثمارهم لم تخفد » اي لم يصيبها ذبول ولا انمصار ولا تشديخ .

٢٤٩٥ - إنخفاص

Dépression (F). Depression (E).

هو الهبوط الطبيعي او الصناعي .

٢٤٩٦ - إنخلاع المفصل

Luxation

هو خروج عظم المفصل من برجته .

٢٤٩٧ - أنخوليوم

Anchonium

هو أبو زيدان من نباتات جرود لبنان الطرية .

٢٤٩٨ - أندترّة °

Fiber (S). Ondatra (F).

Ondatra, Musk-rat (E).

جنس حيوانات لبونة قاضمة ومفترسة من فصيلة الفأريات . انواعه المعروفة ثلاثة موطنها امريكا الشمالية . تألف المروج وصفات الأنهر والبحيرات . مسرحها دجوي تسمى على الارض بخفة وتقوم وتغوص في الماء . ملجئها الحياتي زوجي اما مستمراتها فوفرة العدد . قوتها الجذور والنباتات المائية والاسماك والرخويات . تخلد اجعارها على الضفاف بمستوى الماء حيث تكون مداخلها ومخارجها تحت سطح الماء || اجسامها ربعة تطول من ٥٠ الى ٦٠ سم . بما فيه الذنب الذي يراوح طوله من ٢٠ الى ٢٥ سم . شكلها شكل الجرذ الا انها قصيرة القوائم . عيونها صغيرة . شفاهها مقلوبة . سبالها مستطيلة . اذانها حشفية الاغشية ، قليلة النشور . اذانها مستطيلة ، مبطنة ، حشفية القشار يعلوها في حدودها العليا والسفلى بعض صفوف من الهلب الجامد . قوائمها الخلفية محظبة الاصابع بما يساعدها على السباحة . اوبارها جشيلة ، ناعمة ، لامعة . وتعمل بين افخاذها غدة تفرز مادة زيتية بيضاء اللون رائحتها رائحة الزباد || انثاها تحمل من ٣ الى ٤ مرات في الحول وتضع في كل مرة من ٥ الى ٩ ادراص طامسة عريضة تبصر وتكتسي بعمر عشرة ايام || تصاد لفرائها لانها جيدة الصنف ، مرغوب فيها || اما انواعها الثلاثة فهي التالية .

٢٤٩٩ - أندترّة فيرجينية °

Fiber macrodon (S).

Ondatra de Virginie (F).

موطنها بلاد فيرجينية . جسمها يطول نحو ٥٥ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٢٢ سم . ثوبها الى الرمكة يحاطها وبر اسود ويعلوها موج فضي . بطنها الى الشبهة الغبراء . ذنبها اسود .

٢٥٠٠ - أندترّة قاتمة °

Fiber obscurus (S).

Ondatra obscur (F).

موطنها كندا . جسمها يطول نحو ٥٠ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ ٢٠ سم . ثوبها الى الكهبة السمرات يعلوها موج رصاصي . بطنها الى الشبهة . ذنبها اسود .

٢٤٨٠ - أنجين ، خناق ، ذُبْحَة

Angine (F).

Angina (E).

التهاب يحصل في غشاء حلق وحنجرة الدواجن .

٢٤٨١ - إنحجّات ، حَتّ

Affouillement (F).

Undermining, Washing away (E).

هو العطب الذي تحدثه المياه الجارفة في كل ما يعترض سيرها وهو كذلك ما تحدثه الرياح القالعة من عطب .

٢٤٨٢ - إنحدار

Déclivité (F). Declivity (E).

٢٤٨٣ - إنحراف

Diffraction

هو انحراف اشعة الضياء عند ملامسة سطح ما .

٢٤٨٤ - إنحراف ، إنعطاف

Inflexion

٢٤٨٥ - إنحراف ، زِيْعَان

Déviation (F).

Deviation (E).

٢٤٨٦ - إنحراف مغنطيسي

Déclinaison magnétique (F). Declination (E).

٢٤٨٧ - إنحرافيّة °

Photonastie (F).

Photonasty (E).

الانحرافية حركة محورية نظامية تقوم بها اوراق بعض النباتات او ازهارها من تأثير الضوء .

٢٤٨٨ - إنحسرت

إنحسرت الطير : خرجت من الريش العتيق الى الحديث .

٢٤٨٩ - إنحطاط ، تعس

Abâtardissement (F).

Dégénérescence (F). Degeneracy (E).

هو فقدان بعض المزايا الاصلية الفارقة ان في النبات او في الحيوان .

٢٤٩٠ - إنحلل

Décomposition, Dissolution (F).

Decomposition, Dissolution (E).

هو تفكك وانتاق العناصر او الاجزاء التي تتركب منها المادة .

٢٤٩١ - إنحلل إسفنجي *

Echaudure sponglause,

Liège, Bouchon (F). Soggy breakdown (E).

عارض يصيب ثمار التفاح المخزونة في البراد . سببه حفظ الثمار في بيئة تدنت حرارتها عن المعدل الانسب || مظهره الخارجي انحراف اللباب من الصلابة الى اللين حيث يبدو طريا منخورا كالاسفنج لونه الى الحنطي العابق || يمكن اجتنابه : (١) بجني الثمار عند ادراكها وليس عند ايناعها . (٢) بعدم تأخير نقل الثمار المقطوفة الى البراد وبعدم تعريضها للشمس . (٣) بحفظ الثمار ضمن قنوس الحرارة التي تلائمها .

٢٤٩٢ - إنحلل داخلي *

Brunissure interne (F).

Mealy breakdown (E).

عارض يصيب ثمار التفاح عند حفظها في البراد مدة من الزمن تفوق طاقة احتياها || مظهره الخارجي انصداع البشرة وانحراف لون اللباب الى البني . يبتدئ الانحلل في داخل الثمرة ويمتد الى الخارج فيعطب اللباب ويخضب ويغطي على العصير || يمكن اجتنابه : (١) بجني الثمار عند ادراكها . (٢) بنخب وحفظ الثمار الكبيرة القد وحدها . (٣) بعدم تجاوز مدة الحزن الفصل .



إنحلل إسفنجي



انحلل داخلي



أندترّة

صغيرة فرعاء السوق . كثيفة الاوراق الدائمة المتعاقبة السنانية
النصل الامرد الاخضر . ازهارها عثكولي التجميع تاجي
الارتكاز . ازهارها مختلفة الالوان يغلب فيها الالبيص .
تشكأ بالبدن . تبذر مشاتلها في اوائل الربيع وتغرس
شتولها في حزيران فتزهر من تشرين الى اذار || تجود في
جميع الاتربة وجميع المعارض || اشهر انواعها الزراعية
ما يتبع .

٢٥١٥ - أندلسية بيضاء * ، حُرْفَة مُرَّة

Iberis amara (S). Ibérade amère, Thlaspi blanc (F).

Iberis sempervirens (S). أندلسية خضراء.

Ibérade à feuilles étroites, Thlaspi toujours vert (F).

Iberis pectinata (S). أندلسية صغيرة

Ibérade naine, Thlaspi nain (F).

٢٥١٨ - أندلسية عجمية

Iberis semperflorens (S). Ibérade de tous les mois,
Thlaspi de Perse (F).

Iberis pinnata (S). أندلسية عطرية *

Ibérade odorante, Thlaspi odorant (F).

Iberis odorata (S). أندلسية لذيذة

Ibérade suave (F).

Thlaspi arvense (S). أندلسية مرّة

Thlaspi (F). اطلب شجرة مرّة .

Endoderme (F). Endoderm (E). أندودرم

اطلب بشرة داخلية .

Endothia ٢٥٢٣ - أندوسية *

جنس فطور مجهرية من الروغيات وفصيلة الحشاريات
يتميز بوليمته التي تنمو في نسيج النبات المنحار . اعسائه
غليظة بيضية شفافة ، تكاته ونكاته متشابهة . بوغه وثوري
الاقسام المعرضة || له نوع واحد مؤذ يصيب الكستنة .

٢٥٢٤ - أندوسية الكستنة * ، قرحة الكستنة

Endothia parasitica, Diaporthe parasitica, Valsone-
nectria parasitica (S). Maladie chancreuse du châ-
tagnier (F).

فطر مجهرى يصيب الكستنة في سوقها واغصانها فيعطها
ويميتها || مظهره الخارجى يقع قرحة لونها الى الصفار
فالاحمر تركب لحاء الاغصان والسوق ثم تمتد الى ان
تطوق الغصن المصاب فتقرحه وتعطب اوعيته وشكيره فيذوي
ويموت || يكافح بالاقنلاع والحرق او بالقطع والحرق
والتهجير .

Endocarpe (F). Endocarp (E). أندوكرب

هو الجزء الداخلى من غلاف الشرة يلحفه السوذك ويلحف
البذرة او البنور .

Andira (S). Andira, Andire, ٢٥٢٦ - أنديرا *

Arbre à chou (F). Cabbage tree (E). Unechter
kohibaum (D). Andira (I).

جنس جنبات حرجية وزراعية شائكة من فصيلة القرنيات
الفراشية . منبتها امريكة الجنوبية . ثمارها ولحاء سوقها
طبية تستعمل لطرد الديدان المعوية || له ضربان تزيينيان
معروفان :

Fiber gibethicus (S). ٢٥٠١ - أندثرَة مُمَسَّكَة *
Ondatra musqué (F).

موطنها امريكة الشمالية من المحيط الاطلسي الى المحيط
الهادي . جسمها يطول نحو ٦٠ سم . بما فيه الذنب الذي
يبلغ ٢٥ سم . ثوبها الى الرينة السمراء يعلوها موج فضي .
يقلها الى الشبهة الصنابية الموج . ذنبها اسود .

٢٥٠٢ - أندر اطلب بيدر .

٢٥٠٣ - أندروواس * ، أندروواسيس ، زهرة التيرس ،

كُنْسَلُح Androsaces (S). Androsace,

Androselle (F). Androsace, Sea navel wort (E).

Androsace, Mannsschild (D). Androsace (I).

من اسمائه ملاح ومليح وكشسلخ وهذا الاخير عبري الاصل
ومنه تصحف كسلخ || جنس نباتات عشبية برية وزراعية
من فصيلة الربيعيات . منه انواع طبية يستخرج من عصارة
بصلها مواد عقاقيرية مختلفة ومنه ما هو مدر للبول || اشهر
انواعه الزراعية المستعملة للتزيين :

A. lactea (S). ٢٥٠٤ - اندروواس ابيض

A. blanche (F).

A. lanuginosa (S). ٢٥٠٥ - اندروواس صوفي

A. laineuse (F).

A. sarmentosa (S). ٢٥٠٦ - اندروواس معرّش

A. sarmentouse (F).

A. villosa (S). A. velue (F). ٢٥٠٧ - اندروواس ويري

Androsème ٢٥٠٨ - أندروسامن

اطلب هيوفاريقون غزفي .

٢٥٠٩ - أندروواساقس اطلب اندروواس .

Andromeda (S). ٢٥١٠ - أندروميده *

Andromède (F). Marsh andromeda, Wild rose-
mary (E). Poleigränke (D). Andromeda confoglie
riplegate (I).

جنس جنبات معمرة من فصيلة الخلنجيات ، اوراقها متعاقبة
جامدة طحلاء اللون . ازهارها مختلفة الوضع نسبة الى نوع
الجنبة ، منها الابطية الفردية ومنها العثكولية ومنها التاجية
الى آخرة ... ثمارها عنبيبة نووية تمتاز بمحافظتها على
التويج كغلاف للثمرة . تستعمل للتزيين وهي من النباتات
الجميلة الشكل لكنها منومة وسامة .

٢٥١١ - إندرين

Endrin حاشور زراعي يتخوى نحو ٩٠ ٪ من المركبات الكيماوية
الفعالة وهو سائل يحل بالماء مبرستعمل في مكافحة الحرقص
والتريس والبق وديدان جوز القطن والشوندر والتبع .

٢٥١٢ - إندغهام

Adhésivité (F). Adhesivity (E). الخاصة الطبيعية التي تمكن الشيء من الالتصاق او الالتحام
بشيء آخر .

٢٥١٣ - إندفاق

Ejaculation هو خروج المني عقب الانتشار والانماط .

٢٥١٤ - أندلسية ، تلسفي ، حُرْفَة

Iberis (S). Ibérade, Thlaspi, Teraspie (F). Candytuff

(E). Schleifenblume (D). Iberide, Tlaspi (I).

جنس نباتات حولية ومعمرة من فصيلة الصليبيات ، مهدا
اسية الصغرى وأروبة . انواعها المعروفة ٢٠ جميعها جنبات



أندروواس



أندروميده



أندلسية بيضاء



أندلسية عطرية



أندوسية



أندوسية الكستنة

Enzyme (F). Enzym (E). أنزيم ٢٥٣٧
نوع من الخماثر الكيماوية التي تذوب في الماء وتفرزها الخلايا .

Changement de poils (F). أنسَال ، نُسُول ٢٥٣٨
هو سقوط شعر الدابة أو صوفها أو وبرها وقد يكون ذلك في ازمان معينة .

Pupille de l'oeil (F). إنسان العين ٢٥٣٩
Pupil (E). راجع بؤبؤ العين وحندر .

Sirène (F). Siren (E). إنسان الماء ٢٥٤٠
انسان الماء وبنت البحر والخيلاّن حيوانات بحرية لبونة من رتبة الخيلانيات ، تشبه الإنسان لها اذنان مزعقة الاطراف بدلاً من الارجل وزعانف حوضية بدلاً من الايدي . وقد انقرضت جميعها ولم يبق من رتبة هذه الحيوانات سوى الاطوم وخروف البحر .



انرتة القمام

Usure (F). Abrasion (E). إنسِحاج ٢٥٤١
هو الانحطات الذي يحل بحجارة البناء والاعدة والتأثيل من جراء تقادمها والتآكل الذي تسببه الرياح والامطار .

Mue (F). Moulting (E). أنسلاخ ٢٥٤٢
هي التبدلات الفيزيولوجية التي تحصل كلما غيّرت الحشرات اغشيتها وتطورت من حالة الى اخرى || والانسلاخ في الرواحف يكون عندما تخلع اغشيتها وقد يحصل ذلك مرة في العام .

Encelade (F). أنسلاد ٢٥٤٣
Enceladus (E). احد اقمار زحل ، اكتشفه العلامة الانكليزي هرشكول عام ١٧٨٩ . دورته حول زحل تستمر ٣٢ ساعة و٥٣ دقيقة و٧ ثوان .

Schizogénèse (F). إنسِلَاع ٢٥٤٤
Schizogenesis (E). الانسلاع ، في البيولوجية ، طريقة تكاثر بالانقسام تمارسها الخلقيات الكثرات الهلب .

Anisopus (S). أنسوب ٢٥٤٥
Anisopus (F). Anisopus (E). جنس حشرات من فصيلة الانسوبيات ورتبة ذوات الجناحين . انواعه المعروفة قليلة العدد ، اعطانها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . تألف الجراج والادغال والحدائق والمساكن الريفية || اجسامها صغيرة ، مستطيلة الشكل ، تطول من ٦ الى ٩ مم . رؤوسها مكورة . عيونها كبيرة ، متقاربة عند الذكور ، متباعدة عند الاناث . قرونها الاستشعارية خيطية . ملاسها طويلة . اعظامها قصيرة . كواسلها شبه بيضية . بطونها اسطوانية . رواشها ملونة . قوائمها مستطيلة . اثوابها ملونة . اناثها اكبر قدراً من ذكورها وابنت ثوباً منها || الجملاء منها تعيش على المواد العضوية المنحلة اما الاساريح فثائلة ودائمة .

A. racemosa (S). أنديرا عقودية ٢٥٢٧
A. à grappe (F).

A. inermis (S). A. inerme (F). أنديرا ملساء ٢٥٢٨

أنديس الانتظام الورقي ، مدلال الانتظام الورقي ٢٥٢٩
Indice phyllotaxique (F).
Phyllotaxic index (E). هو مدرج الانتظام الورقي الخاص بكل نبات .

أنديس الإنكسار ، مدلال الإنكسار ٢٥٣٠
Indice de réfraction (F). Index of refraction (E). هو حاصل الإنكسار الثابت .

أندار ، تنبيه ٢٥٣١
Avertissement, Somation (F). Information, Summons (E). الانذار هو ان يوجه نظر ذوي الشأن ان شفهياً او كتابية الى امر او حق او التزام لهم . واما التنبيه فهو الانذار الشفهي دون سواء .

Anarta myrtille (S). أنرتة القمام ٢٥٣٢
Anarte des myrtilles, Noctuelle des aïrelles (F).
Anarta myrtille (E).

حشرة من فصيلة الفسقيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها تهام حوض البحر الابيض المتوسط . فراشها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرفها تعيش على اوراق الخللجيات واخصها القمام || جسمها صغير القد يطول نحو ١٠ مم . بسطها تراوح من ٢٤ الى ٢٥ مم . رأسها معتدل الجرم . عينها كبيرتان . زباناها خيطيان . مرشفها معتدل الجرم والطول . جوشنها حنطي اللون ، صناعي المواج . بطنها الى الحنطي الاصفر يملوه تمشيع اسمر || روشناها الاماميان الى الصفار الباهت يعلوه تجديع ورقشة وزركشة فيها الاحمر والامر والاسمر . روشناها الخلفيان الى الصفار الاشقيح تعلوه بقجة قاعدية وجدة طرفية لونها الى المرة الصنابية || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في ايار وتبقى حتى تموز . تصرخ في الليل . تعاظم بعد ظهورها بستة اسابيع . تمتح الممكن لطخاً صغيرة مستطيلة || السرفة عند الادراك تطول نحو ٢٤ مم . جسمها اسطواني الشكل مشدود القشار . ثوبها الى الخضار الالفس تعلوه ثلاثة خطوط جردية يكتنفها الاصفر . رأسها احمر . مذها الى الضحلة . رواجها الى السواد الفحمي || طور الاكمال يستمر نحو ١٨ يوماً وينقضي ضمن جلباب من الطين تلتحفه السرفة بعد ان تنغم في التربة على عمق ٥ سم .

أنرسيا ٢٥٣٣
اطلب قوبعة الدراق الصغيرة .

أنرسية خيطية ٢٥٣٤
Petite mineuse du pêcher (F). هي قوبعة الدراق الصغيرة ، اطلبها .

أنزاء ، إسفاد ٢٥٣٥
Accouplement (F). جاع الذكر انشاء في الحيوانات الداجنة .
Coupling (E).

أنزياج ٢٥٣٦
Aberration ظاهرة طبيعية تؤثر في النظر فتجعله يشاهد الاجرام السماوية في غير مواقعها الحقيقية .

bâtarde (F). Sea bugloss, Italian alkanet (E). Italienische ochsenzunge, Ochsenzunge (D). Buglossa vulgare, Lingua buona (I).

نبات بري وزراعي تزييني معمر ، يتكاثر بالبذر .
يحبس في جميع المواقع لكنه يرغب في الاتربة ذات الطابع
الكلسي || أزهاره جميلة لونها الى الزرقاء .

٢٥٥٦ - أنشوزة القطب
Anchusa capensis (S).
Buglosse du Cap (F).

نوع من الانشوزة وهي جنبه حولية صغيرة القد ترتفع
نحو ٣٠ سم . أوراقها لسنة متمعجة زباء النصل . أزهارها
الى الزرقاء || أزهارها يدوم من ايار الى حزيران .

٢٥٥٧ - أنشوزة خضراء
Anchusa sempervirens (S).
Buglosse toujours verte (S).

نوع من الانشوزة وهي جنبه معمرة ترتفع من ٧٠ الى
١٠٠ سم . أوراقها لسنة منشارية الحافة زباء النصل .
أزهارها صغيرة الحجم زرقاء اللون . أزهارها يدوم من
نيسان الى تموز .

٢٥٥٨ - أنشوزة سماجونية
Anchusa Italica (S).
Buglosse d'Italie (F).

نوع من الانشوزة وهي جنبه معمرة ترتفع عن التربة نحو
٨٠ سم . أوراقها لسنة ضيقة النصل . أزهارها زرق سماجونية .
يعملو جميع اعضائها من الساق الى الازهار حلب مستطيل
دقيق || أزهارها يدوم من ايار الى تموز .

٢٥٥٩ - أنشوزة صباغية

هي الشنجار الصباغي ، اطلبه .

٢٥٦٠ - أنشوزة صفراء
Anchusa ochroleuca (S).
Buglosse jaunâtre (F).

نوع من الانشوزة وهي جنبه محولة ترتفع نحو ٧٠ سم .
أوراقها لسنة خشنة زباء النصل . أزهارها صغيرة لونها الى
الصفار الباهت || أزهارها يدوم من تموز الى آب .

٢٥٦١ - أنشوزة طويلة القلم
Anchusa stylosa (S).
Buglosse à long style (F).

نوع من الانشوزة وهي جنبه حولية صغيرة القد ترتفع
نحو ٣٠ سم . أوراقها لسنة متمعجة زباء النصل . أزهارها
الى الزرقاء الجميلة || أزهارها يدوم من حزيران الى تموز .

٢٥٦٢ - أنشوزة مخزنية * ، بُوغْلُصُنْ مخزني ،
دَبُونْ ، لسان الثور المخزني

Anchusa officinalis (S). Buglosse officinale, Langue
de bœuf (F). Bugloss, Common alkanet (E). Echte
ochsenzunge (D). Bugloss, Lingua di bue, Coda di
volpe (I).

نوع من الانشوزة وهو نبات طبي بري معمر ، مبدول
في لبنان ويوجد في معظم مناطق حوض البحر المتوسط .
يرتفع نحو ٤٠ سم . أوراقه لسنة قليلة التسنين زباء النصل .
أزهاره زرقاء او بنفسجية اللون في اول عهدها ثم يبيض
عند اقترابها من الذبول || منافعه الطبية عديدة ، يقال
انه يقوي جميع الحواس وينفع من البرسام . والماليخونيا
واوجاع الحلق والصدر والرئة والسعال . رماده ينفع من
القلاع وامراض اللثة . عصيره مع عصير التفاح منعش
مفرح .

٢٥٦٣ - أنشوزيات ، بُوغْلُصُونِيَّات (F).
Anchusées (F). سبط نباتات عشبية من فصيلة الحمحميات . اجناسه وانواعه

٢٥٤٦ - أنشوبيات
Anisopodidae (S).
Anisopodidés (F). Anisopodidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها
المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة
والمعتدلة الحرارة || اجسامها تطول من ٦ الى ١٢ مم .
رؤوسها شبه مكورة . عيونها متقاربة او متلاصقة عند
الذكور ، متباعدة عند الاناث . جميعها ثلاثية الزنار .
قرونها الاستشعارية قصيرة ، متساوية عند الشقين ،
مركبة من ١٦ فصلة . ملامسها مستطيلة . كواسلها شبه
بيضية الشكل . رواشها ملونة . قوائمها مستطيلة . ظنايبها
مجهزة بمناعس حادة || يرقاتها سلكية ، دودية الانتقال ،
تعيش على المواد النباتية المنحلة || اشهر اجناسها الانسوب .

٢٥٤٧ - إنسي
Côté gauche (F). Left side (E).
انسي الانسان والذابة وكل شيء : جانبه الايسر .

٢٥٤٨ - إنسيابي الشكل
Aérodynamique (F).
Aerodynamic (E).

نعت توصف به الاشكال التي تتعرض الى اقل مقاومة ممكنة .

٢٥٤٩ - إنسيب *
Inocybe (S). Inocybe (F).

فطر من فصيلة الفاريقونيات . يوجد في المراعي الرطبة وعلى
ضفاف مجاري الماء . ساقه دقيقة ، رقيقة ، طحلاء اللون .
ارسوسته شبه مخروطية الشكل ، صغيرة القد ، قطرها نحو
٢ سم . لونها الى الطحلة يعلوها موج تبي . اطراسه دقيقة
فضية اللون || يعتبر من الفطور الجحالية المؤذية .

٢٥٥٠ - إنسينة *
Ensina (S). Ensigne (F).

جنس حشرات من ذوات الجناحين قصيرات القرون وفصيلة
الخرشيات . انواعها المعروفة ١٢ منتشرة في معظم اقاليم
البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة طحلاء اللون .
رؤوسها مستعرضة . عيونها ناشزة كبيرة . كواسلها كثيفة
الحمل المستطيل . اجنتحتها منمشة بالابيض . بطونها الى
الطحلة السمراء . قيود حيدها الى البياض الاغبر || تعيش
على جميع انواع الافخوان والقوتحان والنعنع . يرقاتها تقضم
الازهار والبزور .

٢٥٥١ - إنشقاق ، إنشيطار
Clivage (F).
Cleavage (E).

٢٥٥٢ - أنشوا
Anchois (F). Anchovy (E).
اطلب بلم .

٢٥٥٣ - أنشوا المتوسط
Anchois de la Méditerranée (F).

هي بلمة المتوسط ، سمكة بحرية .

٢٥٥٤ - أنشوزة
Anchusa (S).
Buglosse (F). Bugloss (E).

جنس نباتات عشبية برية وزراعية من الانشوزيات جميعها
اعشاب معمرة ترغب في الاراضي المنحدجة والمواقع الرطبة
أوراقها مستطيلة لسنة زباء النصل . أزهارها متعددة
الالوان يغلب فيها الازرق || اشهرها ما يتبع .

٢٥٥٥ - أنشوزة الزهر * ، بُوغْلُصُنْ أزرق
Anchusa azurea (S). Buglosse, Bourrache



إنسيب



انسينة



أنشوزة الزهر



أنشوزة مخزنية

٢٥٧٨ - إنطباع ، سلاسة

Plasticité (F). Plasticity (E).

سهولة الانقياد واللين . وكلمة سلاسة من وضع الدكتور نقولا فياض .

٢٥٧٩ - أنطومة ، أنطومة

Oothèque, Coque ovigère (F). Ootheca (E).

مجموعة البيض التي تلقيها الجرادة وأمثاتها عندما تفرز . وكذلك في مبيض الأسماك ولكل سمكة إنطمان أو أنطومتان .

٢٥٨٠ - إنعاط ، إنعاط

هو الفجج أي الانتشار الناتج عن التهييج الجنسي المصحوب بالاحتقان والانتفاخ .

٢٥٨١ - إنععال ، بيطرة ، حذو

Ferrure, Ferrage (F). Shoeling, Fixing iron on (E).

هو تركيب وتسمير نعل الدابة في حافرها .

٢٥٨٢ - إنعتاق الطعم ، إنعتاق

Affranchissement (F).

Enfranchissement (E).

هو استقلال الطعم من المعلم ويكون ذلك عندما يطعم الطعم بالتراب وتنمو له عند قاعدة ارتكازه جذور مستقلة تعتقه .

٢٥٨٣ - إنعدام الأزهار ، شرج

Agamie (F).

Agamous (E).

هو خلو ازهار بعض النباتات من السداة والمدقة كما في الفطور .

٢٥٨٤ - إنعطاف ، إنعطاف

هو الانحراف .

٢٥٨٥ - إنعتاد ، عتد

Nouaison, Nouure (F).

Setting (E).

هو عقد الثمرة أي تكوين البزرة وقد يكون ذلك بعد الاخصاب واتصال جذرة الطلع الذكرية الحية الفاعلة بالبويضة الانثوية المنغلة . (راجع إرام) .

٢٥٨٦ - إنعفاف ، إنعفاف

Torsion (F).

Twist, Torsion (E).

حالة الشيء المنعطف أو المنقول عكس وجهته الطبيعية .

٢٥٨٧ - إنعكاس ، إنعكاس

Réflexion (F). Reflection (E).

الانعكاس هو تغير اتجاه الضوء أو الجسم المرئي عندما يسقط على سطح مصقول عاكس . وقد ينشأ عن هذا الانعكاس صورة الجسم المرئي إذ وفي دراسة الانعكاس يستخدمون اصطلاحات خاصة كالشعاع الساقط والمنعكس ونقطة السقوط وزاويتي السقوط والانعكاس المنتظم أي الواقع على سطح مصقول كالمراة .

٢٥٨٨ - إنعكاسية ، إنعكاسية

Reflexibilité (F). Reflexibility (E).

Inga (S). Inga (F).

Inga, Coco-weed (E). Inga (D). Inga (I).

جلس اشجار وجنبات حرجية من فصيلة القرنيات السنطية . بعد ما لا يقل عن ١٠٠ نوع جميعها من نباتات المناطق الحارة الاسيوية والامريكية والافريقية || منه انواع مأكولة الثمار اشهرها الأنغا الحلوة ومنه انواع حاملة تسهل المعدة .

عديدة بعضها بري طبي ومنه زراعي تزييني . وهي من النباتات المبدولة . منبتها جميع الاصناف العالمية || اشهرها النوع الطبي المعروف بالديون أو لسان الثور الحزني والنوع الصناعي الصياغي المعروف بالشنجار والانواع التزيينية المعروفة بالانشوزة .

٢٥٦٤ - أنشوطة ، أنشوطة

Noeud (F). Knot (E).

Déversement (F).

Inclination, Overflow (E).

٢٥٦٦ - إنصداع ، إنصداع

تفكك الاجزاء الخشبية في الشجر من البرد والصقيع .

٢٥٦٧ - إنصداع الجدار ، إنصداع

Seime (vét.) (F).

Wire-heel (E).

هو شق يحصل في جدار الحافر وقد يكون على ثلاثة انواع :

Seime en mamelle (F).

Seime en talon (F).

Seime en pince (F).

اسبابه عديدة اخصها جفاف جدار الحافر . يعالج باستعمال ملاقط الحديد ثم المراه الملية للجدار .

٢٥٦٨ - أنصرين ، أنصرين

Ansérine (F). Melting (E).

راجع أثينه .

٢٥٦٩ - أنصرين بيضاء ، أنصرين بيضاء

راجع أثينه بيضاء .

٢٥٧٠ - أنصهار ، أنصهار

Fusion

هو تحول المادة من حالة الصلابة الى حالة السيولة بتأثير الحرارة فيها .

٢٥٧١ - أنصيل ، أنصيل

Ancylos (S).

Ancyle (F). Ancylos (E).

جلس حيوانات مائية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة اللبنيات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحيرات ومناقع البلاد المعتدلة الحرارة . قوتها النبوت المائية || اصداقها صغيرة القد ، دقيقة الصفحة الشفافة ، قمية الشوزن ، رفيعة القن الخلية الشكل . اجسامها صغيرة ملحوفة . رؤوسها مقطوعة . لواصها قصيرة . ارجلها وحيدة اهليلجية الشكل ، قليلة العرض .

٢٥٧٢ - أنصرج ، أنصرج

انفراج الشجر : انشقت عيون ورقه وبدت اطرافه .
وانفراج الزهر : انشقت اكمام زهوره .

٢٥٧٣ - أنضغاط ، أنضغاط

Compressibilité (F).

Compressibility (E).

٢٥٧٤ - إنطباق ، إنطباق

Coincidence (F).

Coincidence (E).

٢٥٧٥ - أنطومة الطير ، أنطومة الطير

Anthomyte pluviale (F).

هي ذبابة الطير .

٢٥٧٦ - أنطومة الملفوف ، أنطومة الملفوف

Anthomyte du chou (F).

هي ذبابة الملفوف .

٢٥٧٧ - أنطومة غبراء ، أنطومة غبراء

Anthomyte blanchâtre (F).

اطلب ذبابة غبراء .



انصداع الجدار



أنصيل

٢٦٠٢ - **إنفلاق** Fission (F). Fission (E).

الانفلاق في الفيزياء النووية انقسام الذرة الى اثنتين تحت تأثير التفجير الجسيمي .

٢٦٠٣ - **أنفلوانزا ، وافدة ، نزلة وشحمة**

Influenza, Grippe
مرض معد يصيب الحيوان ولاسيما الخيل .

٢٦٠٤ - **إنقباض** Plasmolyse (F). Plasmolysis (E).

هو التقلص الذي يحل بالبروتوبلازمه عند انفكاكها وانقطاعها عن الغشاء الخلوي .

٢٦٠٥ - **إنقباض ، إنكمش** Rétraction (F). Retraction (E).

٢٦٠٦ - **إنقباضية ، إنكمشية** Rétractilité (F). Retractility (E).
قابلية الانقباض .

٢٦٠٧ - **أنقذ** Hérisson (F). Hedgehog (E).

هو القنفذ ، اطلبه . وفي الامثال يقال بات فلان بليل انقذ لانه لا ينام الليل كله .

٢٦٠٨ - **إنقذان** Tortue (F).

الانقذان السلحفاة ، اطلبها .

٢٦٠٩ - **أنقرديه** Anacardier (F).

اطلب بلاذر .

٢٦١٠ - **أنقرة** Angora

نعت لبعض الدواجن ذوات الشعر الحريري كبيض النواع الارنب والسنور والماعز .

٢٦١١ - **إنقسام إختزالي** Cytocinèse (F).

Cytocinesis (E).
هو الانقسام الذي يهيم على الخلايا التناسلية في الجذرة والبويضة فيختزل فيها عدد نشب جبلي الخليتين الناتجتين الى نصف عدد نشب جبلة الخلية الاصلية . لذلك فجبلة كل من الخلايا التناسلية تحوي نصف عدد النشب الموجودة في الخلايا الاخرى من جسم النبات || وعندما تتحد جبلة الخلية الذكرية بجبلة الخلية الانثوية في عملية التاثير فالأخصاب ، تتكون منها جبلة واحدة عدد نشبها يساوي العدد الاصيل لجبلة الخلية العادية .

٢٦١٢ - **إنقسام خلوي** Division cellulaire (F). Cellular division (E).

هو الانقسام الذي تتكاثر بواسطته الخلية التي تبتدى فيها حياة النبات . فن واحدة الى اثنتين فأربع وهلم جرأ الى ان تتكون من هذه الخلية ، وما نتج عن تكاثرها من ملايين الخلايا ، أعضاء النبات المختلفة || وهذا الانقسام قد يكون مباشراً او غير مباشر او إختزالي .

٢٦١٣ - **إنقسام غير مباشر** Caryocinèse.

Mitose (F). Caryocinesis, Karyokinesis, Mitosis (E).
هو انقسام الجبلة في خلية النباتات الراقية . وهذا الانقسام يتم على الشكل التالي : انفصال النشب التي تتكون منها المهية وانشطارها طولياً الى شطرين متساويين ثم انجذاب كل شطر الى قطبه حيث تتحد النشب وتكون في كل قطب من قطبيها مجموعة جديدة لها مهيتها ثم يتكون بينهما جدار في السيتوبلازمه يفصل الجبلتين الجديدتين المتساويتين تماماً .

٢٥٩٠ - **إنفا حُلوه** Inga dulcis.

Pithecolobium dulce (S). Inga doux (F).

نوع من الأنفا ، مهدها امريكة الاستوائية وقد عمت زراعتها جميع البلاد الحارة . وهي شجيرة فرعاء شائكة يكثر استعمالها في السياجات الحية || ثمارها قرون مرلوبة طولها نحو ١٥ سم وعرضها ٢ . لبها حلو الطعم للذيد الذكحة مأكول من جميع شعوب تلك البلاد || وهي تعرف بالمكسيك باسم غموشيل « Guamuchil » .

٢٥٩١ - **إنغال ، تبغيل ، تنغيل** Hybridation.

Métissage (F). Hybridization, Cross-breeding (E).
من طرائق الاسفاد قوامسه ان يكون الاب والام من نوعين حيوانيين مختلفين كاتزاا الحمار على الفرس . وما البغل سوى نتيجة هذا الانغال او التبغيل .

٢٥٩٢ - **إنغلاق** Indéhiscence (F). Indehiscence (E).

هي صفة الثمار التي تحافظ على انغلاقتها .

٢٥٩٣ - **آنف**

يقال ارض أنيفة النبات اي سريته . وهي من آنف الارربة اي اسرعها نباتاً .

٢٥٩٤ - **أنف** Nez (F). Nose (E).

عضو في مقدم رأس الحيوانات الثديية ، اشكاله عديدة متباينة ، له وظيفتان اساسيتان : الاولى توصيل الهواء الى داخل الجسم بعد تنقيته وتلطيف حرارته ، والثانية نقل التأثيرات الشمسية الى المخ || وللأنف فتحتان يعرف عنهما بطاقي الأنف ، تنهيان بتجويفين منفصلين في البلعوم . أما سطح الأنف الداخلي فبطن بغشاء مخاطي متشابه الاعصاب الدقيقة الخاصة بحاسة الشم الذي هو مركزها الاوحد .

٢٥٩٥ - **أنف الثور ، أنف العجل** اطلب تم السمكة .

٢٥٩٦ - **أنف القرس** Enif (F).

نجم من كوكبة القرس الاعظم مركزه على الجحفة .

٢٥٩٧ - **إنفتات ، خفتا** Friabilité (F).

Friability (E).

٢٥٩٨ - **إنفحة** Caillotte, Franchemule (F).

Rennet (E).

هي جزء من المعدة او بالاحرى هي المعدة الحقيقية حيث يحصل هضم الطعام . ومن المنافع ما يستخرج من بطن الجدي قبل ان يعطم غير اللبن . وهو المعروف بالجبنة .

٢٥٩٩ - **أنفرا**

نبات طبي . قال الانطاكي : « هو شجر دون الرمان ورقه كورق اللوز وزهره احمر يشبه الجلتار لا يختص بزمان وكثيراً ما يوجد بالجليل وهو معتدل ملطف » .

٢٦٠٠ - **إنفصال** Ségrégation (F). Segregation (E).

هو فصل جزء عن غيره من الاجزاء المركبة او فصلها جميعها عن بعضها بعض .

٢٦٠١ - **إنقسام ، تشعيت** Désintégration (F).

Disintegration (E).
تحليل تركيب الاجزاء .



إنفا حُلوه



إنقسام إختزالي



إنقسام خلوي



إنقسام غير مباشر

مسحوق فاطوري يرتكز على مادة النحاس يستعمل تعفيراً في مكافحة التسنن.

٢٦٢٣ - إنكسار Réfraction (F), Refraction (E).

ظاهرة طبيعية من أبحاث علم الضوء وهي أن الضوء إذا سار في وسط شفاف متجانس سار في خط مستقيم فإذا دخل وسطاً شفافاً آخر انحرف عن طريقه بزاوية خاصة تعرف بزاوية الانكسار. وتسمى النقطة التي يحدث فيها الانكسار عند السطح الفاصل بنقطة السقوط.

٢٦٢٤ - إنكساري Réfrangible (F).

Refrangible (E).

الإنكساري ما هو قابل لإنكسار الأشعة. الأشعة الضوئية الأكثر انكسارية من غيرها أشعة ما وراء البنفسجي.

٢٦٢٥ - إنكسارية Réfrangibilité (F).

Refrangibility (E).

٢٦٢٦ - إنكلاس Décalfication (F).

Decalcification (E).

فقدان الكلس.

٢٦٢٧ - إنكليس راجع أنقليس.

٢٦٢٨ - أنكوليه اطلب أكيلاجيه.

٢٦٢٩ - أنكوميرَة Oncomera (S).

Oncomère (F), Oncomera (E).

جنس حشرات واسعة دامة من فصيلة الاديريات ورتبة مفدمات الاجنحة. انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اعرف انواعها واشهرها الانكوميره الصفراء.

٢٦٣٠ - أنكوميرَة صفراء Oncomera flava (S).

Oncomère jaune (F), Oncomera flava (E).

حشرة واسعة دامة من فصيلة الاديريات ورتبة مفدمات الاجنحة. تألف الاديغات والاحراج. خنافسها تعيش على ازهار النبات. يرقاتها تعيش حيث تنقف على اللحم وعلى الاخشاب اليابسة الصائرة نحو الانحلال || جسمها متوسط القد يطول من ١٦ الى ٢٠ مم. ثوبها الى الصفرة العابقة يعلوها موج اسمر. رأسها مستعرض الجرم، بارز الحطم، ضليح الفكين. زباناها غيظيان. عيناها بارزتان. ظهراتها ذلق الطرف المديب. غداها رباعيتا. الخطوط القاطبة || الانثى اكبر قدماً من الذكر واهت ثوباً منه واقصر زبانا || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجمالنة في اوائل الصيف وتبقى حتى اواخر الخريف. تسرح في الليل. تساند في ثشرين الثاني.

تمتج المكن ميحادياً بين قشور ولحاء الاشجار اليابسة القائمة والمقطوعة || البرقة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ٣٠ مم. جسمها مردني الشكل، سداسي الرواجب، ضليح التأشير الفكية، حنطي اللون، اسود الرأس، اسمر الرواجب والشرح || طور الكعال الذي يستمر نحو ٢٥ يوماً ينتفضي في آخر سرداب كانت فيه البرقة.

٢٦٣١ - إنلياط Exfoliation

هو الانتشار اي سقوط لحاء الشجر شيئاً فشيئاً في الخريف.

٢٦١٤ - إنقسام مباشر Amitose (F), Amitosis (E).

هو انقسام الخلية الواحدة الى خليتين متشابهتين. فعند انقسام الخلية تنقسم الجبلية ايضاً الى قسمين يفصل بينهما عن بعض ويتكون بينهما جدار في السيتوبلازمه ينشأ عنه خليتان متشابهتان || وهذا الانقسام يحصل في النباتات الالوال البسيطة.

٢٦١٥ - إنقسامية Partibilité (F).

Partibility (E).

الإنقسامية هي الشقاصة اي قابلية الانقسام، امكانية الإنقسام الشقائي الى عدة اجزاء.

٢٦١٦ - إنقشار، إنلياط Exfoliation

إنحسار وسقوط لحاء الشجر في الخريف.

٢٦١٧ - إنقضاء الأجل Expiration du terme (F).

Expiration of terme (E).

هو زوال التوقيت القانوني او التعاقد الذي يحدده الالتزام.

٢٦١٨ - إنقلاب الشمس Solstice

انقلاب الشمس او ميلها الاعظم يحصل في فصلي الصيف والشتاء وذلك عندما يكون خط الاستواء قد بلغ اقصى درجات البعد عن الشمس.

٢٦١٩ - أنقليس* ، إنكليس ، حنكليس ،

جريت، صلينباح، قيريث، مارماهي،

مارماهي، مرمريج، نون، شكك

Anguilla vulgaris (S), Anguille commune (F), Common eel (E).

سمكة مأكولة مستطيلة من الانقليسيات تعيش في المياه المالحة والعذبة تكثر في العاصي ودجلة والفرات || طولها عند كمال بلوغها يراوح من ٧٠ الى ١٠٠ سم. ووزنها نحو كيلو. رأسها مستطيل. لها فكان متساويان مجهزان بالاسنان. ثوبها الى الخضار الاسفع. تحمل زعنفتين صدريتين مركزتين عند مؤخر الرأس. لها زعنفة ظهرية واحدة ضيقة تبتدئ عند زامها الثاني وتنتهي مع الزعنفة البطنية الوحيدة ايضاً التي تبتدئ عند الزام الثالث. كانوا يعتقدون في الماضي ان الانقليس لا يتكاثر الا في البحر وقد ثبت الآن انه يبيض ويتكاثر في المياه المالحة والعذبة على حد سواء. وانه يحب البحر ويدخل الانهار حيث يستطيع الى ذلك سبيلاً. وان الانثى تبيض نحو خمسة ملايين سراً. اما مصبل الانقليس فلا يختلف عن مصبل الحيات ويحمل مثله بعض الخواص السامة. وقد توصلوا اخيراً الى استخراجه وحفظه واستعماله تلقيحاً اما للوقاية واما كعلاج.

٢٦٢٠ - أنقليسيات، حنكليسيات


Anguillés (F), Anguillidae, Eels (E).

جنس اسماك مستطيلة الشكل شديدة الالتواء من فصيلة الشيبقيات ورتبة مفتوحات المثانة. انواعه عديدة بعضها بحري وبعضها نهري واكثرها بحرية. نهريه تعيش في المياه المالحة والعذبة على السواء || اعرفها واشهرها الانقليس.

٢٦٢١ - أنقود، نقير* Hile (F), Hilum (E).

هو نقطة اتصال البزرة باغشية الثمرة وهي عبارة عن نقرة صغيرة في البزرة.

٢٦٢٢ - أنكر Ancre




إنقسام مباشر



أنقليس



أنقود



أنكوميرَة صفراء

هيدرات الكربون	١٣,٤ %
رماد	٠,٤ %
الياف	٠,٤ %
	١٠٠,٠

٢٦٣٨ - أنناس بري *Bromelia sylvestris* (S).
Ananas sauvage (F). Wild pine-apple (E). Wilder ananas (D). *Ananasso salvatico* (I).
 نبات بري ، متعاقب ، مشر ، من فصيلة الانناسيات ، ثماره لا تؤكل .

٢٦٣٩ - أنناسيات *Bromeliaceae* (S).
Broméliacées (F). *Bromeliaceae* (E).
 هي الفصيلة الأنناسية من وحيدات الفلقة . أنواعها نحو ٣٥٠ تنتمي الى ٢٧ جنساً . جميعها من نباتات المناطق الحارة الاستوائية || جذورها سطحية هوائية تعيش في التربة وعلى الصخور والأشجار : أوراقها قرصية التجميع طويلة لحمية شائكة الحافة مدببة العنقصة الأبرية || ثمارها اكواز مختلفة الاشكال والاحجام . نبتة يشمر مرة واحدة وكوزاً واحداً يرتكز على شراخ طويل منتصب يقوم مقام الساق .

٢٦٤٠ - أنهار ، تجاري الماء *Cours d'eau* (F).
Stream, Water course (E).

٢٦٤١ - إنهداف *Allergie* (F). *Allergy* (E).
 الانهداف انفعال الجهاز العضوي ازاء بعض المواد المختلفة المصادر .

٢٦٤٢ - أنهران
 الانهران من منازل القمر العواء والسيك . سمياً بذلك لكثرة ماؤها .

٢٦٤٣ - إنهزامي *Défaitiste* (F). *Defeatist* (E).
 نعت تعريفي يطلق على من يقر بالانهزامية .

٢٦٤٤ - إنهزامية *Défaïtisme* (F).
Defeatism (E).
 حالة نفسية تملك بمن يفقد الثقة بالنجاح .

٢٦٤٥ - إنهضام *Peptisation* (F). *Peptization* (E).
 هو رجوع بعض المواد المتخثرة الى اصلها . وقد يتم ذلك بتأثير بعض العوامل الكيماوية .

٢٦٤٦ - إنهضام *Concoction, Digestion*
 هو الهضم الذي يحصل في المعدة .

٢٦٤٧ - إنهبال *Eboulement* (F).
Landslip, Failing in (E).

٢٦٤٨ - أنودة * *Anoda* (S). *Anode, Ocypus* (F).
 جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة الخبازيات . أنواعه قليلة مهدا المكسيك تزرع للتزيين . سوقها تملو من ٩٠ الى ١٢٠ سم . أوراقها السفلى مثلثة الزوايا اما الوسطى والعليا فيضوية القاعدة الى الزام الثاني ثم سنانية . ازهارها فردية ابطية الارتكاز عادية النتح . الوانها براوح من الليلي الى الازرق العابق || ازهارها يستمر طوال الصيف والخريف .

٢٦٣٢ - أنماط زراعية *Façons aratoires* (F).
Dressings of husbandry (E).
 مختلف اشكال انجاز الاعمال الزراعية .

٢٦٣٣ - إنمغاط ، تمغط *Elasticité* (F).
Elasticity (E).
 قدرة الشيء على التمدد بالين .

٢٦٣٤ - أنموذج ، نمودج *Echantillon* (F).
Sample, Specimen (E).
 هو عينة او عينية الشيء .

٢٦٣٥ - إنموس الزيزفون * *Ennomos tillanaria* (S). *Ennomos du tilleul* (F).
Ennomos tillanaria (E).

حشرة من فصيلة الارفيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها الاقاليم المعتدلة الحرارة من البلاد الاسيوية والاروبية . فراشها جارية قوتها رحيق الازهار . سرفها تعيش على اوراق الزيزفون والحور والصفصاف || جسمها متوسط القد ، يطول نحو ١٦ مم . بسطتها نحو ٤٢ مم . رأسها معتدل الجرم . عينها صغيرتان . زباناها مشطيان مزدوجان عند الذكر ، خيطيان ، مستطيلان عند الانثى . جوشها وبطنها الى الطحلة || روشنها الاماميان سداسيا الفروض والاسنان ، متراكبا اللون والتبييض والزركشة . روشنها الخلفيان خماسيا الفروض والاسنان . اهداها الى الصفار التبيي || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في حزيران وتبقى حتى آب . تسرح في الليل . تعاظم بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع . تمتح الممكن لطخاً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرقة عند ادراكها الكمال تقطو من ٣٠ الى ٣٦ مم . جسمها نحيل الجرم يبدو كانه قطعة من قضيب تملو اربعة ثعول متقابلة ، ثوبها الى النبي الاشهب . رأسها الى السمرة القائمة || طور الاكمال يستمر نحو ١٥ يوماً وينقضي ضمن صلجة تحببها السرقة بين الاوراق .

٢٦٣٦ - أنن
 هو طائر يضرب الى السواد وله طوق كطوق الدبسي احمر الرجلين والمنقار مثل الحمامة الا انه اسود (الدميري) .

٢٦٣٧ - أنناس * *Bromelia ananas, Ananas sativus* (S). *Ananas, Bromélie* (F). *Pine-apple* (E). *Ananas, Fichtenapfel* (D). *Ananasso, Pomo apple* (I).

نبات زراعي متعاقب مشر من فصيلة الانناسيات . مهد بعض المناطق الاستوائية من امريكا الجنوبية والانتيل . وقد كثرت زراعته الآن في جميع البلاد الاستوائية اوراقه قرصية التجميع محورية الارتكاز ليفية لحمية طويلة شائكة الحافة مدببة العنقصة الحادة الهدب || ثمرته وحيدة كبيرة الحجم شكلها شكل كوز الصنوبر تملوها ضمة من الاوراق الصغيرة ، محورية الارتكاز القرصي . يزرع لثماره الفخمة اللذيذة الشينة . وثماره هذه غزيرة العصارة السكرية غنية بالفيتامينات «آ» و «ث» . يتكاثر بالفسائل التي تنبت عند قرص الساق وبضمة الاوراق التي تملو الثمرة حيث تقطع مع شيء يسير من الكوز يؤمن لها الغذاء حتى انتاش الجذور .

متوسط تركيبها :	ماء	٨٥,٠ %
	بروتين	٠,٥ %
	دهن	٠,٣ %



انموس الزيزفون



أنناس



أنودة

زوجي هنداً يعني أمه، فقال أنها تعدت عن الولد فلا حاجة لها إلى الزواج؛ قال فولّي ناحية كذا فأشدد معاوية رضي الله عنه:

« طلب الأبلق المقوق فلما

اعجزته أراد بيض الانوق »

انشاء تبيض من الرفنتسين إلى الثلاث، كبيرة الحجم شبه مستديرة. تحضنها منوبة مع الذكر نحو خمسة أسابيع. قوتها الجيف على اختلافها ويقال أنها لا تمتد على الحيوان الحي ولو عضها الجوع || أنواعه المعروفة اثنان.

٢٦٥٨ - أنوق الشرق *Otogyps calvus* (S).

ثوبه اسم ابقع يعلوه موج حنطي. *Oricou d'Orient* (F).

٢٦٥٩ - أنوق النوبة * *Otogyps auricularis* (S).

ثوبه اسم اغبر داكن يعلوه موج متجانس يخفف من

زها. الريش.

٢٦٦٠ - أنومال الكرمة *Anomale de la vigne* (F).

اطلب جعل الكرمة الاخضر.

٢٦٦١ - أنومال دوبا * *Anomala dubia* (S).

Anomale varié (F).

خنافس من فصيلة الجمليات. طولها نحو ١٤ مم. لونها إلى الخضرة موارجها زنجاري، طرفها مع غمدتها إلى الصفرة. يكثر طيرانها في حدة الشمس. اضرارها قليلة. تفضل المناطق الرملية.

٢٦٦٢ - أنومال مذهب * *Anomala aurata* (S).

Anomale doré (F). *Anomala aurata* (E).

خنافس خاضعة من فصيلة الجمليات ورثة مغمدات الاجنحة. موطنها بعض اقاليم حوض البحر الابيض المتوسط. تألف نباتات الاقربة القليلة الاندماج والرملية ولا تمت عن الكرمة والورد والموسج والاشجار المثمرة || جسمها صغير القد يطول من ١٢ إلى ١٤ مم. ويعرض من ٦ إلى ٧ مم. ثوبها العلوي إلى الاخضر الذهبي الموج. رأسها مستدير. خطها قصير. زباناها صغيران، صفيها الاطراف. عينها صغيرتان. ظهرها مقطوم الطرف الذي لا يلحف الشرج. ارساغها خاسية العقل والخلفية منها ثنائية الخالب || الانثى اميز قدماً من الذكر وافتح ثوباً منه واقصر زبانا || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في اوائل ايار وتبقى نحو سبعة أسابيع. مسرحها ضوئي ينشط مع وهج الشمس || البرقة بطيئة النمو يبلغ طولها عند الادراك التام نحو ٢١ مم. جسمها مقوس الشكل، مستغلف البطن، عاجي اللون، اسود الرأس، سداسي الرواجب، ضليع التأشير الحادة. الطور البرقي يستمر من ٢٨ إلى ٤٠ اسبوعاً والبرقة تعيش على جذور النباتات المختلفة اعصها العشبية من حولية ومحولة || طور الاكمال يستمر نحو ستة أسابيع.

٢٦٦٣ - إنيا، إنيا *Inia* (F).

حيوان نهري لبون يدعى بوئو الامازون، اطلبه.

٢٦٦٤ - إنيام *Dioscorea* (S). *Igname* (F). *Yam* (E).

جنس نباتات عشقولية عارضة معصرة من فصيلة الديوسقوريات. أنواعها عديدة منها البري والزراعي. مهدا الاقاليم الحارة

٢٦٤٩ - أنور الإكليل، بيتا المقرّب

Acrab (F). *Acrab* (E).

نجم من كوكبة العقرب.

٢٦٥٠ - أنور الشرطين

أنور الشرطين نجم ثير من كوكبة برج الحمل مركزه على القرن بالقرب من أخفى الشرطين.

٢٦٥١ - أنور الظليمين *Deneb* (F). *Deneb* (E).

أنور الظليمين نجم ثير من كوكبة العقاب مركزه في الذنب.

٢٦٥٢ - أنور العنهة *Alhena* (F). *Alhena* (E).

أنور العنهة أو الميسان نجم ثير من كوكبة الجوزاء.

٢٦٥٣ - أنور العوائد *Rastaban* (F). *Rastaban* (E).

أنور العوائد ويدعى أيضاً رأس الثعبان نجم ثير من كوكبة الثنين مركزه على رأس الثنين.

٢٦٥٤ - أنور الفرقدين

Pherkad (F). *Pherkad* (E).

أنور الفرقدين نجم ثير من كوكبة الدب الاصغر. وهما فرقان الأنور والأخفى.

٢٦٥٥ - أنور المنطقة

Mintaka (F). *Mintaka* (E).

أنور المنطقة نجم ثير من كوكبة الجوزاء مركزه في منطقة الجوزاء. راجع الجبار أو الجوزاء.

٢٦٥٦ - أنورين، ثيامين

Aneurine, *Thiamine* (F).

الانورين والثيامين هما الاسمان العلميان للفيثامين ب ١.

٢٦٥٧ - أنوق *Otogyps* (S). *Oricou* (F).

جنس طير من الكواسر تنتمي إلى فصيلة النسريات. جثتها كبيرة ضخمة طولها نحو ١٥٠ سم وبسطة سقطيها ٣٢٠ سم. رأسها اصلع ارمي. محاسرها بنفسجية. منسرها مستطيل، اصفر البدن، اسود الهرة الشديدة الانعقاد. عنقها ارمي المقدم اغفر المؤخر، زغبه رمادي اللون. سقطيها كبير متفرج. ذنبها قصير مستدير || تعيش جماعات، تعيش في صدوع الصخور. ومن طبعها أنها لا ترضى من الجبال إلا الموحش والشاهق منها. يقال ان في اخلاقتها اربع خصال تحضن بيضها وتحمي فرخها وتألف ولدا وانها لا تمكن من نفسها تغير أزواجها. وفي المثل اعز من بيض الانوق وامنع من بيض الانوق فلا يكاد يظفر به لان اوكلها في رؤوس الجبال الساحقة وهي تحقق مع ذلك. قال الشاعر:

نوق عليها لا ينال ذراها

يلعب النسر دونها والانوق

وقال غيره:

رذات إسمين والالوان شتى

وتحقق وهي كيسه الحويل

وقال غيره أيضاً:

وكنت اذا استودعت سرأ كتمته

كبيض انوق لا ينال لها وكر

وقال الدميري في كتاب حياة الحيوان: « يقال رجل لمعاوية



أنوق النوبة



أنومال دوبا



أنومال مذهب

الشكل عديدة المنافع من فصيلة المغنوليات . مهدا الصين وما جاورها . ثمارها مركبة لوزية دهنية ، لبها أبيض اللون حلو الطعم عطري الرائحة يستعمل في عسدة صناعات شرابية وكحولية فضلاً عن استعماله الطبي . ويستعملون أوراقها لتعطير الشاي ومنهم من يمسحها .

٢٦٧٠ - أنيليس

قال الانطاكي : « يوناني معناه دواء الرحم وهو تمشي يشبه ورقه ورق العنبر وزهره أحمر يخلف حباً في غلف رقيقة حاد الرائحة ومنه صغير لا يرتفع » . وهو نبات طبي قد يكون الانثليس .

٢٦٧١ - أنيلين
Aniline
قل عضوي صناعي يستعمل كأساس في ألوان الصباغة .

٢٦٧٢ - أنيسون
هو الشقار ، اطلبه .

٢٦٧٣ - إهاب
Peau non tannée (F).
Skin no tanned (E).
الاهاب : الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدينغ .

٢٦٧٤ - إهكان
Pédicelle, Pédoncule (F).
Pedicel, Peduncle (E).
هو عرجون الثمرة أي عنقها أو معلقها . ويقال له إهنا . ج . أهن .

٢٦٧٥ - إهتدب
Cueillir le fruit (F).
To gather fruits (E).
إهتدب وهتدب الثمرة : جناها .

٢٦٧٦ - إهتصار
الاهتصار : سقوط النصل على الأرض واصله في الشجرة .

٢٦٧٧ - أهرة
Matériel agricole (F).
Implements of husbandry (E).
الادوات الزراعية الشائعة الاستعمال ، ج . أهر وأهرات .

٢٦٧٨ - أهل العمد
Scénite (F).
لقب يطلق على الشعوب أو القبائل التي تعيش في المضارب .

٢٦٧٩ - إهلال قسطا * ، حشيشة الملكة

Tanacetum balsamita (S). Tanaisie balsamite, Baume coq (F). Tansy, Cost, Costmary (E). Rainfarn, Wurm-kraut (D). Tanaceto (I).
نبات عشبي بري وتزييني من فصيلة المركبات الشعاعية الزهر . يكثر في الأماكن الرطبة الكثيرة الحصى . أوراقه كبيرة القد مأكولة لا تخلو من المنافع الصحية . أزهاره هامة تزيينية جميلة الصفار .

٢٦٨٠ - أهلب
Polysète (F). Polysetous (E).
نعت تعريفي يطلق في علم الحيوان على من كانت فروته كثيرة الشعر الجامد المستطيل كالأهلب .

٢٦٨١ - أهلية
Capacité (F). Capacity (E).
هي حالة المرء في علاقته بالحقوق وهي على أنواع : أهلية الاداء وأهلية الوجوب وأهلية الالتزام وأهلية التصرف .

٢٦٨٢ - إهليلج
Badamier (F). Terminalla (E).
جنس أشجار حرجية وزراعية من فصيلة الاهليلجيات . منبتها الهند وجاوا والانتيل وسرنديب والسفال || سوقها

الاسيوية والامريكية . أشهرها انيام الانتيل والهند واليابان والصين || جميعها عشقوية عارشة عطلة ملتفة . أوراقها متقابلة معنقة قلبية . أزهارها صغيرة ثنائية المسكن ، عنقودية التجميع ، ابطة الارتكاز . عسقلها نبوتية مدبسة الشكل ، نشوية حلوة تؤكل بعد الشاي أو بعد السلق لأنها تحوى بعض العناصر المرة السامة التي تبخرها الحرارة || أشهر اقواعها الزراعية والبرية هي ما يتبع .

٢٦٦٥ - إنيام برّي *
Dioscorea villosa (S).
Igne sauvage (F). Wild yam, Colic root (E). Zottige yamwurz (D). Dioscorea salivatica (I).

نوع من الانيام البري كان ولا يزال يستعمل في بعض المستحضرات والمقايير الوطنية الهندية - الصينية || وهو نبات مداد معمر . أوراقه علفية غزيرة المادة الغذائية . ترعاها الماشية ويجود عليها الحليب .

٢٦٦٦ - إنيام زراعي * ، ديسقوريا ، بطاطا صينية
Dioscorea batatas, D. bulbifera (S). Dioscorée, Igame, I. bulbifère, I. de chine (F). Chinese yam, Japanese yam (E). Bulbillentrage, Yamwurz (D). Dioscorea, Igame (I).

جنس نباتات زراعية من الانيام تزرع لعسقلها المأكولة . زراعتها تستمر ثلاث سنوات || انواعه قليلة أشهرها انيام الانتيل الابيض وانيام الهند الاحمر وانيام الصين وانيام اليابان .

٢٦٦٧ - أنيس
« طائر حاد البصر مأواه قرب الانهار والاماكن الكثيرة المياه الملتفة الاشجار وله لون حسن وتدير في معاشه . قال ارسطو انه يتولد من الشقراق والغراب وذلك بين في لونه . وهو طائر يحب الانس ويقبل الادب والثرية . غذاؤه الفاكهة واللحم » (الدميري) .

٢٦٦٨ - أنيسون * ، أنيسون ، يانسون ، كسون حلو ، حبه حلوه ، يسون أنيسي

Pimpinella anisum (S). Anis, Anis vert (F). Anise, Sweet cumin, Aniseed plant (E). Anis, Anisbiber-nelle, Grüner anis (D). Anice, Anacio (I).

نبات عشبي زراعي حولي من الافاويه وفصيلة الخيميات ساقه فرعاء دقيقة زياء تعلو نحو ٥٠ سم . أوراقه مركبة السفلى منها ثلاثية الوريقات القلبية المحزوزة اما العليا فجزأة ريشية . أزهاره صيوانية التجميع ابطة وتاجية الارتكاز بيضاء اللون . ثماره بزور صغيرة فقيرة مستطيلة لونها الى الخضار الاشهب ، فواحة العرف المستحب يستخرج منها عطر الانيسون وتدخل في عدة صناعات وشرابات كحولية اخصها العرق || الغرام منها يعد نحو ٣٠٠ زرة والبزرة تحتفظ بقوة انتاشها ثلاث سنوات || زراعتها محصورة في بعض المناطق لانه من النباتات التي تحشى البرد وترغب في الاثربة الخوارة القليلة الاندماج الممكن ريبها كلما دعت الحاجة || بزوره تنشط الهضم وتزيل الانتفاخ وتسكن المغص وتدر البول وتنفع الصدر .

٢٦٦٩ - أنيسون نجمي * ، بديان نجمي
Illicium anisatum, I. parviflorum, I. religiosum, I. verum (S). Anis étoilé, Badlane, Badianler (F). Star anis tree (E). Sternanisbaum, Badianenbaum (D). Anacio stellato, Anice della China, Badiana (I).
نوع من البديان وهي شجيرة فرعاء متوسطة الحجم جميلة



إنيام برّي



إنيام زراعي



أنيسون



أنيسون نجمي



إهلال قسطا

٢٦٩٠ - أهوكاتية* ، أبوكاتية ، أبوكادو ، أبوكة

Laurus persea, *Persea gratissima*, *P. americana* (S).
Avocatier, Persée (F). Avocado pear, Alligator
pear (E). Avocatobaum (D). Pero avocado (I).

جنس اشجار مشمرة من فصيلة اللغاريات . انواعها المعروفة قليلة . اما ضرورها واصرامها الزراعية فكثيرة العدد اسمها العربي والفرنسي والانكليزي والالماني والايطالي تحريف لاسمها المكسيكي او بالاحرى الازتيكي (Ahuaca, Ahuacate) شجرتها جميلة الشكل ، شبه هريمه القالب . شامخة القنة والافنان تعلو من ٨ الى ١٠ امتار . جذعها متوسط الغلاظة . ساقها سرحة غضة اللحاء طحلاء اللون . اوراقها ايده متعاقبة معنقة ، تصلها اهليلجي الشكل ، مدبب العقصة ، جامد الصفحة ، العن الحصار ، لامع المواجه . ازهارها عتقودية التجميع ، لاقياسية الارتكاز منها المحورية والطرفية . اكمامها سداسية التركيب ، اسديتها ١٢ ، مآبرها رباعية المصاريع تنفتح للتفطيج عند ايناع الوليع . ثمارها مختلفة الاشكال والاحجام يكثر فيها الاجاصي . وزنها يراوح من ١٠٠ الى ٥٠٠ غ . قشورها مألسة معتدلة السماكة لونها الى الاخضر العابق تعلوه ماجة بنفسجية او جثوية . سودقها لبابي التركيب ، جامد المكسر ، اغبر اللون ، غزير المادة الدهنية ، بندي الطعم والمذاق ، حيود النكهة ، خافت العرف . عجمتها كبيرة القد ثنائية الزبارة ، لبوها لبنة العصارة السريعة التأكد والاحمرار ، كثيرة المسادة المنية الصالحة لعلف المواشي . الشجرة تدعى أبوكاة واهواكة واويكاة . لبها يحوي :

٧٠,١٠	ماء
٢,١٥	بروتايين
٢٠,٠٠	مواد دهنية
٧,٦٠	مواد هيدروكربونية
٠,١٥	رماد

لذلك تعتبر من الاغذية الشبه الكاملة التي تتوافر فيها الفيتامينات «آ» و «ب» . وهي تؤكل مع السكر او مع الملح والفلفل او مع عصير الليمون او النبيذ وقد تهرس وتعطر بالونيل وتستهمل استعمال الزبدة . وهي بالتالي من اشهر الثمار الامريكية واعمها استعمالاً ذلك لان موسم ضرورها المختلفة يستمر طوال السنة ولان متوسط المنة خفام من لبها المأكول يقدر بمائتي سعة حرارية مما يجعلها بمرتبة الحبوب الغذائية . اما اوراقها فتستعمل مقوية للمعدة وطامنة وطاردة للريح ودافعة للحميات . وتستهملها العامة لتحليل الرمل الكلوي وتفتيت بعض انواع الحصى وتذويب الاملاح وادرار البول .

مهدا وزراعتها :

يقال انها من نبات المكسيك وقد عمت زراعتها معظم البلاد الامريكية وبعض المناطق الافريقية والاسيوية . وقد شاهدنا منها عشرات الاشجار على الساحل الليباني الممتد من الحنية (قضاء صور) الى جبيل || ضرورها كثيرة العدد متفاوتة الصفات الجسورية والخصائص التريية والمناخية التي تجعل بعضها يتحمل الصقيع حتى الست درجات تحت الصفر بينما البعض الآخر لا يقوى على احتمال درجة الصفر ولا يحتمل غيره الثمان درجات . تتكاثر بالبذر والتطعيم . شجرتها تنمو بعمر العشر سنوات اذا ما بقيت على حالها دون تطعيم . واذا صار تطعيمها بعمر ثلاث او اربع سنوات تنمو بعد ذلك بسنتين . اصليح تطعيم يوافقها الرقي المزورز القاعدة كما في الليمون .



إهليلج كابلي



إهليلج لوزي



إهليلج هندي شعيري



أهوكاتية

منتصبة ، اغصانها فرعاء ، قشورها مألسة ، اوراقها ملحقة الشكل معنقة ضمية التركيب لونها الى الخضار القاتم . ازهارها سنبلية التجميع ابضية الارتكاز . ثمارها لوزية لبنة عجمية || يستخرج من لحائها صمغ قابض عفص يستعمل في الطلاء الصيني وهو من اجود انواعه || لباب ثمار بعضها يدخل في عدة علاجات طبية . اما دهنها فشائع الاستعمال يقوم مقام زيت الزيتون || اشهر انواعه ما يتبع .

Terminalia citrina (S).

٢٦٨٣ - إهليلج أصفر

Myrobalan citrin, Terminalier citrin (F). Hara nut tree (E). Gelbe myrobalanen (D). Mirobalano citrine (I).

شجرة من الاهليلج فاخرة الصنع الذي يعتبر من اجود انواع الطلاء .

٢٦٨٤ - إهليلج بليته ، بليته

Terminalia bellerica (S). Myrobalan belleric, Badamier-vernis (F). Belleric myrobalan, Bedda nut tree (E). Myrobalanenbaum (D). Mirobalano (I).

هو النوع الجوي الذي يستخرج منه ، مثل النوع الاصفر ، اجود الطلاء الصيني .

Terminalia chebula (S).

٢٦٨٥ - إهليلج كابي

Myrobalan chébulé, Chébulé (F). Back myrobalan, Chebulic myrobalan (E). Raspiger myrobalanenbaum (D). Mirobalano nero (I).

يستعمل في بعض العلاجات الطبية المحلية ويستخرج من لباب لوزة الصنوبر زيت يؤكل .

٢٦٨٦ - إهليلج لوزي* ، لوز هندي

Terminalia catappa (S). Amandier des Indes, Badamier (F). Country almond, Indian almond tree (E). Catappenbaum (D). Mandorlo d'India (I).

يستخرج من لباب لوزة زيت معروف يدعى : الزيت الهندي .

٢٦٨٧ - إهليلج مجنح ، عنص

Terminalia alata (S). Myrobalan ailé (F).

نوع من الاهليلج الطبي . شجرتة متوسطة الارتفاع والحجم ، كثيرة الفروع : فتاء . عجبات ثماره لوزية الشكل لبها غزير المادة الدهنية . لحاء السوق والاغصان تستعمل كقابضة وكدافعة للحميات .

٢٦٨٨ - إهليلج هندي شعيري*

Terminalia horrida (S). Myrobalan d'Inde (F). Indian myrobalan tree (E). Indischer myrobalanenbaum (D). Mirobalano d'India (I).

هو النوع المشهور بثأره المعروفة باسم (هندي شعيري) وثماره مسهلة لا بأس بها ولا سيما للاطفال لانها لا تسبب نغصاً . ومن قائل انها تستعمل في منع الحمل وقد يكون صحيحاً ولكن في حالات خاصة . والثمرة كثيرة المنافع الطبية الصحية .

Combretaceae (S).

٢٦٨٩ - إهليلجيات

Combretacées (F). Combretaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مهدا البلاد الحارة والاستوائية . اجناسها وانواعها عديدة جميعها اشجار وشجيرات وبجالات . قشورها رائنجية طبية وصناعية تدخل في الصباغ والدباغة . بزورها دهنية ، زيوتها نافعة .



أهوكة



أراكاري



أوال



أودو

٢٦٩٨ - **أوجه** (F). Unproductive (E).
أوجهت الاشجار : لم تثمر.

٢٦٩٩ - **أودح**

أودح الكباش اذا توقف ولم ينز.

٢٧٠٠ - **أودع**

الاودع : هو اليربوع (عن الجوهرى).

٢٧٠١ - **أودتوسيريات** (S). Odontoceridae (E).

فصيلة حشرات من رتبة جملونيات الاجنحة . اجناسها وأنواعها المعروفة قليلة العدد ، اعطائها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها متوسطة القد ، سمراء اللون . بسطة اجنحتها تراوح من ٢٠ الى ٣٦ سم . قرونها الاستشعارية مسننة عفاة الفصل . اجنحتها الامامية الى الطحلة الفضية المواج || اساريها طليقة تعيش في المياه الراكدة ضمن شبك رجة تحبها بين الاعشاب المائية .

٢٧٠٢ - **أودوه** (F). Aralia cordata (S).

نوع من الاراليه وفصيلة الاراليات . مهدد اليابان . ضروبه ثلاثة او اربعة . وهو نبات عشبي معمر . سوقه ليفية ترتفع منتصبه نحو المتر . اوراقه مركبة . جذوره كبيرة لحمية مأكولة وأماجله كذلك || يتكاثر بالبذر والتدريج .

٢٧٠٣ - **أودما ، وذمة** (F). Œdème (F).

استسقاء موضعي . Œdema, Edema (E).

٢٧٠٤ - **أوراسيا** (F). Eurasia (E).

كلمة تعني اروبة وآسيا . اسم يطلقه علماء الجيولوجية والجغرافية ، في هذا العصر ، على المجموعة القارية التي كانت ، قبل تجزئتها ، تتألف من آسيا واروبة بما فيها روسيه .

٢٧٠٥ - **أوران**

هو البعامة الشائعة ، اطلبها .

٢٧٠٦ - **أورانوس** (F). Uranus (E).

كوكب سيار يتبع النظام الشمسي ، اكتشفه العلامة «هرسكل» عام ١٧٨١ || حجمه يفوق حجم الارض نحو ٧٥ مرة . دورته حول الشمس تستمر نحو ٨٤ سنة ويبعد عنها نحو ٢٨٨٠ مليون كيلومتر . سرعة انطلاقه في الفضاء نحو ٢٥٢٠٠ كيلومتر بالساعة || يدور في فلكه خمسة اقمار : ميراندا واريال وامبريال وتيتانيا وأوبرون .

٢٧٠٧ - **أورانيا**

اطلب رعاية .

٢٧٠٨ - **أورانيوم**

Uranium
معدن يميل الى البياض ، يذوب تحت درجة عالية جداً (١٨٥٠ سغ) ، وزنه النسبي ١٨٠٦ رمزه (U) وقد يعتبر أيضاً أثقل المعادن من حيث الوزن الذري وهو يستخدم في صناعة القنبلة الذرية || وهذا المعدن يستخرج من الاوران (Urane) المعروفة باسم اكسيد الاورانيوم (Oxyde d'uranium) .

ترغب في الاثربة الخوارة المتوسطة الاندماج ونحشى كثرة الرطوبة || تغرس على ابعاد تراوح من ٧ الى ٨ امتار . تبلغ ذروة انتاجها بعمر ١٨ او ٢٠ سنة ويستمر ذلك نحو عقدين اذ تغل سنوياً من ١٠٠٠ الى ١٤٠٠ ثمرة براوح متوسط وزنها من ٣٠٠ الى ٤٠٠ كيلو . ضروبها واصرامها الحالية المعروفة تفوق الالف ، اشهرها ضروب الانثيل وغواتيالا والمكسيك .

ضروب الانثيل :

تجود في البلاد الحارة والاثربة المتوسطة الرطوبة . جميعها سريعة النمو ، نشيطة ، غادقة ، حولية الحمل . ثمارها كبيرة القد تنضج من تموز الى تشرين الثاني ، لبابها جامد المكسر مستحب العرف الخافت لكنه قليل المسادة الدهنية التي لا يفوق متوسط نسبتها ١٧ % .

ضروب غواتيالا :

تجود في البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة وتحمل درجة الصفر دون ان تتأذى . معظمها من الضروب السنبة المتناوبة الحمل . ثمارها كبيرة القد تنضج في فصلي الربيع والشتاء . لبابها جامد المكسر ، مستحب العرف ، غزير المسادة الدهنية التي يراوح متوسطها من ١٨ الى ٢٠ % .

ضروب المكسيك :

تجود في البلاد المعتدلة الحرارة وتحمل دون ان تتأذى الست درجات تحت الصفر . معظمها نشيط ، مريع ، حولي الحمل . ثمارها متوسطة القد متباينة الاشكال تنضج في الخريف والشتاء والربيع لكنها لا تتحمل السفر البعيد نظراً لرقه قشورها . لبابها مستحب العرف تعلوه زائحة تشبه الانيسون وهو جامد المكسر غزير المادة الدهنية التي يراوح متوسطها من ٢٠ الى ٢٢ % .

٢٦٩١ - **أهوكة** ، **أبوكاة** (F). Avocat (F).

ثمرة الاهوكاتية .

٢٦٩٢ - **أوابد** (F). Sédentaires (F), Sedentary (E).

الطيور المقيمة بأرض شتائها وصيفها . والاوابد ضد القواطع .

٢٦٩٣ - **أواكاري** ، **بركيبورس** (S). Brachyurus (S).

Brachyure, Ouakari (F).

جنس قروود امريكية من فصيلة السبوسيات . انواعه ٣ موطنها غابات ضفة الأمازون اليسرى . اجسامها ربة ، رؤوسها قليلة الشعر . اذناها قصيرة كاسية . اثوابها الى السرة . شعارها ناعمة ووثيرة || تألف الغابات مرتعها الاشجار . قوتها الثمار والبراعم والاوراق والخضرات ويبض الطير والعسل .

٢٦٩٤ - **أوال** ، **أوالى** ، **أوليات** ، **ابتدائيات**

Protozoaires (F). Protozoa (E).

هي الحيوانات الاولييات ذوات الخلية الواحدة . منها البوغيات والنقيعيات والجذريات الارجل ...

٢٦٩٥ - **أوان البذر** (F). Semaïson (F), Sowing-time (E).

هو الوقت الانسب لرمي البذار .

٢٦٩٦ - **أوب** (F). Abellies (F), Bee (E).

الأوب : النحل وهو اسم جمع .

٢٦٩٧ - **أوبه** (F). Membre (F), Member (E).

الأوبه قائمة الدابة ، ج . أوبات .

٢٧١٧ - أورس عراقي
Cygne (F). Swan (E).
اطلب تم .

٢٧١٨ - أورس مسبلح
Olés à éperons (F).
هو الحراثم ، اطلبه . رمته :

٢٧١٩ - أورس مصرية
Ole de Guinée (F).
حراثمة غامبي

٢٧٢٠ - أورس
Oia de Siam (F).
حراثمة سيام

٢٧٢١ - أورس
Oie de Chine (F).
حراثمة الصين

٢٧٢٢ - أورس
Oie de Madagascar (F).
حراثمة مدغشكر

٢٧٢٣ - أورس
Ole d'Egypte (F).
اطلب شقة النيل .

٢٧٢٤ - أورس
Eosol
ماكون زراعي سائل يرتكز على زيت النفط . يستعمل
محلولاً بالماء بمعدل ٣٪ في مكافحة الشتوية ضد مكن
الحشرات من أي نوع كانت وضد الامراض الفطرية وضد
قرمزيات الاشجار المثمرة .

٢٧٢٥ - أورس
Ozone
ضرب من الاوكسيجن وهو غاز مشكال ازرق اللون قوي
الرائحة الاخذة شديد النشاط الاكسيدي . يستعمل في تطهير
مياه الشفة وفي تعقيم الكحول .

٢٧٢٦ - أورس
Ozonium
فطر مجهرى من الوسيات يكثر في زراعات القطن حيث
يركب الجذور السطحية او يسرح في المواد العضوية
الموجودة على سطح التربة || هيفه غيطي الشكل اغبر
اللون كثيف التجميع المشطي ، يمتد كالشع المتراكب
النوايس || قيل انه يسبب مرض التكساس او الدميجة
الشائعة .

٢٧٢٧ - أورس
٢٧٢٨ - أورس
٢٧٢٩ - أورس
٢٧٣٠ - أورس

٢٧٣١ - أورس
٢٧٣٢ - أورس
٢٧٣٣ - أورس

٢٧٣٤ - أورس
٢٧٣٥ - أورس
٢٧٣٦ - أورس

٢٧٣٧ - أورس
٢٧٣٨ - أورس
٢٧٣٩ - أورس

٢٧٤٠ - أورس
٢٧٤١ - أورس
٢٧٤٢ - أورس

٢٧٤٣ - أورس
٢٧٤٤ - أورس
٢٧٤٥ - أورس

٢٧٤٦ - أورس
٢٧٤٧ - أورس
٢٧٤٨ - أورس

٢٧٤٩ - أورس
٢٧٥٠ - أورس
٢٧٥١ - أورس

٢٧٥٢ - أورس
٢٧٥٣ - أورس
٢٧٥٤ - أورس

٢٧٥٥ - أورس
٢٧٥٦ - أورس
٢٧٥٧ - أورس

٢٧٥٨ - أورس
٢٧٥٩ - أورس
٢٧٦٠ - أورس

٢٧٦١ - أورس
٢٧٦٢ - أورس
٢٧٦٣ - أورس

٢٧٦٤ - أورس
٢٧٦٥ - أورس
٢٧٦٦ - أورس

٢٧٦٧ - أورس
٢٧٦٨ - أورس
٢٧٦٩ - أورس

٢٧٧٠ - أورس
٢٧٧١ - أورس
٢٧٧٢ - أورس

٢٧٠٩ - أورس
Débourrer (F).
اورس الشجر : اوراق ، راجع اجدر .

٢٧١٠ - أورس
Podoces (S).
Podoce (F). Podoces (E).
جنس طير من الغربان . انواعه المعروفة قليلة العدد :

تتميز بضعف طيرانها وقصر شوطها وسرعة عدوها على
الارض || اجسامها متوسطة القد . مناقيدها معتدلة الجرم ،
مخاطمها العليا تلحف السفلى . اجنحتها ذلقة ، صغيرة ،
قليلة الانفراج . ارساغها قوية ، اصابعها مستطيلة مسلحة
بمخالب حادة قليلة الانعقاد || اعرف انواعه واشهرها
أورق بندر .

٢٧١١ - أورس بندر
Podoces panderi (S).
Podoce de Pander (F). Pander Podoces (E).
طائر من الاورق . موطنه صحاري الشرق والشرق الاوسط .

يألف الحياة الجلمية . سربه يعد بعض المئات || جسمه
ربعة يطول نحو ٢٦ سم . ثوبه الى الخضار البحري الزاهي
يمبق في الظهر والجوشن . محسراه الى السمرة الفحمية .
عيناه مطوقتان بإطار من الريش الدقيق الابيض . جناحه
ابيض اللون ، اسود القاعدة والطرف || قوته الجراد والحشرات
المختلفة والديدان والبذور . يتميز بقله طيرانه . وبقصر
شوطه وبكثرة اقامته على الحفيض || يدنن عشه في السنت
او في ابواب الصخور . انشاه تحضن وحدها من ٣ الى ٤
بيضات بيضا الذكر يؤمن لها الغذاء .

٢٧١٢ - أورس ، بولة ، يوريا
Urée (F).
Urea (E).
نوع من الاسمدة الازوتية العضوية المركبة . مظهره الخارجي

ملح ابيض بلوري الشكل سريع الذوبان بالماء يحوى
٤٦٪ من الازوت || وهو من الاسمدة البطيئة الانحلال ،
التدرجية المفعولة ، الطويلة الخدمة ، الواجب استعمالها قبل
الفرس والحاجة بنحو ٤٠ يوماً وذلك لتمكين الازوت البولي
من الاستحالة الى ازوت امونياكي ثم نيتراكي قابل التربة .

٢٧١٣ - أورس
٢٧١٤ - أورس
٢٧١٥ - أورس

٢٧١٦ - أورس
٢٧١٧ - أورس
٢٧١٨ - أورس

٢٧١٩ - أورس
٢٧٢٠ - أورس
٢٧٢١ - أورس

٢٧٢٢ - أورس
٢٧٢٣ - أورس
٢٧٢٤ - أورس

٢٧٢٥ - أورس
٢٧٢٦ - أورس
٢٧٢٧ - أورس

٢٧٢٨ - أورس
٢٧٢٩ - أورس
٢٧٣٠ - أورس

٢٧٣١ - أورس
٢٧٣٢ - أورس
٢٧٣٣ - أورس

٢٧٣٤ - أورس
٢٧٣٥ - أورس
٢٧٣٦ - أورس

٢٧٣٧ - أورس
٢٧٣٨ - أورس
٢٧٣٩ - أورس

٢٧٤٠ - أورس
٢٧٤١ - أورس
٢٧٤٢ - أورس

٢٧٤٣ - أورس
٢٧٤٤ - أورس
٢٧٤٥ - أورس

٢٧٤٦ - أورس
٢٧٤٧ - أورس
٢٧٤٨ - أورس

٢٧٤٩ - أورس
٢٧٥٠ - أورس
٢٧٥١ - أورس



أوربية



أوزونيوم



أوفاريه

٢٧٤٢ - **أوكريديه** (S). Eucharidie (F).
جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة الاخدريات. انواعها قليلة، اعطانها البلاد الامريكية. سوقها فرعاء. اوراقها معتقة، كاملة، لا قياسية الترتيب منها المتقابلة والمتعاقبة. ازهارها محورية الارتكاز، مستطيلة الاذن، رباعية البتلات والاسدية || اعرف انواعها واشهرها ما يلي.

٢٧٤٣ - **أوكريديه قصيرة** (S). Eucharidie de Brewer (F).

نوع من الاوكريديه التزيينية. ساقها وفروعها مثدونة تعلو من ١٥ الى ٢٠ سم. اوراقها ضيقة متقابلة، نصلها سميك الصفحة. ازهارها متوسطة القد، بتلاتها ثلاثية التفليق مستطيلة الفص الاوسط. لونها الى الوردي يتوسطه الابيض || ازهارها يستمر طوال الصيف.

٢٧٤٤ - **أوكريديه كبيرة الزهر** *

Eucharidium grandiflorum (S). Eucharidie à grandes fleurs (F).

نوع من الاوكريديه التزيينية. ساقها فرعاء فناء تعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. اوراقها صغيرة القد سنانية النصل تقطو نحو ٤ سم. ازهارها كبيرة فارشة عتيقة اللون. ازهارها يستمر من تموز الى آب.

٢٧٤٥ - **أوكريديه لطيفة** (S). Eucharidie mignonne (F).

نوع من الاوكريديه التزيينية ساقها تعلو نحو ٣٠ سم. اوراقها سنانية ذرية تقطو نحو ٣ سم. وتعرض نحو ١ بتلات ازهارها ثلاثية التفصيص وريسة اللون بيض المروق. ازهارها يستمر من تموز الى آب.

٢٧٤٦ - **اوكسيدور** Oxydor
فاطور زراعي يستعمل سائلاً محلولاً ١٪ في مكافحة امراض البطاطا الفطرية.

٢٧٤٧ - **اوكسيكلورير النحاس**

Oxychlorure de cuivre (F).
فاطور زراعي يرتكز على النحاس وهو شديد الفاعلية النسيية، يستعمل في مكافحة عدة امراض فطرية الخصها التسنه.

٢٧٤٨ - **أولستيوم** *، أولستيوم، غبرة

Holosteum umbellatum (S). Holoste ombellée (F).
Chickweed, Holosteum (E). Doldenspur, Nelken-grass (D). Morgellina ombrellata (I).

نبات عشبي زغبى بري وزراعي معمر من فصيلة القرنفليات اوراقه متقابلة تشبه اوراق القرنفل. ازهاره عطرية جميلة. ازهاره صيواني التجميع. يزرع لجمال ازهاره.

٢٧٤٩ - **اوليات** راجع اوال.

٢٧٥٠ - **أولياريه** (S). Oléaria, Oléaire (F).
جنس نباتات استرالية المنبت معقودة التعريف على اسم العلامة البوتاني اولياريوس. وهي من فصيلة المركبات. انواعها عديدة جميعها شجيرات وجنيات دائمة الخضار، اوراقها كاملة بسيطة صغيرة القد. ازهارها رئيسية بيضاء اللون ومنها عطرية عرفها كالمسك || تزرع للتزيين.

النصل. ازهارها محورية فردية قصيرة الاذن، ثمارها صغيرة لا تكبر الجوزة، قشدية، سكرية. كثيرة البذور السود.

٢٧٣١ - **أوفريس** *، حاجبيته (S). Ophrys (S). Ophrys (E). Kerfblume (D). Ofrio (I).
جنس نباتات عشوية درنية معمرة من السحليات. انواعها عديدة معظمها بري وبعضها زراعي. ولكل من انواعها زهرة موصوفة بشكلها الخاص، كالنحلة والزنبور والدبر والذبابه والعنكبوت الى آخره || تزرع للتزيين لكنها من النباتات السريعة العطب التي تخشى البرد والرطوبة وأشعة الشمس اللاذعة وامتداد الظل.



أوفريس

٢٧٣٢ - **أوكالبتوس** *، كاليبتوس

Eucalyptus (S). Eucalyptus (F). Eucalyptus (E). Schönmütze (D). Eucalipto (I).

جنس اشجار حرجية وزراعية طيبة صحية من فصيلة الآسيات مهدها بلاد استراليا حيث يبلغ ارتفاع بعض انواعها نحو ١٤٥ م. اوراقها معتقة، متدلية، متعاقبة، سنانية النصل الجلدي الخشوب، مدبة العقصة، بحرية اللون. ازهارها فردية او ثلاثية التجميع، ابطية الارتكاز. زهرتها ترمع وترمش مستورة الثورة وتبقى كذلك حتى تضج جذرات الطلع عند ذلك تقع قلنسوة حق الكأس او زر السار وتبدو اسديتها الزغبية التي لا عد لها || انواعها المعروفة حتى الآن لا تقل عن ١٨٠، اشهرها على الاطلاق النوع المعروف بشجرة الحمى او شجرة الصمغ الازرق او الاوكالبتوس العريض الورق || منافعها الطيبة عديدة ولذا تعتبر من الاشجار الصحية الضرورية في الاقاليم الحارة الرطبة لانها تخفف رطوبة التربة وتطهر المناخ. يستخرج من اوراقها ولحاءها وصمغها دهن عطري يدعى اوكالبتول (Eucalyptol) يستعمل لدفع الحميات وللتطهير الجذري || اخشابها صلبة راتنجية برغم سرعة نموها وقد تصلح للبناء. اشهر انواعها واعرفها استعمالاً طبياً وصناعياً وتزيينياً.



أوكالبتوس

٢٧٣٣ - **أوكالبتوس ابيض**

E. leucoxydon (S).
E. blanc (F).

٢٧٣٤ - **أوكالبتوس طويل الورق**

E. longifolia (S).
E. à longues feuilles (F).

٢٧٣٥ - **أوكالبتوس عريض الورق، شجرة الحمى، شجرة الصمغ الازرق**

E. globulus (S).
E. gommier bleu (F).

٢٧٣٦ - **أوكالبتوس عسلي العرف**

E. melliodora (S).
E. à odeur de miel (F).

٢٧٣٧ - **أوكالبتوس عمودي الورق**

E. cosmophylla (S).
E. à feuilles verticales (F).

٢٧٣٨ - **أوكالبتوس عنقودي**

E. botryoides (S).
E. en grappes (F).

٢٧٣٩ - **أوكالبتوس قلبي الورق**

E. cordata (S).
E. à feuilles cordées (F).

٢٧٤٠ - **أوكالبتوس كبير الورق**

E. amplifolia (S).
E. à feuilles amples (F).

٢٧٤١ - **أوكيب**

اوكيب الطائر اذا نهض ونهياً للطيران.



أوكريديه كبيرة الزهر



أولستيوم

٢٧٦١ - أيا بانة *
Eupatorium aya-pana (S).
Aya-pana (F). Ayapana (E). Ayapana (D). Eupatorio del Brasile (I).
ضرب من النبات الطبي العشبي المعمّر من فصيلة المركبات. مهدد أمريكة الاستوائية. سوقه أسطوانية جوفاء ترتفع نحو المتر. أوراقه مركبة ثلاثية سنانية معنقة متقابلة. أزهاره عذقية التجميع، ابطية وهاميسة الارتكاز. يستعمل في الكثير من المستحضرات الطبية كقو ودافع للحميات وضد فساد الدم.



أوليدّة

٢٧٦٢ - إياة
Halo
الاية هي دائرة الشمس وتدعى الحالة والدأة والطفارة. اما دائرة القمر فتدعى الساهور والحالة.

٢٧٦٣ - إيااد
الاياد : التراب يجعل حول الخوض او الشجرة يقوى به ويمنع الماء عن الجذع.

٢٧٦٤ - أيار
Mai (F). May (E).
يعرف أيضاً بـ مايو. الشهر الخامس من السنة الشمسية وهو من شهور الربيع. مدته واحد وثلاثون يوماً. في العقد الثاني منه تهبج الصبا وفي العقد الثالث تبدو السهائم وتهب الشمال ثم الدبور



أولمة

تقويمه الزراعي : اعماله الزراعية عديدة ومختلفة منها : في الزراعات العامة الموسمية : متابعة الاعتناء بزراعة القطن والانتباه الى تعتيق بجلاته في الوقت المناسب ، متابعة وانهاء زراعة التبغ قبل حلول شهر حزيران حيث تشتد الحرارة وتنخفض رطوبة التربة. متابعة العناية بجميع الزراعات الموسمية الصيفية ومكافحة الحشرات والافصام. المباشرة بالحصاد والتكديس.

في الاشجار المثمرة : المباشرة بعزق البساتين او خربها. ازالة جميع النواصي النباتية تحت المطامير. تفريد الثمار الكثيرة العدد. سقاية الاشجار الكثيرة الحمل واخصها التفاح متابعة حرث او عزق الكرمة ومتابعة مكافحة الاوصام والحشرات واخصها دود الثمر والمن القطني والارمداد.

في الحمضيات : متابعة تقطيع نصوب الليمون وسقاية البساتين باتزان ودراية لان كثرة الماء تؤذي.

في البقول : تعمد جميع الزراعات البقلية بالعزق والسقاية والتعشيب ومكافحة الحشرات والامراض.

في الزهور : متابعة السهر النافع والاعتناء مع التسميد الازوتي والعزق والسقاية ومكافحة الاوصام والحشرات عند ظهورها واخصها العناكب.



أيا بانة

٢٧٦٥ - أيا بيل
Carvinés (F). Cervinae (E).
قسم من فصيلة الايليات. اجناسه عديدة جميعها من ذوات الظلف. المذكورها قرون مصمتة متشعبة حولية اي انها تنسلخ وتتجدد كل عام، وامسا انائها نجم على الغالب. اشهر اجناسه الايل والاريل والاروس والونة واليامور.

٢٧٦٦ - أيبند
Airopsis
نبات بري من فصيلة النجيليات قريب الشبه من الزوان ترعاه الماشية فيسمنها.

٢٧٦٧ - إيفر فيل
Ibervil
ماكون زراعي سائل التركيب يرتكز على زيت القطران

٢٧٥١ - أوليدّة *
Eolis (S). Eolide (F).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل خلفيات الحياشيم وفصيلة الاوليديات. انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة. جميعها زحافة تعيش على النبوت البحرية || اجسامها عريضة هلامية بزاقية الشكل. رؤوسها رباعية اللوامس. خياشيمها حلقات دقيقة متساوية الترتيب تكتنف كامل الظهر لونها ازرق وابيض ومنها الازرق والاصفر.

٢٧٥٢ - أوليديات *
Eolididae (S).
Eolidids (F). Eolididae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل خلفيات الحياشيم. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد. اعطائها معظم بحار العالم. جميعها زحافة تعيش على النبوت البحرية والفوقس || اجسامها هلامية بزاقية ، عادمة الصدف ، مستدقة المؤخر. رؤوسها رباعية او سداسية اللوامس. خياشيمها حلقات ملونة تكتنف كامل الظهر. ارجلها فردية مستطيلة ومستدقة || اعرف اجناسها واشهرها الاوليدّة.

٢٧٥٣ - أوليما الزرع
Cricère des céréales (F).
اطلب كريبور الزرع.

٢٧٥٤ - أوليمّة *
Eulima (S).
Eulima (F). Eulima (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الاوليميات. انواعها المعروفة نحو ٥٠ منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصداؤها مردنية الشكل ، محزنة ، ملسة السطح ، لماعة ، بحيلة الانوان العابقة.

٢٧٥٥ - أوليميّات *
Eulimidae (S).
Eulimids (F). Eulimidae (E).
فصيلة من الرخويات معديات الارجل اماميات الحياشيم المشطية. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة جميعها بحرية منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || بعضها لجئي يتطفل على الكرعانيات وقثاليات البحر، والبعض الآخر يعيش قرب الشطوط || اصداؤها ملسة لماعة مردنية الشكل او يرمية مقلوبة || اعرف اجناسها واشهرها الاوليمّة والهيريس والخيسفة.

٢٧٥٦ - أوم
اوم الكلا : عطشه ليسن.

٢٧٥٧ - أوم
وحدة المقاومة الكهربائية.

٢٧٥٨ - أومتر
Ohmmètre (F). Ohmmeter (E).
مقياس الاوميات اي المقاومة الكهربائية بوحدات اوم.

٢٧٥٩ - أونكو
Ungko
هو الجيون الرشيق ، اطلبه.

٢٧٦٠ - أونوما
Onosma
راجع اذن الحمار.



إيثوغه



إيدرونجية



إيدوصارون



إيدوصارون إسباني



إيديا



إيرة

يستعمل محلولاً بالماء بمعدل ٦ ٪ في مكافحة الشتوية ضد مكن الحشرات من أي نوع كانت وضد بعض الأمراض الفطرية .

٢٧٦٨ - إيثوغه ، سترينكوس الغابون Iboga

نبات عشبي بري طبي ينتمي إلى جنس الستريكنوس وفصيلة اللوغانيات . مهدا البلاد الأفريقية الاستوائية كالغابون والكرون || يقال أنه من النباتات الموقية المنعشة التي تذهب بالاعياء وتنشط الجسم والاعصاب . وهو من النباتات المهيجة الشديدة الوقع على الباء والانعاظ .

٢٧٦٩ - إيثير Ether

هو أكسيد الأثيل سائل شديد التبخير .

٢٧٧٠ - إيثه * ، صفصافية Ité, Itée, Iteu (F). Itea (E). Dorlstrauch (D). Itea (I).

جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة القليبات . أنواعه ٦ ، مهدا الشرق الأقصى وأمريكا الشمالية . جميعها شجيرات وجنات فناء . أوراقها عابلة متعاقبة . أزهارها عنقودي التجميع . أزهارها صغيرة القد ، خماسية البتلات . أشهر أنواعه ما يلي :

٢٧٧١ - إيثه بهشية الورق Ité à feuilles de houx (F).

جنية سبروتية معمرة تعلو من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ سم . مهدا الصين . أوراقها جامدة النصل مشارية الحافة ، شائكة الاسنان . عنقودها الزهري هامى الارتكاز متدلي الاطراف . أزهارها صغيرة القد ، خضراء اللون . أزهارها يستمر طوال شهر آب .

٢٧٧٢ - إيثه فيرجينية Itea Virginica (S). Itea de Virginie, Ité de Virginie (F).

جنية سبروتية تعلو من ١٥٠ إلى ٢٠٠ سم . أوراقها اهليلجية تطول نحو ٨ سم . وتعرض نحو ٤ . نصلها لامع البشرة مسنن الحافة . عنقودها الزهري منتصب القوام ، هامى الارتكاز يطول نحو ١٥ سم . أزهارها صغيرة القد بيضاء اللون || أزهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٧٧٣ - إيثار Icerya

اطلب قمرية استرالية . ويعرف بالبق الدقيقي المفلطح .

٢٧٧٤ - إيجار Loyer (F). Rent (E).

هو المبلغ المحدد في عقد الاجاره والواجب دفعه على المستأجر .

٢٧٧٥ - إيداع Consignation (F).

Consignation, Deposit (E).

٢٧٧٦ - إيدام ، إندعاص Putrescence

التعفن في المجال العضوي .

٢٧٧٧ - إيدرونجية * ، كويية Hydrangea (S).

Hydrangelle, Hydrangée (F). Hydrangea (E).

جنس شجيرات وجنات وجنات معمرة برية وزراعية تزيينية من فصيلة القليبات ، مهدا الشرق الأقصى والبلاد الامريكية . أنواعها عديدة . سوقها فرعاء ، أوراقها متعاقبة معتقة شبه بيضية النضر الجميل الخضار . أزهارها عشكولي التجميع تاجي الارتكاز . أزهارها جميلة صغيرة مختلفة الالوان . أشهرها الأرطسيا .

٢٧٧٨ - إيدروجن ، إيدروجن ، هيدروجين Hydrogène (F). Hydrogen (E).

غاز شفاف لا لون له ولا رائحة وهو اخف الغازات ، غير سام ولا يذوب في الماء الا قليلاً ولكن الماء يحوى نحو بلل منه . وهو سريع الاحتراق اذا قرب من النار .

اما اذا وضعت شمعة في اناء فيه ايدروجين فانها تنطفئ . رمزه (يد) وزنه الاتومي ١,٠٠٨ || اما القنبلة الايدروجينية التي كثر التحدث عنها في هذا الزمن فانها ترتكز على تحطيم ذرة الايدروجين .

٢٧٧٩ - أيدع

« شجر له حب احمر يصيغ به . خشبه ثمين يحمل في السفن » عن ابي حنيفة .

٢٧٨٠ - إيدوصارون * ، فداس ، عداس مر Hedysarum (S). Hédysaron, Esparcette, Sainfoin sauvage (F). Hedysarum, Bush clover (E). Süßklee, Zweischürige (D). Sanofiano, Lupinella (I).

نبات عشبي علني من القطانيات الفراشية ينبت في الاراضي الجور ويزرع في المراعي . ترغب فيه الماشية وتسن عليه .

٢٧٨١ - إيدوصارون إسباني * ، سلة Hedysarum coronarium (S). Sainfoin d'Espagne, S. à bouquets, Sulla (F). French honeysuckle, Soola clover (E). Kronsüssklee, Spanischer klee (D). Guadarubio, Sanofiano di Spagna, Sulla (I).

نوع من الايدوصارون وهو نبات عشبي علني معمّر ترغب فيه الماشية لاسيما الاغنام . أزهاره مغرية تجرسها النحل .

٢٧٨٢ - إيديا * Idia (S). Idie (F).

جنس حشرات مفيدة من فصيلة الذبابيات . تشرح مع الجنادب والجراد وتمتص مكنها على سرهما فينقف من يرقات تقضي على دبابها .

٢٧٨٣ - إيداء ، إنتهاب Déprédation (F).

Depredation, Plundering (E).

هو مبلغ الاذى الذي لحق بملك الغير .

٢٧٨٤ - إيراق ، نظام ورقى Follation

هو النظام الترتيبي الذي يتبعه ورق النبات في ارتكازه على القضيب .

٢٧٨٥ - إيراقلية Epialre droite (F).

اطلب سطاقس سنبل .

٢٧٨٦ - إيراقى Foliacé (F). Foliaceous (E).

كل ما له علاقة بشكل الاوراق وشوئتها .

٢٧٨٧ - إيرة * Puma eyra (S).

Eyra (F). Eyra (E).

حيوان مفترس وحيد الجنس والنوع من فصيلة السنوريات . أعطانه معظم مناطق أمريكا الجنوبية اخصها البرازيل || جسمه اهيف رشيق القوام يطول نحو ١٠٠ سم . رأسه شبه مستدير الشكل . ذنبه مستطيل . ثوبه الى الطلسة السوية المتماوجة يعبق مع اقترابه من الظهر ويبيض ويشقر عند البطن || يعيش ذكراً وانثى . يألف الغابات والحدائق القريبة من المساكن . يتسلق الاشجار بحفة . قوته ما استطاع اقتراسه من الحيوان والطيور . وهو شديد الاذى ، ان دخل مدجحة قضى على ما فيها من طير .

جدول عروق الايست مولين مع اهم صفاتها وخصائصها المميزة

رقم العرق	اسمه الاصلي او النوع المتحدر منه	صفاته وخصائصه المميزة
I ١	Paradis anglais à larges feuilles	متوسط النشاط ، يجود في الارربة الفقيرة الضعيفة الرطبة .
II ٢	Doucine de Fontenay	نشط ، متوسط الحجم ، غائر الجذور ، مفدق الانتاج .
III ٣	لا اسم له ولا يتحدر من نوع محقق	يقال ان عيوبه تفوق صفاته وهو سريع الاوراق والاعبال .
IV ٤	Doucine de Holstein, D. jaune	نشط ، متوسط الحجم ، يتحمل صقيع الشتاء ولكنه يخشى الجفاف .
V ٥	Doucine amélioré	نشط ، متوسط الحجم ، متعطش الى البوتاس ، لا يقاوم المن القطني .
VI ٦	Paradis sans pareil de Rivers	متوسط النشاط والحجم ، يخشى البرد .
VII ٧	لا اسم له ولا يتحدر من نوع محقق	نشط لا بأس به وحجمه ايضا ، ثماره زاهية ، استعماله محدود .
VIII ٨	Paradis français	قليل النشاط ، يخشى البرد ، عديم المناعة ضد الآكلة والتبقع .
IX ٩	Paradis jaune de Metz	ضعيف النشاط ، مبكر ، قصير الحياة ، يرغب في الارربة الغنية الخوارة .
X ١٠	لا اسم له ولا يتحدر من نوع محقق	متخار وعبوبه تفوق صفاته .
XI ١١	Doucine vert	متوسط النشاط والحجم ، كثير الاستعمال في بلجيكا وهولندا .
XII ١٢	لا اسم له	شديد النشاط ، كبير الحجم ، طويل العمر ، يرغب في الاقاليم الباردة .
XIII ١٣	لا اسم له	نشط ، كبير الحجم ، طويل العمر ، يرغب في الارض الرطبة ولا يخشى الكثوم .
XIV ١٤	لا اسم له	شديد النشاط ، كبير الحجم وطويل العمر .
XV ١٥	لا اسم له	نشط ، كبير الحجم وطويل العمر ، متخار وقليل الجذور السطحية .
XVI ١٦	Ketziner idéal	شديد النشاط ، كبير الحجم ، طويل العمر ، لا يخشى البرد ، يتطلب الري المنتظم .

المتفاوتة القدر والتي يراوح عددها الوتري من ٣ الى ٧ وذلك نسبة للنوع || انوائها الى السمرة الخنطية المواج .

٢٨٠٣ - **إيستولوجية** Histologie (F). Histology (E). علم يبحث في النسيج العضوية وفي بنية الاحياء المجهرية .

٢٨١١ - **إيقاف الاختيار ، توقيف الاختيار**
Mutage (F). To stop the fermentation of must (E).
هو توقيف عصارة العنب عن الاختيار مدة من الوقت لبض الاسباب التقنية او الصناعية وقد يتم ذلك بواسطة بعض المواد المضادة للاختيار .

٢٨٠٤ - **إيصالية ، ناقلية** Conductibilité (F). Conductibility (E). هي قابلية النقل .

٢٨٠٥ - **أبصر** Herbe sèche (F).
الابصر هو المشب اليابس ، ج . أباصر .

٢٨١٢ - **أيلك** Bois, Forêt d'arbres touffus (F). Wood of lofty trees
الايك : الشجر الكثير الملتف . والغيسة تثبت السدر والاراك ونحوها من ناعم الشجر (اقرب الموارد) .

٢٨٠٦ - **أبض** Métabolisme (F). Metabolism (E). مجموع المعامضات التي تجري وتم في الجسم .

٢٨٠٧ - **أبطل** Flanc, Hypocondre (F). Hypochondrium (E).
الايطل : الحاصرة ج . ايطل . قال امرؤ القيس : « ها ايطلا ظبي وساقا نعام » .

٢٨١٣ - **إيكاكيا * ، إيكاكرو**
Chrysobalanus icaco (S). Chrysobalane, Icaquier (F). Coco-plum (E). Cocosplume, Ikakopflume (D). Ghianda d'oro, Pruno icaco (I).
شجرة زراعية من فصيلة الورديات . مهدا البلاد الاستوائية الامريكية والافريقية . تكثر زراعتها في المناطق البحرية . وهي شجرة دائمة يلمسح ارتفاعها نحو ١٠ امتار . اوراقها متعاقبة معتقة بيضية النصل الجامد الجميل الخضار . ازهارها عذقية محورية وطرفية صغيرة القد بيضاء اللون || ثمارها خوخية الشكل والحجم قشرتها الى الحمرة القرمزية . لها ابيض اللون لاصق بالمعجة مأكول . ويستخرج من لباب المعجة دهن نافع شائع الاستعمال .

٢٨٠٨ - **إيغار** Ebouillantage (F). Scalding (E).
المعالجة بالماء الغالي .

٢٨٠٩ - **إيفوديه** Evodia (S). Evodie (F). Evodia (E). Evodie (D). Evodia (I).
شجرة حرجية طيبة من السذابيات ، مهدا المناطق الحارة الاسيوية ، اوراقها متعاقبة معتقة اهليلجية . ازهارها عنقودية النسيج تاجية الارتكاز . ثمارها نووية طيبة يستعملوها للتريق وقد تكون من المليينات المحمودة .

٢٨١٠ - **إيفيس** Iphis (S). Iphis (F). Iphis (E).
جنس دويبات بحرية من القشريات عشاريات الارجل قصار الذيل وفصيلة اللقوسيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد الحارة اخصها المحيط الهندي || اجسامها صغيرة . دروعها معينية الشكل . ارجلها قصيرة وهزيلة . ملاقلها مستطيلة نشيطة . تتميز بمناسخها القوية

٢٨١٤ - **إيكاكيات** Chrysobalanées (F). Chrysobalane (E).
سبط من الورديات .

٢٨١٥ - **إيكير** Acore, Roseau odorant (F).
اطلب عود الراج .



إيكاكيا



إيفيس



إيكل



أيل أحمر



أيل أرقط



أيل البطائح



أيل إله



أيل الشرق

جالس الظهر والكفل ، طويل العنق والرأس ، كبير القرون قوي الجرامز دقيقها ، قصير الذنب || طوله نحو ٢٣٠ سم. وارتفاعه ١٣٠ وزنه من ١٥٠ الى ٢٠٠ كيلسو. يوجد في اربعة وآسية الصغرى حتى العجم وفي افريقية الشمالية.

٢٨٢١ - أيل أرقط *

Cervus axis (S). Cerf axis, Chital (F). Axis deer, Chital (E). ايل موطنه سرنديب والبنغال وحاليا حتى علو ١٤٠٠ م. جميل الخلقة ، مبقج الثوب الموشح ، متوسط القد يراوح علوه من ٩٠ الى ٩٥ سم || اجله قليل العدد من ٨ الى ١٢ . يألف ضفاف الانهار والغابات الكثيفة .

٢٨٢٢ - أيل أسمر *

Cervus dama dama (S). Daim, أسمر (F). Platycerque (F). Fallow deer (E). Damwild (D). ايل متوسط القد ، جميل الخلقة ، رشيق القوام ، طوله نحو ١٥٠ سم. وعلوه ٩٥ . ثوبه اصهب اسمر تعلوه رقشة بيضاء || موطنه آسية الصغرى والجزائر وتونس واسبانيا والبرتغال .

٢٨٢٣ - أيل البطائح *

Rucervus Duvanceli (S). Cerf de Duvancel, Rucerve Barasingha (F). Barasingha (E). ايل كبير الجثة ، طوله نحو ١٦٠ سم. وعلوه من ١٢٠ الى ١٢٥ . ثوبه الى الجؤوة القائمة . موطنه الهند . يألف البطائح وضفاف الانهار || اجله يعد من ٣٠ الى ٦٠ وأكثر .

٢٨٢٤ - أيل التبت *

Cervus affinis (S). Cerf du Tibet (F). Deer of Tibet (E). ايل موطنه التبت وجوارها ، متوسط القد غليظ الجثة ، اصهب الثوب الاغبر ، ابيض البطن || يألف الجبال العالية . يعيش جماعات قليلة العدد اجلها من ٦ الى ١٢ .

٢٨٢٥ - أيل إله *

Cervus Eldi (S). Cerf d'Eld, Thameng (F). Thameng (E). ايل موطنه البنغال وسيام والكمبودج . كبير الجثة مستطيل الشكل ، يبلغ طوله ٢٠٠ سم. وعلوه ١١٥ . ثوبه الى السرة ، ينبر في الصيف ويعبق في الشتاء || يألف المناطق وضفاف الانهر ، اجله في الصيف يعد من ٨ الى ١٢ ويعد في الشتاء من ٥٠ الى ٦٠ .

٢٨٢٦ - أيل الشرق *

Cervus maral (S). Cerf maral (F). Maral (E). ايل كبير الجثة مستطيل الجرامز يبلغ علوه نحو ١٥٠ سم . له قرنان كبيران لا يقل طول الواحد عن ١١٠ سم. ثوبه اصهب احمر تعلوه مشحة من الصفار || موطنه الشرق من بلاد القرم الى شرقي القفقاز . يألف الغابات والاحراج والفضاب . اجله كثير العدد ان في الصيف او في الشتاء .

٢٨٢٧ - أيل الصين *

Cervus mandarinus (S). Sica mandarin (F). Cervus mandarinus (E). ايل متوسط القد ، اصهب الثوب السوي ، منسوب القوام . موطنه الصين الشمالية || يألف المناطق والسهول واطراف الغابات . اجله كثير العدد يراوح من ٤٠ الى ١٠٠ .

٢٨٢٨ - أيل العراق *

Dama mesopotamicus (S). Daim de la Mésopotamie (F). Mesopotamian deer (E). ايل موطنه العراق والبلاد المجاورة . صغير الجثة رشيق القوام ، سريع الحركة ، طوله نحو ١٥٠ سم. وعلوه من

٢٨١٦ - إيكل * ، بُل ، قشّاء الهند

Aegle marmelos, Cratoeva valanga (S). Aegle, Bel indien (F). Bael tree, Bengal quince, Marmelos (E). Bhelbaum, Schleimappelbaum (D). Belta indiana (I). نوع من الفصيلة النارجية مهددة التبت وبلاد الهند . اشجاره زراعية متوسطة الارتفاع والحجم كثيرة الافناد والافنان . ثماره لحمية لينة بحجم البرتقال . لها زكي الرائحة يربب . عصيرها حامض مز . قشر ثمارها قابض يستخرج منه مادة صبغية صفراء اللون . والهند يستعملون عصير الايكل ضد الهواء الاصفر (الكوليرا) || اما الانهار والاوراق فلها منافع طبية معروفة من الصينيين والهنود .

٢٨١٧ - إيكي دنيا

Bibacier (F). راجع اكيدنيا .

٢٨١٨ - أيكينيت

Aikinite (F). مركب معدني يدعى اكينيت ، اطلبه .

٢٨١٩ - أيل

Cervus (S). Cerf (F). Deer (E). جلس حيوانات برية عاشبة لبونة مجترة من الايائل وفصيلة الايليات . انواعه عديدة اسيوية واروية وامريكية وافريقية المهد جميعها مصصة القرون المتشعبة الحولية الانسلاخ . تعيش جماعات اجلها يراوح من ٨ الى ٥٠ وأكثر ، تأوى الغابات والاحراج والمقارز والفضاب والسهول || قال الدميري في وصف الايل ما حرفته : « وهو اذا خاف من الصياد يرمي نفسه من رأس الجبل ولا يتضرر بذلك واذا لسته الحية اكل السرطان ويصادق السمك فهو يمشي الى الساحل ليرى السمك والسمك يقرب من البر ليراء الصيادون يرفون هذا فيلبسون جلده ليقصدهم السمك فيصيدوا منه . وهو مولع بأكل الحيات يطلبها حيث وجدها وربما لسته فتسيل دمونه الى نقرتين تحت محاجر عينه يدخل الاصبع فيها فتجد تلك الدموع وتصير كالشمع فيتخذ درياقا لسم الحيات وهو البادزهر الحيواني واجوده الاصفر || قال الزجاجي مثل ابن دريد عن معنى قول الشاعر :

هزرتك لا قلى مني ولكن رأيت بقاء ودك في الصدود
كهجر الحائمات الورود لما رأيت ان المنيّة في الورود
تفيض نفوسها ظمأ وتخشى حاماً فهي تنظر من بعيد
تصد بوجه ذي البغضاء عنه وترمقه بالحاظ الودود
فقال الحائم الذي يدور حول الماء ولا يصل اليه ومعنى الشعر ان الايائل تأكل الافاعي في الصيف فتحس وتذهب لحرارتها فتطلب الماء فاذا رأت امتنعت من شربه وحامت عليه تنسمه لانها لو شربته في تلك الحالة فصادف الماء السم الذي في اجوافها هلكت فلا تزال تمتنع عن شرب الماء حتى يطول بها الزمان فيذهب ثوران السم ثم تشربه فلا يضرها . فيقول هذا الشاعر : انه في تركي وصالك مع شدة حاجتي اليه بمشابة الحائمات التي تدع شرب الماء مع شدة حاجتها اليه ابقاء على حياتها || والزجاجي هو الذي صنف كتاب الجمل ومن كلامه ما سرم الله شيئاً إلا وأحل بأزائه خيراً منه حرم الميتة وأباح المذكي وحرم الخمر وأباح النبيذ وحرم السفاح وأباح النكاح وحرم الربا وأباح البيع » || انواع الايل عديدة أشهرها ما يلي .

٢٨٢٠ - أيل أحمر * ، أيل أروبي

Cervus elaphus (S). Cerf élaphe, C. rouge, C. d'Europe (F). Red deer (E). Rotwild (D). ايل كبير القد مستطيل الجسم المنسوب ، عريض الصدر ،

وثبج الظهر. بطنه اغبر اللون جرمزه الى السمرة الداكنة .
طوله نحو ٩٠ سم. وعلوه من ٥٠ الى ٥٥ .

٢٨٢٦ - إيلادة * Cytogénie (F). Cytogeny (E).

الايلادة تكاثر الحجيرات الحيوانية او الخلايا النباتية .

٢٨٢٧ - إيلادي * Cytogène (F). Cytogen (E).

ما يعود الى تكاثر الحجيرات او الخلايا .

٢٨٣٨ - إيلوسن * اطلب بندق بري .

٢٨٣٩ - أيلنس

قال القزويني : « انه نوع من السمك عظيم جداً وحيوانات
البحر كلها تصاد سواء . ومن خواصه انه اذا شوي واكل
منه شخصان معاً بينهما عداوة وخصومة تبدلت الفة » .

٢٨٤٠ - إيلند * Antilope-élan (F).

راجع أروس .

٢٨٤١ - إيلنطس * ، شجرة السماء ، شجرة الله

Allanthus altissima, Ailanthus glandulosa (S). Ailante
glanduleux, Arbre du ciel, Frêne puant (F). Tree
of heaven, Tree of the Gods Chinese ash (E). Echter
götterbaum (D). Alanto, Albero del paradiso (I).
شجرة حرجية كبيرة من فصيلة الساروبيات، مهدا بلاد
الهند الصينية، ساقها غليظة مرتفعة، اغصانها دائمة .
اوراقها متعاقبة مركبة تساعية الأزواج . ازهارها تاجية
الارتكاز عشكولية متفرعة كثيرة القشعب . الزهرة صغيرة
سفلية التركيب خماسية البتلات الرحيمة الشكل الافقية
الانتشاب . اسديتها عديدة معقوفة . ميسمها وحيد مفطرش
القلنسوة || تستعمل للتزيين في الممرات والجادات، اوراقها
اذا لمست تفرز زيوتاً طيارة كريهة الرائحة .

٢٨٤٢ - أيلول * Septembre (F). September (E).

يعرف ايضاً بسبتمبر، الشهر التاسع من السنة الشمسية
وهو من شهور الصيف . مدته ثلاثون يوماً . في الحادي
والعشرين منه يعتدل الليل والنهار وهو اول فصل الخريف.
تقويمه الزراعي : اعماله الزراعية عديدة اخصها :

في الزراعات العامة الموسمية : متابعة العناية بالقطن وبجني
المحصول . متابعة قطف وتجفيف اوراق التبغ والتبلك وادخال
الناشف منها وتعليقه في المخازن . حرث الحواكير المعدة
لزراعة التبغ فور الانتهاء من القطف ومن اقتلاع الشتل.
حرث الارض المعدة لزراعة الحبوب كالخطة وغيرها .

في الاشجار المثمرة : التوقف عن متابعة رش الثمار قبل
القطف بثلاثة اسابيع . ابتداء موسم قطف التفاح لحزنه
في البراد وعلى طالب الحزن ان يجني الثمار عند ادراكها
وقبل اكتمال نضجها وان يوضبها ويصنفها نسبة لحجمها
ودرجة ادراكها وسلامتها من الشوائب . السهر على ثمار
الاجاص والسفرجل . تطعيم الاغراس والاشجار التي بحاجة
الى ذلك بالطعم الرقعي . اعداد الحفر اللازمة لغرس النصبوب
في الاماكن التي سبق تحضيرها .

في الحمضيات : افتتاح موسم تصدير الليمون الحامض .
متابعة مكافحة النمشة . تعشيب وعزق وري البساتين .
تطعيم الاغراس الفتية . تحضير تربة البساتين المستحدثة
وتعيين مواقع الغرس واحتفار الحفر .

في الاشجار المختلفة : ابتداء تحبيب الزيتون الاخضر .

٩٥ الى ٩٥ . ثوبه الى الصهبة الاربدة يميل الى السمرة
في الشتاء || يألف الهضاب والبوادي ومجاري الماء .
اجله كثير العدد .

٢٨٢٩ - أيل المستك * ، كستور

Moschus moschiferus (S). Porte-musc, Chevrotain
porte-musc (F). Musk deer (E).

حيوان بري لبون يجتر من المسكيات وفصيلة الايليات
يشبه الفلبي الا انه ربع الجثة يبلغ علوه نحو ٥٠ سم. وكفله
يعلو غاربه بنحو ٥ سم. وهو اجم الرأس كبير الاذن
قصير الصوف والذيل . للذكر منه جراب بقدر الحفنة
الصغيرة يقع في اسفل بطنه بالقرب من دبره يمتلئ مسكاً
وله نبيان ظاهران || موطنه شاسع الاطراف يمتد من الهند
الى سيبيريا ومن الافغان الى الصين ، يكثر في التبت ،
يرغب في البلاد الباردة ويخشى الحر .

٢٨٣٠ - أيل الهند * ، أيل مقلقة

Cervus unicolor, C. aristotels (S). Cerf unicolore,
Sambar (F). Malay sambar (E).

نوع من الايل موطنه الهند والبنجاب وحلايا ريوجد ايضاً
في سرديب . وهو حسن الخلقة المنسجمة ، رشيق القوام ،
كبير الجثة طوله نحو ٢١٠ سم. وعلوه من ١٢٠ الى ١٣٠
ثوبه الى الصهبة السمره يعلوها موج امغر || يعيش
في الاحراج والغابات والادغال وقرب مجاري الماء وقد شوهد
في مرتفعات حلايا على علو ٣٠٠٠ م. || يسرح في الليل
من الغروب الى الشروق ويبيت في النهار . اجله قليل
العدد من ٦ الى ١٢ .

٢٨٣١ - أيل جتاوا * Cervus hippelaphus (S).

Cerf hippélaphé, Sambar de Java (F). Java sambar (E).
ايل موطنه جاوا قريب الشبه من سلفه لكنه اصغر جثة
وافتح ثوباً || يعيش جاعات عديدة ، اجله لا يقل عن
٤٠ ، يألف الادغال الكثيرة العشب .

٢٨٣٢ - أيل خراسان

Cervus sika, Cervus bactrianus (S). Sica (F). Sica (E).
ايل صغير القد ، ربع القامة ، ثوبه الشتوي الى الصهبة
الغبراء السوية . اما الصيف فيبجج || موطنه خراسان وجوارها
اجله يعد من ٢٠ الى ٣٠ .

٢٨٣٣ - أيل كشمير * ، هونغول

Cervus Cashmirensis (S). Cerf de Cachemire (F).
Hanghul (E).

ايل كبير الجثة يشبه ايل اروبه . علوه نحو ١٤٠ سم.
موطنه احراج بلاد كشمير . يعيش جاعات كبيرة اجلها
لا يقل عن ٤٠ .

٢٨٣٤ - أيل كندا * Cervus canadensis (S).

Cerf du Canada (F). Wapiti (E).
موطنه كندا وبعض مناطق امريكا الشمالية وشمال شرق
آسيا . كبير الجثة طوله نحو ٢٩٠ سم وارتفاعه ١٣٠
اما وزنه فن ٢٥٠ الى ٥٠٠ كيلو . له قرنان كبيران
متشعبان طول الواحد ١٦٠ سم. ثوبه الى السمرة الغبراء
يزداد سمرة مع اقترابه من ثبج الظهر والعنق والرأس .

٢٨٣٥ - أيل نباح * Cervulus muntiacus (S).

Cerf aboyeur, Cervule muntjac (F). Barking deer (E).
موطنه الهندوستان والهند الصينية وماليزيا . صغير الجثة
ثوبه الى السمرة الصهباء يزداد اسمراراً مع اقترابه من العنق



أيل المستك



أيل الهند



أيل كشمير



أيل كندا



أيل نباح



إيلنطس

اسمر اللون . رسغاه الى الجؤوة || يمضي معظم وقته على الارض حيث يكشط التربة في طلب القوت . قوته اخشرات والديدان والبرور والاعشاب || يدثن عشه على ضفاف مجاري الماء في الاشجار القليلة الارتفاع . الاثني تحضن من ٥ الى ٧ بيضات نحو ١٣ يوماً اما الذكر فيؤمن لها الغذاء .

٢٨٤٧ - إيناع Maturité complète (F).

Complete maturity (E).

الايناع والينع هو بلوغ الثمرة كلها وقد يأتي هذا الدور من حياتها بعد الادراك وقبل النضج التام .

٢٨٤٨ - إينانثة Oenanthé (F).

اطلب رازيانه .

٢٨٤٩ - إينانثة منقعية Phellandre (F).

اطلب رازيانه مائية .

٢٨٥٠ - إينولاز Inulase

خيرة تجعل الراسنين في نسيج النباتات قابلة للهضم .

٢٨٥١ - إينولين Inuline (F). Inulin (E).

غلوكوزيد يكثر في خلايا بعض نباتات فصيلة المركبات كالهندباء والراسن .

٢٨٥٢ - إيهان Roquette (F). Rocket (E).

هو الجرجير ، اطلبه .

٢٨٥٣ - إيهقان * Roquette sauvage (F).

Wild rocket (E).

هو الجرجير البري ، وأحدثه أيهقالة . قال لبيد :
فعلت فروع الأيهقان وأطلقت بالجلهتين فلباؤها ونعامها

٢٨٥٤ - أيون ، شارده Ion

الايون هو أتوم او مجموعة من الاتم يحمل او تحمل شحنة كهربائية || اذا اذيت مادة في الماء وكان محلها موصل للتيار الكهربائي فان بعض جزئياتها ينقسم كل منه الى شقين او اكثر يحمل بعضها شحنة كهربائية ايجابية والاخر شحنة سلبية ويدعى الشق الاول ايون ايجابي والآخر الشق الثاني ايون سلبي Ion positif . Ion négatif

متابعة العناية بالموز والانتباه الى السقاية . المباشرة بقطاف العنب المعد لصناعة الخمر والكحول . متابعة تجفيف التين . في البقول والزهور : السهر والاعتناء بجميع البقول وتسميد ما لم يسمد منها حتى الآن بالاسمدة الكيماوية . الاعتناء بجميع النباتات التزيينية المعمرة والحولية القائمة ومكافحة اخشرات التي تركبها والامراض التي تعثرها . اعداد مشاتل النباتات البصلية كالزنبق والزرعس وما اشبه .

٢٨٤٣ - أيسلولة Réversibilité (F). Reversibility (E).

هي صفة لحن انتفاع ما كعاش التتقاعد والراتب العمري فحواها ان يرجع الانتفاع الى المستحقين الاحياء او اذا مات المستحق الى شخص آخر دون نقص في قيمته .

٢٨٤٤ - أيسليات Cervidae (S). Cervidés (F).

Cervidae (E).

فصيلة حيوانات لبونة مجترمة مصمتة القرون المشعبة ، مزدوجة الاصابع . اجناسها عديدة مقسومة الى قسمين الايايل والمسكيات . فالأيايل تشمل عدة اجناس اما المسكيات فجنس واحد .

٢٨٤٥ - أيتم ، أين Zamenis

راجع ارقم .

٢٨٤٦ - أيتمة ذهبية الطوق


Vidua paradiscea, Steganura paradiscea (S).

Veuve à collier d'or, Stéganure de paradis (F).

الايمة طائر من فصيلة التنوطيات . انواعه المعروفة خمسة أشهرها الذهبية الطوق . موطنه معظم مناطق افريقية الوسطى . يألف الغابات والخراج الموحشة وضفاف مجاري الماء . ملجئه الحياتي جماعي . سره متوسط العدد || جسمه معتدل القد ، يطول نحو ٣٥ سم . بما فيه الذنب الذي يطول نحو ١٥ سم . في الزمن العادي . اما في زمن التطريق ، ويكون ذلك بعد التحشير ، فرفال ذنبه تطول نحو ٤٥ سم . رأسه وظهره وذنبه الى السواد الاحم الاسفع . جناحاه الى السواد الموشع بالاحمر . قذاله وعنقه وصدره وبطنه الى الاحمر الناري الموج يعلوه بين العنق والصدر طوق ذهبي الخضاب . متقاده مخروطي الشكل ، مستغلظ القاعدة ، مستدق الملقط ،



أيهقان



الآثرية الكلسية . توجد في الاحراج المبعثرة الاشجار || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٨٥٥ - بَابَة Statistique (F), Statistics (E).
جدول الاحصاء والتعداد .

٢٨٥٩ - بابُوجِيَّة المَلِكَة *
Cypripedium reginae (S).
Cypripède de la reine (F).
نوع من البابوجية . ساقها تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم .
اوراقها خلية النصال المهدبة ، عددها يراوح من ٥ الى ٧ .
اهدابها لاهبة تشري الجلد . ازهارها كبيرة القد ، قطرها
نحو ٨ سم . شفيفتها وردية اللون . بتلاتها وفصلها تبنية ||
تنويرها يستمر من حزيران الى آب .

٢٨٥٦ - بابُوج *
Crepidula (S).
Crépidule (F), Crepidula (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل
وحيدات الاجهزة وفصيلة القَبُوصِيَّات . انواعها المعاصرة
المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة
الحرارة . تعيش لاصقة بصخور المحاذج والشواطئ ||
اصداؤها اهليلجية الشوزن ، مستدقة المقدم ، قريبة الشبه
بالبابوج . اجسامها بيضية . رؤوسها مفلوكة ثنائية اللوامس
المحروطة . عيونها تحتل قواعد اللوامس . خياشيمها ضمية ،
يمينية الارتكاز . ارجلها وحيدة مبطة . ارضيتها رقيقة .



بابوج

٢٨٦٠ - بابُوجِيَّة صَغِيرَة الزَّهْر *
Cypripedium parviflorum (S).
Cypripède à petites fleurs (F).
نوع من البابوجية . ساقها تعلو من ٣٠ الى ٤٠ سم .
اوراقها خلية النصال . ازهارها صغيرة القد عطرية العرف .
شفيفتها الى الصفار الذهبي الموج . بتلاتها وفصلها سمراء
اللون || تنويرها يستمر من ايار الى تموز .

٢٨٥٧ - بابُوجِيَّة *
Cypripedium (S).
Cypripède, Sabot de Venus, Pantoufle de dame (F).
Lady's slipper, Noah's ark (E).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة السحليات . اروماتها
جذمورية مدادة متشعبة . سوقها مورقة . اوراقها متباعدة
الاشكال ، متوازية المروق . ازهارها قليلة العدد او فردية ،
كبيرة القد مقعرة الشيفات التي تبدو كالبابوج || انواعها
المعروفة عديدة ، معظمها بري وبعضها تزييني ، اشهرها
التالية :



بابُوجِيَّة الزَّهْرَة

٢٨٦١ - بابُوجِيَّة مُبَقَّجَة *
Cypripedium guttatum (S).
Cypripède tacheté (F).
نوع من البابوجية ، يكثر وجودها في المناقع . ساقها
قصيرة تعلو من ١٠ الى ٢٠ سم . لها ورقتان لا غير .
نصاها خلية البشرة على الصفحتين . زهرتها وحيدة بيضاء
اللون مرقوشة بالارجواني . فصلها وبتلاتها عاجية . قطر
الزهرة نحو ٥ سم . || تنويرها يستمر نحو ستة اسابيع بين
نيسان وايار .

٢٨٥٨ - بابُوجِيَّة الزَّهْرَة *
Cypripedium calceolus (S), Sabot de Venus (F).
نوع من البابوجية . ساقها تعلو من ٢٥ الى ٤٠ سم .
اوراقها جرداء النصال . زهرتها كبيرة قطرها نحو ١٠ سم .
بتلاتها وفصلها كستنية اللون ، شفيفتها صفراء مشيخة
بالارجواني || منبتها بعض اقاليم البحر المتوسط . ترغب في



بابُوجِيَّة المَلِكَة



بابونج ابيض



بابونج عطر



بابونج كاذب



بابونج تن



بابونج



بابونج

٢٨٧١ - بابونج *، تفتح الارض
Matricaria (S).
Matricaire, Camomille inodora (F). Wild chamomile, Dog's chamomile (E). Echte kamille (D).
Matricaria (I).
جنس نباتات عشبية طبية برية حولية من فصيلة المركبات.
انواعها ثلاثة تختلف بلون ازهارها من ابيض واصفر
ودهبى || تملو من ٢٥ الى ٥٠ سم. اوراقها متعاقبة
مفرضة جالسة النصل الامرط. ازهارها يدوم من حزيران
الى ايلول. جميعها طبية، تستعمل في شتى العلاجات،
اخصها الوضع.

٢٨٧٢ - بابونج *
Porcus babirusa,
Babirusa alifura (S). Babiroussa (F). Babiroussa,
Malaisian swine (E).
حيوان بري وحيد الجنس والنوع من فصيلة الخنزيريات
ورقية الجسليات المزدوجات الاظلاف. حجمه قدر الحمار
الصغير، له نابان كبيران مقوسان يتغذان من فطيلته
ولذلك نابان زائدان || موطنه جزر الزايج وجوارها.

٢٨٧٣ - باتور، باري، بارياء، باريه، بورية
Paillason, Natta de jonc (F). Straw-mat, Door-
mat (E).
هو الحصير المنسوج من القصب او من سوق الاسل
والسلت وغيرها. يستعمل لستر البقول من الصقيع ومن
اشعة الشمس اللاذعة.

٢٨٧٤ - باتون، باطون
Béton (F). Beton (E).
خليط متفاوت النسب من الاسمنت والرمل والقضض.
يضاف اليه الماء اللازم لروبه. وهو عادي او مسلح.

٢٨٧٥ - بات
بات التراب، استخراج من الارض.

٢٨٧٦ - باثر
البثر، هو الماء الجاري من غير حفر.

٢٨٧٧ - باجد
Inféodé (F). Infeudat (E).
نعت تعريفي يطلق في علم الحيوان على كل حشرة تشابه
غيرها او تعيش مع غيرها وتأزرها من اي فصيلة كانت.
ج بواجد.

٢٨٧٨ - باجول
Arbuscule (F).
هو كل مادة او دواء يقضي على النباتات الليفية والخشوشية
من البجلة الى الجنية.

٢٨٧٩ - باحيرة
Plante épineuse (F).
Spiky plant (E).
الباخرة الثبنة الشائكة وتدعى سفا.

٢٨٨٠ - باحور

الباحور والباخير سبعة ايام متوالية، يزعم البعض انه
يستدل بكل يوم منها على حالة شهر من اشهر الحريف
والشتاء. والباخير المعروفة ثلاثة: الباحور العربية
والباحور الغربية والباحور الشرقية || فالباحور العربية
تبتدى في اليوم الثامن عشر من شهر تموز وتنتهي في
اليوم الرابع والعشرين || والباحور الغربية تبتدى في اليوم
الخامس عشر من شهر ايلول وتنتهي في اليوم الحادي
والعشرين || والباحور الشرقية تبتدى في اليوم السابع

٢٨١٢ - بابونج مزرية

Cypripedium hirsutum (S).
Cypripède hérissé (F).
نوع من البابونج. نبات طبي وذعافي. ساقها تملو من
٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقها خلية النصال مزرية عمل
الصفحتين العليا والسفلى. ازهارها تملو من ٣ الى ٥ سم.
قطرها يراوح من ١٤ الى ١٦ سم. شفيقها صفراء اللون.
بتلاتها وفصلها كستنية يملوها موج اصفر || تنويرها
يستمر من ايار الى حزيران.

٢٨١٣ - بابونج رضيع الحيوان من اي نوع كان.

٢٨١٤ - بابونج
Anthémis noble (F). Camamel (E).
راجع اقحوان شريف.

٢٨١٥ - بابونج ابيض *، اقحوان المروج
Leucanthemum (S). Leucanthème, Marguerite des
prés, Canesson (F). Ox-eye daisy (E). Wucher-
blume (D). Crisantemo del prati (I).
نبات عشبي بري وزراعي، محول ومعمر من فصيلة
المركبات. ضروبه عديدة، تملو من ٦٠ الى ١٠٠
سم. اوراقه مستطيلة، مسننة، اذينية. ازهاره كبيرة.
ازهاره يدوم من ايار الى تشرين الثاني.

٢٨١٦ - بابونج اصفر
Camomille destinturiers (F).
Yellow chamomile (E).
راجع اقحوان المصباغين.

٢٨١٧ - بابونج الطيور
Senecion commun (F).
Common groundsel (E).
راجع شرونة شائعة.

٢٨١٨ - بابونج عطر *، كيركيش
Chamaemelum (S). Chrysanthème gazonnant,
Camomille odorante (F). Chamomile (E). Edle
hundskamille (D). Camomilla odorosa (I).
نبات عشبي بري طبي معمّر من فصيلة المركبات.
منبته الشرق الاوسط. يملو من ٥ الى ١٥ سم. اوراقه
خيطية التفريغ زياء. ازهاره صفراء اللون عطرة. ازهاره
يدوم من ايار الى تموز.

٢٨١٩ - بابونج كاذب *، بلتونيه، بلطونيه
Boltonia (S). Boltonia (F). False camomile (E).
Boltonie (D). Boltonia (I).
نبات عشبي بري وزراعي زينة معمّر من فصيلة
المركبات. انواعه المعروفة ثلاثة. سوقها فرعاء مستقيمة،
تملو من ٦٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها ضيقة النصل،
متعاقبة حاضنة || ازهارها بحيلة الشكل ثنائية اللون تشبه
النجوم. ازهارها يدوم من آب الى ايلول.

٢٨٧٠ - بابونج تن *، فخر الكلب، ماروتيه
Maruta (S). Maroute, Camomille puante (F). May-
weed, Dog-fennel (E). Stinkhunds-kamille (D).
Maruta (I).
نبات عشبي بري حولي من فصيلة المركبات. ساقه
فرعاء دقيقة. اوراقه متعاقبة، جرداء، مفرضة. ازهاره
عذقية التجميع، صفر الحراشف بيض البتلات || يكثر
في الزروع وعلى جوانب الطرقات. رائحته كريهة تنضوع
من اللس.

٢٨٩٣ - **بادِر، زَرَّاع** Semeur (F). Sower (E).
من تعاطى ذر البذار.

٢٨٩٤ - **بادِرُوج**
البادروج : نبت طيب الريح (اللسان).

٢٨٩٥ - **بادِيق** Eau-de-vie (F). Brandy (E).
راجع قنديد.

٢٨٩٦ - **بادِنْجَان، أَنْب، حَدَق، حَيْصَل، ثَلْثَان، رِبْرَق، مَعْد، وَغْد**

Morelle, Mélongène (F). Egg-plant (E).
جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة الباذنجانيات ،
أنواعه عديدة مختلفة الاشكال والاحجام والثمار . منها
الحولية والمعمرة والسرحة والشائكة والعارشة || اقسامه اربعة
البادنجان والحدق والحصل والثلثان .

٢٨٩٧ - **بادِنْجَان أُسْتَرَالِي***، **بادِنْجَان مُفَرَّص**
Solanum aviculare, S. laciniatum (S). Morelle
lacinée (F).

نوع من الباذنجان مهدد استرالية . وهو جنبة فرعاء
متوسطة القد . اوراقها كبيرة ، عميقة التفريص . ثمارها
بحجم الخوخة وشكلها . ضروبها ثلاثة تختلف بلون
ثمارها . منها الاصفر والبرتقالي والبنفسجي .

٢٨٩٨ - **بادِنْجَان افريقي** Solanum macrocarpon
جنبة فرعاء متوسطة القد معمرة . مأكولة الثمار . ثمارها
مستديرة طحلاء اللون ، ومنهم من أكل اوراقها مطبوخة .

٢٨٩٩ - **بادِنْجَان البَيْض*** Solanum ovigerum (S).
Melongène à oeufs, Plante aux oeufs, Pondeuse (F).
جنبة متوسطة القد ، تعلو من ٥٠ الى ٨٠ سم . ساقها
وفروعها زياء البشرة . اوراقها بيضيه مستطيلة الزام الاخير
ازهارها زرقاء اللون . ثمارها مأكولة ، حجمها قدر
البيضة ، لونها يختلف باختلاف الضرب . منها الابيض
والاصفر والاحمر والازرق والبنفسجي والاسود .

٢٩٠٠ - **بادِنْجَان بَطْرِي***، **بادِنْجَان الغَابُون**
Solanum Pierreanum (S). Morelle du Gabon,
Olombé (F).

جنبة فرعاء كبيرة القد تعلو نحو ١٥٠ سم . اوراقها كبيرة
سنانية طحلاء اللون زياء النصل || ازهارها ليلكية ، ثمارها
مأكولة قليلة المادة الغذائية مستديرة الشكل مخددة ، لونها
الى القرمزي يعلو موج حطبي || مهدد بلاد الغابون في
افريقية .

٢٩٠١ - **بادِنْجَان تُوِي*** Solanum muricatum (S).
Guayavos (F).

جنبة فرعاء متوسطة القد معمرة تعلو نحو المتر . اوراقها
كاملة مستطيلة عابقة الحصار || ازهارها عديدة زرقاء
اللون . ثمارها مأكولة لذيدة الطعم . بيضيه الشكل يراوح
طولها من ٦ الى ٨ سم . لونها الى الصفار التبي || مهدد
امريكة الجنوبية من بوليفيا الى المكسيك .

٢٩٠٢ - **بادِنْجَان كيتو، نَارَنْجِيَتَا**

Solanum quitoense (S). Morelle de Quito (F).
جنبة معمرة فرعاء كبيرة القد تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠
سم . مهدد بلاد البيرو . اوراقها كبيرة ، قلبية الشكل ، زياء

والعشرين من شهر ايلول وتنتهي في اليوم الثالث من شهر
تشرين الاول || فاليوم الاول من الباحور العربية مثلاً
يدل على مجمل حالة الطقس في شهر آب واليوم الثاني عن
ايلول والثالث عن تشرين الاول والرابع عن تشرين الثاني
والخامس عن كانون الاول والسادس عن كانون الثاني
والسابع عن شباط || اما اليوم الاول من البواخير الغربية
والشرقية فيدل على مجمل حالة الطقس في شهر تشرين الاول
ثم تشرين الثاني فكانون الاول والثاني ثم شباط واذار ونيسان .

٢٨٨١ - **بادِجَان** Cnidium (S). Cnidion (F).
Cnidium (E).

جنس نباتات عشبية برية مرعوية معمرة من الشجاريات
وفصيلة الخيميات . اقليمها المناطق الجبلية . اوراقها
مركبة ريشية . ازهارها صيواني كثيف الاشعة . ازهارها
صغيرة القد بيضاء اللون . يزورها اسطوانية مجنحة .
يقال انها طيبة نقيعها ينفع الصدر .

٢٨٨٢ - **بادِرَّة، قَصْرَة** Gemmule (F).
هي برعمة الملقوحة في البزرة . تكون في رأس السويق
وتنمو باتجاه النور وبمعكس اتجاه الجذر .

٢٨٨٣ - **بادِرُنْجَبُويَة** Mélisse-Citronelle (F).
Lemon-balm (E).
اطلب ترنجبان .

٢٨٨٤ - **بادِرُوج** Basilic commun (F).
Common basil (E).
هو الحبق المعروف ، راجعه .

٢٨٨٥ - **بادِرْزَهْر، بَاكَزَهْر** Bézoard (F). Bezoar (E).
قال الانطاكى : حجر معدني يكون باقى الفرس .
وحيواني ينشأ في قلوب بعض الحيوانات || اجوده المشطب
الزيتوني الشكل الحيواني الضارب الى الصفرة || وهو
كالترياق مضاد للسموم .

٢٨٨٦ - **بادِسْتَر، بَيْدَسْتَر** Castor (F).
Castor, Beaver (E).
هو الخارود ، اطلبه .

٢٨٨٧ - **بادِن** Créophage (F).
بادن ج . بواذن ، هي الدويبات والحشرات التي تتغذي
من اللحوم .

٢٨٨٨ - **بادِيَّات الاسدية** Phanéranthères (F).
Phaneranthous (E).
هي الازهار الظاهرة الاسدية .

٢٨٨٩ - **بادِيَّات الزَهْر** Phanérogames (F).
Phanerogamous (E).

اضف النباتات ذات الاعضاء التناسلية الظاهرة . يشمل
جميع النباتات التامة التجهيز الحاوية الاعضاء الرئيسية
الاربعة وهي الجذر والساق والورقة والثمرة .

٢٨٩٠ - **بادِيَّات اللَوَاح** Phanéranthes (F).
Phaneranthous (E).
هي الازهار الظاهرة الاعضاء التناسلية .

٢٨٩١ - **بادِيَّة، صَحْرَاء، قَفَر** Désert (F).
Desert, Waste, Wilderness (E).

هي كل بقعة من الارض ، مهما اتسعت مساحتها ،
لا تكفي امطارها لنمو النبات .

٢٨٩٢ - **بادَاوَرْد** Marrube (F). Morehound (E).
هو الفراسيون ، اطلبه .



بادنجان استرالي



بادنجان البیض



بادنجان بطري



بادنجان توي

٢٩١٤ - **بَارُوسْمَه** *
Barosma (S).

Barosme, Barome (F). Barosma (E).

سمها الأمير مصطفى الشهابي «ثقيلة الرائحة» || جنس جنبات معمرة برية وزينية من العطريات وفصيلة السذابيات. مهدا أفريقية الجنوبية. وهي من النباتات الطبية الشائعة الاستعمال. أوراقها مقوية مهيجة هضامة. أشهر أنواعها الزراعية خمسة وهي:

٢٩١٥ - **باروسمه أنيقة** *
B. pulchella (S).

B. élégant (F).

٢٩١٦ - **باروسمه أهليلجية** *
B. ovata (S).

B. à feuilles ovales (F).

٢٩١٧ - **باروسمه عريضة الورق** *
B. latifolia (S).

B. à feuilles larges (F).

٢٩١٨ - **باروسمه مسننة** *
B. serratifolia (S).

B. à feuilles dentelées (F).

٢٩١٩ - **باروسمه مكسية** *
B. scoparia (S).

B. à balais (F).

٢٩٢٠ - **بَارُومِتْر** *
Baromètre (F). Barometer (E).

هو المرواز، اطلبه.

٢٩٢١ - **بَارُوسْمَة** *
Sporodesmium

جنس فطور مجهرية من عمارة الزحاميات وفصيلة اللطحيات. كائناته اسطوانية الشكل. شعبة الانقسام، قياسها ٢٠×٥٥ ميكرون || أنواعه قليلة تنطفل على أوراق الدبج وعلى بعض القرعيات منها الخيار. فتوشم الأوراق ببقع مستديرة حنطية أو غبراء اللون، قرمزية الحثار. تسبب عطب وذبول النسيج المنحارة.

٢٩٢٢ - **بَارُيُوم** *
Baryum (F). Barium (E).

معدن أبيض فضي محدود الاستعمال الصناعي. وزنه (با) ثقله النوعي ٣,٨ وزنه الاتومي ١٣٧,٣٦ ينصهر في ٥٧١° سغ.

٢٩٢٣ - **بَارُز، بَارُزِي** *
Autour, Accipitre (F).

Goshawk (E).

جنس طير من عمارة البزاة وفصيلة الصقريات. أنواعه عديدة منتشرة في أكثر أقطار العالم. معظمها كبير القد. طول أجسامها يراوح من ٥٥ إلى ٦٥ سم. وبسطة سقطينها من ١١٥ إلى ١٢٥ سم. جششها ربة القوام. رؤوسها مدورة، عيونها مفر، مناسرها حادة منعقة. سواقطها مستطيلة. أذنانها مستديرة. أرجلها طويلة. مخالبها حادة وقوية || والبازي حاد المزاج، خفيف الجناح، سريع الطيران. شديد الوثب مقدام || كنيته أبو الأشعث وأبو الهلول وأبو لاحق وهو من أشد الطير تكبرا وأصيقها خلقا. وفرخ البازي يدعى غطريفا. وقد يضرب المثل بالبازي. وقد قيل فيه اشعار كثيرة منها:

«إذا ما اعتر ذو علم بعلم فلم الفقه أولى باعتزاز
وكم طيب يفوح ولا كسك وكم طير يطير ولا كبناز»
وهو من الطير الضارة التي لا تنف عن داجن أو غير داجن تستطيع إليه سبيلا || انشاء تبيض أربع رفقات تحضنها وخذها نحو أربعة أسابيع || أشهر أنواعه البازي والبازي الأشهب والأصهب والسحنون.

النصل، طحلاء اللون. أزهارها بنفسجية، ثمارها مأكولة لذينة الطعم سكرية المذاق، حجمها قدر البرتقالة.

٢٩٠٣ - **بَاذْ نَجَان معروف** * ، **أَنْب، مَعْد**

Solanum melongena (S). Aubergine, Melongène (F). Aubergine, Egg-plant (E). Eierfruchtnachtschaten, Eierfrucht (D). Petronciano, Petonciano, Melanzana (I).

نبات زراعي عديد الضروب التي تختلف بشكل ثمارها المأكولة. وهو جنبة ليفية السوق والعروق تعلو من ٦٠ إلى ١٥٠ سم. أوراقها كبيرة فارشة معتقة. أزهارها ابطية الارتكاز ثمارها مستطيلة أو شبه كروية || تتكاثر بالبذر في مشاتل خاصة ثم تنقل إلى مستقرها حيث تغرس على أبعاد متساوية في ربة متوسطة الاندماج غنية بالدبال وبالعناصر الغذائية.

٢٩٠٤ - **بَاذْ نَجَانِيَّة** *
Solanaceae (S).

Solanacées (F). Solanaceae (E).

هي الفصيلة الباذنجانية من ذوات الفلقتين وحيدة القعالة أنواعها كثيرة العدد يجمعها ٧٥ جنسا. منها برية سامة ومنها زراعية صالحة للاكل. معظمها نباتات عشبية حولية أو محولة أو معمرة. وبعضها جنبات وشجيرات || أشهرها الباذنجان والبندورة والبطاطا والفليفلة والتبغ... || أوراقها متناوبة. أزهارها خشوية خماسية الفصل والبسات والاسدية احادية المياسم، ثنائية المبيض.

٢٩٠٥ - **بَارَاثِيُون** *
Parathion

حشور زراعي جزيل النفع يرتكز على مادة فعالة شديدة الوقع تقضي على الكثير من الحشرات الضارة || وهو من السوائل السريعة الانحياص بالماء محلولة يختلف باختلاف قوة الحشرات المقصودة.

٢٩٠٦ - **بَارَاة** *
Focométrie (F).

Focometry (E).

البارة قياس المسافات البؤرية المدة الى المرايا والعدسات لإناسطحة أو محدبة أو مقعرة أو مفرقة أو لامة.

٢٩٠٧ - **بَارُزِي** *
Emergent

٢٩٠٨ - **بَارُز الحَوْشَب** *
Bouleté (F).

Upright on fetlock-joint (E).

عيب في الخيل سببه بروز الحوشب.

٢٩٠٩ - **بَارُزْد** *
Galbanum

اطلب قة.

٢٩١٠ - **بَارُسْطَارِيُون** *
Verveine (F).

Vervain, Verbena (E).

اطلب رعي الحمام.

٢٩١١ - **بَارُض** *
البارض هو أول ما تخرج الأرض من نبت. يقال اطلعت الأرض بارضها.

٢٩١٢ - **بَارُوتْج** *
Cocotier (F). Coco-tree (E).

راجع نارجيل.

٢٩١٣ - **بَارُود أبيض** *
Nitro (F).


اطلب ملح البارود.



بازنجان معروف



باروسمه



بارومتر مسجل

٢٩٣٤ - **باسقة** Stratus
الباسقة السحابة البيضاء الصافية اللون (التاج).

٢٩٣٥ - **باسنة** Charrue, Soc (F).
هي سكة الحراثة. Plough, Ploughshare (E).

٢٩٣٦ - **باسية** Bassia (S). Bassie (F).
جنس اشجار برية وزراعية من فصيلة الطلحيات. منبتها الهند الشرقية وافريقية الاستوائية || انواعه قليلة جميعها لبنية العصارة. اوراقها ضمية، تاجية، كبيرة، معنقة، جلدية، ملطاء. ازهارها هامية الارتكاز، فردية التجميع، طويلة الزناد، متدلّية، صفراء اللون أو حراء || أما العصارة اللبّنية التي تستخرج من اللحاء فيقال انها تشي من الامراض العصبية || اشهر انواعها ثلاثة وهي :

٢٩٣٧ - **باسية السمن***، شجرة الزبدة
Bassia butyracea (S). Bassie beurrière, Arbre à beurre (F).
نوع من الباسية يكثر وجودها في بلاد النوبال، يستخرج من بزورها زبدة تدعى زبدة غلام (beurre de galam) للذينة الطعم قبل ان تجف. وعند جفافها يتغير مذاقها ويتخذ طعم الشحم.

٢٩٣٨ - **باسية طويلة الورق** Bassia longifolia (S).
Bassie à longues feuilles (F).
نوع من الباسية تزرع في البنغال ويستخرج من بزورها دهن مأكول وقد يستعمل في الانارة عند قدمه.

٢٩٣٩ - **باسية عريضة الورق** Bassia latifolia (S).
Bassie à larges feuilles (F).
نوع من الباسية المرعوية تزرع بكثرة في البنغال. تستعمل كعلف للمواشي.

٢٩٤٠ - **باش** Améliorer (F). To ameliorate (E).
باش النبات حسنه وأصله. وأباشه: جعله يتحسن وجعله ينبت ويتأصل ليحود.

٢٩٤١ - **باشق** Accipiter (S). Epervier (F).
Hawk (E).
جنس طير من عمارة البزاة وفصيلة الصقريات. انواعه عديدة لا تقل عن ٤٠ جميعها معتدلة القد رشيق القوام طوطا من ٣٥ الى ٤٠ سنتي. ثوبها الى السرة الرصاصية، صدورها غبراء اللون نمرة وموشة، اذناها موشة بخطوط معترضة. عيونها صفراء وارجلها كذلك || والباشق حاد المزاج يغلب عليه القلق والزعارة وهو قوي النفس خفيف الحمل ظريف الشائل يصيد افخر ما يصيده البازي وهو الدراج والورشان || انشاء تعشش بين شجائيف وشعاب الاشجار، تبيض من اربع الى ست رفئات تحضنها ثلاثة اسابيع || اشهر انواعه الباشق المعروف والبيدق.

٢٩٤٢ - **باشق معروف***، طوط
Accipiter nisus (S). Epervier commun, Emouchet, Tiercelet (F). Sparrow hawk (E).
طائر من الباشق طوله نحو ٣٥ سم. جسمه رشيق القوام ثوبه جلبي التوشم. صدره انمر الرقشة الغبراء. عيناه ورجلاه الى الصفار الزاهي || موطنه الشرق الادنى واروبة الغربية. قوته العصافير والقواغم والعظام والحشرات. وهو مسن الكواسر الضارة لانه شديد الاذى يفتك بالعصافير والطيور الداجنة.

٢٩٢٤ - **بازدار** Fauconnier (F). Falconer (E).
بازدار ج. بزادة. من تعاطى تدريب الطيور الكواسر على القنص.

٢٩٢٥ - **بازر، حاب** Granivore (F).
Granivorous (E).
البازر والحابب واحد وهو الذي يعيش على الحبوب ج. بوازر وحواب.

٢٩٢٦ - **بازل** Dromadaire (F). Dromedary (E).
البازل هو البعير الذي فطر نابه اي انشق وذلك يكون في السنة الثامنة من عمره. ج. بزل.

٢٩٢٧ - **بازن** Pasang
راجع بزل.

٢٩٢٨ - **بازي، صقر باز، شاه باز، لويحق**
Astur palumbarius (S). Autour commun, Autour des palombes (F). Common goshawk (E).
طائر من البزاة كبير الجثة طوله نحو ٦٠ سم. وبسطته ١٢٠ وهو مستدير الرأس الاسفع، اخر العينين، اصفر الرجلين، اديس الظهر والمنكبين والسقطين والذنب، ابيض الصدر الانمر الموشم. يعتبر من اعنف الكواسر واضيفها خلقاً. يألف الاحراج الكثيفة النائية. وهو شره هم لا يعف عن شيء. يدن في اعالي الاشجار الباسقة. انشاء تحضن وحدها من رفنتين الى ٣ رفئات.

٢٩٢٩ - **بازي اشهب*** Astur albidus (S).
Autour blanc (F). White goshawk (E).
طائر من البزاة كبير الجثة، اشهب الثوب، انمر الصدر. موطنه استرالية.

٢٩٣٠ - **بازي اصهب*** Astur badius (S).
Autour brun (F). Black goshawk (E).
طائر من البزاة كبير الجثة، اصهب الثوب، انمر الصدر، كثيف التوشم، موطنه البلاد الاسيوية.

٢٩٣١ - **بازيلة*** Basella (S). Baselle (F).
جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة البازيليات وهي معظمها بقلية عارشة. اوراقها متعاقبة، معنقة، بيضية. ازهارها ابطية سنبلية. ثمارها عنبية سوداء اللون، قرمزية العصارة المستعملة في بعض العلاجات الطبية اخصها الجلدية. اوراقها مأكولة تستعمل استعمال الاسبانخ || اشهر انواعها البازيلة البيضاء ثم الحمراء التي تزرع في الصيف.

٢٩٣٢ - **بازيلة بيضاء، إسبانخ ابيض، ملابار**
Basella alba (S). Baselle, Epinard de Malabar (F). Malabar nightshade, East Indian spinach (E). Malabar spinat, Weisse burblume (D). Basella, Basella bianca, Spinacio della China (I).
نوع من البازيلة الزراعية البقلية، تزرع لاوراقها الصالحة للأكل. تستعمل استعمال الاسبانخ.

٢٩٣٣ - **بازيليات** Basellaceae (S). Basellacées (F).
Basellaceae (E)
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين العديدة القصالات. اجناسها وانواعها عديدة جميعها من نباتات المناطق الحارة والمعتدلة وهي غريبة الشبه بالقطفليات والرجليات والبطباطيات.



بازي اشهب



بازي اصهب



بازيلة



باسية السن



باشق معروف

حلزونية الشكل . قرونها الاستشعارية خيطية مستطيلة .
قوائمها مدببة الاطراف الحادة . ملاقطها خليعة . قوائمها
وملاقطها شاذخة . اعضاء الجانب الانسي اكبر قدراً من
اعضاء الجانب الوحشي || لحومها مأكولة مستحبة الصنف .

٢٩٥٦ - باغوريات ٥ Paguridae (S).


Paguridés (F). Paguridae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الارجل
طوال الذيل المحرمان . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة
منتشرة في معظم بحار العالم باستثناء القطبية || اجسامها
متفاوتة الحجم . جميعها شبه بيضية الشوزن ، ضليعة
الملاقط الكبيرة || اشهر اجناسها الباغور .

٢٩٥٧ - باغيات ٥ Actaeonidae (S).

Actéonidés (F). Actaeonidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل
خلفيات الحياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة ،
بعضها من متحجرات الاحقاب الثالثة وانبعض الآخر
معاصر منتشر في معظم بحار العالم || اصداقها متباينة
الاشكال والاحجام ، يكثر فيها الاهليلجي ، جميعها
مالسة ، بعضها محلزون الاعقاب . ألوانها زاهية متباينة
تراوح من الاشقر الى الجؤوي || اعرف اجناسها واشهرها
الباغا والظفوف والهنك .



باغا

٢٩٥٨ - باقية، كامية Baphia (S).

Baphier, Bois de Cam (F). Cam-wood, Bar-wood (E).
Glänzender färberbaum (D). Bafia (I).

جنس اشجار برية من فصيلة القرنيات القراشية . مهدبا
البلاد الحارة اخصها افريقية . انواعه خمسة . خشبها اقل
من الماء شديد الصلابة . رائحته فواحة تشبه البنفسج
ويستخرج منه مواد صيفية حمراء اللون .

٢٩٥٩ - باقى Débet (F). Debit,

Balance of an account (E).

الباقى هو ما يلزم دفعه بعد المحاسبة .

٢٩٦٠ - باقة Bouquet de fleurs (F).

Bunch of flowers (E). ضمة من الزهر .

٢٩٦١ - باقعة Oiseau des marais (F).

Moor-fowl (E). كل طائر يرد المستنقعات دون المشارع .

٢٩٦٢ - باقيل ٥ Léguminivore (F).

Leguminivore (E).

الباقيل من كان قوته البقول .

٢٩٦٣ - باقيل Anabase (F).

Berry bearing glosswort (E). هو السران ، راجع انا باز .

٢٩٦٤ - باقلاء، باقلى Fève (F). Broad bean (E).

هو الفول ، اطلبه .

٢٩٦٥ - باقلى قبطي Néloambo (F).

Sacred bean (E).

اطلب نيلوفر قبطي .

٢٩٦٦ - باقورة Bouverie, Vacherie (F).

Cattle-shed, Cow-house, Byre (E).

هو المزرع الخاص بالبقر .

٢٩٤٣ - بَاضٌ، سَرَأٌ، مَتَح Pondre (F).

باض للطير وسراً للسك ومتح للحشرات . To lay (E).

٢٩٤٤ - بَاطِس Ronce (F). Bramble,

هو العليق ، اطلبه . Black berry-bush (E).

٢٩٤٥ - باطيني Endogé, Hypogé (F).

Endogéal, Hypogéal (E).

نعت تعريفي يطلق على ما هو موجود في باطن الارض
او التربة .

٢٩٤٦ - باطيني الخياشيم Endobranche (F).

Endobranchial (E).

نعت تعريفي يطلق على كل من كانت خياشيمه داخلية
الارتكاز .

٢٩٤٧ - باطون Béton (F). Beton (E).

مزيج من الاسمنت والرمل والقضة والماء ، يستعمل في البناء .

٢٩٤٨ - باطون رضمي Béton cyclopéen (F).

Kind of concrete (E).

هو الباطون العادي زيد عليه الرضام .

٢٩٤٩ - باطون مسلح Béton armé (F).

Reinforced concrete (E).

هو الباطون تتخلله قضبان من حديد لزيادة متانته .

٢٩٥٠ - باطية Dame-jeanne (F).

Demijohn, Carboy (E). هي الدجاجة .

٢٩٥١ - باطية Cratère (F). Crater (E).

الباطية كوكبة نجوم جنوبية الموضع شكلها كالكوب
العظيم || عدد نجومها تسعة جميعها من المرتبة الرابعة وما
دونها . والعرب تسمي هذه الكواكب « المتلف » .

٢٩٥٢ - باع Brasse (F). Fathom (E).

مقياس للطول يوازي ١٦٢ سم . ج ابواع وباعات .

٢٩٥٣ - باعيت، حافيز، دافيع Mobile, Motif (F).

Mobile, Movable, Moving (E).

هو الغاية الخاصة التي يفسر بها عمل جائز او غير جائز .

٢٩٥٤ - باغما * Actaeonella (S).

Actéonelle (F). Actaeonella (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل
وفصيلة البافيات . انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد
منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اصداقها
اهليلجية الشكل ، مالسة ، شقراء اللون او بنية ومنها
انواع مبقجة بالابيض وغيرها بالجؤوي .

٢٩٥٥ - باغور ٥ Pagurus (S).

Pagura, Bernard l'ermite (F).

Hermit-crab, Pagurian (E).

جنس دوبيات بحرية من القشريات وفصيلة الباغوريات
انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة
والمعتدلة الحرارة . تألف الشطوط وتعيش ضمن اصداق
البوق الفارغة فتجربها وراها ايما سعت وكيفما تحركت
وقد تبدلتها باكبر منها بعد كل انسلاخ || اجسامها متباينة
الحجوم التي تختلف مع الانواع || بطونها عادمة الدروع ،



باغور

رباعيات الخياشيم وفصيلة العمونيات . انواعها المعروفة عديدة جميعها من متحجرات الازمنة الغابرة يكثر وجودها في الطبقة الطباشيرية || جميعها مستقيمة الخط ، وشعيرة الشكل . اطولها تراوح من ٣ الى ١٥ سم .

٢٩٧٥ - **بَال** * Balaena (S). Baleine (F). Whale (E).
جنس حيوانات لبونة مائية من فصيلة الباليات ورتبة الحيتان . انواعه ٦ جميعها كبيرة الجثة ضخمة الرأس ، عادمة الاسنان وانزعانف الظهرية . حلاقيها ضيقة لذلك فانها لا تقتات الا بالاسماك الصغيرة والقشريات || تعيش جماعات ، وتتمر كثيراً . انثاها تضع من جرو الى جروين || تصاد من اجل دهنها المعروف بزيت السمك وعظامها (البالين) الشائعة الاستعمال الصناعي || انواعه : بال الجنوب وبال الشمال وبال المحيط ، والبتيان والبال .

٢٩٧٦ - **بَال الجنوب** Balaena australis (S).
Baleine australe (F). Austral whale (E).
موطنه القطب الجنوبي وبحار الجنوب . وهو كبير الجثة غليظها ، طوله يراوح من ٢٠ الى ٢٤ م . يتميز برأسه القصير العريض .

٢٩٧٧ - **بَال الشمال** Balaena mysticetus (S).
Baleine franche, B. boréale (F). Northern whale (E).
موطنه القطب الشمالي وشمال المحيط الاطلسي وهو اعظم انواع البال واضخمها جثة كما انه اكبر حيوان معروف . طوله يراوح من ٢٥ الى ٣٠ م . وزنه من ١٥٠ الى ٢٠٠ طن .

٢٩٧٨ - **بَال المحيط** Balaena biscayensis (S).
Baleine de Biscaye, Sarde (F). Biscay whale (E).
موطنه المحيط الاطلسي وقد شوهد مراراً في البحر الابيض المتوسط . وهو كبير الجثة ذلق الطرف ، طوله يراوح من ١٦ الى ٢٠ م .

٢٩٧٩ - **بالأحرى، بالاولى** A fortiori
ويقال بالبحري وبقوى حجة .

٢٩٨٠ - **بالح** Terre stérile (F). Sterile land (E).
البالح : الارض التي لا تنبت شيئاً (اللسان) .

٢٩٨١ - **بالغ، مذك** Adulte (F). Adult (E).
هو من الخيل الفرس الذي تم نموه واكتملت اسنانه .

٢٩٨٢ - **بالميمون** Tamier commun (F).
هو الفاشرشين المبذول ، اطلبه . Black bryony (E).

٢٩٨٣ - **بالوعة** * Delphinapterus leucas (S).
Delphinaptère blanc, Bélouga, Béliuga (F).
White whale (E).

حيوان بحري ولود لبون من فصيلة القوقيات ورتبة الحيتان . اعطائه بحار الشمال والقطب . ملجئه الحياتي جماعي . قوته الرخويات واخصها الحبار || جسمه شبه اهليلجي الشكل يطول من ٣٠٠ الى ٦٠٠ سم . ثوبه الى البياض الاغبر . مسكه عادم الثعول . رأسه مستغلف الشكل ، مقطوم الخطم المستدير الطرف . اسنانه كبيرة متائلة في الفكين . عيناه صغيرتان مابحتان . نيسه نفرة تتوسط الجبهة . ظهره عادم الزعانف . زعنفته الصدرية صغيرة القد مجدافية

٢٩٦٧ - **باقوع** * ، **تبقيع** ، **تبقيع** Fusicladium
جنس فطور مجهرية من عمارة الزناخيات وفصيلة اللطحيات . جريه الكنيديه اسطوانية ، قصيرة ، منتصبة . تعلوها كنانة بيضيه او اجاصيه الشكل ، سمراء او زيتونية اللون ، وحيدة او ثنائية الخلية || انواعه عديدة تركب مختلف اعضاء النبات فتسبب الوصم المعروف بالتبقيع .

٢٩٦٨ - **باقوع الاكيدنيا** *
Fusicladium eriobotryae (S). Tavelure du néflier du Japon (F).
فطر مجهري يركب اوراق الاكيدنيا فيعطبها . مظهره الخارجي يقع مستطيلة سمراء اللون ، سوداء الخنار تركب النصل على صفحته العليا فتعطب النسيج وتقودها الى اليباس . وقد يصيب الثمار فيذويها قبل ادراكها || يكافح عند ظهوره باستعمال احد الفواطير الفعالة المجربة كالسوائل السلفوكسية وغيرها .

٢٩٦٩ - **باقوع العرفج** *
Fusicladium pyracanthae (S). Tavelure du coto-neaster (F).
فطر مجهري يركب العرفج في اوراقه وافنانه وثماره . مظهره الخارجي بثور سمر تركب نصل الاوراق وقروح نافضة تعلو لحاء الافنان وبقع تبدو رمادية ثم فحمية تصيب الثمار فتعطبها وتقودها الى الانفلاق واليباس || يكافح باستعمال احد الفواطير المركزة على النحاس .

٢٩٧٠ - **باقية** * ، **بيقة** ، **بيقة** Vicia sativa (S).
Vesce, Pasquier, Barbotte, Bisaille (F). Common vetch, Lints, Tare (E). Futterwicke (D). Veccla coltivata, Veccla comune (I).

نبات عشبي حولي من فصيلة القرنيات الفراشية . ضروبه عديدة ، جميعها قطانية تعلقها الماشية بشبهة . وهي من النباتات المصلحة التي تخصب التربة اذا طمرت فيها .

٢٩٧١ - **بالك** Couvrir, Saillir (F).
To cover, To serve (E).
يقال بالك الحمار الاتان اذا نزا عليها .

٢٩٧٢ - **باكاس** * ، **كلوجنيس** *
Cœlogenys (S). Pacas

جنس حيوانات لبونة قاضمة من فصيلة الشرديات . انواعه المعروفة قليلة تتميز باجسامها الضخمة الثقيلة . طولها نحو ٦٠ سم . وارتفاعها ٣٣ . رؤوسها غليظة . عيونها كبيرة . اذناها صغيرة . اذناها جداع . قوائمها قصيرة . اصابعها خاسية . اظافرها قوية حادة || موطنها يمتد من المكسيك الى البراغواي . تسرح في الليل . قوتها الاعشاب والجنود والشام والبطيخ وقصب السكر ... اجحرتها رداء فسيحة الارحاء تحفرها على عمق ١٥٠ سم . مدخلها ومخرجها نفق واحد طوله من ٥ الى ٦ امتار || انثاها تضع جرواً واحداً في السنة ترضعه وتربيته نحو اربعة اشهر .

٢٩٧٣ - **باكورة، معجالة، بكيرة** Primeur (F). Early vegetables (E).
هي البقول والفواكه وازهار التزيين التي تدرك قبل الاوان المعتاد .

٢٩٧٤ - **باكوليت** * ، **بكوليت** *
Baculites (S). Baculite (F). Baculites (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الارجل



باقوع الاكيدنيا



باقوع العرفج



باقية



باكاس



باكوليت



بال



بالوعة



بامية



بان



باهرة الملكة فيكتوريا



باهرة هندية

٢٩٩٠ - باهرة
Agave
جنس نباتات برية وزراعية ، معمرة ، من فصيلة النرجسيات . انواعه زهاء ٢٧٥ . جذورها ليفية التركيب . سوقها شمراخية . اوراقها لحمية ، حزمية ، مستطيلة ، مدببة العقصية . ازهارها مختلفة الالوان ، محمولة على شماريخ بسيطة او متشعبة || اشهر انواعها ما يلي :

٢٩٩١ - باهرة الملكة فيكتوريا *
Agave Victorlae-Reginae (S). Agave de la reine Victoria (F).

نوع من الباهرة . شمراخها يعلو نحو ٤٠٠ سم . اوراقها تطول من ٥٠ الى ٧٠ سم . نصلها سميك النسيج الجامد الصلب ، لونه الى الخضار الكمد يعلو تبقيج ابيض ، حثاره اغبر اللون ، شذام عقصته اسود || عنقودها الزهري هرمي الشكل يعلو من ١٠٠ الى ١٢٠ سم .

٢٩٩٢ - باهرة امريكية ، صبارة
Agave americana (S). Agave d'Amérique (F). American Aloe (E).

نوع من الباهرة ، شمراخها يعلو من ٥ الى ٨ امتار ، اوراقها تطول من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . نصلها الى الخضار الازرق . حثاره محدب الحافة البيضاء او الصفراء اللون . شوكة اعقف لاقط . عقصته تنتهي بشوكة غليظة تطول نحو ٣ سم . || عنقودها الزهري هرمي الشكل ، كبير القد . تزرع لاليافها . وتستعمل كسياجات حية .

٢٩٩٣ - باهرة فيرجينية
Agave Virginica (S). Agave de Virginie (F).

نوع من الباهرة ، شمراخها يعلو من ١٠٠ الى ١٨٠ سم . اوراقها حولية تعد من ٨ الى ١٥ ، نصلها يعلو نحو ٤٥ سم . ويعرض نحو ٥ سم . وهو محدب الصفحة . عابق الخضار يعلو تخطيط احمر || سبلته الزهرية متقاربة الفواصل كثيفة التجميع تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم .

٢٩٩٤ - باهرة ليفية
Sisal
راجع سيزال .

٢٩٩٥ - باهرة مزدوجة الزهر
Agave geminiflora (S). Agave biflora (F).

نوع من الباهرة المادمة الساق . اوراقها اسلية الشكل تطول من ٤٠ الى ٩٠ سم . وتعرض من ٤ الى ٦ مم . نصلها ملس البشرة ، عابق الخضار ، لين الختار ، ينتهي بهدية سمراء اللون تعلو نحو ٥ مم . || شمراخها الزهري دقيق ونحيل تعلو سيلة رهلة ، ازهارها مزدوجة التجميع .

٢٩٩٦ - باهرة ملطخة
Agave maculosa (S). Agave tacheté (F).

نوع من الباهرة ، شمراخها يعلو نحو ١٠٠ سم . اوراقها تعد من ٢٠ الى ٢٥ . نصلها يعلو من ١٥ الى ٣٠ سم . ويعرض نحو ٢ سم . وهو مخدد الصفحة بحري اللون يعلو تلطيخ اسمر . سبلته الزهرية تعلو من ٢٠ الى ٣٠ سم .

٢٩٩٧ - باهرة هندية *
Gloriosa superba (S). Méchonique du Malabar, Superbe de Malabar (F). Climbing lily, Superb lily, Malabar glory lily (E). Malabarische methonika (D). Narciso superbo, Superba del Malabar (I).

نوع من الباهرات وهو نبات بصلي معمّر عارض . اوراقه متعاقبة ، رحيمة النصل تنتهي بحوالق دقيقة مستطيلة .

الشكل وهما اثنتان ينمي ويسرى . زعنفته الليلية فارقة ، مستندقة الاطراف || يصاد لسكه وزيته . لحمه كاعن الصنف قل من يرغب فيه .

٢٩٨٤ - باليات
Baleinidés (F). Balaenidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية لبونة من مرتبة ريشيات الاحناك ورتبة الحوتيات || انواعها المعروفة خمسة : بال الجنوب وبال الشمال وبال المحيط وبال اليابان المعروف بالوال والبال الصغير المعروف بالبتان .

٢٩٨٥ - بامية *
Hibiscus esculentus, Abelmoschus esculentus (S). Bamia, Gombaud, Gombo, Ketmie comestible (F). Gombo, Gobbo, Okra (E). Bamia, Gombo, Ocker, Ocher (D). Bamla, Gombo, Corna di Grecl (I).

جنبة صغيرة حولية زراعية من فصيلة الخبازيات ، مهدا امريكة الجنوبية . ساقها منتصب ، ليفية ، زباء ، ترتفع نحو المتر . اوراقها كبيرة ، متعاقبة : معتقة ، كفية النصل الازغب ، عابقة اللون الاخضر . ازهارها كبيرة القد ، ابطية الارتكاز ، فردية التجميع ، قصيرة الزناد ، خماسية البتلات الارجوانية الرباط والصفراء الطرف . ثمارها قرنية . بزورها صغيرة مستديرة || تزرع في البلاد الشرقية والاروية لثمارها المأكولة طبخاً . وتزرع في امريكة لثمارها ولاليافها التي يستخرج منها نوع من الورق المعروف باسم غومبو (Gombo) .

٢٩٨٦ - بان ، يسر ، يسار ، شوع ، سيماع
Moringa aptera (S). Moringe aptère, Ben, Ben aptère (F). Ben-oil tree, Horse radish tree (E). Behanbaum (D). Ben, Noce di behen (I).

شجرة حرجية من فصيلة الباليات . اعطائها المناطق الاستوائية والاسيوية والافريقية . اوراقها مركبة بيضية الشكل صغيرة القد . ازهارها زنادية التركيب ، عثكولية التجميع ، ابطية الارتكاز . فواحة العرف العطري ، ثمارها قرون اسطوانية مستطيلة ليفية النسيج تغلف من ١٢ الى ١٥ حبة . حبة كالحمص شكلاً وقدأ وهو اغبر اللون طيب الرائحة يستخرج من لبه مادة زيتية مستحبة الطعم والعرف تعرف بدهن البان . وهي غير قابلة للتأكسد والحموضة ، ومن خواصها المشهورة قوة قابليتها على اكتساب الروائح العطرية مما يجعلها تدخل في شي التراكيب العطرية الصناعية || قال ابن سينا : ان لب البان ينفع من البرص والكلف والبهق وآثار القروح والثآليل || ضروبه عديدة اشهرها البان الدهني (M. pterygo-perma) .

٢٩٨٧ - بانسيه
Pensée (F). Pansy (E).
راجع بنفسج الثالوث .

٢٩٨٨ - باليات
Moringaceae (S). Moringacées (F). Moringaceae (E).
فصيلة شجر البان قريبة الشبه من الكبريات والقرنيات . انواعها عديدة جميعها اشجار وشجيرات خشوية الازهار .

٢٩٨٩ - باهرات
Methonicees (F).
سيط نباتات بصلية من فصيلة الزنبقيات . اجناسه لا لا تجاوز الاربعة جميعها من نباتات البلاد الاستوائية الاسيوية والافريقية . اشهر انواعها الزينية الباهرة الهندية الرائعة الجمال .

Melonbaum (D). Papajo, Fico del iole, Papaia (I). ضرب من البياض مهدد البلاد الاستوائية وقد عمت زراعته جميع البلاد الحارة وهو يعيش ويشمر على الساحل اللبناني في بعض المواقع الدافئة. ساقه اسطوانية منتصبة سرحة عريضة تملأ نحو ١٠ امتار تحمل في قمتها بعض الاوراق الكبيرة. اوراقه منعقة غليظة الزناد المستطيل. نصلها كفي الشكل، كبير القد، سباعي التفصيص، كثير التفريش، اطحل اللون، بحري المواج. ازهاره خماسية البتلات فستقية اللون. الذكرية منها عشكولية التجميع نجيلة القدر اما الانثوية فعذقية التجميع غليظة القدر. جميعها ابوية الارتكاز || ازهاره يستمر من ٨ الى ٩ اشهر. ثماره اجاصية الشكل قدرها قدر الشام الكبير وزنها يراوح من ١٠٠٠ الى ١٠٠٠٠ غ. قشورها عند نضجها تبدو فستقية اللون خراء المواج. لبها اصفر اللون، جامد المكسر، غزير العصارة، سكري الطعم، مستحب المذاق. خافت العرف الخاص. بزوره بيضية الشكل، ليفية القشرة المتمحمة السوداء اللون وهي حريفة الطعم كايوية || يستعمل كالثمام ومنهم من استعمله كالبطاطا وهو ينفع المعدة وينشط الهضم || يستخرج من ساقه واوراقه وقشور ثماره عصارة لبنة بيضاء اللون تدعى صمغ البياض او البياضين او الكاريسين (Papain ou Caricine) تستعمل استعمال البسين.

٣٠٠٧ - بَبَايَات، بَبَايَات (S). Caricaceae (S). Caricacées, Papayacées (F). Caricaceae (E). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين ومنهم من جعلها سبط من فصيلة الالانيات. اشجارها عديمة الاغصان، جذعية الساق الجرداء كالنخل. اوراقها منعقة كفية. ثمارها بطيخية، خماسية او سباعية الاضلع. بزورها بيضية الشكل متمحمة القشرة السوداء.

٣٠٠٨ - بَبَتُون، هَبْتُون (S). Peptone هي المواد الاحية المهضومة او التي حولتها خيرة الهضم.

٣٠٠٩ - بَبَر، بَبَر (S). Tigre (F). Tiger (E). جنس حيوانات مفترسة من فصيلة السنوريات ورتبة اللواسم. موطنها الشرق. انواعها ثلاثة جميعها كبيرة الجثة، يراوح طولها من ١٥٠ الى ٣٠٠ سم. وارتفاعها من ٨٠ الى ١٠٥. اما وزنها فن ١٢٠ الى ٢٠٠ كيلو. اثنائها مجزعة بخطوط سود. بطونها بيض اياطها صناعية. ظهورها الى الصهبة تعقب مع اقترابها من الشج.

٣٠١٠ - بَبَر الْجَزُر (S). Tigris Sondaicus (S). Tigre de la Sonde (F). نوع من الببر، موطنه جزر الزايج والارخبيل وهو اصغر جثة من الببر الهندي لكنه اشرس خلقاً وأحد مزاجاً.

٣٠١١ - بَبَر الْمُنْغُول (S). Tigris Mongolicus, T. Amurensis (S). Tigre de l'Amour (F). نوع من الببر، موطنه بسلاط المنغول وسيبيرية وهو متوسط القد لا يختلف عن الهندي الا باعتدال الاستطالة والعمر وبشوبه الاكثر بياضاً وصهبة.

٣٠١٢ - بَبَر الهند، بَبَر سُلْطَانِي، شير (S). Tigris regalis (S). Tigre royal, T. Impérial (F). نوع من الببر وهو اكبرها جثة واحسنها خلقاً واكلها انسجاماً. يعادل الاسد الشرقي في عظم الجثة والقوة والبشر.

ازهاره كبيرة القد محورية الارتكاز محمولة على معاليق متدلية || اوراقه مرة المذاق تستعمل كمعالج قابض. يصلته كريمة الرائحة، سامة || يعتبر من اجل النباتات التزيينية المركنية لكنه يخشى المواقع الباردة. كما وانه يرغب في الاتربة الدبالية الحارة.

٢٩٩٨ - بَاهِرَة يُوْكِيَّة الْوَرَق *

Agave yuccifolia (S). Agave à feuilles de Yucca (F). نوع من الباهرة، اشجارها يعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها تطول من ٤٥ الى ٧٥ سم. نصلها يزاوي الصفحة، عابث الخضار تعلوه نمشة شمراء، حثارة مسنن الحافسة، اسنانه دقيقة شائكة || سبلتها الزهرية كبيرة القد مستطيلة.

٢٩٩٩ - بَاوَبَاب (S). Baobab راجع بوباب.

٣٠٠٠ - بَاوُلُونِيَا، بَاوُلُونِيَا، بُولُونِيَا

Paulownia Impérial (F). شجرة تزيينية من فصيلة الخنازيريات معقودة التعريف على اسم الاميرة انا باولونيا ابنة القيصر الروسي بولص الاول. مهدا اليابان حيث تعرف باسم «كيري» وهي بحيلة الشكل، متوسطة الحجم، سريعة النمو. اوراقها متقابلة، منعقة، قلبية النصل تطول نحو ٣٠ سم. ازهارها عشكولية التجميع، زرقاء اللون، بنفسجية المواج تظهر وتضع قبل البلاج الاوراق.

٣٠٠١ - بَاَلِير (F). Inculte (F). Uncultivated (E). هو لما بار من الارض فلم يعمر بالغرس والزرع. ج بور. يقال بارت الارض: لم تزرع.

٣٠٠٢ - بَالِرَة (F). Friche (F). Waste or fallow land (E). الارض البائرة والبور هي التي تركت بلا زرع لسبب ما.

٣٠٠٣ - بَاَلِي (F). Sans-prix (F). Without price (E). البائع هو ما لا ثمن له.

٣٠٠٤ - بَبَاَج *٥

Achirus (S). Achire (F). Achirus (E). الواحدة بباجة. جنس اسماك بحرية بيوضة من فصيلة جانبيات العوم. انواعه المعروفة ثلاثة، اعطانها بحار البلاد الاستوائية والحارة || اجسامها مبططة، اهليجية الشكل تطول من ٣٠ الى ٤٥ سم. رؤوسها صغيرة، مستديرة الاخطام. تتميز بخلوها من الزعانف الصدرية اما الزعانف الخوضية فصغيرة. وزعانفها الظهرية والشرجية مستطيلة قاطبة تتصل بالدليية || لحومها جيدة الصنف لذيلة الطعم.

٣٠٠٥ - بَبَاَض، بَبَاَيَا (F). Papayer (F). Papaya (E). نوع من الكريكة من فصيلة البياضيات. مهدد امريكة الاستوائية وقد انتشرت زراعته في جميع المناطق الحارة والاستوائية من العالمين القديم والجديد || ضروبه المعروفة كثيرة العدد اشهرها البياض الزراعي المأكول الثمار، اطلبه.

٣٠٠٦ - بَبَاَض لِرَاعِي، كَرِيكَة بَبَاَيَا، دَبَاء الهند، عَجُور اَفْرِيقِي، عَنَب هندي

Carica papaya (S). Papayer, Arbre de melon (F). Papaya, Papaw apple, Melon tree (E). Papayabaum.



بَاهِرَة يُوْكِيَّة الْوَرَق



بَاوُلُونِيَا



بَبَاَج



بَبَاَض زِرَاعِي



بَبَر الْجَزُر



بَبَر الْمُنْغُول



بَبَر الهند

٣٠١٩ - ببغاء السنغال * ، ببغاء شهباء الرأس
Paecephalus senegalus (S).

Perroquet du Sénégal, Perroquet à tête grise (F).

طائر من الببغاء موطنه بعض مناطق افريقية الاستوائية
أخصها السنغال . يألف الغابات والمواقع الرطبة . ملجئه
الحياتي جماعي . فوجه يراوح من ٣ الى ٥ أزواج . قوته
الثار والحبوب || ثوبه جميل الالوان الزاهية . رأسه وعنقه
الى الشبهة العابقة الزرقاء الموج . ظهره وجناحه وصدره
الى الخضار الاليس الجميل . بطنه وافنيه الى الصفار
الكبريتي ويعلوه في وسط بطنه موج احمر . متفاده ورسناه
واصابه الى الربة السمره || يألف القفص لكنه يقتبس
الكلام بصعوبة .



بيري الاجاص



بيري

٣٠٢٠ - ببغاء خضراء
Perroquet vert (F).

طائر من الببغاء مشهور باسم اماروكة ، اطلبه .

٣٠٢١ - ببغاء رمادية
Perroquet cendré (F).

طائر من الببغاء مشهور باسم جاكو ، اطلبه .

٣٠٢٢ - ببغائية
Psittacosis (S).

Psittacose (F). Psittacosis (E).

مرض معد يصيب الببغاء وقد ينتقل الى الانسان سببه
بسيلوس نوكار . عوارضه حتى تقود الى الانحطاط والوهن
مع التهاب الشعب .



ببغاء السنغال

٣٠٢٣ - ببغاة * ، ببغاء ، ببغاء
Psittacus (S).

Perroquet (F). Parrot (E).

جنس طير من فصيلة الببغاوات وفئة الببغاء الكبيرة الحجم .
انواعه عديدة جميعها متراكبة الالوان الجميلة الزاهية . منها
انواع شهيرة باقتباسها الكلام تسمه فتدوده وتعيده . انها
وارقاها الانواع الافريقية .

٣٠٢٤ - ببغاواته
Psittacidae (S). Psittacidae (F).

Psittacula (E).

فصيلة طير الببغاء من رتبة الجرجيات . اجناسها وانواعها
كثيرة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم اخصها المناطق
الحارة . والببغاوات تقسم الى فئتين الببغاء والدرة . فالببغاء
تشمل الطيور الكبيرة الحجم ، اما الدرة فطيورها صغيرة
القدم .

٣٠٢٥ - ببليش
Peplis (S). Péplide (F). Peplis (E).

جنس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة الخنائيات .
انواعه قليلة العدد اكثرها من نباتات الاراضي الرطبة .
اعما انتشاراً ببليش الماء .

٣٠٢٦ - ببليش الماء *
Peplis portula (S).

Péplide, Peplion, Pourpier sauvage (F). Common
water purslane (E). Echte bachburgel (D).
Porcellanetta (I).

نبات عشبي حولي بري من الخنائيات . اوراقه كاملة
متعاقبة . ازهاره ابطية الارتكاز ، فردية التجميع ، لاطئة ،
بيضاء اللون خضراء الموج . يكثر في المناطق والاراضي
الرطبة . طعمه قريب من طعم البقلة ويؤكل مثلها .

٣٠٢٧ - ببوان
Babouin (F). Baboon (E).

هو قردوح ببوان ، اطلبه .

ثوبه مجزع بخطوط سود . بطنه ابيض اللون اصفر الموج .
ايطلاه الى الصهبة الشقراء . ظهره عنابي شديد اللمعة .
اعطانه الهند وجوارها .

٣٠١٣ - بيري الاجاص * ، نمر الاجاص

Tingis pyri, Stephanitis pyri (S). Tigre du poirier (F).

Pear lace bug (E). Birnbaum-Netzwanze, Birn-
blattwanze (D).

حشرة مضرة تركب اشجار الاجاص وتوقع بها اشد الأذى .
وهي من فصيلة البيريات ورتبة نصفية الاجنحة . تكثر
في لبنان وسورية . تكالغ باستعمال بعض الحواشير النشيطة .

٣٠١٤ - بيري السرمق ، عجاج السرمق

Plesma quadrata (S). Punaise des arroches (F).

حشرة خاضعة من فصيلة البيريات ورتبة مختلفات الاجنحة .
جسمها شديد الصغر يطول نحو ٣ مم . ثوبها الى الحنطي
الاغبر . بطنها ومدتها الى الحمرة . رأسها مطوق بالاسمر
البي . خطمها معتدل الطول . عينها صغيرتان . زباناها
الى الحنطي الاغبر . كوسلها كثيف التثير الاسمر . حنفتها
صغيرة مزوانية . ظهرانها اغبر . قشرانها شفاف . قوائمها
حنطية || مرتعها السرمقيات اخصها السرمق والشوندر .

٣٠١٥ - بيري ملطخ ، عجاج ملطخ

Galeatus maculatus (S). Galéate maculé (F).

حشرة خاضعة من فصيلة البيريات . جسمها مبطل ، يطول
نحو ٥ مم . رأسها صغير الجرم ، حنطي اللون ، اسود
الطوق . معتدل الطول . زباناها كثيفا الملب القصير .
عينها صغيرتان . كوسلها وحنفتها الى السمر السوداء
يعلوهما خطم نفسي ابيض يقطب الكوسل والحنفة . بطنها
ومدتها الى السمر . قوائمها حنطية || لها جيلان في الحول .
مرتعها اوراق فصيلة المركبات .

٣٠١٦ - بيرييات
Tingidae (S). Tingidés (F).

Lace bugs (E). Gitterwanzen (D).

فصيلة حشرات من رتبة نصفية الاجنحة . اجناسها وانواعها
عديدة جميعها صغيرة القد وازفة الجناح . وهي خاضعة
خائبة تعيش على اوراق النبات وافنائه ويجذوعه . معظمها
من الحشرات الضارة . اعرفها واكثرها شيوعاً بيري الاجاص .

٣٠١٧ - بيريّة * ، عين الطاووس ، زنبق النمر

Tigrida (S). Tigridie, Œil de paon, Lis de tigre (F).

Tiger flower, Shell-flower (E). Tigerlilie, Echte
tigerblume (D). Tigridia, Fior di tigre, Occhio di
pavone (I).

جنس نباتات بصلية من فصيلة السوسنيات . سوقها ليفية
التركيب ، لحمية السيج ، مخروطية الشكل . اوراقها
متعاقبة مستطيلة ، محجنة . تصلها جامد الصفحة ، مزغب
الاطراف . ازهارها جميلة الشكل ثلاثية البتلات والبتلات
بتلاتها كبيرة القد متدعة الانتشاب . الوانها متداخلة
تكثر فيها الحمرة القانية حتى مستوى الكأس ثم الابيض
المجزع والمزق بالاحمر والاصفر والبنفسجي || انواعها
المعروفة سبعة جميعها تزيينية .

٣٠١٨ - ببسون ، هضمين
Pepsine (F). Pepsin (E).

هي خيرة المضم في عصارة المعدة وينموها تتحول المواد
الاحية الى بيتون لو هضمون .



ببغاء



ببليش الماء

٣٠٣٦ - بَتُّول - Pétrole (F). Petroleum (E).
هو النفط ، أطلبه .

٣٠٣٧ - بَشْرِيَتِيس - Botrytis
هو الطَّلْمَة ، جنس فطور مجهرية من الطلّسيات وفصيلة الوطحيات .

٣٠٣٨ - بَتَشُولِي * - Pogostemon patchouly (S).
Patchouly (F). Patchouly oil plant (E). Patchouly-
pflanze (D). Pacciuli, Patchouli (I).

نبات عشبي من فصيلة الشفويات مهدد البلاد الاستوائية
الاسيوية . أوراقه بيضيه ، مسننة ، معنقة ، متقابلة .
ازهاره عككولية التجميع ، ابطية وقاجية الارتكاز ، خاسية
البتلات والاسدية || يستخرج من زهره ووزقه وسوقه
بالتقطير دهن سائل يفصل بعد الاستقرار الى مادة جامدة
تدعى عنبر بتشولي والى مادة سائلة تدعى عطر بتشولي .

٣٠٣٩ - بَتَّع - Hydromel
البتع ، هو نبيذ العسل .

٣٠٤٠ - بَتَّع - Vin (F). Wine (E).
البتع هو الخمر والبتع هو الخمار وبتع الخمر خمرها .

٣٠٤١ - بَتَّل - Discernement (F).
Distinguishing (E).
البتل قوة التمييز ، تمييز الشيء عن غيره .

٣٠٤٢ - بَتَّلَة ، قُوعَالَة ، نُويْجِيَّة ، نُورِيَّة -
Pétale (F). Petal (E).
كل قطعة ورقية من تويج الزهرة .

٣٠٤٣ - بَتَّلِي - Pétaloïde (F). Petaloid (E).
ما كان كالبتلة شكلاً وخضاباً .

٣٠٤٤ - بَتُّول ، بَتِّل ، بَتِّلَة - Rejet de dattier (F).
Sprout of date tree (E).
هي الفسيلة من النخل المنقطعة عن أمها .

٣٠٤٥ - بَتُّولا * ، سَنَدَر - Betula (S).

Bouleau (F). Birch (E). Birke (D). Betula, Bedula (I).
جنس أشجار وحيات تحرجية من فصيلة السومليات .
انواعها عديدة . اعطائها البلاد الباردة تعيش بين خطي
العرض ٤٧ و ٧٢ . أوراقها الجافة تستعمل استعمال الشاي
في معظم البلاد السكندنافية . نسغها غزير المادة سكري
المذاق يستعمل في تحضير بعض المشروبات الكحولية .
قشور سوقها تستعمل في الدباغة ويستخرج منها بالتقطير
مادة قاذية صناعية . الخشاب بعض انواعه تستعمل في
صناعة الورق . اشهر انواعه المعروفة ما يلي :

٣٠٤٦ - بَتُّولا بَيْضَاء - Betula alba (S).
Bouleau blanc (F).

٣٠٤٧ - بَتُّولا نُورِيَّة - B. verrucosa (S).
B. verruqueux (F).

٣٠٤٨ - بَتُّولا حَقِيرَة - B. humilis (S). B. chétif (F).

٣٠٤٩ - بَتُّولا حَمْرَاء - B. rubra (S). B. rouge (F).

٣٠٢٨ - بَبْيَانَة * - Babiana (S).

Babiane (F). Babiana (E).
جنس نباتات عشبية دوفصية من فصيلة السوسنيات . منبتها
بعض مناطق افريقية المعتدلة الحرارة . سوقها مورقة تعلو
من ١٥ الى ٣٠ سم . أوراقها متباينة الاشكال ، خلية
النصال . ازهارها عنقودي التجميع . ازهارها ملونة ،
متعاقبة الافقام || تزرع للزيين ضمن البيوت وفي الحدائق .
انواعها المعروفة متوسطة العدد ، اشهرها التالية :

٣٠٢٩ - بَبْيَانَة مَشْدُوْقَة - Babiana ringens (S).
Babiane béante (F).

نوع من الببيانة الزينية . ساقها مستقيمة ترتفع من
٢٠ الى ٣٠ سم . أوراقها اهليلجية مستطيلة . نصالها
خلية الصفحات السفلى . ازهارها كبيرة القد ، مشدوقة
الشكل ، نظراً للتفاوت الكبير بين البتلات اللامساوية
الاحجام . انايبها خضراء اللون ، بتلاتها قرمزية ||
تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

٣٠٣٠ - بَبْيَانَة مُنْتَصِبَة - Babiana stricta (S).
Babiane dressée (F).

نوع من الببيانة الزينية . ساقها منتصبة تعلو من ٢٠
الى ٣٠ سم . أوراقها عصفية النصال الحولية الباهتة الخضار .
ازهارها كبيرة القد ، قطرها نحو ٥ سم . لونها يختلف مع
الضروب منه الابيض والليلكي والاحمر || تنويرها يستمر
طوال شهر ايار .

٣٠٣١ - بَبْيِير - Papyrus
راجع بردي .

٣٠٣٢ - بَتَّان - Neobalaena marginata (S).
Néobaleine marginée (F).

نوع من الببال ، مسرحه اواسط المحيط الهادي وبحر زيلنده
الجديدة . وهو من الحيتان الصغيرة القد التي يراوح طولها
من ٦ الى ٧ امتار . يعيش جماعات متوسطة العدد يراوح
مجموع افرادها من ٦ الى ١٥ .

٣٠٣٣ - بَتَّر - Amputation, Ablation (F).
هو قطع احد اعضاء الجسم لضرورة صحية . راجع
استئصال .

٣٠٣٤ - بَشْر ، بَشْرَاوَات ، عَدِيمَات الدَّسَب - Anoures (F). Anourous (F).

رتبة حيوانات من صف الضفدعيات . انواعها المعروفة
نحو ١٢٠٠ تنضم الى ١٥٠ جنساً تنتمي الى ١١ فصيلة
ولتين ومرتبتين ، مرتبة البكانيات ومرتبة اللسليات .

٣٠٣٥ - بَشْرَاء * - Petrea volubilis (S).
Pétrée grimpante (F).

جنية تزيينية معمرة من فصيلة رعي الحمام . ساقها غارشة
تطول نحو مئة امتار . افانداها مرغية . أوراقها متقابلة ،
معنقة ، اهليلجية النصل الجامد الوثل ، المدب الطرف ،
اللامع البشرة ، تطول نحو ١٠ سم . ازهارها عنقودي
التجميع ، يلر في الارتكاز ، يطول نحو ١٥ سم . ازهارها
صغيرة القد ، بنفسجية اللون . كؤوسها ركيبتها الى
الزرقه || تنويرها يستمر من تموز الى آب .



ببيانة



ببيانة



بتشولي



بتولا



بتوليه



بج



بجعة

٣٠٦٢ - بَشْرَة الخيار (F). Nuile des cucurbitacées (F).
هو ذئار القرعيات فطر مجهرى يصيب نباتات الفصيلة القرعية ، اطلب ذئار .

٣٠٦٣ - بَشْرَة خبيثة (F). Pustule maligne (F).
Pustula maligna, Malignant pustule (E).
تحصل عادة في مرض الجمرة .

٣٠٦٤ - بَشْق ، رَصَع (F). Asphyxie (F). Asphyxia (E).
هو بطة التنفس أو امتناعه وقد يصيب الاشجار المشرة فيميتها . اسبابه ثلاثة : نحر المياه للنبات مدة من الزمن . رطوبة التربة المستمرة . رص التراب على جذور الاغراس العميقة . النصب . راجع اختناق .

٣٠٦٥ - بُشِينَة (F). Jusquame de l'Atlas (F).
هي بنج المغرب ، نبات عشبي بري سام .

٣٠٦٦ - بَج * ، قَطَّ نَمِر (S). Felis serval (S).
Serval (F). Serval, Tiger-cat (E).
جنس سنور وحشي مرقط الثوب ، رفيع القوائم ، مستطيل الرأس ، كبير الاذن الذلقة ، قصير الذنب . يعرف بالقط النمر . طوله نحو ١٠٠ سم . وارتفاعه من ٥٠ الى ٦٠ ، موطنه القارة الافريقية من المتوسط الى القطب ومن الاطلسي الى الهادي || انواعه ثلاثة لا تختلف عن بعضها الا بحجم الجثة وسمة الثوب .

٣٠٦٧ - بَج (F). Arbousier (F). Strawberry tree (E).
اطلب قطلب .

٣٠٦٨ - بَج (F).
البج هو فرخ الطير وقيل فرخ الحمام .

٣٠٦٩ - بُجْرَة (F). Hernie ombilicale (F).
Umbilical hernia (E).
فتاق أو فتق السرة .

٣٠٧٠ - بَجَع * ، حَرْصَل ، قُوق ، سَقَاء ، جَمَل الماء ، كَي ، أْبُر شَلْبَة ، أْبُو جِرَاب ، أْبُو قَرْبَة (S). Pelecanus (S).
Pélican (F). Pelican, Pelecanus (E).
جنس طير مائية من شملات الكف وفصيلة البجيات . انواعه عديدة جميعها كبيرة القد ، مثدونة الساق ، قصيرة الذنب . تتميز بكون مناقبها الطويلة العريضة المفلطحة التي تحمل في مخاطمها السفلى حواصل عظيمة كالجراب تخزن فيها صيدها من السمك . وهي تعيش جماعات . اسراها تعد من ٤٠ الى ١٠٠ يكثر وجودها عند مصبات الانهر وفي البحيرات || اشهر انواعه الابيض والاشقح والوردي .

٣٠٧١ - بَجَع أْبَيْض (S). Pelecanus onocrotalus (S).
Pélican blanc (F).
نوع من البجع كبير الجثة طوله نحو ١٧٠ سم . وبسطه ٣٠٠ ، ثوبه ابيض اللون يشوبه بعض الغبار عند الاطراف اعطانه فسيحة الاربعاء تشمل مصبات الانهر الافريقية والاروبية والهندية .

٣٠٧٢ - بَجَع أَشْقَح (S). Pelecanus crispus (S).
Pélican frisé (F).
نوع من البجع وهو اكبرها جثة واعظمها قدراً ، طوله نحو ٢٠٠ سم . وبسطه ٣٣٠ ، ثوبه اشقح الريش

٣٠٥٠ - بَتُولَا زَغْبِيَّة (S). B. pubescens (S).
B. pubescent (F).

٣٠٥١ - بَتُولَا صَفْرَاء (F). B. lutea (S). B. jaune (F).

٣٠٥٢ - بَتُولَا غَرْبِيَّة (S). B. occidentalis (S).
B. d'Occident (F).

٣٠٥٣ - بَتُولَا منقعية ، قَنْب المنافع (F).
Betula tripartita (S). Chanvre aquatique, Cornuet (F). Bur-marigold, Water hemp (E). Sumpfzweizahn, Wasser hanf (D). Canapa aquatica, Eupatoria aquatica (I).

نبات بري من البتوليات يكثر في مناطق البلاد الباردة .
الياف سوقه قوية تستعمل في صناعة الخبال .

٣٠٥٤ - بَتُولِيَّات (F). Bétulacées, Bétulinées (F).
Betulaceae (E).
سبط من فصيلة السومليات يشمل البتولا والمغث وغيرها .

٣٠٥٥ - بَتُونِيَّة * ، بَطُونِيَّة (S). Petunia (S).
Pétunie (F). Garden petunia (E). Petunie, Balkonpetunien (D). Petunia (I).

جنس نباتات عشبية برية وزيينية من الفصيلة الباذنجانية
انواعها المعروفة ١٢ جميعها امريكية المنبت . اوراقها كاملة متقابلة . ازهارها فردية التجميع ، طرفية الارتكاز ، كبيرة القد ، منفشرة البتلات جميلة الالوان الزاهية .

٣٠٥٦ - بَتِيَّة (F). Boucaut (F). Barrel (E).
برميل كبير من الخشب تحفظ فيه المواد الجافة كالتبغ وغيره . . .

٣٠٥٧ - بَتِيد بَحْرِي (S). Batis maritima (S).
Batide maritime (F).

جنية برية معمرة وحيدة الجنس والنوع من فصيلة البتيديات . ساقها مخشوشة . اوراقها ثنائية التركيب . شرقية التجميع ، سنانية النصال الصغيرة . ازهارها ثنائية المسكن ، ابطية الارتكاز || يستخرج من جذورها وسوقها وفروعها الكثير من الصودا .

٣٠٥٨ - بَتِيدِيَّات (S). Batidaceae (S).
Batidacées (F). Batidaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديمات القملات اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . موطنها بعض اصقاع امريكا الاستوائية وجزر المحيط الهادي . جميعها جنات صغيرة معمرة منبها الشطوط البحرية والمناطق المالحة . جذورها وسوقها وافنادها تحوي الكثير من المواد القلوية || اشهر اجناسها البتيد .

٣٠٥٩ - بُشِيرَة (F). Anesse (F). She-ass (E).
البشيرة هي الاتان .

٣٠٦٠ - بَتِيل ، بَتِيلَة (F). Rejet de dattier (F).
Shout of date tree (E).
راجع بتول .

٣٠٦١ - بَثْرَة ، بِيْش (F). Trou, Cavité en terre (F).
Gap, Cavity (E).
البثرة هي الحفرة المصطنعة لاقبال الفرس . والبيش كذلك حفرة توضع بها الفرس .

Etude physiologique (F). البحث الفيزيولوجي
Physiological study (E).
هو البحث الذي يختص أولاً بدراسة العلة كما تبدو عياناً مع تأثيراتها في النسيج النباتية . ثانياً بدراسة المؤثرات المختلفة التي تزيد أو توقف قوة المرض .

Etude mycologique (F). البحث الميكولوجي
Mycological study (E).
هو البحث الخاص بدراسة النباتات الفطرية وما سببته من اوصام . يشمل معرفة جميع خصائص الفطر كتاريخ حياته وتناسله وانتشاره والاحوال الملائمة لنموه وفتايج اضراره .

٣٠٨٣ - بَحْثَر
بحر اللبن : انقطع وتجبب فهو مبحثر . وقد يكون سببه علة طارئة على الضرر اخصها المميت .

٣٠٨٤ - بَحْذَف
البحذف هو زرع قطلونا ، اطلب بزر قطلونا .

٣٠٨٥ - بَحْر
Défoncer (F). To trench (E).
بحر الارض : شقها .

٣٠٨٦ - بَحْر
Mer (F). Sea (E).
قسم فسيح شاسع من الكرة الارضية تغمره المياه المالحة التي تعيش فيها الاسماك والحيوانات والنباتات البحرية المختلفة || مساحتها تبلغ نحو ١٠٠ ملايين كيلومتر مربع اقصى عمقه المعروف يبلغ ١٠٧٩٠ م . وذلك قرب جزيرة مينداناو || ماؤه يحوى عدة املاح اخصها :

كلوريد الصوديوم البالغة نسبته	٧٨,٣٢ %
كلوريد المغنيزيوم	٩,٤٤ %
سلفات المنيزا	٦,٤٠ %
سلفات الكلس	٣,٩٤ %
كلوريدوم البوتاسيوم	١,٦٩ %
املاح مختلفة	٠,٢١ %
	١٠٠,٠٠

٣٠٨٧ - بَحْرَام
Pélagoscope (F). Pelagoscope (E).
البحرام جهاز يستعمل في رصد لمج البحار واغوارها .

٣٠٨٨ - بَحْرَمَة
Pélagoscopie (F).
Pelagoscopia (E).
البحرمة علم يبحث في حياة الكائنات العضائية في الم خارجي أي في اعماق عرض البحر .

٣٠٨٩ - بَحْرَج
البحرج : ولد البقرة الوحشية . الانثى بحرجة (اللسان) .

٣٠٩٠ - بَحْشَلَة
Danse moderne (F).
Moderne dance (E).

البحشلة الرقص المصري اللوج الملهاج وموسيقاه الصاخبة || قيل فيها مضى الموسيقى تدمت الاخلاق . فما عسانا نقول في موسيقى البشلة التي عم انتشارها جميع اقطار المسكونة ؟

٣٠٩١ - بُخَانِي
Propus (F). Propus (E).
البخاني نجم نير من كوكبة برج الثورين مركزه امام قدم الثور المتقدم .

الاجعد الابيض الموج . اقليمه شاسع الاطراف يمتد من جنوبي اوروبا الى اطراف الصين واليابان .

٣٠٧٣ - بَجَع وَرْدِي
Pelecanus roseus (S).
Pélican rose (F).
نوع من البجع وهو اصفر جثة من الابيض ، ثوبه وردي اللون ، ارجواني الموج . اعطانه تمتد من اوروبا الشرقية الى الصين وماليزية .

٣٠٧٤ - بَجَعِيَّات
Pelecanidae (S). Pélicanidés (F).
Pelecanidae (E).
فصيلة البجع من شاملات الكف ورتبة كفيات القدم . اجناسها وانواعها عديدة جميعها طيور مائية قوتها الاسماك .

٣٠٧٥ - بَجَل ، دُورِين ، حَلَق
Dourine, Mal du coït (F). Trypanosoma (E).
البجل او الحلق مرض يصيب الخيل والحمار سببه دودة ثعبانية من النقيبيات تعيش في الدم ، قوتها الكرويات الحمر .

٣٠٧٦ - بَجَلَة
Arbuste (F). Bush, Shrub (E).
البجلة هي الشجرة الصغيرة .

٣٠٧٧ - بَجْمَة
Tamarisque (F). Tamarisk (E).
البجمة ثمرة الاثل . ج . بجم .

٣٠٧٨ - بَجْن *
Cyprinodon (F). Cyprinodont (E).
جنس اسماك صغيرة من فصيلة البجنيات تعيش في الماء المسوس ، انواعها نحو ١٠٠ جميعها من الاسماك الولودة . زعانفها الظهرية متأخرة الى الوراء اما البطنية فلا اثر لها . يوجد منها في جميع بلاد حوض البحر المتوسط وفي كاليفورنيا والتكساس . اشهر انواعها البطريخ والبطحيش .

٣٠٧٩ - بَجْنِيَّات
Cyprinodontidae (S).
Cyprinodontidés (F). Cyprinidae (E).
فصيلة اسماك صغيرة القد من مفتوحات المثانة تعيش في الماء المسوس والعذب على حد سواء . اجناسها وانواعها عديدة بعضها ولود وغيرها عديم الزعانف البطنية .

٣٠٨٠ - بَجِيع
Conringia (S).
Conringie (F). Perfoliate cabbage (E). Weisser schöterich (D). Conringia (I).
جنس نباتات عشبية معمرة برية وتربينية من فصيلة الصليبيات . مهدها الشرق الاوسط واربطة الجنوبية . انواعه قليلة جميعها لجمية فرعاء ، اوراقها لسنة مستطيلة بحرية الخضار . ازهارها عشكولية التجميع ، ابطية الارتكاز او تاجية .

٣٠٨١ - بَحْرَان
Semen-contraria
نبات طبي يدعى شيخ اليهودية ، اطلبه .

٣٠٨٢ - بَحْث
Etude (F). Study (E).
هو الدرس الخاص ببعض العلوم ومتفرعاتها واحوالها مثل :

البحث الشوذي
Etude morphologique (F).
Morphological study (E).
هو البحث الذي يدرس النتائج الجسمورية التي حصلت في العائل من جراء وجود الفطر ثم معرفة وتقدير مدى الملاقة القائمة بين العائل والطفيل مع تحديد مكان الاصابة .



بجن



بَخَامَة عَاجِيَة



بَخْرَة



بَخُور الْاَكْرَاد



بَخُور الْبَرِّير

مهلها البلاد الحارة الآسيوية والأفريقية . أنواعها المعروفة نحو ٨٠ معظمها بري وبعضها تزييني . كان ولا يزال كهان الهند يحرقون أخشاب بعض أنواعها عند إبتعالهم في معابدهم || اعرفها واشهرها ما يلي .

٣٠٩٩ - بَخْتِيَة عَطِرَة Cl. fragrans (S).

Cl. odorant (F).

٣١٠٠ - بَخْتِيَة مِشْخَارَة Cl. serotinum (S).

Cl. tardif (F).

٣١٠١ - بَخْتِيَة نَسْنَة Cl. foetidum (S). Cl. fétide (F).

٣١٠٢ - بَخْرَة * ، بَخْرَاء ، كُشْتِي وَرْدِيَة

Orobis roseus (S). Orobe rose (F).

نوع من الكشي وهو نبات عشبي بري معمر من فصيلة القرنيات . سوقه منتصبه يراوح ارتفاعها من ٤٠ الى ٦٠ سم . أزهاره وردية اللون مغرية يجرسها النحل .

٣١٠٣ - بَخْس Cl. Culture non irriguée (F).

راجع بعل . البخس : كل أرض تثبت بغير سقي . والبخس من الزرع ما لم يسق بمساء قلدر إنما سقاها ماء السماء . ج بخوس .

٣١٠٤ - بَخْص

البخص هو الضرع الذي لا يخرج لبنه إلا بشدة .

٣١٠٥ - بَخْم Acaule (F).

Acaulous, Stemless (E).

البخم ما لا ساق له من النبات ويدعى النجم .

٣١٠٦ - بَخْنُق Epicrâne (F). Epicranium (E).

هو درع الرأس يتألف عند معظم الحشرات من الجبهة والنافوخ والقفن والحاسر والافواد .

٣١٠٧ - بَخُو

البخو : الرخو الردي . ثمرة بخوة : رخوة رديئة خاوية .

٣١٠٨ - بَخُور الْاَكْرَاد * ، شَجَر الْخَنَازِير ، بَرَبَاطُودَة

Peucedanum officinale, Salinum officinal (S). Peucedane, Fenouil de porc (F). Hog's fennel, Sulphur weed (E). Echter haarstrang (D). Peucedano, Finocchio porcino (I).

نبات بري طبي من فصيلة الخيميات . جذوره حادة للبول ومقوية للمعدة . قال عنه الانطاكي في التذكرة : « ينفع الربو والسعال وأوجاع الصدر والصمم واليرقان . ويفتت الحصى ويسقط الاجنة ويدبر البول ويصلحه اللينوفر . وشرته نصف مثقال » .

٣١٠٩ - بَخُور الْبَرِّير * ، بَخُور السُّودَان ، سَرْخَنْد

د يَنْدَهَك Telephium imperati (S).

Téléphe, Téléfe (F). Orpine, Tree Orpine (E). Südliches zumpenkraut (D). Telefia (I).

نبات عشبي بري من فصيلة الرجليات . اقليمه حوض البحر المتوسط . وهو نبات مداد . أوراقه كاملة ، لحمية ، صغيرة ، معنقة ، متعاقبة ، بحرية اللون . أزهاره عشكولية التجميع ، قاجية الارتكاز || يوجد في أكثر الاراضي البور ، ترعاه الماشية . قال عنه الانطاكي في التذكرة : « يسكن المغص والرياح ويفتح الشهية . يصلحه الصمغ وشرته الى درهم » .

٣١١٠ - بَخُور مَرِّيم Cyclamen (F).

Cyclamen, Sow-bread (E).

٣٠٩٢ - بَخَاخ Serpent cracheur (F).

البخاخ حية سرلودة سامة مشهورة باسم عطر نفاس . اطلبه .

٣٠٩٣ - بَخَار Vapeur (F). Vapour (E).

جسم غازي يتصاعد من الاشياء الرطبة بتأثير الحرارة عليها .

٣٠٩٤ - بَخَارِيد ، بَخَارِيس ، كَحْرِيَة

Baccharis (S). Baccharide, Bacchante (F). Ploughman's spikenard (E). Kreuzstrauch (D). Baccaride (I).

جنس نباتات برية وتزيينية من سبط الاسطريات وفصيلة المركبات . انواعه زهاء ٣٠٠ معظمها جنات وفيها بعض الاعشاب . انواعه الزراعية التزيينية قليلة لكنها جميلة الزهر الطريف .

٣٠٩٥ - بَخَاق Loup (mâle) (F). Wolf (male) (E).

البخاق هو الذئب الذكر (الديرى) .

٣٠٩٦ - بَخَامَة عَاجِيَة *

Blastodacna albida (S). Mineuse des lambourdes du pommier (F). Blastodacna albida (E).

حشرة من القوبيات حشرقيات الاجنحة . موطنها بعض مناطق الشرق الادنى . تألف جنائن التفاح . سرقها لائمة قاضية تثقب الخوط وتعيش على محتويات البرعمة الزهرية كامل الطور البرقي والاكتالي || جسمها صغير قصيف يعطون من ٤ الى ٥ مم . بسطها تراوح من ١٢ الى ١٤ مم . رأسها معتدل الجرم والبروز ، أشهب اللون . عيناها صغيرتان بارزتان . زباناها خيطيان مستطيلان . ملاسها الشفوية والفكية صغيرة . جوشنها حنطي اللون . بطنها تبني || روشناها الاماميان الى البياض العاجي . اهدابها الى الشبهة . روشناها الخلفيان الى التبني الاشقر الموج ، اهدابها مستطيلة تبني اللون || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في اواخر ايار . تعيش نحو ثلاثة اسابيع . تسرح من الغروب الى فحة الليل || تماثل بعد ظهورها بثلاثة ايام وتباشر متح المكن بعد الكوم بيوم واحد وتستمر عليه نحو عشرة ايام وتلقيه ميعاديا ، تغلفه مادة غروية لاصقة ، على خطوط التفاح في اباطها || ينقف المكن بعد متحه بنحو سبعة ايام عن اساريع نحيلة تثقب لحاء الخوط وتخلدها باتجاه الخشب وتقيم في داخلها قوتها الخلايا النباتية || السرفة عند بلوغها الادراك التام تقطون نحو ١٠ مم . جسمها شبه اسطواني الشكل ، واضح التقسيم السكمي ، مستدق الطرف ، حنطي اللون ، اسمر الملاقى . رأسها ودوقتها الصدرية وشرجها الى السمرة القاتمة . مدتها ورواجها الى الحنطي || طور الاكمال يستمر نحو ثلاثة اسابيع وينقضي طليقا في نفق السرفة عند مدخله .

٣٠٩٧ - بَخْت ، بَخْتِي

Boghdi, Chameau de Khorassan (F). Boghdi, Camel of Khorassan (E).

سلالة من الابل الخراسانية من ذوات السنامين تحذرت من تهجين الجبل العربي مع الفالج فأتت دهانج قليلة الغلاظة معتدلة القد والقوام .

٣٠٩٨ - بَخْتِيَة ، شَجَرَة الْبَحْت ، رَاهِيِيَة ،

شَجَرَة الرَهْبَان Clérondendron (S).

Clérondendron, Clérondendron (F). Glory-bower, Glory-tree (E). Losbaum (D). Clérondendron (I).

جنس اشجار وجنبات برية وتزيينية من فصيلة رعي الحمام

على الاشجار || اجسامها متوسطة القد تطول من ٢٢ الى ٣٠ سم. رؤوسها مستعرضة ، مفلطحة . عيونها كبيرة . سبالها مستطيلة سوداء اللون . مناقبها مخروطية الشكل ، واسعة الاشدق الرحيبة . اعناقها قصيرة . اجنحتها مستطيلة ذلقة . اذناها مستديرة الاطراف . اثوابها الى الشقحة والصهبة تعاوها رقشة طحلاء وتجذيع اسود يمتد حتى اطراف الاجنحة || قوتها الجراد والحشرات المختلفة الفصائل والانواع || تدثن في الاشجار الرفيعة . اناثها تبيض من ٤ الى ٦ بيضات اهليلجية الشكل . الحضان يستمر نحو ١٧ يوماً تقوم به الانثى في النهار والذكر في الليل .

٣١٢٤ - بَدْرُ غُوسِيَّات ^o Podargidae (S).
Podargidés (F). Podargidae (E).

فصيلة طير من الجواثم مشقوقات المناقير . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد موطنها بعض مناطق القارة الاسيوية واستراليا || طيورها متوسطة القد ، مستعرضة الرؤوس ، كبيرة العيون ، كثيفة السبال . مسرحها دجوي يستمر من الغروب الى الفجر . قوتها الحشرات وبعض الثمار والبذور || اعرف اجناسها واشهرها البدرغوس والفوئل .

٣١٢٥ - بَدَسْتُمِيَّات ^o Podostemaceae (S).
Podostémacées, Podostémonées (F).
Podostemaceae (E).

فصيلة نباتات مائية من ثنائيات الفلقة عديمات القملات مرتفعات المبيض . اجناسها وانواعها المعروفة نحو ١٢٠ جميعها عشبية مائية يكثر وجودها في انهر امريكا الجنوبية وجزيرة مدغسكر || تلتصق بالصخور المغورة فتنبش وتنوء . اوراقها متعاقبة ، معنقة ، مفترضة النصال . ازهارها خشوية او وحيدة الشق ، ضمنية التجميع او فردية .

٣١٢٦ - بَدَسْكَان ^o Parkinsonia (S).
Parkinsonie (F). Parkinsonia (E).
جنس جنينات وشجيرات برية من فصيلة القرنيات . ازهارها مغثية صفراء اللون فواحة العرف المستحب . انواعها المعروفة ثلاثة منها نوع مبذول في الاحراج اللبنانية يدعى البدسكان الشائك .

٣١٢٧ - بَدَسْكَان الشرق ^o Spartier genêt (F).
Rush broom (E).
اطلب وزال الشرق .

٣١٢٨ - بَدَسْكَان شائك ^o Parkinsonia aculeata (S).
Parkinsonier, Genêt épineux (F). Prickley broom, Jerusalem thorn (E). Stachlichter ginsterbaum (D).
Ginestra spinosa, Spina di Gerusalemme (I).
نوع من البدسكان وهو بحلة شائكة تستعمل للسياج ويستخرج من اليافها نوع من الورق الجيد الصنف . ازهارها بحيلة الشكل صفراء اللون فواحة العرف يجرسها النحل ويحني وليعها .

٣١٢٩ - بَدْعَة ^o Anguis fragilis (S).
Orvet, Serpent de verre (F). Slow-worm (E).
زحافة من العظائيات وحيدة الجنس والنوع تنتمي الى فصيلة الحنجوفيات . جسمها اسطواني الشكل ، عادم القوائم ، سريع الانفصام والمطب . ثوبها الى الطحلة الغبرا الفضفية الموج . وهي تشبه الحية لكنها غير سامة وتقيد الزراعة . تعيش بين الحجارة وتحتها ، تصرح في الليل . قوتها الحشرات .

٣١١١ - بَحُورِيَّات ^o Burseraceae (S).
Burséracées (F). Burseraceae (E).

هي الفصيلة البخورية ومنهم من قال انها سبط من الفصيلة البطمية . انواعها قليلة جميعها اشجار وجنابات . مهدا الاصقاع الاستوائية الامريكية || اشهر انواعها البخورية ، اطلها .

٣١١٢ - بَحُورِيَّة ^o Bursère (F). Burser (E).
شجرة حرجية بحيلة القلب من البخوريات . منبتها امريكة الاستوائية . يستخرج منها بالحز عصارة صمغية رائحة سريعة الجفاف بخورية الرائحة عند الاحتراق .

٣١١٣ - بَحْخِيرَة ^o Pachira (S).
Pachire, Pachirier (F). Pachira (E).

جنس اشجار برية وزراعية من فصيلة الحبازيات . انواعها المعروفة اربعة منبتها المناطق الاستوائية الامريكية . اشهر انواعها بخيرة الفويمان (Pachira aquatica) التي تزرع لثمارها المأكولة || شجرتها كبيرة القد دائمة . اوراقها متعاقبة ، معنقة . نصالها اهليلجية ، كبيرة . ازهارها طاقية التجميع ، بحيلة . ثمارها جراء كبيرة الحجم تحوي بعض المعجات المأكولة الشبيهة بالكستنة .

٣١١٤ - بَدَاة ^o Truffe (F). Truffle (E).
البداة هي الكماة .

٣١١٥ - بَدَاد ، بُدَّة ^o Quantum (F).
Quantum (E).
البداد والبدة النصب من الشيء . ج بُدُد وبيدَد .

٣١١٦ - بَدَح ، * فيكوس ^o Ficus
جنس اشجار برية وتربينية من فصيلة الانجريات . انواعها عديدة جميعها فناء دائمة . اوراقه جلدية وافقة وشديدة الخضار . يستعمل للظل والزينة ولصد الرياح ، يفرس في شوارع المدن وعلى جوانب الطرقات والممرات . اشهر انواعه مايلى .

٣١١٧ - بَدَح الدبَّاغين ^o Ficus infectoria

٣١١٨ - بَدَح عامير ^o Ficus nitida

٣١١٩ - بَدَح عصيف ^o Ficus glumosa

٣١٢٠ - بُدْذُول ^o Podzol (F). Podzol (E).
البذول تراب مغسول ملوئ بالرماد ناتج عن انحطت بعض الصخور . يكثر وجوده في بعض مناطق اربعة الشمالية .

٣١٢١ - بَدَر ^o Mûrir (F). To ripen, To mature (E).
يقال بدر الثمر متى اكتمل نموه وبلغ حجمه وهذا يكون قبل الادراك .

٣١٢٢ - بَدَرَانِج ^o Coix-larmes (F). Coix-millet (E).
راجع امديان .

٣١٢٣ - بَدْرُ غُوس ^o Podargus (S).
Podargue (F). Podargus (E).

جنس طير من فصيلة البدرغوسيات . انواعها المعروفة عديدة موطنها يمتد من آسية الجنوبية الى استراليا وتسمانية . تألف الاحراج المبعثرة الاشجار . تصرح في الليل وتبيت في النهار



بخيرة



بلح



بدرغوس



بدسكان شائك



بدغة



بَدْفِيل



بَدْن

٣١٣٨ - بَدُو Erodium hérissé (F).

هو الجراب العناني ، اطلبه .

٣١٣٩ - بَدْوَة Versant d'une vallée (F).

البدوة هي جانب الوادي وهما البدوتان .

٣١٤٠ - بَدْوَرَة Podura (S).

Podure (F). Podura (E).

جنس حشرات قافزة قارضة من فصيلة البدوريات ورتبة الكهديات . انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، شبه اسطوانية الشكل ، تطول من ١ الى ٤ سم . اثنائها قاتمة ، سوية اللون ، يكثر فيها الاسود البنفسجي المواج . رؤوسها ضخمة . قرونها الاستشعارية قصيرة رباعية الفصل .

بطونها سداسية السكم المحدبة . جهازها القفزي نشيط

مستطيل || اشهر انواعها البدورة المائية (Podura aquatica) المبدولة في اكثر الاقاليم المعتدلة الحرارة والتي يكثر وجودها على سطح المياه الآسنة وفي المواقع الرطبة .

٣١٤١ - بَدُورِيَّات Poduridae (S).

Poduridés (F). Poduridae (E).

فصيلة حشرات قافزة قارضة من رتبة الكهديات . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها صغيرة شبه اسطوانية الشكل . رؤوسها ضخمة . منحرفة الى الاسفل . آفاكها وتأثيرها لاطئة . زناها عديدة . قرونها الاستشعارية قصيرة رباعية الفصل . صدورها ثلاثية الحلقات . بطونها سداسية السكم . مجهزة بجهاز قفزي نشيط وبحويصلات تفرز مادة لزجة تساعد الحشرة على تسلق السطوح الناعمة . قوائمها قصيرة تنتهي بظفر احجن حاد || اشهر اجناسها البدوره .

٣١٤٢ - بَدُوك Padouk (F). Padouk (E).

البدوك نوع من الخشب الاجنبي المرغوب فيه . مصدره الرئيسي بلاد الغابون . يستعمل في الصناعات الساسية وفي الموبيلية . وزنه النسبي يعادل الماء .

٣١٤٣ - بَدِيَّان Illicium (S). Badianier, Badiane (F).

جنس اشجار وجنبات برية وزراعية من فصيلة المغنوليات . انواعه ثمانية منتبها الصين واليابان والهند والمناطق الجنوبية من الولايات المتحدة . ثمارها حقية والحق يحوى من ٦ الى ١٢ لوزة بيضية الشكل لامعة . البشرة الملساء . واللوزة عطرية العرف دهنية اللباب الابيض || اشهر انواعه الزراعية البديان النجمي المعروف بالانيسون النجمي .

٣١٤٤ - بَدِيَّان نجمي Badiane, Anis étoilé (F).

Star anise tree (E). راجع الانيسون نجمي .

٣١٤٥ - بَدِيَّيَّات Protophytes (F).

هي النباتات الاولييات من ذوات الخلية الواحدة كالضريع والفوقس والفطور . والبديثيات في المملكة النباتية يقابلها الاولى في المملكة الحيوانية .

٣١٤٦ - بَدَار Semences (F). Seeds (E).

هو الحب الممد للزرع .

٣١٤٧ - بَدَارَة Semeuse (F). Sower (E).

آلة تستعمل لنثر البذار .

٣١٣٠ - بَدْفِيل * ، بَدْفِيلْم Podophyllum (S). Podophylle (F).

Podophyllum (E).

جنس نباتات جذمورية معمرة من فصيلة البربريسيات . انواعه المعروفة اثنان . جذاميرها افقية الانتشاب . سوقها فردية تعلو نحو ١٥ سم . ثم تتشعب الى زنادين وكل زناد ينتهي بورقة . الورقة كبيرة القد ، كفية الشكل خماسية التفتيص او سباعيته ، مفترضة الحافة . ازهارها فردية كبيرة القد تنشب في زاوية الانتشاب . ثمارها عنبية صفراء اللون ، حجمها حجم ليمونة الحامض ، لباب سودقها مأكول مستحب الطعم . بزورها كثيرة العدد كلوية الشكل .

٣١٣١ - بَدْفِيل إِمُودِي Podophyllum Emodi (S). Podophylle Emodi (F).

نوع من البدليل . مهدد سفوح جبال حملايا . ساقه مع زناد الورقة تعلو نحو ٢٥ سم . عرض ورقته لا يقل عن ١٢ سم . فصلها بالغ التفتيص والتفريص لونه الى الخضار العابق . ثمرته صفراء اللون مأكولة اللباب || جذاميره واوراقه جحالية المادة الشديدة الوقع .

٣١٣٢ - بَدْفِيل دَرَقِيّ Podophyllum peltatum (S). Podophylle pelté (F).

نوع من البدليل . مهدد كندا والمناطق الشمالية من الولايات المتحدة الامريكية . ينبت في المواقع الرطبة الظليلة التي يسود فيها عنصر الرمل . ثماره صفراء اللون مأكولة يطلق عليها اسم تفاح ايار (Pomme de Mai) || جذاميره طبية يستخرج منها مادة راتنجية تدعى بودوفيلين (Podophylline) تستعمل كسهل لطيف .

٣١٣٣ - بَدَلَاوِيَّة ، بَدْلِيرِيَّة Podalyria (S).

Podalyre (F).

جنس انجم وجنبات معمرة من فصيلة القرنيات الفراشية . انواعها عديدة معظمها بري وبعضها تزييني . اشيعها واجملها الانواع البقية والحريرية والفضية الورق .

٣١٣٤ - بَدَلَاوِيَّات Podalyriées (F).

Podalyreae (E).

سبط من فصيلة القرنيات الفراشية اجناسه نحو ٢٠ اما انواعه فكثيرة العدد جميعها جنبية ونجمية . اوراقها صغيرة القد متقابلة او متعاقبة . ازهارها عنقودية التجميع ، محورية او تاجية الارتكاز . الوانها عديدة فيها الابيض والاصفر والوردي والارجواني والياقوتي .

٣١٣٥ - بَدْلِيَّة Buddlée (F). Orange ball tree (E).

راجع أطر وعثر .

٣١٣٦ - بَدَن * ، وَعَل عَرَبِي ، وَعَل الثُوبَة Capra arabica, C. nubiana (S). Bouquetin de l'Arabe (F). Arabian ibex (E).

نوع من الوعل موطنه الثوبة وجبال الجزيرة . ثوبه الى الصهبة القاتمة . طوله نحو ١٥٠ سم . علوه ١٠٠ ، اما وزنه فيراوح من ٧٥ الى ١٠٠ كيلو . له قرنان ضليعان غليظان منعطفان ، يألف الخضاب والجبال الوعرة .

٣١٣٧ - بَدَنِي ، جِسْمَانِي Somatique (F).

Somatic (E).

كل ما يختص بالجسم .

٣١٦٣ - بُرَارَة * Briarcea (S). Briarée (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل خلفيات الخياشيم وفصيلة اليسويديات. انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض مناطق المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط. جميعها يمتية لا تقرب الشطوط. اسرارها وافرة العدد اجسامها عريضة ، شفافة ، مستطيلة ، غراء اللون باستثناء العيون واللوامس. عيونها صغيرة دهبية الشكل سوداء اللون. رؤوسها صغيرة ، مستعرضة ، رباعية اللوامس الجذوية. اذناها دقيقة ، خيطية. خياشيمها اثنا عشر متقابلة مفلوكة الاطراف.

٣١٦٤ - بُرَاز Excrément (F). Excrement (E).

هو ما نتج عن الهضم وما برزه الجسم الحي من استه ، كالفائط والروث والخي والبر والسلح .

٣١٦٥ - بُرَازُون Borason (F). Borason (E).

مادة تركيبية صلبة تم تحقيقها عام ١٩٥٨ تعتبر اول مادة صناعية تفوق صلابتها صلابه الماس .

٣١٦٦ - بُرَازِي Stercoral

نمت تعريفي يطلق على كل ما له علاقة بالبراز وعلى الحشرات التي تعيش فيه .

٣١٦٧ - بُرَازِيَّات Sterculiaceae (S).

Sterculiacées (F). Sterculiaceae (E). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين قريبة الشبه من الجبازيات تشمل بعض الاشجار والجنبات والنعترشات والاعشاب . جميع انواعها من نباتات البلاد الحارة بعضها كبريه الرائحة كالبراز (Stercus) ولذا سميت بالبرازية .

٣١٦٨ - بُرَازِيَّة * شجرة البراز ، طَرَطُور

Sterculia (S). Sterculier (F). Stinking bean trefoll (E). Stinkbaum (D). Sterculia (I).

شجرة برية وتريينية من فصيلة البرازيات ساقها منتصبه . اغصانها ميمعة . اوراقها معنقة ، منعاقبة ، اذنية النصل الكامل ، صفحته مزغبة زغبها نجمي الشكل . ازهارها فردية وحيدة المسكن عديمه الفعالات . اعطائها البلاد الحارة .

٣١٦٩ - بُرَازِيلِيَّة * Bertholletia excelsa (S).

Brésil, Brésiliet (F).

شجرة حرجية من فصيلة القرليات العندميات . مهدا بعض المناطق الحارة من العالمين القديم والجديد . اوراقها مركبة شمفية التجميع . ازهارها تاجي عنقودي . ازهارها خماسية البتلات مختلفة الالوان . ثمارها بطيخية الشكل ، متوسطة القد ، يستخرج منها نحو ٦٥ ٪ من الزيت الصانع للاستعمال المنزلي في اول عهده الى ان يصبح حريفاً فيستعمل في صناعة الصابون . اخشابها فاخرة الصنف ، ناعمة الرقعة . جذوية اللون ، شديدة الصلابة || يقول المؤرخون ان البرتغاليين عندما اطلقوا اسم برازيل عام ١٥٠٩ على البلاد الامريكية المعروفة الآن بهذا الاسم كان الداعي لذلك كثرة احراج شجر البرازيلية في تلك البلاد .

٣١٧٠ - بُرَاسَة Xyloculture (F).

Xyloculture (E). البراسة زراعة القطن .

٣١٤٨ - بَلَدَج Agneau (F). Lamb (E).

البذج هو الحمل ج بذجان . والبذج من اولاد الضأن بمنزلة العنود من اولاد المعز (اللسان) .

٣١٤٩ - بَلَدَح

شق . والبذج هو شق لسان الفصيل لثلا يرتضع (اللسان) .

٣١٥٠ - بَلْدُر Ensemencement, Semallie, Semis (F).

Sowing, Seeds, Seed-bed (E). هو القاء الحب او نثر البذار على التربة وقد يتم إما باليد او بواسطة المبادر .

٣١٥١ - بَلْدُرِي ، زَرْعِي ، بَزْرِي Séminal (F).

Seminal (E). كل ما كان له صلة بالبذار .

٣١٥٢ - بَلْدَع Filtre (F). Filter (E).

بلدع الاناء : قطر الماء . والبذل ما قطره من الماء .

٣١٥٣ - بُلْدَلَان Pouzzolane

ارض بركانية ضاربة الى الحمرة .

٣١٥٤ - بُر Blé, Froment (F). Wheat (E).

راجع حنطة .

٣١٥٥ - بُرَاق Hutte de chasseur (F). Hut (E).

البراة هي ناموس الصياد ، ج براء .

٣١٥٦ - بُرَاقَة الاختراع Brevet d'invention (F).

Patent (E). هي شهادة تمنحها الحكومة الى من يقرر انه احدث ابتكاراً في عالم الصناعة على ان يتبع الطرق القانونية في تسجيله . ويكون حق المنفعة من الابتكار مقصوراً عليه وحده الى امد معين .

٣١٥٧ - بُرَاقَة الاضافة Brevet d'addition (F).

تعطى لدى التوسع في اختراع اعطيت عنه براءة سابقة . واما مدتها فدة البراة السابقة التي تستند اليها .

٣١٥٨ - بُرَاقَة الاستكمال Brevet de perfectionnement (F).

هي براءة تقرر اكتمال اختراع صدرت عنه براءة سابقة .

٣١٥٩ - بُرَابَان Brabant (charrue) (F).

Belgian plough, Brabant (E).

نوع من المحاريث الفرنجية التي تقلب التراب . وقد يكون عادي او مزدوج .

٣١٦٠ - بُرَاح Garigue, Garrigue, Lande (F).

Waste land, Moor (E). برابان عادي .

٣١٦١ - بُرَآد Frigidaire, Frigorifique (F).


Refrigerator, Frigorific (E).

بناء مستوفي شروط السبرد والرطوبة والتهوية خصص لاستيعاب كميات كبيرة من الانتاج الزراعي والحيواني وذلك لحفظها من العطب مدة من الزمن .

٣١٦٢ - بُرَآدَة Malaptérure du Nil (F).

Electric catfish (E).

راجع فرة النيل .



بُرَاقَة



بُرَازِيَّة



بُرَازِيلِيَّة



براغة



براكيوسور



براكيوم



براغة

بازهارها المندونة العلم وهو مسا يشير اليه اسمها العلمي اليوناني الاصل .

٣١٨٠ - براكيوم * ، كشاء
Brachycome (S).
Brachycome (F). Swan river daisy (E). Kurzschopf (D). Brachycome (I).
نبات عشبي حولي او معمر من فصيلة المركبات، يزرع للزينة ولزهوره الجميلة الشكل واللون .

٣١٨١ - براكيكيتش
Brachychiton (S).
Brachychiton, Sterculier à feuilles d'érable (F). Flame tree (E). Flammenbaum (D). Sterculia (I).
شجرة برية وزينية من فصيلة البرازيات . مهدا امريكة واليابان . تزورع في الحدائق وعلى الطرقات . يوجد منها في لبنان . ساقها منتصبة ليفية . اغصانها متباعدة الارتكاز قصيرة الامتداد . اوراقها منعقة ، كفية ، عابله .

٣١٨٢ - براكيوسور
Brachiosaure (F).
حيوان منقرض من جبابرة عظام الاباج اثاني . كان طوله المقدر نحو ٢٤ متراً وارتفاعه نحو ١٤ متراً .

٣١٨٣ - برام
Tarsonemide
جنس حشرات نافعة من فصيلة البراميات . انواعه نحو ١٢ جميعها صغيرة القد تنطفل على ديدان حشرقيات الاجنحة .

٣١٨٤ - برامة *
Turritella (S). Turritelle (F).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة البراميات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم || اصداقها مخروطية الشكل المستطيل ، مدبسة الاعقاب تطول من ٦ الى ١٠ سم . حلزونها منسوبة اللولية ، تعد نحو ٢١ دورة . فروجها القاعدية جانبية ، شبه مستديرة || اجسامها مستطيلة . رؤوسها ثنائية الانواس الطويلة المعبونة ، قصيرة الاخطام الغليظة . اسفطها قرنية المادة .

٣١٨٥ - براميات
Turritellidae (S).
Turritellidés (F). Turritellidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل اماميات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعاصرة عديدة منتشرة في جميع بحار العالم || اصداقها برجية ، مثقوبة ، مدببة الاعقاب ، بليغة التخديد الحلزوني ، بيضية الفوهة المحددة من الداخل || اشهر اجناسها البرامة والدولم .

٣١٨٦ - براميات
Tarsonemidae (S).
Tarsonemidés (F). Tarsonemidae (E).
فصيلة حشرات وانحة من القراديات . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة جميعها صغيرة القد . طول ذكورها لا يفوق نصف ملليمتر واناثها من ٢ الى ٣ ملليمترات . اثوابها الى الصفرة . وهي سريعة التكاثر تنطفل على مختلف ديدان حشرقيات الاجنحة .

٣١٨٧ - برايميس
Brème (F). Bream (E).
راجع ابراميس .

٣١٨٨ - براونيه ، بروفنيه
Brownea (S). Brownée (F).
جنس نباتات برية وزراعية تزيينية من فصيلة القرنيات الفراشية . منبتها امريكة الاستوائية . انواعه عديدة معظمها بري وبعضها زراعي تزييني جميل الازهار المختلفة الالوان .

٣١٧١ - براغيث اليم
Orchestilidae (S).
Orchestilidés (F). Orchestilidae (E).
فصيلة دويبات بحرية من القشريات تعرف بالدغاشيات . اطلبها .

٣١٧٢ - برافين ، فيهاء
Paraffine (F). Paraffin (E).
نوع من الشمع الابيض يستخرج من النفط .

٣١٧٣ - برافة *
Fulgora (S).
Fulgore (F). Fulgora (E).

جنس حشرات من فصيلة البراقيات ورقبة متجانسات الاجنحة . انواعه المعروفة عديدة منتشرة باكثريتها في معظم اصقاع البلاد الاستوائية والحارة || اجسامها لاقياسية الحجم ، منها الصغيرة والكبيرة . رؤوسها مستغلظة ، حويصلية الجباه . رواشها كبيرة ، رجة ، جميلة الزخارف والالوان ، فيها السمرة والكلسة والصفرة والخضار || ذكورها واناثها تفرز مادة شمعية شفافة تبدو كجزر من الكعب تترك وتتلون بلون المكان فتخفي الحشرة عن الانظار || طيرانها بطيء الحركة ، قصير الشوط || تألف الحراج اخصها التي تكثر فيها السدايات .

٣١٧٤ - برافيات
Fulgoridae (S).
Fulgoridés (F). Fulgoridae, Plant hoppers (E).
Lanternenträger (D).

فصيلة حشرات من نصفيات الاجنحة المتجانسة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم المناطق الاستوائية من العالمين القديم والجديد || اجسامها مستغربة الاشكال ، متوسطة القد او كبيرة . مستغلظة الرؤوس . نائثة الجباه الحويصلية الشكل او القرنية . تتميز بصغر قرونها الاستشعارية الشبيهة بالمناخس الدقيقة . رواشها كبيرة ، جميلة الرسوم والالوان || بعض انواعها يفرز مادة شمعية شفافة تأخذ لون الموقع || اعرف اجناسها واشهرها البرافة والهوطين .

٣١٧٥ - براك
Orphie (F). Billfish (E).
راجع خرمان وهي سمكة من الاسقمريات .

٣١٧٦ - براك مبدول
Bar commun (F).
سمكة بحرية مشهورة باسم قاروس مبدول ، اطلبها .

٣١٧٧ - براكونيات
Braconidés (F). Braconidae (E).
راجع دحموريات .

٣١٧٨ - براكيثيل * ، اريود
Brachyteles (S).
Brachytèle, Eriode, Singe-araignée (F).
قرد امريكي وحيد الجنس والنوع من فصيلة السبوسيات . موطنه احراج البرازيل الجنوبية || جسمه اهيف القوام رشيق . يطول نحو ١٣٠ سم . رأسه صغير القد ، عنقه متوسط القصير . قوائمه قوية مستطيلة . ذنبه شديد الطول اخاذ . ثوبه الى الصبهة الخنطية يعبق عند الظهر وينحرف ، مع العمر ، الى الجقوة || يعيش على الاشجار قوته البرام والازهار والاوراق والثمار . انثاء تضع جرراً واحداً .

٣١٧٩ - براكييم
Brachysema (S). Brachysème (F).
جنس نباتات برية وزراعية تزيينية من فصيلة القرنيات الفراشية ، مهدا بلاد استرالية . انواعها قليلة العدد تتميز

وهي مأكولة وتربب . خورها من المرطبات المشهورة النافعة والمضادة للحميات .

٣١٩٨ - بربريسيات Berberidaceae (S).

Berberidacées (F). Berberidaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقين الكثيرة القعالات . مهدا واسع الأرجاء ، نباتاتها عديدة الاجناس والانواع ، معمرة عشبية او ليفية . ثمارها عنبية او جرائية تحوي بذرة واحدة او عدة بذور . منها مأكولة تعتبر من المرطبات النافعة وهي غنية بالحامض التفاحي .

٣١٩٩ - بربريس Irriguer (F). To Irrigate (E).
بربريس الارض : ارسل فيها الماء لتجود (الليث) .

٣٢٠٠ - بربريس

ضرب من السمك يشبه الشبوط (اللسان) .

٣٢٠١ - بربريسان Pogonornis (S).

Barbican (F). Barbican (E).
جنس طير من فصيلة الغنائيات . انواعه المعروفة نحو ١٥ جميعها افريقية المهد . معظمها من عصافير افريقية الشرقية || اجسامها متوسطة القد تطول من ٢٢ الى ٣٠ سم . تتميز بمناقيدها الكبيرة ، المستغلفة ، الضليعة ، المنشارية الخفاف . رؤوسها معتدلة الجرم . سبالها كثيفة تمتد حتى الزور . عيونها كبيرة مطوقة بالاعبر . اثوابها ملونة يكثر فيها الاسود والاليس والابيض والاعبر . اجنحتها قصيرة ، ذلقة . اذنانها مستطيلة ، مستديرة الاطراف . ارساغها معتدلة الطول . اصابعها شديدة النشاط || قوتها الحشرات المختلفة وبعض الثمار العنبية || تدثن افاحيصها في محاجر تحتفرها في التربة . اناثها تبيض من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها بمنابذة الذكور نحو ١٣ يوما .

٣٢٠٢ - بربريس Clarias macrocanthus

سمكة نهريّة من فصيلة السلوريّات مستطيلة الشكل تشبه الحنكليس . يكثر وجودها في بحيرات الحولة وطبرية .

٣٢٠٣ - بربريسة مأكولة

Paropsia esculata (S). Paropsie comestible (F).
جنية معمرة برية وزراعية من فصيلة الالاميات . منها بعض اصقاع مدغسكر والجزر المجاورة || ساقها فرعاء متسلقة . اوراقها متعاقبة ، معنقة . نصالها اهليلجية الشكل ، مدببة الاطراف . ازهارها ضميّ التجميع ، محوري الارتكاز . ازهارها صغيرة برتقالية اللون . ثمارها كعابر رافعة ، حويصلية الشكل تحوي بذور مستطيلة يغلفها جفت لحمي المادة ، عجي اللون ، شفاف ، مستحب الطعم ، مأكول .

٣٢٠٤ - بربروني Rouget-barbet (F).

Mullus barbatus, Red mullet (E).
هو الطرستوج ، ويدعى سلطان ابراهيم .

٣٢٠٥ - بربروني صغير Petit Barbarin (F).

سمكة مشهورة تدعى طرستوج رملي . اطلها .

٣٢٠٦ - بربروني Borbonia (S). Borbonie (F).

جنس نباتات جنية تزيينية من القرنيات الفراشية . مهدا رأس الرجاء الصالح . انواعها تعد على الاصابع جميعها جميلة الشكل والزهر لكنها تحشى الصقيع .

٣١٨٩ - برائيل Camall (F). Hackle (E).

عفر الطائر وهي ما استدار من الريش حول عنقه .

٣١٩٠ - بربرية Barbarée (F). Treacle mustard (E).

اطلب جرجير البر .

٣١٩١ - برباط Périate (F).

جنس دويبات لافقارية ، رغامية التنفس من صف الخندحيات . انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها من دويبات البلاد الحارة تعيش في الاماكن المظلمة الرطبة || اجسامها اسطوانية الشكل ، مستطيلة ، قليلة الصلابة . رؤوسها صغيرة . قشورها قاضمة . عيونها زمنية التركيب . زيتها مستطيلة . جرامزها صغيرة ، دقيقة ، كثيرة العدد . اثوابها عابقة يكثر فيها الاسود الجوي الموج .

٣١٩٢ - برباطوكة Peucedane (F). Hog's fennel (E).

اطلب بخور الاكراد .

٣١٩٣ - بربرال Baribal

هو الدب الامريكي .

٣١٩٤ - بربرخ Aqueduc (F). Aqueduct (E).

قناة لجر المياه عبر الوادي ترتكز على قناطر من حجر او اقواس من باطون تمكها من احتمال ثقل الماء وضغطه .

٣١٩٥ - بربرخ Epididyme (F). Epididymis (E).

جسم دقيق اهليلجي الشكل يستند على حنار الحصية الخلوي العلوي .

٣٢٩٦ - بربرخي Caméléon (F). Chameleon (E).

راجع حرباء .

٣١٩٧ - بربريس ، بربريس ، أنسرباريس ،

إثراة ، زرشك ، عود الريح

Berberis vulgaris (S). Berberis, Epine-vinette, Vinettier (F). Barberry, Pipperidge, Barberry (E). Berberize, Berberitze, Sauerdon (D). Berberis, Birbero, Crespino, Spina acida (I).

جنس جنات شائكة برية وزيينية من فصيلة البربريسيات مهدا جميع البلاد المعتدلة الحرارة . انواعها كثيرة العدد وقد يزرع منها للتزيين زهاء ٣٠ ، اوراقها متعاقبة او ضمية . ازهارها عديدة الالوان عنقودية التجميع او عشكولية . ثمارها عنبية صفراء اللون او حمراء يستخرج منها صباغ وردي اللون يستعمل في صباغة الحرير والصوف والقطن . ويستخرج من قشورها وجذورها واخشابها صباغ اصفر ثابت اللون يعتبر من اجود الصباغات || اشهر انواعه الزراعية ما يلي :

Berberis buxifolia (S). بربريس بقسي

Berberis à feuilles de buis (F). بربريس بهشي

Berberis ilicifolia (S). بربريس بهشي

Berberis à feuilles de houx (F). بربريس درويني

Berberis Darwinii (S). بربريس كندي

Berberis de Darwin (F). بربريس كندي


Berberis Canadensis (S). بربريس كندي

Berberis de Canada (F). بربريس كندي

Berberis acuminata (S). بربريس مؤنف

Berberis à feuilles acuminées (F). بربريس مؤنف

وثمار اكثر انواع البربريس لا تخلو من بعض الحموضة



برباط



برباطوكة



برباطوكة



بربريس



بربريس مأكولة

٣٢٠٧ - برتقال
Iris des marais (F).
Yellow water flag (E).
راجع سوسن المناقع .

٣٢٠٨ - برتقال
Barbeau (F). Barbus, Barbel (E).
هو البني ، جنس اسماك بحرية ونهرية .

٣٢٠٩ - برتقال
Serpe (F). Bill-hook, Hedge-bill (E).
البرت : أداة حادة النصل تستعمل في تشذيب الشجر .
والبرت هو السكر الابيض .

٣٢١٠ - برتقال
Anneau nasal (F). Nostril link (E).
حلقة تجعل في انف البعير تكون من حديد ونحوه .

٣٢١١ - برتقال
Caryopse (F). Caryopsis (E).
هي كل ثمرة جافة من ثمار النجيليات كالقمح والخرطال والشيلم ، يلتصق غلافها الثمري بالبذرة .

٣٢١٢ - برتقال ، برتقال ، برتقال ، جنة
Citrus aurantium (S). Oranger (F). Common orange tree (E). Orangenbaum (D). Arancio dolce, Melarancio, Portogallo (I).

جنس اشجار مثمرة من الفصيلة البرتقالية . مهدد المقدر بلاد الصين وقد سمي برتقالا لان البرتغاليين هم الذين نقلوه من الصين وعرفوه الى العالم الغربي || انواعه عديدة جميعها مأكولة الثمار ، فرعاه اخيكل ، تعلو من ٦ الى ١٠ امتار . قنبا مستديرة ، اوراقها مستطيلة مدببة العقصة ، معتقة ، متعاقبة ، نصلها جميل الخضار ، لامع الصفحة العليا الملساء البشرة . ازهارها فردية او مشطية التجميع ، خماسية البتلات المستطيلة ، البيضاء اللون ، فواحة العرق المستحب . ثمارها كروية ، فوارقها النوعية كثيرة تعود الى الشكل والحجم واللون والطعم .

اقليمه : يرغب في الاقاليم الحارة التي لا تهبط حرارتها الدنيا عن ١٠ درجات سنثيغراد . وهو يخشى جفاف الجو ورطوبة الموقع والرياح الماصفة .

تربيته : يعيش في معظم الارربة لكنه يفضل المتناسبة التركيب الحكي المتوسطة الاندماج . ويجود في الارربة الحوارة العميقة الغور منها كان هوها .

تكاثره : يتكاثر بالبذر والتعقيل والتريد والتطعيم .

زراعته : تنرس النصبوب في فصل الخريف ، بعد تحضير التربة ، في صفوف متساوية ، متوازية الانباق على ابعاد تراوح من ٥ الى ٨ امتار .

العناية : قوامها الري المعتدل الواجب وتنظيف التربة من الاعشاب الضارة ومكافحة الحشرات والامراض ثم التقليم والتشذيب || اشهر انواعه الوطنية والاجنبية ما يتبع .

٣٢١٣ - برتقال أبو سرّة

شجرة كبيرة القد قوية النشط . اوراقها شديدة الخضار . ثمارها كبيرة الحجم ، وزنها يراوح بين ١٨٠ الى ٢٥٠ غ تتميز بجائتها الثملولي الذي يشبه السرة . قشرتها مبرغلة الملمس ، سميكة اللب ، حصوصها جامدة جيدة العصارة الحلوة المذاق . بزورها قليلة او لا وجود لها || تجود في الارربة الخفيفة العميقة الغور . تتحمل الاسفار البعيدة .

٣٢١٤ - برتقال بلسدي

شجرة فرعاه كبيرة القد ، متوسطة النشط والمناعة . اوراقها متوسطة الحجم ، شديدة الخضار . تزهر عند اواخر اذار ، ازهارها يدوم نحو الاسبوعين . نضج ثمارها يبتدئ في

اواخر تشرين الثاني ويستمر حتى اذار || ثمارها كروية ملساء القشرة السميكة اللب ، حصوصها غزيرة العصارة المستحبة الطعم . بزورها كثيرة يراوح عددها من ٩ الى ١٥ || تجود في الارربة الخفيفة القليلة الاندماج . ثمارها لا تتحمل الاسفار البعيدة .

٣٢١٥ - برتقال بلسنسيه* ، برتقال مرسية

Oranger de Valence, O. de Murcie
شجرة كبيرة القد هرمية الشكل قوية النشط . اوراقها كبيرة شديدة الخضار || ثمارها تتحمل الاسفار الطويلة البعيدة ، وهي كروية الشكل ، قشرتها ثلولية سميكة اللب . حصوصها جامدة جيدة العصارة اللذيذة الطعم العطرية العرف || تجود في جميع الارربة الخفيفة ، العميقة الغور .

٣٢١٦ - برتقال بلسنسيه المتخار* ، برتقال فلنسيا

Oranger tardif de Valence (F).
Valencia late (E).
شجرة كبيرة القد ، جميلة الشكل ، عديمة الشوك ، وافرة الانتاج . تزهر في اواخر نيسان . ينضج ثمرها في آب وايلول من السنة التالية || ثمارها مثخارة تتحمل الاسفار البعيدة وهي بيضيه الشكل . متوسطة الحجم ، قشرتها رقيقة اللب ، حصوصها جامدة جيدة العصارة الحلوة الطعم العطرية العرف . بزورها كثيرة العدد ، من ٩ الى ١٢ . تجود في جميع الارربة الخفيفة الحوارة الغنية بالعناصر المعدنية .

٣٢١٧ - برتقال بلسيده Oranger de Blida

شجرة متوسطة القد قوية النشط وافرة الانتاج ، عديمة الشوك || ثمارها تتحمل الاسفار الطويلة وهي مستديرة الشكل ، سميكة اللب ثلولية القشرة . حصوصها متوسطة العصارة اللذيذة الطعم || تجود في الارربة القليلة الاندماج ، العميقة الغور ، الغنية بالمواد العضوية والمعدنية .

٣٢١٨ - برتقال بيساس

شجرة كروية الشكل قوية النشط كثيرة الحمل . ثمارها مستديرة ، متوسطة الحجم ، قشرتها رقيقة اللب . حصوصها غزيرة العصارة السكرية المستحبة الطعم . بزورها عديدة من ٩ الى ١٥ || تجود في الارربة الخفيفة القليلة الاندماج .

٣٢١٩ - برتقال ثومبسون نافيل Thompson navel

شجرة متوسطة القد قوية النشط فارشة الاغصان ، الكثيرة الشوك . اوراقها جميلة الخضار || ثمارها لا تتحمل الاسفار البعيدة وهي كروية كبيرة القد مقلطحة القاعدة . قشرتها مصقولة البشرة رقيقة اللب الحش ، حصوصها غزيرة العصارة اللذيذة الطعم العطرية العرف || تجود في جميع الارربة القليلة الاندماج الغنية بالعناصر المعدنية .

٣٢٢٠ - برتقال خشملي*

شجرة متوسطة النشط والمناعة . تزهر في اواخر نيسان . نضج ثمارها يبتدئ في اواخر كانون الاول ويستمر حتى نيسان . ثمارها كبيرة الحجم ، مستديرة الشكل ، ثلولية الخاتم ، قشرتها رقيقة اللب . حصوصها غزيرة العصارة الحلوة اللذيذة الطعم والنكهة . بزورها من ٨ الى ١٠ || تجود في الارربة الرملية العميقة الغور والغنية بالعناصر الغذائية .

٣٢٢١ - برتقال شموطي* ، برتقال يافاري

شجرة متوسطة الحجم والنشط والمناعة . فروعها منبسطة ،



برتقال بلدي



برتقال بلنسية



برتقال بلنسية المشخار



برتقال خشملي



برتقال شموطي

لمة الحمضيات. اجناسها ثلاثة البرتقال والليمون والاترج. اما انواعها فعديدة. معظمها اشجار وشجيرات. مهدها المناطق الحارة الاسيوية والافريقية والامريكية والاسرائيلية.

٣٢٢٧ - بُرْتَقَالُ أَشْقَح (S). *Berytus rufescens* (S). *Béryte roux* (F).

حشرة خاضعة من فصيلة البرتوسيات. جسمها صغير. يطول من ٩ الى ١٠ مم. || ثوبها الى الحنطي الاشقي. رأسها مكور. خطمها معتدل الطول. زباناها شديدا الطول. عينها صغيرتان. كوسلها متوسط الجرم. ظهرها شبه شفاف، اشقي الاعصاب. بطنها حنطي اللون. قوائمها دقيقة مستطيلة || تألف المواقع الرطبة اخصها الاودية والحدائق. قوتها اوراق الاعشاب البرية.

٣٢٢٨ - بُرْتَقَالُ شَائِكُ الزُبَانِي (S). *Berytus hirticornis* (S). *Béryte à antennes hérissées* (F).

حشرة خاضعة من فصيلة البرتوسيات. جسمها صغير. يطول نحو ٨ مم. ثوبها الى الحنطي. ظهرها شبه شفاف، تملوه مشحة وردية خفيفة. بطنها الى الحنطي الاسمر الموج || رأسها صغير مكور. خطمها مستدق. عينها صغيرتان ناشرتان. زباناها مستطيلان، كثيفا اطلب الشائك. كوسلها مخروطي. حنطها صغيرة. ظهرها ضيق مستطيل. بطنها صغير الجرم. قوائمها مستطيلة || تألف المواقع الرطبة وضايف مجاري الماء. قوتها اوراق الاعشاب البرية.

٣٢٢٩ - بُرْتَقَالِيَّات (S). *Berytidae* (S). *Bérytidés* (F). *Berytidae* (E).

فصيلة حشرات من رتبة مختلفات الاجنحة وطبقة نصفيات الجناح. اجناسها وانواعها عديدة، منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحارة || اجسامها صغيرة. رؤوسها مكورة. اخطامها نحيلة رباعية الاجزاء. عيونها جانبية الارتكاز. قرونها الاستشعارية دقيقة، رباعية الفصل. قوائمها مستطيلة اخصها الزوج الخلفي || جميع اجناسها خاضعة ودائمة تعيش على اوراق النبات او في الجشالة.

٣٢٣٠ - بُرْتَقَالِيَّات (F). *Terre meuble* (F). *Mellow soil, Loose ground* (E).

البرث هي اسهل الارض واحسنها. ج برات وابراث. ٣٢٣١ - بُرْتَقَالِيَّات (F). *Griffe* (F). *Claw* (E).

البرث من السباع بمنزلة الاظفار من الانسان والمخلب من الطائر. ٣٢٣٢ - بُرْتَقَالِيَّات (F). *Fissipède* (F). *Fissiped* (E).

نمت تعريفي يطلق على كل حيوان من ذوات الاربع، اطراف قوائم برثية التركيب.

٣٢٣٣ - بُرْج الأسد (F). *Le Lion* (F). *The Leo* (E).

الكوكبة الخامسة من فلك الابراج. تجتازها المجموعة الشمسية من ٢٢ او ٢٣ تموز الى ٢٣ آب || صورته قريبة الشبه بالاسد. نجومه سبعة وعشرون. والعرب تسمي النجم الذي على وجهه من الخارج عن الصورة «سرطان الطرف». وتسمي الاربعة التي في العنق والقلب «الجهة». وتسمي التي على البطن وعلى الحرقفة «الزبرة». والذي على مؤخرة الذنب «الصرفة» لانصراف البرد عند سقوطه بالمغرب.

اوراقها كبيرة. تزهر عند اواخر اذار. ازهارها يدوم نحو عشرة ايام. نصبح ثمارها يبتدئ في كانون الاول ويدوم حتى شباط || ثمارها تتحمل الاسفار الطويلة وهي كبيرة القد بيضية الشكل، قشرها خشنة الملمس سميكة اللب. حصوصها جامدة الخلايا، قليلة العصير اللذيذ الطعم والنكهة والعرف. بزورها قليلة يراوح عددها من ١ الى ٧ تجود في جميع الاثربة الحارة القليلة الاندماج الغنية بالعناصر المعدنية.

٣٢٢٢ - بُرْتَقَالُ مَاورِدِي *

شجرة فرعاء كروية الشكل متوسطة النشاط والمناعة. تزهر في اواخر اذار. نصبح ثمارها يبتدئ في كانون الاول ويدوم حتى شباط || ثمارها لا تتحمل الاسفار البعيدة وهي بيضية الشكل صغيرة القد ملساء القشرة الرقيقة اللب. حصوصها حمراء اللون غزيرة العصارة المستحبة الطعم والعرف والنكهة. بزورها كثيرة يراوح عددها من ٦ الى ١٢. تجود في الاثربة الرملية الديابية العميقة الغور.

٣٢٢٣ - بُرْتَقَالُ مَغْرِبِي *، بُرْتَقَالُ سَكْرِي، بُرْتَقَالُ حَلْو

شجرة متوسطة القد شديدة النشاط. تزهر في اذار. نصبح ثمارها يبتدئ في كانون الاول ويستمر حتى شباط. ثمارها تتحمل الاسفار وهي مستديرة الشكل، قشرها سميكة اللب، حصوصها جامدة جيدة العصارة السكرية والطعم. بزورها كثيرة العدد من ٨ الى ٢٠ || تجود في جميع الاثربة الحارة القليلة الاندماج.

٣٢٢٤ - بُرْتَقَالُ واشنطن نافيل * *Washington navel*

شجرة متوسطة القد فارشة الاغصان القليلة الشوك. اوراقها جميلة الخضار اللامع. ثمارها تتحمل الاسفار البعيدة وهي كروية الشكل. قشرها مصقولة البشرة رقيقة اللب. حصوصها جامدة غزيرة العصارة الحلوة || تجود في جميع الاثربة القليلة والمتوسطة الاندماج الغنية بالعناصر المعدنية.

٣٢٢٥ - بُرْتَقَالِيَّات، بُرْتَقَالِيَّات *Orange*

هي ثمرة البرتقال، اشكالها والوانها واحجامها عديدة تختلف باختلاف النوع والاثربة والمناخ || عصارها غزيرة المادة الغنية بالفيتامينات وبمختلف العناصر الغذائية. فالمتة غرام من عصير البرتقال تحوي نحو ٩٠ مغ من الفيتامين «ث» والكثير من الفيتامين «آ» والقليل من الفيتامين «ب». وحداتها الحرارية تبلغ ٥٠ اما تركيبها الكيميائي فهو:

ماء	٨٧,٢ %
هيدرات الكربون	١١,٢ %
بروتين	٠,٩ %
ادهان	٠,٢ %
حامض ليموني ومختلف	٠,٥ %
اما العناصر المعدنية المتوفرة في العصير فهي:	
الكالسيوم	٢٤ %
الفسفور	١٨ %
الحديد	٤ %

٣٢٢٦ - بُرْتَقَالِيَّات *Aurantiaceae*.

Hesperidae (S). *Aurantiacées, Hespéridées* (F).

Aurantiaceae, Hesperideae (E).


فصيلة نباتية من ذوات الفلقين عديدة القعالات من



برتقال ماوردي



برتقال مغربي



برتقال واشنطن نافيل

٣٢٣٤ - بُرْجُ التَّوأمين (F).
Les Gémeaux (F).
Gemini, the Twins (E).

الكوكبة الثالثة من فللك الابراج . تجتازها المجموعة الشمسية من ٢٢ ايار الى ٢١ او ٢٢ حزيران || تتألف من ٨٥ نجماً . وهي صورة انسانين رأسيهما في الشمال والشرق وارجلهما في الجنوب والغرب وقد اختلطت نجوم احدهما بنجوم الآخر || والعرب تسمي النيرين الاثنين اللذين على رأسيهما « الذراع المبسوطة » . واللذين على ثدي التوأم الثاني « الحقة » . والذي على الركبة اليسرى من التوأم المقدم « المبسوطة » والذي على الركبة اليسرى من التوأم المؤخر « المقبوضة » والذي امام قدم التوأم المقدم « البخاتي » .

٣٢٣٥ - بُرْجُ الثَّوْر (F).
Le Taureau (F).
The Bull, Taurus (E).

الكوكبة الثانية من فللك الابراج . تجتازها المجموعة الشمسية من ٢٠ او ٢١ نيسان الى ٢٢ ايار || وهي تتألف من ١٤١ نجماً . مقدم الثور الى المشرق ومؤخره الى المغرب وليس له كفل ولا قائمتان خلفيتان . رأسه تلتفت الى جنبه وقرناه الى ناحية المشرق . والنير الاحمر الذي على جبهته وهو مؤلف من خمسة نجوم يسمى « الدبران وعين الثور وتالي النجم وحادي النجم والفنيق » . والعرب تسمي النجوم التي على كاهل الثور وعنقه « الثريا » وهما نجمان يبران في خلأها خمسة نجوم متقاربة كعنقود العنب .

٣٢٣٦ - بُرْجُ الجَدْي (F).
Le Capricorne (F).
The Capricorn (E).

الكوكبة العاشرة من فللك الابراج . تجتازها المجموعة الشمسية من ٢٢ او ٢٣ كانون اول الى ٢٠ او ٢١ كانون ثان || عدد نجومها ٧٢ . صورتها قريبة الشبه بالجدى . والعرب تسمي النجمين اللذين على القرن الثاني « سعد الذابح » . سمي ذابحاً للصنير الملاصق له . وتسمي الاثنين النيرين اللذين على الذنب « الحجين » .

٣٢٣٧ - بُرْجُ الحَمَل (F).
Le Bélier, Méduse (F).
The Ram, Aries (E).

الكوكبة الاولى من فللك الابراج . تجتازها المجموعة الشمسية من ٢٠ او ٢١ اذار الى ٢٠ او ٢١ نيسان . صورتها تشبه الحمل او الكبش || تتألف هذه الكوكبة من ٦٦ نجماً مقدمها الى جهة المغرب ومؤخرها الى المشرق . وجه الحمل منعطف على ظهره والنيران اللذان على القرن يسميان « الشرحين » . والنير الخارج عن الصورة يسمى « النطح » . واللذان على الالية مع الذي على الفخذ وهي على مثلث متساوي الاضلاع تسمى « البطين » || والعرب جعلت بطن الحمل منزلاً للقر كبطن السمكة وسمته « البطين » .

٣٢٣٨ - بُرْجُ الحَوَاتِ (F).
Les Poissons (F).
The Fishes, Pisces (E).

ويدعى برج السمكة . الكوكبة الثانية عشرة من فللك الابراج . تجتازها المجموعة الشمسية من ١٨ او ١٩ شباط الى ٢٠ او ٢١ اذار || عدد نجومها ١١٣ . وهما سمكتان الاولى متقدمة وهي التي على ظهر الفرس الاعظم في الجنوب والاخرى على جنوب كوكبة المرأة المسلسلة وبينهما شلة من النجوم متعرجة السطر الواصل بين السمكتين .

٣٢٣٩ - بُرْجُ الدَّلْو (F).
Le Verseau (F).
The Water-bearer, Aquarius (E).

ويدعى برج ساكب الماء . الكوكبة الحادية عشرة من

فللك الابراج . تجتازها المجموعة الشمسية من ٢٠ او ٢١ كانون ثان الى ١٨ او ١٩ شباط || عدد نجومها الواضحة بجلاء ٥١ . اما الصغيرة القليلة الوضوح فتقدر باكثر من مليون . والعرب تسمي النجمين اللذين على المنكب الايمن « سعد الملك » واللذين على المنكب الايسر مع الذي على ذنب الجدي « سعد السمود » . والثلاثة التي على اليد اليسرى « سعد بلع » فتشبهها بقم مفتوح ليلعب . وتسمي الذي على ساعده مع الثلاثة التي على يده اليمنى « سعد الاخوية » .

٣٢٤٠ - بُرْجُ الرَّاهِي (F).
Le Sagittaire (F).
Sagittarius (E).

ويدعى برج القوس . الكوكبة التاسعة من فللك الابراج . تجتازها المجموعة الشمسية من ٢٢ او ٢٣ تشرين ثان الى ٢٢ او ٢٣ كانون اول || عدد نجومها ٦٥ . والعرب تسمي النجم الذي على النصل والذي على مقبض القوس والذي على الطرف الجنوبي من القوس والذي على طرف اليد اليسرى من الداية « النعام الواردة » لأن الحجر شبت بنهر والنعام قد وردت النهر . وتسمي الذي على المنكب الايسر والذي فوق السهم والذي على الكتف الايسر والذي تحت الابطاء وهو بعيد عن الحجر الى ناحية المشرق ، « النعام الصادرة » . وتسمي اللذين على الجهة الشمالية من القوس « الظليين » . واللذين على الفخذ اليسرى والساق « الصردين » .

٣٢٤١ - بُرْجُ السَّرَطَان (F).

Le Cancer, l'Ecrevisse (F).
The Crab, Cancer (E).

الكوكبة الرابعة من فللك الابراج . تجتازها المجموعة الشمسية من ٢١ او ٢٢ حزيران الى ٢٢ او ٢٣ تموز || صورتها قريبة الشبه بالسرطان . تتألف من ٨٣ نجماً . والعرب تسمي النجم النير منها « النثرة والمنطف او المزود » واسم النجمين التاليين للنثرة « الحمارين » . والنجم النير الذي على القائمة المؤخرة « الطرفة » || والنجمان المعروفان بالحمارين واحد منهما يدعى الحمار الجنوبي والآخر الحمار الشمالي .

٣٢٤٢ - بُرْجُ العَذْرَاء ، بُرْجُ السَّنْبِلَة (F).

La Vierge, Epi de la Vierge, Parthénie (F).
The Virgo, Spica (E).

الكوكبة السادسة من فللك الابراج . تجتازها المجموعة الشمسية من ٢٣ آب الى ٢٣ او ٢٤ ايلول || عدد نجومها ١١٠ . وهي صورة امرأة رأسها على الجنوب الصرفة . والعرب تسمي النجوم التي على منكبها الايمن « العواء » وهو المنزل الثالث عشر من منازل القمر . والنجم النير الذي بقرب يدها « السماك الاعزل » وبياضاته « السماك الرامح » لأن امامه كوكب صغير يقال له راية السماك ورعده . ونجوم القدم اليسرى تدعى « الففر » لنقصان الضوء .

٣٢٤٣ - بُرْجُ العَقْرَب (F).
Le Scorpion (F).
The Scorpion, Scorpio (E).

الكوكبة الثامنة من فللك الابراج . تجتازها المجموعة الشمسية من ٢٣ او ٢٤ تشرين اول الى ٢٢ او ٢٣ تشرين ثان || عدد نجومها ٢٧ . صورتها كالعقرب . والعرب تسمي النجوم الثلاثة التي على الجهة « الاكليل » . وتسمي النير الاحمر الذي على البدن « قلب العقرب » وتسمي الذي قدام القلب والذي خلفه « النياط » . وتسمي الذي في الحروات « الفقرات » . وتسمي الاثنين اللذين على طرف الذنب « الشولة » .

Bergénie purpurine (F).

نوع من البرجينة . منبتها بعض جبال الهند اخصها حملايا . شراخها خفي اللحم يرتفع من ٨ الى ١٥ سم . اوراقها اهليلجية ، مستديرة الاطراف . نصالها عديمة التسنين لونها الى الخضار البحري اللامع . ازهارها كبيرة القذ أرجوانية اللون العابق || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

٣٢٥٦ - برجينة قلبية الورق ٥

Bergenia cordifolia (S).

Bergénie à feuilles cordiformes (F).

نوع من البرجينة . منبتها بعض الاقاليم الاسيوية اخصها جبال المنغول . شراخها اجرد يعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم . اوراقها اهليلجية ، قلبية القواعد . نصالها ناشرة العروق ، منشارية الحفاف . ازهارها كبيرة القذ ، وردية اللون || تنويرها يستمر من اذار الى ايار .

٣٢٥٧ - برجينة لحمية الورق ٥

Bergenia crassifolia (S).

Bergénie à feuilles charnues (F).

نوع من البرجينة . منبتها جبال المنغول . شراخها يعلو من ١٥ الى ٤٠ سم . اوراقها اهليلجية ، مستدقة القواعد والاطراف . نصالها لحمية مسنة الختار . ازهارها صغيرة حمراء اللون || تنويرها يستمر من اذار الى ايار .

٣٢٥٨ - برجينة لسانية ٥

Bergenia ligulata (S). Bergénie ligulée (F).

نوع من البرجينة . مهدا جبال حملايا . شراخها خفي اللحم يرتفع نحو ٢٠ سم . اوراقها قلبية الشكل . نصالها خلية البشرة على الصفحتين . ازهارها قصيرة المعاليق بيضاء اللون || تنويرها يستمر من اذار الى ايار .

٣٢٥٩ - برجة ٥

Chamelle de valeur (F).

Goodly she-camel (E).

البرجة : الناقة من خيار الابل .

٣٢٦٠ - برد ٥

Grêle (F). Hail (E).

ماء جامد يسقط من الغيوم المتلبدة بشكل حبات كروية مختلفة الحجم .

٣٢٦١ - برد ٥

Aile d'insecte (F). Wing-shard (E).

يقال بردا الجراد والجندب : جناحاه .

٣٢٦٢ - برد صناعي ٥

Froid industriel (F).

Industrial-cold, Cold-storage (E).

هو البرد الحاصل من استعمال احدى طرق التبريد العديدة . وهو ضروري لحفظ الثمار واللحوم وغيرها من المحاصيل الزراعية السريعة العطب وذلك لان البرد يشل عمل الجراثيم ويقضي على بعضها .

٣٢٦٣ - برداء، ملاريا، أجمية ٥

Malaria مرض خبيث يصيب الانسان والحيوان سببه بوع يعيش طفيلياً في الدم فيحله ويفقره . وبعض البعوض هو الذي ينقله الى الانسان والحيوان .

٣٢٦٤ - برداس ٥

Melandrium (S).

Melandre (F). Melandrium (E).

جنس نباتات عشبية معمرة من سبط السيلانيات وفصيلة القرنفلية . انواعه المعروفة قليلة العدد ، اعطانها بعض

La Balance (F).

The Scales, Libra (E).

الكوكبة السابعة من فلك الابراج ابتداء من برج الحمل . تجتازها المجموعة الشمسية من ٢٣ او ٢٤ ايلول الى ٢٣ او ٢٤ تشرين اول || عدد نجومها ٥١ . صورتها كالميزان ولا يوجد فيها نجوم ساطعة تستحق التسمية .

٣٢٤٥ - بُرْج حمام ، تمراد ، ربيع ٥

Fule, Colombier (F). Dove-cot, Pigeon-house (E).

بناء خاص لسكنى الحمام .

٣٢٤٦ - بُرْج جاد ٥

Métathorax (F). Metathorax (E).

هو في الحشرات الحلقة الصدرية الاخيرة اي الثالثة .

٣٢٤٧ - بُرْج جاس ٥

Point de mire (F).

Aim, Point aimed at (E).

٣٢٤٨ - بُرْج جُد ٥

Mésorthorax (F). Mesothorax (E).

هو في الحشرات الحلقة الصدرية الوسطى اي الثانية .

٣٢٤٩ - بُرْج جمة ٥

Articulation des doigts (F).

Turriculé (F). Turriculate (E).

نعت تعريفي يطلق على كل صدفة وحيدة المصراع ، لولها منسوب الخلزنة المتساوية المرتفعة كالبرج .

٣٢٥١ - بُرْج جية ، زنبق الأبراج ، زنبق برونو ٥

Paradisía Lilliastrum (S). Paradisic faux-lis, Lis de St. Bruno, Lis des Allobroges (F). St. Bruno's lily (E). Echte trichterlilie (D). Giglio di San Bruno (I).

نبات عشبي معبر وحيد الجنس والنوع من فصيلة الزنبقيات . يرغب في الاتربة الكلسية القليلة الرطوبة . ساقه دقيقة نحيلة منتصبة تعلو من ٢٥ الى ٥٠ سم . اوراقه مستطيلة ضيقة النصل تطول من ٣٠ الى ٦٠ سم . وتعرض نحو ٤ سم . ازهارها عطرية العرف ، بيضاء اللون ، تطول نحو ٥ سم . ازهاره يستمر من حزيران الى آب .

٣٢٥٢ - بُرْج جية هائية ٥

Bergia aquatica (S). Bergie aquatique (F).

نبات عشبي حولي بري من فصيلة الالطيديات . منبته . مناقع حوض البحر الابيض المتوسط || ساقه اسطوانية قليلة الفروع . اوراقه متعابلة ، رمحية النصال ، مسنة الختار . ازهاره ضمي التجميع ، محوري الارتكاز . ازهاره صغيرة ثنية اللون .

٣٢٥٣ - بُرْج جيس ٥

Jupiter (F).

هو المشتري من كواكب مجموعة النظام الشمسي ، اطلبه .

٣٢٥٤ - بُرْج جينة ٥

Bergenia (S).

Bergénie (F). Bergenia (E).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة السفرسيات . اروماها ضخمة . اوراقها بسيطة ، بعضها لحمي النسيج . ازهارها عنقودية التجميع تتركز على شوايخ ضليعة ، قصيرة او متوسطة الارتفاع || تزرع للتزيين في الحدائق . انواعها المعروفة عديدة ، اشهرها التالية :

٣٢٥٥ - بُرْج جينة أرجوانية ٥

Bergenia purpurescens (S).



برج حمام



برجينة



برجينة



برده



بردي



بررجة شرسة



برزان



برساء أمريكي



برساء هندي

زبانها صولجانيان . جوشنها الى الكهبة السمره عند الذكر والى الطحلة عند الانثى . بطنها لبد الحمل ، اشقق اللون يعلوه موج امغر اربد || روشنها الاماميان الى الربرة تعلوها جدة وسطى مستعرضة عند الذكر ، مستضيقة عند الانثى . روشنها الخلفيان رباعيا الفلوس ، موشحان ومضلعان بالبي || لما جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في ايار . تسرح في النهار . تعاقل بعد ظهورها بنحو تسعة اسابيع . تمتع الممكن لطخا على الصفحات السفلى من نصال العصف || السرفة عند بلوغها الكمال تطول من ٢٥ الى ٢٨ مم . جسمها اسطواني الشكل ، مائل القشار الناعم الحمل . ثوبها الى الصفار الاخضر تعلوه ثلاثة خطوط رصاصية . رأسها اسمر . شرجها مجهز بزائدة مقلوبة . مدتها ورواجها الى السمرة الداكنة || طور الاكمال يستمر نحو ثلاثة اسابيع وينقضي في التربة تحت الجثالة ضمن غلاف عضوي المادة .

٣٢٧٢ - برزان * Eccremocarpus (S).
Eccramocarpe (F). Eccremocarpus (E).

جنس نباتات جنبيه معمرة برية وتزيينية من فصيلة البفونيات . انواعه المعروفة ستة مهدا بعض مناطق امريكة الجنوبية اعصها بلاد البيرو || ساقها وفروعها نحيلة متسلقة . اوراقها معنقة ، متعاقبة ، ريشية ، تنتهي بحواقي دقيقة تمكها من التسلق . ازهارها عنقودي النجم . ازهارها متوسطة القد ، مستطيلة الاعناق ، لونها الى الحمرة يعلوها موج اصفر او اخضر يختلف مع اختلاف الانواع || زراعتها التزيينية تستلزم المواقع الدافئة . تتكاثر بالبزور وبالعقل .

٣٢٧٣ - برس Cotonnier (F). Cotton plant (E).
البرس والبرس هو القطن ، اطلبه .

٣٢٧٤ - برس Ameubler (F). To make (soil) (E).
برس الارض : سهلها ولينها بالنبال والعمل .

٣٢٧٥ - برساء Mimusops (S).
Mimusope (F). Mimusops (E).
جنس اشجار حرجية وتزيينية من فصيلة السيوتيات . منبتها المناطق الاستوائية . انواعها المعروفة ٣٠ ، اشجارها متوسطة القد . اوراقها متعاقبة معنقة ، نصلها جامد الصفحة ، ملهي الشكل لامع البشرة . ازهارها فردية التجميع ابطية الارتكاز او محورية وهي بيضاء اللون او صفراء || اشهر انواعها الهندي والامريكي .

٣٢٧٦ - برساء امريكي Mimusops elata (S).
Mimusope élevé (F). Cow-tree of Para, Brazilian milk-tree (E). Kuhbaum von Para (D). Mimusopo (I).
نوع من البرساء . منبتها المناطق الاستوائية الامريكية . شجرته غليظة اساق يستخرج منها بالحز عصارة صمغية مطاطة تستعمل في عدة صناعات .

٣٢٧٧ - برساء هندي Mimusops elengi (S). Cavequi, Elengi (F). Bukul tree (E). Elengibaum (D). Elengi (I).
نوع من البرساء ، مهد الهند ، اشجاره متوسطة القد . ثماره برتقالية الشكل سمره اللون مأكولة . يستخرج من ساقه بالحز عصارة صمغية مطاطة جيدة الصنف .

٣٢٧٨ - برسام Pleurésle (F). Pleurisy (E).
هو ذات الجنب ، مرض صدري يصيب الانسان وبعض

مناطق حوض البحر الابيض المتوسط ، منبتها الطوي الجرد والقم || سوقها مزغبة ، قلياة الفروع . اوراقها مستطيلة ، رحية النصال المدببة المتسامكة . ازهارها خماسية البتلات ، عشارية الاسدية ، بيضاء اللون . اشهر انواعها واعرفها :

برداس مخلي الكاس M. eriocalycinum (S).

M. à calice velouté (F).

M. pratense (S).

M. des prés (F).

برداس مرجي

٣٢٦٥ - بردة * رباك بردة ، أبو بصل

Chrysophrys berda (S). Daurade rose (F).

سمكة من الاسبوريات تنتمي الى جنس الرباك . طولها من ٢٠ الى ٣٠ سم . لونها وردي مذهب الموج . تكثر في البحر المتوسط .

٣٢٦٦ - بردقان Oranger (F). Orange tree (E).
راجع برتقال .

٣٢٦٧ - برد قوش Marjolaine (F).
هو المردقوش ، اطلبه . Annual marjoram (E).

٣٢٦٨ - برد قوش معقد Amaraque (F).
هو المرو ، اطلبه . Amaracus (E).

٣٢٦٩ - بردي * بابير ، ببير ، بابيرس ، بابورس Papyrus antiquorum, P. domesticus, Cyperus papyrus (S). Papyrus, jonc du Nil, Souchet à papier (F). Papyrus, Nile papyrus, Paper-reed (E). Agyptisches zypergras, Papyrusgras (D). Papiro, P. egiziano, Giunco del Nilo (I).

نبات جذموري عشبي معمر من فصيلة السدييات . منبته مناطق البلاد الحارة . يكثر وجوده في بحيرات النيل الابيض والازرق . قيل فيه « رماده يجلو الاسنان ويقطع الدم حيث كان ويلحم الجراح واذا مضغ اذهب الحقر واوقف التآكل وهو يضر الاحشاء ويصلحه العسل » || وهو من النباتات اللادرق ها . ساقه مستقيمة عفية تعلو نحو ثلاثة امتار ، قطرها يراوح من ٤ الى ٧ سم . تكليل هامها مجموعة من الازهار القرصية الشكل || وما اوراق البردي التي تسمى غريف وفيلكون وكولان وفافر والتي كانت تستعمل في العصور الغابرة سوى لحاء هذا النبات المائي المتراكب الاسقاط . اقدم اوراق البردي المحفوظة حتى الآن يعود تاريخها الى عهد السلالة الفرعونية الثامنة عشرة اي الى ١٨٠٠ سنة قبل الميلاد .

٣٢٧٠ - بردون Bardeau, Bardot (F).
Hinny, Pack-mule (E).

كل نغل ابو حصان وامه اتان . وعرفه العرب بدابة الحمل الثقيلة البطيئة ج براذين .


٣٢٧١ - بررجة شرسة *

Pararge megaera, Laslommata megaera (S).

Pararge mégère, Mégère (F).

Pararge megaera (E).

حشرة من فصيلة المجانيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . سوطها يمتد من الشرق الادنى الى اروبة . فراشها جارة قوتها مغتر الازهار . سرفتها خاضعة تعيش على عصف النجيليات || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٤ مم . بسطها نحو ٤٠ مم . رأسها صغير الجرم . عينها كبيرتان .



الحيوان . وفي عرف الاقدمين الحمى اذا دامت مع الصداع والثقل في الرأس والحمة في الوجه وكراهة الضوء .

٣٢٧٩ - برسكة * Pereskia (S). Péreskia (F).

جنس نباتات نجديّة معمرة من فصيلة الصباريات . انواعها المعروفة عديدة جميعها من ثبوت المناطق الحارة في امريكا الجنوبية || سوقها وافنادها ليفية اسطوانية الشكل . اوراقها عابلة ، معنقة ، لانظامية الارتكاز ، بيضوية الشكل ، لحمية النصال المنبسطة ، ازهارها فردي ار عشكولي التجميع ، محوري الارتكاز . ازهارها كبيرة ، جميلة ، عديدة الالوان التي تختلف باختلاف الانواع . ثمارها عنبية ، مأكولة للباب || اوراقها غزيرة العصير ، لذينة الطعم ، تؤكل طازجة ومطبوخة .

٣٢٨٠ - برسوم Canne à sucre (F). Sugar-cane (E).

اطلب قصب السكر .

٣٢٨١ - برسونة * Persona (S). Persona (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة اليسويصيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة || اصداقها صغيرة شبه اهليلجية الشكل ، محزنة ، مستدقة الاعقاب ، مستطيلة الفوهات || اجسامها مخروطية ، كبيرة الاردية ، لانظامية الافواه .

٣٢٨٢ - برسيم * Trifolium alexandrinum (S). Trèfle d'Egypte, Trèfle d'Alexandrie (F). Egyptian clover, Bersim clover (E). Agyptischer klee, Barsimklee (D). Trifoglio alessandrino, Moscino minore (I).

نوع من النفل من فصيلة القطنيات وهو نبات حولي علني وافر الانتاج والفائدة . اوراقه مركبة ثلاثية مستطيلة المعاليق . ازهاره سنبلية التجميع هامة الارتكاز .

٣٢٨٣ - برسيم أحمر Trèfle rouge (F).

اطلب فقل المروج . Red clover (E).

٣٢٨٤ - برسيم الماء Ménianthe (F). Buck-bean (E).

راجع إطريرفل .

٣٢٨٥ - برسيم حجازي Luzerne cultivée (F).

راجع قصة مزروعة . Lucerne (E).

٣٢٨٦ - برسيم ياباني Lespedeza striata (S).

Trèfle du Japon (F). Japanese clover (E). Japanscher kleeber (D). Trifoglio del Giappone (I).

نبات علني من القطنيات وهو وافر الانتاج الخضري حميد الخواص الغذائية . ساقه دقيقة فرعاء . اوراقه كثيفة التجميع رريقاته بيضوية صغيرة . ازهاره مغنرية يحرسها النحل .

٣٢٨٧ - برشاوشان Adiante capillaire (F).

اطلب كزبرة البير . Maidenhair (E).

٣٢٨٨ - برشك

برشك الجدوز: فصلها وأبان بعضها من بعض .

٣٢٨٩ - برسوم

البرشوم: نوع من نخل البصرة وهو أبكر النخل ثمرأ .

٣٢٩٠ - برص

يقال برص المطر الارض اذا اصابها قبل حرثها (القاموس).

٣٢٩١ - برصة، برضة Terre inapte à la culture

ارض لا تنبت شيئاً . ج براص .

٣٢٩٢ - برصنوية

Parsonsia (S). Parsonsie (F).

جنس نباتات عارشة تريينية من فصيلة الدفليات . اوراقها معنقة متقابلة رحيمة . ازهارها عشكولي التجميع ، تاجي الارتكاز . ازهارها مستطيلة زنادية جميلة الشكل ، خاسية البتلات ، مستحبة العرف || انواعه المشهورة ثلاثة :

برصنوية جاوا Parsonsie de Java (F).

برصنوية كعبورية Parsonsie capsulaire (F).

برصنوية هائكة Parsonsie hétérophylle (F).

٣٢٩٣ - برطام Lèvre épaisse (F). Lip thick (E).

الشفة الغليظة عند الحيوان . ج براطم .

٣٢٩٤ - برطم، أكالييف Acalypha betulina,

Acalypha fruticosa (S). Acalyphe (F). Cooper leaf (E).

Nesselschön, Zeckel (D). Acalifa (I).

جنية برية وتريينية من سبط البرطميات وفصيلة الفربيونيات . مهدها البلاد الحارة . تزرع للتزيين وهي من النباتات الطبية تفيد المعدة والامعاء .

٣٢٩٥ - برطم هندي Acalypha indica (S).

Ricinelles (F). Acalypha tree, Three seedel mercury (E). Exotisches bingelkraut (D). Ricinella (I).

جنية برية طيبة من البرطميات . منبها الهند يستخلص من اوراقها وثمارها مواد دهنية تستعمل خارجياً في معالجة السلسل وبعض الامراض الجلدية .

٣٢٩٦ - برطميات Acaliphées (F). Acalyphe (E).

سبط من فصيلة الفربيونيات يشمل البرطم والخروب .

٣٢٩٧ - برطوم Poutrelle (F). Stop-plank (E).

البرطوم: خشبة غليظة يدعم بها البيت ويسقف .

٣٢٩٨ - برطيل Ours âgé (F). Elderly bear (E).

البرطيل: الدب المسن .

٣٢٩٩ - برطوليه Burtonia (S). Burtonie (F).



جنس نباتات برية وتريينية من سبط البدلاريات وفصيلة القرليات الفراشية . مهدها استرالية || انواعه عديدة جميعها انجم وجنات بعضها ترييني يزرع لجمال شكله وزهره وبعضها حريف سام قلوي المادة الفعالة .

٣٣٠٠ - برعان * Leuciscus (S). Gardon (F).

جنس اسماك نهريّة وبحيرية من فصيلة الشبابت . انواعه عديدة تعيش جماعات في المياه العذبة . طولها يراوح من ٢٠ الى ٣٠ سم . ظهورها خضراء اللون وردية الموج ، بطونها فضية ، زعانفها الى الخضار الاصفر || اشهر انواعه ثلاثة الابيض والاخضر والاشقر .

٣٣٠١ - برعان أبيض Leuciscus lepidus (S).

Gardon gracieux (F).



براعم مختلفة




برعم أنثائي



برعم خشبي



برعم زهري



برعم وري



برعموت

٣٣١٣ - برعم عرشي Bourgeon adventif (F).
Adventitious bud (E).

هو الذي ينبت في أي مكان من الساق، والفنن والفند.

٣٣١٤ - برعم عريان Bourgeon nu (F).

Naked bud (E).
هي العين أو الزمعة الصغيرة القائمة على ساق أو فرع
بعض الاعشاب لا يحضنها غلاف خاص يميز.

٣٣١٥ - برعم عقيم Agassin (F). Unproductive
lowest bud or shoot on a grape-vine (E).

هو كل برعم لا يثمر ينمو على ساق أو فرع الجفنة.

٣٣١٦ - برعم كاذب، برعم مبسور Bourgeon anticipé, Faux-bourgeon (F). Untrue
bud, False bud (E).

هو كل برعم ينمو في غضون السنة على فنن السنة الجديد.

٣٣١٧ - برعم محوري، برعم جانبي، برعم إبطي Bourgeon axillaire, Bourgeon latéral (F). Axillary
bud, Lateral bud (E).

هو ما ينبت عادة في إبط الأوراق.

٣٣١٨ - برعم نهم، برعم أرضي Bourgeon souterrain (F). Underground bud (E).

هو الذي ينبت عند أسفل الجذع أو على الجذور.

٣٣١٩ - برعم وري Bourgeon à feuilles
Foliage leaf (E).

هي كل زمعة مستطيلة الشكل المخروطي-ينجم عنها ورق.

٣٣٢٠ - برعمعة Ecussonnage (F). Budding (E).

هي التطعيم بالرقعة أو بالعين.

٣٣٢١ - برعمون Ciste cotonneux (F).

هو اللادن الطوطي، اطلبه.

٣٣٢٢ - برغ Salive des reptiles (F).

Saliva of the reptilla (E).

البرغ اللعاب وقد خصص بلعاب الزحافات.

٣٣٢٣ - برغوز، برغوز، برغوز Bourgeon terminal (F). Terminal bud (E).

ولد البقرة وقيل البقرة الوحشية (القاموس). الأنثى برغزة.

٣٣٢٤ - برغشة Moustique domestique (F).

Mosquito (E). راجع بعوضة منزلية.

٣٣٢٥ - برعموت Bergamote (F). Bergamot (E).

عطر يستقفر من زهر وأوراق البرعموت.

٣٣٢٦ - برعموت*، ليمون أصاليا Citrus bergamia (S). Bergamotier (F). Bergamot
orange tree (E). Bergamottenzitrone (D). Berga-
motta (I).

شجرة من البرتقاليات، متوسطة القد، قوية النشاط،
قليلة الشوك. أوراقها أهليلجية معنقة جناحية. أزهارها
مشطية التجميع، كثيرة العدد، صغيرة القد، بيضاء
اللون، فواحة العرف. ثمارها ملساء القشرة، إجمامية الشكل
سميكة اللب، حامزة العصارة || يستخرج من زهرها
عطر البرعموت. أما لبها فيروب.

نوع من البرعمان ينلب فيه البياض يكثر في دجلة والفرات
والعاصي.

٣٣٠٢ - برعمان أخضر Leuciscus prasinus (S).

Vaugeron (F).
نوع من البرعمان ينلب في لونه الخضار الاسمر. يكثر
في بحيرة ليان ونهر الدانوب.

٣٣٠٣ - برعمان أشقر Leuciscus rutilus (S).

Blanchet, Roche, Rousse (F).
نوع من البرعمان ينلب فيه اللون الأشقر الفضي الموج،
يكثر في المياه الفرنسية والألمانية.

٣٣٠٤ - برعمس Chamelle bonne laitière (F).

She-camel a great deal of milk (E).
البرعمس هي الناقة الغزيرة اللبن.

٣٣٠٥ - برعمل Hyenon (F).

البرعمل ولد الضبع. والفرمل أيضاً.

٣٣٠٦ - برعم*، برعمعة، برعموم، برعمومة،
زمعة Bourgeon (F). Bud (E).

هو الجسم الصغير الابتدائي الحالة المخروطي الشكل الذي
يتكون في انبثات عند إبط الورقة ثم ينمو ويفتق عن
قضيبي أو ورقة أو زهرة. وتختلف تسمية البراعم بالنسبة
إلى مواضعها وأوضاعها.

٣٣٠٧ - برعم احتياطي Contre-bourgeon (F).

Reserve-bud (E).

هي العين أو الزمعة الصغيرة البطيئة النمو التي تتكون عند
قاعدة الفنن ومن الحيلة الإبقاء عليها لتجديد الفنن
فيما لو تلفته بعض الموارض.

٣٣٠٨ - برعم التطعيم Ecusson (F).

Slip with bud for grafting (E).

هي العين أو البرعم التي انترعت مع ما يحيطها من لحاء
لتكون طعماً لنبتة أخرى (راجع تطعيم).

٣٣٠٩ - برعم إنتهائي*، برعم طرفي، برعم
هامي، غرنوق إنتهائي

Bourgeon terminal (F). Terminal bud (E).

هو البرعم الذي يتكون عند نهاية الفنن أو القضيبي. فهو
إذا برعم استمرار ومتابعة النمو لذلك يصح نعتة ببرعم
الامتداد.

٣٣١٠ - برعم حترشقي Bourgeon écailleux (F).

Squamous bud (E).

العين أو الزمعة الصغيرة القائمة على ساق أو فرع إحدى
النباتات الليلية أو العشبية المعمرة والتي تحضنها الحراشف
الورقية.

٣٣١١ - برعم خشبي Bourgeon à bois (F).

Wooden bud (E).

كل زمعة مستطيلة الشكل ينجم عنها قضيبي أو أوراق،
وهو بخلاف البرعم الزهري أي الابنة التي تنجم عنها
الزهرة.

٣٣١٢ - برعم زهري* Bourgeon à fleurs (F).

Flower bud, Blossom bud (E). اطلب ابنة.

٣٣٣٩ - برغوث البربوع Mesopsylla eucta (S).
Puce de la gerboise (F).
يركب البربوع ومعظم الحيوانات القاضمة .

٣٣٤٠ - برغوث حاشف Sarcopsylla penetrans (S).
Puce pénétrante, Chique (F). Jigger flea, Chigoe (E).
ويقال له البرغوث الحارق والنافذ والثاقب وهو ينخر الجلد ويدب تحته ليتمتع ببيضه .

٣٣٤١ - برغوثيات Pulicidae (S). Pulicidés (F).
Pulicidae (E).
فصيلة البراغيث من رتبة القذانيات وطبقة عديمات الجناح.
اجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها صغيرة القد . اجسامها
حشرية مضغوطة الجانبين . قرونها الاستشعارية مثدونة
الطول ثلاثية الفواصل تقم في تجاويف خاصة مركزها
وراء العينات . اخطامها مستطيلة تنتهي بمشاك ثاقبة
ماسة . قوائمها كبيرة قوية معدة للقفز .

٣٣٤٢ - برغوثون Perigona (S).
Périgone (F). Perligna (E).
جنس حشرات من فصيلة البرغوثيات ورتبة غمديات
الاجنحة . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض مناطق
البلاد الحارة والاستوائية || اجسامها صغيرة ، معتدلة
التخطيط ، طول من ٣ الى ٤ مم . رؤوسها صغيرة . عيونها
ناشرة . تأثيرها وفكوكها قياسية . ملامسها مهدبة الاطراف .
قرونها الاستشعارية قلادية الشكل . كواسلها واعنادها
مصدقة . بطونها مفلطحة . اعنادها لاحفة ، مهدبة الختار .
قوائمها نشطية . اثوابها تراوح بين الكستني والجووي ||
الحشرة الجمالنة حابة ودائمة . البرقة دائمة .

٣٣٤٣ - برغوثيات Perigonidae (S).
Périgonidés (F). Perigonidae (E).
فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها
المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد الحارة
والاستوائية || اجسامها صغيرة تطول من ٢ الى ٥ مم .
رؤوسها صغيرة ، شبه مزوانية الشكل . عيونها كبيرة ،
ناشرة . تأثيرها وفكوكها قياسية . ملامسها هليية الاطراف .
قرونها الاستشعارية قلادية الشكل ، مركبة من ١١ فصلة .
كواسلها واعنادها مصدقة . اعنادها مهدبة الختار || جميع
انواعها دائمة وتعيش على الجذور والحبوب وسائر المواد
النباتية المطبوعة || اشهر اجناسها البرغون

٣٣٤٤ - برغوثان Perfektan
حاشور زراعي يرتكز على مادة الليندان وهو جزيل
النفع ، شديد الوقع ، يقضي على معظم الحشرات الضارة .
له نوعان تجاريان السائل والمسحوق . فالسائل يحوي
٢٣ ٪ من الليندان الفعال ويستعمل نضجاً على النباتات
والمسحوق يحوي ٧٠ ٪ من الليندان الفعال ويستعمل
تغصيراً .

٣٣٤٥ - برغوث Brephos (S).
Bréphos (F). Brephos (E).

جنس حشرات فراشية من حشرغيات الاجنحة وفصيلة
النسقيات . انواعه المعروفة قليلة العدد معظمها من فراشات
الشرق الاوسط واروبة || يرقاتها خاضعة تعيش على مختلف
الاعضاء النباتية || اشهر انواعه واضرها برغوث البتولا
(Br. Notha) يرقته نهمه تركب البتولا فتؤذيها وتعطب
الشجير والخشب .

٣٣٢٧ - برغوث بري Bergamote sauvage (F).
Wild bergamot (E).
اطلب نعنخ الخيل .

٣٣٢٨ - برغوث
البرغوث هو ولد البقرة الوحشية .

٣٣٢٩ - برغوث Pulex (S). Puce (F). Flea (E).
جنس حشرات صغيرة وخازة مؤذية من فصيلة البرغوثيات
تمتص الدم من جسم الانسان والحيوان وتنقل اليه الامراض
الميكروبية ومنها الطاعون || كنيته ابو طافر ، ابو عدي ،
ابو الثواب ، طامر بن طامر || والبراغيث انواع منها ما يلي .

٣٣٣٠ - برغوث الإنسان ، برغوث عذام
Pulex irritans (S). Puce de l'homme (F). Irritating
flea (E).
هو البرغوث المعروف يعيش في الاماكن القذرة يقتحم
الانسان وينقل الامراض الخبيثة اخصها الطاعون .

٣٣٣١ - برغوث البحر ، نغروب
Nephrops (S). Néphrops, Langoustine (F).
دوية من القشريات عشاريات الارجل طويلة الذيل .
موطنها يمتد من البحر الابيض المتوسط الى المحيط الاطلسي .
يكثر وجودها قرب شواطئ الجزائر || تتميز بنحالة
الجسم والقوائم ، باستطالة وضخامة الملاقط ، وبدقة
واستطالة القرون الاستشعارية . طولها يراوح من ٢٧ الى
٣٠ سم . ثوبها متراكب الجووي والاحمر والازرق والبرتقالي
والبنّي الاصفر الموج || تعتبر من الانواع الجيدة الصنف .

٣٣٣٢ - برغوث البساتين Puce des jardins (F).
برغوث البساتين وبرغوث الخضر وبرغوث الملفوف ...
انواع من الدقة اي الاتيز ، راجع دقة .

٣٣٣٣ - برغوث السمك Puce des poissons (F).
هو الارغول ، دوية من القشريات الدنيا . اطلبه .

٣٣٣٤ - برغوث السنور Pulex felis (S).
Puce du chat (F). Cat flea (E).
يعيش على جميع السنوريات اخصها القط .

٣٣٣٥ - برغوث الطيور الداجنة Pulex ovium (S).
Puce des oiseaux de basse-cour (F). Poultry flea (E).
يركب جميع الطيور الداجنة فيؤذيها .


٣٣٣٦ - برغوث الفار Xenopsylla cheopis (S).
Xenopsylla, Puce des souris (F). Xenopsylla, Mouse
flea (E).
يركب الفار والجردان .

٣٣٣٧ - برغوث الكلب Ctenocephalus canis (S).
Puce du chien (F). Dog flea (E).
يركب الكلب ويؤذي .

٣٣٣٨ - برغوث الماء Daphnia pulex (S).
Daphnie, Puce d'eau (F). Water beetle (E).
نوع من الدوبيات الصغيرة المائية ينتمي الى القشريات .
يعيش جماعات في المياه الحلوة الراكدة وهو احمر اللون
قريب الشبه من البرغوث ويقفز مثله ولذلك سمي برغوث
الماء .



برغوث



برغوث البحر



برغوث الماء



برغوث



برغوث



برق



برقش مبدول




برق



برق البر



برقونية



بركة

انواعه عديدة جميعها شجيرات وجنات . اعطانها البلاد الحارة . اوراقها متعاقبة مركبة وثرية التجميع ، وريقاتها صغيرة بارزة العروق . ازهارها نورية خماسية التركيب . ثمارها مأكولة تشبه البرقوق شكلاً وحجماً || اشهر انواعه ما يلي .

٣٣٥٥ - برقوق البر الاحمر ، برقوق اسبانيا

Spondias purpurea, Spondias mombin (S). Spondias d'Espagne, Prunier d'Espagne (F). Spanish plum, Red mombin (E).

٣٣٥٦ - برقوق البر الحلو

Spondias dulcis (S). Spondias doux, Pomme cythère (F). Sweet mombin, Caja manga (E).

٣٣٥٧ - برقوق شائك ، خوخ شائك

Prunus spinosa (S). Prunier épineux, Prunellier, Epine noire (F). Sloe tree, Black thorn, Bullace (E). Schlehenpflaume (D). Prugnolo, Pruneillo, Spina florita (I).

شجيرة برية فرعاء شائكة من الخوخيات وفصيلة الورديات . منبتها شرقي حوض البحر المتوسط . تعلو من ٢ الى ٣ امتار . افنانها زياء اللحاء . اوراقها صغيرة . ازهارها فردية التجميع ، بيضاء اللون ، وردية التوشيح || ثمارها صغيرة القدر كروية الشكل طولها نحو ٢ سم .

٣٣٥٨ - برقوقية

Pariconia جنس فطور مجهرية من اللدخيات وفصيلة اللطحيات . مشيجه مداد قليل الكثافة والوضوح . جربه الكنيديّة بسيطة التركيب تحمل في اطرافها شفيرات رافعة تعلوها كنانة كروية الشكل ، فردية التجميع ، عابقة الالوان . انواعه عديدة معظمها رمي يعيش على المواد النباتية المنحلة .

٣٣٥٩ - برقي ، ضيفن

Parasite (F). البرقي هو الطفيلي من الفطور والنبات . اطلب ضيفن .

٣٣٦٠ - بركار

Circé (F). Circinus (E). البركار كوكب سيار من الخنثى يحمل رقم ٣٤ .

٣٣٦١ - بركار

Compas (F). Compass (E).

٣٣٦٢ - بركان

Volcan (F). Volcano (E). البركان فجوة في جوف الارض تتصل بالقشرة الارضية بواسطة ثغرة ضيقة تنتهي بفوهة تندفع منها عند الثوران غازات ومعادن مصهورة ملتهبة تعرف بالطفح .

٣٣٦٣ - بركاني

Volcanique (F). Volcanic (E). راجع ارض بركانية وحرّة .

٣٣٦٤ - برمكة ، بط خضاري ، شريف خضري

Anas platyrhynchos, Anas boschas (S). Canard colvert (F). Mallard, Wild duck (E).

طائر بري من فصيلة البطيات . اصغر من البط الاهلي . ثوبه متراكب الالوان الجميلة يغلب فيها الاخضر والاطحاحل . موطنه فسيح الارحاء يشمل البلاد الاسيوية والافريقية والاوربية التي يحوب بعض اصقاعها كل عام . يألف المياه العذبة . يعيش جماعات كثيرة العدد . يدن في اعشاب المناطق والهور . الانثى تحضن وحدها نحو ٤ اسابيع من ١٢ الى ١٦ بيضة .

٣٣٤٦ - برقء

Brebis pie noire (F). البرقاء هي الشاة التي يشق صوفها الابيض طاقات سود . الذكر ابرق .

٣٣٤٧ - برقانيات

Polynéoptères (F). Polyneoptera (E).

شعبة حشرات من طائفة المجنحات اصلاً تشمل ثلاث طبقات وتسع رتب والكثير من الفصائل وعدة الاف من الاجناس والانواع || طبقاتها الثلاث هي جلديات الجناح ومستقيبات الجناح والوردانيات || اما رتبها فهي جلدية الاجنحة ومستقيمة الاجنحة والجلفسيات والفصصيات والاشيانيات واللؤلؤيات والسرفيات والعقانيات والسردانيات .

٣٣٤٨ - برقفة

Hydnum imbricatum (S). Hydne imbriqué (F). Barbes (E). Braca-Baca (D). Penchenilio, Poncherillo (I).

فطر من الابريات ورتبة الدعاميات . وهو من الفطور الصالحة للاكل || ساقه غليظة قصيرة تعلو الارض من ٥ الى ٨ سم . ارسوسته رمادية اللون مستديرة الشكل حشوية الصفحة العليا ، قطرها يراوح من ١٠ الى ١٥ سم . حراشفها حنطية || لبابه وافر السماكة جامد المقطع اسمر اللون مر الطعم قبل طبخه || يكثر وجوده في احراج الصنوبر . يظهر في آب ويبقى حتى تشرين الثاني .

٣٣٤٩ - برقش ، شرشور

Fringilla (S). Pinson (F). Finch (E).

جنس عصافير من الجواثم المحروطيات المناقير . انواعه عديدة تشبه الدوري لكنها اكبر قدماً . اثنائها متداخلة الالوان . جوانحها مستطيلة . اذنانها فارقة . ارساغها نحيلة . اناثها اصغر قدماً من ذكورها . وهي من القواطع تألف الغابات والحدائق والبراري قوتها البزور البرية وبعض الحشرات والهور . تدن في الاشجار الظليلة اناثها تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمنابرة الذكور || اشهر انواعه ثلاثة وهي :

٣٣٥٠ - برقش الاحراج

Fringilla montifringilla (S). Pinson des ardenes (F). Brambling, Mountain finch (E).

٣٣٥١ - برقش الثلج

Fringilla nivalis (S). Pinson des neiges, P. niverolle (F). Alpin finch (E).

٣٣٥٢ - برقش مبدول

Fringilla coelebs (S). Pinson commun (F). Chaffinch (E).

٣٣٥٣ - برقوق ، خوخ بري

Prunus insititia, Prunus salvaticus (S). Prunier sauvage (F). Wild prune tree (E). Wilder haus-pflaume (D). Prugno salvatico (I).

شجيرة برية فرعاء شائكة من الخوخيات وفصيلة الورديات . منبتها حوض البحر المتوسط . تعلو من ٣ الى ٧ امتار . افنانها وافندها زياء اللحاء . ازهارها ثنائية او ثلاثية التجميع ، بيضاء اللون . ثمارها شبه كروية طولها نحو ٣ سم . لونها بنفسجي .

٣٣٥٤ - برقوق البر ، اجاص البر

Spondias (S). Spondias, Mombin (F). Spondias, Mombin, Hog plum tree (E). Mombin, Monbinbaum (D). Spondio, Susinastro (I).

جنس نباتات حرجية وزارعية من فصيلة الراتنجيات .

Amphibie (F). **برمائي، قازب** ٣٣٧٨-
Amphibious, Amphibian (E).
البرمائي أو القازب، هو كل حيوان مسكنه الماء ولكنه يستطيع الخروج منه بعض الوقت كالقمة وفرس البحر والتساح.

Programmer (F). **برممج** ٣٣٧٩-
To program (E).
وضع البرامج.

Programmation (F). **برمجة** ٣٣٨٠-
Programming (E).
البرمجة التحديد المسبق لتنسيق العمل وكيفية تبسيطه ونشره.

Parmentiera (S). **برمنتيرة***، **برمنتيرا** ٣٣٨١-
جنس اشجار متوسطة القد من فصيلة البنوليات. مهدها المناطق المعتدلة الأمريكية. سوقها ملساء اللحاء. اغصانها متشعبة الافناد. اوراقها معنقة مركبة. ازهارها محورية الارتكاز. ترمع على الاغصان والافناد. انواعها قليلة اعرفها:

Parmentiera edulis (S). **برمنتيرة مأكولة** ٣٣٨٢-
ثمارها قرون لحمية اسطوانية مستطيلة مأكولة اللب.

Parmentiera cereifera (S). **برمنتيرة شمعية** ٣٣٨٣-
ثمارها قرنية يستخرج من بزورها مادة شمعية شائعة الاستعمال الصناعي.

برمغنات البوتاس ٣٣٨٤-
Permanganate de potasse (F). Potassium perman-ganate (E).
هو ملح الحامض البرمنغنيكي مع البوتاس. وهو من المطهرات الزراعية الفعالة الشديدة الاثر.

Perminvar (F). Perminvar (E). **برمينفار** ٣٣٨٥-
مركب معدني يحوي ٣٠٪ من الحديد و ٤٥٪ من النيكل و ٢٥٪ من الكوبلت. رغبته المغنطيسية المرتفعة تجعله شائع الاستعمال في صناعة الكلل المغنطة.

Sisyrinchium (S). **برمودية*** ٣٣٨٦-
Bermudienne (F). Eyed grass (E).
جنس نباتات جاذورية معمرة من فصيلة السوسنيات. انواعه زهاء ٥٠ معظمها امريكي المنبت. جذورها ليفية. اوراقها مزدوجة التصفيف. ازهارها ضمية التجميع. شرعائها ثنائي المصراع || ترغب في الاتربة الخصبة المتوسطة الاندماج والرطوبة. اعرفها ما يتبع.

برمودية البرمود ٣٣٨٧-
Sisyrinchium Bermudianum (S). Bermudienne des Bermudes (F). Blue eyed grass (E).
نوع من البرمودية، ساقها شراخية، مفلطحة، منتصبه. تملو نحو ٢٥ سم. اوراقها قرصية الانتشابه تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. وتعرض نحو ٦ مم. ازهارها هامية الارتكاز، متوسطة القد، لونها الى الزرقاء الجميلة. ازهارها يستمر من ايار الى تموز.

برمودية كبيرة الزهر ٣٣٨٨-
Sisyrinchium grandiflorum (S). Bermudienne à grandes fleurs (F).
نوع من البرمودية، ساقها شراخية، اسطوانية، نحيلة

Mare (F). Pool, Pond (E). **بركة** ٣٣٦٥-
وهذه طبيعية او اصنع اليد مكشوفة تجمع وتحصر فيها المياه للاستفادة منها. وقد تدعى حوضاً عندما تخصص لتربية الاسماك.

Barkeria (S). Barkérie (F). **برمكريه*** ٣٣٦٦-
نبات استحي وحيد الجنس والنوع من السحليات الجوليات. مهدها المكسيك || تعيش طفيلية. سوقها شراخية. اوراقها حاضنة عصفية النصال، حيلة الخضار المزتر بالجقوي. ازهارها معنقة، كبيرة، عاجية اللون يعاوها موج وردي.

بركشت، سوار الهند ٣٣٦٧-
Helicteres Isora (S). Hélictere, Isore (F). Isora, Screw tree, Twisted horn (E). Isora helictère (D). Isora (I).
جنس اشجار وجنات برية ويزينية من فصيلة الخبازيات مهدها البلاد الأمريكية والهند. انواعها المعروفة نحو ٣٠ معظمها بري وبعضها تزييني. اوراقها كاملة لا قياسية الارتكاز. ازهارها خنثوية ابطية الارتكاز نورية التجميع.

Perchlorate **بركلورات** ٣٣٦٨-
هو ملح الحامض ملظير كلوريكي. اشهر هذه الاملاح بركلورات البوتاسيوم.

Perchlorure (F). Perchloride (E). **بركلوريد** ٣٣٦٩-
هو الكلوريد الذي يحوي اكبر كمية ممكنة من الكلور.

Volcanologie (F). **بركنة** ٣٣٧٠-
Volcanology (E).
البركنة علم يبحث في الظواهر البركانية ومسبباتها.

Parkia (S). Parkie d'Afrique (F). **بركيسه*** ٣٣٧١-
شجرة دائمة من فصيلة القرنيات السنطية. منبتها بعض الاقطار الافريقية. ساقها غليظة، اغصانها فارشة، ارتفاعها يبلغ نحو ١٥ م. اوراقها ريشية ثنائية المشط. ازهارها زنادية ٤ ناحية الارتكاز، حمراء اللون. ثمارها قرنية، قرونها مفلطحة، طويلة، تضم عدة حبوب صغيرة مستديرة تستعمل استعمال البن.

Xénopele (F). **بركسيل** ٣٣٧٢-
البركسيل حية بيوض عادمة السموم تدعى حذابة. اطلبها.

Ophisure serpent (F). **بركسيل السحندر** ٣٣٧٣-
هو رستان البرق، من الاسماك البحرية، اطلبه.

Brachyure **بركسيورس** ٣٣٧٤-
هو الاواكاري، جنس قروء من فصيلة السبوسيات.

Berlandieri **برلندي ياري** ٣٣٧٥-
نوع من الاجفان البرية الاصل تستعمل كامهات لانها قوية النشاط والمناعة.

برم ٣٣٧٦-
البرم: ثمر الغضاه. الواحدة برمة. وقيل ثمر الطلح. والبرم: حب العنب اذا كان مثل رؤوس الذر.

Barrémien, Urgonien **برماني، أرغوني** ٣٣٧٧-
ساف من الطبقة الطباشيرية مركزه تحت الأبناسي وفوق النكوبي.



بركيا



بركيا



برمنتيرة



برمودية




برمورس



برناسية



برناسية



برنة



برنق



برنوف

مناطق جبال البلاد المعتدلة الحرارة والباردة || سوقها مقرة .
اوراقها قرصية الانتشاب ، مستطيلة الاعناق ، كلوية
النصال الصغيرة الجرداء البشرة . ازهارها فردية ، خاسية
البتلات ، تتركز على شوايخ محوفة مستطيلة . ألوانها
تختلف مع الانواع ، يسود فيها الاصفر || ثمارها جراء
عديدة البزور ، متفلة ، ثلاثية المصارع او رباعيتها .

٣٣٩٧ - برناسيات *
Parnassiaceae (S).
Parnassiaceae (E). Parnassiaceae (F).

فصيلة نباتية من مزدوجات الفلقة ، مستقلات القعالات .
اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من نبات
المناطق الباردة والمنحرفة نحو المعتدلة || أشهر اجناسها
البرناسية .

٣٣٩٨ - برناسية *
Camptolaimus (S).
Camptolaime (F).

جنس طير من كفيات القدم وفصيلة صفيحيات المناقير .
انواعها المعروفة ثلاثة اعطائها البلاد القطبية || اجسامها
متوسطة الحجم ، كبيرة الاجنحة ، قصيرة الاذناب .
مطوقة الاعناق . يغلب فيها اللون الابيض ومنها الشهباء ||
اشهر انواعها واعرفها برناسية لبرادور (C. Labradoricus).

٣٣٩٩ - برنة *
Perna (S). Perne (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم
عادات المشايخ وفصيلة الاطيريات . انواعها المعروفة نحو
٥٠ منتشرة في معظم بحار المناطق الحارة || اصداؤها متباينة
الاشكال والاحجام ، لاقية المصارع . مفصلاتها
عامة الاسنان || تعيش لاصقة بالصخور البعيدة الغور .

٣٤٠٠ - برنق
Ribellier (F). Embellia (E).

اطلب برنق .

٣٤٠١ - برنق جاسف
Armoise commune (F).
Mugwort (E).

راجع شويلاء .

٣٤٠٢ - برنق ، وكن *
Parenchyme (F).
Parenchyma (E).

هي نسج الاغذاء والخشب في نصل الورقة من كل نبات .

٣٤٠٣ - برنق * ، برنق
Embellia (S).
Embellie, Ribellier (F). Embellia (E). Ribellie (D).
Embellia (I).

جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة اجناحيات . اعطائها
البلاد الاسيوية الاستوائية . انواعها المعروفة نحو ٢٠
جميعها جنات ومعرشات . اوراقها متعاقبة ، كاملة ،
جلدية النصل . ازهارها عنقودية التجميع ، محورية
الارتكاز او تاجية . ثمارها نووية وحيدة العجمة || أشهر
انواعها الزراعية البرنق الكابل . ثماره مأكولة وترب .

٣٤٠٤ - برنوف * ، شهابانج ، طباق البراغيث ،
راسن البراغيث

Inula conyzoides, Pulicaria odora (S). Aunée co-
nyze, Herbe aux puces (F). Flea-wort, Flea-bane,
Ladies' Gloves (E). Dürnwurz, Grosses flöhkraut (D).
Incensario, Erba della pulci (I).

نوع من الراسن وهو نبات عشبي بري طلي معمر من
فصيلة المركبات الانبوية الزهر . ينبت في جميع مناطق
الشرق الاوسط . ساقه فرعاء فناء . اوراقه حاذئة ، متعاقبة ،

منتصبه تعلو من ٢٠ الى ٣٠ سم . اوراقها سنانية النصل
الضيق الصفحة . ازهارها كبيرة القد ، جرسية الشكل ،
متدلية . لونها الى الازجواني العابق || ازهارها يستمر من
ايار الى حزيران .

٣٣٨٩ - برمورية مخططة
Sisyrinchium striatum (S).
Bermudienne striée (F).

نوع من البرمورية ، ساقها شمراخية ، مفلطحة ، منتصبه .
اوراقها سنانية ، نصلها ضيق الصفحة المخططة . ازهارها
سنانية التجميع ، كبيرة القد ، صفراء اللون ، موشحة
بالبنفسجي || ازهارها صيني وخريفي .

٣٣٩٠ - برمورية نجيلة

Sisyrinchium graminifolium (S). Bermudienne
graminoïde (F).

نوع من البرمورية . ساقها شمراخية ، مفلطحة ، منتصبه ،
تعلو من ٢٠ الى ٤٥ سم . اوراقها عصفية الشكل . ازهارها
صفراء اللون يعلوها تبقيج احمر || ازهارها يستمر من
نيسان الى حزيران .

٣٣٩١ - برمورية نخلية الورق

Sisyrinchium palmifolium (S). Bermudienne à
feuilles de palmier (F).

نوع من البرمورية . ساقها شمراخية ، مفلطحة ، منتصبه ،
اوراقها قرصية الانتشاب نخلية الشكل . ازهارها ضمية
التجميع ، هامة الارتكاز ، صفراء اللون موشحة بالحنطي .
ازهارها صيني .

٣٣٩٢ - برنوس * ، نضارية الكرمة ، خنفساء

Bromius obscurus villosulus, .
Eumolpus vitis, Adoxus obscurus (S). Eumolpe de
la vigne, Ecrivain, Gribouri, Diablotin, Bête à
forge, Bête à café (F). Western grape rootworm (E).
Weinstock-Falkkäfer (D).

خنفساء صغيرة من فصيلة النضاريات . طولها نحو ٥ مم .
مجدودة الشكل ، لونها الى السواد الفحبي || يرقها صغيرة
دقيقة تركب اوراق الكرمة وعنها ولا تمف عن الجذور
فتسرد نخبها وقد تقضي عليها || تكافح عند ظهورها باستعمال
احد الحواشير الفعالة نفساً على الكرمة .

٣٣٩٣ - برمني
Permien (F). Permian (E).

نعت تعريفية يطلق على الحقبة الخامسة والاخيرة من الاباج
القديم . فيقال العصر البرمي والاراضي البرمية . وكلمة
برمي منسوبة الى بلدة « برم » الروسية الواقعة على نهر
« كاما » الذي يصب في نهر « الفولغا » || تتميز هذه
الحقبة بانقراض الاسماك صفيحيات الجلود ، وبكثرة
الرخويات اغصها عضديات الارجل ، وبازدهار مستورات
الزهر الوعائية وعريانات البذور .

٣٣٩٤ - برميل
Baril, Barrique, Tonneau (F).
Small barrel, Cask, Tun (E).

وعاء من خشب او حديد يستعمل لحفظ السوائل ونقلها .

٣٣٩٥ - برميل الخمر ، دن
Fût (F). Barrel (E).

وعاء من خشب يستعمل ما لا يقل عن مائة لتر تحفظ
وتنقل فيه الخمر .

٣٣٩٦ - برناسية *
Parnassia (S). Parnassie (F).

جنس نباتات عشبية معمرة برية وزراعية تزيينية من
فصيلة البرناسيات . انواعها المعروفة نحو ١٥ . اعطائها

غداها متتابعاً التحزير القاطب . ارساغها خاسية العقل ||
الانثى امير قدأ من الذكر وابته ثوباً منه واضخم بطناً ||
لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواسط
الربيع وتعيش حتى اواخر الصيف . تسرح في الليل وتبيت
في النهار || البرقة التي تدرك الكمال الجسموري بعمر ستة
اشهر تطول نحو ١٥ مم . جسمها شبه اسطوانتي الجرم ،
قليل التقويس ، سداسي الرواجب ، اطحل اللون ، صغير
الرأس المكور الاسمر || طور الأكمال الذي يستمر نحو
ثلاثة اسابيع ينقضي ضمن صلتجة خاوية الغشاء السميك
المركب من مواد نباتية معجونة بالريال .

٢٤١٦ - برهوسيات ٥
Byrrhidae (S).
Byrrhidae (F). Byrrhidae (E).

فصيلة حشرات دامتة من رتبة غمديات الاجنحة || اجناسها
وانواعها قليلة العدد . مهدا معظم مناطق البلاد المعتدلة
الحارة . تألف الاراضي المذحاة والرملية على السواء .
تعيش مختبئة تحت الحجارة والطحالب والجشالة وقشور
الاشجار وعندما تشعر بخطر مداهم تدخل رؤوسها تحت
كواسلها وتقلص جوامزها في اخاديدها البطنية المعدة
لضمها || اجسامها صغيرة القد ، بيضية الشكل ، مسترة
الرؤوس ، جشحة الزباني المركبة من ١١ فصلة . كواسلها
محدودة . اغمادها مخددة لاحقة . جوامزها نشيطة . ارساغها
خاسية العقل || اشهر اجناسها البرهوس .

٢٤١٧ - بروار دومينيكي ٥
Paoaria dominicana (S).
Paoare dominicain (F).

طائر من البروار ينتمي الى فصيلة الشرشوريات . موطنه
المناطق الحارة من البرازيل . يألف الغابات والادغال
وضفاف مجاري الماء . نظامه الحياتي جماعي . فوجه يعد
من ٣٠ الى ٦٠ زوجاً || جسمه صغير القد يطول نحو
١٨ سم . ثوبه العلوي الى الشبهة السبورية العابقة . ثوبه
السفلي الى البياض الاغبر . رأسه وقزله وعنقه الى الحمرة
الدموية . زفده اسود . منقاده شديد السمرة . رسغاه الى
السمرة القاتمة || طيرانه خفيف الحركة ، سريعها ،
معتدل الشوط . قوته التار العنينة والبذور والحشرات . يألف
حياة الاسر ويعيش ويتكاثر في القفص || يدثن عشه
في الادغال . الانثى تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها
بمناوبة الذكر نحو ١٣ يوماً .

٢٤١٨ - برواق، بروق، سريش
Asphodelus (S).
Asphodèle, Baton royal (F). Asphodel, King's rod,
Silver rod (E). Kaïseraffodill, Kaïser scepter (D).
Asphodillo, Cibo regio, Asta regia (I).

جنس نباتات عشبية ترابية معمرة من فصيلة الزنبقيات .
سوقها شمراخية تغلفها اوراق متتابعة ، لحية النسيج ،
دقيقة النصل ، مستطيلة . ازهارها عنقودي التجميع ، هامي
الارتكاز . ازهارها سداسية التركيب والتقسيم . رائحة
الجمال ، هية || اشهر انواعه الثلاثة التالية .

٢٤١٩ - برواق أبيض
Asphodelus albus (S).
Asphodèle blanc (F).

٢٤٢٠ - برواق أصفر
Asphodelus luteus (S).
Asphodèle jaune (F).

٢٤٢١ - برواق مدّاد
Asphodelus ramosus (S).
Asphodèle rameux (F).

رجية الشكل . فصلها ازغب البشرة اللزجة . ازهاره صفراء
اللون ، مرة المذاق ، عطرية الرائحة .

٢٤٠٥ - برني
Cochelet (F). Cockerel (E).
البرني ج براني : الديكة الصنار حين تدرك .

٢٤١٦ - برنيق
Hippopotame (F).
Hippopotamus (E).
هو فرس البحر . اطلبه .

٢٤٠٧ - برنيق
ضرب من الكأة . والبرنيق هوتقن النهر ورسابة الماء فيه .

٢٤٠٨ - برهان*
Porphyrio (S).
Porphyrio (F). Porphyrio, Gallinule (E).

جنس طير من فصيلة التفلقيات . انواعه المعروفة ١٧
معظمها من طيور حوض البحر المتوسط . جميعها كاسرة
قوتها الحيات والعطاء والجردان والفيضان والدويبات والحشرات
وبعض الاعشاب . ترغب في المنافع وتألف جوار الماء .
اثوابها جميلة الالوان الزاهية التي يغلب فيها الارجواني
والبنفسجي والازرق || اشهر انواعه ما يتبع .

٢٤٠٩ - برهان ثخنون
Porphyrio caeruleus (S).
Porphyrio des marais (F). Allen's gallinule (E).

٢٤١٠ - برهان سلطاني، فرحة سلطانية
Porphyrio porphyrius (S). Poule sultane (F).
Green-backed gallinule (E).

٢٤١١ - برهان فرفور، فرفر
Porphyrio chloropus, Gallinula chloropus (S).
Poule d'eau (F). Purple gallinule (E).

٢٤١٢ - برهامة ٥
Périthèle (F). Perihel (E).
اقرب محل لسيارة من الشمس .

٢٤١٣ - برهامة
Frondaison (F).
Foliation, Foliage (E).
جماع ما يعلو هيكل الشجرة من ورق ونور وثمر .

٢٤١٤ - برهنيدي*، كروان الجبل، كروان جبلي
Cedricnemus (S). Cedricnème, Burhinid (F). Stone-
curlew (E).

جنس طير من دجاجيات الارض القواطع . انواعها سبعة .
اثوابها دبسة . مناقيرها وسبقانها مستطيلة . عيونها جاحظة .
اجنحتها ذلقة . اذنانها قصيرة . تسرح في الليل ولها فيه
صوت مانوس || ترتاد المواقع المرتفعة القريبة من الماء .
قوتها الحشرات والديدان . تدثن في الاشجار . اناثها تبيض
وتحضن اربع بيضات من ١٦ الى ١٨ يوماً .

٢٤١٥ - برهوس مستدير ٥
Byrrhus pilula (S).
Byrrhe ové (F). Byrrhus pilula (E).

حشرة دامتة من فصيلة البرهوسيات ورتبة مفدمات الاجنحة .
موطنها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحارة من الشرق الادنى
واروبية . تألف الاراضي المذحاة والرملية على السواء .
خنافسها ويرقاتها تعيش على المواد النباتية المنحلة || جسمها
صغير القد ، بيضي الشكل ، يطول من ٨ الى ١٠ مم .
ثوبها الى السمرة الكستنية الصنابية الموج . رأسها مخروطي
يفور بكامله تحت الكوسل . عينها صغيرتان ماحتان .
زباناها صرلجانيان جشاحان . كواسلها قلنسوي الشكل .



برهان



برهنيدي



برهوس مستدير



بروار دومينيكي



برواق أبيض



برواق مدّاد

هو أدنى مستوى يهبط فيه ماء النهر ، وكل ماء نابع ، في السنة .

٣٤٣١ - بروفاليّة * Browallia (S).

Browallie (F). Browallia (E).
جنس نباتات تزيينية معمرة من فصيلة الخنازيريات ، منبها أمريكية الاستوائية . أنواعها الزراعية ثلاثة البيضاء والزرقاء والبنفسجية . أوراقها متعاقبة معنقة اهليلجية ، نصلها جميل الخضار مدبب العقصة الذرية . أزهارها نوري التجميع طرفي الارتكاز . أزهارها صغيرة القد ، مستطيلة الأنبوب ، جميلة الشكل .

٣٤٣٢ - بروفنيّة Brownée (F).

راجع براونيه .

٣٤٣٣ - بروق Asphodèle (F). Asphodel (E).

راجع برواق .

٣٤٣٤ - بروقة Brunellia (S). Brunellie (F).

جنس نباتات حرجية من فصيلة البروقيات . أنواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض المناطق الحارة والاستوائية || جميعها اشجار فروع معتدلة الارتفاع . سوقها ملساء اللحاء . أوراقها متعاقبة ، قصيرة الاعتق ، اهليلجية النصال ، ناشرة للمروق والاعصاب . أزهارها عشكولي التجميع . أزهارها خشوية ، خماسية البتلات . ثمارها جراء . أخشابها صناعية ، صلبة ، تبنية اللون .

٣٤٣٥ - بروقيّات Brunelliaceae (S).

Brunelliacées (F). Brunelliaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقين مستقلة القعالات . اجناسها وأنواعها قليلة العدد . منبها الطوعي بعض الاصقاع الحارة والاستوائية اخصها أمريكية الجنوبية || جميع أنواعها اشجار وشجيرات تعلو من ٤ الى ١٢ م . أوراقها متعاقبة . أزهارها خشوية . ثمارها جراء عديدة الاخبية || أشهر اجناسها البروقة .

٣٤٣٦ - بروم Brome (F). Bromin, Bromine (E).

عنصر شبه معدني رمزه (بر) يوجد في الطبيعة متحداً ببعض المعادن . وزنه الانعومي ٧٩,٩٢ || وهو سائل لزج ، احمر اللون ، نفاذ الرائحة المهيجة يغلي بحرارة ٥٨,٨° سغ . وهو يزيل الالوان || مركباته عديدة تستخدم في الطب كطهرات ومسكنات وتستخدم في التخفيف وفي التصوير الفوتوغرافي .

٣٤٣٧ - برونشيت Bronchite (F). Bronchitis (E).

هي الزلة الشعبية .

٣٤٣٨ - بروتيّة Asphodeline (S).

Asphodéline (F).

جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة الزنبقيات . أنواعها المعروفة قليلة العدد منبها يمتد من الشرق الأدنى الى بعض مناطق اوروبا || شكلها قريب الشبه من البرواق . سوقها مورقة متتابعة الاوراق تعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم . أوراقها ملسة النصال المحرمة المخزنية الشكل . أزهارها عنقودي التجميع ، طرفي الارتكاز . أزهارها صفراء اللون ، مستحبة العرف الفواح || تنويرها يستمر من نيسان الى ايار .



برودنيه ليتوره



بروفاليه

٣٤٢٢ - بروتايين ، بروتين, Protéine (F). Protein (E).
مادة آسية مركبة تتكون من عناصر مختلفة اهمها الكربون والأزوت . وهي احدى المواد الرئيسية الثلاث التي يتكون منها غذاء الانسان والحيوان فهي اذن ضرورية لنمو الجسم ولتكوين العضلات ولتعويض الاحتراق الداخلي . توجد بكثرة في معظم الحبوب الجافة كالحنطة والعدس والبقول كما توجد في اللحوم والاجبان وبيض البيض .

٣٤٢٣ - بروتن Proton
ذرة كهرباء سلبية .

٣٤٢٤ - بروتوبلازمه ، ودقة Protoplasme (F).

Protoplasm (E).
هي المادة اللزجة الحية الموجودة داخل جدار الخلية النباتية وضمنها السيتوبلازمه التي تحوق بالجلية . وهذه البروتوبلازمه صفات وخصائص عديدة منها : القدرة على تأكسد الغذاء وتمثيله وعلى الحركة والنمو ثم القوة على التكاثر .

٣٤٢٥ - برودة أيار Maialisme

برودة في الطقس تحصل غالباً خلال شهر ايار وقد يعزونها خطأ الى القسر .

٣٤٢٦ - برودنيّة ليتوره * Prodenia litura (S).

Chenille défoliante (F). Cotton worm, Tobacco caterpillar (E). Agyptische Baumwollraupe (D).

يرقها تدعى دودة ورق القطن ، اطلبها || فراشة من فصيلة انفسقيات موطنها البلاد الحارة . طولها يراوح من ١٤ الى ١٧ مم . وبسطها من ٣٠ الى ٣٦ مم . روشناه الاماميان مقطوبان بخطوط طويلة ومعترضة ومزركشة لونها الى الصفار الباهت . روشناها الخلفيان الى البياض الصدي ، عروقها سمر وحثارها كذلك . زبانها خيطية مستطيلة . رأسها وصدرها الى البني العابق . بطنها اغبر ، ترجاته سمر || تسرح في الليل . اناتها تضع من ١٠٠٠ الى ١٥٠٠ مكنة تمتحها على اوراق النباتات العائلة ضمن اجربة وشعية الشكل يتسع الواحد منها الى نحو ٣٠٠ مكنة تنقف بعد متحها بثلاثة ايام في الصيف وبعد اسبوع في الربيع والخريف وبعد ثلاثة اسابيع في الشتاء || يرقاتها تنسلخ خمس مرات ثم تتحول الى عذارى داخل شرافق من الطين || اجيالها اخوية سبعة . عوائل يرقاتها عديدة اخصها القطن والبرسيم والذره والتبغ والبندوره والبطاطا ... كما انها لا تعف عن الكرمة والتين والتفاح والاجاص والخوخ والموز .

٣٤٢٧ - بروز Emergence (F). Emergence (E).

حالة ما هو بارز . اما نقطة البروز فهي النقطة التي يبرز منها الشعاع الضوئي عند خروجه من المحيط الذي يجتاز . وهي كذلك مركز اندفاق مياه الينبوع في الارض .

٣٤٢٨ - بروز الحوشب ، تقوش الحوشب Bouleture (F). Overshot fetlock (E).

عيب يصيب حوشب الخيل .

٣٤٢٩ - بروسين Brucine (F). Brucin (E).

مادة شبه قلوية سامة تستخرج من جوز القي .

٣٤٣٠ - بروض ، تحاريق ، شحاح Etiage (F).

Low-water mark (E).

الى ٤ سم. ثوبها اخضر اللون ، ازرق الموج . تركيب مع يرقاتها جميع اجناس وانواع الصليبيات فتؤذيها .

٣٤٥١ - برّيس الملفوف *
Baris laticollis (S).
Baridie du chou (F).

حشرة صغيرة من فصيلة السوسيات . طولها نحو ٣ سم. ثوبها اسود اللون لامع . تركيب الملفوف وبعض الصليبيات تمتح مكانها على السوق فينقف عن يرقات نحيلة دقيقة تنخر عوائلها وتعيش في السرايب التي تحضرها داخل اللحم.

٣٤٥٢ - برّيسكة شعراء
Beris hirsuta (S).
Bériss velu (F).

حشرة من فصيلة الوطافيات . جسمها صغير القدر خلي القشار ، مبعثر الحلب ، يطول من ٦ الى ٨ سم. رأسها معتدل الحجم ، مستدير القفن . عينها فارتقان . ملاسها صغيرة وقصيرة . زباناها منتصبان ، سداسيا الفصل . صدرها ازرق اللون ، اسفح الموج . حجبها رباعية المناخن الذرية . بطنها سداسي السكم ، صناعي اللون ، اسمر الحيد . روشنها كبيران ، تعلوها مشعة صناعية خفيفة . قوائمها مستطيلة || تألف المواقع التي تكثر فيها الاعشاب والازهار . يرقاتها حنظلة اللون ، سود الرؤوس ، تعيش على المواد النباتية والعضوية المنحلة .

٣٤٥٣ - برّيصة

البريصة: دابة صغيرة دون الوزغة اذا عضت شيئاً لم يبرأ (اللسان) .

٣٤٥٤ - برّيللا
Perilla (S). Pérille (F).

بريللا هو الاسم الهندي . نبات عشبي حولي عطري من فصيلة الشفويات . مهدد بعض اصقاع الهند . يزرع للتزيين ولعرقه القواح || ساقه زبّاء تعلو من ٤٠ الى ١٠٠ سم. أوراقه متعاقبة معتقة سنالية النصال المستدقة القاعدة والظرف . ازهاره فردية ، ابطية الارتكاز ، مستطيلة للمعاليق ، بيضاء اللون ، فوّاحة العرف || تنويره يستمر من تموز الى آب .

٣٤٥٥ - برّيليوم، غلوسينيوم

Béryllium, Beryllium, Glucinium (F). Beryllium (E).
عنصر معدني يكثر وجوده في الزمرد . وهو على شكل بلورات معدنية الموج تحترق في الاكسجين وتشتعل في الفليور والكلور والبروم || رمزه (بي) ثقله النوعي ١٠٧٣ ووزنه الاتومي ٩٠,٠٢ || تراكيبه عديدة يذوب في الحوامض والحوارض . استخدامه الصناعي لا بأس به .

٣٤٥٦ - برّاة
Accipitres, Accipitridés,
Accipitriens, Autours (F). Accipitres (E).

عمارة طير من فصيلة الصقريات تشمل اربعة اجناس : الباز والباشق والزمج والمفرح . جميعها ريمة الجثة ، متوسطة القد ، معتدلة العنق ، صغيرة الرأس . سواقطها معتدلة الاستدارة والطول . زكاتها وارساها مستطيلة . مناسرها قصيرة ، مسنة الحافة ، منعقة البهرة الذرية || اعطائها العالم تألف الاحراج والغابات . وهي شرسة الاخلاق حادة المزاج . قوتها القواضم والزحافات والعصافير وكل حيوان صغير تتمكن منه .

٣٤٥٧ - بزاز العذراء
Hélichryse stœchade (F).
Cassidony (E). راجع امارنطون: نبات عشبي ترابي .

٣٤٣٩ - برّي
Sauvage (F). Savage, Wild (E).
هو في النبات خلاف البستاني او الزراعي وفي الحيوان خلاف الاهلي او الداجن .

٣٤٤٠ - برّي
Terrestre (F).
Terrestrial, Earthly (E).
هو خلاف البحري .

٣٤٤١ - برّيتون
Péritoine (F). Peritoneum (E).
غشاء الكرش .

٣٤٤٢ - برّيد
Tigre (F). Tiger (E).
هو البر ، اطلبه . وقد جاء في الدميري : « ويقال انه متولد من الزرقان واللبوة ومن طبعه ان الانثى منه تلقح من الكريخ ولهذا كان عدوه كالريخ ولا يقدر احد على صيده وانما تسرق جرائده فتجعل في مثل القوارير من زجاج ويركض بها على الخيول السابقة فاذا أدركهم ابوها ألحقوا اليه قارورة منها فيشتغل بالنظر اليها والخيلة في اخراج ولده منها فيفوته بقيتها » .

٣٤٤٣ - برّيسر
Salvadore (fruit) (F).
Salvadore (fruit) (E).
ثمر الاراك حلو مأكول . قال ابو حنيفة : « عنقوده يملأ الكف وله عجمة مدورة صلبة اكبر من الحصص قليلا . الواحدة بريرة » .

٣٤٤٤ - برّيزة، قصفة
Briza (S). Brize (F).
جنس نباتات عشبية برية من النجيليات . انواعه عديدة نحو ٣٠ منتشرة في جميع الاصقاع العالمية المعتدلة الحرارة . اعرف واشهر انواعه الاربعة التالية .

٣٤٤٥ - برّيزة أنيقة*
Briza media (S).
Brize amourette, Amourette (F). Lady's hair, Pearl grass (E). Kleines zittergras (D). Erba brillantina, Tremolina (I).
عشبة معمرة تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. عصفها قرصي التجميع متوسط الطول . سبلتها نحيلة الساق ، هرمية الشكل ، عنقودية . ازهارها بحيلة زرقاء اللون .

٣٤٤٦ - برّيزة صغيرة
Briza minor (S).
Brize petite (F).
عشبة حولية تعلو من ١٥ الى ٣٠ سم. عصفها ضيق مستطيل . سبلتها عنقودية التجميع ، هرمية الشكل بنفسجية الازهار .

٣٤٤٧ - برّيزة كبيرة
Briza maxima (S).
Brize grande (F).
عشبة حولية تعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم. عصفها ضيق النصل مستطيل . سبلتها عنقودية التجميع . ازهارها خضراء اللون .

٣٤٤٨ - برّيزة منتصبة
Briza erecta (S).
Brize dressée (F).
عشبة معمرة تعلو من ٤٠ الى ٨٠ سم. عصفها طويل النصل المريض . ازهارها سنبل الشكل والتجميع .

٣٤٤٩ - برّيزيا
Cécidomyie des feuilles de poirier
راجع طشار ورق الاجاص .

٣٤٥٠ - برّيس أزرق*
Baris cœrulescens (S).
Baridie bleue (F).
حشرة صغيرة من فصيلة السوسيات . طولها يراوح من ٢



بريزة أنيقة



بريس أزرق



بريس الملفوف



بَزَاقَة البَسَاتِين



بَزَاقَة الحَقْل



بَزَبُور



بَزَّة



بَزَّة أَرْجَوَانِيَّة

٣٤٦٥ - بَزَبُور *
Pezoporus (S).

Pézopore (F). Pezoporus (E).

طائر وحيد الجنس والنوع من فصيلة السدافيّات. موطنه تسمانية وأستراليا الجنوبية والغربية. ملجته الحياقي زوجي. يألف المناطق والمواقع الفاحلة. يعدو على الأرض بسرعة ولا يطير إلا نادراً. مسرحه دجوي يستمر من الغروب إلى الفجر. جسمه معتدل القد، مستطيل الذنب، قصير المنقار الأعقف. ثوبه إلى الخضار المتفاوت الماحجات يعلوه تسليج أصفر وأسود. جبهته أرجوانية اللون. يذئب أفحوصه بين الأعشاب المتكاثفة المستعصية. الأنثى تضع أربع بيضات تحضنها وحدها نحو ١٩ يوماً. بينا الذكر يؤمن لها الغذاء.

Zygaena (S).

Zygène (F). Zygaena (E).

جنس حشرات من فصيلة البزيات ورتبة حرشفيّات الاجنحة. أنواعها عديدة جميعها صغيرة القد، اجسامها غابقة الاثواب، زياء الكنف. اجنحتها الامامية إلى السمرة المشبعة بأحد الألوان تعلوها بقع حمراء والخلفية إلى السمرة السوية يحوقها اطار عابق. زباناها صقّية مستطيلة، ملامسها دقيقة، مراهفها طويلة. وهي من الحشرات الثنائية الجيل الحولي. يكوم الذكر انثاه في اوائل الربيع. وتمتص الأنثى مكها المستدير الاصفر اللون الذي يراوح عدده من ١٠٠ إلى ١٥٠ على صفحات الاوراق السفلى او بين شقوق اللحاء. فينقف بعد عشرة ايام او اسبوعين عن يرقات صغيرة زياء البشرة طحلاء الظهر المخطط بالاسود، غبراء البطن سوداء الرأس. يدوم تطور اليرقة نحو ثلاثة اسابيع. تمر بخلها في ثلاثة السلاخات ثم تتحول إلى خادرة ضمن شرنقة مغزلية الشكل غبراء اللون تخرج منها بعد ثلاثة اسابيع حشرة كاملة (فراشة). تعيد سيرتها الاولى ولكنها لا تخرج من سباتها الخلدري إلا في اوائل الربيع. ضررها محصور بما تقوم به اليرقة من نشاط في ثقب والتهام البراعم والزبعات والاوراق. تكافح باستعمال اي حاشور كان من الحواشير الكثيرة العدد التي نترك امر انتقاء احدها إلى الميسور منها. اما اشهر انواع البزة واعرفها واضرها فهي التالية.

٣٤٦٦ - بَزَّة أَرْجَوَانِيَّة * ، بَزَّة الصَّعْتَر

Zygaena purpurais (S). Zygène pourpre.

Zygène du thym (F). Zygaena purpurais (E).

حشرة من فصيلة البزيات ورتبة حرشفيّات الاجنحة. موطنها بعض الاقاليم المعتدلة الحرارة من الشرق الاوسط إلى اوروبا. فراشتها جارية قوتها رحيق الازهار. سرفتها خاضلة قوتها اوراق الصعتر وزبعاته. جسمها متوسط القد يطول نحو ١٥ مم. بسطتها نحو ٣٦ مم. رأسها معتدل الجرم. عينها صغيرتان فاشرتان. زباناها صقّيان مستطيلان، نجوشنها وبطنها إلى الكستني الاسفع الموج. روشتها الاماميان إلى الطحلة المشبعة بالاحمرار الأرجواني. حنارها مطوّق بالاسود. روشتها الخلفيان إلى الحمرة الارجوانية يحوقها اطار ضيق اسود. لها جيل واحد في الحول. تظهر الفراشة في ايار وتبقى حتى تموز. تسرح في النهار. تعازل بعد ظهورها بنحو خمسة اسابيع وتمتص المكن مباحداً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق. السرفة عند بلوغها الادراك الثام تطول من ٢٨ إلى ٣٠ مم. جسمها شبه اسطواني الشكل. ثوبها إلى الطحلة يعلوها موج اسمر

Cobra cracheur (F).

٣٤٥٨ - بَزَاق

البزاق حية سرلودة سامة مؤذية تدعى عطف نفثات. اطلبه.

٣٤٥٩ - بَزَاق Limax (S). Limaces (F). Slugs (E).

جنس حيوانات من الرخويات وفصيلة البزاقات. انواعه عديدة اعرفها:

Limax arion rufus (S).

Limace rousse (F). Reddish slug (E).

Limax maximus (S).

Limace grande (F). Great slug (E).

البزاق الاغر

البزاق الكبير

٣٤٦٠ - بَزَاقَة البَسَاتِين *

Limax arion hortensis (S).

Limace des jardins (F). Black field slug (E).

نوع من البزاق. دوية من الرخويات عادمات الفقار تنتمي إلى فصيلة البزاقات. جسمها نابض، يطول نحو ٤ سم. محدب الصفحة العليا، منبسط المدب. قشورها مشبك الغشاء يعلوه قرب الرأس درع كلبي المسادة، غصروفي الغشاء، محدودب كالضهارة، مثقوب الجانب الايمن، يلحف التجويف الخيشومي. ثوبها إلى الشقعة السمر. رأسها وملامسها إلى السمرة السوداء. ملامسها العلويان كبيراً القد يشبهان بعينين مكورتين. ملامسها السفليان قصيران دقيقان. خطمها قاصم. تألف البساتين والمباقل. قوتها المواد النباتية المختلفة اخصها نواصي البقول واوراقها الفتية. وهي كالحلزون من الدويبات الخشوية التي تحمل الاعضاء التناسلية الذكرية والانثوية في آن واحد. تبيض في اوائل الربيع من ٧٠ إلى ٨٠ بيضة تنقف بعد اربعة اسابيع. وهي تفرز عند الشعور بالخطر مادة فوارة حامضية التركيب كريمة الرائحة تبعدها عنها الاعداء. وتفرز ايضاً عند زحفها على بعض الاتربة وعلى القش والاوراق مادة لعابية لزجة تمكها من الدب على السطوح المتحركة.

٣٤٦١ - بَزَاقَة الحَقْل * Agriolimax agrestis (S).

Limace des champs, L. agreste (F).

Grey field slug (E).

نوع من البزاق. دوية من الرخويات عادمات الفقار تنتمي إلى فصيلة البزاقات. جسمها يطول نحو ٦ سم. وهو كبزاق البساتين محدودب الصفحة العليا يعلوه درع مثقوب يلحف التجويف الخيشومي. ثوبها إلى الكهبة تعلوها رقشة سمر. رأسها وملامسها أعقب ماجة من ظهرها. مدبها اغبر اللون. تألف المراعي والحقول. قوتها المواد النباتية. وهي خشوية كسائر انواع البزاق. تبيض في اوائل الربيع من ٨٠ إلى ١٠٠ بيضة تنقف بعد اربعة اسابيع.

٣٤٦٢ - بَزَاق Limacien (F). Slugging (E).

نعت وصفي يطلق على ما كان شكله كالبزاق.

٣٤٦٣ - بَزَاقِيَّات Limacidae (F). Limacidae (E).

فصيلة حيوانات صغيرة من الرخويات المديدات الرئوية.

٣٤٦٤ - بَزَال Trocart (F). Trocar (E).

آلة جراحية للبز.

٣٤٨٣ - بَزَقَات القَمَر Nostocaceae (S).
Nostocacées, Nostochinées (F). Nostocaceae (E).
فصيلة من الالغيات تنتمي الى الخثيات الزرق . اجناسها
وانواعها كثيرة العدد معظمها بحري وبعضها ارضي .
اشهر اجناسها الارضية بَزَّة القمر .

٣٤٨٤ - بَزَقَة القمر * ، نُسْطُوك

Nostoc, Crachat de la lune (F). Nostoc, Star-jelly, Witch's butter (E).

جنس ألغ من فصيلة بزقات القمر . انواعه عديدة جميعها
ارضية تعيش في المناقع والمواقع الرطبة الكثيرة النور .
وهي مجموعة من الالياف المستندقة المركبة من خلايا كروية
متتابة تغشاها مادة هلامية لاقياسية الشكل والحجم .

٣٤٨٥ - بُزْل * ، بَازِن ، وعل فارسي

Capra Aegagrus (S). Chèvre aegagre, Pasang (F).
Pasan, Pasang, Persian ibex (E).

نوع من الماعز او الوعول الشرقية . موطنه من القفقاس
الى السند ، يكثر في جبال بلاد فارس . جسمه مستطيل ،
ظهره ضيق ، رأسه قصير ، جهته عريضة ، دوارجه
دقيقة قوية ، ذيله قصير . الذكر له قرنان طويلان
محدوديان منعطفان الطرف || يستخرج من معدته مادة
طبية مضادة للسم تدعى بادزهر .

٣٤٨٦ - بَزْل ، بَطْ

Ponction (vet.) (F).
Puncture (E).
هو ادخال بزل او مشرط في مكان معين من الجسم
لاخراج ما يجب ان لا يبقى من غاز او قيح وغيرها .

٣٤٨٧ - بَزْلُ إِسْتِقْصَائِي (F). Ponction exploratrice

٣٤٨٨ - بَزْلُ الْخُرَاج (F). Ponction d'un abcès

٣٤٨٩ - بَزْلُ الْخَمَر (F). Décuvage (F). Tuning (E).
هو اسالة الخمر من الدن عقب الاختار وذلك لفصلها
عن الشجر .

٣٤٩٠ - بَزْلُ الْكُرْش (F). Ponction du rumen

٣٤٩١ - بَزْلَت ، نِسْفَة ، بَازِلَت (F). Basalte (F).
البزلت او النسفة هي حجارة الحرة السود . Basalt (E).

٣٤٩٢ - بَزْمَة (F). Ratlon (F).
البزمة والوزمة هي الاكلة الواحدة من اصل الشكد اليومي .

٣٤٩٣ - بَزْمُوت Bismuth
معدن ابيض اللون اريد تلوه ماجة حمراء . سريع القصف .
سهل الانسحاق صفائح الوثل متبلور || رمزه (بت)
وزنه الانومي ٢٠٨٦ يتصهر تحت درجة ٢٦٨ سغ .
ثقله النوعي يراوح بين ٩٧٥ و ٩٨٠ || يعتبر مثال
المعادن اللاقابلة للمغنت كما ان الحديد يمثل المعادن
الاقابلة للمغنت .

٣٤٩٤ - بَزْنَعَة * (S). Brisinga (S).
Brisinga (F). Brisinga (E).

جنس كواكب بحرية من فصيلة البرنغيات . انواعها
المعروفة قليلة العدد اعطائها بلج بحار المناطق الباردة ||
اجسامها كبيرة مستطيلة الجرامز ، بحيلة الالوان الزاهية
يكثر فيها البرتقالي .

يخف تدريجياً مع الاقتراب من المدب . ويملوها ايضاً
ثلاثة خطوط سود قاطبة ورقشة جزوية يتخللها الاصفر تمتد
من الصدر الى الشرج . قشارها كاس قصير الحلب .
رأسها اسود . مدبها اغبر . رواجها شديدة السمرة || طور
الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي ضمن
صليحة مردنية الشكل تحببها السرفة على فروع الصمتر
الممرات من الورق او على حشاف النجيليات .

٣٤٩٨ - بَزَّة الْجَلْبَان (S). Zygaena scabiosae

Zygène scabieuse (F).

٣٤٩٩ - بَزَّة الْخَسْدَقُوق (S). Zygaena meliloti

Zygène du melilot (F).

٣٤٧٠ - بَزَّة الْخَزَامِي (S). Zygaena lavandulae

Zygène de la lavande (F).

٣٤٧١ - بَزَّة السَفِيَّات (S). Zygaena rhamantus

Zygène des papilionacées (F).

٣٤٧٢ - بَزَّة الشَّدَاب (S). Zygaena erythrus

Zygène de l'eryngium (F).

٣٤٧٣ - بَزَّة الصَّعْتَر (S). Zygaena purpuralis

Zygène du thym (F).

٣٤٧٤ - بَزَّة الْعَرَاوَة (S). Zygaena filipendulae

Zygène de la spirée (F).

٣٤٧٥ - بَزَّة الْكَرْمَة (F). Zygène de la Vigne

راجع جنادة الكرمة .

٣٤٧٦ - بَزَّة اللَّتِين (S). Zygaena hiliaris

Zygène de l'ononis (F).

٣٤٧٧ - بَزَّة النَّصَل (S). Zygaena trifolii

Zygène du trèfle (F).

٣٤٧٨ - بَزْدَرَة (F). Fauconnerie (F). Falconry (E).

فن تدريب وترويض الطيور الكواسر المعدة للصيد .

٣٤٧٩ - بَزْر ، بَزَار ، زُرْعَة ، تَقَاوِي (F). Semences

Seeds, Seed-corn (E).
هو الحب المعد للزرع .

٣٤٨٠ - بَزْرَايَة

بزراية ج بزاري : كلمة عامية تدل على البهزرة ، اطلبها .

٣٤٨١ - بَزْرَة (F). Graine (F). Seed (E).

اطلب حبة .

٣٤٨٢ - بَزْرَقُطُونَا * ، عَشْبَة الْبَرَاغِيْث ، حَشْبَة الْبَرَاغِيْث

Plantago psyllium (S). Psyllion, Plantain psyllion,
Herbe aux puces (F). Flea-wort (E). Flohwege-
rich (D). Psilio minore, Pulicaria, Erba delle pulci (I).

نبات عشبي بري طبي وصناعي معمر . وهو نوع من
لسان الحمل وفصيلة الحملات . اوراقه منعقة قرصية .
ازهاره شمراخية الارتكاز سنبلية التجميع || يستخرج من
اوراقه وثماره وبزونه مادة صمغية لزجة تنفع الرمد
والتهابات العين ، تفيد الشعر وتستعمل في تصفيف الاقشة .




بَزْر قَطُونَا



بَزَّة الْقَمَر



بَزْل ، بَازِن



بَزْنَعَة



بَزَيْفَة



بَزَيْلَة



بَزَيْلَة رِيَة



بَسَّارِي



بَسَّارِي



بَسَّارِي

٣٥٠٢ - بَسَّاد * (S). Psoa (F). Psoa (E).

جنس حشرات من فصيلة البَسَّاديات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض اقاليم الكرم من الشرق الاوسط الى اوروبا || اجسامها مستطيلة الشكل ، معتدلة الاحديداد ، تطول من ٨ الى ١٢ مم . رؤوسها كبيرة ، مستعرضة . عيونها ناشزة . تأشيرها وملامسها نظامية . قرونها الاستشعارية دهبوسية . كواسلها مربعة الشكل ، محدبة . بطونها مدببة المؤخر . اغمارها تلحف البطن باستثناء المؤخر المدبب . قوائمها شديدة النشاط . رؤوسها وكواسلها واغمارها وقوائمها مبعثرة الهلب الدقيق ، اثوابها ملونة || الحشرة الجمالنة خاضلة . اليرقة دائمة تعيش على الجفان والجرازين اليابسة .

٣٥٠٣ - بَسَّادِيَّات * (S). Psoidae (F). Psoidae (E).

فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم مناطق الكرم من العالمين القديم والجديد || اجسامها شبه اسطوانية الشكل ، مزغبة القشار ، تطول من ٨ الى ١٢ مم . رؤوسها كبيرة ، مستعرضة . عيونها كبيرة ، ناشزة . تأشيرها وملامسها نظامية . قرونها الاستشعارية تساعية الفصل ، دهبوسية الاطراف . كواسلها محدبة . اغمارها مقطوعة الطرف الذي لا يلحف كامل البطن . قوائمها نشيطة . ارساغها خماسية العقل . اثوابها ملونة || جميعها دائمة تعيش على المواد النباتية المنحلة . يرقاتها تعيش في قلب الجرازين والجفان اليابسة || اشهر اجناسها البَسَّاد .

٣٥٠٤ - بَسَّارِي * (S). Bassaris (F). Bassaris (E).

جنس حيوانات من الراتونيات . انواعه ثلاثة ، موطنها البلاد الامريكية . وهي قريبة الشبه بالراتون لكنها هيفاء القد ، مستطيلة الرأس والذيل . اشهرها :

بَسَّارِي المكسيك (S). Bassaris rusé (F). Bassaris (E).

٣٥٠٥ - بَسْبَاج * (S). Hemionitis (F). Hemionitis mulewort (E). Gitterfarn (D). Emionitide (I).

جنس نباتات سرخسية من البَسْبَاجيات . يعد عشرة انواع اسيوية وامريكية المنبت . تتميز بشكل انتشار مجاميعها الجرثومية على عروقها واعصاب اوراقها اذ تبدو كالشبكة المستقيمة الخطوط . تزرع للترزين .

٣٥٠٦ - بَسْبَاجِيَّات (S). Polypodiaceae (F). Polypodiaceae (E).

فصيلة من السراخس ، نباتاتها من مستورات الزهر الوعائية . تشمل نحو ٣٠٠٠ نوع منتشرة في جميع اقطار العالم .

٣٥٠٧ - بَسْبَاسَة (S). Muscadier (F). Myristica (E).

جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية من فصيلة البَسْبَاسيات . انواعه نحو ٨٠ ، مهدا البلاد الاستوائية . اشهرها جوز الطيب .

٣٥٠٨ - بَسْبَاسَة الطيب (S). Muscadier commun (F). Nutmeg tree (E).

شجرة من البَسْبَاسيات تعرف بجوز الطيب .

٣٤٩٥ - بَزَيْغِيَّات * (S). Brisingidae (F). Brisingidae (E).

فصيلة من كواكب البحر الشوكيات النجوميات ، اجناسها وانواعها قليلة العدد جميعها لجية تعيش في الاعماق التي يراوح غورها بين ٣٠٠ و ٥٠٠ م . || اشهر اجناسها البَزَيْغَة .

٣٤٩٦ - بَزَيْغِيَّات (S). Zygaenidae (F). Zygaenidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة . اجناسها وانواعها عديدة لا تقل عن ٨٠٠ ، جميعها صغيرة ومتوسطة الحجم ، كثيفة الحراشف الزغبية ، ضعيفة الاجنحة الضيقة . ملامسها قصيرة دقيقة ، اخطامها مستطيلة ، قرونها الاستشعارية ضيقة الشكل مستطيلة . اثوابها مختلفة الالوان الزاهية يكثر فيها الاخضر والازرق والاحمر والاسمر . ذكورها اعقب لوناً واصفر قدماً من اناثها . تسرح في النهار ، قوتها رحيق الازهار ترشفه وتساق النحل عليه || اليرقة زباء البشرة غبراء اللون موشمة ومخططة او منقطعة بالاسود قوتها زباعت وورق بعض النباتات || الحادرة تلحف بشرنقة وشية الشكل غبراء اللون مصقولة النسيج تحيكمها غالباً على حشاف النجيليات .

٣٤٩٧ - بَزَيْر * (F). Blanc de mai (F). White mullein (E).

راجع بوصير لبد .

٣٤٩٨ - بَزَيْفَة * (S). Pasiphaea (F). Pasiphaea (E).

جنس حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الارجل طويلات الذيل وفصيلة القريدسيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة ومنها البحر الابيض المتوسط || اجسامها بحيلة الالوان الزاهية ، تطول من ١٠ الى ١٢ سم . الزوجان الاماميان من ارجلها مجهزة بملاقط نشيطة || اشهر انواعها بَزَيْفَة سيفادو (Pas. Sivado) يقال انها من اجود انواع القريدس .

٣٤٩٩ - بَزَيْلَة * ، بَزَيْلَة ، بَزَيْلَة ، بَسَلَة (S). Pisum sativum (F). Pois cultivé, Pois vert, Petit pois (F). Garden pea, Common pea (E). Saaterbse, Erbsen (D). Pisello, P. coltivate (I).

نبات عشبي حولي مأكول الحب من فصيلة القطانيات الفراشية . ضرابه عديدة جميعها متسلقة . فوارقها تعود الى ميعاد الزرع وحجم الحب وجودة مذاقه || ثماره قرون لينة تحضن حبوب كروية الشكل خضراء اللون غنية بالعناصر الغذائية اخصها البروتين والحديد . وهي مع ذلك تحوي ما لا يستهان به من الفينامينات «آ» و«ث» . يتكاثر بالبذر . يرغب في الاتربة المتوسطة الاندماج الغنية بمنصري البوتاس والفسفور .

٣٥٠٠ - بَزَيْلَة بَرِيَّة * ، بَسَلَة بَرِيَّة (S). Pisum elatius (F). Wild pea (E). Wilder erbse (D). Pisello salvatico (I).

نوع من البَزَيْلَة يكثر بين الزروع وفي الاراضي البور . قرونه صغيرة وحبه كذلك . تغلفه الماشية بشية .

٣٥٠١ - بَس ، بَس ، بَسِين (F). Chat (F). Cat (E).

هو السنور . ويقال للأنثى بسة وبسينة .

٣٥٢٢ - بَسْتَرَة Pasteurisation (F).
Pasteurization (E).
البسرة هي منع نمو وتكاثر الجراثيم بالتسخين .

٣٥٢٣ - بَسْتَلُوزِيَّة * Pestalozzia (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الرففيات . انواعه عديدة معظمها رمي يركب الاشجار البرية والحرجية .
ونيمته بوعية سمراء اللون تنشأ محصورة في الادمة ثم ترقى وتنتشر . كنيده مستطيلة ، مoothورة ، عابقة اللون . بويغاته متوجة بهالة من الحلب العادم اللون . اشهر انواعه الثلاثة التالية .

٣٥٢٤ - بَسْتَلُوزِيَّة الحرجية * Pestalozzia hartigii (S).
فطر مجهرية يركب مختلف النباتات الحرجية الفتية من الصنوبريات والمحاوات || مظهره الخارجي لطخة عرضها من ٢ الى ٤ سم . تطوق بشرة ولحاء الساق على علو شبرين او ثلاثة من التربة ، تجف وتيبس بعد انبلاجها ببضعة ايام فتسبب يباس كل ما يعلوها من الاعضاء النباتية . يكافح باقتلاع الاغراس الموبوءة وينضخ السليمة بأحد القواطير الفعالة . كما يحسن تطهير التربة بالكلس .

٣٥٢٥ - بَسْتَلُوزِيَّة المصاري * Pestalozzia guepini (S).
فطر مجهرية يتعدى على معظم النباتات التي تعيش في المصاري منها الازالية والكميلية والمغنولية الخ... || يركب الاوراق فيمنطقها ببقع لا قياسية الشكل والحجم . لونها الى السمرة تسبب جفاف الوثن وتقضي على التبادل النسفي || يكافح باستعمال احد الاملاح النحاسية المخففة .

٣٥٢٦ - بَسْتَلُوزِيَّة النخل * Pestalozzia palmarum (S).
فطر مجهرية يصيب اوراق النارجيل وغيره من النخل التريبي || مظهره الخارجي بقع صغيرة متراكبة غبراء اللون تركب النصل على صفحته العليا || اضرامه زهيدة لا تستوجب العناية . ومنهم من قطع الاوراق الموصومة .

٣٥٢٧ - بَسْتَنَّة ، غَيْطَنَّة Horticulture,
Jardinage (F). Horticulture, Gardening (E).
هي زراعة البساتين تتناول زراعة البقول والازهار والاشجار المثمرة واشجار التزيين .

٣٥٢٨ - بَسْتَنِي ، غَيْطَنِي Horticoie (F).
Horticultural (E).

٣٥٢٩ - بَسْتُورِلُوز Pasteurellose
امراض سارية سببها ميكروبات مختلفة الانواع ، منها ذات الرئة السارية في الخيل والاسهال في المعول والجمرة في الدجاج الخ .

٣٥٣٠ - بَسْتُون مُنْتَفِش * Biston hirtarius, Lycia hirtaria (S).
Biston à ailes velues, Lyce hérissée, Phalène hérissée (F). Biston hirtarius, Lycia hirtaria (E).
حشرة من فصيلة الارفيات ورتبة حشرقيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوربة . تألف الاقاليم المعتدلة الحرارة . فراشها جارية قوتها رحيق الازهار . سرفها خاضعة قوتها اوراق الاشجار الحرجية والمثمرة ||

٣٥٠٩ - بَسْبَسِيَّات Myristicaceae (S).
Myristicacées (F). Myristicaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين العديدة القعالات . ويقال لها ايضاً فصيلة جوز الطيب .

٣٥١٠ - بَسْبَايَج * ، أَصْرَاس الكُتَب ، تَشْتِيَوَان ، عَرَقَسُوس Polypodium vulgare (S).
Polypode commun, Filicule, Polypode de chêne (F). Common polypody, Polypody wall fern, Golden locks (E). Echtes engelsüss, Engelsüss (D). Polipodio, Polipodio quercino, Falce dolce (I).
نوع من البسباجيات السرخسيات وهو نبات بري وزيني معمر سريع النمو كبير الاوراق جميلها يرغب في الاحراج الظليلة اخصها احراج السنديان . وهو من النباتات الطبية نقيه منفث ويدر البول ويلين المعدة .

٣٥١١ - بَسْبِس Ciguë (F). Hemlock (E).
هو الشوكران ، نبات عشبي جحالي طهي مبذول ، اطلبه .
٣٥١٢ - بُسْتَان ، جَنَّة ، فِرْدَوْس ، حَائِط ، حَشَّ Jardin (F). Garden (E).
هو كل ارض تزرع فيها النباتات البستانية كالأشجار المثمرة والازهار والخضار ... للاستفادة من ريعها . وبوجه عام تستعمل كلمة بستان للتعبير عن التخصيص فيقال مثلاً بستان ليمون وبستان موز الى آخره .

٣٥١٣ - بُسْتَان بُرْتُقَال ، بِيَّارَة ، مَبْرَقَة Orangerale (F). Orange-plantation (E).
هي الارض المغروسة اشجار برتقال .

٣٥١٤ - بُسْتَان خُضَر ، مَبْقَلَة ، سِبَاخ Jardin potager (F). Kitchen-garden (E).
هو البستان الذي تزرع فيه البقول والخضار .

٣٥١٥ - بُسْتَان زَرَاعِي Jardin d'utilité (F).
Profit-garden (E).
هو البستان الذي يتخذ للانتفاع من زراعته او تربته .

٣٥١٦ - بُسْتَان زَيْتُون ، زَوَاتِين Oliveraie, Olivale (F).
Olive-plantation (E).
هي الارض المغروسة زيتوناً .

٣٥١٧ - بُسْتَان فَوَاكِه ، مَثْمَرَة ، جُنَيْنَة Verger, Jardin fruitier (F). Fruit-garden, Orchard (E).
هو بستان الاشجار المثمرة من اي نوع كانت . وقد يطلق عادة على البستان الذي حوى اكثر من نوع واحد من الاشجار .

٣٥١٨ - بُسْتَان مَوْز ، مَوْمَرَة Bananeraie (F).
Banana-plantation (E).
هي الارض المغروسة موزاً .

٣٥١٩ - بُسْتَنَانِي ، جَوَّار ، بَسْتَنَانِي Jardinier (F).
Gardener (E).
هو من كانت مهنته العمل في البساتين والحداثق .

٣٥٢٠ - بَسْتَانِي ، غَيْطَانِي Horticulteur (F).
Horticulturist (E).
من كان اختصاصه نباتات الزينة .


٣٥٢١ - بَسْتَنَج Boswellie
هو اللبان من البخوريات ، اطلبه .




بساج




بستلوزيه



بستلوزيه الحرجية



بستلوزيه المصاري



بستلوزيه النخل



بستون منتفش

ملجته الحياتي بخافي . جماعته قليلة العدد . قوته الحشرات والثمار والبزود || جسمه صغير القد يطول نحو ١٨ سم . يتميز بقزعة الناعمة الريش المنعطفة على القفن وبكبر رفال ذنبه المروحية الشكل . ثوبه الى الشقحة السمرام السعفاء تسود في الرأس والصدر والجناح . جانباً زوره الى البياض الاغبر || صياحه يشبه فرقة سوط الخوذي مما دعا الى تلقيبه بالصنوبر الخوذي .

٣٥٣٩ - بَسَق

بَسَقَتْ وأبَسَقَتْ البهي، وقع في ضرعها اللبن قبل التناج فهي مبسقة ، ج مبسقة .

٣٥٤٠ - بَسَل

بسل الخل : طاك تركه فأخلف طعمه وتغير .



بَسَد

٣٥٤١ - بَسَلَف *

Pselaphus (S).

Pselaphe (F). Pselaphus (E).

جنس حشرات من فصيلة البسلافيات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها شديدة الصغر ، تطول نحو ٢ مم . رؤوسها شبه مزوانية الشكل . عيونها صغيرة ، ماسحة . قرونها الاستشعارية صولجانية . قشورها صغيرة . ملاسها الفكية شديدة الطول . كواسلها صغيرة ، ضيقة . بطونها بيضبة الشكل . اغمادها قصيرة ، مخددة تلحف نصف البطن . قوائمها نشيطة . ظنايب القوائم الوسطى والخلفية شائكة . اثنائها كسثنية او بنية او سمرام || تسرح في الليل . تألف ضفاف مجاري الماء . تعيش تحت الجويل وفي الجثالة قوتها المواد النباتية المنحلة .

٣٥٤٢ - بَسَلَفِيَّات °

Pselaphidae (S).

Pselaphidés (F). Pselaphidae (E).

فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحارة || اجسامها شديدة الصغر ، مستطيلة الشكل ، تطول من ١.٥ الى ٤ مم . رؤوسها مكورة ، صغيرة . عيونها بارزة او ماسحة . ملاسها الفكية كبيرة . قرونها الاستشعارية صولجانية الشكل ، مركبة من ١٠ او ١١ فصلة . كواسلها متباينة الشكل ، يغلب فيها التكوين . اغمادها قصيرة تلحف نصف البطن . اثنائها وحيدة اللون || جميعها مفترسة او دامة . تنصها المفضل القراديات ولا تعف عن الديدان التي يتكرر وجودها في الجثالة وفي الاخشاب النخرة || اشهر اجناسها البسلاف والشنيوم والريشباخ .

٣٥٤٣ - بَسَلَة

Pois cultivé (F). Garden pea (E).

راجع بريلا .

٣٥٤٤ - بَسَلَة بَرِيَّة

Pois sauvage (F).

Wild pea (E).

راجع بريلا بَرِيَّة .

٣٥٤٥ - بَسَلَة سَكْرِيَّة

Lotier cultivé (F).

Garden winged pea (E).

راجع اصابع العروس .

٣٥٤٦ - بَسَلَة هِنْدِيَّة ، فَرِيَسَاء ، لُوبِيَاء سُوْدَانِيَّة

Cajanus bicolor, C. flavus, C. Indicus (S). Cajan, Cajanus, Ambrevade (F). Pigeon pea, Congo pea, Cajan pea (E). Catjang, Angolische (D). Citiso dell'Indie, Pisello d'Angola (I).

بجلة زراعية متسلقة من جنس الفازوليات وفصيلة القرنيات

جسمها متوسط القد يطول نحو ١٧ مم . بسطها تراوح من ٤٦ الى ٥٠ مم . رأسها معتدل الجرم . عيناها صغيرتان بارزتان . زباناها مشطيان عند الذكر ، خيطيان عند الانثى . جوشها وبطنها الى الكهبة الحنطية المواجه وبطنها رتاجي الزغب المنتفش ينتهي بضمة تطوق الشرج || روشناها الاماميان الى الكهبة الحنطية تعلوها سرنجة معترضة وزوزقة وزركشة سمرام قاتمة . روشناها الخلفيان الى الكهبة الحنطية تعلوها في نصفها الاخير ثلاثة خطوط متعرجة معترضة سمرام اللون . اهدابها حنطية || لها جبل واحد في الحول . تظهر الفراشة في ايار وتبقى حتى تموز . تسرح في الليل . تعاظم بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع . تمتح الممكن لطخاً على الاغصان والافناد || السرفة عند الادراك التام تطول نحو ٣٤ مم . جسمها اسطواني الشكل ، مبعثر اطلب القصير ، رباعي الشعول المتقابلة . رأسها صغير الجرم . شرجها مجهز بزائدين لامساويين . ثوبها يمانن البيئة التي تعيش فيها لذلك فهو بلون الاوراق || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي ضمن صلتجة تحيكها السرفة بين الاوراق .

٣٥٣١ - بَسَكْد *

Corall (F). Coral (E).

هو المرجان ، اطلبه .

٣٥٣٢ - بَسَدَة °

Pisidium (S).

Pisidie (F). Pisidium (E).

جنس حيوانات مائية من الرخويات صفيحيات الخياشيم والارجل ومن فصيلة السيرينيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بحيرات البلاد المعتدلة الحارة || اصداؤها صغيرة شبه مخروطية الشكل ، مقعرة القفن ، متساوية المصاريح . مثاعها ثنائية طليقة || تعيش مغمولة في الاسمال .

٣٥٣٣ - بَسْر

البسر : الفص من كل شيء . والتسر قبل اطرابه وذلك اذا لون ولم ينضج .

٣٥٣٤ - بَسْر

Polliniser avant terme (F).

يقال بسر النخلة وابترها اذا ابرها قبل اوان الجب .

٣٥٣٥ - بَسْرَة

البسرة نعمت حال للنبات اذ يكون في اوله البارض وهو كما يبدو في الارض ثم الجسيم ثم البسرة ثم الصمء ثم الخشيش وقال ذو الرمة :

« رعت بارض البهي جيماً وبسرة

وصمء حتى آنفها نصالها »

٣٥٣٦ - بَسْط

Numérateur (F). Numerator (E).

البسط وصورة الكسر واحد .

٣٥٣٧ - بَسْط الوقائع

Articulation (F).

Enumeration of facts (E).

هو سرد الحوادث كتابية مع اتباع ترتيبها الزمني على ان تقام البيئة عليها امام المحكمة كما يجري ذلك في التحقيقات والاستجوابات .

٣٥٣٨ - بَسْفُود *

Psophodes (S).

Psophode, Oiseau-cocher (F).

طائر من الجواثم سنيات المناقير وفصيلة الكعيتيات اعطانه بعض مناطق استرالية . يألف الاحراج المبعثرة الاشجار .



بَسْفُود



بَسْلَف

دقيقة قصيرة لا متحركة سبحية الترتيب كثيفة التجميع. تطول من ٠.٧ إلى ٢ مي. وتعرض من ٠.٢ إلى ٠.٥ مي.

٣٥٥٦ - بَسِيلُوس الجَزَر (S). *Bacillus carotovorus*

يصيب الجزر فيذبل الجذور ويلينها ثم يموتها. شكله قضبان مهدبة متحركة لا قياسية التجميع والترتيب. طولها يراوح من ٢ إلى ٥ مي. وعرضها من ٠.٦ إلى ١ مي.

٣٥٥٧ - بَسِيلُوس الحَامِضُ اللَّبَنِيّ *

Bacillus acidi lactici (S).

يسبب الاختمار اللبني الحامضي. وهو يوجد في الهواء وفي اللبن الرائب || شكله قضبان صغيرة عديمة الحركة لا قياسية التجميع والترتيب.

٣٥٥٨ - بَسِيلُوس الخَلّ *

Bacillus aceti, Bacillus acetici (S).

يسبب الاختمار الخلي وهو يوجد في الهواء والخل. شكله قضبان اسطوانية قصيرة لا قياسية الحجم، مرصوفة التجميع. سبحية الترتيب.

٣٥٥٩ - بَسِيلُوس الذَّرَّةُ الصَّفْرَاءُ (S). *Bacillus zeae*

يصيب الذرة الصفراء فيمنع نموها ويذبلها || يعيش في جذور وسوق النباتات الفتية. وهو قضبان صغيرة متحركة طولها يراوح من ٠.٨ إلى ١.٦ مي. وعرضها نحو ٠.٦ مي. يقال انه يسبب للدواجن التي تتغلف الذرة المصابة به ما يدعونه بالانكليزي «Corn-stalk disease» نتائج تسمم الدم وغيرها.

٣٥٦٠ - بَسِيلُوس الزَبْدِيّ (S). *Bacillus butyricus*

Ferment butyrique (F).

يسبب الاختمار الزبدي وهو يوجد في اللبن والجبن وأنزباب والماء.

٣٥٦١ - بَسِيلُوس الشَّوْنَدَر (S). *Bacillus betae*

شكله قضبان قصيرة فردية أو سبحية التجميع. يعتري جذور الشوندري في الأتربة الرطبة الغنية بالمواد الأزوتية فيحول دون نموها ثم يذبلها ويموتها || وهو من الأمراض القليلة الانتشار نظراً لمتطلباته البيئية المحدودة.

٣٥٦٢ - بَسِيلُوس الصَّفْرَاءُ (S). *Bacillus tabificans*

يصيب الشوندري فيؤذيه. مظهره الخارجي يبتدئ ويتحول كما يلي: ارتحاء في الأوراق يمنعها عن الشقوق ثم تقيح في النصل يتحول من الخضار القائم إلى الخضار الباهت فالخضار الأصفر ثم الاصفرار الشامل فالذبول فاليباس. وهو قضبان بيضية الشكل سبحية التجميع والترتيب كثيرة الحركة طولها يراوح من ٤ إلى ٦ مي.

٣٥٦٣ - بَسِيلُوس العَفَنِ

Bacillus putrefaciens liquefaciens, B. caulivorus (S).

يصيب البطاطا والبندورة والتبغ وبعض نباتات الزينة. مظهره الخارجي يقع لا قياسية الشكل تظهر على السطح ثم تمتد صعداً إلى أن تعم الأوراق فتعطب الخلايا وتقضي عليها بعد أن تلونها بالسرة || شكله قضبان اسطوانية، قصيرة، سبحية التجميع والترتيب، تطول نحو ١.٥ مي. وهو يعيش ويتكاثر في التربة أينما لائمته ظروف البيئة.

٣٥٦٤ - بَسِيلُوس العنب (S). *Bacillus uvae*

يصيب العنب فيعطله، وقد يقضي على الموسم إذا اعتري الكرمة عند الإزهار لانه يسبب يباس الأزهار || وهو

الفراشية. منبتها الاصقاع الاستوائية الهندية والأفريقية. ثمارها قرون مستطيلة تحوي عدة بزور اسطوانية الشكل. تزرع لبزورها المأكولة.

٣٥٤٧ - بَسْلُورَه *

Passalora

جنس فطور مجهرية من عمارة الزناخيات وفصيلة اللطحيات. جربه الكندية خيطية الشكل مژجزة. كنانته بيضية. أو اجاصية متناصفة الانقسام. بويغاته مخنوقة || أنواعه عديدة تركب الأوراق على صفحاتها السفلى دون أن تعطلها.

٣٥٤٨ - بَسُوق

البسوق هي أنثى المجترات التي وقع اللب في ضرعها قبل التاج.

٣٥٤٩ - بَسِيكُومِيَّات (S). *Psychomyidae*

Psychomyidés (F). *Psychomyidae* (E).

فصيلة حشرات من رتبة جملونيات الاجنحة. أجناسها وأنواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة || أجسامها صغيرة، سمراء اللون أو سوداء. بسطة أجنحتها تراوح من ١٠ إلى ١٨ مم. أجنحتها الامامية مغطاة بخمل ناعم دقيق يختلف خضابه مع اختلاف الاجناس والأنواع إنما يكثر فيه الاسمر ثم الاصفر التبيج الموج || أساريها طليقة تعيش في المياه الراكدة ضمن اروفة رجة متعرجة تشيدها بالرمل والريال اما بين الحجارة والصخور اما في القاع. أشهر أجناسها:

Psychomyia (S).

البسيكومية

Lype (S).

الليب

Tinodes (S).

التيود

٣٥٥٠ - بَسِيل

Bacille (F). *Bacillus* (E).

البسيل أو القصيمة هي كل بكتيرية تكون في شكل قضيب.

٣٥٥١ - بَسِيلَة

Lupin (F).

البسيلة: هي الترس (ابن سيده).

٣٥٥٢ - بَسِيلُوس *، بَاشِلُس، بَاشِيلُوم، بَسِيل، قَصِيمَة

Bacille (F).

Bacillus, Bacillum, Baculum (E).

جنس بكتيريات من فصيلة القضيبيات يشمل جميع اشكال البكتيريات المستطيلة. أنواعه عديدة وهي صلبة أو لينية، متحركة أو غير متحركة. تتكاثر بالانقسام المباشر أو بالتبرغ || اعرف أنواعه وأشهرها ما يتبع.

٣٥٥٣ - بَسِيلُوس البَاذَنْجَانِيَّات

Bacillus solanacearum (S).

يصيب نباتات الفصيلة الباذنجانية، أخصها البطاطا فيسبب فيها العفن الغفيري.

٣٥٥٤ - بَسِيلُوس البَقُول (S). *Bacillus oleraceae*

يصيب عدة بقول أخصها القنبيط فيعطب الاعضاء المصابة ويقودها إلى العفن والهريان || شكله قضبان مهدبة متحركة لا قياسية التجميع تطول من ١ إلى ٤ مي. وتعرض من ٠.٥ إلى ١ مي.

٣٥٥٥ - بَسِيلُوس التَّبَغ (S). *Bacillus tabacivorus*

يصيب شتول التبغ فيمنعها لكنه محدود الاضرار لانه يركب سطح الشتول المهدوشة دون سواها || شكله قضبان




بسلوره



بسيلوس



بسيلوس الحامض اللبني



بسيلوس الخلل



بسيللوس الكرمة



بسيللوس النشا



بسيللوس نيكوثيانا



بشام



بشمة



بشمة عقدية

٣٥٧٤ - بَشْمَةُ عَقْدِيَّة *، قُرَام، فلاريس مُعَقَّد
Phalaris tuberosa (S). Phalaris noueux (F). Tuberos sword-grass, Peruvian grass (E). Gichtenglanz-grass (D). Folaridi, Bindello (I).

نبات عشبي حولي علني من النجيليات. انتاجه وافر المحصول الحفري لكنه اقل جودة وقيمة غذائية من البشمة.

٣٥٧٥ - بَشْر - Raclage (F). Scraping (E).

٣٥٧٦ - بَشْرَقَة - Cuticule, Derme (F).

Cuticle, Derm (E).

هي الطبقة الواقية الناعمة الدقيقة التي تغلف الأدمة.

٣٥٧٧ - بَشْرَقَة خَارِجِيَّة، إَكْزُودِرْم - Exoderme (F). Exoderm, Ectoderm (E).

هي في النبات غلاف القشرة الخارجي.

٣٥٧٨ - بَشْرَقَة دَاخِلِيَّة، أُنْدُودِرْم - Endoderme (F). Endoderm (E).

هي في النبات غلاف القشرة الداخلي الذي يحيط بالشرة

او البزرة او الشكير.

٣٥٧٩ - بَشْرُوش - Flamant rose (F). Flamingo (E).

هو النحام، اطلبه.

٣٥٨٠ - بَشْرِي - Dermique (F). Dermic (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما له علاقة بالبشرة كالنسيج

وغيرها.

٣٥٨١ - بَشْرَيْن، كُوتَيْن، كِيوتِين - Cutine (F). Cutin (E).

هي المادة الكهاوية التي تحصل من تحويل السيللوز في

القسم الخارجي من ادمة النبات.

٣٥٨٢ - بَشْشَك - Camouflier (F). To disguise (E).

تستتر او تنكسر بغية الخديعة.

٣٥٨٣ - بَشْشَك - Camouflage (F).

Artificial concealment (E).

البشك التستتر والتنكر.

٣٥٨٤ - بَشْشَكِيَّة ٥ - Puschkinia (S).

Puschkinle (F).

نبات دوفصي بري وزراعي تزييني من الزنبقيات. معقود

التعريف على اسم العلامة الروسي «بوشكين». دوفسته

صغيرة مبطة. أوراقه قرصية الانتشاب، قليلة العدد،

من ٢ الى ٣. نصالها مستطيلة، ضيقة، جميلة الخضار

العابق. ساقه شراخية، معتدلة الارتفاع، تنتهي ببعض

الازهار الصغيرة القد الجميلة الشكل، لونها الى البياض

العاجي الموشع بالازرق.

٣٥٨٥ - بَشْم - Indigestion (F). Indigestion, Surfeit (E).

راجع تخم. يقال بشم الرضيع من الحليب: اتخم.

٣٥٨٦ - بَشْمَلَة - Amélanhier commun (F).

هي المكرة المبدولة، اطلها.

٣٥٨٧ - بَشْمُور - Flamant (F). Flamingo (E).

هو السرخاب، طائر من النحام احمر الريش.

قضبان اسطوانية متحركة تطول من ٣ الى ٤ مي. تجميعها سبجي الترتيب، تكاثرها بوغي.

٣٥٦٥ - بَسِيلْلُوس الكرمة * - Bacillus vitivorus (S).

يصيب الكرمة في اللحاء والخشب فيسبب نوعاً من الادماع

الصمغي وقد يسمي الى نمو الجفنة ان لم يعطها في الاتربة

الرطبة او الكتومة اهوم || وهو قضبان صغيرة منفصلة

لا قياسية الشكل والتجميع، اما يكثر فيها الترتيب السبجي

طولها يراوح من ١ الى ٢ مي. وعرضها نحو ٠,٧٥ مي.

٣٥٦٦ - بَسِيلْلُوس النشا * - Bacillus amylobacter (S).

يصيب درن البطاطا فيعفن النشا ويحدث الحامض السني.

٣٥٦٧ - بَسِيلْلُوس مُنْطِخ - Bacillus maculicola (S).

يصيب اوراق التبغ فيلطفها. مظهره الخارجي بقع لا

قياسية الشكل صغيرة الحجم تعلو نصل الاوراق. تبدو

باهتة الخضار ثم غبراء اللون ثم يبيضاء يحولها اطار اسمر.

شكله قضبان صغيرة متحركة لا قياسية التجميع يغلب

فيها الترتيب الفردي تطول من ١,٥ الى ٢,٥ مي. وتعرض

من ٠,٧ الى ١ مي.

٣٥٦٨ - بَسِيلْلُوس نيكوثيانا * - Bacillus nicotianae (S).

يصيب التبغ في جميع اجزائه الهوائية والتربية. مظهره

الخارجي بقع سمر تعلو عروق الاوراق ثم تمتد الى سائر

النصل وتعم الساق والسرخ والجذور فتعطبها وتذويها.

شكله قضبان اسطوانية متحركة فردية او ثنائية التجميع

تطول من ٢ الى ٣ مي. وتعرض من ٠,٦ الى ١ مي.

٣٥٦٩ - بَسِيمَة ٥ - Pteranthus (S). Ptérante (F).

جنس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة القرنفليات.

انواعه المعروفة لا تتجاوز الخمسة. منبها معظم اصقاع

حوض البحر الابيض المتوسط || سوقها منتصبه قليلة

الفروع. اوراقها متقابلة، لحمية النصال السنائية الشكل.

ازهارها وتريه التجميع معظمها ثلاثي. الوانها تراوح بين

الوردي والبيكني.

٣٥٧٠ - بَشَام * - Baumier (F).

Balsam of Mecca (E).

هو البلسان « شجر طيب الريح يشاك بقضبه واحده

بشامة ويقال لحيه عند الصيادلة حب البلسان » (اقرب

الموارد). وقد قال الشاعر:

« اتذكر يوم تصقل عارضيا

بقرع بشامة سقي البشام »

٣٥٧١ - بَشْبَش - Feuilles de coloquinte (F).

هو ورق الحنظل.

٣٥٧٢ - بَشْت القَرْد - Céatophylle (F).

هو حاملو الماء، اطلبه.

٣٥٧٣ - بَشْمَة *، حَبِّ العَصَافِير، فلاريس

Phalaris canariensis (S). Phalaride, Phalaris, Alpiste,

Blé d'oiseau (F). Canary grass (E). Kanarienglanz-

grass (D). Canaria, Scagliola della Canarie (I).

نبات عشبي حولي علني من النجيليات. يزرع في المراعي

للعلف ويزرع لجني بزره المأكول من العصافير.

٣٥٩٨ - بَشْوَرَة اللَّيْلِ الْكَبِيرَة، أَبُو الْوَشِي اللَّيْلِي

Saturnia pyri (S). Grand paon de nuit (F).

فراشة من البشوريات كبيرة القد جميلة الثوب المنمش والمزركش. تسرح في الليل. يكثر وجودها من نيسان الى تموز. يرقاتها خاضعة نهمة تركب اوراق الاشجار المثمرة والحرجية انحصا الاجاص والخوخ.

٣٥٩٩ - بَشْوَرَة النَّهَارِ*، أَبُو الْوَشِي النَّهَارِي

Vanessa io (S). Petit Paon du jour (F). Vanessa io (E). Tagpfauenauge (D).

فراشة من البشوريات متوسطة القد جميلة الثوب زاهية الالوان، يكثر وجودها من تموز الى ايلول. يرقاتها خاضعة تركب البقول فتعريها وتؤذيها.

٣٦٠٠ - بَشْوَرِيَّات Nymphalidae (S).

Nymphalidés (F). Nymphalidae (E).

فصيلة حشرات من حرشيات الاجنحة. اجناسها وانواعها كثيرة العدد مختلفة الاثواب والالوان الجميلة. قوائمها الامامية عادمة الخالب. ارساغ ذكورها وحيدة العقلة وارساغ اناثها خماسية العقل || يرقاتها خاضعة نهمة زباء، الكنف مستطيلة الهلب. رباط خادراتها شرجي المسلك تتدلى به.

Polyptère Béchir (F).

Polypterus Bichir (E).

٣٦٠١ - بَشِير

راجع ابو بشير، نوع من الشم.

Potosie folle (F).

٣٦٠٢ - بَشِيْطُ أَخْبَل

حشرة من غمديات الاجنحة تدعى جمل اخبل، اطلبه.

Potosie métallique (F).

٣٦٠٣ - بَشِيْطُ زُمْرُدي

حشرة من غمديات الاجنحة تدعى جمل زمردى، اطلبه.

Phosphorescent (F).

Phosphorescent (E).

٣٦٠٤ - بَصَّاص ٥

نعت تعريفي ووصفي يطلق على كل سمكة او حشرة تملؤها مواد فسفورية تشع في الظلام.

Photogenèse (F).

Photogeny (E).

٣٦٠٥ - بَصَّاصَة ٥

البصاصة انتاج الضوء الفيزيولوجي عند النباتات والحيوانات والحشرات البصاصة.

Photogène (F).

Photogenic (E).

٣٦٠٦ - بَصَّاصَة ٥

نعت تعريفي يطلق على الاجهزة والنسج التي تسبب الاشعاع عند بعض الحشرات وغيرها.

Bouçak (F).

٣٦٠٧ - بُصَاق

ضرب من النخيل وافر الانتاج، صغير البسر، اشجع التمر. يوجد في الاراضي القليلة الرطوبة.

Lampyre nocturne (F).

٣٦٠٨ - بَصْبُوص اللَّيْلِ

هو اليراعة الدجوية، اطلبها.

٣٦٠٩ - بَصْبُوص اللَّيْلِ الشَّرْقِي

Luciola orientai (F).

هو اليراعة الشرقية، اطلبها.

Eleusina coracana (S). كَنْب ٣٥٨٨ - بَشْنَة*

Eleusine (F). Raggee corn, African millet (E). Krummährige eleusine (D). Eleusina, Panico Indiano (I).

جنس نباتات عشبية حولية برية وزراعية من فصيلة النجيليات. انواعه المعروفة سبعة، يزرع منها نوعان الهندي والافريقي لانها من النباتات العلفية الجيدة الانتاج والفوائد. وهناك شعوب هندية وافريقية تستعمل الحب استعمال الحنطة او الذرة الصفراء.

Nénuphar blanc (F).

White water-lily (E).

٣٥٨٩ - بَشْنَيْنُ أَبْيَض

اطلب نيلوفر ابيض.

Nénuphar bleu (F).

Blue water-lily (E).

٣٥٩٠ - بَشْنَيْنُ أَزْرَق

اطلب نيلوفر ازرق.

Nénuphar jaune (F).

Yellow water-lily (E).

٣٥٩١ - بَشْنَيْنُ أَصْفَر

اطلب نيلوفر اصفر.

Lotier d'Egypte (F).

Egyptian lotus (E).

٣٥٩٢ - بَشْنَيْنُ عَرَبِي

اطلب نيلوفر العروس.

Vanessa cardui (S).

Vanesse du chardon, V. del'artichaut, Belledame (F).

فراشة من البشوريات يرقها تطول من ٣ الى ٤ سم. وهي سمراء اللون تحمل على كل جانب من جانبيها خط اصفر باهت، ويقطب ثبجها من مؤخر الرأس الى الشرج خط من الهلب الابرش. وهي تركب جميع اجناس وانواع الحرشف اغصها الارضي شوكي.

Vanessa atalanta (S).

Vanesse atalante, Vulcain (F). Painted lady, Thistle butterfly (E). Distelfalter (D).

فراشة من البشوريات ثوبها مزركش النقش جميل الالوان العابقة. يكثر وجودها من تموز الى تشرين. يرقاتها خاضعة تعيش على اوراق نباتات الفصيلة القراصية.

Vanessa polychloros, Aglais polychloros (S).

Vanesse polychrome, V. grande tortue, Paon grande tortue (F).

فراشة من البشوريات ثوبها مزركب الالوان المتداخلة التي يغلب فيها البرتقالي. يكثر وجودها من تموز الى ايلول. يرقاتها خاضعة نهمة تركب اوراق التفاح والكرز والمخلص والدردار.

Aglais urticae (S).

Vanesse petite tortue, Paon petite tortue (F).

فراشة من البشوريات صغيرة القد جميلة الثوب مزركبة الالوان يكثر وجودها في الصيف من تموز الى آب. يرقاتها خاضعة نهمة تركب البقول وسائر نباتات الفصيلة القراصية.

Saturnia pavonia, Eudia pavonia (S).

Petit paon de nuit (F).

فراشة من البشوريات متوسطة القد جميلة الثوب المنمش والمزركش. تسرح في الليل. يكثر وجودها من اذار الى حزيران. يرقاتها خاضعة تركب اوراق الخوخ وبعض نباتات الزينة.



بَشْنَة



بَشْوَرَة الْحَرْشَف



بَشْوَرَة الْغُرُوب



بَشْوَرَة الْقَرَّاص



بَشْوَرَة النَّهَار



بصل



بصل الخشخاش



بصل المفريت



بط أهلي



بط المَنَاقِع

Wild-leek (E). Perllauch, Wilder lauch (D). Porro bastardo, Porro salvatico (I).

نبات بصلي بري من الزنبقيات ، يقال انه لا يخلو من الفوائد الطبية والمنافع الصحية ومنهم من أكله مسلوقاً .

Oignon marin (F). **٣٦٢٠ - بَصَل الفَار**
Sea onion (E). راجع إشقييل .

Muscari en grappe (F). **٣٦٢١ - بَصَل المِسْك**
Starch hyacinth (E). راجع حلحل جميل .

Bulbe, Oignon (F). Bulb, Onion (E). **٣٦٢٢ - بَصَلَة**
ساق ارضية مستديرة مركبة من قرص واسقاط لحمية متراصة متراكبة تحضن برعمة رئيسية ترتكز على القرص .

Nivéole printanière (F). **٣٦٢٣ - بَصَلَة بَيْضَاء**
Spring snow-flake (E). راجع عهر ريبي .

Brebis de peu de lait (F). **٣٦٢٤ - بَصُوق**
البصوق: أقل الغنم لبناً (القاموس) .

Truffe (F). Truffle (E). **٣٦٢٥ - بَضْبَاض**
البضباض: الكمأة .

٣٦٢٦ - بَضَم
يقال بضم الحب اذا اشتد قليلاً . وبضم الزرع اذا غلظ حبه . والبُضَم هي السنبلة .

Ilot (F). Islet (E). **٣٦٢٧ - بَضِيع**
البضيع: الجزيرة الصغيرة في البحر . ج بَضِيع .

Ponction (F). Puncture (E). **٣٦٢٨ - بَطّ**
راجع بزل .

Anas (S). Canards (F). Ducks (E). **٣٦٢٩ - بَطّ**
واحدة بطّة للذكر والانثى . جنس طيور وحشية وداجنة من فصيلة البطيات . انواعه عديدة منتشرة في جميع اقطار العالم . اشكالها واحجامها والوانها كثيرة . جميعها ترغب في المَنَاقِع والمياه الراكدة || اشهر انواعه واعرفها بط المَنَاقِع الذي تحدثت منه الضروب الداجنة .

Canard domestique (F). **٣٦٣٠ - بَطّ أهلي**
Domestic duck (E).

نوع من البط ، يقال انه تحدث من النوحشي . ضروبه وسلالاته عديدة تختلف باشكالها واحجامها والوانها . جميعها كبيرة المنقار الصفحي ، قصيرة ريش الجناح والذنب ، ربعة الجسم الكائر ، قصيرة القوائم الغليظة . لا تطير . ضروبه وسلالاته كثيرة العدد جميعها سهلة التربية ، قليلة المتطلبات والنفقات انما يلزمها الكثير من الماء . الذكر الواحد يكتفي سبع اناث . الانثى تبيض في السنة الواحدة من ٦٠ الى ٢٠٠ بيضة . مدة حضانة البيض تراوح من ٢٨ الى ٣١ يوماً . || قوته دقيق الحبوب والنخالة والاعشاب والبقول .

٣٦٣١ - بَطّ المَنَاقِع * ، بَطّ وَحْشِي
Anas boschas (S). Canard sauvage (F). Wild duck (E). هو النوع الذي تحدثت منه الضروب الاهلية وسلالاتها الكثيرة العدد .

Arglie caillouteux (F). **٣٦١٠ - بَصْرَة ، بَصْر**
Pebble clay (E). البصرة والبصر: الطين العلك الجيد الذي فيه حصى .

٣٦١١ - بَصْرَة
البصرة: حجر براق . ج البصر .

Feuillaison (début) (F). **٣٦١٢ - بَمَصَص**
Foliation (lead) (E). انشقاق وتفتح الزمعات للاوراق .

Hémoptysie (F). **٣٦١٣ - بَصْق الدَّم ، نَفْث الدَّم**
Hemoptysis (E). عارض نزف يحصل في الرئة اسبابه عديدة اخصها الاجهاد والاعياء .

Allium cepa, Porrum cepa (S). **٣٦١٤ - بَصَل ***
Oignon, Ognon (F). Onion (E). Zwiebel (D). Cipolla (I).

نبات زراعي محول من فصيلة الزنبقيات . واحدته بصلة . والبصلة تتركب من ساق ارضية قرصية صغيرة متراكبة الاسقاط . تخرج من سطحها الاسفل جذور عرضية دقيقة كثيفة بيضاء اللون تنتش من زر طرفي كبير تحيط به الاسقاط المستوفة المتتابعة التي تتكون في اطرافها الاوراق الجوفاء || ازهاره نوري التجميع ، خيمي الارتكاز يحمله شراخ اجوف منبثق عن قرص الساق الارضية . الزهرة كاملة خنثوية سداسية البتلات والاسدية ، بيضاء او خضراء اللون || انواعه وضروبه كثيرة العدد . زراعته عالمية . فوائده الصحية عديدة اخصها مقاومته الحميات وادار البول . وهو من البقول الغنية بالعناصر الهيدروكربونية . تحليله يفيد على اشتهاله :

١,٦٨ ٪	من المواد الازوتية
٠,١٠ ٪	من المواد الدهنية
٢,٧٨ ٪	من السكر
٨,٠٤ ٪	من المواد الاستخلاصية غير الازوتية
٠,٧١ ٪	من السيليلوز

٣٦١٥ - بَصَل الخشخاش * ، هِيمَنْتُس أَتَمَر
Haemanthus coccineus (S). Haemanthe ponceau, Tulipe du Cap (F). African tulip, Blood flower (E). Afrikanische tulpe, Blutblume (D). Tulipano d'Africa, T. del Cape (I).

نوع من الهيمانتس له ورقتان كبيرتان نصلها مالمس البشرة ، يطول من ٥٠ الى ٦٠ سم . ويعرض من ١٥ الى ٢٠ . شراخه يعلو نحو ٢٥ سم . ترسه الزهري كثيف التجميع قطره نحو ٨ سم . زهرته حمراء اللون || ازهاره يستمر من آب الى تشرين .

Scille d'automne (F). **٣٦١٦ - بَصَل الحبة**
Autumnal squill (E). راجع إشقييل الخريف .

Muscari chevelu (F). **٣٦١٧ - بَصَل الذئب**
Tassel hyacinth (E). راجع حلحل أزب .

Muscari botryoïde (F). **٣٦١٨ - بَصَل الزيز**
Grape hyacinth (E). راجع حلحل جميل .

Allium ampeloprasum (S). Ail à cheval, Poireau sauvage, Faux poireau (F). Blue-leek, Vine-leek,

— الفئة الثالثة تشمل الضروب المشخنة ذات الوريقات الصغيرة المتوسطة الكثافة والتميع وهي :

Moerker, Président von Junker, Gastold, jaune cimbal, Leo, Richter's Imperator, Louis Botha, Landjuwel, New seedling, Stollnick, Major Welssman, Lord Tennyson, Omega...

— الفئة الرابعة تشمل الضروب ذات العروق الملونة والوريقات المستعرضة المتمعة وهي :

Géante bleue, Géante blanche, Arabella, Victoria-Augusta, Zoulou, Bretonne...

هذا من الوجهة النباتية وقد لا يكون كذلك من الوجهة الصنفية التجارية التي تركز على جودة المذاق والطعم. لذلك وبالنسبة الى هذه المجموعة، تقسم الضروب الى اربعة اقسام :

١ - قسم الضروب الجيدة الصنف الممكن استعمالها في جميع المأكول :

Belle de Fontenay, Marjolin hâtive, Marjolin têtard, Fleur de pêcher, Chave, Royale.

٢ - قسم الضروب الحسنة الصنف الممكن استعمالها في معظم المأكول :

Hollande jaune, Hollande rouge, Violette longue, Quarantaine de la Halle, Caillou blanc, Séguin, Violette, etc...

٣ - قسم الضروب المتوسطة الصنف :

Pousse-debout, Victor, Rognon rose, Saucisse, Flocon de neige, Merveille d'Amérique, etc...

٤ - قسم الضروب العادية الصنف الوافرة الانتاج التي تستخدم في الصناعات الغذائية وفي غذاء الماشية :

Eléphant blanc, Champion, Reine des polders, Farineuse rouge, Géante bleue, Institut de Bauvais, Magnum bonum, Early rose, Négresse, Richter's Imperator, etc...

٣٦٣٨ - بطاطا أب-تو-ديت *

Up-to-déti (Fin de siècle)

ضرب متوسط الابكار، حسن الصنف، قوي النمو، وافر الانتاج، يرغب في الاتربة القليلة او المتوسطة الاندماج || درناته مستطيلة مفلطحة، عويناتها قليلة غائرة، بشرتها سمراء اللون، لبها ابيض.

٣٦٣٩ - بطاطا إرستالين *

Eersteling

ضرب باكوري يوجد في الاتربة المتوسطة الاندماج. درناته كبيرة الحجم مستطيلة، عويناتها سطحية، بشرتها تبنية اللون، لبها اصفر.

٣٦٤٠ - بطاطا إرلي روز *

Early rose

ضرب متوسط الابكار، قوي النمو، وافر الانتاج. درناته كبيرة اسطوانية، عويناتها غائرة عميقة، بشرتها وردية اللون، لبها ابيض غزير العصارة.

٣٦٤١ - بطاطا آرڤن بنر *

Arran Banner

ضرب باكوري نجحت زراعته في لبنان. درناته متوسطة الحجم، شبه مستديرة، عويناتها صغيرة غائرة، بشرتها ملساء ترابية اللون، لبها ابيض.

٣٦٤٢ - بطاطا امبراطور *

Imperator, Richter's Imperator

ضرب مشخار عظيم الانتاج، متوسط الصنف يستعمل في الصناعات الغذائية. درناته كبيرة الحجم شبه مستديرة عويناتها غائرة عميقة، لبها ابيض جامد المكسر.

٣٦٣٢ - بط خضاري

Canard colvert (F).
Mallard (E).
راجع بركة.

٣٦٣٣ - بط قطني

Macreuse (F). Scoter (E).
هو الدمية، جنس طير من البطيات؛ اطلب دمية.

٣٦٣٤ - بطء الإكتاخ، بطء النقطين

Echamplure (F).
هو التأخير العارض على تفتح الزمعات وقد يكون سببه البرد وخلافه.

٣٦٣٥ - بطارس

ضرب من السمك يعرف بالسرخس (محيط المحيط).

٣٦٣٦ - بطاس

Patas (F).
هو الهجرس الاحمر، نوع من القروذ الذئالة، اطلبه.

٣٦٣٧ - بطاطا، بطاطيس

Solanum tuberosum (S).
Pomme de terre, Parmentière (F). Common potato (E). Potaten, Kartoffel (D). Patata, Pomo di terra (I).

جنس نباتات عشبية عسقلية حولية من فصيلة الباذنجانيات. انواعه وضروبه كثيرة العدد تتميز بأوراقها ودرناتها المختلفة الاشكال والاحجام || سوقها عشبية هشة. أوراقها مركبة وثرية. وريقاتها صغيرة يراوح عددها من ٥ الى ٩. نصلها كثير العروق متمم الملمس، ازغب البشرة. ازهارها عثكولي التجميع. تاجي الارتكاز. ازهارها خماسية التركيب عديدة الالوان يطفو عليها الليلكي. ثمارها عنبية. بزورها صغيرة كلوية مفلطحة لونها الى البياض. عسقلها درنية غذائية عديدة الاشكال والالوان تحوى من النشا ما تراوح نسبته من ١٦ الى ٢٤ ٪ وهي متوسطة الغنى بالفيتامينات «آ» و «ث». اما متوسط تركيبها فهو ما يلي :

ماء	٧٩,٠٠ ٪
بروتين	١,٧٦ ٪
دهن	٠,٠٥ ٪
هيدروكربونات	١٧,٧٤ ٪
الياف	٠,٣٥ ٪
رماد	١,١٠ ٪

يمش البطاطا وينتج في معظم الاقاليم المعتدلة. مهدد المقدور بلاد الشيلي في امريكا الجنوبية حيث تكثر انواعه البرية. يوجد في جميع الاتربة القليلة او المتوسطة الاندماج، الخوارة، الغنية بالمواد العضوية وبالعناصر الرئيسية. زراعته تستلزم العناية بالترية والري الغزير || تقسم انواعه وضروبه، بالنسبة الى خصائص أوراقها، الى اربع فئات :

— الفئة الاولى تشمل الضروب الباكورية ذات الاوراق الكثيفة المتمعة النصل وهي :

Segonzac, Chave, Pousse-debout, Reine des polders, Mayette, Kidney, Prince de Galles, Ronde hâtive, Ed. Lefort, Gelbe rose, Brandale, etc.

— الفئة الثانية تشمل الضروب المتوسطة الابكار ذات الاوراق القليلة الكثافة، الدمية التميع وهي :


Salle de farine, Saas, Ella, Fleur de pêcher, Couronne impériale, Flocon de neige, Evergood, Hâtive de Richter, Hâtive de Zwicky, Kerfurter, Fruhe, Landmann, Géante de l'Ohio, etc.



بطاطا، ساق وأوراق وأزهار



بطاطا أب-تو-ديت



بطاطا إرستالين



بطاطا إرلي روز



بطاطا آرڤن بنر



بطاطا امبراطور



بطاطا بينتجه



بطاطا حلوه



بطاطا رويال



بطاطا مايت



بطاطا مرجولان



بطاطا

٣٦٥٠ - بطاطا صفراء هولندا (F). *Jaune de Hollande* (F). ضرب متوسط الابكار، قوي النمو، وافر الانتاج. درناته مستطيلة، عويناتها غائرة، لبها اصفر.

٣٦٥١ - بطاطا فيتلوت (F). *Vitelotte* (F). ضرب متوسط الابكار، وافر الانتاج. درناته اسطوانية مستطيلة، عويناتها غائرة عميقة، لبها ابيض جامد المكسر.

٣٦٥٢ - بطاطا مابيت (F). *Mayette* (F). ضرب باكوري، قوي النمو حسن الصنف. درناته بيضيه مفلطحة، عويناتها سطحية، بشرتها غبراء ملساء. لبها اصفر.

٣٦٥٣ - بطاطا مرجولين*، بطاطا كيدني (F). *Marjolin, Marjolaine, Kidney* (F). ضرب باكوري، فاخر الصنف، متوسط الانتاج. درناته مستطيلة، بشرتها ملساء، عويناتها سطحية، لبها عابق الصفار.

٣٦٥٤ - بطاطا هنو (F). *Hénaut, Belle de Fontenay* (F). ضرب باكوري، فاخر الصنف، جيد الانتاج. درناته اسطوانية مستطيلة، بشرتها ملساء، عويناتها غائرة، لبها اصفر.

٣٦٥٥ - بطاطا صينية (F). *Igname bulbifère* (F). راجع إنيام صيني.

٣٦٥٦ - بطاطا يابانية (F). *Crosne du Japon* (F). نبات عشبي عسقولي معمر من السقاس وفصيلة الشفويات. يزرع لجلوره الدرنية المأكولة. عساقله مغزلية الشكل، بيضاء المكسر، قليلة الالياف، مستحبة الطعم.

٣٦٥٧ - بطاطا*، جنجر، طرته، شبط الفول (S). *Polygonum aviculare* (S). *Renouée des oiseaux, Centinode, Trainasse, Traniane, Herbe à cochon* (F). *Knot-grass, Centinode, Knot-weed, Armstrong* (E). *Vogelknöterich* (D). *Centinodia, Bistorte aviculare, Bistorte centinodio, Poligono, P. degli uccelli* (I).

نبات عشبي بري من فصيلة البطاطيات كان ولا يزال من الاعشاب الطبية. ساقه فراء. اوراقه متعاقبة، نصلها اهليلجي الشكل، صغير القد، مدبب المقصبة الشائكة. ازهاره ابطية الارتكاز، ثماره بزور مخروطية الشكل تأكلها العصافير.

٣٦٥٨ - بطاطا نيلي، شبطاط، نيلته صينية (S). *Polygonum tinctorium* (S). *Persicaire indigotier* (F). *Chinese Indigo* (E). *Chinoisches Indigo* (D). *Saraceno tintorio* (I).

نبات عشبي معمر من فصيلة البطاطيات. يستخرج منه صبغ نيلي شائع الاستعمال في بلاد الشرق الاقصى.

٣٦٥٩ - بطاطيات (S). *Polygonaceae* (S).

Polygonacées (F). *Polygonaceae* (E). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديمة القعالات. اجناسها وانواعها نحو ١٠٠ جميعها من نباتات المناطق الحارة والمعتدلة. فيها الاعشاب والجنات والاشجار، معظمها بري. اوراقها فردية. ازهارها خنثوية. ازهارها لاقياسي الارتكاز، عنقودي او صيواني او سنبل. التجميع.

٣٦٤٣ - بطاطا بلائشار (F). *Blanchard* (F). ضرب متوسط الابكار، حسن الصنف، وافر الانتاج. درناته مستديرة الشكل، عويناتها غائرة، لبها اصفر اللون.

٣٦٤٤ - بطاطا بينتجه* (F). *Bintje* (F). ضرب باكوري فاخر الصنف، وافر الانتاج. درناته بيضيه مستطيلة، عويناتها سطحية. بشرتها ملساء تبقية اللون، لبها اصفر.

٣٦٤٥ - بطاطا حلوه*، قلئقاس هندي (F). *Ipomaea batatas, Convolvulus batatas, Batatas edulis* (S). *Patate, Batate, Patate douce* (F). *Sweet potato, Spanish potato* (E). *Batate, Batatep-runkwinde* (D). *Batata* (I).

نبات عسقولي عشبي مداد معمر من فصيلة المحموديات. ضروبه عديدة سوقها مدادة تطول من ٢ الى ٣ أمتار. اوراقه مختلفة الاشكال تغلب فيها الاستطالة، جميعها معنقة متعاقبة. ازهاره قليلة التجميع، محورية الارتكاز يكثر فيها البنفسجي والابيض. عساقله عديدة الاشكال والاحجام والالوان التي تختلف مع الضروب من الابيض الى الاصفر والاحمر والبنفسجي. جميعها سكرية مفضية مأكولة بعد شيها او سلقها || تركيبها الكيماوي التالي، وهو المعدل الوسطي، يدل على غناها بالمواد الغذائية :

ماء	٦٩,٣٢ %
هيدرات الكربون	٢٤,٧٣ %
مواد دهنية	٢,٦٣ %
مواد زلالية	١,٣٨ %
سليوز	٠,٨٦ %
رماد	١,٠٨ %

اما نشاها فأبيض اللون، سهل الاستخراج. ونسبة موادها السكرية تزداد في الضروب العابقة الالوان || يستخرج منها بالتخمير والتقطير نوع من الكحول اللطيفة الشائعة الاستعمال. المثة كيلو من المسائل الحمر تقطر ١٥ ليترًا من الكحول عيار ٩٥؛ والمثة كيلو من المسائل البيض تقطر ١٣ ليترًا من الكحول عيار ٩٥.

٣٦٤٦ - بطاطا رويال* (F). *Royale* (F). ضرب متوسط الابكار، فاخر الصنف، وافر الانتاج. درناته كلوية الشكل متوسطة الحجم، عويناتها بارزة، بشرتها سمراء اللون، لبها تبي.

٣٦٤٧ - بطاطا زنجية (F). *Négresse* (F). ضرب مشغار متوسط الصنف والانتاج، درناته اسطوانية، عويناتها غائرة عميقة. لبها شديد السمرة جامد المكسر.

٣٦٤٨ - بطاطا سان مالو (F). *Saint Malo, Fluke géante* (F). ضرب متوسط الابكار، قوي النمو، وافر الانتاج. درناته مستطيلة كبيرة، بشرتها صفراء اللون ملساء، عويناتها سطحية، لبها ابيض اللون غزير العصارة.

٣٦٤٩ - بطاطا شاو (F). *Chaw, Shaw, Jaune ronde* (F). ضرب باكوري، فاخر الصنف، وافر الانتاج. درناته متوسطة الحجم، عويناتها غائرة، لبها اصفر اللون قليل العصارة.

٣٦٦٠ - بَطْبَطَة

البطبطة هي صوت البط من فيه .



بطر وميس

٣٦٦١ - بَطْطَة

Canard (F). Duck (E).

٣٦٦٢ - بَطْطَة أنثى

Cane (F). Female duck (E).

٣٦٦٣ - بَطْطَحَاء

Lit d'un torrent (F).

Torrent bed (E).

البطحاء مسيل الطحمة والجدول .

٣٦٦٤ - بَطْرَة ٥

Batara (F).

طائر من الجوارثم وفصيلة الجيشتيات يدعى تمنوفيل اشهب ، اطلبه .



بطريش الاغصان

٣٦٦٥ - بَطْرَة هندية

Abre (F). Love pea (E).

راجع ابروس عطر .



بطريش الحبوب

٣٦٦٦ - بَطْرُوميس ٥

Pteromys (S).

Pteromys (F). Pteromys (E).

جنس حيوانات لبونة قاضمة من فصيلة السنجائيات .
انواعه ١٢ موطنها الهند والصين واليابان والجزر || اجسامها
متوسطة القد مستطيلة . رؤسها عريضة . ذلأقيمها
مقطومة . آذانها كبيرة . اذنانها طويلة . تتميز بزوائد
الجلدية الجناحية القائمة على خوصها من مفصل الساعد
الى رسع الفخذ ومنه الى الزام الاول من الذنب . تطير
من شجرة الى اخرى ، شوطها يراوح من ٢٠ الى ٨٠ م .
تألف الغابات والاحراج الكثيفة ، تسرح في الليل .
تعيش على الاشجار قوتها البراعم والنوامي والثمار على اختلافها
والحشرات والديدان . اجعارها او كان تربها في صدوع
الاشجار . اناثها تضع من ٣ الى ٤ ادراص ، تبصر وتكتسي
بعد وضعها بعشرة ايام .



بطريش الراتنجيات

٣٦٦٧ - بَطْرِيش الاغصان ٥

Scobicia ceratonlae (S).

Cusson des branches (F).

خنفساء من البطريشيات صغيرة القد طولها نحو ٥ مم .
ثوبها الى البني العايق . تركيب اساريع الكرمة وافنان المنور
وافناد التين فتثقبها وتمتص مكنها داخل اللحاء فينقف عن
يرقات تتابع حفر اللحاء والخشب حتى منطقة المكاك والمخ
فتقضي على الجزء الاعلى من العضو المنخور .



بطريش الزيتون

٣٦٦٨ - بَطْرِيش الحبوب ٥

Rhizopertha dominica (S). Cusson des grains.

Capucin des grains (F). Lesser grain borer (E).

Getreidekapuziner (D).

خنفساء من البطريشيات صغيرة القد اسطوانية الشكل ،
كستنية اللون ، طولها نحو ٣ مم . ظهراتها خشن الملمس .
تأشيرها قوية بارزة . تمتص مكنها على الحبوب المخزونة
فينقف عن يرقات دقيقة غبراء اللون تنخر الحبوب المكسورة
وغير المكسورة وتعيش عليها .



بطريش السنديان

٣٦٦٩ - بَطْرِيش الراتنجيات ٥

Bostrychus typographus (S). Bostriche typographe (F).

خنفساء من البطريشيات صغيرة القد ، مبططة ، سمراء اللون
تطول نحو ٦ مم . تركيب سوق واغصان الراتنجيات . يرقاتها
مؤذية تنخر اللحاء وتسردب الشكير .



بطريش النخيل



بطريش مخدّد

٣٦٧٠ - بَطْرِيش الزيتون ٥

Sinoxylon sexdentatum (S). Sinoxylon, Apate de la vigne (F). Sinoxylon sexdentatum (E). Rebendraher (D).

خنفساء من البطريشيات صغيرة القد ، طولها نحو ٥ مم .
ثوبها حنطي اللون اسمر الموج . ظهراتها مسنن الختار .
تركب عادة جميع الاشجار اليابسة والضعيفة ولا تمف
عن الزيتون ، وقد تعتري الكرمة ان لم تجد عائلا سواها .

٣٦٧١ - بَطْرِيش السنديان ٥

Bostrychus capucinus (S). Apate des chênes (F).

خنفساء من البطريشيات ، طولها نحو ٨ مم . رأسها وصدرها
سود ، نمداهها وبطنها حر . يرقاتها تركيب الاشجار
الحرجية اخصها السنديان فتؤذيه .

٣٦٧٢ - بَطْرِيش الكرمة

Sinoxylon (F).

بطريش الكرمة وبطريش الزيتون واحد ، اطلبه .

٣٦٧٣ - بَطْرِيش النخيل ٥

Phonapathe frontalis (S). Apate des dattiers (F).

خنفساء من البطريشيات كبيرة القد طولها نحو ١٥ مم .
ثوبها كستني اللون ، اسود الموج . مزغب الكنف . يرقاتها
تركب المراجين فتتخرها وتسبب يباس البسر قبل ادراكه
وقد تنخر الجريد فتكسره الرياح .

٣٦٧٤ - بَطْرِيش مخدّد ٥

Bostrychus lineatus (S). Bostriche strié (F).

خنفساء من البطريشيات صغيرة القد طولها نحو ٥ مم .
ثوبها الى السمرة العنابية . رأسها اسود اللون . نمداهها
مخدّدان . يرقاتها تركيب الصنوبر فتؤذيه .

٣٦٧٥ - بَطْرِيشيات ٥

Bostrychidae (S). Bostrychids (E). Kapuzinerkäfer, Holzkäfer (D).

فصيلة حشرات من نمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها
عديدة . يكثر فيها الحجم الصغير والشكل الاسطواني .
رؤوسها محدبة . قرونها الاستشعارية قصيرة ، فواصلها
من ٩ الى ١١ والثلاث الاخيرة منها منشارية او ورقية
الشكل . ارساغها خماسية العقول . محالبها عادمة التسنين .
اثوابها مختلفة الالوان || اناثها تمتص مكنها في ثقب
اسطوانية تحفرها في الاخشاب اليابسة وفي لحاء الاشجار
فينقف عن يرقات مقرسة غليظة الرأس ومقدم الجسم تعيش
على المواد الخشبية في الانفاق التي تسردها وتمكث فيها
حتى رقادها العذري حيث تتحول الى حوريات فخنفساء
تجدد جيلها وتعيد سيرتها .

٣٦٧٦ - بَطْرِيق * ، أكتع

Alca (S). Pingouin (F). Penguin (E).

جنس طير بحرية من فصيلة البطريقيات . انواعه المعروفة
نحو ١٧ موطنها جزر البحار الشمالية والقطبية ، تنزح
عنها الى المناطق الدافئة في زمن التساقد والترخيم ثم تعود
اليها مع فراخها . ملجئها الحياتي جماعي . اسراها وافرة
العدد . قوتها الاسماك والقشريات || اجسامها عضلية ،
معتدلة الجرم ، ربعة الرؤوس ، مستطيلة المناقيد ، قصيرة
الاجنحة الذرية الاطراف ، صغيرة الاذنان والقوائم ،
ثلاثية الاصابع الكاملة الخطاب . اثوابها متائلة عند الشقين .
رؤوسها وارديتها وكمال صفحتها العليا الى السواد الفاحم



بطريق



بطفون جبار



بطم



بطم أخضر



بطماحة

فواحة العرف كثيرة الاستهلاك || ثمرته تدعى الحبة الخضراء. قال ابن سينا انه يحلو الجرب والقوباء. وقال غيره انه منقث في النزلات الصدرية ومدر للبول. وقال الانطاكي: «اوراقها تسود الشعر ملاء. والحب يسخن الصدر والمعدة ويقطع البلغم ويزيد القوة الجنسية ويسهل عن تجربة. ودهنه يحلل أوجاع العصب وحصر البول شرباً ويصلحه العسل. وشربه الى عشرة».

٣٦٨٢ - **بُطْمُ أَخْضَرُ***، بُرْزُوق (S). Pistacia khinjuk (S). Lentisque de Bombay (F). East Indian mastiche (E). Ostindischer mastix (D). Lentisco di Bombay (I).

نوع من الفستقيات وفصيلة البطميات. مهدد الهند وبعض مناطق الشرق الاوسط. شجرته فرعاء تعلو من ٤ الى ٧ امتار. اوراقها مركبة عابطة، وريقاتها وترية يراوح عددها من ٩ الى ١٣. نصلها ملس السطح. ثمارها بقدر الحصة الصغيرة || يستخرج من لحاء سوقها مادة راتنجية صفية تملك وتستعمل في شتى الصناعات العطرية.

٣٦٨٣ - **بُطْمُ شَرْقِي**، **بُطْمُ مَسْكِي**، **ضُرُوء**، **مُصْطَكَاة** (S). Pistacia lentiscus (S).

Lentisque, Pistachier lentisque, Arbre au mastic (F). Lentisk, Mastic tree (E). Mastixpistazie (D). Lentisco, Pistacchio sondo, Manna del Libano, Pistacchio d'Oriente (I).

نوع من الفستقيات وفصيلة البطميات. شجرته صغيرة القد فرعاء، تعلو من مترين الى ستة امتار. اوراقها مركبة دائمة، وريقاتها شفعية التجميع، مستطيلة يراوح عددها من ٦ الى ١٢. نصلها ملس البشرة، جميل الخضار اللامع، عنقها الى الجذوة. ثمارها بحجم وشكل الحمص الصغير، لونها الى الجذوة السمراء || يستخرج منها صمغ راتنجي مشهور يدعى المصطكاء والكمكام.

٣٦٨٤ - **بُطْمَاْحَة*** (S). Incarvillea (S). Incarvillea (F). Incarvillea (E).

جنس نباتات عشبية او خشوشة من فصيلة البغنونيات. سوقها متباينة الاحجام. اوراقها متعاقبة. ازهارها كبيرة القد، عنقودية التجميع، طرفية الارتكاز || تزرع للتزيين في المراكن والحدائق. ترغب في الاتربة المتوسطة الاندماج الوافرة المواد الغذائية || انواعها المعروفة عديدة، اشهرها التالية.

٣٦٨٥ - **بُطْمَاْحَة صَفْرَاء*** (S). Incarvillea lutea (S). Incarvillea (F). Incarvillea (E).

نوع من البطماحة. بجلة معصرة خشوشة الساق والفروع تعلو من ٨٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها الجذعية مسننة الختار. اوراقها العليا مفصصة. ازهارها متدللية كبيرة القد، قطرها نحو ٥ سم. لونها الى الصفار الكبريتي الجميل || تنويرها يستمر من حزيران الى تموز.

٣٦٨٦ - **بُطْمَاْحَة صَيْلِيَّة*** (S). Incarvillea sinensis (S).

نوع من البطماحة. عشبة تزيينية محولة. ساقها تعلو من ٥٠ الى ٩٠ سم. اوراقها ريشية، خطية إلوريقات. ازهارها بيضاء اللون يعلوها تمشيخ احمر وهي عشارية الفصل، قريبة الشبه بزهرة الكشائين أي الديجيتال || تنويرها يستمر من تموز الى آب.

الاسفع الموج، صدورها وبطونها وكامل صفحتها السفلى الى البياض || اناسها تضع في موسمها الحولي بيضة واحدة، شبه اجاصية الشكل، صلبة القوية، خضراء اللون، مرقوشة بالابيض. الترخيم يستمر نحو ٣٥ يوماً تقوم به الانثى بمنابرة الذكر.

٣٦٧٧ - **بُطْرِيْقِيَّات** (S). Alcidae (S).

Alcidés (F). Alcidae (E).

فصيلة طير من عادات الريش ورثة كفتيات القدم. انواعها المعروفة نحو ٢٥ تجمعها بعض الاجناس. جميعها تسبح وتغوص. تجيد العوم اكثر من الطيران. مارجها الحياتي جماعي. اسرارها متباينة العدد، تغلب فيها الوفرة || اجسامها عضلية. رؤوسها متفاوتة الضخامة. اعناقها قصيرة. مناقيدها متباينة الاشكال. اجنحتها قصيرة، ذلقة واذناها وقوائمها كذلك. اصابعها كاملة الخطاب. اثوابها متماثلة عند الشقين || موطنها مناطق الدائرة القطبية تنزح عنها مرة في العام، نحو خمسة اشهر، الى المناطق المعتدلة الحرارة، حيث تبيض وتحضن وتعمل ثم تعود مع فراخها || اشهر اجناسها البطريق والم و المرفول والمقار.

٣٦٧٨ - **بُطْس**

«نوع من السمك لها مرارات يكتب بها الكتب فاذا جففت قرئت في الظلام كما تقرأ بالنهار» (صاحب المعطار) وذلك يعود الى ما فيها من فسفور يضيء في الظلام.

٣٦٧٩ - **بُطْمُونُ جَبَّار*** (S). Patagona gigas (S).

Patagone géante (F).

طائر من فصيلة الضريسيات. اعطانه بعض مناطق امريكا الجنوبية. يعتبر اكبر طائر من فصيلة الضريسيات || جسمه قريب الشبه بجسم السامة، يطول نحو ٢٠ سم. ثوبه الى الطعلة السمراء يعلوها موج اخضر. صدره وبطنه الى الذبرة الخضراء الموج. يتميز باستطالة منقاره وجناحيه || قوته اللدباب والحوام ورحيق الازهار || يدشن عشه في الاشجار الغشاء قرب مجاري الماء. انشاء تحضن من مرتين الى ثلاث مرات في الحول. حضنتها من ٣ الى ٤ بيضات ترخها بمنابرة الذكر نحو ١٣ يوماً.

٣٦٨٠ - **بُطْلَان** (F). Nullité (F). Nullity (E).

هو انتقاض العقد القانوني بسبب فقدانه احدى الشروط الجوهرية او الشكلية اللازمة لصحته. والبطلان قد يكون:

بطلان مطلق Nullité absolue (F).

بطلان صريح Nullité expresse (F).

بطلان نسبي Nullité relative (F).

بطلان مضمر Nullité virtuelle (F).

٣٦٨١ - **بُطْمُ***، **صِرَاوَة**

Pistacia terebinthus P. cabulica (S). Térébinthe, Pistachier térébinthe (F). Turpentine tree, Terebinth tree (E). Terepentinpistazie, Terepentinbaum (D). Terebinto, Pistacchio terebintino, Scotano campestre (I).

ومن اسمائه افيس، افططويس، تمالس، طرينس، قريشة. نوع من الفستقيات وفصيلة البطميات. وهو شجرة فرعاء فتاء تعلو من ٣ الى ٥ امتار. اوراقها مركبة عابطة. وريقاتها وترية يراوح عددها من ٧ الى ١٣، نصلها جلدي التركيب ملس السطح. ثمارها بلسنية القد، شبه كروية الشكل || يستخرج من لحاء سوقها مادة راتنجية

البطيخات . أنواعه المروفة عشرة اعطائها البلاد الحارة . تجوب بحيراتنا وانهارها واهوارها ومناقعها . اجسامها كبيرة القد تطول نحو ٥٠ سم . اثوابها الى الصلبة المنسجة بالاسود والاصفر || طيرانها بطي . الاندفاع ، متقطع الحركة ، قصير الشوط .

٣٦٩٨ - بطوس* Pothos (S). Pothos (F).

جنس نباتات مدادة معمرة من فصيلة القلقاسيات . انواعها المروفة عديدة جميعها من ثبوت المناطق الحارة الاسوية والافريقية والامريكية || سوقها عارشة . اوراقها متعاقبة ، معنقة ، اهليلجية النصال المتممجة . ازهارها خنثوية ، ضبية التجميع ، ترتكز على معاليق ابطية الانتشاب . ثمارها عنبية ، صغيرة القد ، مستديرة ، مبططة الرأس والعقب ، جامدة القشور ، جحالية المادة .

٣٦٩٩ - بطونيا Pétunie (F). Petunia (E). راجع بتونيا .

٣٧٠٠ - بطونيكا، قسطنران Betonica (S). Bétoine (F). Betony (E).

جنس نباتات عشبية حولية او معمرة من فصيلة الشفويات . اوراقها متعاقبة معنقة طويلة الزناد . ازهارها سنبلية التجميع تاجي الارتكاز . ازهارها بحيلة الشكل ، عطرية العرف ، سريعة الادبار . انواعها قليلة . اشهرها البطونيكا الطبية والبطونيكا التزيينية .

٣٧٠١ - بطونيكا طيبة* ، شاطره

Betonica officinalis, Stachys betonica (S). Bétoine, Betonica, Belle tête, Epialre bétoine (F). Betony, Wound-wort, Bishop's-wort (E). Betonien, Betonienziest, Betonica (D). Betonica, Vettonica (I). نوع من البطونيكا ، وهي عشبة برية معمرة منبتها جميع الاصقاع المعتدلة كانت ولا تزال من النباتات الطبية الشائعة الاستعمال تنفع من الطحال وضعف الكبد والهضم . وهي تعلو من ٢٠ الى ٦٠ سم . ساقها زباء . اوراقها بيضيه مسننة الحافة . ازهارها سنبلية التجميع وردية اللون او حمراء .

٣٧٠٢ - بطيات Anatidae (S).

Anatidés (F). Anatidae (E). هي فصيلة البط من كفيات القدم صفيحيات المناقير . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . اشهرها البط والم والارز والبلقشة والعفاس .

٣٧٠٣ - بطيخة Papillon femelle (F). Female butterfly (E). هي الفراشة الانثى من اي جنس او نوع كانت ، ج بطاح .

٣٧٠٤ - بطيخ* ، بطيخ أحمر ، بطيخ هندي ، جبس ، رقي ، دلاع ، خربز

Citrullus vulgaris, Cucumis citrullus, Cucurbita citrullus (S). Pastèque, Melon d'eau (F). Watermelon (E). Wasserzittrulle, Wassermelone (D). Pastecca, Melone d'acqua, Anguria (I).

نبات عشبي حولي بري وزراعي من فصيلة القرعيات . يزرع للآراء المأكولة . ضروبه عديدة معظمها زراعي مأكول الثمار . فوارقها قائمة على الشكل والحجم ورقعة

٣٦٨٧ - بطماحة لبدة

Incarvillea compacta (S).

Incarvillée compacte (F).

نوع من البطماحة . عشبة مخشوشة معمرة درنية الجذور . ساقها قصيرة تعلو نحو ٤٠ سم . اوراقها لحمية ، سكمية التفصيص . ازهارها لبد التجميع . ازهارها كبيرة القد ، تطول نحو ٦ سم . لونها الى الوردي اللامع || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

٣٦٨٨ - بطميات

Anacardiaceae,

Terebinthaceae (S). Anacardiaceae, Térébin-

thacées (F). Anacardiaceae, Terebinthaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين كثيرة القعالات تشمل خمسة وخمسين جنساً تنتمي الى خمسة اسباط . وهي المنقيات والفستقيات والدوبينيات والبلاذريات والسبنديات . جميعها اشجار وشجيرات وجنبات راتنجية .

٣٦٨٩ - بطن Abdomen

تجويف في الجسم الحيواني يضم مجموعة الاعضاء التي تكون الجهاز الهضمي والدوري والبولي || اهم اجزائه المري والمعدة والامعاء والكبد والكلى والطحال .

٣٦٩٠ - بطن Alpha du Centaure (F).

البطن نجم نير من كوكبة قنطورس . ويدعى ايضاً ألفا قنطورس ، اطلبه .

٣٦٩١ - بطن الأرض Tréfonds (F). Subsoil (E).

هو من الحضيض ما كان مركزه الحصيلي تحت الهوم اذ ان الترتيب من داخل الارض الى خارجها يبتدى بالنقطة الوسطى او المركزية يعلوها الجوف المانع ثم بطن الارض ثم الهوم ثم التربة السطحية .

٣٦٩٢ - بطن الحوت ، رشاء

بطن الحوت او الرشاء منزل من منازل القمر اليانية . وهو كواكب كثيرة صغار على صورة السمكة وفي سرتها نجم نير ينزله القمر آخر ليلة من الشهر | رقيب بطن الحوت يدعى السماك .

٣٦٩٣ - بطناني* Tellurique (F). Telluric (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما هو خاص بالارض كالحراة الارضية والزلازل ...

٣٦٩٤ - بطنانية Tellurisme (F). Tellurism (E).

البتنانية من الوجهة الحكمية ، عمل مغناطيسية الارض . ومن الوجهة الجغرافية ، تأثير طبيعة الارض على الحيوان والنبات .

٣٦٩٥ - بطني ، جرجنبي Ventral

نعت وصفي يطلق على كل ما له صلة ببطن الحيوان .

٣٦٩٦ - بطنية السنفات Gastrolobe

راجع غاسترولوب .

٣٦٩٧ - بطور* Dendrocygna (S).

Dendrocygne, Canard-oie (F). Dendrocygna (E).

جنس طير من كفيات القدم صفيحيات المناقير وفصيلة



بطور



بطوس



بطونيكا طيبة



بطيخ

٣٧١٦ - بَعَاك ٥
Andromastie (F).
Andromasty (E).
البعاك صمور الغدد الثديية عند الإنسان والضرعية عند الحيوان .

٣٧١٧ - بُعَاق *
Nimbo-cumulus
سحاب ينهمر بشدة .

٣٧١٨ - بَعَامَة ، بَعِيمَة ، شِمَانْزِي
Anthropopithecus (S). Chimpanzé (F). Chimpanzee (E). Schimpanze (D).

البعامة ج بعام . جنس قروود كبيرة القد من فصيلة اشباه الانسان ومرتبعة القرديات . انواعه المعروفة خمسة . موطنها المناطق الافريقية الحارة والاستوائية . تألف الاحراج الكثيفة . قوتها الثمار والجلود وبعض الاعشاب . تعيش جماعات قليلة العدد || تعتبر من افهم القروود وأميزها موهبة وادراكاً . اعرف انواعه ما يلي .

٣٧١٩ - بَعَامَة شَائِعَة * ، أَوْرَان ، شِمَانْزِي شَائِع
Anthropopithecus troglodytes (S). Chimpanzé commun (F). Common chimpanzee (E).

نوع من البعام قامته تجاوز ١٥٠ سم . جسمه كثيف الشعر الاسود . موطنه البلاد الاستوائية الافريقية . يألف الاحراج الكثيفة . يتسلق الاشجار بخفة . قوته الثمار . له من القوة والعزم ما يخيف الفهد فيتحاشاه . يقبل التأديب لكنه سريع الغضب ولا يتحمل المضادة والاكرام .

٣٧٢٠ - بَعَامَة صَلْعَاء * ، شِمَانْزِي أَصْلَع
Anthropopithecus tschego (S). Chimpanzé tségo (F). Tschego chimpanzee (E).

نوع من البعام . قامته نحو ١٥٠ سم . رأسه أصلع . اذناه كبيرتان مبسوطتان . أنفه مفروط ، شفاه غليظتان شارفتان || موطنه البلاد الاستوائية الافريقية . يألف الاحراج الكثيفة . قوته الثمار واللحوم || قوته تعادل قوة البعامة الشائعة . يقبل التأديب لكنه لا يتحمل المضادة .

٣٧٢١ - بَعَانِق
Harpies (F). Harpy (E).
جنس طير من العقبان وفصيلة الصقريات . انواعه قليلة جميعها كبيرة انقد طولها نحو ١٠٠ سم . وهي قوية المنسر الاعقت البهرة المؤلفة الحادة . سواقطها قصيرة ، اذناها طويلة ومستديرة ، ارساغها غليظة ، مخالبها مستطيلة ، اظافرها كبيرة || اعرف انواعها واشهرها البعق .

٣٧٢٢ - بَعَث
Reviviscence (F).
Reviviscence (E).

البعث خاصة تتميز بها بعض الحيوانات الدنيا والنباتات التي يميتها ، ظاهرياً ، الجفاف . وتبعثها اي تحيها من جديد ، الرطوبة || الحيوانات الدنيا التي تتميز بهذه الخاصة كثيرة العدد اشهرها الثعبانيات اذ تستطيع البقاء في حالة الموت الظاهر نحو ١٤ سنة . ثم الدورات وغيرها وبعض النباتات .

٣٧٢٣ - بَعْر
Déjection (F). Dejection (E).
رجيع ذوات الحف والظلف . الواحدة بمرة .

٣٧٢٤ - بَعْصُوصَة
البعصوصة : دوية صغيرة بيضاء لها بريق (اللسان) .

المكسر ولونه ولون البزور وتوشيمها || والبطيخ من الثمار الغنية بالماء اذ تبلغ نسبته نحو ٩١ ٪ في حين انه يحوى ٨ ٪ فقط من المواد السكرية . وهو من الثمار المنعشة التي تروي الغليل وتدر البول وتفيد المصابين بالاسماك والبواسير .

٣٧٠٥ - بَطِيخ شَوْكِي
Méiocacte (F).
Melon-thistle (E).
اطلب مقلة القاضي .

٣٧٠٦ - بَطِيخِي ، قَرَعِي
Péponifère (F).
نمت يطلق على جميع النباتات التي تحمل ثماراً كثمار البطيخ .

٣١٤٠ - بَطِيخِيَّة
Pépon, Péponide (F). Pepo (E).
نعت تعريفي يطلق على الثمار القرعية الشكل من اي فصيلة كانت .

٣٧٠٨ - بَطِيْط
Crenidens
جنس اسماك بحرية من فصيلة الاسبوريات ورتبة شائكات الزعانف . انواعه المعروفة ٦ معظمها من اسماك البحر المتوسط والاحمر . جميعها مفلطحة الجسم طولها يراوح من ١٥ الى ٢٠ سم . وعرضها من ٨ الى ١٢ سم . || اشهر انواعه البطيط الفضي .

٣٧٠٩ - بَطِيْط فَضِّي * ، بُلَيْط
Crenidens Forskali (S). Crenidens argenté (F). Silvery crenidens (E).

سمكة صغيرة من البطيط طولها نحو ١٨ سم . وعرضها ١٠ تكثر في البحر الاحمر . ثوبها متداخل الالوان الزاهية . ظهرها الى الخضار الازرق . جانبها وبطنها الى الفضي المجزع بلالصف . زعانفها متراكبة الالوان .

٣٧١٠ - بَطِيْن
Ventricule (F). Ventricle (E).

٣٧١١ - بَطِيْن
Botein

البطين منزل من منازل القمر الشامية . وهو بطن الحمل وصُفّر لان الحمل برج نجوم كثيرة . والبطين بطنه والثريا لميته . وهو يتألف من ثلاثة انجم صغار مستوية التثليث كانها اثاني . موقعه بين الشرطين والثريا || رقيب البطين يدعى الزبانا .

٣٧١٢ - بَطْكَارَة
هنة ناتئة في اسفل طرف الحياء عند جميع المواشي .

٣٧١٣ - بَطْر ، كَيْنَة
Clitoris
هو لجام مدخل الزردان او حجابها وهو جزء من الفرج مركزه تحت الزرنية وداخلها .

٣٧١٤ - بَطْرِيَّة *

Clitoria (S).
Clitorie (F). Clitoria (E).
سميت كذلك لان زهرها يشبه البظر . جنس نباتات برية وتزيينية ، حولية ومعمرة من فصيلة القرنيات الفراشية . انواعها نحو ٢٥ معظمها امريكي المنبت . منها العشبية والليفية والعرشة والمنتبسة . ازهارها كبيرة ، جميلة الشكل ، مختلفة الالوان فيها الابيض والازرق والارجواني والاحمر .

٣٧١٥ - بَطْرِيَّة تِرْنَات
Clitorie de Ternate (F).
Blue-clitoria (E).
اطلب مازريون هندي .



بطيط فضي



بطارية



بُداق



بعامة شائعة



بعامة صلعاء

نوع من البعوض كبيرة القد تحمل في صدرها بقتان كبيرتان قائمتان وعلى جناحها بقع فاتحة زباء . وهي كثيرة الانتشار في البلاد الحارة أخصها مصر . لدغتها مؤلمة . تنقل الملاريا .

٣٧٣٣ - بَعُوضَة فِضِّيَّة * *Stegomyia fasciata* (S).

نوع من البعوض وهي صغيرة القد ، رمضاء اللون مجزعة بالأصفر . حراشفها خلية فضية الموج . اعطائها البلاد الحارة يقال أنها تنقل الحمى الصفراء .

٣٧٣٤ - بَعُوضَة مِصْرِيَّة * *Aedes aegypti* (S).

نوع من البعوض صغيرة الجسم سوداء اللون ، صدرها مجزوع بالابيض . اعطائها البلاد الحارة يكثر وجودها في مصر . يقال أنها تنقل بعض الحميات .

٣٧٣٥ - بَعُوضَة مُلَطَّخَة *Anopheles maculipennis* (S).

حشرة من فصيلة البعوضيات . جسمها صغير القد يطول نحو ٧ مم . ثوبها الى السمرة الصفراء الموج . روشنها ملطخان . زيان الذكر اصفر اللون . زيان الانثى اسمر . بطنها انبوبي الشكل . قوائمها دقيقة سمراء || تظهر الحشرة الجملانة من نيسان الى تشرين الثاني . تألف ضفاف المناقع ومجاري الماء والمسكن الريفية وزرائب الماشية || تلقي الانثى بكمها في المياه الضحلة وعلى الضفاف الرطبة . يرقاها دامتة خاضلة .

٣٧٣٦ - بَعُوضَة مَنَزَلِيَّة * *Culex pipiens* (S).

Moustique domestique, Cousin commun (F). *Common mosquito* (E). *Haustechmücke* (D).

نوع من البعوض صغيرة القد طويلا من ٣ الى ٦ مم . جسمها وقوائمها الى السمرة . اجنحتها عديمة التبييض . الذكر منها يعيش نحو اربعة ايام . اما الانثى التي لا تعيش اكثر من شهر في الصيف فانها تقضي طوال مدة بياتها الشتوي ، من الحريف الى الربيع في الاماكن الرطبة المظلمة .

٣٧٣٧ - بَعُوضِيَّات *Culicidae* (S).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وأنواعها كثيرة العدد تجتمع الى عمارتين البعوض والدكسيد .

٣٧٣٨ - بَعْبِثْرَان *Santoline* (F).

راجع اخيليا منعشة . *Lavender cotton* (E).

٣٧٣٩ - بَعِير *Chameau adulte* (F).

البير : الجمل البازل او الجذع . ج ابيرة وبغران . *Grown-up camel* (E).

٣٧٤٠ - بُغ *Chamelet, Chamelon* (F).

البغ هو الجمل الصغير والانثى بغة . *Young camel* (E).

٣٧٤١ - بُغَاث *Catharte* (F).

جنس طير من الكواسر ينتمي الى فصيلة النسريات . انواعه قليلة جميعها كبيرة الجثة ، صلعاء الرؤوس ، مستطيلة المناسر المنمقفة البهرة . ارساغها ومخالبها عارية . سواقطها كبيرة القد سمراء اللون || اشهر انواعه البغاث الاسود والبغاث الرشيق .

٣٧٢٥ - بَعْفَة * ، هَامَة ، أُم الصَخْر *Tyto alba, Scix flammea* (S).

Effraie commune. Ef. flamée (F). *Barn-owl, White-owl* (E).

طائر من البويات وعمار البعفيات . انواعه عديدة جميعها متوسطة القد طولها يراوح من ٢٢ الى ٣٨ سم . وبسطها من ٨٠ الى ٩٠ سم . اثوابها الى البياض الموشح والمنميش بالاسمر والاسود . مناسرها جالسة الانتشاب محجنة البرة . سواقطها مستطيلة ذرية . اذانها قصيرة وعريضة . ارساغها دقيقة كاسية . مخالبها قليلة الريش || اعطائها العالم وهي في شرفنا الاوسط بين الطيور الآيدة تألف الخرائب والاطلال . تدن في الصدوع والاقواب . اناتها تضع نحو ٤ بيضات تحضنها بمنابرة الذكور نحو ٢٤ يوما . وهي من الروامس تلتبس قوتها في الليل . تصيد الجرذ والفأر والعضال والزباب وجميع انواع الدويبات والحشرات .

٣٧٢٦ - بَعْفِيَّات *Strigens*

عمار من فصيلة البويات تشمل جنساً واحداً يدعى البعف .

٣٧٢٧ - بَعْل ، بَخْس ، عَذِي *Culture non irriguée* (F).

Dry farming (E).

الزراعات البعلية والعذية والبخسة هي التي لا تسقى غير المطر . وللجمع يقال أعذاء وبخوس .

٣٧٢٨ - بَعْنَق * *Thrasaetus harpyia* (S).

Harpie féroce, Aigle destructeur (F). *Fierce Harpy* (E).

طائر من البعائق شديد البأس والشكيمة والنهم . ثوبه يشبه ثوب البوم . رأسه وعنقه الى الصهبة . صدره وزمكاه الى البياض . بطنه مستدير التوشيم . حدقة عينه الى الصفار الاحمر . منسره اسود اللون . ارساغه ومخالبه صفر . اظافره فحمية || يألف الاحراج والغابات القريبة من الماء . انشاء تدن في الاشجار الباسقة وترصع عشها بشئ الافنان والالياف وهي تضع من ٤ الى ٥ رفقات تحضنها وحدها || قوته جميع الحيوانات الفقيرة التي يستطيع اليها سبيلا من السنجاب الى النرد والكلب والطائر الداجن .

٣٧٢٩ - بَعُوض ، بَرَعَش ، نَامُوس *Culicines* (F).

Culicinae (E).

عمار هوام من فصيلة البعوضيات . اجناسها وأنواعها عديدة جميعها صغيرة القد . حشافية الجسم ، مستطيلة الخطم ، قوية المتك ، ريشية الزباني المركبة من ١٥ فاصلة عند الذكور و ١٤ فاصلة عند الاناث || ذكورها تعيش على رحيق الازهار والسوائل السكرية . اناتها تعيش من امتصاص الدم . وخزها مؤلم . وقد تنقل بعض انواع الحميات كالملاريا والحمى الصفراء وغيرها || اشهر انواعها البعوضة المنزلية .

٣٧٣٠ - بَعُوض مُؤَذَّر *Aedine*

جنس بعوض صغير القد طوله يراوح من ٦ الى ٨ مم . انواعه قليلة العدد اجسامها نحيلة . اثوابها مؤذرة ومجزعة . اشهر انواعها البعوضة الفضية .

٣٧٣١ - بَعُوضَة سَمْرَاء *Culex fatigans*

نوع من البعوض ، صغيرة القد سمراء اللون وحيدة الخط البطني الابيض او الاصفر . يقال أنها تنقل مرض الضنك .

٣٧٣٢ - بَعُوضَة فَرْعُونِيَّة * *Anopheles Pharoensis* (S).

Anophéline des Pharaons (F).



بَعْفَة




بَعْل



بَعُوضَة فَرْعُونِيَّة



بَعُوضَة فَضِيَّة



بَعُوضَة مِصْرِيَّة



بَعُوضَة مَنَزَلِيَّة



بُغَاثُ أُسُود



بُغَاثُ رَشِيق



بِقَارُ اَبْيَضُ الزُّور



بِئَل



بِغُنُوسُ بَاهِت



بِغُنُونِيَّةُ سَلَكِيَّة

٣٧٥٢ - بُغُنُوسُ بَاهِت *٥

Pogonus pallidipennis (S).

Pogone pâle (F). Pogonus pallidipennis (E).

حشرة قانصة من فصيلة الرئيطيات ورثة غديات الاجنحة . موطنها حوض البحر الابيض المتوسط . تألف الشطوط البحرية قوتها ما تيسر من الحشرات الدنيا والهوم والقشريات التي يلفظها البحر || جسمها صغير القد يطول من ٨ الى ٩ سم . رأسها اسود قصير الخطم . فكها ضليعان . زباناها دقيقان ، مستطيلان . عينها صغيرتان بارزتان . ظهرانها بني اللون ، نحاسي الموج ، مستدير انطرف اللاحف . غمداها ثمانيتا التحديد القاطب . ارساغها خماسية العقول || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملة في اوائل الربيع وتعيش حتى اواخر الصيف . تسرح في النهار . تسافد في اواخر آب . تمتح الممكن على الرمل تحت نفايات البحر وتحت الحجارة || البرقة عند باوغها الادراك التام تطول نحو ١٣ سم . جسمها اسطواني الشكل ، سداسي الرواجب . ثوبها الى الطحلة الكثرة السمره الموج . رأسها وشرجها الى السمره الكستنية || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٥٠ يوماً ينقضي في نفق تحلده البرقة بين جذور النبات .

٣٧٥٣ - بَغُونِيَّات

Bignoniaceae (S).

Bignoniacées (F). Bignoniaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين تشمل البغونية والجكرندة والتكوية والكتلية وغيرها . معظم نباتاتها اشجار وجنبات وبعض الاعشاب اللبية العارشة . اكثرها برية ومنها تزيينية جميلة الازهار الكبيرة القد الزاهية الالوان || اشهر انواعها التزيينية البغونية السلكية .

٣٧٥٤ - بَغُونِيَّةُ سَلَكِيَّة *٥

Bignonia capreolata, B. crucigera (S). Bignone (F). Carolina trumpet-flower, Cross-vine (E). Kreuzranke, Kreuzwein, Trompetenblume (D). Bignonia aranciata, Tetrafilia (I).

جنبه معمرة من البغونيات . مهدا المناطق الحارة الامريكية ساقها ماله فرعا . اوراقها متقابلة معنقة . نصلها اهليلجي الشكل ، جامد الصفحة بارز العروق . حوالقها دقيقة عصفية الشكل . ازهارها كبيرة القد ، طويلة الانبوب ، فارشة البتلات الخماسية التركيب || تزرع للزينة . تتكاثر بالهندور والعقل .

٣٧٥٥ - بَغُونِيَّة

Bégonia (F). Begonia (E).

راجع بينونية .

٣٧٥٦ - بَغُونِيَّات

Bégoniacées (F).

Begoniaceae (E).

راجع بينونيات .

٣٧٥٧ - بُغْيَبِغ

البغيبغ هو تيس الظباء السمين (الدميري) .

٣٧٥٨ - بِفَعْلُ الْقَانُون

Ipsa jure

صيغة تستعمل للدلالة على حق يكتسب قانوناً بمجرد وقوع الحدث الذي انشأه .

٣٧٥٩ - بِفَعْلُ الْوَاقِع

Ipsa facto

بمجرد الفعل . صيغة تستعمل للدلالة على تعديل يدخل حتماً لزماً على موقف قانوني بمجرد وقوع حدث معين دون ان يصدر حكم فيه .

٣٧٤٢ - بُغَاثُ أُسُود *

Catharista atrata (S).

Catharte noir, Urubu (F). Urubu atrata (E).

طائر من البغاث . طولهُ نحو ٦٥ سم . وبسطته ١٨٠ . ثوبه اسود اللون يعلوه موج اسفع . رأسه اصلع احمر . قلادة عنقه مرداء حمر . عينه زرقاء المقلية ، قرمزية الحدقة . منسره مستطيل الشكل ، منعطف البهرة ، مرجاني اللون || موطنه الغابات والاحراج . يعيش قرب المدن البحرية . قوته الجيف الممتنة || يدثن عشه في الاشجار البامقة وفي اوقاب الصخور وصدور الخرائب . انشاه تحضن رقتين نحو ٣٥ يوماً .

٣٧٤٣ - بُغَاثُ رَشِيق *

Catharista aura (S).

Catharte aura (F). Urubu aura (E).

طائر من البغاث طولهُ نحو ٦٠ سم . وبسطته ١٧٠ ، ثوبه الى السمره الخطية يعلوها موج ازرق . رأسه اصلع . قة رأسه بنفسجية اللون . جبهته وحسره ومنسره حمر . عينه مستطيلة الجفن الاسود ، زرقاء المقلية ، حمر الحدقة . رسفه ويخبله الى السمره الداكنة || موطنه العالم يكثر في البلاد الامريكية يألف الغابات والاحراج . يعيش قرب المدن والساكر . قوته الجيف الممتنة .

٣٧٤٤ - بِقَارُ اَبْيَضُ الزُّور *

Pygarrhicus albogularis (S).

Pygarrhique à gorge blanche (F).

طائر وحيد الجنس والنوع من الجواثم رقيقات المناقير وفصيلة العشليات . اعطانه البلاد الاستوائية . يألف الغابات والاحراج . قوته الحشرات ومكثها ويرقاتها || جسمه ربعة يطول نحو ١٥ سم . رأسه معتدل الجرم ، مستطيل المنقاد الخرزوي الشكل . عنقه شديد القصر . جناحاه قصيران . رفال ذنبه مدببة الاطراف الجامدة . ثوبه الى الشقحة . رأسه ومنكباه وقوادمه سود . زوره ابيض . بطنه منمش بالاسود . برائنه محبسة قوية تمكته من تسلق امس الاشجار .

٣٧٤٥ - بُغَام

البغام هو صوت الظبية .

٣٧٤٦ - بَغَر

Averse (F). Downpour (E).

البغر هي الدفعة الشديدة من المطر .

٣٧٤٧ - بَغَر

Eaux souillées (F). Sluttish water (E).

البغر هو الماء المهيث تنفر عنه الماشية .

٣٧٤٨ - بَغْشَة

Ondée (F). Shower (E).

البغشة هي المطرة الضعيفة .

٣٧٤٩ - بَغْل

Mulet (F). He-mule, Mule (E).

هو الهجين الناتج عن تصالب الخيل والحمير وهو غالباً ولد فرس زراً عليها حمار وقد يكون ولد اتان زراً عليها حصان || وكنية البغل : ابن ناهق ، ابو الاشجع ، ابو الحرون ، ابو الصقر ، ابو قضاة ، ابو قوص ، ابو كعب ، ابو مختار ، ابو ملعون .

٣٧٥٠ - بَغْل

Croiser (F). To cross (E).

قام بالتهجين او التصالب .

٣٧٥١ - بَغْلَة

Mule (F). She-mule (E).

هي البغل الانثى ظاهراً .

٣٧٧١ - بقّة *Oréas, Taurotragus (F).*
Taurotragus oryx, Eland (E). راجع اروس .

٣٧٧٢ - بقّة *Boops (S). Bogue (F). Boöps (E).*
 الاسم العلمي من اليوناني بمعنى عين الثور . جنس اسماك بحرية من فصيلة الاسبوريات شائكات الزعانف . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار العالم || اجسامها متوسطة القد ، وحيدة الزعنفة الظهرية . عيونها كبيرة مستديرة || لحمها مأكولة ، جيدة الصنف او متوسطته || اشهر انواعها البقة المبدولة والبقة الفيدسية .

٣٧٧٣ - بقّة الزرع* ، سؤنه *Eurygaster integriceps (S).*
 حشرة مضرة من نصفيات الاجنحة وفصيلة الحماسيات . تسطو على سنايل الحنطة والشعير فتثقب الحب وتمتص عصارتها المائعة وتوقع به اشد الاذى . وهي بيضية الشكل ، مخروطية الرأس ، مفلطحة الجسم تطول من ٩ الى ١٢ مم . ثوبها اسمر اللون اصفر الموج يعلوه تمشيع عابق ونمشة بنية . حثار جسمها الظاهر مديج بالكستي .

٣٧٧٤ - بقّة الفراش* ، بنيت الحصى *Acanthia lectularia, Cimex lectularius (S). Punaise du lit (F). Stinking bug (E).*
 حشرة من البقيات صغيرة القد ، بيضية الشكل ، مفلطحة الجسم . تطول نحو ٥ مم . وتعرض نحو ٣ ، لونها اسمر احمر . تركب الانسان في اثناء النوم وتمتص دمه || مهدا العالم . تكثر في الاماكن القذرة . تختبئ نهاراً وتخرج ليلاً ولها عند اللس رائحة كريهة مستهجنة مستقرة بعض الوقت .

٣٧٧٥ - بقّة اللبك* *Coccus lacca (S).*
 حشرة صغيرة القد سمر اللون من نصفيات الاجنحة . تركب جنبات البيوت فتوخزها وتحول عصارتها الصغية المائعة الى لك غروي لزج يعتبر من اجود اصناف اللك .

٣٧٧٦ - بقّة المركب* *Naucoris (S). Naucore (F). Naucorid (E).*
 جنس حشرات مائية من نصفيات الاجنحة وفصيلة عقرييات الماء . اجسامها مبطولة ، صغيرة القد ، بيضية الشكل . قوتها الهوام .

٣٧٧٧ - بقّة النفل* ، سيرتيس *Syrts crassipes (S).*
 حشرة من البقيات صغيرة القد ، بيضية الشكل ، بنية اللون ، قصيرة الزباني ، سريعة الحركة || موطنها العالم . تركب معظم انواع النفل وتؤذيها .

٣٧٧٨ - بقّة غيدسية* ، صلبان *Boops salpa, Box salpa (S). Bogue-morue, Saupa, Salpa (F). Boöps salpa, Goldlin (E).*
 نوع من البقة . سمكة بحرية بيوض . اعطانها البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق الاطلسي || جسمها اهليجي الشكل قريب الشبه بالفيدس ، يطول من ٢٥ الى ٣٠ سم . || ثوبها الى الطحلة الفضية يعلوها توشيع زيتي وتشيز ذهبي قاطب || لحمها مأكول ، متوسط الصنف في الريح ، جيده في الحريف .

٣٧٦٠ - بق الحمام*

Cimex columbarius, Acanthia columbaria (S). Punaise des pigeonniers (F). Bug of dove-cot (E).
 حشرة من البقيات بيضية الشكل ، مفلطحة الجسم ، سمر اللون تطول نحو ٤ مم . وتعرض نحو ٢ يكثر وجودها في الابراج القذرة والماريد الخشبية . وهي تركب الحمام وتمتص دمه .

٣٧٦١ - بقّ الخطمي *Phriacoccus hirsutus (S).*
 حشرة من رتبة نصفيات الاجنحة وفصيلة القرمزيات ، تركب الخطمي وتوقع باوراقها بمض الاذى .

٣٧٦٢ - بقّ القصب الدقبي* *Pseudococcus sacchari (S).*
 حشرة من رتبة نصفيات الاجنحة وفصيلة القرمزيات ، تركب قصب السكر فتوقع به بعض الاضرار .

٣٧٦٣ - بقّ الماء *Hydrocorises (S). Punaies d'eau (F).*
 حشرات مائية من مختلفات الاجنحة ، تكثر في المناطق الميقة الغور وفي بعض البحيرات .

٣٧٦٤ - بقّار *Bouvier, Vacher (F). Cow-herd (E).*
 هو الذي يحرس البقر ويتمهدا . وهو ايضاً الراعي الذي يقودها الى المرعى ويحافظ عليها .

٣٧٦٥ - بقّار *le Bouvier (F).*
 البقار كوكبة نجوم شمالية الموقع تدعى ايضاً عواء ، اطلبها .


٣٧٦٦ - بقّاط *Bucco (S).*
 البقاط هو ثفل الهبيد اي الحنظل او حبه .

٣٧٦٧ - بقّاق* ، بقّالة *Bucco, Barbus (F).*
 جنس طير متسلقة صياحة من فصيلة البقاقيات . موطنها احراج البلاد الاستوائية . قوتها الحشرات على اختلاف انواعها واحجامها .

٣٧٦٨ - بقّاقيات *Bucconidae (S). Bucconidés (F). Bucconidae (E).*
 فصيلة طير من المتسلقات . اجناسها وانواعها عديدة جميعها مثدونة الاجسام ، كبيرة الرؤوس والمناقير الجالسة ، مهدبة الشوارب ، زاهية الالوان الفاقعة المتباينة . اعطانها احراج البلاد الاستوائية . قوتها الحشرات .

٣٧٦٩ - بقّال *Marchand de légumes*
 هو يباع البقول .

٣٧٧٠ - بقّامة ه* *Pagamia (S). Pagamier, Pagamée (F).*
 شجيرة برية وزراعية تزيينية من فصيلة الفويات منبتها بعض المناطق الاستوائية الامريكية || ساقها فرعاء تملو نحو اربعة امتار . فروعها فرقة مألسة اللحاء لونها الى الدهسة . اوراقها اميدة متقابلة معتقة . نصالها اهليجية الشكل ، مدببة الاطراف . ازهارها سنبل التجميع ، محوري الاثكاز . ازهارها صغيرة رباعية البتلات السنائية المنبسطة ، صفراء اللون . ثمارها عتية نووية لونها الى الخضار الالسن .




بق الحمام بق القصب الدقبي



بقاق



بقّامة



بقّة الزرع بقّة الفراش



بقّة اللبك



بقّة المركب بقّة النفل



بقّة غيدسية



بُقَّة مَبْدُولَة



بَقْدُونَس



بَقْدُونَس بَرِي



بَقَر الحَرَاة



بَقَر القَصَابَة



بَقَرَة حَلُوب



بَقَس دَائِم الحَضْرَة



بَقْسَان

ضيق الزعنفة الظهرية الجالسة ، فارقة الزعنفة الشرجية .
لحمها مأكول متوسط الصنف .

٣٧٨٩ - بَقَرَة بَنِي إِسْرَآئِيل (F). Myrméléon (F).
هي لَبث عَفْرَيْن ، أَطْلَب . Myrmeleon, Ant lion (E).

٣٧٩٠ - بَقَرَة حَلُوب* ، بَقَرَة لَبُون

Vache laitière (F). Milking cow (E).
هي كَل بَقَرَة يَتَعَمَدُهَا صَاحِبُهَا مِنْ أَجْلِ حَلِيبِهَا . وَالْأَيْقَارُ
الْحَلُوبُ عَدِيدَةُ السَّلَالَاتِ وَالْعُرُوقُ ، مَتَشَابِهَةُ الْمِيزَاتِ
وَالصِّفَاتِ وَالْأَشْكَالِ . وَقَانُونًا إِذَا بَاعَتِ الْبَقَرَة الْحَلُوبُ
شَمْلَ الْبَيْعِ رَضِيْعَهَا .

٣٧٩١ - بَقَرِيَّات (F). Bovid (E).
هي فَصِيلَة الْبَقَرِ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ الْبَلْوَةِ وَرَبِيَّةٍ مَزْدُوجَاتِ
الْأَصَابِعِ الْمُخْتَرَاتِ . تُشْمَلُ الْبَقَرُ وَالْجَامُوسُ وَالدَّرْبَانِيَّةُ
وَالْبَيْسُونُ وَالْجَيْهَلُ . وَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ جَعَلَهَا تُشْمَلُ النَّمُ وَالظُّبَابُ .

٣٧٩٢ - بَقَرِيَّة (F). Bovins
هي بِالْأَصْلِ كَلِمَة مُرَادِفَة لِبَقَرِيَّاتٍ وَلَكِنَّهَا اسْتَعْمِلَتْ
لِلدَّلَالَةِ عَلَى الْبَقَرِ وَالْجَامُوسِ دُونَ سَوَاهِمَا .

٣٧٩٣ - بَقْسَان ، تَشْمَشَاد (S). Buxus (S).
Buis (F). Box tree (E).
جَنْسُ نَبَاتَاتٍ مَعْمُورَةٍ مِنْ فَصِيلَةِ الْبَقْسِيَّاتِ . أَنْوَاعُهَا عَدِيدَةٌ
مِنْهَا الْأَشْجَارُ وَالشَّجِيرَاتُ وَالْجَنْبَاتُ الْمَتَسَلِّفَةُ . مَعْظَمُهَا بَرِي
وَبَعْضُهَا تَزْيِينِي . أَوْرَاقُهَا صَغِيرَةٌ الْقَدِّ مُتَقَابِلَةٌ لَاطِلَةٌ .
نَصَالُهَا أَهْلِيلَجِيَّةُ الشَّكْلِ قَصِيرَةُ الْأُذْيُنَاتِ الدَّقِيقَةِ . اخْشَابُهَا
شَدِيدَةُ الصَّلَابَةِ تَسْتَعْمَلُ فِي صِنَاعَةِ الْحَفَرِ وَالتَّنْزِيلِ || أَشْهُرُ
أَنْوَاعِ التَّرْبِيئَةِ الْبَقْسَانِ الدَّائِمِ الْحَضْرَةِ .

٣٧٩٤ - بَقْسَان دَائِمِ الْحَضْرَةِ* ، تَشْمَشَادُ أَخْضَر ،
عَشَقْ ، تَشْمَشِير (S). Buxus sempervirens (S).
Buis toujours vert (F). Common box tree (E).
Echter buxbaum, Buchsbaum (D). Bosso, Auscio,
Martello, Bossolo (I).
هُوَ الْبَقْسَانُ التَّرْبِيئِيُّ الشَّائِعُ الْزَّرَاعَةِ حَتَّى يُمْكِنَ الْقَوْلُ أَنَّ
لَا حَدِيقَةً تَخْلُو مِنْهُ .

٣٧٩٥ - بَقْسَانٌ ٥* (S). Pachysandra (S).
Pachysandre (F). Pachysandra (E).
جَنْسُ نَبَاتَاتٍ عَشْبِيَّةٍ مَعْمُورَةٍ مِنْ فَصِيلَةِ الْبَقْسِيَّاتِ . سَوَاقُهَا
نَحِيلَةٌ جَالِسَةٌ أَوْ مُسْتَلْقِيَّةٌ . أَوْرَاقُهَا أَبِيدَةٌ ، مُعْتَنَةٌ . نَصَالُهَا
بَيْضِيَّةُ الشَّكْلِ . أَزْهَارُهَا سَنَبِلِيَّةُ التَّجْمِيعِ . أَزْهَارُهَا وَحِيدَةٌ
الْمُسَكَّنُ ، الذَّكَرِيَّةُ رُبَاعِيَّةُ الْفَصْلِ وَالْأُنْثِيَّةُ ثَلَاثِيَّةُ
الْمِيَّاسِ الشَّخِيَّةِ . كَمَا بَرَأَ ثَلَاثِيَّةُ الْأَعْبِيَةِ الْقَرْنِيَّةِ الشَّكْلِ ||
أَنْوَاعُهَا الْمَعْرُوفَةُ قَلِيلَةٌ الْعَدَدُ ، أَشْهُرُهَا التَّالِيَةُ :

٣٧٩٦ - بَقْسَان طَرَفِي السَّنَابِل (S). Pachysandra terminalis (S).
Pachysandre à épis terminaux (F).
نَوْعٌ مِنَ الْبَقْسَانِ . سَاقُهُ مُتَنْصِبَةٌ تَعْلُو نَحْوَ ٣٠ سَم . أَوْرَاقُهُ
جُلْدِيَّةُ النَّصْلِ تَطُولُ نَحْوَ ٦ سَم . وَتَعْرُضُ نَحْوَ ٣ سَم .
أَزْهَارُهُ سَنَبِلِيَّةُ التَّجْمِيعِ ، طَرَفِي الْأَرْتِكَازِ . أَزْهَارُهُ صَغِيرَةٌ
الْقَدِّ ، حُمْرَاءُ اللَّوْنِ ، خَافِتَةُ الْعَرَفِ || تَنْوِيرُهُ يَسْتَمِرُّ مِنْ
نَيْسَانِ إِلَى آيَارِ .

٣٧٧٩ - بُقَّة مَبْدُولَة*

Boops vulgaris, Box boops (S).
Bogue commun (F). Common Boöps (E).
نَوْعٌ مِنَ الْبُقَّةِ . سَمَكَةٌ بَحْرِيَّةٌ بَيَوضُ مَبْدُولَةٍ فِي الْبَحْرِ الْأَبْيَضِ
الْمُتَوَسِّطِ || جَسْمُهَا وَشَعْيُ الشَّكْلِ يَطُولُ مِنْ ٣٠ إِلَى ٣٥ سَم .
ثَوْبُهَا مُتَرَكَبٌ الْأَطْحَلُ وَالزِّيْبِيُّ وَالْأَصْفَرُ . ظَهْرُهَا أَعْبَقُ
مِنْ جَانِبَيْهَا . سِجَانِبَاهَا مَشِيْرَانُ بَعْشَرَةٌ خُطُوطٌ قَاطِبَةٌ ذَهَبِيَّةُ
الْلَوْنِ . بَطْنُهَا قُضِي . زَعْنَفَتَاهَا الظَّهْرِيَّةُ مُسْتَطِيلَةٌ أَمَّا الذَّيْلِيَّةُ
فَفَارِقَةٌ || لَحْمُهَا جَيِّدُ الصَّنْفِ ، مُرْغُوبٌ فِيهِ .

٣٧٨٠ - بَقْدُونَس* ، مَقْدُونَس ، كَرَفَس رُومِي (S). Petroselinum sativum, Carum petroselinum, Apium petroselinum, A. vulgare (S). Persil, Persil cultivé, Persil commun (F). Common garden parsley (E). Gartenpetersilie, Petersille (D). Petrosimolo, Prezemolo (I).

نَبَاتٌ عَشْبِيٌّ بَقْلِيٌّ زُرَاعِيٌّ مِنْ فَصِيلَةِ الْخِيَمِيَّاتِ غَنِيٌّ جَدًّا
بِالْفَيْتَامِينَاتِ اخْصَصَهَا الْفَيْتَامِينُ «ث» || يَتَكَثَّرُ بِالْبُزْرِ
يَنْمُو فِي جَمِيعِ الْأَتْرَابِ الزَّرَاعِيَّةِ أَمَّا يُفَضَّلُ الْحَوَارَةُ وَالْذَبَالِيَّةُ .

٣٧٨١ - بَقْدُونَس بَرِي* (S). Anthriscus sylvestris (S).
Anthriscue, Cerfeuil sauvage, C. des bois (F). Wild chervil, Cow weed (E). Kalberkerbel, Wilderkerbel (D). Cerfoglio salvatico, Mirride salvatica (I).

نَبَاتٌ عَشْبِيٌّ بَرِيٌّ طَبِيٌّ يَنْتَسِي إِلَى الْفَصِيلَةِ الصَّيْوَانِيَّةِ .
أَوْرَاقُهُ وَأَزْهَارُهُ تُشَبِّهُ أَوْرَاقَ وَأَزْهَارَ الْبَقْدُونَسِ لَكِنَّهَا أَصْفَرُ
قَدًّا . مَنَافِعُهُ الطَّيِّبَةُ بَهْمَةً . يُقَالُ أَنَّهُ يَفِيدُ الْمَعْدَةَ وَيَنْشِطُ
الْدَّمُ .

٣٧٨٢ - بَقْدُونَس جَبَلِي (F). Sélin (F). Milk parsley (E).
هُوَ السَّالِينُومُ .

٣٧٨٣ - بَقْدُونَس كَاذِب (F). Aethuse, Ciguë des jardins (F). Fool's parsley (E).
هُوَ الشُّوْكَرَانُ الصَّغِيرُ ، أَطْلَبُ .

٣٧٨٤ - بَقَر (S). Bœufs (F). Beeves, Oxen (E).
هَمَارَةُ حَيَوَانَاتِ مَجْتَمِعَةٍ لَبْوَةٍ مِنْ فَصِيلَةِ الْبَقَرِيَّاتِ تُشْمَلُ
الْبَقَرُ الْإِهْلِيُّ وَالْجَامُوسُ وَالْبَيْسُونُ وَالْجَيْهَلُ الْخ .

٣٧٨٥ - بَقَر الحَرَاة* ، عَوَامِل ، نَحَّة ، فُدُن (F). Bœufs de travail (F).
هُوَ الْبَقَرُ الْمُدَّةُ لِلْعَمَلِ . وَلَا يُقَالُ لِلوَاحِدِ فُدَانٌ لِأَنَّ الْفُدَانَ
هُمَا الثَّوْرَانِ اللَّذَانِ يَفْدَنُ عَلَيْهِمَا .

٣٧٨٦ - بَقَر القَصَابَة* ، بَقَر الدَّبْح (F). Bœufs de boucherie (F).
هُوَ الْبَقَرُ الْمَعْدَةُ لِلْمَسْلُخِ أَوْ بِالْآخَرِ لِلذَّبْحِ .

٣٧٨٧ - بَقَر أَهْلِي (S). Bos taurus (S).
Bœufs domestiques (F). Domestic oxen (E).
الْبَقَرُ الْإِهْلِيُّ هُوَ جَنْسُ الْبَقَرِ الدَّاجِنِ الْمَعْرُوفِ . سَلَالَاتُهُ
وَعُرُوقُهُ كَثِيرَةٌ الْعَدَدُ لَا يَجَالُ لَذِكْرُهَا هُنَا . الذَّكَرُ يُدْعَى
ثَوْرًا وَالْأُنْثَى تُدْعَى بَقَرَةً .

٣٧٨٨ - بَقَرَة (S). Bagrus (S).
جَنْسُ أَسْمَاكَ نَهْرِيَّةٍ مِنَ السَّلُورِيَّاتِ تَعِيشُ فِي مِيَاهِ الْمَنَاطِقِ
الْحَارَةِ . أَنْوَاعُهَا الْمَعْرُوفَةُ قَلِيلَةٌ ، أَشْهُرُهَا الْبِيَّاضُ وَالْبَقَاقُ .
جَمِيعُهَا مُتَوَسِّطَةُ الْقَدِّ ، وَشَعْيَةُ الشَّكْلِ ، رُبَاعِيَّةُ الْعَذَبَاتِ ،

من ٨٠ الى ١٠٠ سم. وعرضها من ٤٥ الى ٦٠ سم. اما ارتفاعها فن ٣٠ الى ٣٥ سم. تدخل اليها من السطح الاسفل. وقد تبقى هذه الردهة نحو اربع سنوات اما العش فانها تجدد وتغير مكانه كل سنة. حضنتها من ٥ الى ٦ بيضات ترخها بمنابرة الذكر.

Cyclamen (F).

٣٨٠٧ - بَقْلَامُوس

اطلب سكه.

Motella (S).

٣٨٠٨ - بَقْلَة *

Motelle, Loche de mer (F). Rock-ling (E).

جنس اسماء بحرية من فصيلة الغادسيات. انواعه ستة اجسامها مستطيلة، حراشفها رقيقة مائلة، رؤوسها مقطوعة تتميز بمذباتها الفكية الارتكاز الثلاثية التجميع. تعيش في الاعماق الصخرية حيث يكثر الضريع. لحومها مأكولة مستحبة الطعم.

Légume (F). Vegetable (E). ٣٨٠٩ - بَقْلَة، خُضْرَة

هي البقول والخضر والخضراوات وبكلمة اشمل جميع النباتات العشبية التي يغتذي الانسان بها او ببعض اجزائها.

Impératoire (F).

٣٨١٠ - بَقْلَة الامبراطور

Masterwort (E).

راجع بقلة الرئيس.

Agripaume (F).

٣٨١١ - بَقْلَة الأمهات

Common mother-wort (E).

راجع فراسيون القلب.

Chou (F). Cabbage (E).

٣٨١٢ - بَقْلَة الأنصار

هي الملفوف.

Collinsonia canadensis (S). ٣٨١٣ - بَقْلَة الأوجاع

Collinsonie, Collinsone de Canada (F). Rich-weed, Canadian horse-mint (E). Kanadische collinsonie (D). Collinsonia (I).

نبات عشبي بري طبي من فصيلة الشفويات، منبته كندا وبعض مناطق امريكا الشمالية، يقال ان ضهاد اوراقه يزيل الالوجاع.

Grande chélide (F). ٣٨١٤ - بَقْلَة الخطاطيف

Greater celandine (E).

هي عروق الصباغين، اطلبها.

٣٨١٥ - بَقْلَة الرئيس *

Peucedanum ostruthium (S). Impératoire, Ostrute, Aneth fétide (F). Masterwort, Broad leaved hog's fennel (E). Echte melsterwurz (D). Imperatoria, Elafobosco vero, Erba rena (I).

نبات بري طبي من فصيلة الخيميات. جلوره مدرة للبول ومماره طاردة للدود.

Varaire blanc (F).

٣٨١٦ - بَقْلَة الرواح

White heilabore (E).

نبات طبي جذموري يعرف بالحربوق الابيض، اطلبه.

Blechné spicant (F).

٣٨١٧ - بَقْلَة الطحال

Snake fern (E).

راجع بلكتوم.

Ptarmique (F).

٣٨١٨ - بَقْلَة العُطَّاس

Sneezewort (E).

راجع اخيليا.

٣٧٩٧ - بُقْسان مُسَطَّح *

Pachysandra procumbens (S).

Pachysandre couché (F).

نوع من البقسان. ساقه مسطحة تطول نحو ٤٠ سم. اوراقه الى الخضار القائم. اعناقها تطول نحو ٥ سم. اما نصالها فتطول نحو ٨ سم. وتعرض نحو ٦ سم. سابلها الزهرية محورية الارتكاز. ازهارها صغيرة، بيضاء اللون، عطرية العرف || تنويرها يستمر من نيسان الى ايار.

Buxaceae (S). ٣٧٩٨ - بَقْسِيَّات، شَمْشَادِيَّات

Buxacées (F). Buxaceae (E).

هي الفصيلة البقسية او الشمشادية. اجناسها وانواعها عديدة معظمها اشجار وجنبات وبعضها بحلات واعشاب.

Emballage (F). Packing (E).

٣٧٩٩ - بَقْط

هو التعبئة، اطلبها.

٣٨٠٠ - بَقْع

مشروب كحولي يستخرج من التمر والنسل بعد تخميرها.

٣٨٠١ - بَقْعَة

المكان يستنقع فيه الماء. ج بقاع. والبقاع ضد المزارع.

Jonathan spot ٣٨٠٢ - بَقْعَة جُنْشَان

عارض يصيب ثمار تفاح جشنان وسائر التفاح الاحمر المتعذر من ذات الاصل او الذي يمت اليه بصلة || مظهره الخارجي بقع لا قياسية الشكل والقدر، تغلب فيها الاستدارة قطرها من ٢ الى ١٠ مم. تركب بشرة الثمار في اثناء تخزينها في البراد فتشوهها دون ان تعطب اللباب || يقال انها عاهة وراثية يمكن اجتنابها بقطف الثمار عند بداية ادراكها وبنقلها تورا الى البراد.

Crypsis schoenoides (S).

٣٨٠٣ - بَقْق *

Crypsis, Crypside (F). Crypsis grass (E). Dornen-grass (D). Crypside (I).

نبات عشبي بري حولي من فصيلة النجيليات، منبته آسية الوسطى واروبة الشرقية. يكثر في الاراضي الرطبة ترعاه الماشية بشبهة.

٣٨٠٤ - بَقْل

عد النبات من البقل. قال ابن منظور: «واختلفوا في القفعاء فبعض يبقلها وبعض يحشها».

Tordyle officinal (F). ٣٨٠٥ - بَقْل الشعال

هو الشرعوب الخزني، اطلبه.

Picolaptus (S). Picolapte (F). ٣٨٠٦ - بَقْلَاط *

جنس طير من الجواثم سنيات المناقير وفصيلة العشوليات. انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض مناطق البلاد الاستوائية || تألف الغابات والحراج الكثيفة. ملجئها الحيائي زوجي. قوتها الحشرات ومكثها وديدانها || اجسامها رشيقة، صغيرة القد. مناقبها مستطيلة، قليلة التعجين. اذنانها رتاجية الرفال المنهدلة الاطراف. ارساغها دقيقة مستطيلة. اناؤها كستنية اللون او الى الصخرة السمراء تعلوها تزاويق عمر ومخطوط بيض || تدثن في الاشجار المتراكبة الفروع. عشها بحجم جوة الهند تقيم في ردهة مؤلفة من سطحين من القضبان والالياف والاوراق طولها



بقق



بقلاط



بقلة



بقلة الرئيس



بقلة الغزال



بقلة حقا



بقم



بقنقومون



بقونية

- ٣٨٣٢ - بَقْم Datura metel (F). Metel (E). هو جوز مائل ، اطلبه .
- ٣٨٣٣ - بَقْم هندي Bois de sapan (F). راجع عندهم صبان .
- ٣٨٣٤ - بَقْمَة Succisa pratensis (S). Mors du diable (F). Devil's-bit scabious (E). Tenselsabbiss (D). Scabiosa (I). البقمة طعم السمك يرمى لها في الماء الراكد فتسمن عليه .
- ٣٨٣٥ - بَقْنَقُومُون * Succisa pratensis (S). Mors du diable (F). Devil's-bit scabious (E). Tenselsabbiss (D). Scabiosa (I). نبات عشبي بري معمر من فصيلة الدبسياسيات يكثر بين الزروع وفي الاراضي البور . يستخرج منه مواد طبية تستعمل في علاجات الامراض الجلدية منها السفلس .
- ٣٨٣٦ - بَقْوَة القَانُون De plein droit (F). صيغة يراد بها ان الاثر القانوني لا يحدث بمقتضى فعل الارادة او القيام باجراء خاص بل بمجرد قوة القانون نفسه . كالارث مثلا . فالتركة تقول الى الوارث بقوة القانون .
- ٣٨٣٧ - بَقُول Légumes (F). Vegetables (E). كلمة شاملة تعني جميع النباتات العشبية المأكولة وان قصد بها التعريف او بالاحرى التحديد فتستعمل كما يلي :
بقول بصلية : البصل والكراث والثوم .
بقول ثمرية : الخيار والقرع والارضي شوكة .
بقول جذرية : الجزر والملفت والشوندر .
بقول حببية : الفول والفاصوليا والحمص .
بقول ناشفة ، قيم : البابايا واشباهها .
بقول ورقية ، احرار البقول : الخس والهندباء والجرجير ...
- ٣٨٣٨ - بَقُولِيَّة * Bocconia (S). Bocconie (F). Plume poppy (E). Federmohn (D). Bocconia (I). بحلة تزيينية من البقوليات . ساقها فرعاء منتصبه اوراقها متعاقبة كبيرة القذ مشرمة الاطراف . ازهارها طرفية عادية البتلات . نقيعها ماسط وطارد للدود .
- ٣٨٣٩ - بَقُولِيَّات Bocconiales (F). Bocconiae (E). سبط من فصيلة الحشخاشيات . ازهاره عديدة البتلات . انواعه عديدة منبتها البلاد الامريكية جميعها بحلات واعشاب ليفية فرعاء يستخرج منها مادة صمغية صفراء اللون او حمراء تحوي بعض الخواص الطبية الجليلة النفع .
- ٣٨٤٠ - بَقُولِيَّة Barge (F). راجع بوقية
- ٣٨٤١ - بَقِيَّات Acanthiadae, Cimicidae (S). Acanthiades, Cimicidés (F). Acanthiadae, Cimicidae (E). فصيلة حشرات من نصفيات الجناح اجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها صغيرة القذ ، بيضية الشكل ، مفلطحة الجسم ، اثرية الاجنحة ، عادمة الوينيات ، دقيقة الزباني الرباعية الفواصل . منها انواع تتركب النبات فتؤذي بعضها يتطفل على الحيوان والطيور .
- ٣٨٤٢ - بَقِيل Rosage d'Orient (F). Pontic rhododendron (E). هو عصلة الشرق جنبه تزيينية ، اطلبها .

- ٣٨١٩ - بَقْلَة العَوْف Pouliot de Crète (F). راجع طوقريون اكريني .
- ٣٨٢٠ - بَقْلَة الغَزَال * ، ريحان الارض Origanum dictamnus (S). Dictame de Crète (F). Dittamy of Crete (E). Kretischer diptam, Diptam-dosten (D). Dittamo di Creta, Origanum di Creta (I). نبات عطري طبي من فصيلة الشفويات . وهو عشبة حزمية معمرة . اوراقها زغبية النصل ، ازهارها صغيرة ارجوانية فواحة العرف المستحب ، مرة المذاق || يستعمل في بعض المستحضرات الطبية اخصها علاجات القلب .
- ٣٨٢١ - بَقْلَة اللبن Gaillat (F). راجع غالليون حقيقي .
- ٣٨٢٢ - بَقْلَة الملوكة Fumeterre officinale (F). راجع شاهترج مخزني .
- ٣٨٢٣ - بَقْلَة الهير Valériane officinale (F). اطلب ناردين مخزني .
- ٣٨٢٤ - بَقْلَة حامضة Oxalide (F). راجع حامض العيد .
- ٣٨٢٥ - بَقْلَة حَقَاء * ، بَقْلَة زَهْرَاء ، رِجْلَة ، فَرْقَحِين Portulaca oleracea (S). Pourpier, P. potager, P. cultivé (F). Purslane, Garden purslain (E). Gartenportulak (D). Portulaca, Poracchia, Peplo (I). بقلة عشبية حولية برية وزراعية من فصيلة الرجليات . تنبت تلقائيا في اكثر الاراضي المروية . سوقها واوراقها لحمية النسيج ، غزيرة العصارة ، قليلة الحموضة ، مستحبة الطعم . كثرتها تسهل المعدة . تتكاثر بالبذر .
- ٣٨٢٦ - بَقْلَة عَرَبِيَّة Amarante blette (F). راجع قطيفة يانعة .
- ٣٨٢٧ - بَقْلَة مَبَارَكَة Chicorée (F). هي الهندباء .
- ٣٨٢٨ - بَقْلَة يَهُودِيَّة Laiteron commun (F). راجع تفاف معروف .
- ٣٨٢٩ - بَقْلِي Oléracé (F). Vegetable (E). نعت تعريف يطلق على كل نبات عشبي مأكول .
- ٣٨٣٠ - بَقْلِين Légumine (F). Legumin (E). مادة ازوتية تكون في بزور القطنيات .
- ٣٨٣١ - بَقْم * ، بَقْم أسود Haematoxylon campechianum (S). Campêche, Hematoxyle (F). Campeachy wood, Log wood (E). Campechebaum, Campecheholz (D). Campeggio, Legno di campeche (I). شجرة حرجية وصناعية من فصيلة القرنيات ، تملو نحو ١٢ م . منبتها البلاد الحارة . يستخرج من انابجها الوعائية الحشبية مادة صباغية بنية ذات شأن تدعى إمامتين او إمامتكيلين Hématéine ou Hématoxyline .

٣٨٥٢ - **بَكْتِيرِيُولُوجِيَا ، بَكْتِيرِيُولُوجِيَا ،**
Bactériologie (F). **بَكْتِيرِيُولُوجِيَا**
Bacteriology (E).
هو علم الميكروبات او علم الراجيات .

٣٨٥٣ - **بَكْتِيرِيَّة**
Bactérie (F). Bacterium (E).
كائنة مجهرية تكاد تكون غير منظورة ، اشكالها عديدة منها الكروي والهلالي والقضيبي ... توجد في الهواء والماء . تخشى الحرارة القوية التي تدمتها ولا يفسدها البرد والجليد . منها نافعة ذات قيمة حيوية واقتصادية ومنها ضارة مؤذية وميتة .

٣٨٥٤ - **بَكْتِيرِيَّة الْأَزُوت ، أَزُوتُوبَكْتِير**
Azotobacter
درينات في جذور معظم النباتات القرنية تثبت وتدخر ازوت الهواء . وهذا مما يجعلها من النباتات المصلحة والمفيدة فيا لو طمرت في التربة عند الادراك وقبل الهيج .

٣٨٥٥ - **بَكْتِيرِيَّة النَّتْرِجَّة ، نَيْتْرُوبَكْتِير**
Nitrobacterie (F). Nitrobacter, Nitrifying bacteria (E).
هي البكتيرية التي تسبب وتثير النتجة .
٣٨٥٦ - **بَكْتِيرِيُوم**
Bacterium
جنس بكتيريات من فصيلة القضيبيات . انواعه عديدة معظمها عديم الحركة ، دقيق الجسم ، اسطواني الشكل ، مالمس الصفحة او مخدد ، يطول من ٥.٠ الى ١٥.٠ مي . اشهر انواعه واضرها بكتيريوم البطاطا والتبغ والتبيل والدوسر .

٣٨٥٧ - **بَكْتِيرِيُوم الْبَطَاطَا**
Bac. solanacearum (S).
وصم يصيب النباتات الناشئة والبالغة فيبلور السوق ويؤذيها ويوقف النمو بعد ان يعطب الاوراق . اما الدرنات فيعطوقها بحلقة كستنية اللون تظهر عند القطع والتأكسد .

٣٨٥٨ - **بَكْتِيرِيُوم التَّبَغ**
Bac. tabacum (S).
وصم فتاك يصيب التبغ فيوشم اوراقه بنكات صغيرة سمراء اللون ثم غبراء فيفضاء تميت الخلايا وتقضي على النسيج .

٣٨٥٩ - **بَكْتِيرِيُوم الثَّيْل**
Bac. Rathayi (S).
وصم يصيب الثيل في قصبه وعصفه وازهاره .

٣٨٦٠ - **بَكْتِيرِيُوم الدُّوسِر**
Bac. monilliformans (S).
وصم يصيب جذور الدوسر فيؤذيها ويؤخر نمو النبات ان لم يشله .

٣٨٦١ - **بَكْتِين**
Pectine, Matière pectique (F).
Pectin, Material pectic (E).
مادة هلامية التركيب تشبه الصمغ الشفاف توجد في الثمار .

٣٨٦٢ - **بَكْر**
البكر شجر يشبه البشام لكنه اطول ورقاً واكبر حجاً يستاك باغصانه (اللسان) .

٣٨٦٣ - **بَكْرَة ***
Poulie (F). Pulley (E).
طارة صغيرة من خشب او حديد فارقة الاطار تحضن الحبل الذي يمر عليها عند رفع الاثقال .

٣٨٦٤ - **بُكْس**
Box
هي شقة الفرس اي مكانه المحتجز في الاصطبل .

٣٨٤٣ - **بَكَ**
Copulation des Insectes (F).
Insect copulation (E).
البك هو سفاد الحشرات . بك وبالك : سفد .

٣٨٤٤ - **بُكَاءة**
نبات كالجرجير (اللسان) ج بكاء وبكاء .

٣٨٤٥ - **بُكَاءة**
قال ابو حنيفة البكاء مثل البشامة لا فرق بينهما الا عند العالم بهما . وهما كثيراً ما يندخان معاً واذا قطعت البكاء هريقت لبناً ابيض . ج بكى .

٣٨٤٦ - **بُكَارَة**
Forcerie (F). Forcing-house (E).
هي دفيئة البواكير : بناء زجاجي او نصف زجاجي يشبه المصري ، تجوز تدفئته ، يستعمل لزراعة مختلف انواع البواكير الشمرية والبقلية والزهرية .

٣٨٤٧ - **بُكَاسِين**
Bécassine (F). Snipe (E).
راجع شكب .

٣٨٤٨ - **بُكَاسَة الْعُرْعَر * ، بَخْفَة الْعُرْعَر**
Pachyposa lineosa (S). Pachypose linéaire, Bombyx des genévriers (F). Pachyposa lineosa (E).
حشرة من فصيلة البقييات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها الاقاليم المعتدلة الحرارة من حوض البحر الابيض المتوسط . فراشها عجفة تعيش على مخزونها الامعالي . سرفها خاضعة قوتها اوراق العرعر والسرو || جسمها متوسط القد يطول نحو ٢٠ مم . بسطها تراوح من ٤٠ الى ٤٤ مم . رأسها صغير الجرم . عيناها صغيرتان ماسحتان . زباناها مشطيان . جوشنها ويطنها الى الطحلة يعلوها . واج اكلف واسمر || رواشنها الى الطحلة يعلوها في الزوج الامامي تشيع اسمر يمتد من القاعدة الى الاطراف . ويعملوها في الزوج الخلفي مواج اكلف . حناها الخارجي منقط بالاسمر . اهدابها الى الشققة || لها جيلان في الحول .

تظهر فراشة الجيل الاول في حزيران ، وتظهر فراشة الجيل الثاني في ايلول . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو خمسة ايام وتمتدح المكن لطفاً على الصفحات السفلى من نصال اوراق العرعر او على افنان الشربين والسرو || السرقة عند الادراك التام تقطول نحو ٤٠ مم . جسمها شبه اسطواني الشكل . ثوبها الى الطحلة يعلوها مواج اسمر وخط عريض من الهلب الاربد يمتد من الرأس الى الشرج وخطان جانبيان ازرقان . رأسها الى الزرقاء السوداء المواج . حيدها احمر . مدتها ورواجها سمر || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي ضمن صلجة تحببها السرقة بين الاوراق والافنان .

٣٨٤٩ - **بُكَتَاز**
Pectase
خبرة تحول البكتين الى حامض بكتيني .

٣٨٥٠ - **بَكْتِيرِيُولِيْت ***
Bactériolyte (F).
Bacteriolylt (E).
البكتريوليت عنصر يسبب ليز البكتريات اي انحلالها .

٣٨٥١ - **بَكْتِيرِيَّات**
Bactéries (F). Bacteria (E).
شعبة من المشرقيات تشمل اربع فصائل وهي الصمغيات والقضيبيات والكرويات والهيمنيات .



بُكَاسَة الْعُرْعَر



بُكَرَة

سمكة بحرية تدعى بلميده شائعة ، اطلبها .

الانتم من اولاد البقر قبل ان تسفد .

۳۸۷۷ - بُل

راجہ ایمل .

۳۸۶۶ - یکناسیات *Bixaceae* (S).

Bixacées, Bixinées (F). Bixaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين. أنواعها نحو ٤٥٠
وأجناسها ١٠ جميعها أشجار وجنابت حرجية وزينية
منبها الاقاليم الحارة والمعتدلة.

٣٨٦٧ - يَكْفٍ * ، نُفٍ ، حَيَّةُ الْقَلْبِ ،

فَوَالَيْسَ، ظَنُّوْهُ أَسْوَدُ

Cardiospermum halicababum (S). **Cardiosperme**, **Pois de merveille**, **Pois de cœur**, **Cœur des Indes** (F). **Balloon-vine**, **Heart-pea**, **Love In a puff** (E). **Blase nerbse**, **Echter herzame**, **Luftballonpflanze** (D). **Cuore dell'Indie**, **Domenicani**, **Vescicaria del cuore** (I).

نبات بري وتربي من فصيلة الصابونيات . اعطاه البلاد الحارة . ساقه ليفية عارشة . اوراقه متعاقبة مركبة وتربية التجميع . حوالقه تتقدم الازهار . ازهاره عنقودية ابطية ، مستطيلة المعاليق ، بيضاء اللون . ثماره حويصلية الشكل تغلف البزور المستديرة الحصية الحجم . بزورها شديدة الصلابة ، سود القشرة ، بيض النقيز . تستعمل في صناعة القلائد ولها بعض الخواص الطبية .

معدن نفيس فضي اللون رمزه (بلا) ثقله النوعي ٢١,٤٥ وزنه الاتومي ١٩٥,٢٣ ينصهر في ١٧٥٥ درجة سخ. وهو شديد الصلابة، جيد اللدانة. لا يتأثر بالهواء ولا يتفاعل بالحوامض.

Bakélite (F). Bakelite (E). بَکَلِیت - ۳۸۶۸

مادة شائعة الاستعمال الصناعي ، محفوفة التعريف على اسم الدكتور « بكنلند » . وهي عذوة تركيبي يحصل من تكثيف الالدهيد النحل مع الفينول .

Aglosses (F), Aglosses (E), ٥ - بُكْرَانِيَات ٣٨٦٩

حاشور زراعي شديد الفاعلية يرتكز على مادة « استر تيوفسفوريك ». يستعمل في تدخين المصاري للقضاء على الاراق والتترانيك والمناكب الحمر والتريس والصيدن . وهو يستعمل في المفاطر للقضاء على الذباب والكهديات . اللعبة العادية تحوي ١٠ غرامات من المادة الفعالة وتكفي لتدخين ما يراوح حجمه من ٢٥٠ الى ٣٠٠ م ٣ . اما الثمار والبقول المدخونة فيمكن استعمالها بعد مضي يومين .

مرتبة من رتبة البئر تشمل فصيلة واحدة تدعى ببيئيات احناسها وانواعها قليلة العدد تتميز بانعدام اللسان .

٣٨٨٢ - بلاد دُين، ست الحسن

Atropa belladonna (S). **Atrope, Belladone, Morelle**
furieuse, Bouton noir (F). **Deadly nightshade, Dwale,**
Banewort (E). **Echte tollkirsche, Wolfskirche** (D).
Belladonna, Atropa, Solano maggiore (I).

Pachnode bandée (F). ٣٨٧ - يَكْنُودَة

راجع جمل المواقف .

جنية طبية برية معمرة من فصيلة الباذنجانيات . منبتها البلاد الحارة والمعتدلة . تكثر في الاماكن الرطبة الظليلة .
تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . جذورها غليظة لحمية .

Pycnide (F). Pycnidia (E). ۳۸۷۱ - پکنید

راجم بوغ مغلف .

ساقها قوية منتصبه ، فروعها زباء اللحاء . أوراقها
أهليلجية معنقة شمعجة النصل الشديد الخضار .
أزهارها إبطية وتاجية الارتكاز ، خماسية التركيب ، كبيرة
البتلات الوردية اللون الموشحة بالأصفر || ثمارها عنبية
تبدو حمراء اللون ثم تنحرف نحو الأسود اللامع . لها
خفري ، حلو المذاق ، نافذ السم || أوراقها وأزهارها
وثمارها وجذورها سامة تؤذي الإنسان والحيوان || يستخرج
منها جوهر فعال يدعى الاتروبين وهو مادة قلووية سامة
تستعمل في الطب .

۳۸۷۲۔ بکُور، بکیر، مہنگار، معجال

Précocité, Hâtif (F). Precocious, Early (E).

هي صفة النبات الذي يسرع في نموه وأدراكه .

Palamys (S). بَكُورَة، بَلَمْبِندَة ٣٨٧٣-

Pélamide, Pélamyde (F). Pelamys, Palamida (E).

سمكة بحرية من فصيلة الاسقمريات قريبة الشبه من التونة لكنها أنشط حثكاً واكبر سناً ثوبها الى الزرقاء اللامعة يعقب مع اقترابه من ثبج الظهر حيث يطووه تجزيم معتزض اسمر



يكا



يكف



بلاک دون

٣٨٩٢ - **بلاكروت** Black-rot, Pourriture noire
اسم شامل لعدة اوصام فطرية مظهرها الخارجي عفن ندي
الوئل اسود اللون .

٣٨٩٣ - **بلاك** Poterium (S).
Pimprenelle (F). Poterium (E).
جنس نباتات عشبية ونجمية معمرة من البلانيات وفصيلة
الورديات . انواعه نحو ٢٠ تكثر في البور وفي الاراضي
المذحاة . جميعها علفية نافعة ومنها الصحية والطبية العديدة
الفوائد . اوراقها مركبة متعاقبة . وريقاتها وترية التجميع
متشاربة الحافة . ازهارها ضمية النورة طرفية الارتكاز .
اشهر انواعه البلان الثولوي (P. verrucosum) والشوكي
(P. spinosum) والحجام (P. sanguisorba) والخزني
(P. officinalis) والمندمج (P. compactum) والوبري
(P. villosum) .

٣٨٩٤ - **بلاك افريقي** Pimprenelle d'Afrique (F).
Melianthus (E).
هو العسلية اطلبها .

٣٨٩٥ - **بلاك شوكي** Poterium spinosum (S).
Pimprenelle piquante (F).
نوع من البلان يكثر في البراري المذحاة وهو نجمة شائكة
قرصية الشكل مشتبكة الفروع ، متشعبة الشوك اوراقها
مركبة متعاقبة . وريقاتها وترية بيضية النصل المسنن
الحافة . ازهارها طرفية وردية اللون .

٣٨٩٦ - **بلاك محجام ، كزبرة الثعلب**
Poterium sanguisorba (S). Pimprenelle sanguisorbe,
P. petite (F). Burnet (E). Pimprenelle (D). Burnet,
Pimpinella sorbastrelia, P. minor (I).
نوع من البلان العشبي البري يكثر بين الزرع وفي البور .
اوراقه صحية نافعة مستحبة الطعم المر .

٣٨٩٧ - **بلاك مخزني**
Poterium officinalis, Sanguisorba officinalis (S).
Pimprenelle grande, Sanguisorba officinale (F).
Great burnet (E). Grosser weissenknopf (D). Pim-
pinella comune, Meloncello (I).
نوع من البلان العشبي البري يألف المناطق والاراضي الرطبة .
اوراقه وازهاره وجذوره طيبة ، نافعة ، منشطة وتدر البول .
وهو من النباتات الصبغية الشائعة الاستعمال الصناعي
مزيجها مع املاح الحديد يعطي الصباغات السود ومزيجها
مع الشب يعطي الصباغ الاخضر .

٣٨٩٨ - **بلاقيات** Poteriales (F). Poteriales (E).
سبط من فصيلة الورديات اجناسه وانواعه عديدة جميعها
معمرة معظمها بري وبعضها تزييني . ثمارها فقيرة يابسة
وطليقة .

٣٨٩٩ - **بلانيريه** Planera (S). Planère (F).
Planer tree (E). Wasserulme (D). Planera (I).
جنس اشجار وجنابات من البوقيصيات . اوراقها متعاقبة
بيضية النصل . ازهارها خشتوية . ثمارها جناحية جدعة
الجناح . اشهر انواعها ما يلي :

٣٩٠٠ - **بلانيريه مفترضة**
Planère crénelée, Orme de Sibérie (F).
شجرة كبيرة القد تعلو نحو ٢٥ م . خشبها صناعي شائع
الاستعمال لا تقربه حشرات ولا ينخره سوس .

٣٨٨٣ - **بلاديوم** Palladium
معدن ابيض يستخرج عادة مع البلاتين او من بعض
مناجم الذهب . ثقله النوعي يراوح من ١١ الى ١٢
وزنه الاتومي ١٠٦ ينصهر في ١٥٠٠ درجة سخ . وهو
شديد الصلابة لا يتأثر بالهواء والماء ولا يتفاعل بالحوامض .
يتميز بقوة امتصاصه الهيدروجين وبامتزاجه مع بعض
المعادن التي يقويها ويمنع فسادها . يستعمل في صناعة
الادوات الدقيقة الثمينة .

٣٨٨٤ - **بلاذر ، أنقردية** Anacardium (S).
Anacardier, Anacarde (F). Anacardium (E).
جنس اشجار وجنابات من فصيلة البطليات . مهدا المناطق
الاستوائية الاسيوية والامريكية . اوراقها متعاقبة ، معنقة ،
كاملة ، بسيطة . ازهارها عنقودية التجميع تاجية الارتكاز .
ثمارها قلبية الشكل لحمية السوذك مأكولة . يستخلص من
بذورها مادة قلوية تستأصل النحول والقوبة . ويستخرج
من سوقها عصارة صمغية تدعى صمغ البلاذر او صمغ
الاكاجو || اشهر انواعه الشرقي والغربي .

٣٨٨٥ - **بلاذر شرقي ، بلاذر شرقي**
Anacardium officinarum, Semecarpus anacardium
(S). Anacardier oriental, Noix de marais (F). Ana-
cardium, Marsh nut, Marking nut tree (E). Tinten-
baum (D). Semecarpo d'Orient (I).
نوع من البلاذر الصناعي والتزييني . ثمرته متوسطة القد
ثماره مأكولة . يستخلص من بذور ثماره بعض المواد الطبية
الجلدية . اخشابها صناعية جيدة الصنف .

٣٨٨٦ - **بلاذر غربي ، أكاجو**
Anacardium occidentale (S). Anacardier occidental,
Acajou, Noyer d'acajou, Pomme d'acajou (F). Cas-
hew-nut tree, Bean of Malacca (E). Nierenbaum,
Acajoubaum (D). Anacardo, Acajou (I).
نوع من البلاذر شجرته كبيرة القد . ثماره مأكولة يستخلص
من عصارته بعد تحميرها وتقطيرها مشروب كحولي مستحب
الطعم . ويستخرج من لحاء سوقه مادة صمغية شائعة
الاستعمال . خشبه ناعم الرقة فاخر الصنف ثمين القيمة .

٣٨٨٧ - **بلاذريات ، بلاذريات** Sémecarpées (F).
Semecarpa (E).
سبط من الفصيلة البطمية اشهر اجناسه البلاذر .

٣٨٨٨ - **بلارج ، بلكرج** Cigogne blanche (F).
White stork (E).
طائر كبير الجثة طويل المنقار مستقيم يعرف بالقلق
الابيض ، اطلبه .

٣٨٨٩ - **بلاستودرمة** Blastoderme (F).
Blastoderm (E).
البلاستودرمة غشاء مركزة في البيضة تحت الندية . وهو
مؤلف من طريستين ، الاولى تتحول الى جلد والثانية الى
معي الملقوحة .

٣٨٩٠ - **بلاسمه** Plasma
هي الاثلة .

٣٨٩١ - **بلاسمه حيوانية** Zooplasma (F).
Zooplasma (E).
مادة هيولية تحضن نواة الحبيرة عند الحيوان .



بلاذر غربي



بلاذر شوكي



بلاذر مخزني

٣٩١٧ - بُلَّتْ Gypaète (F). Gypaetus (E).

هو البلح ، اطلبه .

٣٩١٨ - بُلَّة

البلة هي واحدة البيل وهو نور الغضاه . والبيل ايضاً هو الزغب الذي يكون بعد النور .

٣٩١٩ - بُلَّة البلة هي بقية الكلا .

٣٩٢٠ - بُلْتُون Pluton (F). Pluto (E).

كوكب سيّار معروف ايضاً باسم أفلوطن . اطلبه .

٣٩٢١ - بُلْتُونِيه Boltonie (F). False camomile (E).

راجع بابونج كاذب .

٣٩٢٢ - بُلْتَجَم Bander (F). To bind or tie up (E).

بلجم الدابة : عصب قوائها من داء يصيبها .

٣٩٢٣ - بُلْتَج * ، بُلَّتْ ، كاسير العظم

Gypaetus barbatus (S). Gypaète, G. barbu (F). Gypaetus (E).

طائر من الكواسر وحيد الفصيلة والجنس والنوع . موطنه الجبال الشاخنة من الحبشة الى الهند فالشرق الاوسط فأوروبا . وهو كبير الجثة طوله نحو ١٤٥ سم . ويسطته نحو ٣٠٠ سم . رأسه مستطيل الشكل ابيض الجبهة . عينه صغيرة القد ، حمراء المقلة ، صفراء الحدقة ، يحوقها اطار اسود عريض الخط يقطب المحسر من الشدق الى قبة الرأس . منسره اسمر اللون احجن البهرة الشديدة الانعقاد . ارساغه كاسية قصيرة وغلبيظة . مخالبه قوية . وهو اسمر الظهر والسقطين والذنب ، اغبر الجؤجؤ والبطن انما رقشة ثوبه تختلف مع العمر || يلتبس قوته في رائحة النهار . يصيد الجداء والارانب وكل حيوان يدب ولا يعف عن الجيف وقد يحمل عظم الفخذ من الثور والبعير او كل عظم فيه مع حتى اذا كان في كبد السماء ارسله على صخرة فيتكسر فيهبط فيأكل مخه || يدشن عشه في قم الجبال النائية . قطر وكنه لا يقل عن ١٥٠ سم . وعرضه نحو ٦٠ سم . الذكر يكوم انشاء في الربيع فتبيض رفتهين تحضنها وحدها نحو ٤٠ يوماً || وهو من الكواسر التي تدجن بسهولة وتأنس البشر وتألّف الطير .

٣٩٢٤ - بُلْتَج Dattes (F). Dates (E).

البلح من ثمر النخل قبل البسر لأن اول التمر طلع ثم خلال ثم بلح ثم بسر ثم رطب ثم ثمر . الواحدة بلحة .

٣٩٢٥ - بُلْتَج البعر Moule (F). Mussel (E).

اطلب ميديه .

٣٩٢٦ - بُلْتَج الصحراء Dattier du désert (F).

اطلب عالج . Thorn tree (E).

٣٩٢٧ - بُلْتَج طرازون Kaki (F).

هو الكاكي ، اطلبه .

٣٩٢٨ - بُلْتَحِيَّات Gypaètes (F).

فصيلة من رتبة ألجوارح وكواسر النهار تشمل جنس البلح دون سواه .

٣٩٢٩ - بُلْتَخ ، بُلَاخ Chêne coquiné (F).

البليخ والبلاخ نوع من السنديان . راجع سنديان . Kermes oak (E).

٣٩٠١ - بلا نيره منفعية Planère aquatique (F).

شجرة صغيرة القد مهدا منافع لوزيانا . تزرع للتزيين وهي هرمية الشكل جميلة القالب . اخشابها صناعية حنطية اللون .

٣٩٠٢ - بُلْبَال Loup (F). Wolf (E).

البلبال هو الذئب . اطلبه .

٣٩٠٣ - بُلْبُل * ، كُغَيْت ، نُغَر ، جُحِيل

Pycnonotus (S). Pycnonota, Bulbul (F). Pycnonotus, Bulbul (E).

جنس عصافير من فصيلة الكميتيات . انواعه نحو ٥٠ اعطانها الاصقاع الحارة الاسيوية والافريقية . جميعها جميلة الشكل رشيقة القوام مختلفة الالوان المتداخلة يندب فيها الحنطي الاسمر المراج والرمادي الاسفع . تألف الاحرج والغابات والحدائق . معظمها غريد يحسن التوقيع . وهي تدن في الاشجار وتحضن من ٤ الى ٦ بيضات . اشهر انواعه ما يتبع .

٣٩٠٤ - بُلْبُل الشعير Ortolan (F).

راجع ارطلان .

٣٩٠٥ - بُلْبُل الغاب الأتمر

Locustelle tachetée (F).

هو الشندل الأتمر ، اطلبه .

٣٩٠٦ - بُلْبُل عراقي Pycnonotus leucotis

٣٩٠٧ - بُلْبُل فلسطيني Pycnonotus capensis vellum

٣٩٠٨ - بُلْبُل لبناني Pycnonotus xanthopyga

٣٩٠٩ - بُلْبُل مصري Pycnonotus barbatus arsinoe

٣٩١٠ - بُلْبُل مغربي Pycnonotus barbatus barbatus

٣٩١١ - بُلْبُلِيَّات Pycnonotidae (S).

Pycnonotidés (F).

فصيلة طير من الجواثم تدعى كميتيات . اطلبها .

٣٩١٢ - بُلْبُس Muscari (F).

هو الحبل ، اطلبه .

٣٩١٣ - بُلْبُس أزرق Muscari botryolde (F).

راجع حبل جميل . Grape hyacinth (E).

٣٩١٤ - بُلْبُس الكلب Muscari chevelu (F).

راجع حبل أزب . Tassel hyacinth (E).

٣٩١٥ - بُلْبُس مسكي Muscari odorant (F).

راجع حبل مسكي . Strach hyacinth (E).

٣٩١٦ - بُلْبُول * Dafila acuta (S).

Canard pilot, Pilet (F). Pintail (E).

طائر من البطيات القواطع كبير الجثة طوله نحو ٦٣ سم . رأسه حنطي اللون تشوبه حمرة وجؤرة . عنقه موشع بالابيض جؤجؤه وبطنه الى البياض الاغبر ، افنيكه اصفر ، ظهره انمر ، رقشته سمراء الاطار . الانثى اكثر رقشة واقل بياضاً من الذكر .



ببل



ببلول



بلح

لان البلم الغليظ الكثير الشعر المستطيل لا يجب ان يكون في الخيول العتيقة المظلمة .

٣٩٤٢ - بلندون *
Paludina (S).
Paludine (F). Paludina (E).

جنس حيوانات مائية سرلودة من الرخويات معديات الارجل وفصيلة البلدونيات . انواعه المعروفة نحو ١٠٠ منتشرة في جميع اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة . تعيش في المياه العذبة || اصداؤها صلبة القد ، محلزنة ، رقيقة الغشاء الكلي ، جميلة الزخرفة والخطوط القاطبة .

٣٩٤٣ - بلندونيات *
Paludinidae (S).
Paludinidés (F). Paludinidae (E).

فصيلة حيوانات سرلودة مائية من الرخويات معديات الارجل اماميات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . تعيش في المناطق وفي مجاري الماء || اصداؤها صغيرة ، محلزنة ، رقيقة ، جميلة الالوان والزخرفة || اعرف اجناسها واشهرها البلدون والصومر والثمام .

٣٩٤٤ - بلندي
Indigène (F). Indigenus (E).

من كان من مواليد عطنه ان في الحيوان ام في النبات .

٣٩٤٥ - بلرديرة *
Billardiera (S).
Billardièr (F).

جنس جنات سرعية معمرة من فصيلة الحبشيات . اوراقها متعاقبة سنانية النصال . ازهارها طرفية الارتكاز ، فردية او خسية التجميع || انواعها المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية :

٣٩٤٦ - بلرديرة عارشة *
Billardiera scandens (S).
Billardièr grimpante (F).

نوع من البلرديرة . مهدا استرالية . ساقها عارشة تطول نحو اربعة امتار . افنانها مزغبة اللحاء . اوراقها متعاقبة ، كاملة ، سنانية الشكل ، صغيرة القد . ازهارها فردية ، مستطيلة المالحق ، متدية . ثمارها عنية ، كروية الشكل ، زرقاء اللون .

٣٩٤٧ - بلرديرة مستطيلة الزهر *
Billardiera longiflora (S).
Billardièr à longues fleurs (F).

نوع من البلرديرة . مهدا استرالية . ساقها عارشة تطول نحو ستة امتار . اوراقها متعاقبة ، كاملة ، سنانية النصل . ازهارها فردية ، فستقية اللون تطول نحو ٥ سم . ثمارها عنية حمراء اللون .

٣٩٤٨ - بلرْفون *
Bellerphona (S).
Bellérphon (F). Bellerphona (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل اللامتجانسة وفصيلة الاطلنطيات . انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها من متحجرات الطبقة الفسفية || اصداؤها صغيرة محدبة وحيدة المصاريح يملوها في وسطها كظفر قاطب وتحزيز افقي . صفحتها الداخلية مالة .

٣٩٤٩ - بلز ، لبليز
Limon (F). Silt (E).

هو الطين الذي تعقبه مياه الانهر بعد فيضانها وعودتها الى مجاريها الطبيعية .

٣٩٣٠ - بلخنة

البلخنة نبات ينبت ولا يملو (اللسان) .

٣٩٣١ - بلخش
Biebersteinia (S).
Biebersteinia (F).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الفرونيقيات . انواعها المعروفة قليلة العدد ، اعطانها جبال حوض البحر الابيض المتوسط || سوقها مستضخمة بضباضة فرعاء . اوراقها رحيمة . ثنائية التركيب الريشي او ثلاثية . ازهارها سنبلية التجميع او عنقودي . ازهارها خماسية التركيب ، صغيرة القد او متوسطة ، بيضاء اللون او تبنية . تنويرها ربيعي .

٣٩٣٢ - بلخشية *
Periploca (L). Périplouque (F).
Silk vine (E). Echte hundsschlinge (D). Apocino serpeggiante, Erba del signore (I).

جنس جنات برية وزراعية من فصيلة الصفلاقيات . انواعه قليلة بعضها عارض . اوراقها معتقة قليلة لسنة متعاقبة عابلة . ازهارها جميلة عشكولية التجميع خماسية البتلات المنفرجة الخضراء ظاهراً والبنفسجية من الداخل . ثمارها اسطوانية الشكل ملساء . اشهرها الثلاثة التالية .

٣٩٣٣ - بلخية سرنديب
Périplouque de Ceylan (F).

نوع من البلخية تزرع لثمارها المأكولة .

٣٩٣٤ - بلخية مصرية
Périplouque scammonée (F).

نوع من البلخية تزرع للزينة . ازهارها بيضاء اللون جميلة الشكل ، فواحة العرف المستحب .

٣٩٣٥ - بلخية يونانية
Périplouque grecque (F).

نوع من البلخية الزينية ، زهرتها حمراء اللون ، عصارتها سامة .

٣٩٣٦ - بلد ، وطن ، اقلتم
Acclimater (F).
To acclimatize (E).

كيف النبات او الحيوان يشي الوسائل ليألف اقلماً جديداً لم يتعوده بعد .

٣٩٣٧ - بلدة
Auge (F). Bucket (E).

هنة من رصاص مدرجة يقيس بها الملاح الماء .

٣٩٣٨ - بلدة
البلدة منزل من منازل القمر البانية وهي رقعة من السماء لا كوكب بها بين النعام وسعد الذابح ينزلها القمر وربما عدل فنزل بالقلادة وهي ست كواكب مستديرة صفار خفية موقعها بين النعام وسعد الذابح ايضاً || رقيب البلدة يدعى الدراع .

٣٩٣٩ - بلدور
Polder

اطلب كسية .

٣٩٤٠ - بلدوس
Boldo (F). Boldo wood tree (E).

هي شجرة الكبد ، اطلبها .

٣٩٤١ - بلدوم ، غبغب
Fanon (F). Fetlock (E).

من اعضاء قوائم الفرس وقد يدل على العنق وجودة الرسن



بلخية



بلدون



بلرديرة مستطيلة الزهر



بلرْفون



بلسم مكة



بلشون أُرأس



بلشون أرجواني



بلشون أُرمد

٣٩٦٣ - بَلْسَمِينِيَّات، مَجْزَاعِيَّات

Balsaminaceae (S). Balsaminacées, Balsaminées (F). Balsaminaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين ومنهم من جعلها سبط من الفرنوقيات. أجناسها قليلة، أنواعها عديدة معظمها نبات عشبي حولي جميل الزهر يستعمل للتزيين.

٣٩٦٤ - بَلْسُن

Lentilles (F). Lentils (E).

هو العدس المأكول. واحدته بلسنة.

٣٩٦٥ - بَلَشُون، مَالِك الْحَزِين

Ardea (S). Héron (F). Heron (E).

جنس طير من القواطع وفصيلة البلشونيات. أنواعه ١٠ منتشرة في معظم أقطار العالم. جميعها كبيرة الجثة مستطيلة الساق، طويلة العنق الدقيق والمنقاد الجالس الذلق. وهي تألف المناطق والضفاف حيث تصطاد الأسماك والضفادع.

٣٩٦٦ - بَلَشُون أَيْض

Herodias alba (S). Héron blanc (F). White heron (E).

هو ابن الماء الأبيض، أطلبه.

٣٩٦٧ - بَلَشُون أُرأس*، أَبُو الْعَنْقَاء

Ardea melanocephala (S). Héron à tête noire (F). Black-headed heron (E).

نوع من البلشون كبير الجثة أسود الرأس.

٣٩٦٨ - بَلَشُون أُرْجَوَانِي*، جَحْفَة، أُرْخِيَاوِي

Ardea purpurea (S). Héron pourpre (F). Purple heron (E).

نوع من البلشون، كبير الجثة، أرجواني الثوب، يألف أخوار الأنهر والهور.

٣٩٦٩ - بَلَشُون أُرْمَد*، بَلَشُون سِنْجَاي، دَنَكَلَة

Ardea cinerea (S). Héron cendré (F). Grey heron (E).

نوع من البلشون أُرمد الثوب يكثر وجوده في الشرق العربي.

٣٩٧٠ - بَلَشُون بَحْرِي

Herodias bulbus (S). Reef heron (E).

هو ابن الماء المادي، أطلبه.

٣٩٧١ - بَلَشُون جَبَّار، سَبْطَر، مِرَّة، أَبُو عِيْزَار

Ardea Goliath (S).

Héron Goliath (F). Goliath or Giant heron (E).

أكبر أنواع البلشون وأضخمها جثة وأعظمها سرباً.

٣٩٧٢ - بَلَشُونِيَّات

Ardeidae (S). Ardeidae (E).

فصيلة طير من رتبة طوال الساق أجناسها وأنواعها كثيرة العدد معظمها من القواطع يحجب الأقاليم المختلفة ويألف المناطق والهور والأخوار.

٣٩٧٣ - بُلْصُوص، بِلْص

البُلْصُوص طائر وإنشاء بلْصَى والجمع بلاصيص (الديري).

٣٩٧٤ - بُلْصُوص جَاوَا

Eurylaimus javanus (S). Eurylaima de Java (F).

طائر من فصيلة البُلْصُوصِيَّات. موطنه جاوا وسومطرة والهند. جسمه يطول نحو ٢٥ سم. رذاؤه ومجراه وبطنه وذنبه إلى السواد الفحشي القائم. زوره وصدره إلى الصفار الباهت، ويملوه في أواسط قوادمه وفي بعض ريش أفنيكه ترابع

٣٩٥٠ - بُلْس

Lentilles (F). Lentils (E).

البلس هو العدس المأكول. الواحدة بلسة (اللسان).

٣٩٥١ - بَلْس

Carique (F). Common fig tree (E).

راجع تين. الواحدة بلسة.

٣٩٥٢ - بَلْس، بِلْس

هو رماد القلى (فريتخ).

٣٩٥٣ - بَلْسَان

Etourneau (F). Starling (E).

اللسان: نوع من الطيور يقال لها الزراير (التاج).

٣٩٥٤ - بَلْسَان، بَشَام

Balsamier, Baumier (F). Balsam tree, Balm tree (E).

جنس اشجار وجنبات رائحة برية وتزيينية من فصيلة البخوريات مهدما الاصقاع الحارة من الشرق الاوسط وأفريقية. أنواعها عديدة يستخرج من بعضها ادهان رائحة عطرية فاعرة. أشهرها بلسم مكة والمقل والمر والقطف والقفل. راجع هذه الاسماء.

٣٩٥٥ - بَلْسَان أَيْض

Boule de neige (F). Snow ball tree (E).

راجع افلوس ثلجي.

٣٩٥٦ - بَلْسَان الماء

Viorne lobé, Obier (F). Water elder (E).

راجع افلوس أُمرد.

٣٩٥٧ - بَلْسِيد، بَوْصِيَة

Plaste, Plastide (F). Plastid, Plastidium (E).

مجموع مواد الخلية الحية باستثناء عناصر الدختر والافراز. وهي أيضاً وظيفة الخلية بالنسبة إلى قدرتها على التطور والنشوء.

٣٩٥٨ - بَلْسَك

Aparine (F). Catch-weed (E).

هو الغاليون الأبيض نبات بري طبي.

٣٩٥٩ - بِلْسَك

Hirondelle (F). Swallow (E).

البلسك هو الخطاف (فريتخ).

٣٩٦٠ - بَلْسَكَاء، بِلْسِكَاء

Bardane (F). Burdock (E).

نبت ينشأ في الثياب فلا يفارقها واسمه في المفردات «عمي خذي معك». راجع أَرَقَطِيُون.

٣٩٦١ - بَلْسَم

Myroxylon (S). Myroxyle (F). Myroxylon (E).

جنس اشجار حرجية طيبة من فصيلة القرنيات الفرائية. أنواعه قليلة اعطتها الاصقاع الحارة ايضاً كانت. يستخرج من سوقها وفروعها عصارة رائحة بلسمية تستعمل في بعض المستحضرات الطبية.

٣٩٦٢ - بَلْسَم مَكَّة*، بَلْسَم جَلْعَاد، أَبُو شَام

Balsamodendron gileadense, Commiphora opobalsamum, Amyris gileadense (S). Baumier, Balsamier de la Mecque, B. de Gilead, B. de Judée (F). Balm of Gilead, Balsam of Mecca (E). Mekka balsambaum, Opobalsambaum (D). Albero balsamico, Balsamo della Mecca, B. di Gilead (I).

نوع من اللسان من فصيلة البخوريات. اعطانه البلاد الحارة. يكثر في الشرق العربي. يستخرج منه دهن عطري فاخر الصنف وصمغ رائحة عزيزة تعتبر من اجود انواع البخور.

٣٩٨٢ - بُلُطُوسِيَّات ٥ Platypodidae (S).

Platypodidés (F). Platypodidae (E).

فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة اعطائها معظم حراج البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة، اسطوانية الشكل، تطول من ٥ الى ٨ سم. رؤوسها كبيرة، مستعرضة القفن. عيونها ناشزة. تأشيرها وملامسها نظامية. قرونها الاستشعارية صغيرة، دبوسية الاطراف. كواسلها مستطيلة، محدبة. اغمادها لاحفة. قوائمها نشيطة. ارساغها رباعية العقول. اثوابها ملونة || جميعها خاشبة بعضها يعيش على الصنوبريات والبعض الآخر على البلوطيات || اشهر اجناسها البلطوس.

٣٩٨٣ - بُلُطُوش ٥ Sciuropterus (S).

Polatouche (F).

جنس حيوانات لبونة قاضمة من فصيلة السنجاييات. انواعه ٢٣ موطنها المناطق القريبة من الباردة في آسية واروبة وامريكا. جميعها صغيرة. القد. اجسامها مستطيلة. رؤوسها ذلقة عيونها جاحظة. اذناها صفيحية الشكل مبططة. تتميز بزوائدها الجلدية الجناحية القائمة على كامل خوصها من مفصل الساعد الى مفصل الفخذ. تطير من شجرة الى اخرى شوطها يراوح من ٢٠ الى ٢٥ م. || تألف الغابات والاحراج الكثيفة. تسرح في الليل. تعيش على الاشجار قوتها البراعم والنوامي والثمار والبزور واللوز والجوز... اجحرتها اوكن ترتبها في صدوع الاشجار. اناثها تضع من ٣ الى ٥ ادراص تبصر وتكتبي بعد وضعها بعشرة ايام.

٣٩٨٤ - بُلُطُولِيَّة Boltonie (F). False camomile (E).

راجع بابونج كاذب.

٣٩٨٥ - بُلُطِي *، مُشَط، خِرْمَشَقْلِي

Chromis (F). Chromis, Tilapia, Bolti (E).

جنس اسماك بحرية ونهرية من فصيلة المشطيات انواعه المعروفة قليلة جميعها متوسطة القد او صغيرة. تتميز برؤوسها المخشفة وافواها المندفعة وزعانفها الظهرية المستطيلة الشائكة والشرجية الفارقة || اعرف انواعه يتبع.

٣٩٨٦ - بُلُطِي الْمُتَوَسِّط، بُلُطِي كَسْتَنِي

Chromis castanea (S). Chromis chatain, Castagnole, Queue fourchue (F).

نوع من البلطي يكثر في المتوسط طوله يراوح من ٣٠ الى ٦٠ سم. ثوبه كستني اللون اسفع الموج يبق عند الظهر. لحمه متوسط الصنف مأكول.

٣٩٨٧ - بُلُطِي النِيل Chromis niloticus (S).

Chromis du Nil (F).

نوع من البلطي يكثر في النيل وفي سائر الانهر الافريقية. طوله يراوح من ٣٠ الى ٥٠ سم. ثوبه الى الاربدة السمراء يعلوها موج اسفع. لحمه متوسط الصنف مأكول.

٣٩٨٨ - بُلُطِي الْيَهُودِيَّة، بُلُطِي طَبَرِيَّة

Chromis paterfamilias (S). Chromis de Judée (F).

نوع من البلطي يوجد في بحيرة طبرية طوله يراوح من ٢٠ الى ٤٠ سم. ثوبه الى الاربدة السمراء يعلوها موج اسفل. من ميزات الخاصة ان الذكر يحفظ ويحضن في تجويف خطمه سرء الانثى حتى اكتمال نطفه.

بيضاء صغيرة. حدقة عينه ياقوتية اللون. منقاده ضخم، ضليع، شبه مخروطي الشكل، ذرب الطرف الاعقف، واسع الشدق الرحب. ساقه مستغلظة الجرم، لوئها الى السمرة السوداء || يألف الرياض وضفاف البحيرات ومجاري الماء. قوته الديدان والاساريع والحشرات وبعض الثمار البرية || يدشن عشه في الاشجار التي تشرف على الماء. الانثى تبيض من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها بمنابرة الذكر.

٣٩٧٥ - بُلُصُصِيَّات ٥ Eurylaimidés (F).

Eurylaimidae (E).

فصيلة طير من الجواثم سنيات المناقير. اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٢٠ جميعها من طيور الهند وماليزيا || اجسامها ربعة. مناقيدها ضخمة، مخروطية الشكل، قصيرة. اجنحتها قصيرة. اذناها مستعرضة، مستديرة الاطراف. اثوابها تختلف مع الانواع يكثر فيها التلوين || اعرف انواعها واشهرها بلصوص جاوا.

٣٩٧٦ - بُلُطَانِيَّة * Pultenaea (S). Pulténée (F).

جنس نباتات برية وتريينية من فصيلة القرنيات الفراشية. انواعها عديدة مهدا بلاد استرالية. جميعها جنبات ومجالات فرعاء. اوراقها خيطية صغيرة القد متعاقبة متقاربة الترتيب. ازهارها نورية التجميع تاجية الارتكاز. انواعها التريينية المشهورة ثلاثة:

٣٩٧٧ - بُلُطَانِيَّة مُخَزَّزَة P. dentata (S).

P. dantelée (F).

٣٩٧٨ - بُلُطَانِيَّة مُتَصِبَة P. stricta (S).

P. dressée (F).

٣٩٧٩ - بُلُطَانِيَّة مُعَطَفَة P. flexilis (S).

P. flexible (F).

٣٩٨٠ - بُلُطَة، بَرَسَاء بُلُطَة

Mimusops balata (S). Balata (F).

Guiana milke tree (E). Balatabaum (D).

شجرة حرجية وصناعية منبها المناطق الاستوائية اخصها الفويان. وهي نوع من البرساء وفصيلة السبوتيات. ساقها متوسطة الارتفاع مستغلظة القطر. اوراقها متعاقبة مننقة جامدة النصال. ازهارها ابطي الارتكاز. ازهارها فردية التجميع صفراء اللون || يستخرج منها بالحز عصارة صمغية مطاطة جيدة الصنف. اخشابها صناعية فاخرة تستعمل في الموبيليا.


٣٩٨١ - بُلُطُوش ٥ Platypus (S).

Platype (F). Platypus (E).

جنس حشرات خاشبة من فصيلة البلطوسيات ورتبة غمديات الاجنحة. انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم حراج البلاد المعتدلة الحرارة من العالمين القديم والجديد || اجسامها اسطوانية الشكل، تطول من ٥ الى ٨ سم. رؤوسها كبيرة، مستعرضة القفن. عيونها ناشزة. تأشيرها ضليمة. ملامسها صغيرة. قرونها الاستشعارية صغيرة، دبوسية الاطراف. كواسلها مستطيلة، محدبة. اغمادها لاحفة، مقطومة الطرف. قوائمها نشيطة. اثوابها سوية اللون الواحد باستثناء الرأس الذي غالباً ما يكون اسود || جميعها خاشبة تعيش على الصنوبريات والبلوطيات.



بلطانيه



بلطوس



بلطوش



بلطي

مفلطحة ، اهليلجية الشكل ، تطول من ١٥ الى ٢٢ سم .
اثوابها الى السمرة او الشقحة تعلوها زخارف متباينة
الاشكال || جميعها خاضعة تعيش على الارواق الغنية التي
يكثُر وجودها على ضفاف مجاري الماء || اعرف اجناسها
البلفون .

٣٩٩٧ - بِلَقَالِيَا ٥ Bellevalia (S). Bellevalie (F).

جنس نباتات دوفسية برية من فصيلة الزنبقيات ، معقودة
التعريف على اسم العلامة « بلقال » . انواعها المعروفة
قليلة ، منبها يمتد من الشرق الادنى الى معظم اقطار اروبة
المعتدلة الحرارة || سوقها شمراخية ، عادمة الورق تعلو من
٢٠ الى ٥٠ سم . وتنتهي باكليل من الزهر يراوح عددها
من ٢٠ الى ٣٠ زهرة . اوراقها قرصية الانتشاج عددها
من ٤ الى ٥ وطولها يراوح من ٣٠ الى ٤٠ سم . اما عرضها
فن ١٠ الى ١٥ سم . ازهارها الى اليباض الاخضر الموج
ومنها بنفسجية القاعدة او جزؤية || تنويرها يستمر من
نيسان الى ايار .

٣٩٩٨ - بِلَفِيل ٥ Pelophilus (S).

Pérophile, Boa de Madagascar (F).

نوع من الثعابين الضخمة عادمة الاخاديد والسموم من
فصيلة الاصليات . اعطانها جزيرة مدغسكر . تألف
المستنقعات حيث يتوفر لها القوت من مختلف ما دب وعام ||
جسمها شبه اسطوانى الشكل مستضخم الوسط ، مستدق
العنق والذنب ، يطول نحو ٢٢٠ سم . رأسها معتدل الجرم
مقطوم الخطم . ثوبها الى السمرة القاتمة تعلوها رقشة سوداء
متباينة الاشكال تكثُر فيها الاطواق .

٣٩٩٩ - بِلَق ٥ Albâtre (F). Alabaster (E).

البلق حجارة نضية ما وراها كالزجاج اذا كانت نقية
وقليلة الشخانة .

٤٠٠٠ - بِلَقَاء ٥ Melaleuca (S).

Mélaleuque (F). Melaleuca (E).

جنس اشجار وجنبات برية وزراعية من فصيلة الآسيات .
انواع عديدة منبها جزر أفيانيز وبعض الاصقاع الصينية .
اوراقها كاملة ، رحيمة ، معنقة ، متعاقبة او متقابلة .
نصلها عابق الخضار الزاهي ، تتخلل مسامه غديرات
صغيرة ملوكة بالاذهان العطرية . ازهارها سنبلية التجميع
مختلفة الالوان منها الابيض والاصفر والارجواني . ثمارها
جراة || يستخرج من اوراقها وازهارها دهن الكلجيبوت
وهو دهن لزج اخضر اللون يستعمل دلكا كعلاج لداء
المفاصل وداخليا كعرق || انواعه عديدة اشهرها ما يتبع .

٤٠٠١ - بِلَقَاء بِيضَاء Melaleuca leucodendron (S).

Mélaleuque blanc (F).

شجرة سمراء الساق ، بيضاء الاغصان والافناد . اوراقها
متعاقبة جلدية النصل المدبب المعنقة . ازهارها بيض .
ازهارها يدوم من اوائل ايار الى اواخر حزيران .

٤٠٠٢ - بِلَقَاء حُرْشِفِيَّة Melaleuca squamea (S).

Mélaleuque écailleux (F).

شجرة صغيرة تعلو من ٤ الى ٦ أمتار . اوراقها متقابلة
معنقة بيضية الشكل . ازهارها حُرْشِفِيَّة ليلكية . ازهارها
يدوم من حزيران الى ايلول .

٣٩٨٩ - بَلَطِيمُور مَبْدُول ٥ Yphantès Baltimore (S).

Baltimore vulgaire (F). Common Baltimore (E).

طائر من فصيلة الكاروجيات . موطنه امريكا الشمالية
اخصها ولاية ماريلندا . يألف الغابات والحدائق ريقتر
من الاماكن الآهلة حيث يلقي كل تشجيع لانه يقضي
على جميع الحشرات من الجراد الى الفراشة والحفساء ||
جسمه معتدل القد . يطول نحو ٣٢ سم . رأسه وقنزته
وعنقه وظهره وذنبه الى السواد الاسفع الموج . صدره وبطنه
الى الصفار الناري . جناحه الى السواد الاسفع يعترضها
تجذيع اصفر . ذنبه مقطوم الطرف ، اصفر الزام الاخير .
عيناه كبيرتان مطوقتان بالبرقالي . حدقة عينه حمراء اللون
منقادة ورسفاه الى السمرة || يألف حياة الاسر ويعيش
في القفص شرط ان يكون فسيحا || يدثن عشه في
الاشجار الرفيعة بين مجموعة من افناد الاغصان . عشه
قدحي الشكل عتين الحيك . الانثى تضع من ٣ الى ٤
بيضات تحضنها بمنوبة الذكر نحو ١٧ يوما .

٣٩٩٠ - بِلَعْلَع ٥

طائر مائي طويل العنق (القاموس) .

٣٩٩١ - بُلْعُم ، بُلْعُوم ، فَرِي ، مِسْرَط ٥

Esophage (F). Esophagus (E).

مجرى الطعام في الخلق . جمع بلاع .

٣٩٩٢ - بُلْعُوط ٥ Alevin (F). Fry, Young fish (E).

بلعوط ج بلاعيط . السمك الحديث العهد قبل ان يتملص
من حواشيه وزوائده . انظر في الرسم البلعوط في
مختلف ادواره .

٣٩٩٣ - بُلْعُومِي ، حُلُقُومِي ٥

Pharyngien (F). Pharyngeal (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالحلقوم كقولك
شريان حلقومى .

٣٩٩٤ - بُلْعُومِيَّات تَبْهِيَّة ٥

Pharyngiens labyrinthiques (F).

فئة من الاسماك كاملات العظام ، شائكات الزعانف تتميز
بشكل عظامها - الحلقومية التي تشبه انخاريب المتراكبة
كالخلايا والتي تمكنها من الاحتفاظ ببعض الماء فترة من
الزمن تكفيها لسد حاجة خياشيمها عند الانتقال برا من
مكان الى مكان || اشهر اسماء هذه الفئة تدعى أنباس .

٣٩٩٥ - بِلَغُون ٥ Pelogonus (S).

Pélogone (F). Pelogonus (E).

جنس حشرات خاضعة من نصفيات الاجنحة المختلفة
وفصيلة البلغونيات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم
اقطار العالم || اجسامها مفلطحة ، اهليلجية ، تطول
من ١٨ الى ٢٠ سم . رؤوسها صغيرة مستعرضة مدببة المقدم .
عيونها مكورة ناشزة . اثوابها الى السمرة السوداء الموج
تعلوها زخرفة حنطية وشقراء . بطونها مبطنطة . قوائمها صغيرة
ونشيطة || تألف ضفاف مجاري الماء حيث الاعشاب الندية .


٣٩٩٦ - بِلَغُونِيَّات ٥ Pelogonidae (S).

Pélogonidés (F). Pelogonidae (E).

فصيلة حشرات من نصفيات الاجنحة المختلفة . اجناسها
وانواعها قليلة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها



بلطيمور مبدول



بلعوط



بلفيل



بلقاء

٤٠١٠ - بَلَقُط Moineau soulcie (F).
البلقط والبلقوط هو دوري الغاب ، اطلبه .

٤٠١١ - بَلَقَعِي ، مَهْمَهِي Subdésertique (F).
Subdesert (E).
نعت تعريفي يطلق على المناطق شبه الصحراوية .

٤٠١٢ - بَلَقُوس Placusa
حشرة من فصيلة الدنيات ورتبة غدييات الاجنحة . وهي صغيرة القد طولها نحو ٢ سم . ثوبها حنطي اللون تعيش تحت لحاء الاشجار الضعيفة والمريضة .

٤٠١٣ - بَلَكْنُوم ، بَلَقْلَة الطححال Blechnum spicant (S). Blechne spicant, Blechnum en épis (F). Rough spleenwort, Snakefern, Hardfern (E). Gemeiner rippenfarn (D). Polipodio amaro (I).
نوع من السراخس البساجية وهو نبات طبي اوراقه مستطيلة رحيمة الشكل مركبة من وريقات صغيرة لسنة وحيدة العصب . كان ولا يزال يستعمل في معالجة الطحال.

٤٠١٤ - بَلَكُل Drosométrie (F).
Drosometry (E).
البلل قياس رواسب الماء الناجمة عن سقوط السدى والندى .

٤٠١٥ - بَلَم ، أَنَشُوا Engraulis (S).
Anchois (F). Anchovy (E).
جنس اسماك صغيرة من فصيلة الصابوغيات . انواعه المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في جميع البحار . وهي اسماك صغيرة القد مستطيلة الشكل طولها يراوح من ٨ الى ١٢ سم . تعيش جماعات وافواجا . تقترب من الشواطئ تصاد في نيسان وايار وحزيران جميعها من الاسماك المأكولة .

٤٠١٦ - بَلَمَاء Nuit de la pleine lune (F).
البلاء هي ليلة البدر .

٤٠١٧ - بَلَمَة Rut
البلمة : ورم الحياء من شدة الضبعة . يقال بها بلمة شديدة . وبلمت وأبلمت الفرس والناقة والبقرة : ورم حيائها من شدة الضبعة واشتت الفحل (القاموس) .

٤٠١٨ - بَلَمَة الْمُتَوَسِّط ، أَنَشُوا الْمُتَوَسِّط Engraulis encrasicolus (S). Anchois de la Méditerranée (F). Mediterranean Anchovy (E).

نوع من البلم . سمكة بحرية بيوض . اعطانها البحر الابيض المتوسط . تعتبر من الاسماك اليمية . مسرحها الاغواط والثغاف || جسمها وشقي الشكل يطول من ١٠ الى ١٥ سم . ثوبها الى الرعدة الفضية الموج يعبق عند الظهر وبييض عند البطن . رأسها مخروطي الشكل ، ذلق الخطم . شدقها واسع الانفراج . فكها العلوي يتقدم السفلي . اسنانها صغيرة ، ذرية ، متتابعة الصفوف . عيناها كبيرتان ، جاحظتان . زعانفها شفافة واللذلية فارقة || تصاد في الليل على ضوء الفانوس . لحمها متوسط الصنف .

٤٠١٩ - بَلَمُنُوس Palamnaeus (S).
Palamnaeus (F). Palamnaeus (E).
جنس عقارب خبيثة من فصيلة الشبدييات ، انواعه المعروفة ثلاثة موطنها معظم المناطق الاستوائية من القارة الاسيوية ||

٤٠٠٣ - بَلَقَاءُ خَلَنْجِيَّة Melaleuca ericifolia (S).
Mélaleuque à feuilles de bruyère (F).
جنبه تعلو من ٢ الى ٣ امتار . اوراقها متعاقبة خلنجية الشكل مستطيلة ، نصلها عابق اللون يعلو خطان من الغدييات المستديرة . ازهارها ليلكية . ازهارها يدوم من حزيران الى آب .

٤٠٠٤ - بَلَقَاءُ سَاطِعَة Melaleuca fulgens (S).
Mélaleuque éclatant (F).
جنبه تعلو من ٢ الى ٣ امتار . اوراقها متعاقبة ضيقة النصل مدببة ، لونها الى الخضار البحري . ازهارها قرمزية . ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

٤٠٠٥ - بَلَقَاءُ صَعْتِيَّة Melaleuca thymifolia (S).
Mélaleuque à feuilles de thym (F).
بجلة تعلو من المتر الى المترين . اوراقها متعاقبة مستطيلة ، نصلها باهت الخضار عادم المروق ، ازهارها عابقة الاحرار . ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

٤٠٠٦ - بَلَقَاءُ كَاجِيْبُوت ، كَاجِيْبُوت Melaleuca cajaputi (S). Mélaleuque naine, Cajepu-
tier (F). Cajeput oil tree, Punk tree (E). Kajepu-
baum (D). Cajaputi (I).

بجلة فرعاء تعلو من المتر الى المترين . اوراقها متعاقبة ، اهليلجية ، سنانية الزام الاخير ، مدببة المقصبة . نصلها باهت الخضار تعلو غدييات مستديرة نظامية الارتكاز . ازهارها وردية اللون . ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول || تكثر زراعتها في بعض مناطق الشرق الاقصى . يستخرج من اوراقها افخر ادهان الكاجيبوت التي تستعمل في الطب وفي علاج داء المفاصل .

٤٠٠٧ - بَلَقَاوِيَّات Méléaleucées (F).
سيط من فصيلة الآسيات . نباتاته مختلفة الاحجام منها البجلة والشجيرة والشجرة ومنها البرية والزراعية والزينية . انواعه لا تقل عن المئة معظمها امريكي المنبت وبعضها اسوي . اشهرها البلقاء .

٤٠٠٨ - بَلَقُوس Pelecus (S). Pelecus (F).
جنس اسماك نهريّة من مفتوحات المثانة وفصيلة الشبوطيات . انواعه المعروفة قليلة . جميعها من اسماك اروبة الشرقية والوسطى . يكثر وجودها قرب مصبات الانهر || اجسامها مستطيلة الشكل ، انفية الخط الاعلى الممتد من الخطم الى الظهر فالذيل . محدبة الخط الاسفل اي خط البطن . اطولها قراوح من ٢٥ الى ٤٥ سم . ظهورها معتدلة التبليط . بطونها حادة الاطراف الذرية . تتميز بصغر زعانفها الظهرية وباستطالة الصدرية وبكبر الشرجية والذيلية الفارقة || لحمها متوسطة الصنف ، مأكولة .

٤٠٠٩ - بَلَقُشَة Mergus (S).
Mergien, Harle (F). Merganser (E).
جنس طيور مائية من فصيلة البطيات . انواعها ٧ جميعها من القواطع الكبيرة القد . بعضها متوج الرأس . ثوبها ثوب البط الوحشي . طولها يراوح من ٧٠ الى ٨٥ سم . وبسطة جناحها زهاء المتر . يكثر وجودها في البلاد الباردة . تمضي فصل الشتاء في مياه البلاد الحارة والمعتدلة .



بَلَقُوس



بَلَقْشَة



بَلَقُوس



بَلَكْنُوم



بَلَم



بَلَمَة الْمُتَوَسِّط

٤٠٢٥ - بَلْمَنِيَاتُ الشَّيْفِ (F). Armoise commune (F).
Mugwort (E).
هو الشيلاء من النباتات الطبية . اطلبها .

٤٠٢٦ - بَلْمَنِيَاتُ وَمُسْ (S). Plenodomus (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصفييات . يتميز ببيكنيدات
السطحية الارتكاز ، اللاقياسية الشكل ، العابقة اللون ،
السميكة الجول والضيقة الملق الذي ينمق طولاً عند الاثمار .
بريداته بسيطة ، مستطيلة ، شفافة || انواعه قليلة محدودة
الاضرار . اشهرها ما يتبع .

٤٠٢٧ - بَلْمَنِيَاتُ وَمُسْ البطاطا الخلوله (S).
Plenodomus destruens (S). Foot rot (E).

فطر مجهرية يصيب النباتات الفتية في عروقها على بعد ١٥
او ٢٠ سم من التربة ، فيذوبها بعد ان يجعد ويحجم
قشورها . وهو على الدرنات عفن اسود يركب العيون
دون سواها || اضراره زهيدة لا تستوجب المكافحة . وان
كان لا بد منها فيظهر البذار بالزئبق المصعد الخلول
١ . / مدة خمس دقائق .

٤٠٢٨ - بَلْمَنِيَاتُ (F). Goudron (F). Tar (E).
هو القطران ، اطلبه .

٤٠٢٩ - بَلْمَنِيَاتُ (S). Sphaeriidae (S).
Sphériidés (F). Sphaeriidae (E).
فصيلة حشرات من غديات الاجنحة . اجناسها وانواعها
المعروفة متوسطة العدد ، منتشرة في معظم مناطق البلاد
المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، محدودة ، شبيهة
بالقراد ، تطول من ٣ الى ٨ مم . رؤوسها صغيرة ، قليلة
النشور . عيونها بارزة . قرونها الاستشعارية دبوسية
الاطراف ، مركبة من ١١ فصلة . كواسلها مستعرضة .
اغمارها قصيرة لا تلحف كامل البطن || تعيش تحت
الحجارة والطحالب في المواقع الرطبة || اشهر اجناسها
البنتة .

٤٠٣٠ - بَلْمَنِيَاتُ (F). بقلة (السان) .

٤٠٣١ - بَلْمَنِيَاتُ (F). Sittelle bleue (F).
طائر من الجوائم وفصيلة التيسيات مشهور باسم كاسر
الجوز الازرق ، اطلبه .

٤٠٣٢ - بَلْمَنِيَاتُ (S). Balanops (S). Balanope (F).
جنس اشجار حرجية من فصيلة البلنوبيات . انواعه المعروفة
متوسطة العدد ، جميعها شجيرات منتصبه فرعاء . ثمارها
عنية مأكولة . اخشابها متينة صناعية .

٤٠٣٣ - بَلْمَنِيَاتُ (S). Balanopsidaceae (S).
Balanopsidacées (F). Balanopsidaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها وانواعها المعروفة
متوسطة العدد ، منبها الطوعي بعض جزر المحيط الهادي ،
اخصها جزيرة كليدونية الجديدة || جميع نباتاتها اشجار
وشجيرات وجنبات . سوقها منتصبه فرعاء . اوراقها متعاقبة ،
لاطئة ، شبه ضمية التجميع ، سنانية التصلال الجامدة
الريشية العروق . ازهارها ثنائية المسكن . الذكورية منها
سداسية الاسدية او تساعيتها ، اما الانثوية فلحوفة
بقنابات مرصوصة متراكبة ، خذروفية الشكل || اشهر
اجناسها البلنوب .

اجسامها كبيرة القد تطول من ١٠ الى ١٢ سم . اثوابها
تختلف مع النوع ، منها الاسود والاخضر والخططي الاسمر .
ملاقطها كبيرة مزدوجة التسنين الداخلي . جميعها دجوية
تسرح في الليل . ابرتها حادة الحمة . لدغتها شديدة الاذى
وقد تكون مميتة .

٤٠٢٠ - بَلْمَنِيَاتُ (F). Bélemnite (F).
هي السهمية ، جنس حيوانات بحرية من الرخويات ،
اطلبها .

٤٠٢١ - بَلْمَنُونُ (S). Palaemon (S).
Palémon (F). Palaemon (E).

جنس دوبيات مائية من القشريات عشاريات الارجل
وفصيلة القريدسيات . انواعه المعروفة كثيرة العدد منتشرة
في جميع بحار العالم وفي معظم بحيراته وانهاره || جميعها
كبيرة القد ، قسطانية الالوان الجميلة || لحمها جيدة
الصف من مرغوب فيها .

٤٠٢٢ - بَلْمَنِيَاتُ (S). Engraulidae (S).
Engraulidés (F). Engraulidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من العظميات مفتوحات المثانة .
اجناسها وانواعها المعروفة لا تتجاوز الستين || اعطائها
معظم بحار العالم . سرحها الاغواط والنقاف والمجادح .
اسرارها متباينة العدد الذي يراوح من الفين الى خمسين ألفاً
واكثر || اجسامها مستطيلة ، عادمة الضخامة ، تطول
من ٨ الى ١٥ سم . اثوابها الى الريدة الفضية المتفاوتة
المواج || تتميز بزوايا اشداقها المتأخرة الى ما وراء العين ،
بفكوكها السفلى المتأخرة عن العليا ، وبعدم تسنين
اكظارها البطنية || اشهر اجناسها البلم .

٤٠٢٣ - بَلْمَنِيَاتُ * (S). Pelamys (S).
Pélamide, Palamida (F).

جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة
الاسقمريات . انواعها عديدة . اعطائها نسيحة الارحاء
تمتد من المحيط الهندي الى الاطلسي عبر البحر الاحمر
والمتوسط . جميعها كبيرة القد قريبة الشبه من التون
رؤوسها مستطيلة . اسنانها حادة . اثوابها الى الزرقة اللامعة
المجزعة بالخططي والاسمر والخرنوبي .

٤٠٢٤ - بَلْمَنِيَاتُ شَائِعَةٌ * ، بَلْمَنِيَاتُ شَائِعَةٌ ،

سَرْدَّة (S). Scomber sarda, Sarda sarda (S).
Pélamide, Pélamya, Scombre sarda (F).
Scale breast (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة الاسقمريات شائكات
الزعانف . اعطائها البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق
المحيط الاطلسي . تعتبر من الاسماك اليمية . اسرارها وافرة
العدد || جسمها وشبي الشكل يطول من ٤٠ الى ٦٠ سم .
ثوبها الى الزرقة الفضية يعبق في الظهر ويغير في البطن
ويملوه من الخط الجانبي الى ثبج الظهر تجذيع عمودي
خطي اللون يعترضه تشيز افقي خرنوبي اللون . زعانفها
الى الشبهة الصفراء المواج باستثناء الظهرية الاولى . فانها
شديدة السرة . رأسها مستطيل الخطم الخروطي . شدقها
واسع الانفراج . فكها متعادلان . اسنانها كبيرة ، حادة .
عينها كبيرتان ، ناتزتان . زعنفتها الذيلية ملالية الشكل ||
لحمها ابيض ودك مستحب الطعم ، مرغوب فيه .



بَلْمَنُونُ



بَلْمَنِيَاتُ



بَلْمَنِيَاتُ شَائِعَةٌ



بَلُونُوسْ أَرْمَد



بَلُونُوسْ



بَلُونُوسْ الْبَلُوط



بَلُونُوسْ الْبَنْدَق



بَلُونُوسْ الْكَسْتَنَاء



بَلُونُوسْ

٤٠٣٤ - بَلُونُوسْ أَرْمَد *، حَبَّة غَمَمِيَاء

Blanus cinereus (S). Blane cendré,
Blanus cendré (F). Cinereous Blanus (E).

حيوان زحّاف ، بيوض ، من العظام ينتمي إلى فصيلة القهقريانيات قابعات الاسنان ، مالمسات اللسان ، عادات القوائم . مهدد حوض البحر الأبيض المتوسط من سواحل الشرق الأدنى إلى إسبانيا والمغرب والجزائر . جسمه اسطواني الشكل مزور بجلقات حرشفية التركيب يمكنه من الاندفاع والانكماش . طوله نحو ٢١ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ ٦ سم . رأسه مخروطي الشكل . خطمه ينتهي بمادة قرنية صلبة . عيناه مغلفتان بغشاء طامس ، الداعي لنعته بالحية العمياء . أذناه مغلفتان بالغشاء الصيواني . ثوبه إلى الجوزة السمر . الأنثى افتح ثوباً من الذكر واغظظ جرماً منه . يَأْلَف الرمال والأراضي الزراعية والمروج . يخلد ملجأه ويقم سكناه تحت الحجارة . يسرح في الليل . دفعه مستقيم الخط . قوته الديدان والأساريع والعقارب والعناكب . يقال أنه يعيش نحو ٢٤ سنة . يبلغ كامل نموه بعمر ثلاث سنوات ويسافد بعمر أربع سنوات .

٤٠٣٥ - بَلُونُوسْ *، أَبُوشِعَاع Polynaemus (S). Polynème (F). Polynaemus (E).

جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة البليونيوات . أنواعه المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار المناطق الاستوائية . أجسامها صغيرة شبه أهليلجية الشكل . أثوابها بحيلة الألوان الزاهية . عذباتها جامدة مستطيلة تكتنف قاعدة الفك الأسفل . زعانفها الذيلية فارقة هلالية التقويس . لحوها كاعنة الصنف قل من يرغب فيها .

٤٠٣٦ - بَلُونُوسِيَّات Polynaemidae (S). Polynémidés (F).

فصيلة اسماك بحرية من شائكات الزعانف . أجناسها وأنواعها المعروفة قليلة العدد أعطانها بحار المناطق الاستوائية . أجسامها أهليلجية الشكل صغيرة القد . تتميز بعذباتها الجامدة الحارقة الطول وبزعانفها الذيلية الفارقة المقوسة . أشهر أجناسها البليونية .

٤٠٣٧ - بَلُونُوس Balaninus (S). Balanin (F). Balanus, Nut-weevil (E).

جنس خنافس صغيرة القد من فصيلة السوسيات . أنواعه عديدة تتميز بأخطائها الدقيقة المستطيلة . أشهر أنواعه المؤذية الثلاثة التالية :

٤٠٣٨ - بَلُونُوس الْبَلُوط * Balaninus glandium (S). Balanin des glands (F). Acorn Weevil (E). Eichelbohrer, Eichelrüssler (D).

نوع من البليون طوله يراوح من ٣ إلى ٤ سم . لونه حنطي أغبر يعلوه توشيع أبيض وأصفر . يعيش على السنديان . أنثاه تمتح مكنها ، عند العقد ، على حافة القمع الداخلية فينقف عن يرقات تنخر البلوط .

٤٠٣٩ - بَلُونُوس الْبَنْدَق * Balaninus nucum, Curculio nucum (S). Balanin des noissettes, Charançon des noissettes (F). Hazel-nut weevil (E). Haselnussbohrer, Nussrüssler (D). خنفساء من البليون طوله يراوح من ٨ إلى ١٠ سم . ثوبها أغبر اللون اطحل الموج تعيش على أوراق وعقد البندق .

أنثاه تمتح مكنها على الثمار فينقف عن يرقات تعيش داخل الشرة فتلتهمها .

٤٠٤٠ - بَلُونُوس الْكَسْتَنَاء Balaninus elephas (S). Curculio elephas (S). Balanin des châtaignes, Charançon des châtaignes (F). Chestnut weevil (E). Kastanienbohrer (D).

خنفساء من البليون طولها يراوح من ٨ إلى ١٠ سم . ثوبها أصفر اللون تعلوه زغبة طحلاء . خطمها شاذ بطوله ودقته وتقويسه . تركيب الكستناء والبلوط وتمتج مكنها داخل الثمار فينقف عن يرقات قصيرة القد غليظة تلتهم لباب الثمر .

٤٠٤١ - بَلُونُوس Puits tari (F). البئر الذاهبة الماء .

٤٠٤٢ - بَلُونُوس الصخر Cristal de roche (F). Rock-crystal (E). ضرب من الصوان أو المرو المتحجر .

٤٠٤٣ - بَلُونُوس الْفُسْتَق Rouille du pistachier وسم فطري يعتري الفستق (اطلب ايروميس الفستق) .

٤٠٤٤ - بَلُونُوس Chêne (F). Oak (E). راجع سنديان .

٤٠٤٥ - بَلُونُوس اخضر Chêne vert, Ballote, Yeuse (F). Ilex (E). راجع سنديان اخضر .

٤٠٤٦ - بَلُونُوس الارض Ballote fétide (F). Foetid-horehound (E). هو الفراسيون الاسود . اطلبه .

٤٠٤٧ - بَلُونُوس الملك الجوز وقيل هو الشاهبلوط (ابن سيده) .

٤٠٤٨ - بَلُونُوس Gland (F). Acorn (E). هي ثمرة السنديان .

٤٠٤٩ - بَلُونُوسِيَّات، سِنْدِيَّانِيَّات Cupuliferaceae (S). Cupuliféracées (F). Cupuliferaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديمات القملات . أجناسها وأنواعها كثيرة العدد أشهرها السنديان والبندق .

٤٠٥٠ - بَلُونُوسِيَّات Cupuliforme (F). Cupuliferous (E). نعت تعريفي يطلق على ما كان شكله كالبلوط .

٤٠٥١ - بَلُونُوسِيَّات *، يَاسْمِين هِنْدِي Plumeria (S). Plumerie, Frangipanier (F). Frangipani, Pagoda tree, Temple tree (E). Jasminunge (D). Plumeria, Frangipana (I).

جنس اشجار وجنبات برية وزينية من فصيلة الدفليات . مهددا البلاد الحارة . أنواعها المعروفة ٤ أشهرها البليوماريه العطرة . شجيرة حسنة الهيكل ، ساقها مخشوشب عديم الصلابة ، أوراقها متقاربة ، متعاقبة ، منقطة ، ملعقة الشكل ، جميلة الخضار . أزهارها عشكولية التجميع ، هامة الارتكاز ، خشوية ، خماسية البتلات ، جميلة الهيئة ، فواحة العرف المستحلب ، بيضاء اللون . يستخرج من سوقها عصارة سامة تستعمل لاستئصال الثآليل .

٤٠٥٩ - بلنيط Crenidens argenté (F).
راجع بليط فصي .

٤٠٦٠ - بليعة* ، غليستين ، وستارية

Glycina, Wistaria (S). Glycine, Wistaria (F). Glycine, Kidney-bean tree (E). Süssbohne, Wistaria (D). Glicinia (I).

جنس نباتات مدادة عارشة تزرع للتزيين من فصيلة القرنيات الفراشية || انواعها عديدة ، اوراقها مركبة ، وريقاتها وريية العدد ، ازهارها عنقودية التجميع مختلفة الالوان || اشهر انواعها ما يتبع .

٤٠٦١ - بليعة خلية Wistaria venusta (S).
Glycine veloutée (F).

ساقها مدادة عارشة تطول نحو ١٠ امتار . وريقاتها زباء النصل على صفحتيه || ازهارها بيض . ازهارها عنقايد ملتكة طولها نحو ١٥ سم . تنويرها يستمر من نيسان الى حزيران .

٤٠٦٢ - بليعة صينية Wistaria sinensis (S).
Glycine de Chine (F).

ساقها مدادة عارشة تطول من ١٥ الى ٢٠ م . وريقاتها ملساء النصل الباهت الخضار || ازهارها عطرية الرائحة ، بنفسجية او بنفسجية موشحة بالابيض || ازهارها عنقايد رهلة يراوح طولها من ٢٠ الى ٣٠ سم . تنويرها يستمر من نيسان الى حزيران || ثمارها قرون مستطيلة زباء البشرة . بزورها بيضية الشكل مقلطحة .

٤٠٦٣ - بليعة كثيرة الزهر

Wistaria floribonda (S). Glycine floribonda (F).
ساقها مدادة عارشة تطول نحو ١٥ م . وريقاتها ملساء النصل كثيرة العدد من ١٥ الى ١٩ || ازهارها مختلفة الالوان فيها الابيض والموشح والوردي والبنفسجي . ازهارها عنقايد متوسطة الكثافة ، كثيرة العدد ، طولها نحو ٢٠ سم . تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

٤٠٦٤ - بليعة يابانية Wistaria japonica (S).
Glycine du Japon (F).

ساقها مدادة عارشة تطول نحو ٣ امتار . وريقاتها ملساء النصل مستدقة العقصة || ازهارها صغيرة القد ، بيضاء اللون . ازهارها عنقايد رهلة يراوح طولها من ١٥ الى ٣٠ سم . تنويرها يستمر من اوائل تموز الى اواخر آب .

٤٠٦٥ - بليج Myrobalan belleric (F).
Belleric myrobalan (E).

راجع اهليج بليج .

٤٠٦٦ - بليو اثنولوجية Paléothnologie (F).
Paleoethnology (E).

علم يبحث في خصائص الشعوب من الاثار والتعجرات العائدة الى زمن ما قبل التاريخ .

٤٠٦٧ - بليو بيوولوجية Paléobiologie (F).
Paleobiology (E).

البليو بيوولوجية علم يبحث في منافع الحياة ابتداء من البقايا العضوية او الاحافير المحفوظة في بعض الطبقات الحصلية (الجيولوجية) .

٤٠٦٨ - بليو جغرافية Paléogéographie (F).
Palaeogeography (E).

البليو جغرافية ، اي جغرافية الاحقاب الجيولوجية ، تدرس

٤٠٥٢ - بلون Bellone (F).
البلون كوكب سبتار من الخنفس مركزه بين المريخ والمشتري .

٤٠٥٣ - بليحة* Onchidium (S).
Onchide, Onchidie (F). Onchidium (E).

جنس حيوانات مائية من الرخويات ، معديات الارجل ، رئوية ، وفصيلة البزافيات . انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها هندية الهند تعيش في المياه العذبة || جسمها مرباطة عادمة الصدف ، بيضية الشوزن ، محدبة الصفيحة العليا ، مسطحة السفلى المطوقة بحتار الرداء المجذع . رؤوسها مبطلة ثنائية اللوامس المتدعة . التجويف الرئوي خلفي الارتكاز يغلفه الرداء .

٤٠٥٤ - بليس* زهر اللؤلؤ ، شاش القاضي

Bellis (S). Pâquerette (F). Daisy (E).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المركبات . انواعها عديدة معظمها بري وبعضها تزييني . اوراقها ضمية قرصية سمكة النصل . ازهارها رئوسية فردية تاجية يحملها زناد دقيق شمراخي الشكل || اشهر انواعها التزيينية ما يلي .

٤٠٥٥ - بليس مستدير الورق Bellis rotundifolia (S).
Pâquerette à feuilles rondes (F).

نوع من البليس يملو من ٢٠ الى ٣٥ سم . اوراقه معنقة ثلاثية او خماسية الاصلع . نصلها خلي البشرة مهدب . ازهاره محمولة على شمرايح مستطيلة ، طباهها اصفر اللون لسيناتها بيض ومنها ليلكية || ازهاره يستمر من اذار الى ايار .

٤٠٥٦ - بليس معمّر Bellis perennis (S).

Pâquerette vivace, Petite Marguerite, Fleur de Pâques, F. de pâturage, Mère Gigogne (F).
Brise-wort, Daisy (E). Gänseblume, Margarethenkraut, Wildes massliebchen (D). Bellide, Margaritha, Pratellina (I).

نوع من البليس يملو من ٤ الى ١٥ سم . اوراقه معنقة وحيدة الضلع ، زباء النصل ، عنقها مجنح القاعدة . ازهاره محمولة على شمرايح دقيقة طباهها اصفر اللون ، لسيناتها بيض او وردية || ضروره عديدة تختلف بالوان ازهارها . ازهاره يستمر من اذار الى تشرين الثاني .

٤٠٥٧ - بليسان Dichroa febrifuga (S).

Dichroa fébrifuge (F). Dichroa febrifuga (E).
شجرة طبية برية وزراعية من فصيلة السفسريات . منبتها يمتد من الهند الى ايران . ساقها فرعاء . هيكلها هيكل الارطنسيا . تملو نحو ٢٠٠ سم . اوراقها ابيدة ، معنقة ، متقابلة ، اهليلجية ، ذلقة الاطراف ، منشارية الحفاف . ازهارها عشكولي التجميع . ازهارها تبدو بنفسجية ثم تتحول الى الزرقة . ثمارها عنبية زرقاء اللون تستعمل كدافعة للحمى في الهند والافغان وايران .

٤٠٥٨ - بليساندر Palissandre, Palixandre (F).

Purple wood, Rose wood (E).
خشب فاخر الصنف يقطع من بعض انواع الساسم . تصدوره البرازيل والهند الشرقية وبعض مناطق افريقية الغربية || وهو من الاخشاب الشديدة الصلابة المتأسكة الرقعة الناعمة . لونه الى البنفسجي العابق الاسمر . رائحته عطرية مستحبة .



بليحة



بليس



بليج

الزعانف ، اجناسها وانواعها عديدة . اعطائها بحار البلاد الحارة والاستوائية . جميعها زاهية الالوان الجميلة . اسنانها مندمجة كأنها منقار الببغاء .

٤٠٨١ - بَنَات نَعَش الصغرى

la Petite Ourse (F).

كوكبة من النجوم مشهورة باسم الدب الاصغر . اطلبه .

٤٠٨٢ - بَنَات نَعَش الكبرى

la Grande Ourse (F).

كوكبة من النجوم مشهورة باسم الدب الاكبر . اطلبه .

٤٠٨٣ - بَنَات وَرْدَان

Blattidae (S).

Blattides, Blattiens (F). Blattidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة السرناقيات اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في جميع البلاد المعصورة . اكثرها من الحشرات القارضة المؤذية . قوتها المواد العضوية والنباتية . معظمها يعيش على الارض يألف الاماكن الرطبة المظلمة وبعضها يعيش على سطح الماء .

٤٠٨٤ - بَنَات يَوْم

Ephemeridae (S).

Ephéméridés (F). Ephemeridae (E).

هي الزعرقيات ، فصيلة حشرات من الهوام .

٤٠٨٥ - بَنَاتَة

Square, Jardin d'agrément (F).

Square, Enclosed garden (E).

هي الروضة العشب النضرة . وقد استعملها الامير مصطفى الشهابي للدلالة على هذا النوع الخاص من حدائق التزيين الذي يختلف بترقيته عن الحديقة العادية والروضة وغيرها .

٤٠٨٦ - بَنَاتَة

Ligne directe descendante (F).

جبل النسب الخابط . Descending direct line (E).

٤٠٨٧ - بُنْبُك

Requin-marsouin (F).

Lamna, Mackerel shark (E). اطلب ليا .

٤٠٨٨ - بُنْبُكْ أَزْرَق *

Carcharhinus glaucus (S).

Requin bleu (F). Blue Shark (E).

سمكة بحرية سرلودة مفترسة من فصيلة البنبكيات . اعطائها جميع بحار العالم باستثناء القطبية || تعتبر من أسرع اسماك الفصيلة وأشرسها خلقاً وأبطشها || مسرحها العادي يمي في الاغواط وتمخر سطح الماء وتواكب السفن في اسفارها وتقرب من المراقب || جسمها وشعي الشكل ، يطول نحو سبعة امتار . ثوبها الى الزرقة البحرية . ظهرها سبوري الموج . بطنها اغير ابيض . رأسها مخروطي الشكل . خطمها شارف . فها لاطىء مستعرض الشدق . اسنانها متراصة ، مزوانية الاطراف الحادة كالخناجر . زعنفتها الظهرية الامامية كبيرة القد ، مقعرة ، مفلوكة || الاثني معتدلة النشار تضع في كل مرة ، بين اواسط ايار واواخر حزيران نحو ٣٠ مجراً || لحمها معتدل الصلابة ، كاعن الصنف لا يؤكل . تصاد لمسكها وزيتها .

٤٠٨٩ - بُنْبُكِيَّات

Carcharhinidae (S).

Carcharhinidés (F). Carcharhinidae (E).

فصيلة اسماك سرلودة مفترسة من رتبة الاشلاق السنفيات . اعطائها معظم بحار العالم واخصها بحار البلاد الحارة . اجناسها وانواعها المعروفة نحو عشرين || اجسامها مستطيلة .

امتداد البحار والرواسب التي تركتها عبر الازمنة الحالية المتعاقبة من تاريخ الحصلية الارضية .

٤٠٦٩ - بَلْيُوسَانِي

Paleocène (F).

Palaeocen (E).

اسم يطلق على اقدم عصر ، اي الاول ، من عصور الحقبة الثالثة || يتميز برواسبه المتفاوتة الكثافة التي تركتها مياه البحار عند تقلصها وانسحابها .

٤٠٧٠ - بُمْبِيَكْس

Bombyx

راجع قزفة .

٤٠٧١ - بُنْ *

Coffea (S). Caféier, Cafier (F).

Coffee tree (E). Kaffeebaum (D). Caffé, Albero del caffè (I).

جنس شجيرات برية وزراعية من فصيلة الفويات . مهدا بلاد الحبشة ومنها انتقلت بواسطة العرب الى اليمن والهند وأمريكا || اقليمها الزراعي جميع المناطق الحارة والاستوائية التي لا تهبط حرارتها الدنيا دون العشر درجات || أوراقها دائمة الخضار الزاهي ، متقابلة ، معتقة ، بيضيه ، رحيمة الزام الاخير ، متمعة النصل . ازهارها ابطية الارتكاز ، بيضاء اللون ، عطرية مستحبة العرف . ثمارها شبه نووية . عجائتها ثنائية الحبة . حبوبها منبسطة اخدودية من الداخل ، محدودة من الخارج لوئها الى الخضار البحري . وحة البن تفقد قوة الانبات بسرعة لذلك يجب بذرها قبل مرور ثلاثة اسابيع على جنبها . منهم من سماه «قهوة» في حين ان القهوة هي نقيع البن المحمص المسحوق المغلي في الماء || أشهر ضروبه الزراعية البن اليمني وبن موكا والبن الحبشي الحرري وبن البرازيل والكونغو وغينية وليبرية .



بن

٤٠٧٢ - بَنَات الرعد

Truffe d'hiver (F).

Winter truffle (E).

اطلب كم شتوي .

٤٠٧٣ - بَنَات أَخْدَر

Onagres (F). Onagers (E).

هي حمر الوحش .

٤٠٧٤ - بَنَات الشيخ

Herniaire glabre (F).

Turk's herb (E).

اطلب نومان أمد .

٤٠٧٥ - بَنَات العيد

Coccinellidés (F).

Coccinella (E).

راجع دعسوقيات .

٤٠٧٦ - بَنَات الماء

Sireniens (F). Sirenia (E).

راجع خيلانيات .

٤٠٧٧ - بَنَات اوبر

Truffe grise (F).

Grey truffle (E).

اطلب كم أمد .

٤٠٧٨ - بَنَات عِرْس

Mustélinés (F).

Mustelinae (E).

ردف او عشيرة من فصيلة السموريات تشمل ابن عرس والسمور والدلق والفاقوم .

٤٠٧٩ - بَنَات عَرُوهَن

Champignons (F).

Mushroom, Fungus (E).

هي الفطور .

٤٠٨٠ - بَنَات مِصْقَار

Scaridés (F). Scaridae (E).

فصيلة ابي مصقار من الاسماك العظمية الشائكات



بنك أزرق



بنت العيد



بنت طبق




بنت وردان



بنتكرين



بنتول أشهب



بنتويه

schabe, Hausschabe (D).

حشرة صغيرة الجثة طولها نحو ١٥ م. ثوبها الى البني الفاتح الزاهي || اجنحتها كبيرة مستطيلة تمتد على محيط جسمها .

٤٠٩٩ - بنتشكرين * Pentacrinus (S).

Pentacrine (F). Pentacrinus (E).

جنس حيوانات بحرية من زنايق البحر الشوكيات . انواعه المعروفة قليلة العدد . جميعها لدية تعيش في الاعماق التي تراوح غورها من ٢٥٠ الى ٢٠٠٠ م. || جميع اعضائها خماسية التركيب المضاعف . مجموعاتها في القاع تبدو كروج خضراء مترامية الاطراف .

٤١٠٠ - بنتشلسة ° Panchalassa (F).

Panchalassa (E).

اسم يطلقه علماء الجيولوجية والجغرافية على اليم اي على مجموعة البحار التي تغمر الكرة الارضية .

٤١٠١ - بنتشو Bonto

حيوان نهري لبون يدعى ايضاً بوتو الامازون ، اطلبه .

٤١٠٢ - بنتشول ° Pennatula (S).

Pennatule (F). Pennatula (E).

جنس حويئات بحرية من المزهاريات وفصيلة البنتولييات . انواعه المعروفة عديدة اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . جميعها شبه اسطوانية الشكل متباينة الالوان . اشهر انواعه البنتول الاشهب .

٤١٠٣ - بنتشول أشهب ° Pennatula grisea (S).

Pennatula grise (F).

نوع من البنتول . يكثر وجوده في البحر الابيض المتوسط . مدبخته شبه اسطوانية الشكل منتصبة عمودياً تكسوها الازهار ابتداء من الثلث الاول . لونها الى الشبهة وتصبح فسفورية مضيئة في زمن التناسل وذلك يعود الى مجموعات الحبيرات المستدة من القوة والتي تحوي بعض المواد الدهنية المضيئة .

٤١٠٤ - بنتشولييات ° Pennatulidae (S).

Pennatulidés (F). Pennatulidae (E).

فصيلة حويئات بحرية من المزهاريات الحلسونيات . اجناسها وانواعها عديدة اشهرها البنتول .

٤١٠٥ - بنتشومه * ، عتم أروبي ، زرق الطير ،

دبق مقدس ، دبق البتلوط ، دبق

السنديان ، لورنتس

Loranthus europaeus (S). Loranthe d'Europe, Gui de chêne (F). Continental mistle toc, European mistle toc (E). Eichenriemenblume, Mistel (D). Visclo, Pania europea, Viscara (I).

نبات من الحضاليات الطفيلية التابعة الى فصيلة الغنميات . يركب الاجاص والتفاح والكستناء والسنديان ، يعيش على فروعها واغصانها فيؤذيها وقد يميتها .

٤١٠٦ - بنتج Atavisme (F). Atavism (E).

البنج هو الرجوع الى الاصل . من بنج رجع الى اصله . والبنج هو الاصل والبنك ايضاً .

٤١٠٧ - بنتج Hyoscyamus (S).

Jusquame (F). Hyoscyamus (E).

جنس نباتات عشبية برية جحالية من فصيلة الباذنجانيات .

وشعية الشكل ، ثنائية الزعانف الظهرية والبطنية ، كبيرة الزعانف الشرجية . اعطامها ذلقة شارفة . اسنانها كالتناجر تمزق وتبقر كل شيء || تتميز بنياستها المجهزة باغشية سادنة وتتميز بسرعة الانتقال وبقساوة الاخلاق الشرسة وبالبهم والضراوة المفرطين . تتعدى على الانسان وتراقق المراكب والبواخر || اشهر اجناسها البنك والسينتل والجلاد .

٤٠٩٠ - بنة

البنة هي رائحة العود عند احتراقه ورائحة كل نبات او اوراق تحترق معها كان عرفها || والبنة هي رائحة مرايض الغنم والماعز والظباء والبقر .

٤٠٩١ - بنت العيد * ، دغسولة Coccinelle (F).

Coccinella (E).

جنس حشرات نافعة مفترسة من فصيلة الدغسوقيات انواعها عديدة جميعها صغيرة القد محدبة الشكل طولها يراوح من ٣ الى ٧ م. اثنائها مختلفة الالوان يكثر فيها الاحمر يعلوه تبقيع اسود او تنقيط ابيض .

٤٠٩٢ - بنت القنصل Fille de Consul (F).

Easter flower (E).

اطلب عنجد جميل . نبات من الفريونييات .

٤٠٩٣ - بنت النكا Chalcide (F). Chalcides (E).

هي الدساسة ، اطلبها .

٤٠٩٤ - بنت طبق * Emys palustris (S).

Emyde bourbeuse, Tortue émyde (F). Marsh-tortoise (E).

نوع من الحسة تعرف بحسة المناقع وهي سلحفاة صغيرة القد طولها نحو ٣٠ سم . تعيش في الهور وفي المناقع المستقرة المياه . قوتها الاسماك والضفادع والبرقيات .

٤٠٩٥ - بنت وردان * ، صرصور Blatte, Cafard, Cancrelat (F). Blatta, Cockroach (E).

جنس حشرات من بنات وردان انواعه ٦ اعرفها ٣ تتميز بقرونها الاستشعارية الطويلة وهي مدبولة في معظم مطابخ وافران وبيوت ومراحض البلاد حيث تأكل الخبز والسكر واللحم وجميع ما تقع عليه من مواد عضوية .

٤٠٩٦ - بنت وردان المطايخ ، صرصور شرقي Blatta orientalis (S). Blatte orientale, Blatte des cuisines (F). Common cockroach (E). Orientalische schabe, Küchenschabe (D).

حشرة طولها نحو ٢٥ م. ثوب ذكورها الى البني العايق اما الاناث فسود . اجنحة الذكر كبيرة تغطي كامل الجسم اجنحة الانثى صغيرة قصيرة .

٤٠٩٧ - بنت وردان أمريكية ، صرصور أمريكي Periplaneta americana (S). Blatte américaine (F).

American Cockroach (E). Amerikanische Schabe, Karkerlak (D).

حشرة طولها نحو ٣٥ م. ثوبها الى البني المتاوج اثنائها اعيق لوناً من ذكورها || اجنحة الذكر كبيرة مستطيلة تشرف على الجسم .

٤٠٩٨ - بنت وردان جرمانية ، صرصور جرمانى Blatella germanica (S). Blatte germanique (F).

German cockroach, Croton bug (E). Deutsche

٤١١٤ - **بنجر** Betterave (F). Beet-root (E).
هو الشوندر، اطلبه.

٤١١٥ - **بنج كشت** Agneau-chaste (F).
هو الارثد جنبه طيبة معمرة.

٤١١٦ - **بنجوان** Linder (S).

Benjoin (F). Benzoin (E).
جنس اشجار وشجيرات برية وتريينية من فصيلة الفاريات.
انواعه عديدة. اوراقه عابطة، متعاقبة. ازهاره ثنائية
المسكن، سداسية الفصل المتساوية، قستقية اللون.
اشهر انواعه الثلاثة التالية.

٤١١٧ - **بنجوان مخزني** * Linder Benzoin (S).
Benjoin officinal (F).
نوع من البنجوان شجيرة سبروتية تعلو نحو ٤ امتار
اوراقه اهليلجية الشكل تطول من ٥ الى ١٥ سم. نصلها
مالس البشرة، اخضر الصفحة العليا، بحري السفلى.
ازهاره تسبق الاوراق وهي نورية التجميع، محورية
الارتكاز. نورتها تعد من ٣ الى ٦ ازهار. ثماره لحمية.
بيضية الشكل، حمضية القند، قرمزية اللون.
اخشايبه ولحاء اخشايبه عطرية الرائحة يستخرج منها بعض
الادهان الطيبة ومادة صمغية تدخل في معظم تراكيب
القناديد لتثبيت عطورها.

٤١١٨ - **بنجوان مقصص** Linder obtusiloba (S).
Benjoin à lobes obtus (F).
نوع من البنجوان مهدد الصين واليابان. شجيرة صغيرة
القند تعلو من ٥ الى ٨ امتار. اوراقه لاقياسية الشكل
منها الكاملة ومنها الثلاثية التفصيص المقطوعة. نصلها
مالس البشرة، اخضر الصفحة العليا، بحري السفلى.
ازهاره نورية التجميع. نورته ابطية الارتكاز
تعد من ٨ الى ٨ ازهار || اخشايبه صناعية جيدة
الصنف.

٤١١٩ - **بنجوان ناعم** Linder sericea (S).
Benjoin soyeux (F).
نوع من البنجوان مهدد اليابان. شجيرة تعلو من ٦ الى
١٠ امتار. اوراقه اهليلجية تطول نحو ١٠ سم. نصلها
خمي البشرة على صفحتيه. ازهاره نورية محورية.
نورته تعد من زهرتين الى اربع زهرات || اخشايبه صناعية
جيدة الصنف قليلة الادهان والمواد الصمغية.

٤١٢٠ - **بنجيات** Panagaeidae (S).
Panagaeidae (F). Panagaeidae (E).

فصيلة حشرات من غديات الاجنحة. اجناسها وانواعها
المعروفة عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة ||
اجسامها صغيرة، تطول من ٧ الى ١٥ مم. رؤوسها
صغيرة، طليقة. عيونها بارزة. قرونها الاستشعارية
خيطة مركبة من ١١ فصلة. تأثيرها وفكوكها قياسية.
ملاسمها هليبة الفصل الطرفية. كواسلها مكورة محصورة.
اغدادها ملونة، تساعية الاخاذيد النحيلة القاطبة. قوائمها
نحيلة معتدلة الطول || جميعها مفترسة. يكثر وجودها تحت
الحجارة والجشالة في المواقع الرطبة. تلجأ في الشتاء الى
جلوع الحور والصفصاف حيث تستتر بالحاء || اشهر
اجناسها البنجة.

سوقها منتصبه غليظة زباء. اوراقها رحيمة، مفترسة،
متعاقبة، حاضنة، كبيرة النصل، زغبية البشرة.
ازهارها كبيرة القند، ابطية وتاجية الارتكاز، خشوية،
خماسية البتلات المندمجة. ثمارها حقية، رباعية الغريقات
قنبولية الغطاء. بزورها مفلطحة مخروطية الغشاء.
انواعه المعروفة تقارب المشرية. جميعها من النباتات الجحالية
الطبية التي يستخرج منها بعض المواد النافعة || اشهرها
البنج الابيض والاسود والذهبي والمغربي.

٤١١٨ - **بنج أبيض** * Hyoscyamus albus (S). Jusquiame blanche (F). White
henbane (E). Weisses bilsenkraut (D). Giusquiamo
bianco, Jusquiamo (I).

بجلة عشبية برية غليظة الساق، قليلة الفروع تعلو نحو
٥٠ سم. ازهارها صغيرة القند بيضاء اللون يعلو بياضها
مواج تبني. تكثر في المواقع الرطبة والارربة المتوسطة
الاندماج.

٤١١٩ - **بنج أسود** * Hyoscyamus niger (S). Jusquiame noire, Poclée,
Potelée, Hannebane, Herbe aux poules (F). Hen-
bane, Hen-bell, Hyoscyamus (E). Schwarzes bilsen-
kraut (D). Giusquiamo nero, Favo porcino (I).
بجلة عشبية برية غليظة الساق فروعها تعلو من ٦٠ الى ٨٠
سم. اوراقها كبيرة كريمة الرائحة. ازهارها كبيرة تبني
مبضعة بالاحمر الارجواني || يكثر وجودها في الارربة
الرطبة.

٤١١٠ - **بنج المغرب، بثنينة** Hyoscyamus fateslez (S). Jusquiame de l'Atlas (F).
بجلة عشبية برية غليظة الساق المنتصبه. تعلو نحو ٥٠ سم.
فروعها كثيرة. اوراقها متوسطة القند، زباء النصل.
ازهارها قصيرة الاذن، قستقية اللون موشجة بالاحمر الارجواني.
مهددا جبال الاطلس. تكثر في المواقع الرطبة.

٤١١١ - **بنج ذهبي** Hyoscyamus aureus (S).
Jusquiame dorée (F).
بجلة عشبية برية نحيلة الساق المنتصبه. تعلو نحو ٤٠
سم. فروعها قليلة. اوراقها صغيرة كثيفة الزغب.
ازهارها طويلة الاذن، ذهبية اللون مبضعة بالاحمر.
تكثر في الاراضي الرطبة القليلة الاندماج.

٤١١٢ - **بنجة** Pangaea (F). Pangaea (E).
البنجة من بنج اي الاصل. اسم يطلقه علماء الجيولوجية
والجغرافية على الكرة الارضية عندما كانت لا تزال كتلة
كودلية واحدة، أي منذ تكوينها حتى زمن تجزئتها وانقسامها
الى قارات.

٤١١٣ - **بنجمة** * Panagaeus (S).
Panagée (F). Panagaeus (E).
جنس حشرات قانصة من فصيلة البنجيات ورثة غديات
الاجنحة. انواعها المعروفة متوسطة العدد، منتشرة في
بعض مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها
تطول من ٨ الى ١٢ مم. رؤوسها صغيرة، طليقة. عيونها
صغيرة، ناشزة. قرونها الاستشعارية خيطة، مستطيلة.
تأثيرها وفكوكها قياسية. ملاسمها مهدبة الفصل الطرفية.
كواسلها محدودة. اغدادها لاحفة، تساعية الاخاذيد
النحيلة القاطبة. بطونها مفلطحة. قوائمها نشيطة. اثوابها
مبضعة، يكثر فيها الاسود يملوه تبقيج احمر || الحشرة
الجملانة قانصة. البرقة والنجة وقانصة.



بنج ابيض



بنج اسود



بنجة



بنجوان مخزني



بندا

baum, Gemeiner schüsserbaum (D). Bonduc, Niccheri, Occhio di gatto (I).

جنية برية من فصيلة القرنيات . فروعها وافئانها قليلة . اوراقها مركبة . وريقتها صغيرة زلقة . ازهارها الى البياض الاخضر الموج . ثمارها حنابل ثخينة شائكة تغلف بعض البزور الكروية الشكل الاحية التركيب . وبزورها هذه تدعى الرمه وعين القط وهي من المقويات وتستخدم في الهند كدافئة للحميات وضد نهش الافاعي السامة .

Aveline, Noisette (F).

٤١٢٨ - بَنْدُقَة

Hazel-nut (E).

ثمرة البندق .

Corylacées, Corylées (F).

٤١٢٩ - بَنْدُقِيَّات

Corylaceae (E).

سبط من الفصيلة البتولية السوملية . اشهر اجناسه البندق .

Pandalus (S).

٤١٣٠ - بَنْدَل *٥

Pandale (F). Pandalus (E).

جنس دوبيات بحرية من القشريات عشاريات الارجل وفصيلة القريدسيات . انواعه المعروفة عديدة معظمها يعيش في بحار البلاد الباردة وبعضها في بحار البلاد المعتدلة الحرارة ومنها البحر الابيض المتوسط || جميعها كبيرة القد . مستطيلة الاخطام والزياني ، جميلة الالوان القسطانية ازهاره || لحومها جيدة الصنف مرغوب فيها .

Pandura (S).

٤١٣١ - بَنْدُور *٥

Pandora (F). Pandura (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة البندوريات . انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اصداقها صغيرة بابوجية الشكل ، لا متساوية المصارع والاضلع . المصراع السفلي مسطح الصفحة يكتم اطراف العلوي ، وهي بيضاء اللون لؤلؤية || اجسامها قصيرة المشاعب الطليقة المهذبة الاطراف . تعيش لاصقة بالصخور المخمورة بالماء .

٤١٣٢ - بَنْدُورَة ، طَمَاطِم ، قُوْطَة

Solanum lycopersicum (S). Tomato, Pomme d'amour, Pomme d'or (F). Tomato, Love apple (E). Tomaten, Kirschentomaten, Goldapfel (D). Pomodoro, Tomatō, Pomo d'amore (I).

جنس نباتات عشبية بقلية زراعية من الفصيلة الباذنجانية . مهدد امريكه الحارة ومنها عمت زراعتها انعام || انواعه وضروب كثيرة العدد ، جميعها مأكولة الثمار تختلف باختلاف الشكل والحجم وسرعة النمو والادراك || اما قيمة الثمرة الغذائية فقليلة لكنها غنية بالفيتامينات والحوامض النافعة . يوجد فيها :

٠.٧٦ ٪ من المواد الازوتية .

٠.٣٢ ٪ من المواد الدهنية .

٣.٨٩ ٪ من المواد الهيدروكربونية .

اشهر انواعه الرئيسية تتبع .

٤١٣٣ - البندورة البَلَحِيَّة *

Lycopersicum microcarpum (S). Tomato olive (F).

ثمارها كثيرة صغيرة بلحية الشكل مدبة القيد والظرف .

Aelurus (S). Panda (F).

٤١٢١ - بَنْدَا *

حيوان من الراتونيات وحيد الجنس والنوع . جثته تطول نحو ٦٠ سم . وذيله ٤٣ اما ارتفاعه فتحو ٣٦ سم . وهو قريب الشبه من السنور رأسه مستدير الشكل ، فروته مستطيلة الصوف الناعم . موطنه المقلب الجنوبي الشرقي من جبال حملايا . يألف الغابات . قوته الثمار والحبوب وبعض الحشرات . نيرج الذكر منه فواح الرائحة المسكية .

Macaque rhésus (F).

٤١٢٢ - بَنْدَر

هر الماكاك الرئيس ، اطلبه .

Corylus (S). Noisetier (F).

٤١٢٣ - بَنْدُق ، جِلْدُوز جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية من فصيلة البتوليات السومليات . انواعه قليلة . جميعها من نباتات المناطق المعتدلة . اشجارها فناء ترغب في الاراضي العميقة الغور . افئانها ملساء ، غيداء . اوراقها عابلة متعاقبة منقطة ، قليلة ، مسنة الحافة ، زغبية السطح الاسفل من النصل . ازهارها وحيدة المسكن . الذكورية منها قدية ، اسطوانية طويلة . الانثوية نورية عذقية وردية اللون . ثمارها صغيرة يختلف شكلها مع نوعها ، جميعها خشبية الغلاف الاملس تحوي بذرة واجدة فلقية مأكولة ، طيبة الطعم . يستخرج من بزورها دهن يقوم مقام دهن اللوز . اشهر انواعها الزراعية الثلاثة التالية .

٤١٢٤ - بَنْدُق بَرِّي ، جِلْدُوز بَرِّي ، إِيْلَاوسن

Corylus sylvestris (S). Noisetier franc, Coudrier sauvage (F). Wild filbert (E). Wilder hasel (D). Avellano salvatico, Nocciuolo salvatico (I).

شجرة دائمة فناء عديدة الضروب . تعلو من ٦ الى ١٠ امتار . مهدا آسيا الصغرى والبلقان . ساقها ملساء ، فروعها وافئانها كثيفة ، اوراقها جوئية اللون زياء الصفحة السفلى . ثمارها صغيرة خلية القشرة مستطيلة الشكل || تعيش في جميع الاثربة المتوسطة الاندماج .

٤١٢٥ - بَنْدُق تَرْكِي ، جِلْدُوز تَرْكِي ، قَيْطَاقِيَا

Corylus colurna (S). Noisetier de Turquie, Coudrier de Byzance (F). Filbert, Hazel, Constantinople hazel (E). Türkische hasel, Baumhasel (D). Avolano di Costantinopoli, Nocciuolo di Costantinopoli (I).

شجرة كبيرة هرمية الشكل تعلو من ١٥ الى ٢٠ م . ساقها غليظة طحلاء اللون صلفاء اللحم الملساء . فروعها وافئانها متوسطة الكثافة . اوراقها لامعة النصل ، كبيرة الحجم ثمارها قلبية الشكل || ترغب في الاثربة المتوسطة الاندماج العميقة الغور .

٤١٢٦ - بَنْدُق مَعْرُوف * ، جِلْدُوز عَادِي

Corylus Avellana (S). Noisetier commun, Avelinier, Coudrier (F). Filbert, Hazel-nut tree (E). Haselstrauch, Hasel, Nussbaum, Haselnuss (D). Avellano, Nocciuolo, Bacuccola (I).

شجرة متوسطة القد تعلو من ٤ الى ٧ امتار . ساقها ملساء ، فروعها كثيفة متدية الاطراف . اوراقها قلبية مسنة الحافة ، ثمارها صغيرة قلبية الشكل مدبة الخاتم . تعيش في جميع الاثربة ، ترغب في الاراضي العميقة الغور المتوسطة الاندماج .

٤١٢٧ - بَنْدُق هِنْدِي * ، قَارِح ، جَوْز لَرَقَة

Caesalpinia bonduc (S). Bonduc, Chiquier, Chicote (F). Bonduc, Bonducella, Nicker tree (E). Nicker-



بندق معروف



بندق هندي



بندل



بندور



بندورة بلحية



بندورة سبحية



بندورة شائعة



بندورة عنقودية



بندورة كرزية



بنسمون



بنغار



بنغاز

٤١٣٤ - البندورة السبحية *

Lycopersicum rosarigerum (S). *Tomate en chapelet* (F).

ثمارها سبحية التجميع اجاصية الشكل منخفضة القيد والخاص سمكة اللب قليلة العصارة .

٤١٣٥ - البندورة الشائعة *

Lycopersicum esculentum (S). *Tomate mangeable* (F).

ضروبها عديدة وثمارها مختلفة الاشكال والاحجام تغلب فيها الامتدانة والتبطين مع كبر القد .

٤١٣٦ - البندورة العنقودية *

Lycopersicum racemigerum (S). *Tomate en grappes* (F).

ثمارها عنقودية التجميع ، صغيرة القد قلبية الشكل .

٤١٣٧ - البندورة الكرزية *

Lycopersicum cerasiforme (S). *Tomate cerise* (F).

ثمارها كرزية الشكل متوسطة الحجم ، سمكة اللب ، قليلة العصارة والبزور .

٤١٣٨ - بندوريات *

Pandoridés (F).

Pandoridæ (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد . اعطائها بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اصداؤها متباينة الاشكال لامتساوية المصارع والاضلع . اجسامها صغيرة . مشاعها قصيرة ، طليقة ، مهدبة الاطراف || اعرف اجناسها واشهرها البندور والميقم .

٤١٣٩ - بنترهير *

Limon d'Egypte (F).

Egyptian small lim -ر .

اطلب ليمون مالح .

٤١٤٠ - بنسمون* ، خماسية الاسدية

Pentstemon (S). *Pentstemon* (F). *Pentstemon* (E). *Bartfäden, Funffäden* (D). *Pentstemon* (I).

جنس نباتات بحلية معمرة من فصيلة الخنازيريات مهدا امريكة الشمالية . انواعها قليلة منها الجنبيات والبعجلات والاعشاب . اوراقها متقابلة لينة . ازهارها عشكولي التجميع . ازهارها خماسية الاسدية بحيلة الالوان الزاهية المختلفة . اشهر انواعه التزيينية :

٤١٤١ - بنسمون أحمر *

P. punicens (S). *P. rouge* (F).

٤١٤٢ - بنسمون أبيض *

P. glaber (S). *P. glabre* (F).

٤١٤٣ - بنسمون اهليلجي *

P. ovatus (S).

P. à feuilles ovales (F).

٤١٤٤ - بنسمون جرسى *

P. campanulatus (S).

P. campanulé (F).

٤١٤٥ - بنسمون رشيق *

P. speciosus (S).

P. élégant (F).

٤١٤٦ - بنسمون هاتك *

P. heterophyllus (S).

P. hétérophylle (F).

٤١٤٧ - بنصر *

Annulaire (F).

Ring finger, Third finger (E).

البنصر الاصبع بين الوسطى والخنصر . ج بناصر .

٤١٤٨ - بنصيريات *

Annulariae (S).

Annulariées (F). *Annulariae* (E).

فصيلة نباتية من مستورات الزهر الوعائية . اجناسها وانواعها عديدة . جميعها من النباتات المنقرضة العائدة الى العصور السحيقة الغابرة .

٤١٤٩ - بنطافيلن *

Potentille (F). *Potentilla* (E).

اطلب بوتنتيلا .

٤١٥٠ - بنغار *

Bungarus (S).

Bungare (F). *Bungarus* (E).

بنغار هو الاسم الهندي الماليزي لهذه الافاعي . جنس حيات خبيثة سامة من اماميات الاتحاد وفصيلة الرحيات . انواعها المعروفة نحو ١٢ اعطائها تمتد من الافغان الى الهند وماليزية || اجسامها شبه اسطوانية قضيفة دقيقة الاذنان تطول من ١٦٠ الى ٢١٠ سم . اثنائها صفراء اللون او زرقاء يعلوها تجذيع معترض منتظم الترتيب اسود اللون او احمر .

٤١٥١ - بنغاز *

Pangases (S). *Pangase* (F).

جنس اسماء نهريه من مفتوحات المثانة وفصيلة السلوريات . انواعه المعروفة قليلة العدد موطنها معظم انهر الصين وفياتنام وماليزية || اجسامها وشعية مستطيلة . تتميز بكثافة عذباتها الدقيقة المستطيلة التي تبدو كالسبال . زعانفها الظهرية الامامية مجهزة بمناخس حادة . الذيلية فارقة || لحمها متوسطة الصنف ، مأكولة .

٤١٥٢ - بنغالي ، ترنور *

Estrelida (S).

Bengali, Astrild (F). *Astrild* (E).

جنس عصافير من فصيلة التروطيات . انواعه المعروفة متوسطة العدد موطنها يمتد من الجزيرة العربية الى الهند ومن افريقية الشرقية الى الوسطى والجنوبية . نظامها الحياتي جماعي . افواجها تعد من ١٠ الى ٨٠ زوجاً || اجسامها صغيرة القد ، رشيقة ، قريبة الشبه بالدوري . مناقيرها صغيرة ، رقيقة ، اجنحتها واذناتها معتدلة الطول || تألف الغابات وضياف مجاري الماء والواحات . طيرانها خفيف الحركة سريعها . قوتها البزور البرية والحشرات ومكثها وكزودها واساريمها || اكثر انواعه يألف حياة الاسر ويعيش في القفص . اشهر انواعه الازرق الطوق والاشهب الازرق والاكعب والصغير ، والاخضر والمرقوش

٤١٥٣ - بنغالي أزرق الطوق* ، ترنور أزرق

Estrelida phoenicotis (S).

Bengali cordon-bleu (F).

عصفور من البنغالي . موطنه يمتد من افريقية الوسطى الى الشرقية والجزيرة العربية . فوجه لاقياسي العدد اذ يراوح من ١٠ الى ٦٠ زوجاً || جسمه صغير القد يطول نحو ١٠ سم . ثوبه العلوي والسفلي مع جناحيه الى الشبه الصفراء المواجه يطوقها حثار أزرق في المحجرين والعنق والصدر والاطليل حتى الزمكي . ويتميز الذكر ببقعة صغيرة قرمزية اللون تتوسط كل من المحجرين . حدقة عينه شديدة الصفار || طيرانه خفيف الحركة سريعها . قوته البزور البرية ومكث الحشرات ويبط النمل || يدثن عشه في الادغال القريبة من سطح التربة . الانثى تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٢ يوماً || يألف حياة الاسر ويتكاثر في القفص .



١. بنغالي أزرق الطوق
٢. بنغالي أشهب أزرق
٣. بنغالي اكهب



بنفسج عطر



بنفسج الثالوث الشرقي



بنفسج الثالوث النحيل

V. Hederacea (S). البنفسج العشقي الورق
Violette à feuilles de lierre (F).
اوراقها كلوية الشكل ، مسننة الحافة ، أزهارها بنفسجية
أو بيضاء اللون .

V. Odorata (S). Violette odorante (F). البنفسج العطر*
Sweet violet (E).
اوراقها قلبية مسننة الحافة ، رواكها كثيرة وطويلة ، أزهارها
فواحة العرف .

V. papilionacea (S). البنفسج الفراشي الورق
Violette papilionacée (F).
اوراقها قلبية فراشية . أزهارها عديدة العرف بنفسجية أو
بيضاء أو صفراء اللون .

V. rotundifolia (S). البنفسج المستدير الورق
Violette à feuilles rondes (F).
اوراقها مستديرة ، أزهارها كبيرة صفراء اللون .

V. lanceolata (S). البنفسج المستطيل الورق
Violette lancéolée (F).
اوراقها مستطيلة ، رواكها كثيرة ، أزهارها بيضاء اللون
مبضعة بالاحمر .

V. pubescens (S). البنفسج الأزغب
Violette pubescente (F).
رواكها سطحية زباء . اوراقها كلوية . أزهارها صفراء اللون .
من الفئة الثانية القصيرة السوق تخص بالذكر :
V. pedunculata (S). البنفسج الطويل المعلاق
Violette à longs pédoncules (F).
رواكها سطحية . اوراقها بيضية طويلة المعاليق . أزهارها
كبيرة القند صفراء اللون .

V. canadensis (S). البنفسج الكندي
Violette du Canada (F).
رواكها سطحية قصيرة . اوراقها قلبية . أزهارها كبيرة
القند خلية البتلات .

من الفئة الثالثة العديدة السوق ، الثلاثية الالوان ، المعروفة
باسم :

بنفسج الثالوث ، زهرة الثالوث
Viola tricolor (S).
Pensée (F). Pansy, Heart's ease, Herb trinity (E).
Stiefmutterchen (D). Pensiero (I).
تخص بالذكر أعرفها وأشهرها :

V. lutea (S). بنفسج الثالوث الاصفر
Pensée jaune (F).
اوراقها مستديرة ، أزهارها عطرة ثلاثية الالوان ، يطفي
عليها الاصفر .

V. acutis (S). بنفسج الثالوث الشرقي*
Pensée d'Orient (F).
اوراقها مستديرة شديدة التجميع . أزهارها كبيرة البتلات
ثلاثية الالوان فيها الابيض والاصفر والازرق .

V. calcarata (S). بنفسج الثالوث المهاري
Pensée éperonnée (F).
اوراقها مستديرة . أزهارها طويلة المهاري المدبب الطرف .
قصيرة الزناد ، يطفي عليها الابيض والاصفر .

V. gracilis (S). بنفسج الثالوث النحيل*
Pensée grêle (F).
اوراقها مستديرة . أزهارها صغيرة ثلاثية الالوان فيها
الابيض والاصفر والليلكي .

٤١٥٨ - بنفسجيات
Violaceae (S).
Violacées, Violariacées (F). Violaceae (E).
في الفصيلة البنفسجية من ذوات الفلقتين عديدة القملات .
انواعها زهاء ١٠٠ معظمها اشباب صغيرة القند . اوراقها

٤١٥٤ - بنغالي أشهب أزرق* ، ثرثور أشهب
أزرق
Estrela incana (S).
Bengali gris bleu (F).

عصفور من البنغالي . موطنه بعض مناطق افريقية الوسطى
والجنوبية . فوجه يمد من ٥٠ الى ٧٠ زوجاً || جسمه
صغير القند يطول نحو ١٢ سم . ثوبه العلوي الى الشبهة
الزرقاء المواج . ثوبه السفلي الى الشبهة الفضية . رأسه
وجناحاه اعقب خضاباً من رداءه . حذقة عينه عسلية اللون ||
طيرانه خفيف الحركة سريعة . قوته الحشرات ومكنها
ويظ النمل والبزور البرية || يدثن عشه في الادغال .
الانثى تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمنابرة الذكر
نحو ١٢ يوماً || يألف حياة الاسر ويتكاثر في القفص .

٤١٥٥ - بنغالي اكهب* ، ثرثور اكهب

Estrela cinerea (S).
Bengali gris, Astrild gris (F).
نوع من البنغالي . موطنه يمتد من الجزيرة العربية الى
افريقية الشرقية والوسطى . سربه يمد من ١٥٠ الى ٢٠٠
زوج || جسمه صغير القند يطول نحو ١١ سم . ثوبه الى
الكهبة يسمر في الرأس والجناحين والذنب ويدنر في البطن .
عيناه مطوقتان باطار احمر . حذقة عينه عسلية اللون .
منقاره مرجاني اللون . رسفاه الى الكهبة || قوته الحشرات
ومكنها والبزور البرية . يدثن عشه في الادغال على ارتفاع
ثلاثة اقدام عن سطح التربة . الانثى تضع من ٤ الى ٥
بيضات تحضنها بمنابرة الذكر نحو ١٢ يوماً || يألف
حياة الاسر ويتكاثر في القفص .

٤١٥٦ - بنغورديه
Bongardia (S). Bongardie (F).
Golden rod (E). Bongardibaum (D). Bongardia (I).
جنية تزيينية من فصيلة البرباريسيات مهدا المناطق
الشرقية الحارة . سوقها صفراء اللون . اوراقها متعاقبة
مستطيلة ، نصلها مالمس البشرة فسفي اللون يعلوه مواج
وردي . أزهارها كبيرة جميلة مختلفة الالوان .

٤١٥٧ - بنفسج
Viola (S).
Violette (F). Viola, Violet (E).

جنس اشباب صغيرة برية وتزيينية معمرة من فصيلة
البنفسجيات . اوراقها قرصية معنقة طويلة الزناد اذنية .
ازهارها خنثوية ، محورية ، فردية ، خاسية الفصل
غير المتساوية ، مهازية الفصيلة القاعدية ، خاسية
البتلات ، مهازية البتلة السفلى . الوانها عديدة يئلب
فيها البنفسجي والابيض || يستخرج من زهرها مادة
قلوية تدعى فيولين ويستخرج ايضاً بالتقطير عطر شيق
مستحب العرف كثير الاستعمال في الصناعات العطرية .
تجميع الازهار صحي طبي اما الجذور فقيئة وتستعمل هذه
الغاية || انواعه الزراعية عديدة تقسم الى ثلاث فئات .
١ - فئة الانواع العديدة السوق الوحيدة اللون .
٢ - فئة الانواع القصيرة السوق الوحيدة اللون .
٣ - فئة الانواع العديدة السوق الثلاثية الالوان .

اما تعريف الفئة الاولى والثانية فهو الآتي :

Viola (S). Violette (F). Violet (E). Veilchen (D).
Violetta (I).

من فئة الانواع الاولى العديدة السوق الوحيدة اللون تخص
بالذكر :

V. Sagittata (S). البنفسج السهمي الورق
Violette sagittée (F).
اوراقها سهمية ، رواكها قليلة ، أزهارها زرقاء اللون .

عديدة بعضها كبير الحجم بطول نحو ١٠٠ سم. ويزن من ٥ الى ٦ كيلو. والبني يتميز بحجمه المستطيل وحراشفه الدقيقة وزعانفه الكبيرة. وهو من الاسماك المأكولة العادية الصنف || أشهر أنواعه :

٤١٧١ - بُنِّي أَحْمَر Barbus grypus

٤١٧٢ - بُنِّي أُرُوبَة، بَرِيْس شائع Barbus vulgaris

٤١٧٣ - بُنِّي النِيل Barbus bynni

٤١٧٤ - بُنِّي دِرْجَلَة، فَهْدَة، بِرْمِيْسَة Barbus perince

٤١٧٥ - بُنِّي طَوِيل الرَّأْس Barbus longisepe

٤١٧٦ - بُنِّي كَبِير Barbus kersin

٤١٧٧ - بُنِّي نَهْرِي Barbus fluviatilis

٤١٧٨ - بُنْيَات Coffeaceae (S), Coffeacées (F), Coffeaceae (E).

فصيلة نباتية اجناسها ١٤٠ وأنواعها زهاء ٢٠٠٠ جميعها من نباتات المناطق الحارة. أشهرها البن.

٤١٧٩ - بُنْيَاس الشَّطِّ Buniade cakile (F).

نبات بري من الصليبيات يعرف بفجيلة الشط، اطلبها.

٤١٨٠ - بُنْيَة، وَتْل Structure (F).

شكل تركيب الاعضاء التي تؤلف الجسم او الاجزاء التي تؤلف الشيء.

٤١٨١ - بُنْيَة Talle (F), Sucker (E).

هي الشط.

٤١٨٢ - بنيسيليوم* Penicillium (S)

جنس فطور مجهرية من عمارة الهبويات وفصيلة الوقسيات. يتميز بحراب زقي مستطيل الشكل مفصلي الاطراف، تكاته سحجة الارتكاز المنتصب، شعبة التجميع. أنواعه عديدة بعضها صحي طبي مثل بنيسيليوم نوتاتوم (Penicillium notatum) الذي يعطي البنيسيلين المشهور، وبعضها صناعي مثل بنيسيليوم كنديدوم (Penicillium candidum) الذي يستعمل في صناعة الاجبان. ومنها مؤذية ضارة تعطب الثمار وتكسب الاقتصاد الزراعي. أشهرها : بنيسيليوم إيتاليكم، بنيسيليوم اكسبسم، بنيسيليوم ديجيتاتم، بنيسيليوم كرستاسم.

٤١٨٣ - بنيسيليوم اكسبسم

Penicillium expansum (S).

فطر مجهرية من الهبويات يركب ثمار التفاح المحفوظة المخدوشة البشرة من أي سبب كان فيعطها || مظهره الخارجي بقعة سمراء مستديرة تبدو صغيرة ثم تنتشر وتكبر بسرعة، يعلوها عفن اغبر ثم اطلحل وينتهي باللون السبوري.

٤١٨٤ - بنيسيليوم إيتاليكم، عفن أزرق

Penicillium italicum (S), Moisissure bleue (F).

فطر مجهرية من الهبويات يركب ثمار الحمضيات فيعطها. يبدو أنه لا يصيب إلا الثمار المدركة المخدوشة. مظهره الخارجي بقعة صغيرة مستديرة كامدة اللون تعلو

معنقة طويلة الزناد، مستديرة النصل متعاقبة التركيب. ازهارها محورية الارتكاز، لاقياسية التجميع، خاسية الفصل والبثلاث والاسدية. اسديتها مندغمة في قرص المبيض. ألوانها باغليتها بنفسجية زاهية. اعطانها الطبيعية جميع المناطق المعتدلة.

٤١٥٩ - بنفسجية Ionopsidion

جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة الصليبيات. ازهارها تشبه البنفسج قالباً ولوناً. تزرع للزينة.

٤١٦٠ - بَنَفَش Améthyste (F), Amethyst (E).

البنفش حجر كريم يعرف بالجمست (فرينغ).

٤١٦١ - بَنَقْم نبات يشبه الكماء (اقرب الموارد).

٤١٦٢ - بَنَقُوسِي Capitá (F), Capitate (E).

نعت تعريفي يطلق، في علم النبات، على ما كمال طرفه مكور الشكل او بيضي. ويطلق في علم الحيوان على القشريات اللامندغمة الرؤوس.

٤١٦٣ - بَنَقُوسِيَا Banksia (S).

Banksie (F), Banksia (E).

جنس اشجار وجنات برية وتزيينية من فصيلة الفصيات أنواعها عديدة مهددا استرالية. اوراقها ضخمة ثلاثية الترتيب نصلها جامد الصفحة منشاري الحافة. ازهارها خشوية قدية التجميع. ثمارها مجموعة من البزور المرسوفة على شكل اكواز الصنوبر. أشهر أنواعها التزيينية ما يتبع :

٤١٦٤ - بَنَقُوسِيَا بَهِيَّة * Banksia speciosa (S).

Banksie magnifique, B. superbe (F).

جنية تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها مسوية الشكل، نصلها مفرض الصفحة بارز العروق. ازهارها مستطيل السيلة اصفر اللون.

٤١٦٥ - بَنَقُوسِيَا كَبِيرَة Banksia grandis (S).

Banksie robuste (F).

شجرة جميلة الشكل متوسطة الحجم تعلو من ١٠ الى ١٥ م. اوراقها كبيرة مستطيلة مثلثة الزوايا متمعة النصل ازهارها مستطيل الهريه اصفر اللون.

٤١٦٦ - بَنَقُوسِيَا مُسَنَّنة Banksia serrata (S).

Banksie à feuilles dentelées (F).

شجرة جميلة القالب تعلو من ٨ الى ١٠ امتار. اغصانها زباء اللحماء. اوراقها مسوية الشكل نصلها جامد الصفحة مسنن الحافة، بارز العروق المتوازية الترتيب. ازهارها خلية حمراء اللون || ازهارها يستمر من تموز الى آب.

٤١٦٧ - بَنَكْرِيَّاس Pancréas (F), Pancreas (E).

راجع حلوة.

٤١٦٨ - بَن مِيمُون Tamier commun (F).

هو الفاشرشين المبدول، اطلبه.

٤١٦٩ - بَنَن Engraisser (F), To fatten (E).

بنن الشاة اربطها ليسمها.

٤١٧٠ - بُنِّي، بِرْمِيْس Barbus (S).

Barbeau, Barbot (F), Barbel, Barbus (E).

جنس اسماك بحرية ونهرية من فصيلة الشبوطيات. انواعها



بنقوسيا هية



بني



بنيسيليوم

القشرة ثم تتحول بسرعة الى عفن ازرق اللون يعم البقعة ويمطب القشرة والخصوص والبذور.

٤١٨٥ - بنيسليوم ديجيتاتام، عفن أخضر

Penicillium digitatum (S). Moisissure verte (F).
فطر مجهري من الهبويات يركب ثمار الحمضيات ولا يعف عن غيرها. ولكنه لا يصيب إلا الثمار المدركة الملوخوزة او المخوشة || مظهره الخارجي بقعة او بقع مستديرة متناخسة متراصة تبدو سمراء اللون حتى يفسحها نواس العفن فتستقر على اللون الاخضر. يستعملون الآن لوقاية الثمار من هذا الفطر الفتاك محلول البورق المركّز من ٦ الى ٨٪ فيغسلون الثمار ويقتونها في المحلول نحو اربع دقائق. ومن الواجب الا تقلل حرارة الماء عن ٤٦ درجة سغ والا ترتفع اكثر من ٥٠ درجة سغ.

٤١٨٦ - بنيسليوم كروستاسم

Penicillium crustaceum, P. glaucum (S).
فطر مجهري من الهبويات يركب معظم الثمار المحفوظة واطعمها الاجاص والعنب. كما يصيب الحبوب عند انتاشها وتحويل موادها السكرية، هذا اذا مكنته رطوبة البيئة من ذلك لانه من فئة الفطور التي لا تعيش وتتكاثر الا في المحيط المشبع الرطوبة.

٤١٨٧ - بنيسليون
Pénicillion (F). Penicillion (E).
هو عفن العسل من الفطور الخيطية النافعة.

٤١٨٨ - بنيسقية
Ramule (F). Branchlet (E).
هي الزمرة النامية الجديدة التي تبدو كأنها قريبة من الاكاخ فيستمر نموها دون ان تورق. ج بنائق.

٤١٨٩ - بنين
Larves d'abeille (F).
راجع دجبة.

٤١٩٠ - بنين، كافين
Caféine (F). Caffeine (E).
مادة شبه قلووية طيبة مقرية ومنبهة، مرة الطعم، صلبة الذوبان في الماء البارد. تستخرج من ثمار واوراق البن والشاي والكولا وبهشية البراغواي والكاكاهو. الخ.

٤١٩١ - بنيل
Baniule (F).
هي الحبشة راجعها.

٤١٩٢ - بنيل أرقط
Baniule moucheté (F).
هي الحبشوقة الرقطاء راجعها.

٤١٩٣ - بنيلونية
Bignone (F). Cross-vine (E).
راجع بنيلونية.

٤١٩٤ - بهّا، عصيفيرة، مجزاعة

Impatiens balsamina, Balsamina hortensis (S). Balsamine des jardins (F). Garden balsam (E). Gartenspringkraut, Springkraut (D). Impazienté, Balsamina (I).
نبات عشبي حولي من البلسينيات ضروبه عديدة جميعها تزيينية جميلة الازهار المختلفة الالوان. ثمارها قرون مضلعة مدببة الزام الاخير تنفلق عن بزور كروية صغيرة القد كستنية اللون || والها يعيش ويوجد في جميع الارربة والمواقع انما يرغب في وفرة الاسمدة المعدنية.

٤١٩٥ - بهّار*، شقّار
Diacope bohar (S).
سمكة كبيرة القد من الشطف وفصيلة البهاريات طولها نحو ١٠٠ سم. ثوبها ابيض اللون اشقر الموج يعبق مع اقترابه من ثبح الظهر. لحمها مستحب الطعم مرغوب فيه. اعطانها البحر الاحمر والخليج الفارسي وشواطئ الهند.

٤١٩٦ - بهّار
Anthemis
البهار ويقال له المرار وعين البقر نبات طيب الريح جعد له فقاحة صفراء تثبت ايام الربيع يقال لها المرارة. راجع اقحوان.

٤١٩٧ - بهّار الصباغين

Camomille des teinturiers (F). Dyer's anthesis (E).
هو اقحوان الصباغين، اطلبه.

٤١٩٨ - بهّار حقلي
Camomille des champs (F).
هو الاقحوان الاصفر، اطلبه.

٤١٩٩ - بهّار قبيل
Anthémis noble (F).
هو الاقحوان الشريف، اطلبه.

٤٢٠٠ - بهّار
Bohor
هو عفر الحبشة، اطلبه.

٤٢٠١ - بهّاريّات
Sclaenidae (S). Scénidés (F).
Sclaenidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من العظميات شائكات الزعانف. اجناسها وانواعها عديدة اشهرها الشطف واللوت والحمورور.
٤٢٠٢ - بهّت
البهت: حساب من حساب النجوم وهو مسيرها المستوي في يوم (السان).

٤٢٠٣ - بهّت
Soufflage (F). Panting (E).
البهت هو عرض الانثى على الفحل الهيت للتاكيد من وداقها.

٤٢٠٤ - بهّشة
هي البقرة الوحشية.

٤٢٠٥ - بهّدل
Hyenon (F). Young hyena (E).
البهدل هو جرو الضبع.

٤٢٠٦ - بهّدل*، عتدليب اليابان

Leiothrix lutea (S).
Leiothrix, Rossignol du Japon (F).
طائر وحيد الجنس والنوع من فصيلة القرقفيات. اعطاه تمتد من اليابان الى الهند. يألّف الاحراج والغابات. قوته الحشرات والديدان وبعض الثمار والبزور البرية. ملجئه الحياتي جماعي، افواجه قليلة العدد || جسمه صغير القد. رأسه الى السمرة العابقة. جهته ومحسراه وعنقه الى الصفرة. جوشنه الى الحمرة البرتقالية. بطنه الى البياض الاغبر. ظهره الى السمرة الزيتية. جناحه اسمر القاعدة، برتقالي الصفحة، اصفر الختار. ذنبه فارق الطرف، اسود اللون، ابيض النمشة. منقاره احمر. رسناه واصابعه الى الجزوة || يدثن عشه في الادغال والشجار القليلة الارتفاع. انشاء قنص اربع بيضات تحفنها بمناروبة الذكر نحو ١٣ يوما.



بها



بهار



بُهْدُل

٤ الى ٦ بيضات. التزجيم يستمر نحو اسبوعين || اعرف انواعه واشهرها الثلاثة التالية :

٤٢١٧ - بَهْرَمَان بَاهِر °

Pericrocotus speciosus (S).

Péicrocote splendide, Minivet splendide (F).

٤٢١٨ - بَهْرَمَان لَارِي °

Pericrocotus flammeus (S).

Péicrocote flambé, Oiseau vermillon (F).

٤٢١٩ - بَهْرَمَان وَرْدِي °

Pericrocotus roseus (S).

Péicrocote rose, Minivet migrateur (F).

٤٢٢٠ - بَهْرَمَة
Floraison (F). Efflorescence (E).
البهرمة : زهر النور ورونقه .

٤٢٢١ - بَهْرَمَة ° بَزْرَايَة
Porte-graine (F).
Seed-bearer (E).

ما يزرع من البقول والنباتات الصناعية وغيرها للحصول على بزورها ومتابعة انسالها المنتجة . ج بهازر وبزاري .

٤٢٢٢ - بَهْرَمَة °
Culture de porte-graines (F).
Cultivation of seed-bearer (E).

البهرمة وقدعى ايضاً زراعة البزاري ، كل زراعة تهدف الى انتاج البذار .

٤٢٢٣ - بَهْش

البهش : المقل ما دام رطباً واذا يبس فخشل .

٤٢٢٤ - بَهْش
Chêne liège, Surler (F).
Cork-oak (E).
هو سديان شور .

٤٢٢٥ - بَهْشِيَّة
Subéreux (F). Suberous (E).
البهشي والغليبي تمت وصني وتعريبي يطلق على ما كان تركيبه كالبهش .

٤٢٢٦ - بَهْشِيَّات
Aquifoliaceae, Illicaceae (S).

Aquifoliacées, Illicacées (F).

Aquifoliaceae, Illicaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها وانواعها عديدة جميعها اشجار وجنبات معمرة . اوراقها متعاقبة لاطقة . ازهارها نورية التجميع ابطية الارتكاز .

٤٢٢٧ - بَهْشِيَّة
Ylex (S). Houx (F). Holly tree (E).

جنس اشجار وجنبات حرجية من فصيلة البهشيات . انواعها المعروفة ١٧٥ معظمها امريكي المنبت . اوراقها عروية ، متعاقبة ، محزوزة النصل ، مسنة الحافة . ازهارها ابطية الارتكاز ، نورية التجميع . نورتها رباعية الازهار والبتلات والاسدية . اخشابها صناعية مرغوب فيها . لحاؤها تستعمل في صناعة الدبق . اوراقها طيبة . اشهر انواعها ما يلي :

٤٢٢٨ - بَهْشِيَّة الدِّبْق ° ، طِيم ، عُوْد الخير

Ilex aquifolium (S). Houx commun, Agrifon (F). Holly, Holm, Christmas (E). Stechhulst, Christdorn, Stechpalme (D). Lauro spinoso, Aquifoglio, Strillazzo, Agrifoglio, Azzillastro (I).

شجرة متوسطة القد ، ضرورها ثلاثة الحمراء والصفراء

٤٢٠٧ - بَهْدَلَة البهدلة اصل اللدي . ج بهادل .

٤٢٠٨ - بَهْرَام ، بَهْرَامَج Mars (F).

هو المريخ كوكب من الخلتس ، اطلبه .

٤٢٠٩ - بَهْرَامَج

« البهرامج من اشجار الجبال وهو ضربان ضرب منه مشرب لون شعره الحمرة ومنه اخضر هياذب النور . وكلا النوعين طيب الرائحة » (اللسان) .

٤٢١٠ - بَهْرَانَة °
Furcraea (S). Fourcrée (F).

جنس نباتات برية وزراعية معمرة من فصيلة الارجسيات . انواعه عديدة قريبة الشبه من الباهرة . اوراقها قرصية الانتشاب ، لحمية النصل ، شاذكة الختار . ازهارها عنقودي الشكل . ازهارها دولابية التجميع تتميز باسديتها الغليظة المتك والحويط || اشهر انواعها ما يلي .

٤٢١١ - بَهْرَانَة مَارِدَة
Furcraea gigantea (S).

Fourcrée gigantesque, Chanvre mexicain (F).

هو النوع الزراعي المشهور بجودة ومثانة الياف الصناعية . اوراقه تطول نحو ٢٥٠ سم . وتعرض ٢٠ سم . نصلها جميل الخضار الزاهي اللامع || عنقوده الزهري كبير القد . ازهاره عاجية اللون .

٤٢١٢ - بَهْرَانَة مَتَاوِجَة
Furcraea undulata (S).

Fourcrée ondulée (F).

نوع من البهرانة شمراخها يعلو نحو ٤٠٠ سم . اوراقها تطول من ٤٠ الى ٥٠ سم . نصلها جامد النسيج ، بحري اللون ، متاوج الختار ، مسنن الحافة ، شوكة اسمر اللون ، اعقف الجسم . لاقط || عنقودها الزهري كثير التشبيب الجالس الانتشاب . ازهارها تبينة اللون يعلوها موج اخضر .

٤٢١٣ - بَهْرَة
Pointe crochue du bec (F).

البهرة طرف المنسر الاحجن رهرة الوادي سراته وخيره وبهرة كل شيء وسطه . ج بهر وأبهار .

٤٢١٤ - بَهْرَم ، بَهْرَمَان
Carthame (F).

Safflower (E).
هو القرم ، اطلبه .

٤٢١٥ - بَهْرَمَان ، ياقوت بحري
Escarboucle (F).

Carbuncle (E).

حجر كريم احمر اللون ساطع الونق والنضاء . والبهرمان ايضاً ضرب من العصفور عن الديري .

٤٢١٦ - بَهْرَمَان °
Pericrocotus (S).

Péicrocote, Minivet (F).

جنس طير من الجواثم سنيات المناقير وفصيلة المذابيات . انواعه المعروفة عشرة . اعطانها تمتد من الافغان الى الهند والصين واليابان وماليزية . تألف الغابات والمواقع الرطبة حيث تكثر الحشرات . ملجنها الحياتي جماعي . جماعاتها قليلة العدد . قوتها الذباب والحوام والحشرات المجنسة والذابة . اجسامها رشيقة تطول من ١٨ الى ٢٢ سم . اثوابها جميلة

الالوان الزاهية المتراكبة والمتداخلة ، اعماها الاخر على اختلاف خضاباته والازرق والاسود والاخضر الاليس والوردي والاصفر والاشفق والاشهب || تدشن اعشاشها في الاشجار الرقيقة . اناها تحضن بمنابرة الذكور من



بهرانة



بهرمان



بهشية الدبق

٤٢٣٦ - بَهْشِيَّةُ الْحَجَرِ Lichen

نبات يملو الصخور يعرف بالحزاز وكشة العجوز .

٤٢٣٧ - بَهْشِيَّةُ ٥* Acrobates (S).

Acrobate, Voltigeur (F).

جنس حيوانات لبونة من الجراييات وفصيلة الفلنجريات .
أنواعه المعروفة ثلاثة . موطنها احراج استرالية وغينيا
الجديدة . قوتها اوراق النبات والازهار والثمار والعسل
والحشرات || تتسلق الاشجار وتنتقل من الواحدة الى
ال اخرى تحليقاً في الفضاء لانها تتميز بغشاء جناحي الشكل
يمتد من الزور الى اسفل البطن || اجسامها متباينة
الاحجام ، منها الصغيرة التي لا يتجاوز طولها ١٥ سم .
بما فيه الذنب . ومنها الوسطى التي يبلغ طولها نحو ٣٥ سم .
بما فيه الذنب الذي لا يقل طوله عن طول الجسم . رؤوسها
مخروطية الشكل . قوائمها خماسية الاصابع ، حادة الاظافر .
اصوافها ناعمة لينة اذنانها مستطيلة ، مزدوجة التصفيف
الوبري || سرعها دجوي . اناثها رباعية الاخلاف .



بَهْشِيَّةُ الشاي



بَهْشِيَّةُ الشاي



بَهْشِيَّةُ الشاي



بَهْشِيَّةُ الشاي

٤٢٣٨ - بَهْشِيَّةُ ٥* Betail (F). Cattle, Livestock (E).

اطلب ماشية .

٤٢٣٩ - بَهْشِيَّةُ ٥*

البهية هو الصغير من اولاد الغنم والماعز والبقر وغيرها .
الذكر والانثى فيها سواء . والجمع بهم وبهام وبهامات .
قال الازهري اما اسنان الغنم فساعة قصعها امها من
الضأن والماعز ذكراً كان او انثى سملة وجمعها سمال .
ثم هي بهية فاذا بلغت اربعة اشهر وفصلت عن امها فا
كان من اولاد الماعز فهو جفار واحدها جفر فاذا رعى
وقوى فهو عريض وعتود وجمعها عرضان وعتدان . وهو
في كل ذلك جدي والانثى عناق ما لم يأت عليها الحول .
وجمعها عنق . والذكر تيس اذا اتي عليه الحول والانثى
عنز . ثم تجلع في السنة الثانية فالذكر جذع والانثى جذعة .

٤٢٤٠ - بَهْشِيَّةُ أَيْضُ Béhen blanc (F).

راجع قنطريون بهمن . White behen (E).

٤٢٤١ - بَهْشِيَّةُ ٥* Mammoth (F). Mammoth (E).

هو الماموث ، اطلبه .

٤٢٤٢ - بَهْشِيَّةُ ٥* Boute-en-train (F).

الفحل الذي تمرض عليه الاناث ولا يحمل عليها . Merry-making (E).

٤٢٤٣ - بَهْشِيَّةُ ٥* Cataseta (S). Cataseta (F).

جنس نباتات امسية او مربابية من السحليات . انواعها
المعروفة قليلة العدد جميعها برية وتزيينية مهددا بعض
مناطق امريكة الاستوائية || اوراقها قرصية الانتشاب ،
كبيرة النصال ، غبراء الخضار . ازهارها كبيرة ، بخيلة ،
خلافة || تزرع في المراكن لكنها تحشى البرد .

٤٢٤٤ - بَهْشِيَّةُ ٥* Callidium (S). Callidia (F).

جنس حشرات من فصيلة القرنبيات . انواعه عديدة تتميز
بطول قرونها الاستشعارية ، بالوانها الزاهية وبقلة اذها .
اعرفها واعها انتشاراً ما يلي .

٤٢٤٥ - بَهْشِيَّةُ بَنَفْسَجِيَّة* Callidium violaceum (S).

Callidia violette (F).

خنفساء طولها من ١٠ الى ١٥ مم . لونها الى البنفسجي

والبيضاء الثمر . علوها يراوح من ٥ الى ١٥ م اوراقها
كبيرة ، معتقة ، جلدية النصل الباهت الخضار ، ثلاثية
التقرين ، قرونها شائكة || ازهارها متوسطة القد معتقة .
ثمارها عنبية يستخرج منها مادة دبقية رائحة الاستعمال .
ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٤٢٤٦ - بَهْشِيَّةُ الشاي* ، شاي براغواي ، ماتى

Ilex Paraguensis (S). Houx du Paraguay, Thé du Paraguay, Maté (F). Paraguay tea, Mate (E). Paraguaytee, Mate strauch (D). Agrifoglio emetico, A. Paragua, Falso tè, Tè del Gesuiti (I).

شجرة كبيرة القد تملو من ١٥ الى ٢٠ م . مهددا البلاد
الامريكية تعيش في المواقع الرطبة الممرضة للشمس .
اوراقها معتقة ، متعاقبة ، مستعرضة الزام الاخير ،
نصلها امرط البشرة ، خفيف التسنين اخضر الصفحة
العليا ، عابق السفلى || ازهارها رباعية التركيب
والجميع . ثمارها حمر || اوراقها صميصة صناعية
تستعمل استعمال الشاي .

٤٢٤٧ - بَهْشِيَّةُ جُذْلَة Ilex opaca (S).

Houx touffu (F).

شجرة كبيرة القد تملو نحو ١٢ م . اوراقها سنديانية
الشكل ، شائكة ، لونها الى الخضار الزاهي || ازهارها
نورية ابوية . ثمارها حمر او صفر . ازهارها يستمر
من نيسان الى حزيران .

٤٢٤٨ - بَهْشِيَّةُ حَلْقِيَّةُ الْوَرَق Ilex verticillata (S). Houx verticillé (F).

شجرة صغيرة متوسطة ارتفاعها نحو ستة امتار . اوراقها
احليلجية ، حلقة الارتكاز ، نصلها لاقياسي التسنين ،
ازغب الصفحة السفلى || ازهارها نورية التجميع .
ثمارها حمر او صفر . ازهارها يدوم من حزيران الى تموز .

٤٢٤٩ - بَهْشِيَّةُ عَابِلَة Ilex decidua (S).

Houx à feuilles caduques (F).

شجرة متوسطة القد تملو نحو ثمانية امتار . اوراقها عابلة
ضيقة القاعدة ، مدببة القمة ، قليلة التسنين . نصلها
ازغب الصفحة السفلى || ازهارها نورية التجميع . ثمارها
برتقالية اللون . ازهارها في ايار .

٤٢٥٠ - بَهْشِيَّةُ مَرَطَاء Ilex glabra (S).

Houx glabre (F).

جنية صغيرة القد تملو نحو المتر . اوراقها صغيرة رباعية
الاسنان الشائكة ، جلدية النصل الامرط ، لونها الى
الخضار الاسفع || ازهارها ابوية ، فردية ، صغيرة .
ثمارها سود . ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

٤٢٥١ - بَهْشِيَّةُ مَلَسَاء Ilex levigata (S).

Houx lisse (F).

شجيرة تملو نحو ثلاثة امتار . اوراقها مستطيلة ، طولها
بوازي ثلاثة اصناف عرضها ، نصلها امس البشرة ،
عريض التسنين ، باهت الخضار || ازهارها فردية
التجميع . ثمارها برتقالية اللون ، ازهارها يستمر من
ايار الى حزيران .

٤٢٥٢ - بَهْشِيَّةُ ٥* Ladre (F). Measle (E).

هو في الخيل بياض الجلد حول المنافذ الطبيعية كالانف
والقن والشفة والجنب .



بَهِيَّةٌ ثَنَائِيَّةُ اللَّوْنِ



بَهِيَّةٌ دُمُورِيَّةٌ



بَهِيَّةٌ مَلَوَانَةٌ



بَوَّابٌ



بَوَّابٌ

الاسفع يعلوه موج احمر. تعيش على اخشاب الصنوبر المقطوعة اليابسة. يرقاتها دقيقة مستطيلة سمراء اللون تعيش تحت اللحاء.

٤٢٤٦ - بَهِيَّةٌ تِرْنَال (S). Cataseta ternala (S). Catasète de Ternal (F).

نوع من البهية الزراعية التزينية. مهدها بلاد البيرو وقد انتشرت زراعتها الواسية في جميع اقطار البلاد الباردة والمعتدلة الحرارة || اوراقها قرصية الانتشاب، مستطيلة، مضلعة. ازهارها زنادية الارتكاز، خلاصة الشكل، جميلة الالوان الزاهية || تزرع في المراكب البيتية.

٤٢٤٧ - بَهِيَّةٌ ثَنَائِيَّةُ اللَّوْنِ*

Callidium bicolor (S). Callidie bicolore (F). Callidium bicolor (E).

حشرة خاضعة خاشبة مؤذية من فصيلة القرنييات ورتبة مفدمات الاجنحة. تألف احراج الشربين والسرو والسنوب. خنافسها تعيش على اوراق النباتات المختلفة. يرقاتها تركيب جذوع الاشجار اليابسة فتسردب اللحاء والشكبر || جسمها متوسط القد يطول من ١٠ الى ١٥ مم. ثوبها ثنائي اللون ازرق الرأس والكوسل والجرامز، جزوي البطن والظهران والزبان || لها جيل واحد في الحول. تسرح في النهار وتبيت في الليل || يرقها خاشبة تطول من ١٧ الى ٢٥ مم. جسمها محدوب الظهر مبسط المدب، قصير الرواجب. ثوبها الى السمرة الخنطية يعلوها موج اصفر وتنقيط اسمر يمتد من الحلقة الصدرية الثالثة الى سكة الشرج. رأسها شديد السمرة || طور الاكمال الذي يستمر من ٣٠ الى ٣٥ يوماً ينقضي ضمن صليجة خاوية مركبة من فئات المواد النباتية المعجونة بالريال.

٤٢٤٨ - بَهِيَّةٌ دُمُورِيَّةٌ* Callidium sanguineum, Pyrrhidium sanguineum (S). Callidie sanguine (F). خنفساء طولها من ٩ الى ١٢ مم. زباء الاغداد، ثوبها الى الجؤوة الزاهية تعيش على اخشاب الصنوبر. يرقها مستطيلة حنطية اللون، سمراء الرأس تعيش تحت اللحاء وفي الشكبر.

٤٢٤٩ - بَهِيَّةٌ مِلَوَانَةٌ* Callidium variabile (S).

Callidie variable (F). Callidium variabile (E). حشرة خاشبة مؤذية من فصيلة القرنييات ورتبة مفدمات الاجنحة || جسمها معتدل القد يطول نحو ١٢ مم. رأسها اسود اللون. تأشيرها وجرامزها الى الصلبة. كوسلها يرتقالي تتوسطه نقطة سوداء. غمداها منمشان بالازرق العايق. بطنها اسود الوسط، اشهب الاطراف || يرقها خاشبة، غبراء اللون، قوية التأثير القاضمة. تعيش على الاخشاب المقطوعة اليابسة فتسردبها وتمطبها.

٤٢٥٠ - بَهِيْسَمَةٌ، حيوان، دابة، زاهلة

Bête (F). Beast (E).

٤٢٥١ - بَهِيْسَمُوت Hippopotame (F).

Hippopotamus (E). مي فرس البحر.

٤٢٥٢ - بَوَّاءَ*

Boa جنس ثعابين عظيمة من فصيلة الاصليات. انواعه المعروفة خمسة جميعها امريكية. المهذ تتميز باستطالة جسدها التي تبلغ ستة امتار. وهي من الحيات غير السامة التي تبتلع فريستها.

٤٢٥٣ - بَوَّائِيَّاتٌ Boidae (S).

Boidés (F). Boidae (E).

فصيلة حيات من عديمات الاغاديد والسموم. بعضها بيوض والبعض الآخر سرلود. اجناسها وانواعها عديدة تجسمها حسب التصنيف الحديث عمارتان: عمارة المزعاميات وعمارَة الاصليات || جميع انواعها تعيش في المناطق الحارة او الاستوائية. اجسامها ضخمة، كبيرة، وبعضها عظيم القد يطول من ٦ الى ١٠ امتار || معظمها دجوي المسرح وبعضها يسرح في النهار. قوتها الحيوان والطير والاسماك. تبتلع فرائسها بعد سحقها.

٤٢٥٤ - بَوَّاب Pylore (F). Pylorus (E).

البوَّاب هو فم المعدة اي الفوهة التي يندفع منها الثفل. مركزه بين المعدة والمعج.

٤٢٥٥ - بَوَّارِز Phanères (F). Phanerous (E).

البوارز او بوارز الجلد هي الاعضاء التي تبرز من الجلد كالشعر والريش والافافير والاسنان الخ.

٤٢٥٦ - بَوَّاع Sporophore (F). Sporophore (E).

البواع اسم يطلق على كل عضو يحمل البوغ ان في الفطور ام في السراخس وغيرها.

٤٢٥٧ - بَوَّاكِير، طلائع Prémices (F).

First-fruits, Firstlings (E).

هي اول غلات الارض وهي ايضاً اول نتاج الحيوانات.

٤٢٥٨ - بَوَّال Polyurie (F). Polyuria (E).

هو كثرة ادرار البول. ويحصل هذا العارض للفرس في زمن الودقان.

٤٢٥٩ - بَوَّالِح Terrains délaissés (F).

Abandoned ground (E).

البوالح: الارض التي قد عطلت فلا تزرع ولا تعمّر (السان).

٤٢٦٠ - بَوَّابٌ*، بَوَّابٌ، حَبَّابٌ، عَمَّارَةٌ،

تَبَلْدِي، حَمِيرَاءٌ، شَجَرَةُ خَبِزِ الْقُرُودِ،

أَدَنْسُون، أَدَنْسُونِي Adansonia (S).

Baobab, Adansonie, Pain de singe (F). Baobab, Monkey bread, Sour gourd (E). Baobab, Adansonie affenbaum (D). Baobab, Albero di mille anni, Noce d'Egitto (I).

كلمة «بوياب» تعني الف سنة. وهو جنس من الاشجار الحرجية الوحداية العظيمة الدوحة من فصيلة الجبازيات الزغبية || انواعه عديدة اشهرها ثلاثة:

البوياب الافريقي او الاصبعي Adansonia digitata (S).

البوياب الاسترالي Adansonia grandidieri (S).

البوياب المدهسكري Adansonia madagascariensis (S).

جميعها من اشجار البلاد الحارة تملو نحو ١٠ امتار وتفرش

نحو ٥٠ م. ساقها ضخمة جداً يبلغ قطرها نحو ثمانية امتار.

اما قطر دوحته فلا يقل عن ٥٠ م. اغصانها عظيمة،

افقية الامتداد يراوح طولها من ٢٠ الى ٢٥ م. جذورها

غلظة جداً، عرضية الارتكاز، طولها يبلغ ضعف طول

الاغصان. اوراقها راحية، اصبعية، خماسية الفلق.

ازهارها كبيرة القد. كؤوسها خضراء اللون من الداخل،

بتلاتها خماسية غبراء اللون، اسديتها عديدة لونها الى

ربعة . مناقبها صغيرة . اثنائها متباينة الالوان الزاهية الساطعة || اعرف اجناسها واشهرها المنكان .

٤٢٦٧ - بوتاس Hanneton japonals (F).
Japanese may-bug (E). راجع جعل ياباني .

٤٢٦٨ - بوتاس Prunelle (F). Eyeball (E).

٤٢٦٩ - بوتاس Pupille de l'oeil (F).
Pupil, Apple of the eye (E).



بوتاس

٤٢٧٠ - بوتاس Rhinorhina (S). Rhinorhina (F).

بوتاس هو الاسم المشهور في الهند وجزر الزايج . جنس طير من فصيلة القيقوبيات . انواعه المعروفة قليلة اعطائها تمتد من الهند الى ماليزية وصومترا . تألف الغابات وصفاف بحاري الماء . قوتها الحشرات واساريها ويرقاتها وبعض الثمار || اجسامها تطول من ٢٧ الى ٣٥ سم . تتميز بكبر واستطالة اذنانها المستديرة الاطراف . رؤوسها معتدلة الجرم مناقبها مخززية مدببة . اجنحتها ذلقة الاطراف . اثنائها متراكبة الالوان الجميلة || اشهر انواعه واكثرها انتشاراً البوير الاصفر (Rhinorhina chlorophæna) رأسه وعنقه وصدره الى الصفار الكبريتي . رداؤه وجناحاه وبطنه وذنبه الى الخضار الزاهي يعلوه في ذنبه اربع جدات معترضة سوداء اللون يتاخمها ثقبين اصفر نصف دائري الشكل || الانثى اقصر ذنباً وابنت ثوباً من الذكر .



بوتاس الطين

٤٢٧١ - بوتاس Aubépine noire (F). Black thorn (E).

قال ابو حنيفة البوت من شجر الجبال ونباته نبات الزعرور وكذلك ثمرته الا انها اذا اينعت اسودت سوداً شديداً وحلت حلاوة شديدة ولها عجة صغيرة مدورة . وهي تسود فم آكلها ويد مجتنها وثمرتها عنقيد كعنقيد الكباش والناس يأكلونها . واحدها بوتة .

٤٢٧٢ - بوتاس Potasan «ج»

حاشور زراعي مائع شديد الفاعلية والنشط يستعمل في مكافحة الدوريفور (خنفساء البطاطا) || مادته الفعالة مركبة ترتكز على استر حامض الكوبارين الفسفوري مع الليندان || يستعمل بمعدل ٣٠٠ سم ٣ في ٦٠٠ لتر ماء الهكتار الواحد وهو من الحواشير السامة التي تستوجب العناية والحذر .



بوتاس

٤٢٧٣ - بوتاس Potazote

سماد بوتاسي مركب من عنصري البوتاس والازوت يحوي ٢٤٪ كلوريد البوتاس و ١٢٪ ازوت امونياكي .

٤٢٧٤ - بوتاس Potasse (F).

Potash (E). هو اكسيد البوتاسيوم . يعتبر من النجوة الزراعية عنصر الغذاء الثالث ، بعد الازوت والحامض الفسفوري . يدخل في تكوين جميع الزلايات في جميع النباتات من الحفيرة الى العظيمة || ميزاته الجنسية عديدة اهمها قوة الادخار في الثمار والحبوب . تحسين الصنف والادلاء عن كامل صفاته الباطنية والخارجية . حث الشعور الماصة والجذيرات والوعية النسجية على نقل الماء من التربة تخفيفاً لوطأة النتوح . صد شوائب القيقض المضني لانه يمكن الخلايا من احماله بقوة . اشتراكه المجدي مع الحامض الفسفوري في الحد من شذوذ الازوت . تنشيطه المناعة

الحمرة || ثمارها بيضوية الشكل برتقالية اللحم . لها حامض مز ، يزورها دهنية || اوراقها وبوادرها وازهارها ولب ثمارها وعجمها شائعة الاستعمال المنزلي والصناعي والطبي .

٤٢٦١ - بوتاس * سلتون الصخر

Cancer pagurus (S).
Crabe dormeur, Houvet, Poupert, Tourteau (F).

نوع من السرطان . حيوان بحري من القشريات عشاريات الارجل قصار الذيل المحرسمات . اعطانه معظم شطوط بحار العالم يعيش على الخشاف والصخور المطروقة غير المنسورة || جسمه شبه مربع الشكل ، طوله نحو ١٦ سم . وعرضه نحو ٢٠ سم . درعه قليل الاحديداد . يتميز بخطمه المحرسم وبمقلطيه الصليعين || لحمه جيد الصنف مرغوب فيه .

٤٢٦٢ - بوتاس Muscicape (F).

Muscicapa, Fly catcher (E).
هي خطاف او خاطف الذباب ، اطلبه .

٤٢٦٣ - بوتاس الطين Muscicapa striata (S).

Gobe-mouches gris (F). Spotted fly-catcher (E).

عصفور حاشر من فصيلة المذبذبات . اعطانه تمتد من الشرق الاوسط الى اروبة الغربية . يألف السواحل في الشتاء ويحبب الوسط والجروود في الربيع والصيف || جسمه صغير القد يطول نحو ١٥ سم . بسطته نحو ١٧ سم . ثوبه الى الكهبة السمر . رأسه موشم بالاسود . زوره وصدره وايطلاه الى البياض الاغبر تعلوه رقشة سمر . بطنه اغبر اللون عادم الرقشة . حدة عينه ومنقاره وقائمته الى السمرة السوداء || يألف الحراج والحدائق والبساتين ويتردد باستمرار على المواقع التي يكثر فيها الطين لالتهام ما يحوم بقرها من ذباب || قوته الحشرات اخصها الذباب والبعوض والهوم || يعيش ذكراً وانثى لا يفترقان حتى الموت . يدشن عشه في الاشجار الدغلة . الانثى تحضن بمناوبة الذكر من ٤ الى ٦ بيضات . الترخيم يستمر نحو ١٤ يوماً || يعتبر من المصافير الكثيرة النفع الواجب حمايتها .

٤٢٦٤ - بوتاس

نبات يستعمل اصله وصنعه في معالجة الجراح والقروح (اقرب الموارد) .

٤٢٦٥ - بوتاس Bobartia (S).

Bobartie (F). Bobartia (E).

جنس نباتات عشبية دوقسية من فصيلة السوسنيات . انواعها المعروفة اثنان مهدها بعض مناطق افريقية الجنوبية . اوراقها اسلية الشكل . ثماريخها شبه اسطوانية تحمل في قمها ضلمات من الزهر الاصفر تكتنفها قنابات كبرى وصغرى . بتلاتها صغيرة سريعة الذبول . اما تتابع الازهار فيستمر نحو ثمانية اسابيع || تزرع للتزيين في المراكن والحدائق . ترغب في الاتربة الخفيفة الوافرة المواد الغذائية || تنويرها سيقي .

٤٢٦٦ - بوتاس بيتاس

Pipridae (S). Pipridés (F). Pipridae (E).

فصيلة طير من الجواثم سنّيات المناقير . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة . موطنها بعض مناطق امريكا الجنوبية والوسطى . تألف الغابات الرطبة والحياة الجماعية || اجسامها

عفصية حراء اللون تستعمل في تطيب الجهاز الهضمي .
وان اعتراها بقعة الملك حولت عصارتها العفصية المائعة الى
لك غروي لزج يعتبر من اجود اصناف الملك .

٤٢٨٣ - بوث **Déblai (F). Clearing (E).**
البوث : ما استخراج من الارض كالتراب والحجارة .

٤٢٨٤ - بُور **Bore (F). Boron (E).**
جسم بسيط شبه معدني رمزه (B) وزنه الذري ١٠,٨٢
ثقله النوعي ٢,٤٥ مسحوق اسمر اللون عديم
التبلور والانصهار || يمتزج مع اشباه المعادن والمعادن .
مقدوره التحليلي انشط من الكربون .

٤٢٨٥ - بُور، بالرة **Friche (F).**
Waste or fallow land (E).
الارض البور والبالرة هي التي تركت بلا زرع لسبب ما .

٤٢٨٦ - بُورق **Borax**
ملح معدني طبيعي مركب مع الصوديوم يكثر وجوده في
التبت وايران وكليفورنيه . ثقله النوعي ١,٧ صلابته من
٢ الى ٢,٥ وهو قلوي المذاق تقببه الحرارة . فوائده
الاقتصادية كثيرة يستعمل في عدة صناعات .

٤٢٨٧ - بُورق ارمي **Salpêtre (F).**
Saltpetre (E).
الطلب ملح البارود .

٤٢٨٨ - بُورُونِيَّات **Boroniées (F). Boronleae (E).**
سبط من فصيلة السذابيات اجناسه وانواعه قليلة العدد
منبها استراليه وتسمانيه معظمها جنبات وجنبيات معمرة
جميلة الازهار تستعمل للتزيين .

٤٢٨٩ - بُورُونِيَّة * **Boronia (S). Boronie (F).**
جنس نباتات تزيينية من الفصيلة السذابية . جميعها مجل
وجنبيات صغيرة دقيقة السوق المنتصبة المستطيلة . اوراقها
متقابلة مركبة ريشية . وريقاتها شفعية الانتظام .
ازهارها خنثوية ، فردية ، ابطية ، زنادية ، رباعية
البتلات والاسدية . جميعها عطرية ساطعة العرف عديدة
الالوان .

٤٢٩٠ - بُوري **Focal**
هو ما كان مختصاً بالبؤرة اي مركز اجتماع الاشعة .

٤٢٩١ - بُوري * ، بِيَّاح **Mugil (S).**
Muge, Mulet, Mullet (F). Mugil, Grey mullet (E).
جنس سمك مأكول من فصيلة البوريات . انواعه عديدة
نحو ٧٠ منها الفضي والمذهب والغليظ والنطاط . جميعها
اسطوانية الشكل مستطيلة . طولها يراوح من ٣٠ الى ٧٠ سم .
حراشفها كبيرة مستديرة . زعانفها سبع . الذيلية فرقاء .
يكثر وجود بعض انواعها على الشواطئ اللبنانية السورية
من الناقورة الى اللاذقية .

٤٢٩٢ - بُوري عريض الرأس * ، بِيَّاح فيضي **Mugil cephalus (S). Muge céphale, M. à grosse tête, Mulet cabot (F). Striped Mullet (E).**

سمكة بحرية بيوض من فصيلة البوريات شائكات الزعانف .
اعطانها البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي . تعتبر من
اسماك الشبوط والحداد والرزان المفترسة . ملجئها الحياتي

الجبليّة الذاتية التي تمكن النبات من مقاومة الامراض
الجرثومية والافصام الفطرية || اما الاسمدة البوتاسية
فتقسم الى قسمين : الاسمدة المعدنية والاسمدة العضوية .
فئة الاسمدة المعدنية تشمل كلوريد البوتاس ، سلفات
البوتاس ، نترات البوتاس ، السيلفيت ، النيتروپوتاس
والبوتازوت || اما فئة الاسمدة العضوية فتشمل رماد الخشب .
رماد الفحم الحجري ، رماد التراب ورماد الفوقس .

٤٢٧٥ - بُوتاسِيُوم ، بُوتاسِيُوم **Potassium**
معدن قلوي رمزه الاتومي ١٩ ، رمزه (K) ثقله
النوعي ٠,٨٧ وزنه الذري ٣٩,١ وهو لين كالشمع
بحرارة ١٥ درجة وما فوق ، صلب وسريع القصف بحرارة
دون ١٢ درجة . ينصهر بحرارة ٦٣ درجة ، ينلي ويتبخّر
بحرارة ٧٠٠ درجة . مكسره لامع كالفضة . يكمد عند
هدرجته بالهواء . يتأكسد ويمتزج بالكلور والكبريت
وغيرهما فينتج عن ذلك تراكيب بوتاسية مختلفة التركيز
ودرجات النقاوة تستعمل في الزراعة لتغذية النبات بعنصر
البوتاس .

٤٢٧٦ - بُوتاني **Botaniste (F). Botanist (E).**
هو من اختص بعلم النبات اي البوتانيك .

٤٢٧٧ - بُوتانيك **Botanique (F).**
Botany, Botanical (E).
هو علم النبات .

٤٢٧٨ - بُوتَقَة ، بُودَقَة **Coupelle (F). Cupel (E).**

٤٢٧٩ - بُوتَنِيَّة * **Potentille (F). Potentilla (E).**
جنس نباتات عشبية من الشيلكيات وفصيلة الورديات
انواعه عديدة منها برية طيبة ومنها زراعية تزيينية . اوراقها
مركبة ريشية او ثغلية او اصصية الشكل . ازهارها جميلة
مختلفة الالوان فيها الابيض والاصفر والاحمر . كؤوسها
فارشة ، مزدوجة الفصل ، خاسية البتلات . اسديتها
عديدة . مياسها جانبية الارتكاز قصيرة . راجع عشبة القوى .

٤٢٨٠ - بُوتُو الأمازون * ، إِنِيَا **Inia**

geoffroyensis (S).
Inia, Boutou de l'Amazon (F). Inia (E).
حيوان مائي ولود ليون من فصيلة الجبعليات ورتبة الحوتيات .
اعطانه نهر الامازون في امريكا الجنوبية . قوته الاسماك ||
جسمه شبه اهليلجي الشكل ، مستغلف البطن . يطول نحو
٢٠٠ سم . الشطر الاعلى من جسمه الى الزرقة القائمة .
الشطر الاسفل والبطن الى الوردي . رأسه معتدل الجرم ،
واضح المعالم والحدود . شغلته جالس مستطيل يملوه بعض
الطلب الجامد . اسنانه كثيرة ، ذرية . عيناه صغيرتان ،
ماصتان . نيسه نفرة تتوسط الجبهة . زعنفته الظهرية
صغيرة ، متأخرة . زعنفته الصدرية سنائيتا الشكل .
اما الذيلية فكبيرة ، فارقة ومتساوية الفلق || لحمه متوسط
الصنف ، مأكول .

٤٢٨١ - بُوتِيَّة **Butea (S). Butée (F). Butea (E).**
جنس اشجار وجنبيات عارشة من فصيلة القرنيات الفراشية
منبها البلاد الاسيوية الاستوائية . اشهر انواعها بوتية الملك .

٤٢٨٢ - بُوتِيَّة الملك * **Butea frondosa (S).**
Butée, Arbre à laque (F). Palas tree, Bastard
teak (E). Kinobaum, Lackbaum (D). Butea (I).
نوع من البوتية يستخرج من ساقها بالحز عصارة صمغية



بوتنتيلا



بوتو الامازون



بوتية الملك



بورونية



بوري



بوري عريض الرأس

٤٣٠١ - بَوْصُ - Robe (F). Coat (E).

البوص هو لون الثوب في الدواب والاعنام .

٤٣٠٢ - بَوْص - Roseau commun (F).

هو القصب . Common reed (E).

٤٣٠٣ - بَوْص فارسي - Canne de Perse (F).

هو القصب الفارسي . Persian cane (E).

٤٣٠٤ - بَوْصِيَّة - Plastide (F). Plastid, Plastidium (E).

هي البلاستيد مجموعة معظم مواد الخلية الحية . وهي أيضاً وظيفة الخلية بالنسبة الى قدرتها على التطور والنشوء .

٤٣٠٥ - بَوْصِيَّة عادية اللون - Leucoplaste (F).

مواد الخلية العادية اللون . Leucoplast (E).

٤٣٠٦ - بَوْصِير*، بَوْصِيرَا، آذان الدب، مُسْكِر - Verbascum (S).

الحوت

Molène, Bouillon blanc (F). Mullein, Cow's lungwort (E). Wollkraut, Königskerze (D). Verbascum, Tassobarbasso (I).

جنس نباتات عشبية برية حولية ومحولة من البوصيريات وفصيلة الخنازيريات . انواعه عديدة نحو ١٠٠ جميعها أعشاب برية بعضها طربي يكثر وجوده على جوانب الطرقات وفي السياجات || سوقها ليفية زباء منتصبه . اوراقها زغبية ، متعاقبة ، حاضنة ، بيضيه ، سنانية الزام الاخير . ازهارها عنقودي ار سنبل التجميع ، تاجي الارتكاز . ازهارها زغبية صغيرة سريعة الزوال . خاسية البتلات والاسدية ، صفراء او صهباء اللون . اعرف واشهر انواعه ما يتبع .

٤٣٠٧ - بَوْصِير أبيض، مكنسة الأندَر - Verbascum Thapsus (S). Molène blanche, Bouillon-blanc (F).

عشبة محولة منتصبه الساق تعلو من متر الى مترين . ساقها وفروعها خلية كثيفة الزغب الابيض والاصفر . ازهارها صفراء اللون . ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

٤٣٠٨ - بَوْصِير أسود، لَسِيْدَة سَوْدَاء - Verbascum nigrum (S). Molène noire, Bouillon-noir (F).

عشبة محولة منتصبه الساق ، قصيرة الفروع ، تعلو من ٥٠ الى ١٢٠ سم . ساقها وفروعها واوراقها وازهارها زغبية البشرة . ازهارها بنفسجية البتلات صفراء الكؤوس . ازهارها يدوم من ايار الى آب .

٤٣٠٩ - بَوْصِير لَيْد، لَسِيْدَة، بُزَيْر - Verbascum alatum (S). Molène allée, Blanc de Mai, Cierge de Notre Dame (F). Called also (E).

عشبة محولة منتصبه الساق تعلو نحو ٢٠٠ سم . ساقها زباء ، فروعها كثيفة خلية اللحم . اوراقها شديدة الخضار ازهارها الى الصفار الزاهي يعلو موج وردي . ازهارها يدوم من ايار الى ايلول .

٤٣١٠ - بَوْصِير مُسْكِر - Verbascum sinuatum (S).

Molène sinueuse, Herbe de St. Fiacre (F). Moth-mullein (E).

عشبة محولة منتصبه الساق تعلو نحو ١٥٠ سم . ساقها وفروعها زباء اللحم . اوراقها شديدة الخضار . ازهارها بنفسجية . ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول . ثمارها طيبة ، يقال انها مسكرة .

جامعي || جسمها اهليلجي الشكل يطول من ٥٠ الى ٧٠ سم . ثوبها الى الرعدة الفضية . ظهرها الى السمرة ويعلوها في جانيها بعض الخطوط الضيقة القاطبة الشديدة السمرة . زعانفها بحرية اللون زرقاء الموج . رأسها مخروطي الشكل . شدتها ضيق الانفراج . عينها كبيرتان ، جاحظتان . زعانفها متباينة الاشكال ، الظهرية اثنتان ؛ الذيلية فارقة || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٤٢٩٢ - بوري مذنب*، بَسَّاح مَذْهَب - Mugil auratus (S). Muge doré, Mulet doré, Daurin (F). Common grey Mullet (E).

نوع من البوري . سمكة بحرية بيوض . اعطانها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي وبحر الشمال . تعتبر من اسماك اغواط النفاف . ملجئها الحياتي شرمي || جسمها اهليلجي الشوزن يطول من ٤٠ الى ٦٠ سم . ثوبها الى الرعدة الفضية الزرقاء الموج يصفر عند الظهر ويغبر عند البطن . خطها الجانبي حنطي اللون ، اصفر الموج . رأسها مخروطي الشكل ، ضيق الخطم القصير . شدتها قليل الانفراج . اسنانها صغيرة ، ثلاثية الصفوف في الفكين . عينها كبيرتان ، جاحظتان . زعانفها الظهرية اثنتان . زعنفتها الذيلية هلالية التقعر || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٤٢٩٤ - بوريَّات - Mugilidae (S).

Mugilids (F). Mugilidae (E).

فصيلة اسماك من العظميات الشائكات الزعانف اجناسها وانواعها عديدة اشهرها البوري .

٤٢٩٥ - بوريَّطش - Pyrite (F). Pyrites (E).

راجع بيريت .

٤٢٩٦ - بوزيدان - Orchis

هو السحلب نبات تزييني جميل الزهر .

٤٢٩٧ - بَوْسَنُطْلُط - Boussingaultite (F).

هو المزيج الطبيعي المزدوج من سلفات الامونيكا والمنيزا .

٤٢٩٨ - بَوْسَنُطْلُطِيَّة - Boussingaultia (S).

Boussingaultie (F). Madeira vine, Mignonette vine (E). Knollige beerblume (D). Boussingaultia (I).

جنية عارشة معمرة عشقولة الجذور من فصيلة البازيليات . مهدا امريكه الجنوبية . اوراقها متعاقبة ، قلبية ، سمكة النصل . ازهارها سنبل التجميع ، ابطي الارتكاز . ازهارها خشوية صغيرة القد ، بيضاء اللون ، فواحة العرف . تزرع للتزيين .

٤٢٩٩ - بَوْسِيدَان - Peucedanum (S).

Peucedan (F). Peucedanum (E).

جنس نباتات معمرة من فصيلة الصيوانيات . انواعه عديدة معظمها نباتات عشبية وفيها بعض الجنبات . اوراقها مختلفة الاشكال والانتظام . ازهارها خيمية بيضاء او صفراء اللون || انواعه العشبية مرعوية تمتلئها الماشية ومنها طيبة .

٤٣٠٠ - بَوْسِيدَانِيَّات - Peucedanéés (F).

Peucedaneae (E).

سبط من الفصيلة الصيوانية انواعه عديدة اكثرها نباتات عشبية برية وطيبة منتشرة في جميع الاصقاع المعتدلة الحرارة .



بوري مذنب



بوسير

٤٣٢٣ - بُوْغَاء Arôme, Odeur (F).
Aroma, Odour (E).
البوْغام هي الرائحة . يقال ارتفعت بوْغاء الطيب .

٤٣٢٤ - بُوْغَاد Boghead (F). Boghead (E).
البوْغاد وقيد معدني يعود الى جيوب من الخثيات المتراكمة المتحجرة . وهو يعطي من ٥٥ الى ٦٠ ٪ مواد متبخرة ، ويعتبر أجود أنواع فحم الغاز المعروف حتى الآن .

٤٣٢٥ - بُوْغَاة Buglosse officinal,
Langue de bœuf (F). Common alkanet (E).
هو الانشوزة المخزنية ، اطلبها .

٤٣٢٦ - بُوْغُلُصْنُ أَزْرَق Buglosse, Bourrache
bâtarde (F). Sea bugloss (E). اطلبها .
هو الانشوزة ، اطلبها .

٤٣٢٧ - بُوْغُلُصْنُ الصَّبَاغِيْن Orcanette-vipérine (F).
Dyer's bugloss (E). اطلبها .
هو الشنجار الصباغي : اطلبها .

٤٣٢٨ - بُوْغُلُصْنُ مَخْزُونِي Buglosse officinal,
Langue de bœuf (F). Common alkanet (E).
هو الانشوزة المخزنية ، اطلبها .

٤٣٢٩ - بُوْغُلُصُونِيَّات Anchusées (F).
راجع انشوزيات .

٤٣٣٠ - بُوْغُلُصِيَّةٌ *، جَهَنْمِيَّة Bougainvillea (S).
Bougainvillée, Bougainvillier (F). Bougainvilla (E).
Drillingsblume (D). Bougainvilla (I).
جنبه معمرة شائكة معترشة تزيينية من فصيلة الشيات مهدها أمريكة الاستوائية . اوراقها بيضية معنقة متعاقبة . ازهارها محورية ثلاثية التركيب يجمعها زناد قصير لوها انعادي الى الحمرة البنفسجية الموج منها ضروب وردية اللون وصفراء وحمراء .

٤٣٣١ - بُوْغِيَّ، كَنْبِيْدِي Conidien (F).
Conidian (E).
نمت تعريبي يطلق على ما هو بوغي التركيب او الشكل .

٤٣٣٢ - بُوْغِيَّات ، غُبِيْرِيَّات Sporozoaires (F).
Sporozoa (E).
شعبة من الحيوانات الدنيا الاوالي .

٤٣٣٣ - بُوْغِيَّات دَمَوِيَّة Hémosporidies (F).
Hemosporidia (E).
رتبة من البوغيات الاوالي تشمل البوغيات الطفيلية التي تعيش في كريات الدم .

٤٣٣٤ - بُوْغِيَّاتُ مَخْطَاطِيَّة Myxosporidies (F).
Myxosporidia (E).
هي البوغيات التي تعيش بوجه عام كطفيليات على الاسماك .

٤٣٣٥ - بُوْغُرْدِيَا * Bouvardia (S). Bouvardie,
Egnetier (F). Bouvardia (E). Bouvardia (I).
جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة الفويات مهدها بلاد المكسيك انواعها قليلة جميعها اشباب وجنبات ليفية حزمية منها الجرداء اللحاء ومنها الزغبية ازهارها جميلة الشكل فيها الابيض والاصفر والاحمر . وهي تخشى الصقيع وترغب في المعاملة الحسنة .

٤٣٣٦ - بُوْغُرْسِيَا * Beaufortia
جنس جنبات برية وتزيينية من فصيلة الاسيات . انواعها المعروفة قليلة مهدها استرالية ومنها انتقلت الى معظم

٤٣١١ - بُوصِيرِيَّة Verbascées (F). Verbasceae (E).
سبط من الفصيلة الخنازيرية . نباتاته عشبية محولة زغبية اللحاء . اوراقها شاذفة متموجة النصل . ازهارها عنقودي او سنبل التجميع ، محوري او تاجي الارتكاز . ازهارها صغيرة القد ، زياء الاجزاء .

٤٣١٢ - بُوط *، بُوط رَفِيع ، حَقَا Typha angustata (S). Typhace, Massette, M. des étangs, Quenouille, Tontaque (F). Reed-mace, Small bulrush (E). Schmalen, Rohrkolben (D).

نبات جذموري مائي من البوطيات . اوراقه ضيقة مستطيلة شائعة الاستعمال الصناعي .

٤٣١٣ - بُوط عَرِيض *، دَاَدِي Typha latifolia (S). Masse d'eau, Massette à larges feuilles, Canne de jonc (F). Cat's-tail, Great reed-mace, Marsh-pestle (E). Breiter rohrkolben (D). Stiancia d'acqua, Mazza d'acqua, Tipha, Candela (I).

نوع من البوطيات وهو نبات جذموري مائي منته المناطق الحارة والمعتدلة . اوراقه صناعية شائعة الاستعمال .

٤٣١٤ - بُوطَاس Potasse (F). Potash (E).
هو البوتاس راجعه .

٤٣١٥ - بُوطُس Bothe (F).
هو الحرموس ، جنس اسماك بحرية ، اطلبه .

٤٣١٦ - بُوطُسُ الْمُتَوَسِّط Bothe de la Méditerranée (F).

هي حرموسة المتوسط ، اطلبها .

٤٣١٧ - بُوطِيَّات Typhaceae (S).
Typhacées (F). Typhaceae (E).

هي الفصيلة التي سماها الامير مصطفى الشهابي «بركيات» وكان جورج بوست قد اطلق عليها اسم «ذنب الهر» . وهي من وحيدات الفلقة تشمل عشرة انواع جميعها نباتات جذمورية مائية سوقها اسطوانية منتصبة . اوراقها حاضنة متعاقبة عصفية الشكل مستطيلة . ازهارها وحيدة المسكن هامة الارتكاز . ثمارها كذنب الهر المستقيم . اشهر انواعها البوط .

٤٣١٨ - بُوْع Ascospore (F). Ascospores (E).
هو جسم داخل الفقعة او نتوء صغير جداً يوجد في مستورات الزهر وظيفته حاية بوغيات التناسل اللاشي .

٤٣١٩ - بُوْع حيواني Zoospore (F).
Zoospore, Swarm-spore (E).

٤٣٢٠ - بُوْع خَارِجِي ، كَنْبِيْدَة Conidie (F).
Conidium (E).
هو البوغ الفطري الذي يكثر في الزقيات .

٤٣٢١ - بُوْع لَحْمِي ، سَرْكُوسُورِيْدِيَا Sarcosporidies (F). Sarcosporidia (E).
بدور كيسية توجد في لحم المواشي والخنازير .

٤٣٢٢ - بُوْع مُغْلَف ، يَكْنِيْد Pycnide (F).
Pycnid, Pycnidium (E).
هو جيب او غريفة جوفاء تحمل عضو التناسل في بعض الفطور الطفيلية . وهو احد اشكال الاخصاب والتناسل في النباتات الدنيا .



بوط



بوط عريض



بوغنيلية



بوفورديا



بوفورسيا



بوفونيا



برق



بوق النحل



بوق النسر



بوق



بوق



بوقير

٤٣٤٦ - بوقيصة*، عيشبة الابواق، عيشبة الاباريق
Sarracenia (S). Sarracénie (F).

جنس نباتات منقعية ترينية من فصيلة البوقيات مهدا
منافع امريكة الشمالية || انواعه قليلة ، جميعها جذمورية
معمرة قرصية الاوراق التي لا ترتفع عن الارض . اوراقها
اكواب منتصبة على شكل الابواق ، جميلة الهندام
مزخرفة الانوان . زهرتها وحيدة شمراخية ، خشوية ،
مستديرة الكأس ، عديدة البتلات السفلية الاشحام
البضوية الشكل ، صغيرة الاسدية ، مظلية الميسم .
يستخلص من اوراقها وجذاميرها مادة شبه قلووية تدعى
سراسنين «Sarracénine» || انواعها التريينية اربعة وهي :

Sar. pourpre (F).

بوقية أرجوانية

Sar. perroquet (F).

بوقية ببغالية

Sar. variolaire (F).

بوقية جدريه

Sar. de Drummond (F).

بوقية درومن

٤٣٤٧ - بوقيصة قبصرية
Fritillaire impériale (F). Crown Imperial fritillary (E).

تعرف باكليل الملك ، اطلها .

٤٣٤٨ - بوقيير*، أبو قريش، كلو
Buceros (S). Calao (F). Buceros, Hornbill (E).

جنس طير من الجواثم. الملتصقات الاصابع . انواعه قليلة
اعطائها المناطق الاستوائية الاسيوية والافريقية . جميعها
كبيرة القد ، غليظة المناقيد المستطيلة المسلحة بقرون
غضروفية التركيب تمتد من قمة الرأس الى منتصف المنقاد.
اثوابها متراكبة الالوان اللامعة . تألف الغابات الكثيفة .
قوتها الثار والمواد النباتية وبعض الحشرات والدويبات .
تدس في تجاويف الاشجار . اناثها تضع من ٤ الى ٥
بيضات تحضنها وحدها محجور عليها في عشها وذلك لان
الذكر يوصد مدخل العش بالطين تاركاً ما يلزم من فجوة
لمنقاد الانثى تستلبي به القوت طوال مدة الترخيم .

٤٣٤٩ - بوقيصا، دردار، شجرة البقي، ألم
Ulmus (S). Orme, Arbre de Moucheron (F). Elm
tree (E). Ulme, Ulmbaum (D). Olmo, Ulmo (I).

جنس اشجار حرجية من البوقيصيات تتميز باوراقها
اللاقياسية الشكل ، المشعة ، الثنائية التنسج . ازهارها
خشوية ، ثمارها مجنحة يابسة || انواعه عديدة اشهرها يلي .

٤٣٥٠ - بوقيصا جبلي، دردار جبلي، غرغار
Ulmus montana, U. scabra (S).

Orme montagnard, O. blanc (F). Wych elm,
Scotch elm, Mountain elm (E). Bergulme (D). Olmo
montana, O. rugoso (I).

شجرة كبيرة القد تعلو من ٢٥ الى ٤٠ م. اوراقها بيضيه
جامدة النصل . فروجها عديدة منها الهرمية والصيوانية
والمتدليلة الاطراف .

٤٣٥١ - بوقيصا حمراء*، بوقيصا حقلية، دردار
حقل، غرغار، غرغاج، غرغاشقي
Ulmus campestris, U. glabra (S). Orme champêtre,
Ormeau, Yvee (F). English elm (E). Feldulme, Rüster
(D). Olmo comune, Olmo gentile (I).

شجرة كبيرة القد تعلو من ١٥ الى ٣٠ م. اوراقها جامدة
صلبة لاقياسية الشكل والحجم || منافعها الطبية حميدة :

الاقطار . ازهارها جميلة الشكل عطرة بعضها ارجواني اللون
وبعضها ابيض أو اصفر .

٤٣٣٧ - بوفونيا*، حشيشة الصفدع
Buffonia (S). Buffonie, Buffone, Bufone, Herbe à crapaud (F).
Buffonia (E). Buffonie (D). Buffonia (I).

جنس نباتات برية من فصيلة القرنفلية . انواعها عديدة
منها الاعشاب الحولية ومنها البجل الليفية المعمرة . جميعها
جبلية منبها الشرق الادنى واروبه الجنوبية والغربية .

٤٣٣٨ - بوق
Buccinum (S).

Buccin (F).

حلزون بحري من الرخويات المعديات كبير الحجم
مستطيل الخرطوم يقتنص كل ما وصل اليه . وهو كثير
الوجود في المياه اللبنانية .

٤٣٣٩ - بوق النحل
Clerus apiarius (S).

Clairon des abeilles (F).

حشرة من غمديات الاجنحة تطول من ١٠ الى ١٥ م.
ثوبها الى الزرقه يحلوها تجزيع معترض احمر . تعيش على
رحيق ووليع الازهار اخصها ازهار الفصيلة الخيمية .
يرقاتها مؤذية تغزو خلايا النحل وتفتك بالبنين داخل
النخاريب .

٤٣٤٠ - بوق النشتر
Craterellus cornucopioides (S). Cratérille, Trom-
pette des morts (F). Craterellus (E).

فطر اجوف القلنسوة المقمرة من فصيلة الغاريقونيات وهو
من الفطور المأكولة اللذيذة الطعم .

٤٣٤١ - بوقال
Bocal (F). Glass jar (E).

كوز بلا عروة . وهو غالباً وعاء من زجاج متوسط الحجم
يستعمل لحفظ البزورات والسكاكر والمرقيات . ج بواقيل .

٤٣٤٢ - بوقية*، حنشات
Albuca (S). Albuca, Albuquerque (F). Bastard star of Bethlehem (E).
Stiftblume, Weisszwiebel (D). Albuca (I).

البوقية جنس نباتات بصلية من فصيلة الزنبقيات انواعها المعروفة
خسة اعطائها البلاد الحارة الاسيوية والافريقية . ازهارها
بيضاء اللون جميلة الشكل . يستخرج من بصلها عصارة
لزجة يصنع منها بعد تخميرها شراب مسكر .

٤٣٤٣ - بوقي
Convoluté (F). Convoluted (E).

نعت تعريفي توصف به الاشياء البوقية الشكل اخصها
الاعضاء النباتية .

٤٣٤٤ - بوقيات
Buccinidae (S).

Buccinidés (F). Buccinidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل
اماميات الخياشيم المشطية . اجناسها وانواعها عديدة بعضها
من متحجرات الاحقاب الطباشيرية والثاللية والبعض الآخر
معاصر منتشر في معظم بحار العالم . جميعها بفترة ||
اصداقها متفاوتة الاحجام يغلب فيها الكبر ودقة الاعقاب
المدببة . اجسامها محلزة . رؤوسها صغيرة ، مبططة ،
ثنائية اللوامس المعبونة . السننبا مجهزة بمساحل تعلوها
كلاليب حادة || اعرف اجناسها واشهرها البوق والفرفور .

٤٣٤٥ - بوقيات
Sarraceniaceae (S).

Sarracéniacées (F). Sarraceniaceae (E).

فصيلة النباتات البوقية من ذوات الفلقتين اشهر اجناسها
البوقية الى حيث تنتمي .

٤٣٦١ - بُولَامُونِيَّات Polémoniacées (F).
Polemoniaceae (E).
فصيلة نباتية تعرف بالقبسيات ، اطلبها .

٤٣٦٢ - بُولِبُور Bulpur
عاشوب زراعي يستعمل للقضاء على النباتات الضارة المستعرضة الاوراق اخضها الاعشاب التي تكثر في زراعة البصل || وهو يرتكز على مادة سيانات البوقاسيوم ويحوي منها ما يراوح قدره من ٩٧ الى ٩٩٪ يرتكز محلوله من ١ الى ١,٥٪ وفقاً لحالة النبات وتنضخ به الاعشاب بمعدل ١٠ لترات لكل ١٠٠ م^٢.

٤٣٦٣ - بُولَّة Urée (F). Urea (E).
هو نتيجة ما يحصل من احتراق المواد الازوتية في الجسم ويخرج مع البول .

٤٣٦٤ - بُولَّة Johnius (F).
سمكة نهريّة من البهاريات تدعى جنيوس ، اطلبها .

٤٣٦٥ - بُولْدُوزِر Bulldozer
هو المنساح ويدعى الشوف ، اطلبه .

٤٣٦٦ - بُولُوغَالِين، بُولِيغَالَا، حَشِيْشَةُ اللَّبَن، مُسْتَدْرَة Polygala (S).
Polygale, Herbe à lait (F). Milk-wort, Milk weed (E).
Weissen kreuzblume (D). Polygala, Erba da latte (I).
جنس نباتات بحولية من فصيلة اللبنيات . انواعه عديدة جميعها حزمية السوق الدقيقة . اوراقها صغيرة القد ، رحيمة النصل ، متعاقبة . ازهارها هامية الارتكاز ، سنبلية التجميع او عنقودية ، حمراء اللون او زرقاء او بيضاء . اشهر انواعه ما يتبع .

٤٣٦٧ - بُولُوغَالِين آمِي الورق Polygala myrtifolia (S).
Polygale à feuilles de myrte (F).
بجلة فناء تعلو من متر الى مترين . فروعها كثيفة زهاء اللحماء ، اوراقها مستطيلة . ازهارها بنفسجية . ازهارها عنقودي التجميع يستمر من ايار الى آب .

٤٣٦٨ - بُولُوغَالِين بَقْسِي Polygala chamaebuxus (S). Polygale faux-buis (F).
عشبة تعلو من ١٠ الى ٢٠ سم . اوراقها متعاقبة . ازهارها الى الصفار الموشح بالاحمر . بتلاتها كبيرة . ازهارها يدوم من نيسان الى ايلول .

٤٣٦٩ - بُولُوغَالِين رَشِيْق Polygala speciosa (S).
Polygale élégant (F).
بجلة بحيلة الشكل تعلو من متر الى مترين . فروعها دقيقة مرطاة . اوراقها اهليلجية ملساء النصل . ازهارها بنفسجية او حمراء اللون . ازهارها عنقودي .

٤٣٧٠ - بُولُوغَالِين شَائِع Polygala vulgaris (S).
Polygale vulgaire, Latier (F).
عشبة معمرة حزمية تعلو من ٢٠ الى ٣٠ سم . اوراقها جامدة النصل . ازهارها هامية || ترغب فيها الماشية وتعتبر من الاعشاب المرعوية العلفية التي تستدر اللبن في البقر والضان والماعز .

قشورها قابضة ومعرفة ، اوراقها غنية بحدد الطل الذي يستخرج منه ماء الدردار المستعمل في تنظيف وتطهير الجروح وفي غسيل العيون المصابة بالرمد || اخشابها صلبة تستعمل في صناعة السفن .

٤٣٥٢ - بُوقِيصَا صِينِيَّة Ulmus Chinensis, U.
parvifolia (S). Orme de Chine (F). Chinesé elm (E).
شجرة متوسطة الكبر تعلو من ١٠ الى ١٤ م . افنادها ونواميسها زهاء اللحماء . اوراقها عروية نصلها مائل لامع . ثمارها مستديرة مجنحة || يكثر وجودها في الصين واليابان والتبت .

٤٣٥٣ - بُوقِيصَا قُزْمِيَّة Ulmus pumila (S).
Orme nain (F). Dwarf elm (E).
شجرة تعلو من متر الى ثلاثة أمتار . مهدا البلاد الاسيوية الباردة . اوراقها صغيرة ، منسوبة ، نظامية ، نصلها جامد الحباك مائل البشرة . ثمارها مستديرة مجنحة .

٤٣٥٤ - بُوقِيصِيَّات، دَرْدَارِيَّات Ulmées (F).
Ulmus (E).
سبط من فصيلة الانجريات يشمل بعض الانواع الشجرية الخرجية والصناعية .

٤٣٥٥ - بُوقِيْقَة * ، بُقُوْبِيْقَة Limosa (S).
Barge, Bécasse de mer (F). Goduit (E).
جنس طيور مائية من فصيلة دجاجيات الارض ورتبة طوال الساق . انواعها عديدة جميعها من القواطع التي تجوب البلاد بخذاء الشواطىء البحرية || اشهرها البوقيقة السلطانية التي نشاهدها كل عام عند عودتها الى الهند .

٤٣٥٦ - بُوقِيْقَة سُلْطَانِيَّة * Limosa limosa (S).
Barge égocéphale, B. à queue noire (F). Bar-tailed goduit (E).
نوع من البوقيقة كبيرة الجثة تعلو نحو ٤٠ سم . وهي رفيعة الساق البوقيقة ، مستطيلة المنقار ، بلبقاء الثوب يكثر فيها الاشهب والاسود والرمادي . ذنبها ابيض اللون اسود الاطراف .

٤٣٥٧ - بُوقِيْقِيَّات Limosians (F).
عمارة من فصيلة دجاجيات الارض . اجناسها وانواعها قليلة العدد تتميز باشكالها الرشيقة . مناقيرها محددة مستطيلة ، مبططة الملاقط . ارساعها حذفية الجهة الامامية ، سرديّة الخلفية . اصابعها لاطئة الانتشاب || اعرف اجناسها واشهرها البوقيقة .

٤٣٥٨ - بُول Urine
هو السائل الذي تفرزه الكلوتان ويخرج من المثانة الى الاحليل . ويتميز آخر هو البراز المائع في الحيوان .

٤٣٥٩ - بُول الدَّم Hématurie (F). Hématuria (E).
عارض يعترى الخيل عندما تصاب ببعض الامراض ولا سيما التهاب الكلى الحاد .

٤٣٦٠ - بُول يَحْمُورِي Hémoglobinurie (F).
Hemoglobinuria (E).
مرض يعرف بوجود يحسور ذائب في بول الدواب دونما كريات دموية .



بوقيصا حراء



بوقيقة



بوقيقة سلطانية



بولوغالين شائع




بوليترنسيوم



بوليد



بوليسبور الكتان



بوليس



بومة أذن



بومة صماء

٤٣٧٩ - بُولِيَسْتَرُوس *Bolet (F). Boletus (E).*
هو الهرنوع جنس فطور من الفصائيات.

٤٣٨٠ - بُولِيَسْتَرُوس * *Bulimus (S).*
Bullme (F). Bulimus (E).
جنس حيوانات برية من الرخويات المعديات الرئوية وفصيلة الحارونيات. أنواعه المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في معظم البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة. تعيش في المواقع الرطبة وعلى ضفاف مجاري الماء || اصداؤها شبه مردنية الشكل ، محزنة ، متباينة الحجم واللون . اجسامها لا تختلف عن اجسام الحارون || اشهر انواعه المأكولة واكثرها قذا البوليس البرازيلي .

٤٣٨١ - بُولِيَسْتَرُوس *Hibou (F). Owls (E).*
جنس طير من البوميات وعمارة البوميات . انواعه ثلاثة : البومة الاذن ، والبومة الصماء واللول اي بومة الاطلاق . جميعها ربة الجسم ، متوسطة الحجم ، مرقطة الثوب . منسرها احجن اعقف منشقة وسبع انفجوة ، محسرها فسيح الصفحة . سقطها مستطيل القد يجاري الذنب ويتعداه . ارساغها كاسية ومخالها كذلك .

٤٣٨٢ - بُولِيَسْتَرُوس *Puma concolor (F).*
اطلب كوجر .

٤٣٨٣ - بُولِيَسْتَرُوس *Asio otus, Otus vulgaris (S).*
Hibou commun, H. vulgaire, Moyen-duc (F). Long-eared owl (E).
نوع من البوم ربة الجثة ، متوسطة الحجم . طولها نحو ٣٥ سم . موطنها فسيح الارحاء . يشمل معظم اقطار العالم وهي من اوايد الاحراج البنانية . نظامها الحياتي جماعي ، سرها يد من ٦ الى ١٠ . تدن في تجاويف الاشجار وصنوع الصخور او في وكن الزاغ والقيق والورشان . اناها تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور نحو ثلاثة اسابيع . تلتس قوتها من الغروب الى الفجر . تصيد جميع انواع الحشرات والدويبات والجرد والفار والصفادع .

٤٣٨٤ - بُولِيَسْتَرُوس *Asio flammeus, Otus brachyotus (S). Hibou brachyote, H. à huppes courtes (F). Short-eared owl (E).*
نوع من البوم مثدونة القنازع ولذا سميت بالصماء . جثها ربة متوسطة القد تطول نحو ٣٥ سم . وهي من القواطع التي تجوب معظم مناطق العالم ما عدا استرالية . تألف الخيس والمقاصب والمناقع . تدن في المقاصب . تلتس قوتها في الليل ابتداء من الفسق . تصيد الصفادع والجرد والفار والدويبات والحشرات .

٤٣٨٥ - بُولِيَسْتَرُوس *Hibou ascalaphe (F).*
هي اللول ، اطلبه .

٤٣٨٦ - بُولِيَسْتَرُوس *Pomarsol*
فاطور زراعي يرتكز على مركبات « ثيورام » يستعمل في مكافحة تبقع ورقشة الثار . استعماله لا يؤدي النحل . تركيز محلوله يراوح عادة من ٥٠٠ الى ٧٥٠ غرام بومرسول لكل ١٠٠ لتر ماء || تجري المكافحة عند الازهار وبعد الانقصاد وفي اوائل الصيف .

٤٣٧١ - بُولُوغَالِين فِيرَجِينِيَّة *Polygala senega (S).*
Polygale de Virginie (F).
بجلة صغيرة تنمو من ٨٠ الى ١٥٠ سم . فروعها فناء ، زباء . اوراقها مستطيلة . ازهارها قرمزية . ازهارها يستمر من نيسان الى ايلول || وهي من النباتات الطبية تسهل المعدة وتدر البول .

٤٣٧٢ - بُولُوغَالِينِيَّات ، مُسْتَدْرَات *Polygalées (F). Polygaleae (E).*
سبط من فصيلة اللبنيات . انواعه عديدة معظمها نباتات عشبية وبجلية منبتها الاقاليم المعتدلة اكثرها بري وبعضها طبي وزراعي .

٤٣٧٣ - بُولُوغَرَفِيَّة *Polographie (F).*
Polography (E).
البولوجرافية الوصف الفلكي للسماء .

٤٣٧٤ - بُولِيَتَرْنِسِيُوم * *Polythrincium*
جنس فطور مجهرية من الزناخيات وفصيلة اللطحيات . جريه الكنيدي قصيرة ، كردومة ، منتصب . كئاده مخروطية الشكل ثنائية الخلية || له نوع واحد يركب اوراق النفل البري فيوشها بنقط مستديرة زيتية اللون تملو النصل على صفحته العليا .

٤٣٧٥ - بُولِيَد * *Polyides (S).*
Polyide (F). Polyides (E).
نبات بحري من الخشيات الحمر . يكثر وجوده في بعض مناطق البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي || كلاليه صغيرة . ساقه اسطوانية ، فرقة ، كثيرة الانشعاب ، غصرونية المادة . حمر اللون سمراء الموج .

٤٣٧٦ - بُولِيَسْبُور * *Polyspora*
جنس فطور مجهرية من فصيلة الرغيفيات . وحيد النوع يتميز بمشيجه الخيطي التركيب الذي ينشأ تحت الطبقة الادمية ثم يرق متبعا جدران الحباك الادمي او شعاب المسام . كئاده مستطيلة ، ضمية التجميع || نوعه المعروف بوليسبوره الكتان .

٤٣٧٧ - بُولِيَسْبُور الكتان * *Polyspora lili (S).*
Browning, Stem-break (E).
فطر مجهري يركب الكتان في المواقع الباردة الرطبة فيؤذي في ساقه واوراقه وازهاره التي تبدو حنطية اللون صدئية الموج || يكافح بتطهير البذار .

٤٣٧٨ - بُولِيَسْتَرُوسِيَّات * *Polycentropidae (S).*
Polycentropidés (F). Polycentropidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة جلوليات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ومتوسطة القد ، سمراء اللون . بسطة اجنحتها تراوح من ١٦ الى ٢٨ مم . اجنحتها الامامية مقشاة بخمل دقيق ذهبي اللون او فضي او اسمر او مزخرف بالاسمر والاصفر || اساريها مفترسة ، طليقة ، تعيش من قنصها في المياه الجارية . شباكها شبه قمية الشكل تحبها بين الاعشاب المائية . اشهر اجناسها :

البوليسنروب *Polycentropus (S).*
والسيرنوس *Cyrnus (S).*

الشكل يطول من ٨٠ الى ١٢٠ سم. ثوبها متداخل الالوان. ظهرها وزعانفها الظهرية والصفحة العليا من رأسها الى الزرقة السوداء الموج. الشطر الاعلى من جانبيها الى الزرقة، الشطر الاسفل مع بطنها الى البياض الاخير الفضي الموج ويعاوها في هذا الشطر تشيز رباعي الخطوط السمر الافقية الامتداد || رأسها مخروطي الشكل، ذلق الخطم. فكها الاسفل يتقدم الاعلى. شدتها معتدل الانفراج. عيناها كبيرتان، ذهبيتا اللون / زعانفها الظهرية اثنتان كبيرتان يتبعها ثمان زعنفات صغيرة. الشرجية تقابل الظهرية الثانية ويتبعها سبع زعنفات. الذيلية شبه هلالية الشكل || لحمها دمك، أبيض اللون، مستحب الطعم. مرغوب فيه.

٤٣٩٣ - بُونِيلِيَّة ^٥ Bonellia (S). Bonellie (F).
جنس دوبيات بحرية من الجفريات المسلحة وفصيلة الاخيوريات. انواعها المعروفة قليلة العدد اشهرها البونيلية الخضراء (Bonellia viridis) التي يكثر وجودها في البحر الابيض المتوسط || تتميز هذه الدوبيات بالازدواج الشكلي الفاضح بين الذكر والانثى. ذكورها صغيرة شكلها كحرف الالف تعيش في مسالك اقنية افراز الاناث. الانثى مستضخمة الجسم القريب الشبه من حبة الحنطة. مستطيلة الزائدة الخرطومية الجزلة المحجمة الاطراف.

٤٣٩٤ - بُونِيُوم Bunium
راجع آأكثار.

٤٣٩٥ - بُوه Ducs (F). Horneds owls (E).
جنس طير من البوميات وعمارة البوهيات. انواعه عديدة منتشرة في جميع اقطار العالم وهي اكبر انواع كواسر الليل قداً تتميز بمناسرها الصلبة القوية ومناشقها المستديرة الفسيحة وسواقطها الضعيفة واذناها القصيرة وارساغها ومخالبها القوية العارية. اشهرها البوهة وبوهة فيرجينية.

٤٣٩٦ - بُوهة * Bubo maximus (S).
Grand duc (F). Eagle-owl, Great horned owl (E).
نوع من البوه وفصيلة البوميات كبير القد طوله نحو ٦٥ سم. والانثى اكبر جثة من الذكر || موطنه البلاد المعتدلة الحرارة. يألف الغابات والاحراج والاطلال على السواء غير انه لا يقرب الاماكن الآهلة برغم كونه من الطيور الآتدة. يدن عشه في تجاويف وصدوع الاشجار الصوجانة. انشاء تضع ثلاث بيضات مستديرة خشنة غبراء اللون تحضنها وحدها نحو ٤ اسابيع || وهو يلتصق قوته في الليل. يصيد جميع انواع الحشرات والقواضم من الفأرة الى السنجاب كما يبطش بالبط والاوز والغربان والزيفان والارانب.

٤٣٩٧ - بُوهة فيرجينية Bubo virginianus (S).
Duc de Virginie (F). Virginian horned owl (E).
نوع من البوه كبير القد طوله نحو ٧٠ سم. موطنه امريكة الشمالية والجنوبية. يألف الغابات والاحراج الظليلة. يلتصق قوته في الليل. يصيد كل ما وقع نظره عليه من حيوان يتسكن منه بما في ذلك الافاعي والاسماك.

٤٣٩٨ - بُوهِيَّات Astoniens, Buboniens
عمارة من فصيلة البوميات تشمل اربعة اجناس وهي البوم والبوه والشيج والهوازن جميعها من الكواسر الروامس.

٤٣٨٧ - بُومَرَسُول أَكْثَف Pomarsol forte (F).
فاطور زراعي شديد الفاعلية يرتكز على مركبات (TMTD) الذي يحوي منها ٨٠٪. يستعمل في مكافحة تبغ ورقشة التفاح والاجاص على الشكل التالي:
قبل الازهار بمعدل ٠,٢٠٠٪.
بعد الازهار بمعدل ٠,١٢٥٪.
وهو يستعمل ايضاً في مكافحة طسة التوليب بمعدل ٠,٢٪. استعماله لا يؤذي النحل.

٤٣٨٨ - بُومُونْسِيَّة * Beaumontia
جنس جنبات برية وتريينية من فصيلة الدفليات مهددا الشرق الاقصى. اوراقها بيضيه متقابلة. ازهارها كبيرة القد خماسية البتلات، عنكولية التجميع، ابضية الارتكاز او تاجية. اشهرها النوع المعترش الكبير الزهر. زهرته يفضاء اللون موشحة بالاحمر.

٤٣٨٩ - بُومِيَّات Strigidae (S).
Strigidés (F). Strigidae (E).

فصيلة طير من الجوارح كواسر الليل تنتمي الى الجوجيات. انواعها المعروفة ١٣٣ تنصم تحت لواء ثلاث عمارات البوهيات والبمفيات والفداديات || موطنها يشمل جميع مناطق العالم واخصها المناطق المعتدلة الحرارة. اكثر انواعها من الضارب. معظمها يأوى الحراج والغابات وبعضها الخرائب والاطلال || قوتها المفصليات والرخويات والاسماك والقوازم وبعض الزحافات واللبونات الصغيرة كالجرذ والفار والعكر ولا تعف عن المصاير || تتميز بعيونها النشيطة التي تمكنها من رؤية الاشياء في الظلام، وبآذانها الشديدة الاحساس السمع. وتتميز ايضاً بنعومة ريشها وبزريزاه قوادمها المتناهية الدقة مما يجعل طيرانها خافت الصوت او عادمه || اجسامها متفاوتة القد، منها الصغيرة التي لا يفوق حجمها حجم عصفور الدوري ومنها الكبيرة التي يبلغ حجمها حجم الديك الكبير. جميعها كبيرة العيون المستديرة، كاسية الارساع. اكثرها كثير الزقاء لا ينقطع عنه طوال الليل وبعضها لا يزقو الا في زمن السفاد || الذكر اصغر قدماً من الانثى ويدعى الفياذ والهام وكنيته ابو الابرء وابو الاصبع وابو المنهال وابو مالك وابو يحيى. والانثى ام الخراب وام الصبيان وام قشعم.

٤٣٩٠ - بُوْنِي Poney (F). Pony (E).
البوني. او القرس الجدمة نعت يطلق على الحيل الصغيرة القد الخفيفة الوزن.

٤٣٩١ - بُونِيَّة * Pelamys (S). Bonite, Bize, Pélamide (F). Bonito, Enthyunnus pelamis (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة الاسقمريات انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها كبيرة القد مستطيلة الرأس. استانها قوية حادة. لونها الى الزرقة الزاهية يعلوها من جهتي ظهرها تأذير عمودي يميل الى السمرة العابقة.

٤٣٩٢ - بُونِيَّة مُشَيَّزَةُ البَطْن * Katsuwonus pelamis (S). Bonite à ventre rayé, Scombre bonite (F). Thynnus pelamis (E).
نوع من البونيت. سمكة بحرية بيوض من الاسقمريات شائكات الزعانف. اعطانها البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي || تعتبر من الاسماك القواطع. تجوب المتوسط اربع مرات في الحول || جسمها اهليجي



بومونسيه



بونيت



بونيت مشيَّزة البطن



بوهة



بوهينية

على مستوى تفجيرها أو يعلو حتى سطح الأرض أو فوقه بالنسبة إلى ما يكتشفه من ضغط . وتفجير هذه البئر أو حفرتها يتم عادة بواسطة المرجاس .

٤٤١٢ - **بشر الصّرف** (F). Wine-glass (E). Boit-tout (F).
هي الآبار التي تنتهي إليها مختلف المياه اخصها مياه المناقع فتغيب في جوف الأرض دون الاستفادة منها .

٤٤١٣ - **بشر الميرحاض** (F). Fosse d'aisances (F). Cesspool (E).
هي الحفرة التي تستلقي غائط الانسان وبوله ومن الافضل ان تبني على يابس لتتجنبها من الترشيع .

٤٤١٤ - **بشر المزبلة** (F). Fosse à purin (F). Dung-water (E).
هي البئر الضابطة التي ينتهي إليها بول دواجن الاسطبلات والمزارب وقد تبني عادة بقرب المزبلة لاستفقاء السوائل التي تتسرب من الزبل .

٤٤١٥ - **بياسة** (F). Mesology (E).
علم البيئات ومدى تأثيرها في الحياة .

٤٤١٦ - **بيات شتوي** (F). Hibernation (E).
تتور الحياة بعض الوقت في النبات وفي بعض اجناس الحيوان والحشرات .

٤٤١٧ - **بياح ، بيّاح** (F). Muge (F). Mugil (E).
هو البوري ، اطلبه . والواحدة بيّاحة وبيّاحة . والبيّاحة هي ايضا شبكة الحوت (السان) .

٤٤١٨ - **بيّاح أسود** (F). Muge noir (F).
سمكة بحرية تدعى حمّاشة ، اطلبها .

٤٤١٩ - **بيّاح فيّقي** (F). Muge céphale (F).
سمكة بحرية تدعى بوري عريض الرأس ، اطلبها .

٤٤٢٠ - **بيّاح مدّهب** (F). Muge doré (F).
سمكة بحرية تدعى بوري مذهب ، اطلبها .

٤٤٢١ - **بيار** (F). Biarum (S). Biare (F).
جنس نباتات دوفسية عشبية من القلقاسيات . انواعه المعروفة قليلة اعطانها الشرق الاوسط واروية الجنوبية . جميعها صغيرة القد . اوراقها سنانية النصل او خطية . ازهارها خريفية || وهو من النباتات الطوعية في البقاع .

٤٤٢٢ - **بيّار** (F). Biar (F).
هو الاسقمري الكلياس ، اطلبه .

٤٤٢٣ - **بيّارة** (F). Orangerie (F). Orangery (E).
راسع بستان يرتقال .

٤٤٢٤ - **بيّاس** (F). Bias (F).
جنس طير من الجواثم سنيات المناقير وفصيلة المذهبانيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها البلاد الافريقية . جميعها صغيرة القد ، قنبرية الرأس ، مقطوعة الذنب . اثوابها الى

٤٣٩٩ - **بوهينية** (F). Bauhinia (S).
جنس نباتات معمرة برية وتزيينية من فصيلة القرنيات . انواعه نحو ٦٠ مهددا المناطق الحارة والاستوائية . منها الشجيرات ومنها الجنبات العارشة . اوراقها معنقة مركبة ثلاثية الفصوص . ازهارها تاجي الارتكاز عنقودي التجميع . ازهارها كبيرة القد جميلة الشكل خاصة البتلات مختلفة الالوان . ثمارها قرون مستطيلة . بزورها بيضيه مفلطحة . اشهر انواعه ما يتبع .

٤٤٠٠ - **بوهينية ارجوانية** (F). B. purpurea (S).
جنبه تزيينية جميلة الازهار الارجوانية . B. pourpre (F).
٤٤٠١ - **بوهينية عارشة** (F). B. scandens (S).
جنبه عارشة جميلة الازهار الوردية اللون . B. grimpante (F).

٤٤٠٢ - **بوهينية عذقية** (F). B. corymbosa (S).
جنبه عارشة غضة عذقية الازهار . ازهارها حر . B. à corymbes (F).

٤٤٠٣ - **بوهينية قطبية** (F). B. tomentosa (S).
جنبه طيبة زباء اللحاء . زهرها ابيض اللون يعلو موج اصفر . اوراقها وازهارها وجذورها ناعمة وطاردة للديدان . B. cotonneuse (F).

٤٤٠٤ - **بوهينية مؤنفة ، أرجة القرون ، قرّك** (F). Bauhinia acuminata (S). Bauhinie acuminée, Senné bâtard, Ebenier de montagne (F). Orchid tree, Mountain ebony (E). Bergebenholz, Unächte senna (D). Bauhinia, Ebano montano (I).
شجيرة تزيينية كثيرة الانتشار ، جميلة المندام . اوراقها مؤنفة الرؤوس . ازهارها ارجوانية .

٤٤٠٥ - **بويضة** (F). Ovule (F).
مادة حيوية تتكون ضمن المبيض النباتي فتصير بعد اخصابها بذرة او حبة او عجنة تؤمن استمرار الحياة || ومنهم من استعمل بذيرة فهذا تسويق لا يجوز لان البويضة لا تصير برة الا بعد التأبير والاخصاب وان لم يتم الاخصاب لا تتكون البيرة .

٤٤٠٦ - **بويضية** (F). Ovarisme (F). Ovarism (E).
مذهب الذين يمزون اصل الحيوان وجميع الكائنات الحية الى بويضة || وعلى السؤال من اين اتت البويضة وكيف تكونت ؟ فهو سر الوجود .

٤٤٠٧ - **بويغية** (F). Spore (F).
هي بذرة النباتات خفيات التزاوج او عديمات الازهار .

٤٤٠٨ - **بويغية** (F). Sporidie (F). Sporidium (E).
هي البويغية الصغيرة الذرية القد المركبة .

٤٤٠٩ - **بويمة** (F). Huetta (F). Tawny owl (E).
بومة صغيرة .

٤٤١٠ - **بشر ، ركبيّة ، جبّ ، جفّر** (F). Puits (F). Well (E).
حفرة في الأرض عميقة لجمع الماء والاستقاء منها .

٤٤١١ - **بشر أرتوازيّة** (F). Puits artésien (F).
هي البئر التي ينفجر ماؤها في الاعماق وقد يبقى الماء



بياس

٤٤٣٨ - بَيَانُ حَالَةِ الْأَمْكِنَةِ (F). Etat des lieux (F).
Inventory of fixtures (E).
هو تحديد عين ثابتة ووصف كل جزء منها في حالته الراهنة من حيث الحدة والقدم بمناسبة تسليمها الى مستأجرها .

٤٤٣٩ - بَيْبُ . Conduit d'amenée (F).
البيب هو مجرى الماء الى الخوض . Supply-pipe (E).

٤٤٤٠ - بَيْبَاءُ * . Pipa (S).
Pipa (F). Pipa (E).

جنس ضفادع من فصيلة البيبائيات ورتبة البكبائيات .
انواعها المعروفة قليلة العدد . مهدها بعض اصقاع امريكة الجنوبية . يكثر وجودها في مياه البرازيل والغويان ||
اجسامها كبيرة القد مستغلفة . اطولها تراوح من ١٧ الى ٢١ سم . رؤوسها مفلطحة محرسة . اخطامها تنتهي بزوائد ادمية معتدلة الصلابة . فكوكها عادمة الاسنان . اصابع قوائمها الامامية عادمة الخطاب ، مستطيلة ، دقيقة ، تنتهي بنجوم قرنية المادة شكلها كالمهاز . اصابع قوائمها الخلفية كاملة الخطاب || انثاها ، بعد الكوم ، تسرا نحو ١٠٠ دعبلة في جيوب مطاطة ترفمها فوق مؤخر ظهرها حيث تلتصق بالجلد الذي يرتفع حول كل دعبلة فيؤمن سلامتها حتى النطف .

٤٤٤١ - بَيْبَائِيَّاتُ * . Pipidés (F). Pipidae (E).
فصيلة من مرتبة البكبائيات ورتبة عديمات الذنب . اجناسها وانواعها قليلة العدد . جميعها ضفادع عادمة اللسان قازبة ، تقضي معظم حياتها في المياه العذبة . اشهر اجناسها البيباء والقيطم .

٤٤٤٢ - بَيْبُطُ . البيبط : طائر (فريتغ) .

٤٤٤٣ - بَيْبِيُونُ * . Bibio (S). Bibion (F). Bibio (E).
جنس حشرات من فصيلة البيبيونيات انواعه عديدة جميعها صغيرة القد طولها يراوح من ٩ الى ١٤ سم . اجسامها مستطيلة رخوة تكثر في الربيع فوق الازهار والاعشاب . ترز مكثا في التربة فينتفخ عن يرقات تلهم جذور مختلف النباتات من الزروع الى القطنيات والصلبيات والشوندر والبطاطا .

٤٤٤٤ - بَيْبِيُونُ الْأَدْعَالِ . Bibio femoratus (S).
Bibion des buissons (F).

حشرة من فصيلة البيبيونيات . جسمها يطول من ٩ الى ١٤ سم . رأسها مكور . عينها صغيرتان . زباناها شديدا القصر ، ولمساها كذلك . صدرها بيضي مقطوم . بطنها اسطواني ، سداسي الحيد ، كثيف الحلب || الذكر احمر اللون . الانثى الى السواد القاتم . روشنها كبيران ابيضان ، احرا المقدم عند الذكر ، اسمره عند الانثى . قوائمها الى السرة السوداء || تظهر الحشرة الجملة من اواسط نيسان الى اواخر حزيران . تألف الادغال والحدائق || تتوجه البرقة فور نطقها الى جذور النبات فتعيش عليها .

٤٤٤٥ - بَيْبِيُونُ بُسْتَانِي . Bibio hortulans (S).
Bibion horticole (F).

حشرة من فصيلة البيبيونيات . جسمها يطول من ٩ الى ١١ سم . رأسها مكور . عينها صغيرتان . زباناها قصيران . ولمساها ناتقان . صدرها بيضي الشكل . بطنها اسطواني ، سداسي الحيد ، كثيف الحلب الدقيق || الذكر اسود اللون .

الطحلة السمره يملوها تمشيح اسود وتجذع ابيض . بطونها بيضاء اللون او غبراء || قوتها الذباب والهوم والحشرات الصغيرة والديدان .

٤٤٢٥ - بَيَّاضُ ، بَيَّاضَةُ . Bagrus bajad
سمكة نهريه من البقر وفصيلة السلوريات تكثر في النيل .

٤٤٢٦ - بَيَّاضُ دَقِيقِي . Maladie du blanc (F).
البياض الدقيقي لفظه شاملة تدل على مظهر خارجي واحد قوامه غبار ذري الشكل ابيض اللون ينتشر على الاوراق وقد يعمها على صفحتها السفلى ثم العليا سببه اوصام نباتية مختلفة بعضها فطري وبعضها ميكروبي .

٤٤٢٧ - بَيَّاضِي . Herodias egretta
راجع ابن الماء البيوضي .

٤٤٢٨ - بَيَّالُ ، دِيَاغِرَامُ . Diagramme (F). Diagram (E).

٤٤٢٩ - بَيَّانُ . Etat (F). Statement (E).

٤٤٣٠ - بَيَّانُ ، شَهَادَةُ الرَّبَّانِ . Manifeste (F).
Manifest (E).
وثيقة ببيان البضائع التي في السفينة يحررها ويوقعها الربان ويقدمها الى مأموري الجمرك وتدعى شهادة البضائع الواردة ولا يباح للسفن ان تغادر المواني الا بشهادة الخروج او بيان الصدور .

٤٤٣١ - بَيَّانُ الْأَسْبَابِ . Exposé des motifs (F).
Explanatory statement (E).
هي الاعتبارات التي يمهدها في مشروع او اقتراح لمنطوقه .

٤٤٣٢ - بَيَّانُ الْحَالَةِ . Etat de situation (F).
State of affairs (E).
هو بيان موجز مبسوط في حالة ذمة المرء المالية بعنصرها السلمي والايجابي .

٤٤٣٣ - بَيَّانُ الْقِيُودِ الْعَقَارِيَّةِ . Etat des inscriptions (F).
هي شهادة يحررها امين السجل العقاري فيثبت فيها جميع القيود والامتيازات والاختصاصات والتكاليف المترتبة عن عين ثابتة مستخرجة من سجلاته .

٤٤٣٤ - بَيَّانُ الْمَصَارِيفِ . Etat des frais (F).
Expenses statement (E).
هو قائمة بحساب المنصرف والمطلوب لاحد الطرفين .

٤٤٣٥ - بَيَّانُ تَصْفِيَةِ الْمَوْجُودَاتِ . Etat liquidatif
هو بيان تبني عليه قسمة موجودات يمتلكها شيوعاً اثنان فاكتر كالتراكات فتستبعد الاموال التي تقرر لدفع الديون ثم تبين الباقية بعد ذلك بالتفصيل (حصة كل مشتاع ومقدار منها) .

٤٤٣٦ - بَيَّانُ تَقْصِيْلِي . Devls (F). Estimate (E).
البيان التفصيلي او المقايسة هو بيان مفصل بالاعمال المقصودة مقروناً بشئ كلفها .

٤٤٣٧ - بَيَّانُ تَقْدِيرِي . Etat estimatif (F).
Estimative (E).
هو بيان يحرر عن الاعيان المنقولة فتبسط فيه هذه الاعيان موصوفة وصفاً مسهباً مبيناً الى جانبها مبلغ مقدار ثمنها لها .



بيضاء



بيبيون

البتللات اما الانثوية فرباعية البتللات ومركزها بين زهرتين ذكريتين || تنويره اصفر اللون يمتد من اواسط الربيع الى اواسط الصيف .

٤٤٥٥ - بيروا
Bière (F). Beer (E).
راجع جعة .



بيدق

٤٤٥٦ - بيرال الكرمه
Pyræle de la vigne (F).
هي فائلة الكرمه ، اطلبها .

٤٤٥٧ - بيرغ ، صناع النارجيل
Birgues (S).
Birgue, Crabe des cocotiers (F). Birgues (E).

بيرغ هو الاسم الهندي . جنس حيوانات قازبة من القشريات عشاريات الارجل وفصيلة الباغوريات . انواعه المعروفة قليلة العدد موطنها بعض مناطق الهند وجزر المحيط الهادي || جميعها قازبة تعيش على ضفاف الانهر والمناقع . مسرحها دجوي . تخرج من انفاقها بعد غروب الشمس وتعود اليها قرب الفجر . تتسلق اشجار النارجيل فتقضم معاليق الثمار الفتية ثم تعود فتلتهمها على الارض .



بيلمان

٤٤٥٨ - بيرنغمة
Pyranga (S).
Pyranga (F). Pyranga (E).

جنس طير من فصيلة الثغريات . انواعه المعروفة نحو ١٢ موطنها يشمل جميع القارة الامريكية . تألف الرياض والغابات . نظامها الحياتي جماعي . اسرارها متفاوتة العدد || اجسامها صغيرة القد . مناقبها مخروطية ، صغيرة ، مسننة الافاك العليا . اجنحتها معتدلة الحجم . اذناها متوسطة القد ، مقطوعة الاطراف . ارساخها دقيقة . اصابعها نشيطة . اثنائها جميلة ساطعة الالوان الزاهية يكثر فيها الاحمر وبشتقاته . تعتبر اجمل عصافير الفصيلة || جميع انواعها تعيش على البذور والحشرات الصغيرة || تدفن اعشاشها في الاشجار الرفيعة على ارتفاع بضعة امتار عن سطح الارض . اثنائها تضع من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور من ١٣ الى ١٥ يوماً .



بيرنغة

٤٤٥٩ - بيرنغمة
Pygocentrus piraya (S).
Piranha (F).

بيرنغمة هو الاسم العامي الشائع في البرازيل . سمكة نهريّة مفترسة لاحمة من السلمونيات . اعطانها انهر امريكية الاستوائية || جسمها مضغوط ، شبه بيضي الشكل ، يطول من ٢٠ الى ٣٠ سم . تتميز باسنائها الفارقة الحادة التي تعملو الفكين وتندمج عند تطبيقها || تعتبر من الاسماك الرهيبة لانها لا تفزع عن سمكة او حيوان وقد تقضي على الجاموس ، ان كان في الماء ، بطرف بضعة دقائق ذلك لان اصغر سرب من اسرارها يعد بضعة الاف .

٤٤٦٠ - بيروكسيد ، بروكسيد
Péroxyde (F).
Peroxide (E).
هو ثاني اوكسيد او فوق اوكسيد .



بيوتنة ملونة

٤٤٦١ - بيوتنة ملونة ، فائلة الجنائين
Peronea variegana, Acala variegana (S).
Tordeuse des vergers (F). Peronea variegana (E).

حشرة صغيرة من فصيلة الفاتلات حشرقيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الادنى الى اروبة الجنوبية والوسطى . فراشتها جارية قوتها وحيق الازهار . سرفتها خاضعة قوتها وثن نصال الاوراق . تتركب الاجاص والتفاح والمشمش والخوخ واللوز والزعرور ... || جسمها صغير قضيف

الانثى الى الحمرة . روشنها الى الغبرة السمرء عند الشقنين . قوامها شديدة السمرة || تظهر الحشرة الجمالنة من نيسان الى ايار . تألف الزروع والمباقل || تمتح الانثى مكثها في التربة فينقف عن يرقات تنهم جنور البقول والزروع اخصها البطاطا والشوندر والقطنيات .

٤٤٦٦ - بيبيونيات
Biblonidae (S).

Biblonidés (F). Biblonidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها عديدة . اجسامها مستطيلة مبططة ، رؤوسها مستديرة . عويناتها كبيرة . قرونها الاستشعارية قصيرة ودقيقة . ذكورها سمر واناثها الى الحمرة || يرقاتها دودية الشكل لونها الى السمرة ، رؤوسها سود لامعة . نظامها الغذائي يختلف باختلاف محيطها الحيوي فهي تاربة وخاضعة وخاشبة في آن واحد تعيش من التراب وعلى جذور النبات . اشهر اجناسها البيبيون والدلفوس .

٤٤٤٧ - بيت زراعي ، مسكن زراعي
Habitation rurale (F). Rural habitation, Rural abode (E).
هو كل بناء ريفي يسكنه من تعاطى الزراعة .

٤٤٤٨ - بيتا قنطورس ، الوزن
Beta du Centaure (F). Agena (E).

الوزن او بيتا قنطورس نجم ثير من كوكبة قنطورس . مركزه على حافر اليد اليسرى . اما النير الموجود على حافر اليد اليمنى فيدعى حصار || والوزن يبعد عن الارض نحو ٩٠ سنة ضوئية .

٤٤٤٩ - بيتترات البوناس
Bitartrate de potasse (F). Potassium bitartrate (E).
نوع من الاملاح البوتاسية يوجد في بعض الخمور بنسب قليلة متفاوتة .

٤٤٥٠ - بيتدانة البيدانة الحمار الوحشية .

٤٤٥١ - بيدار ، جرين ، أندار
Aire (F). Area (E).
هو المكان ، من الارض ، المعد لدرس الحبوب بالنورج وما اشبه .

٤٤٥٢ - بيداستير
Castor
هو الحارود اطلبه .

٤٤٥٣ - بيدق ، عقصي
Accipiter velox, A. fuscus (S). Epervier chatain, E. brun (F). Cast-net (E).

طائر من البواشق طوله نحو ٣٥ سم . ثوبه ثوب الطوط يعلموه موج حنطي شديد اللمة . خلقه كخلق رفاقه من البواشق وهو من القواطع التي تجوب البلاد اسراباً كثيرة العدد . قوته العصفير والمغاة والفار والجردان والحيات .

٤٤٥٤ - بيدمان
Vaillantia (S).
Vaillantie (F). Vaillantia (E).

نبات عشبي بري حولي من فصيلة الفويات . ينبت حوض البحر الابيض المتوسط || ساقه فرعاء تعملو من ٣٠ الى ٦٠ سم . فروعها مضلعة متضبة . اوراقه متعاقبة ، اذينية ، ضمية التجميع ، صغيرة القد . نصالها ضيقة ، خلية البشرة ، باهتة الخضار . ازهاره ثلاثي التجميع ، ابطي الارتكاز . ازهاره وحيدة الشق ، الذكورية منها ثلاثية

الابيض المتوسط . تألف احراج الصنوبر ، خنافسها تعيش على البناثق والاهداب ، يرقاتها تسردب اللحاء والشكير || جسمها صغير القد يطول من ٦ الى ٨ مم . ثوبها الى الجقوة الصنابية المواج تعلوها نمشة بيضاء وتزويق وزراكتش متباينة الالوان . رأسها يرمي الشكل ، صغير الجرم ينتهي بمثلث قاضم ثاقب . عيناها صغيرتان . زباناها مرفقيان صولجانيان . ظهراتها ذلق المؤخر المستدير الطرف الاحف . غدها كشيقتا الحمل والسف . ارساغها رباعية العقل الظاهرة || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواخر نيسان وتبقى حتى اواخر آب . تسرح في النهار . تسافد بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع . تمتح الممكن في الخرايب والاعصان في ثقب تخليجها بمثلتها || اليرقة عند بلوغها الادراك التام تطول من ٨ الى ١٠ مم . جسمها اسطواني الشكل مقوس . ثوبها الى التبي الاسمر . رأسها وفكاها الى الجقوة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي في آخر نفق احتفرته اليرقة .

٤٤٦٨ - بيئسوس ٥ Byssus (F). Byssus (E).

البيسوس مادة ليفية تفرزها بعض الرخويات . راجع ليفن .

٤٤٦٩ - بيئسوس رباعي النقط *

Beosus quadripunctatus (S).

Beosus quadripunctu (F).

حشرة خاضعة من رتبة مختلفات الاجنحة نصفيات الجناح وفصيلة الطثريات . جسمها صغير مبطل يطول نحو ٧ مم . يملوه في الكوسل والمجدافين تدبج اسود || رأسها شبه مزواني الشكل ، اسود اللون . خطمها معتدل الطول . عيناها صغيرة ، جانبية ، ناشرة . زباناها مستطيلان . كوسلها شبه مخروطي الشوزن ، مقطوم الطرف ، اسود القسم الامامي ، بني القسم الخلفي ، تملوه نقطتان فحمتان ويطوقه حثار ضيق ابيض . بطنها اسود السطح ، ابيض الحثار . حجفتها صغيرة ، محرمة الشكل ، سوداء || مجدافها الى البني يملوها عند طرفها تدبج اسود يطوق الابيض || قشراتها ارمدة اللون . قوائمها مستطيلة ، مبلقة بالاسود والاصفر الخنطي || مسرحها البراري . تركيب جميع انواع الاعشاب .

٤٤٧٠ - بيئسوسي ٥ Byssogène (F).

نمت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالبيسوس . راجع ليفني .

٤٤٧١ - بيئسون * Bos bison (S). Bison

جنس ابقار وحشية من فصيلة البقرات . ضخيم الرأس قصيره ، رفيع الحاروك ، طويل شعر الرأس والعنق والصدر . كبير الجثة ، طوله نحو ٤٠٠ سم . وارتفاعه ٢٣٠ سم . وزله من ٩٠٠ الى ١٠٠٠ كيلو . اما الانثى فأكبر جثة من الذكر لكنها اصغر رأساً واقصر قرناً || يوجد منه حالياً نوعان بحالة الانقراض .

٤٤٧٢ - بيئسون اوروبية Bos bonasus (S).

Bison d'Europe (F). European bison (E).

٤٤٧٣ - بيئسون امريكية Bos americanus (S).

Bison d'Amérique, Buffalo (F). American bison (E).

٤٤٧٤ - بيش Trou (F). Hole (E).

هي الحفرة في التربة وتدعى الجورة .

يطول من ٤ الى ٥ مم . بسطتها تراوح من ١٤ الى ١٦ مم . رأسها معتدل الجرم والخطم ، اسمر اللون . عيناها صغيرتان بارزتان . زباناها خيطيان . ملامسها دقيقة . مرشفها معتدل الطول . جوشها اشهب اللون . بطنها الى الخنطي || روشنها الاماميان الى الشبهة البيضاء المواج تعلوها رقشة سمراء تمتد من اواسط الزام الثاني الى الطرف . روشنها الخلفيان الى الشبهة السبورية . اهدابها الى الشبهة الفضية || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في فصل الصيف . تسرح في الليل وتبيت في النهار . تعاظم بعد ظهورها بنحو ثمانية ايام وتباشر متح الممكن بعد الكوم بيوم واحد وتستمر عليه نحو سبعة ايام وتلقي مبيحادياً على الاقنات والاعصان والجذوع تغلفه مادة غروية لاصقة شفافة || ينقف الممكن في اوائل الربيع اي بعد متحه بنحو ٢٨ اسبوعاً عن اسابيع دقيقة تتوجه توات نحو الاوراق الفتية فتفتلها وتمنطقها بشباك حريرية المادة وتعيش في داخلها على الوثن || السرفة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ١٥ مم . جسمها شبه اسطواني الشكل اخضر اللون ، اصفر المواج ، يملوه خط ثبجي عريض من الحلب القصير يمتد من الكوسل الى الشرج . رأسها ودوقها الصدرية الى السمرة اللامعة || طور الاكمال الذي يستمر من ١٢ الى ١٥ يوماً ينقضي ضمن صلتجة خاوية تنسجها السرفة داخل الاوراق المفتولة .

٤٤٦٢ - بيريات ٥ Beraeidae (S).

Béraeides (F). Beraeidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة جملونيات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد محصورة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها شديدة الصغر ، فحمية اللون . اجنحتها الامامية مدببة الاطراف المهذبة || اساريها تعيش في المياه الجارية وفي المناطق ملحوقة بجلايب اسطوانية الشكل مؤلفة خاصة من فتات الالياف والورق . اشهر اجناسها :

البريا Beraea (S).

البيرو Beraeodes (S).

الارنود Ernodes (S).

٤٤٦٣ - بيريت ، بوريطيس ، بوريطيس ،

مركشيتا Pyrite (F). Pyrites (E).

هو كبريتور الحديد الطبيعي وقد يكون اصفر اللون او ابيض والاصفر أجود نوعاً ويدهى حجر النار .

٤٤٦٤ - بيئسكاني ، بليوسين Pliocene (F).

Pliocene (E). الطبقة العليا من الاباج الحديث وهي تحوي اطراف الاحافير .

٤٤٦٥ - بيئسه Oryx beisa

راجع أرخ افريقي .

٤٤٦٦ - بيئسم

شجر يشبه البلوط له حمل كالسفرجلة الص .

٤٤٦٧ - بيئسود منمش ٥ Pissodes notatus (S).

Pissode ponctué, Petit charançon ponctué, Petit charançon du pin (F). White pine weevil (E).

Keiferjungholzrüssler (D).

حشرة خاضعة ناهمة مؤذية من فصيلة السوسيات ورتبة مفدمات الاجنحة . موطنها بعض اصقاع حوض البحر



بيسود منمش



بيسوس رباعي النقط



بيسون

٤٤٨٦ - **بَيْض** Spermiote (F).
هو بيض النمل والصفادع . الواحدة بيضة .

٤٤٨٧ - **بَيْع** Vente (F). Sale (E).
البيع عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه الذي يدعى البائع بنقل ملكية شيء إلى الطرف الآخر الذي يدعى الشاري والذي يلتزم بدفع ثمنه . والبيع قد يكون على عدة أوجه وأشكال ، أعرفها قانوناً ما يتبع .

٤٤٨٨ - **بَيْع آجِل** Vente à terme (F).
هو الذي يضرب فيه أجل يؤخر وجوب أداء الالتزام لأحد الطرفين . فإذا أصر التزام الشاري بدفع الثمن فهو بيع بالائتمان . وإذا أصر التزام البائع بتسليم المبيع فهو البيع مع تأجيل التسليم .

٤٤٨٩ - **بَيْع إختياري** Vente volontaire (F).
هو الذي يصدر بمحض إرادة البائع ويقابله البيع الجبري .

٤٤٩٠ - **بَيْع إداري** Vente administrative (F).
هو الذي يتخذ على أموال ملك الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة ويمتاز عن البيع العادي بالتسهيلات الإدارية في إجراءاته .

٤٤٩١ - **بَيْع الأثاث بالمزاد** Vente à l'encan (meubles) (F).
هو بيع الأثاث بالمزاد العلني .

٤٤٩٢ - **بَيْع الإستهلاك** Vente à l'acquitté ou à la consommation (F).
هو الذي يلتزم البائع بمقتضاه تسليم المبيع المودع في الجبرك بعد دفع الرسوم عنه .

٤٤٩٣ - **بَيْع البراعة** Vente sans garantie des vices (F).
هو الذي يتحمل به الشاري عيوب المبيع ومثل هذا البيع لا يجوز إلا إذا اتفق عليه .

٤٤٩٤ - **بَيْع التجربة** Vente à l'essai (F).
هو الذي ينمق على شرط أن يجرب الشاري المبيع ولا يصبح البيع نهائياً إلا إذا وجد المبيع ملائماً للغاية التي أعد لها كبيع آلة أو أداة .

٤٤٩٥ - **بَيْع المخزون بالتصرف** Vente au disponible ou en disponible (F).
هو الذي يمرض به البائع بضاعة مستودعة عنده أو عند غيره ويمكن الشاري من التصرف بها .

٤٤٩٦ - **بَيْع الوفاء** Vente à réméré (F).
هو الذي يحفظ البائع به الحق في استرداد المبيع إذا هو رد ثمنه إلى الشاري بعد أجل معين مضافة إليه المصاريف .

٤٤٩٧ - **بَيْع بالائتمان ، بيع الإستهجار** Vente à crédit (F).
هو البيع الذي يؤجل دفع الثمن فيه .

٤٤٩٨ - **بَيْع بالتفصيل** Vente à tempérament (F).
هو نوع من أنواع البيع بالائتمان يشترط فيه دفع الثمن أقساطاً موزعة على آجال معينة في مدة طويلة وأكثر ما يستعمل لبيع المفروشات والمكاتب والآلات .

٤٤٧٥ - **بَيْش** Aconit (F). Aconite (E).
راجع أكونيت .

٤٤٧٦ - **بَيْض**
البيض كواكب صغار عديدة تعلوق إحدى النعام في كوكبة النهر .

٤٤٧٧ - **بَيْض الأرض** Crépide (F).
Hawk's-beard (E).
راجع سرغه .

٤٤٧٨ - **بَيْض الحُصنة** Couvée (F).
Covey, Nest of eggs (E).
هو كل ما تحضنه الدجاجة (الرنقاء) من بيض في حُصنة واحدة . وهو أيضاً كل ما تستوعب الحاضنة الآلية من بيض في حُصنة واحدة .

٤٤٧٩ - **بَيْض الشَّيْخ** Arctotide (F). Wind seed (E).
راجع أذن الدب .

٤٤٨٠ - **بَيْضَة *** Œuf (F). Egg (E).
جسم عضوي وضع لاستمرار البقاء ينشأ في مبيض أنثى بعض الرتب الحيوانية كالطيور والأسماك والحشرات وهو يحوي بويضة أن خصبت تكون فيها حيوان شبيه بآبيه وأمه . ويختلف البيض من حيث الحجم والشكل والعدد باختلاف مصدره . أضخمه بيض النعام وأدقه بيض الحشرات . أما بيض الدجاج وهو أشهر البيوض وأعما نظراً لما يحويه من مواد غذائية يستهلكها الإنسان فهو يتكوّن من جسمين الملح والزلال أي صفار البيض وبياضه .

٤٤٨١ - **بَيْضِيَّات** Phycomycètes, Siphomycètes (F).
Phycomycetes (E).
هي رتبة الفطور البيضية تشمل ثلاث مراتب وسبع فصائل منها لا علاقة لها بالاقتصاد ومنها كثيرة الضرر كالصنائيات والعفنات . أما مراتبها فهي التسنيات والسرنيات والنظريات .

٤٤٨٢ - **بَيْضِيّ ، بَيْضَوِيّ ، بَيْضِيَّة** Ovale (F).
Oval, Egg-shaped (E).
نعت وصفي يدل على الشكل الاهليلجي العديم الاستطالة الذي يشبه البيضة .

٤٤٨٣ - **بَيْطَار** Maréchal ferrant (F).
Farrier, Shoeing-smith (E).
هو من تعامل مهنة البيطرة أي من ينعل الخيل والبقر ويقال له المبيطار .

٤٤٨٤ - **بَيْطَرَة** Ferrure (F). Shoeing (E).
راجع إنعال .

٤٤٨٥ - **بَيْطَس** Pomatias (S).
Pomatide (F). Pomatias (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الأرجل وفصيلة السريقيات . الأنواع المعروفة قليلة العدد ، منتشرة في بعض مناطق البحر الأبيض المتوسط || أصدافها مردنية الشكل ، متناوبة الحلزونة ، متباعدة التحزيز الطولي ، دقيقة الأعقاب الذرية ، فسيحة الفوهات المستديرة . ألوانها متراكبة يغلب فيها الجوّوي والصفرة الزعفرانية .



بيض مختلف الاشكال

٤٥١٣ - بيعونية ، بيعونية

Begoniaceae (S). Bégoniacées (F). Begoniaceae (E). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين تشمل البيغونية وغيرها . نباتاتها عشبية حولية أو معمرة . مهدها المناطق الحارة الأمريكية . أنواعها تفوق الالف منها زراعة مأكولة تطبخ كالحماض لأنها حامضة مثله ومنها طيبة جزيلة النعم وبعضها تزييني جميل الاوراق والازهار .

٤٥١٤ - بيعونية ، بيعونية ، بيكونيه

Begonia (S). Bégonia, Bégonie, Bégone, Oseille sauvage (F). Begonia, Elephant's ear (E). Begonian, Begonie, Schiefblatt (D). Begonia (I).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة البيغونيات انواعه عديدة نحو ٨٠٠ منها العادي والعسقلي والبري والطبي والزراعي التزييني . اوراقها متعاقبة ، معنقة ، لاقياسية الشكل والالوان المشربة . ازهارها وحيدة المسكن ، عديمة التويج ، رباعية البتلات السبلية . مبيضها ثلاثي الاجنحة سداسي الاغلام المزدوجة . الوانها عديدة يكثر فيها الالبيض والوردي والاحمر || تتكاثر بالبذر والتعجيل . توجد في جميع الاثرية القليلة الاندماج والمتوسطة . تزرع في المراكن داخل البيوت لأنها تحشى البرد || اشهر انواعه التزيينية المتداولة ما يلي .

٤٥١٥ - بيعونية بوليفيه B. boliviensis (S). B. de Bolivie (F).

٤٥١٦ - بيعونية ثنائية اللون B. discolor (S). B. à 2 couleurs (F).

٤٥١٧ - بيعونية خروعية الورق B. ricinifolia (S). B. à feuilles de ricin (F).

٤٥١٨ - بيعونية دائمة الزهر * B. semperflorens (S). B. toujours fleuri (F).

٤٥١٩ - بيعونية سدنية B. Sedeni (S). B. de Sedeni (F).

٤٥٢٠ - بيعونية طويلة الزغب B. longipila (S). B. à longs poils (E).

٤٥٢١ - بيعونية قسطلية الورق B. castanaefolia (S). B. à feuilles de châtaignier (F).

٤٥٢٢ - بيعونية كثيرة الزهر B. multiflora (S). B. multicolore (F).

٤٥٢٣ - بيعونية مهاوكة الورق * B. undulata (S). B. à feuilles ondulées (F).

٤٥٢٤ - بيعونية متوسطة B. intermedia (S). B. intermédiaire (F).

٤٥٢٥ - بيعونية مختلفة الزهر B. diversiflora (S). B. à fleurs diverse (F).

٤٥٢٦ - بيعونية مرجانية B. corallina (S). B. à fleurs corail (F).

٤٥٢٧ - بيعونية مضلعة الورق B. rex (S). B. à feuilles marbrées (F).

٤٥٢٨ - بيعونية معدنية الموج B. metallica (S). B. à reflets métalliques (F).

٤٥٢٩ - بيعونية منتصبة * B. erecta (S). B. érigée (F).

٤٤٩٩ - بيع بالعينة (F). Vente sur échantillon (F). هو الذي يلتزم به البائع تقديم بضاعه مطابقة للعينة التي سلمها للشاري قبل انعقاد البيع او عند انعقاده .

٤٥٠٠ - بيع بالمزاد (F). Vente aux enchères (F). هو الذي يجري علناً فيتبارى فيه المزايدون ويكون الشاري من عرض اعلى ثمن في المبيع .

٤٥٠١ - بيع بالمذاق (F). Vente ad gustum (à la dégustation) (F). هو الذي يتعقد على اشياء يذوقها الشاري قبل شرائها كالزيت والنيذ ولا يتعقد البيع الا بعد مذاقها .

٤٥٠٢ - بيع بالوزن والكيل (F). Vente au poids, à la mesure (F). هو الذي يتعين فيه المبيع بالوزن والعدد والكيل .

٤٥٠٣ - بيع تسليم السفينة (F). Vente f.o.b. (F).

٤٥٠٤ - بيع تسليم الميناء (F). Vente c.a.f. ou c.i.f. (F).

٤٥٠٥ - بيع جبري (F). Vente forcée (F). هو بيع املاك المدين على يد القضاء بعد ان يحجزها الدائنون . وهو مرادف بيع المحجوز (Vente sur saisie) .

٤٥٠٦ - بيع علني (F). Vente publique (F). هو الذي يجوز لكل امرئ ان يتقدم فيه للشراء ويراد به البيع بالمزاد .

٤٥٠٧ - بيع على الشحن (F). Vente sur embarquement (F). هو من البيوع البحرية وفحواه ان يشحن البائع البضائع على اي سفينة في الميناء المعين وتبقى عليه اخطار سفرها الى حين تسليمها .

٤٥٠٨ - بيع على المكشوف (F). Vente à découvert (F). هو الذي لا يكون البائع مالكا للمبيع ساعة انعقاده . بل يحفظ لنفسه حق شرائه وتسليمه في الاجل الموقوت ومثل هذا البيع يتعقد عادة في المصفق (البورصة) .

٤٥٠٩ - بيع على الوثائق (F). Vente sur documents (F). هو الذي يكتفي فيه البائع بتسليم الشاري الوثيقة التي تمكنه من تسليم البضائع الميئة فيها .

٤٥١٠ - بيع عاجل (F). Vente au comptant (F). هو الذي يتقايض به البائع والمشتري المبيع والتثن لساعتها .

٤٥١١ - بيعونية Piggotia جنس فطور مجهرية من فصيلة الهدكيات . بكتيدات مفلطحة لاقياسية الحجم . نجمية الانفلاق . جوفها دقيق النسيج . بويقاتها مستطيلة شبه مخروطية الشكل ، شفافة او صفراء اللون || انواعه قليلة غير مؤذية .

٤٥١٢ - بيغور Peltogaster (F). Peltogaster (E). جنس دويبات بحرية من القشريات جذوريات الرؤوس . انواعه المعروفة قليلة العدد تطفل على الباغوريات .



بيغونية دائمة الزهر



بيغونية مهاوكة الورق



بيغونية منتصبة



بيغونية وردية الزهر



بيقران



بيكة



بيلس

Melissa turca, Melissa di Moldavia (I).

عشبة طيبة حولية تعلو نحو ٦٠ سم. ساقها فرعاء. أوراقها مستطيلة، نصلها خلي البشرة واسع التسنين. أزهارها بنفسجية يملوها موج أبيض. أوراقها وأزهارها فواحة العير تستعمل استعمال الشاي ويقال أنها لا تخلو من بعض المنافع الصحية والطبية وقد تفيد القلب وتلئم الجرح.

٤٥٣٩ - بيقييات، كيرسنيات (S).
Vicia (E).
سبط من فصيلة النطانيات الفراشية.

٤٥٤٠ - بيكة* (S).
Lagomys, Ochotona (F).
Pica, Lièvre sans queue (F).

جنس حيوانات لبونة قاضمة من فصيلة البيكيات. أنواعه ١٦ منها ١٢ آسيوية و ٣ أمريكية وواحد أروبي. جميعها عاشبة خازنة دجوية تألف المناطق الجبلية العالية والبلاد الباردة. أجرتها رداء عديدة الالتفات تأوى إليها في النهار قوتها الأعشاب تقطعها وتكدسها عامات كبيرة في المغاور وبين شخالف الصخور || أجسامها ربة صغيرة القد وطولها يراوح من ١٥ إلى ٣٠ سم. رؤسها صغيرة، مقاصصها مقطوعة، عيونها وآذانها صغيرة. جرامها متساوية الطول. أذناها جداع دمية || أثوابها مختلفة الألوان يكثر فيها الاسمر العابق. وبرها خشن الملص كثيف التجميع || أنثاها تضع في أوائل الصيف من كل سنة ستة أدراس تبصر وتكتسي بعد وضعها بمشرة أيام.

٤٥٤١ - بيكرومة خديعة (F).
Fidonie servante (F).
راجع فيدونية خديعة.

٤٥٤٢ - بيكونيا (F).
Bégonia (F). Begonia (E).
راجع بيغونيا.

٤٥٤٣ - بيكييات (S).
Lagomyidae, Ochotonidae (F).
Lagomyidés, Ochotonidés (F).
Lagomyidae, Ochotonidae (E).
فصيلة حيوانات لبونة قاضمة من مرتبة بيكييات الشوزب ورتبة القواضم. أنواعها عديدة يجمعها جنس واحد. جميعها صغيرة القد ربة الجئة موطنها البلاد الباردة. تسرح في الليل لا يبات شتوي لها.

٤٥٤٤ - بيكييات الشوزب (F).
Lagomorphes (F).
مرتبة حيوانات لبونة من رتبة القواضم تشمل البيكييات والأرنبيات.

٤٥٤٥ - بيئلة

البيئلة هي البال أو الحوت أو ضرب منها (اللسان ومحيط المحيط).

٤٥٤٦ - بيلس* (S).
Pitylus (F). Pitylus (E).

جنس طير من الجواثم محروطيات المناقير وفصيلة التنغريات. أنواعه المعروفة قليلة العدد موطنها أمريكة الاستوائية. ملحها الحياتي جماعي. تألف الغابات والمواقع الرطبة. قوتها الحشرات والدوريات والديدان والبذور وأثمار اليانعة || أجسامها معتدلة القد. أذناها مستطيلة. مناقيدها قصيرة، ضليعة، مسننة الافاك العليا. أثوابها سوية الألوان القاتمة. يكثر فيها الاسود ثم الرمادي الاغس.

٤٥٣٠ - بيغونية وردية الزهر* (S).
B. rosaefflora (S).

B. à fleurs de rose

٤٥٣١ - بيقة (F).
Vesce (F). Common vetch (E).
راجع باقيه.

٤٥٣٢ - بيقران*، رأس التنين (S).
Dracocephalum (S).
Dracocéphale, Tête de Dragon (F). Dragon's-head (E).
جنس نباتات عشبية من فصيلة الشفويات. أزهارها تشبه رأس التنين. أنواعها نحو ٢٧ معظمها معمر وبعضها حولي. أوراقها ضيقة النصل. أزهارها سنبل. أزهارها بين البنفسجي والازرق || اعرف أنواعه التزيينية ما يتبع.

٤٥٣٣ - بيقران الجبل

Dracocephalum Ruyschiana (S). Dracocéphale de Ruysch (F).

عشبة معمرة تعلو نحو ٣٠ سم. ساقها ملساء. أوراقها كاملة مستطيلة شبه خيطية، طولها نحو ٤٠ مم. عرضها ٤. سنبلها بيضية الشكل. أزهارها تطول من ٣ إلى ٤ سم. لونها الى الزرقة الجميلة. اسديتها صوفية || أزهارها يستمر من حزيران الى ايلول.

٤٥٣٤ - بيقران النمسا

Dracocephalum Austriacum (S). Dracocéphale d'Autriche (F).

عشبة معمرة تعلو نحو ٣٠ سم. ساقها زباء. أوراقها خرقية التفريض. أزهارها بنفسجية مقوسة تطول من ٣ الى ٤ سم. اسديتها خلية || أزهارها يستمر من ايار الى حزيران.

٤٥٣٥ - بيقران أملس (S).
Dracocephalum imberbe (S).
Dracocéphale glabre (F).

عشبة معمرة تعلو نحو ٢٠ سم. أوراقها كلوية الشكل طويلة الزناد. سنبلها الزهرية قصيرة. أزهارها الى الزرقة الزاهية. اسديتها ملساء البشرة || أزهارها يستمر من حزيران الى تموز.

٤٥٣٦ - بيقران رشيق

Dracocephalum speciosum (S). Dracocéphale élégant (F).

عشبة معمرة تعلو نحو ٥٠ سم. ساقها منتصب زباء. أوراقها قليلة النصل الردن. أزهارها بنفسجية موشحة بالابيض. اسديتها ملساء || أزهارها يستمر نحو ٥ أسابيع ابتداء من حزيران.

٤٥٣٧ - بيقران كبير الزهر

Dracocephalum grandiflorum (S). Dracocéphale à grandes fleurs (F).

عشبة معمرة تعلو نحو ٤٠ سم. ساقها زباء أوراقها مستطيلة، نصلها خلي البشرة مسن الحافة. سنبلها الزهرية كبيرة القد. أزهارها تطول نحو ٥ سم. لونها الى الزرقة العابقة || أزهارها يستمر نحو ٥ أسابيع ابتداء من تموز.

٤٥٣٨ - بيقران ملدافي، ملبس تركي

Dracocephalum moldavica (S). Dracocéphale de Moldavie, Mélisse turque, Moldavique (F). Blue dragon's-head, Moldavian balm (E). Türkischer drackenhopf, Türkische melisse (D). Dragocephalo,

ساقها منتصبه فرعاء . أوراقها معنقة ، متعاقبة ، اهليلجية . فصلها جامد الصفحة ، بارز العروق المتوازية . أزهارها فردية ، طرفية ، زنادية ، خنثوية الثلاث || جميع أجزائها من اللحم الى الاوراق والازهار والتار عطرية ، طيبة وصحية مقوية ، ناهضة . ويستخرج منها اطياب وادهان فاخرة .

٤٥٥٥ - بَيْسَالِيَه Pimelea (S). Pimélée (F).
Rice flower (E). Fettglanzstrauch (D). Pimella (I).

جنس جنات برية وزينية من فصيلة المازريونيات . انواعه نحو ٧٠ جميعها اقية المنبت . أوراقها عروية متقابلة . أزهارها عشكولية التجميع ، محورية وتاجية الارتكاز ، حيلة الشكل وردية او بيضاء اللون .

٤٥٥٦ - بَيْتَّة ، دَلَالَة Preuve (F). Proof (E).
البينة او الدلالة هي البرهان على وقوع الواقعة او حدوث العمل القانوني في الكيفية المأخوذ بها قانوناً وهي أيضاً الوسيلة المتبعة لاقامة الحجة .

٤٥٥٧ - بَيْتْنِي ، مُتَخَلَّل Intercalaire (F).
Intercalary (E).
الزراعات البينية او المتخللة هي الزراعات المختلفة القائمة بين انباق الاشجار منها كان تنسيقها .

٤٥٥٨ - بَيْتْنِيْث Bonite (F). Bonito (E).
هو البونيت جنس اسماك بحرية من الاسقمريات .

٤٥٥٩ - بَيْهَن Bursaria (S).
Bursaire (F). Bursaria (E).

جنس نباتات بجلة معمرة ابيدة من فصيلة الخبضيات . أوراقها صغيرة مستطيلة لسة . أزهارها عشكولية التجميع ، صغيرة الحجم ، كثيرة العدد . بيضاء اللون ، عطرية العرف || انواعه قليلة أشهرها البين الشائك .

٤٥٦٠ - بَيْهَن شَائِك Bursaria spinosa (S).
Bursaire épineuse (F).

نوع من البين وهو بجلة شائكة ابيدة أزهارها غبراء اللون فواحة العرف المستحب تزرع للتزيين والسياح .

٤٥٦١ - بَيْهِيْدُونَال Bi-Hédonal (F).

عاشوب زراعي يرتكز على الهرمونات يستعمل في زراعات المصان والارز والحنطة والذرة والدخن وذلك للقضاء على الشوك والقصوان واللبان والحامض والهيضمان والبيقية والامسوخ والحوذان والحرم والحشخاش والرخاخ والاخليليا والبلاب ولسان الحمل والسرفل والقنطريون وكيس الراعي والجلجول وحشيشة القزاز والقراص والبطياض والشرونة . حاجة الهكتار تراوح من ٢ الى ٥ لتر من مادة البيهيدونال تذاب في المقدار اللازم من الماء عل ان لا يقل عن ٥٠٠ لتر ولا يتعدى ١٠٠٠ لتر .

٤٥٦٢ - بَيْتُوت * Echinocactus Williamsii,
Auhalonium W., Lophophora W. (S). Peyote (F).
Peyotl (E).

نبات طبي وحيد الجنس والنوع من فصيلة الصباريات . يعلو نحو ٢٠ سم . جذره لفي الشكل . ساقه سرعة اسطوانية تنتهي بارسوسة غليظة يرمية تعلوها صفوف من

٤٥٤٧ - بَيْلَسَان ، كَحَان Sambucus (S).
Sureau (F). Sambucus (E).
جنس شجيرات وجنيات حرجية وزينية من فصيلة البيلسانيات او الحانيات . انواعه المعروفة نحو ٢٠ جميعها من نباتات المناطق المعتدلة . أوراقها معنقة ، متقابلة ، مركبة ، خنثوية الوريقات . أزهارها خنثوية خنثوية خنثوية التركيب ، عشكولية التجميع . ثمارها عنبية صغيرة القد تحوي من ٣ الى ٥ زور صغيرة آحية || أشهر انواعه البيلسان الاسود والبيلسان الصغير .

٤٥٤٨ - بَيْلَسَان أَسْوَد ، كَحَان كَبِير ، خَبَابُور ، دَمْدَمُون ، سَبْرَقَة Sambucus nigra (S).
Sureau, S. noir, Sullon, Haut bois (F). Elder tree, Arn tree, Boon tree (E). Schwarzer holunder, Holunder (D). Sambuco nero, S. nostrale (I).

هو البيلسان الشائع المعروف . شجيرة تملو نحو خمسة امتار . أزهاره صحية طيبة فواحة العرف المستحب ، نقيعها عرق وسكن . قشور عيادته تدر البول وتفيد البواسير والحروق . قال ابن سينا حبها وعودها ينفعان من وجع الرئة وعرق النسا والصرع ويقاومان السوم ونهش الافاعي . ودهنها يخرج الجنين والمشيمة وينفع من عسر البول ومن سموم الهوام .

٤٥٤٩ - بَيْلَسَان صَغِير * ، كَحَان صَغِير ، خَامَا أَقْطَرِي Sambucus ebulus (S). Hièble, Yèble, Petit sureau (F). Danewort, Dwarf elder, Ground elder (E). Attich, Attichholunder (D). Ebblo, Ebullo, Sambuco minore (I).

جنية صغيرة تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم تزرع للتزيين . أزهارها عشكولية حيلة لا تخلو من العرف المستحب .

٤٥٥٠ - بَيْلَسَانِيَّات ، كَحَانِيَّات Caprifoliaceae (S). Caprifoliacées (F). Caprifoliaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وحيدات التويجات تشمل عدة اجناس منها البيلسان وسلطان الجبل .

٤٥٥١ - بَيْلَط * Pelates (S).
Pélate (F). Pelates (E).

سمكة بحرية ببوض من شائكات الزعانف تنتمي الى فصيلة الفرخيات . موطنها يمتد من المحيط الهندي الى الجزر الاقيانية || جسمها متوسط القد ، معتدل التبطيط ، يطول نحو ٢٥ سم . رأسها معتدل الجرم صغير الخطم والشدق . القسم الاكبر من زعنفتها الظهرية المستطيلة شائك المناسخ الذرية . زعنفتها الذيلية كبيرة مقعرة . ثوبها ازرق الظهر ، اريد الجانبين ، اغبر البطن || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

٤٥٥٢ - بَيْلَم Capsule de coton (F).
Capsule of cotton (E).

البيلم هو جوز القطن .
٤٥٥٣ - بَيْلُوكَرَبُس * Pilocarpe (F).
جنس نباتات جنبة طبية من السدابيات مهدا البرازيل مشهورة باسم جبورندي ، اطلبها .

٤٥٥٤ - بَيْلُون * ، قَرْفَة بَيْضَاء Cannella alba (S).
Cannelier des Antilles, Cannelle blanche (F). White cinnamon tree, Antilles cinnamon tree (E).
شجيرة وحيدة الجنس والنوع من القرفيات . مهدا الانتيل .



بيلسان صغير



بَيْلَط



بِيلُون



بَيْتُوت

٤٥٦٨ - **بيوع متعاقبة** (F). Ventes par filière (F).
هي التي تتعاقب الى ان تصفى باذن التسليم .

٤٥٦٩ - **بيوفيزياء ، فيزيائية**
(F). Biophysique (F). Biophysic (E).
علم يبحث في علاقة الفيزياء بالحياة .

٤٥٧٠ - **بيوكهفنة** (F). Biospéologie (F).
(E). Biospaeology (E).
علم يبحث في الحياة الحيوانية والنباتية داخل الكهوف .

٤٥٧١ - **بيولوجية ، علم الأحياء ، علم الحياة**
(F). Biologie (F). Biology (E).

علم يبحث في ماهية الحياة واحوالها وعواملها المختلفة في
الحيوان والنبات . لذلك تقسم البيولوجية الى قسمين .
حيوانية ونباتية .

٤٥٧٢ - **بيولوجية حيوانية** (F). Zoobiologie (F).
(E). Zoobiology (E).
علم حياة الحيوان وهو يشمل الاسباب والتركيب والاحوال
والنظم والعوامل والمعطيات والموجبات .

٤٥٧٣ - **بيولوجية نباتية** (F). Biologie végétale (F).
(E). Vegetable biology (E).
علم حياة النبات وهو يشمل نظامها وتركيبها واحوالها .

٤٥٧٤ - **بيولوجيست** (F). Biologiste (F). Biologist (E).
راجع أحيائي .

٤٥٧٥ - **بيئة** (F). Milieu, Environnement (F).
(E). Environment, Medium, Habitat (E).
الوسط الذي تعيش فيه المادة .

٤٥٧٦ - **بيشي** (F). Mésologique (F). Mesologic (E).
كل ما هو مختص بعلم البيئات .

٤٥٧٧ - **بيضة** (F). Ovule animale (F). Ovum (E).
هي المادة الحيوية التي تتكون ضمن المبيض الحيواني والتي
تؤمن استمرار الفسل عند انحصائها .

الشعول المفلطحة . ازهارها فردية صغيرة تنشب في الشعول .
بتلاتها خضر الصفحات الخارجية ، وردية الداخلية .
اعطانه بلاد المكسيك والتكساس . كان ولا يزال يعتبر من
النباتات الطبية المقوية التي يعزى اليها شفاء معظم الامراض .
عصارته تحوي بعض العناصر القلوية المتباينة المفاعيل
تؤثر على الدماغ وعلى مختلف اعصاب واعضاء الجسم .

٤٥٦٣ - **بيوجغرافية** (F). Biogéographie (F).
(E). Biogeography (E).

البيوجغرافيه علم يبحث في توزيع الكائنات الحية على سطح
الكرة الارضية وفي اسباب هذا التوزيع وما آل اليه منذ
نشأة الحياة الى عصرنا الحالي .

٤٥٦٤ - **بيوشقي** (F). Biosexuel (F). Biosexual (E).
نعت تعريفي توصف به الظواهر الشقية بالنسبة الى
علاقها بالحياة .

٤٥٦٥ - **بيوض ، سرؤ** (F). Œuvé, Ovipare (F).
(E). Hard-roed, Oviparous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل حيوان يتكاثر بالبيض او
بالسرء كالطير والسلك والحشرات .

٤٥٦٦ - **بيوض** (F). Cylindrophora (F).
جنس فطور مجهرية وحيد النوع من عمارة الطليسات
وفصيلة الوطحيات . يتميز بكناثه الاسطوانية الجسم ،
المستدقة الاطراف التي تبدو كالحمل الكثيف يعلوه غبار
ابيض فضي المواج .

٤٥٦٧ - **بيوض النخل** (F). Cylindrophora albedinis, Fusarium albedinis (S).
(F). Bayoud (F).


وصم ونخيم الماقبة يقضي على سعف النخل وجذاره سببه
فطر البيوض النهم الفتاك المؤذي . مظهره الخارجي
غبار ابيض اطحل ينشي الكرب واصول السعف ثم ينتشر
تدرجياً الى ان يمتلئ كامل سعف النخلة فيجلببه بوشاح
ابيض اللون فضي المواج يؤثر في المسام والنسج الخليلوية
ثم ينحرف الى البني وهو نتيجة تأكسد المواد الدبقية
التي تحوّلها الاوراق بكثرة || يكافح عند ظهوره
باستعمال سائل بورديو او غيره من الفواطير الفعالة المركزة
على النحاس او الزنك .



بيوض



نخلة قضي
عليها البيوض



تاير



تاتو



تانوزيه

آذانها بوقية . جرامزها قصيرة مسلحة باظافر حادة . تألف البراري . قوتها الزحافات والدويبات والحشرات والنمل وبعض الجلود النباتية .

٤٥٨٥ - تاتوزيه *
Tatusia (S).

Tatusia (F). Tatusia (E).
جنس حيوانات لبونة من فصيلة المدرعات . انواعه المعروفة ١٢ جميعها امريكية المهد || اجسامها مدرعة مستطيلة . رؤوسها مخروطية . عيونها صغيرة . آذانها كبيرة . اذنانها مستطيلة ، حيدة . قوائمها الامامية رباعية الاصابع ، الخلفية خماسية . اظافرها مخروطية الشكل ، لامتناهية الطول . دروعها لاقياسية الاحزمة التي يراوح عددها من ٥ الى ٩ || اناثها رباعية الابطاء ، منها زوج صدري وزوج كاذبي او اربي . وهي ثنورة تضع في كل رمص من ٤ الى ١٠ جراء || اعرف انواعه واشهرها الثلاثة التالية :

٤٥٨٦ - تاتوزيه اوبره
Tatusia pilosa (S).

Tatusia pileux (F). Pilous tatusia (E).
نوع من التاتوزيه . اعطانه معظم مناطق البرو . والاكوادور يألف السباسب والبراري . قوته الحشرات والنمات والوزغ... ملجئه الحياتي فردي || جسمه يطول نحو ٧٠ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٣٠ سم . درعه خماسي الاحزمة المتحركة ، اسمر اللون يعلوه غلب دقيق يطول من ٣ الى ٤ سم . لونه الى السمرة التبنية الموج .

٤٥٨٧ - تاتوزيه ييبه
Tatusia novemcincta (S). Tatusia péba (F).

نوع من التاتوزيه . اعطانه تمتد من امريكة الوسطى الى المكسيك والتكساس . يألف السباسب والسهول القاحلة . قوته الحشرات والدويبات والجيف . ملجئه الحياتي فردي ،

٤٥٧٨ - تابع النجم
Aldebaran
من منازل القمر ، يدعى الدبران . اطلبه .

٤٥٧٩ - تايل
Candiment
ما يطيب به الطعام . اشهر التوابل الملح ثم البهارات .

٤٥٨٠ - تآبيت
Graduation (F).
Graduation, Graduating (E).

تعيين الاقسام التي تحدد الابنة او الدرجة .

٤٥٨١ - تآبير
Pollinisation (F). Pollinization (E).
هو وصول جدرة الوليع الى الميسم ودخولها من القلم الى المبيض . وقد يتم اما طبيعياً ويدعى التفطيج اي التآبير الذاتي . او بالواسطة ويدعى التنبيع والجب اي التآبير الاصطناعي . (راجع لمبارة) .

٤٥٨٢ - تآبير حشري
Entomophilie (F).
Entomophily (E).

هو التآبير الذي تقوم به الحشرات عندما تنقل طلع الزهرة الذكر الى ميسم الزهرة الانثى .

٤٥٨٣ - تآبير * ، تآبيروس
Tapir (F).
هو السناد ، حيوان هني الخلق غليظ الجثة موطنه الحالي جزر ماليزيا وبعض البلاد الامريكية . اطلب سناد .

٤٥٨٤ - تآنو * ، مدرع
Dasypus (S).

Armadille. Tatou (F). Armadillo (E).
جنس حيوانات درعاء من آكلات النمل . انواعه ستة موطنها امريكة الجنوبية مسرحها يمتد من الفويان الى القطب . جميعها ثقيلة الهبة ، اهليلجية الشكل . مفلطحة الجسم تطول من ٣٠ الى ١٠٠ سم . رؤوسها مخروطية ،

تأخر الاكساح او تأخر التفطين وبطء الاكساح او بطء التفطين هو التأخير العارض على تفتح الزبعات والبراعم وقد يكون سببه البرد وغلافه .

٤٦٠٠ - تَأْدَم ، تَدَعَص

Putréfaction (F).

Putrefaction (E).

انحلال المواد النيتروجينية العضوية بفعل الجراثيم .

٤٦٠١ - تَار

Juteux (F), Juicy (E).

نعت تعريفي يطلق على لباب الثمار الغزيرة العصارة .

٤٦٠٢ - تَارِب ، طَاسِل ، كَيْمُوح

Géophage (F), Geophagous (E).

نعت تعريفي يطلق على كل دودة من اي نوع كانت تعيش من التراب .

٤٦٠٣ - تَارِج

Insoluble (F), Insoluble (E).

غير ممكن حله .

٤٦٠٤ - تَأْرِيْث ، تَأْرِيْف ، تَحْدِيْد

Abornage, Abornement, Bornage (F), Settling bounds, Fixing limits (E).

هو وضع الارض او المناور بين ارضين او اكثر لتثبيت الحدود .

٤٦٠٥ - تَارِيْخ الكُرَّة الأرضِيَّة

Histoire du Globe terrestre (F).

World history (E).

تاريخ الكرة الارضية ، كن سنبر عنه ، ينحصر بسرد مراحل التطورات ، بما فيها الحكيمية والجغرافية ، التي مرت بها منذ تكوينها ونشأة الحياة عليها وما آل اليه الوجود البشري || عمر البشرية بالنسبة الى عمر الارض جزء تافه لا يقاس ذلك لان التاريخ المعقول لبدء الحياة القبلية بعد العائلية لا يتجاوز مائة ٢٥ او ٣٠ الف سنة || اما الازمنة التي سبقت هذا العصر ، والتي لا يزال اصحاب الاختصاص يقدرون مداهم ويعيدونه بعد كل معادلة مستجدة ، فانها رجة المجال تقاس بملايين السنين || الابحاث العلمية الحديثة ، بتحديد ازمته الوقائع والاحداث الفارقة ، بناء على معطيات علوم الآثار القديمة والاحاث والجيولوجية استناداً الى السداكة (ترسيب طبقات الارض) والاشعاعية ... ثم بتحديد المجالات الفضائية التي تفصلنا عن الكواكب والنجوم والمجرات .. تفيد وتقدر عمر الكرة الارضية بنحو سبع مليارات سنة ، وهو الزمن الذي انقضى منذ التكوين اي منذ الانفجار السديمي الذي تكونت منه الكرة الارضية بتكاثف المادة || اما التقلبات التي طرأت ، وازمنتها ، ومدى مراحلها ، فيمكن حصرها بخمس مراحل تسلسلها الزمني يأتي كما يلي :

١) المرحلة الاولى وتدعى ما قبل الكمبري ، تقسم الى ثلاث حقبة .

- الحقبة الاولى وتدعى التكوين ، تتميز بالمناسخ التالية :

الانفجار الاصلي .

تكوين الشرح الرقيعي الذي يضم الكرة الارضية .

بدء النظام الشمسي .

تكوين الارض .

- الحقبة الثانية وتدعى السحيقة ، تتميز :

الذكر لا يسمى للاجتماع بالانثى الا في زمن الوداق || جسمه يطول نحو ٧٥ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ ٣٥ سم . درعه تساعي الاحزمة المتحركة . ثوبه الى السمرة السوداء القائمة .

٤٥٨٨ - تَاتُوزِيَّة هَجِين

Tatusia hybrida (S).

Tatusia mulet (F).

نوع من التاتوزيه . اعطائه بعض مناطق البرازيل . يألف البراري والاراضي المذحاة والقفر . قوته الحشرات والدويبات والورغ . ملجئه الحياتي فردي كسائر انواع جنسه || جسمه يطول نحو ٧٥ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ ٣٥ سم . درعه سباعي الاحزمة المتحركة . ثوبه الى السمرة .

٤٥٨٩ - تَأْتِير

Ethérification (F), Etherification (E).

تحويل الكحول الى إيتر .

٤٥٩٠ - تَأْتِيل ، رَسْمَلَة

Capitalisation (F).

Capitalization (E).

هو تقدير قيمة ثمن الشيء على اساس دخله بمقتضى نسبة مئوية مقرر او مروفة .

٤٥٩١ - تَأْتِيل الفائدة

Anatocisme (F).

Capitalization of the interest on a loan...

هو ضم فوائد دين حل اجل دفعها الى قيمة الدين الاصلية لتنتج بدورها الفوائد .

٤٥٩٢ - تَاجُ الجَبَّار ، تَاجُ الجَوَاز

تاج الجبار او تاج الجوزاء تسعة نجوم من كوكبة الجبار مركزها على الكم .

٤٥٩٣ - تَاجِيَّة

Mitraria (S).

Mitraire (F), Mitraria (E).

جنية معمرة من فصيلة الجسنيريات . ساقها تعلو نحو ١٢٠ سم . افئادها مضلعة ومزبزة . اوراقها متقابلة ، معنقة ، بيضيه الشكل ، صغيرة القد ، شبه جلدية النصل المشاري الحتار . ازهارها ابطية الانتشاب ، مستطيلة المالحق قرمزية اللون ، تطول نحو ٤ سم . ثمارها عنية مخروطية الشكل كالتاج || تنويرها يستمر من ايار الى تموز .

٤٥٩٤ - تَاجِير مَزْرَعَة

Bail à ferme (F).

Lease of land (E).

هي الاجارة المعقودة على ارض زراعية لقاء بدل محدود يجوز ان يكون نقداً ام عيناً .

٤٥٩٥ - تَاجِيم

Reboisement (F), Retimbering (E).

هو تجديد الحراج اي اعادة تحريجها .

٤٥٩٦ - تَاحِم ، سَاحِل ، نَاسِج

Tisserand (F).

Weaver (E).

التاحم هو الحائك .

٤٥٩٧ - تَاحِي

Jardinier (F), Gardener (E).

التاحي هو خادم البستان .

٤٥٩٨ - تَآخَر ، إِبْطَاء

Tardiveté, Tardiveté (F).

Lateness (E).

هو التأخر او الابطاء في نمو النبات والحيوان .

٤٥٩٩ - تَآخَر الاكساح

Echamplure (F).



تَاجِيَّة

(٥) المرحلة الخامسة وتدعى الاباج الرابعي ، وهي تقسم الى حقبتين .

- الاولى وتدعى البليستوسانية ، تتميز اولاً بتواتر ازمة الدميك والدفع . ثم بالحفاظ على جميع الفئات الحيوانية والنباتية البحرية والبرية الموجودة .

- الثانية وتدعى المعاصرة ، تشهد تطور الادراك والمعرفة عند الجنس البشري .

بدء رقي الانسان واستعماله للظفر ان في الدفاع عن النفس ام في الصيد وغيره .

عصر الرعاة الرحل والقوس والنبال .

الانسان الصيني يستخدم النار .

اكتشاف الزراعة وفارسها .

اكتشاف الخط والرسم كاداة تعبير .

عصر النوقس .

الحضارة الفينيقية وملاحمها .

الحضارة الفرعونية وكنوزها .

الحضارة الميسانية (اليونانية الاولى) .

اكتشاف الحلك (البوصلة) .

عصر بركليس اي عصر اثينا الذهبي .

مولد بوذا والحضارة البوذية .

هندسة اقليدس وطبيعات ارخميدس .

الامبراطورية الرومانية .

مولد المسيح والحضارة المسيحية .

حضارة مايا او الحضارة المايسية .

ظهور الاسلام والفتح الاسلامي .

الحروب الصليبية .

البعثات الاستطلاعية البحرية .

اكتشاف العالم الجديد .

عصر البخار والفحم الحجري .

استخدام الكيمياء واستنباط الكهرباء .

استخدام النفط ومشتقاته .

المناهج الاختبارية تتسم الصدارة .

النهضة العلمية والتقدم التقني السريع .

عصر الذرة .

معالم حضارة غنسية بعد ارتياد القمر .

معالم نهضة تقويمية ترمي الى اكتساح العالم وقد تسبب انقراض البشرية او القسم الاكبر منها .

٤٦٠٦ - تأشير Brinjure. Bringeure (F).

خطوط ضيقة الى سواد تشوب لون الثوب في الحيوان . Brindleding (E).

٤٦٠٧ - تأشير Resanguinage (F). دجسيلة ٥ هو التهجين المفتعل للعودة بالنبات الى صفات فقدتها تتميز بها دحه او عذفه .

٤٦٠٨ - تأشير Alcalinité (F). قلوية هي صفة القلوية او حالتها . Alkalinity (E).

٤٦٠٩ - تأشير Hybridation dégénéréscente (F). Degenerating hybridization (E). التهجين الهابط بالنوع الى ادنى .

٤٦١٠ - تأشير Mandibule (F). Mandible (E). تأشير ج. تأشير . هي الاجزاء الفموية المتساوية الجانبية الارتكاز الموجودة تحت الجاضم والتي تقبض بواسطتها الحشرة على فريستها او ما تقتذي به .

بتكاثف المادة الجامدة وترسيف طبقات الارض .

بتواتر الهزات الارضية والثورات البركانية .

بانتشار الاوكسيجن وبشحن الجو الارضي من هذا المنصر .

- الحقة الثالثة وتدعى ما قبل الحيوان ، تتميز : بنشأة الحياة على الارض .

بظهور اقدم المتحجرات اللامنسوبة .

بظهور اقدم الاحافير النباتية الخضبية .

بنشأة التناسل الشقي (النفاطر) .

بظهور اول خلايا مضيئة ذات جبهة .

بظهور الديدان .

(٢) المرحلة الثانية وتدعى الاباج الاول او القديم وهي تقسم الى خمس حقب .

- الاولى وتدعى الكبرية ، تتميز بانتشار اللافقرات ، التريلوبيت والرشويات والقشريات والشوكيات والاسفنجيات والمجوفات .

وبظهور الطوح في المحيطات .

وبانعدام الحياة البرية على اليابسة .

- الثانية وتدعى السيلورية ، تتميز بظهور الفقريات ، الاسماك المصفحة ، وبانتشار التريلوبيت والتوتيات . وبظهور العناكب على اليابسة والنباتات الاولى من مستورات الزهر الوعائية .

- الثالثة وتدعى الديفوتية ، تتميز بانتشار الاسماك المصفحة والتوتيات والفنيات . بظهور القواذب وانتشار العناكب والدخاخيات .

- الرابعة وتدعى الكربونية ، تتميز بانتشار الاسماك العظمية والقواذب . وبظهور الزحافات والحشرات ومعديات الارجل .

- الخامسة وتدعى البرمية ، تتميز بانقراض التريلوبيت وبانتشار الزحافات وبعض الحشرات المتباينة الحجم والاشكال .

(٣) المرحلة الثالثة وتدعى الاباج الثاني او الاوسط وهي تقسم الى ثلاث حقب .

- الاولى وتدعى الترياسية ، تتميز بانتشار الزحافات المائية والسرتيت . وبانتشار الزحافات البرية الكبيرة الهيكل العظمي ، التي تهيمن على الارض .

- الثانية وتدعى الجورية ، تتميز باستمرار انتشار الزحافات المائية والعمويات . وبانتشار الدناصير والحشرات الكبيرة على اليابسة . وبظهور الثدييات والنباتات باديات الزهر .

- الثالثة وتدعى الطباشيرية ، تتميز بانقراض العمويات ومعظم الزحافات المائية . وبانقراض الدناصير وانتشار الزحافات البرية . وبظهور الطير .

(٤) المرحلة الرابعة وتدعى الاباج الثالثي ، وهي تقسم الى حقبتين .

- الاولى وتدعى النملية ، تتميز بانتشار النمليات في البحار . وبانتشار الثدييات والطير والحشرات والنباتات الكثيرة الزهر في البر .

- الثانية وتدعى النيوحيثية ، تتميز بمحافظتها على معظم الاجناس والانواع البحرية . وباستمرار انتشار الثدييات وبظهور الرئيسات ، ارومة الجنس البشري ، كما يدهون .



تأشير



تاغندست



تاغو مبول



تاكوك



تال



تالينوم

٤٦٢١ - **تأكسد** (F). Oxidation (E).
إذا اتحدت مادة بالأكسجين قبل أنها تأكسدت وإذا كانت المادة المتحدة عنصراً سمي ناتج الاتحاد أكسيداً كأكسيد الرصاص وأكسيد النحاس وأكسيد الكربون . وقد يكون اتحاد المادة بالأكسجين مصحوباً بحرارة فيدعى التأكسد احتراقاً .

٤٦٢١ - **تاكوت** (F). Euphorbia (E).
اطلب فرييون .

٤٦٢٢ - **تاكوك** (S).
Fédie, Valériane d'Alger (F). African valerian, Horn of plenty (E). Algerischer baldrian (D). Fedia, valeriana porporina (I).

جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الناردية . أنواعه أربعة جميعها أعشاب نجمية صغيرة القند تملو من ١٥ إلى ٣٠ سم . سوقها جوفاء فرعاء . أوراقها حاضرة أهليلجية ، نصلها مسنن الحافة ، مدبب العقصة . أزهارها كثيرة ، جميلة الشكل ، وردية اللون وبعضها أبيض .

٤٦٢٣ - **تال** ، **دوم تدمر** (S). Borassus flabellifer (S).
Borasse, Palmier de Palmyre (F). Palmyra-palm, Tal-palm, Great fan palm (E). Palmyrapalme, Weinpalme (D). Palma di Palmira, P. de ferro (I).
شجرة من الثاليات وفصيلة النخليات منبتها البلاد الحارة ساقها منتصبه رفيعة . أوراقها تاجية مروحية كبيرة . يستخرج من ساقها عصارة سكرية يصنع منها خر اليلج . خشبها صلب العود اسود اللون يصلح في صناعة الادوات .

٤٦٢٤ - **تالب** التالب شجر يتخذ منه القسي .

٤٦٢٥ - **تالب** (F). Bouquetin, Ibex (E).
التالب هو الوعل والاثني تالبة .

٤٦٢٦ - **تالي الشولة**

تالي الشولة نجم في برج العقرب يأتي بعد الشولة .

٤٦٢٧ - **تالي النجم**

تالي النجم نجم نير من كوكبة برج الثور .

٤٦٢٨ - **تاليات** (F). Borassées, Borassinées (F).
سبط من فصيلة النخليات يعد بعض الانواع الافريقية والهندية أشهرها التال .

٤٦٢٩ - **تالينوم** ، **هرجرج** (S).
Talin, Taline (F). Puchero of Mexico (E). Brantpflanze, Taline (D). Tallno (I).

نبات عشبي بري وبقي من فصيلة الرجليات . أوراقه شبه لحمية متعاقبة معنقة . أزهاره عنقودية التجميع طرفية الارتكاز وحيدة اللون الأبيض أو الأحمر . منبته اقليم الشواطئ البحرية من أمريكا الوسطى . وهو يستعمل استعمال الجرجير .

٤٦٣٠ - **تاليوم** Thallium
عنصر معدني اكتشفه كروكس عام ١٨٦١ ودرسه لامي عام ١٨٦٢ . صفاته الحكيمة قريبة من الرصاص . رمزه (تا) ثقله النوعي ١١.٨٥ وزنه الذري ٢٠٤ ينصهر في ٢٩٠° سغ . وهو شديد الصلابة سريع

٤٦١١ - **تأشيين** Lixiviation
استخراج القلي من ارمدة النباتات الاشنية .

٤٦١٢ - **تأصيص** ، **تركين** (F). Empotage (F).
Potting (E).
وضع الامير مصطفى الشهابي وهو الزرع في اصيص او في مكن .

٤٦١٣ - **تاغندست** ، **جاوي**

Imperatoria ostruthium (S). Impératoire de montagne, Benjoin français, Autruche, Otours (F). False pellitory of sapin, Fellow grass (E). Echte meisterwurz, Falsches spanisches glaskraut (D). Imperatoria, I. della montagna (I).

نبات طبي جذموري معمر من فصيلة الخيميات . منبته اقليم حوض البحر المتوسط . أوراقه مركبة خماسية ، مستطيلة الزناد . أزهاره صيواني التجميع يرتكز على شراخ منتصب رفيع . أزهاره كثيرة العدد ، صغيرة القند ، بيضاء اللون . جذموره يحوي بعض الخواص الطبية الجزيلة النفع التي اشتهرت في العهد الماضي وكادت تضمحل في عهدنا الحاضر .

٤٦١٤ - **تاغو** (S). Tupinambis (S).
Sauvegarde, Tegu (F).

جنس حيوانات زحافة من العطاء وفصيلة التيديات . انواعه المعروفة خمسة اعطانها المناطق الاستوائية الامريكية || تتميز بكبر اجسامها وباستطالة أسننها المفلوقة الاطراف الاخاذة . جلودها مغلوفة بالخراسف من الرأس الى الذنب . قوائمها قوية نشيطة خماسية الاصابع . اغبابها كبيرة متدلية . اذنانها مستطيلة ضخمة القواعد دقيقة الاطراف || قوتها الحيوانات والطيور والحشرات .

٤٦١٥ - **تاغو أد هس**

Tupinambis rufescens (S).
Sauvegarde rougeâtre, Tegu rougeâtre (F).
نوع من التاغو . موطنه بعض مناطق الارجنتين . يألف ضفاف مجاري الماء ولا يقترب من الاماكن الآملة . قوته الحيوان والطيور || جسمه كبير القند ، يطول نحو ١٢٠ سم ثوبه الى الدهسة يعلوها تمشيع اخضر واسود . الصفحة السفلى من جسمه الى الغبرة الدنسة .

٤٦١٦ - **تاغو مبول**

Tupinambis teguixin (S).
Sauvegarde commun, Tegu commun (F).
نوع من التاغو . موطنه يمتد من البرازيل الى الارغواي والانتيل . يألف الغابات القريبة من الماء ويقترب من الاماكن المأهولة لانه يسطو على الدجاج والبيض . قوته الجرد والفأر والوزغ والطيور ... || جسمه كبير القند يطول نحو ١٥٠ سم . ثوبه الى الخضار الزيتي يعلوه تجذيع معترض اسود . بطنه وكامل الصفحة السفلى من جسمه الى الغبرة الصفراء .

٤٦١٧ - **تافول** Tacca
اطلب تقة .

٤٦١٨ - **تاق** (F). Anaphylaxie (F). Anaphylaxis (E).
فرط التحسس .

٤٦١٩ - **تافلوم** هو التبلد ، اطلبه .

٤٦٤٠ - تَامِينَات مُتَّحِدَة ، تَامِينَات مُقْتَرَنَة
Co-assurances (F). Co-Insurances (E).
هي التأمينات المتتابة على عين واحدة في سبيل خطر واحد
شرط ان لا تزيد جملتها عن ثمن العين المؤمنة .

٤٦٤١ - تَامِيَة * ، صَيْدَلَانِي Tamia (S). Tamia.
جنس حيوانات ليلية قاضمة من فصيلة السنجابيات انواعه
٢٦ منها ٢٥ امريكي ونوع واحد اسيوي . جميعها صغيرة
القد . اجسامها تطول من ١٤ الى ١٨ سم . واذنابها من
١٠ الى ١٢ سم . اثوابها الى الصفرة الغبراء تعلوها خمسة
خطوط سود . اصوافها قصيرة خشنة ، جحورها مساكن
فسيحة المخازن والحجر عديدة المداخل والمخارج ، طويلة
الانفاق المنعرجة والسراريب المتروضة تحفرها قرب جذوع
الاشجار وبين جذورها وتخزن فيها ما تستطيع ادخاره
من بزور وجيوب يرارح وزنها من ٦ الى ٩ كيلو .

٤٦٤٢ - تَاهِيِيَّI
Métazoïque (F).
Metazoic (E).
نعت تعريفي يطلق على ما استبق ظهور الحيوان . كقولك
المصور التأهيبية .

٤٦٤٣ - تَبَارِيح النَّبَات Inflorescence
هي ازهاره او مجموعة ازهاره .

٤٦٤٤ - تَبَاعِد ، تَبَايُن Divergence
اختلاف الاتجاه .

٤٦٤٥ - تَبَاعِدِي ، مُتَبَاعِد ، مُتَبَايِن Divergent
مختلف الاتجاه .

٤٦٤٦ - تَبَاغ Planteur de tabac (F).
Tobacco grower (E).
التبّاع من تعاطى زراعة التبغ .

٤٦٤٧ - تَبَاغَة Tabacologie (F).
Tobacology (E).
التبّاغة البحث في التبوغ وصفاتها وميزاتها ومحتوياتها
العنصرية .

٤٦٤٨ - تَبَان التبان هو بائع التبغ . والتبان هو المكان المعد لحزن التبغ
والجشيش وما اشبه .

٤٦٤٩ - تَبْتِيل Pétalodie (F). Petalody (E).
التبثيل عارض جسموري يعترى ازهار بعض النباتات
فيحول الاسدية الى بتلات .

٤٦٥٠ - تَبْخَر Evaporation
تحويل السائل الى بخار ، من سطحه الطلق ، ببطء وهوادة
بفعل حرارة الشمس .

٤٦٥١ - تَبْخِير Vaporisation, Fumigation (F).
Vaporization, Fumigation (E).
هو احداث بخار لغاية معينة قد تكون صحية او زراعية
او صناعية .

التأكسد في الهواء والماء . يمتزج مع الكبريت والكلور
والبروم واليود والزنك والنيحاس والالومينيوم والزنك
والرصاص || تراكيبه واملاحه سامة قتالة .

٤٦٣١ - تَامِر * ، لُوبِيَاء عُسْقُولِيَّة Dolichos bulbosus (S). Dolique bulbeux (F).
Tuberos grané (E). Dolico bulboso (I).
نبات عشبي حولي عسقولي الجذور من اللوبياء وفصيلة
القطنانيات الفراشية . اعطائه البلاد الحارة يزرع لخبه
وعساقله المأكولة .

٤٦٣٢ - تَامِك التامك : الناقة العظيمة السنام . ج توامك (اللسان) .

٤٦٣٣ - تَامِك Elevé (F). High (E).
نعت وصفي يطلق على كل ما هو مرتفع من النبات والاشياء .
كقولك شجرة تامكة وبناء تامك .

٤٦٣٤ - تَامُور Péricarde (F). Pericardium (E).
هو الشغف ، غلاف القلب .

٤٦٣٥ - تَامُول * ، تَنْبُل ، شَاه صِينِي Piper betel (S). Bétel, Temboul, Poivrier
betel (F). Betel pepper, Betel vine (E). Betelp-
fefferstrauch, Betel (D). Betel (I).
نبات معمر من فصيلة الفلفلث . ساقه ليفية عارشة .
اوراقه متعاقبة منعقة قلبية النصل . ازهاره ابطية . تكثر
زراعته في الهند حيث يصفون اوراقه . ثماره جوزية
يستخرج منها صباغ احمر مرغوب فيه . ويستخرج من
اوراقه بالتقطير وبعد معالجتها باليوتاس مادة مائنة فستقية
اللون تدعى «روح التامول» مفعولها التطهيري يزيد
مفعول الفينول خمسة اضعاف .

٤٦٣٦ - تَامُول ضَيْقُ الْوَرَق * ، مَتِيكُو ، عُرْطَنث Piper angustifolium (S). Bétel à feuilles étroites,
Matico, Herbe du soldat (F). Matico plant,
Soldier's herb (E). Soldatenkraut (D). Erba di
soldato (I).
نوع من التامول . اوراقه ضيقة النصل يقال انها طيبة
نافعة كثيرة الفوائد الصحية . اوراقه وثماره تستعمل
استعمال التامول .

٤٦٣٧ - تَأْمِين Assurance (F). Insurance (E).
عقد يلتزم به المؤمن مقابل قبض بدل متفق عليه ان يدفع
الى المؤمن له او الى مستحق التأمين مبلغاً محدداً او دخلاً
منظماً اذا ما وقع خطر معين كالحريق وهلاك الماشية .

٤٦٣٨ - تَأْمِين زَرَاعِي ، ضَمَان زَرَاعِي Assurance agricole (F). Agricultural Insurance (E).
اتفاق متبادل بين زارع وشركة تدفع هذه بموجبه الى الزارع
قيمة الهالك او التالف من الشيء المضمون لقاء عجالة
ثابتة او متبدلة . مثاله ضمان الماشية من الطوارئ وتأمين
الزروع من الصقيع .

٤٦٣٩ - تَأْمِينَات Sûretés (F). Warranty (E).
هي الضمان المتقدم لاجل تنفيذ الالتزام . والتأمينات قد
تكون شخصية او عينية .



تَامِر



تَامُول



تَامُول ضَيْقُ الْوَرَق



تَامِيَة

٤٦٦٣ - تَبَسُّس Sitelle (F).

طائر يدعى كاسر الجوز ، اطلبه . ومنه الاروبي والازرق والسرياني .

٤٦٦٤ - تَبَسُّس سِرْيَانِي Sitelle syriacus (F).

طائر يدعى كاسر الجوز السرياني ، اطلبه .

٤٦٦٥ - تَبَسُّسِيَّات Sittidae (S).

Sittidés (F). Sittidae (E).

فصيلة طير من الجواثم المتسلقات رقيقات المناقير . انواعها المعروفة ٢٤ اعطانها البلاد المعتدلة الحرارة وبعض المناطق الشمالية || معظم انواعها آبد وبعضها ضارب . تألف الحراج والغابات . قوتها الحشرات والدويبات اخصها العناكب وبعض البزور والحبوب || اجسامها صغيرة ، ربة . رؤوسها معتدلة الجرم . مناقيدها مخروطية مستطيلة . اجنحتها معتدلة الرخابة ، عشارية القوام . اذناها قصيرة مربعة الشكل ، تتألف من ١٢ رفة || تدن في تجاريف الاشجار وفي اوقاب الصخور . اناثها تحضن من ٣ الى ٩ بيضات . الترخيم يستمر من ١٣ الى ١٤ يوماً . الذكور تؤمن الغذاء || اشهر انواعها التَبَسُّس .

٤٦٦٦ - تَبَسُّش Loriot (F). Oriole (E).

طائر يقال له صفارية واجمعها .

٤٦٦٧ - تَبَسُّشِيَّات Oriolidae (S).

Oriolids (F). Oriolidae (E).

فصيلة طير من الجواثم مشروبات المناقير . انواعها المعروفة نحو ٤٠ معظمها من ضوارب وقواطع العالم القديم || تألف الحراج والمواقع التي تكثر فيها الاشجار الباسقة . ملجنها الحيائي جماعي باستثناء زمن التصادف والحضانة || قوتها الحشرات الطائرة والدابة وبعض الثمار العنية || اجسامها رشيقة ، متفاوتة القد . اطوالها تراوح من ٢٠ الى ٢٧ سم . رؤوسها ومناقيدها معتدلة الجرم . اجنحتها مستطيلة ، ذلفة . اطول قوادمها الرابعة . اذناها متوسطة القد ، مقطومة الطرف . اناثها ملونة ، يكثر فيها الاصفر والاصفر الاخضر المواجه . اناثها اهدت ثوباً من ذكورها || اشهر انواعها التبشش المعروف بالصفارية .

٤٦٦٨ - تَبَشُّع Ricin (F). Castor-oil plant (E).

التبشع هو الخروع ، اطلبه .

٤٦٦٩ - تَبَع * Agrion (F). Dragon-fly (E).

جنس حشرات من فصيلة التبعيات . انواعه عديدة جميعها اسطوانية الجسم المستطيل النحيل . اجنحتها رباعية زاهية الالوان . تعيش قرب الماء .

٤٦٧٠ - تَبَعُّش Dispersion (F).

Dispersion, Breaking-up (E).

٤٦٧١ - تَبَعِي Vache en chaleur (F).

التبعي هي البقرة المستحمة (القاموس) .

٤٦٧٢ - تَبَعِيَّات Agrionidae, Calopterygidae (S).

Agrionidés, Calopterygidés (F).

Agrionidae, Calopterygidae (E).

فصيلة حشرات من الرعاشات اجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها حشرات مفيدة تفترس الهوام . وهي تتميز بضعف طيرانها وبعدم استرسال اجنحتها عند الراحة . اناثها تمتح مكنتها على النباتات المائية تحت الماء .

٤٦٥٢ - تَبَدُّل Variation

هو التغير الذي يحصل في الصفات الاساسية لضرب او نوع ما من النبات او لعرق او سلالة حيوانية . ومن التبدلات ما تنتقل بالوراثة ومنها بالتطعيم .

٤٦٥٣ - تَبَدُّل فَجَائِي Mutation (F). Change (E).

هو الافتجاء ، اطلبه .

٤٦٥٤ - تَبْدِيد ، إِخْتِلَاس Détournement (F).

Turning away, Misappropriation (E).

هو ان يخرق حائز العين عمداً العقد القانوني الذي خوله وضع يده عليها محتفظاً بملكيتها لغيره فيتصرف في هذه العين تصرف المالك اما برفض ردها الى مالكها او بتسليمها للغير .

٤٦٥٥ - تَبِير Or vierge (F). Native gold (E).

هو الذهب الطبيعي ، اطلب ذهب .

٤٦٥٦ - تَبَرَّع Libéralité (F). Bounty (E).

هو كل تصرف لا عوض عنه مهما كانت طريقته كالحبة والوصية الخ .

٤٦٥٧ - تَبَرُّعُ Debourement (F).

Bursting of the breds of trees (E).

تبرعت الشجرة : خرج برعمها .

٤٦٥٨ - تَبَرُّومَة Theobroma (S). Théobrome (F).

جنس نباتات شجرية من فصيلة البرازيات . انواعها كثيرة العدد معظمها بري وبعضها زراعي يستثمر لبدوره التي يستخرج منها الكاكاو . اعطانها البلاد الحارة الرطبة . سوقها منتصب تعلو من ٤ الى ١٦ م . جذورها وتدية . اغصانها فرعاء . اوراقها معتقة متعاقبة لاقياسية الشكل . نصالها بارزة العروق . ازهارها خنثوية ، خاسية التركيب جذعية وفرعية الارتكاز . ثمارها قرون مخروطية مستطيلة يعلوها غطاء قطبي حنطي اللون عدد اضلاعه يراوح من ٥ الى ١٠ لبانها عنبية المادة سكري الطعم يلحف بعض البذور اللوزية الشكل التي يستخرج منها الكاكاو . اشهر انواعه تبرومة الكاكاو المعروفة بالكاكاو وتبرومه ماريا .

٤٦٥٩ - تَبَرُّومَة الكاكاو Théobrome cacao (F).

هي الكاكاو ، اطلبه .

٤٦٦٠ - تَبَرُّومَة مَارِيَا * Theobroma Mariae

Abroma Mariae, Herrania Mariae (S) Théobrome Marle, T. du Brésil (F).

نوع من التبرومه البرية مهددا البرازيل في مناطق الامازون العليا . شجرتها تعلو نحو ١٠ امتار . اوراقها كبيرة القد مركبة كفية سباعية او تساعية الوريقات الاهليلجية المستطيلة ، زنادها يطول نحو ٥ سم . ازهارها الى الصفار الموشح بالاحمر بزورها مستحبة الطعم والعرف ، عادمة المرارة تستعمل استعمال الكاكاو .

٤٦٦١ - تَبَرِّي Flave (F). Pale yellow (E).

هو اللون الاصفر المذهب .


٤٦٦٢ - تَبَرِير ، تَسْرِيَة Grainage (F).

Silk-worm's eggs (E).

عمل يرمي الى الحصول على سر دود القز .



تَبَرُّومَة مَارِيَا



تَبَع

N. Maritima	١٦	تبغ مريتا
N. Megalosiphon	٢٠	مفلوسيفون
N. Multivalvis	٢٤	مليفلفيس
N. Miersii	١٢	ميارسي
N. Nesophila	٢٤	نوفيليا
N. Noctiflora	١٢	نكتيفلوره
N. Nudicaulis	٢٤	نوديكوليس
N. Wigandoides	١٢	ويغنديويد

٤٦٧٥ - تبغ تباكم* ، نيكوليانا تباكم

Nicotiana tabacum (S).

عرة من التبوغ انواعها ٦ . حصة منها برية وزينية
واحد يدعى باسم العرة تحدرت منه الضروب والاصرام
الزراعية المعروفة المشهورة || نباتاتها متباينة النشط
والقوة . سوقها منتصبه تكثر فيها الفروع الهامة .
اوراقها نظامية الارتكاز متفاوتة العدد الذي يراوح من
١٦ الى ١٢٠ . نصالها حاضنة وبعضها لاطى* وهي مختلفة
الاشكال والاحجام يكثر فيها الاهليلجي الكبير الصفحة .
ازهارها عنقودي التجميع . ازهارها لاقياسية اللون الذي
يراجح من الابيض الى الارجواني || نظامها النطشي قياسي
الترتيب والعدد . نطاق انواعها ١٢ باستثناء نوع تباكم
المزدوج العدد || اوراقها تستعمل للتدخين والمضغ والسعوط
ويستخرج من بذورها مادة زيتية جفوفة تصلح لصناعة
الصابون وادهان البويا || اما انواعها الستة فهي ما يتبع :

N. Otophora	١٢	تبغ أوفوره
N. Tabacum	٢٤	تباكم
N. Tomentosa	١٢	تومتوزا
N. Rusbyi	١٢	رسي
N. Setchellii	١٢	ستشلي
N. Glutinosa	١٢	غلوتينوزه

٤٦٧٦ - تبغ رستنيكا* ، نيكوليانا رستنيكا

Nicotiana rustica (S).

عرة من التبوغ انواعها المعروفة ٩ معظمها بري وزينية
ضروبها واصرامها الزراعية عديدة . نباتاتها ناشطة قوية .
سوقها منتصبه . اوراقها معنقة مختلفة الاشكال والاحجام
يكثر فيها الشكل القلبي . ازهارها الى الصفرة يعطوها موج
اخضر || نظامها النطشي قياسي الترتيب والعدد . نطاق
انواعها ١٢ باستثناء نوع رستنيكا المزدوج العدد .
اشهر ضروبها الزراعية الصناعية وخصها الماخوركا تزرع
في بلاد الاتحاد السوفياتي وفي سائر اروبة الشرقية . ومن
ضروبها الحامية القوية الغنية بمادة النيكوتين تخص
بالذكر الزلاخ الذي يزرع في مراکش والسوفي الذي يزرع
في تونس والبرازيليا الذي يزرع في ايطاليا || اما انواعها
التسعة فهي :

N. Benavidesii	١٢	تبغ بنافيدسي
N. Paniculata	١٢	بنيكولاته
N. Thyrsiflora	١٢	تيرسيفلوره
N. Rustica	٢٤	رستنيكا
N. Raimondii	١٢	رموندي
N. Solanifolia	١٢	سولانيفوليا
N. Glauca	١٢	غلوكا ، سيس
N. Cordifolia	١٢	كرديفوليا
N. Knightiana	١٢	كنيكتيانه

Tabac, Nicotiana (F).

Tobacco, Nicotiana (E).

اسم شامل يدل على الجنس . يستعمل للتعريف النوعي
والضربي كقولك تبغ تباكم وتبغ رستنيكا وتبغ بافرا
وتبغ جزيني الخ . والتبغ من تعاطى زراعة التبغ .

٤٦٧٤ - تبغ بتونيويد* ، نيكوليانا بتونيويد

Nicotiana petunioides (S).

عرة من التبوغ انواعها المعروفة ٤٥ جميعها برية
وزينية . نباتاتها اعشاب متناقلة الكسم والشوزن ،
لاقياسية التفريع معظمها ضمي الفروع الجزعية الانتشاب .
اوراقها لاقياسية التجميع والارتكاز قراكب عند اسفل
الجدع والفروع وهي متباينة الاشكال والاحجام . نصالها
لاطئة او معنقة . ازهارها مستطيلة الانابيب مختلفة الالوان
منها الابيض والوردي والاحمر والبنفسجي وهي بغالبيتها
تسكع وتنطبق في وجه النور ، تفتح وتتنور في الظل
والظلام || نظامها النطشي متفاوتة الاعداد ، لاقياسي
الترتيب . نطاق انواعها يراوح من ٩ الى ٢٤ || اما
انواعها فهي ما يتبع :

N. Attenuata	١٢	تبغ أنواتا
N. Arentsii	٢٤	أرنتزي
N. Exigua	١٦	اكزيكوا
N. Excelsior	١٩	اكسلسيور
N. Occidentalis	٢١	اكسيدنتاليس
N. Acaulis	١٢	اكوليس
N. Acuminata	١٢	اكوميناتا
N. Alata	٩	الاتا
N. Ameghinii	١٢	أمغينو
N. Undulata	١٤	أندولاته
N. Inguiba	؟	إنغوليا
N. Palmeri	١٢	بلسميري
N. Petunioides	١٢	بتونيويد
N. Plumbaginifolia	١٠	بلمباجينيفوليه
N. Benthiana	١٩	بنتميانه
N. Pauciflora	١٢	بوسيفلوره
N. Bonariensis	٩	بوناريينسيس
N. Bigelovii	٢٤	بيغلوفي
N. Trigonophylla	١٢	تريغونوفيليا
N. Debneyi	٢٤	دبني
N. Repanda	٢٤	ربندا
N. Rotundifolia	٢٢	روتنديفوليه
N. Spegazzinii	١٢	ستيغزيني
N. Stocktonii	٢٤	ستكتوني
N. Stenocarpa	؟	ستينوكربا
N. Suaveolens	١٦	سوافيولنس
N. Sylvestris	١٢	سيلفستريس
N. Goodspeedii	٢٠	غودسبيدي
N. Gossei	١٨	غوسي
N. Fragrans	٢٤	فراغرانس
N. Velutina	١٦	فلوتينيا
N. Quadri-valvis	٢٤	كدريفلفيس
N. Clevelandii	٢٤	كليفلندي
N. Corymbosa	١٢	كورمبوزا
N. Longiflora	١٠	لنجيفلوره
N. Langsdorffii	٩	لنغسدورفي
N. Linearis	١٢	لينياريس



تبغ بتونيويد



تبغ تباكم



تبغ رستنيكا

٤٦٧٧ - تَبَقِيَّات ، نيكوتيانِيَّات

Nicotianées (F). Nicotianeae (E).

جنس نباتات عشبية حولية برية وزراعية من الفصيلة الباذنجانية . انواعها عديدة وضروبها بضع مئات . يقال ان منبتها الاصلي امريكة الجنوبية ومنهم من قال الهند . وهي بمعظمها نباتات وحيدة الساق المنتصبة تعلو من ٥٠ الى ٢٥٠ سم . اوراقها مختلفة الاشكال والاحجام تحوي بعض المواد المخدرة الشبه قلوية اخصها وافعها «النيكوتين» . ازهارها كاملة خنثوية خماسية البتلات والاسدية . ثمارها بزور صغيرة كستنائية اللون يجمعها حق ثنائي الفلق رباعي الغريفات || والتبقيات تقسم الى ثلاث عتر رئيسية وهي :

Nicotiana tabacum

تبغ تباكم

Nicotiana rustica

تبغ رستيكا

Nicotiana petunioïdes

تبغ بتونيويد

اما الضروب والاصرام التي تحدثت من انواع هذه العتر فلا يقل عددها الحالي عن ٨٠٠ .

٤٦٧٨ - تَبْقِيل (F). Cross-breeding (E).

هو الانفال ، قوامه الجمع بالانزاع بين حيوانين من نوعين مختلفين للحصول على نتاج معين .

٤٦٧٩ - تَبَقُّع * (F). Spots (E).

وصم فطري يصيب بعض الاشجار المثمرة والخرجية فيؤذيها سببه فطور مجهرية تعرف بالموطب . اطلب عوطب .

٤٦٨٠ - تَبَلْدِي (F). Monkey bread (E).

راجع بوباب .

٤٦٨١ - تَبَلَّص

تبلصت الغم الارض : رعت ما فيها اجمع .

٤٦٨٢ - تَبَلُّل ، إِذْمِصَّاص (F). Adsorption

هو امتصاص الجوامد للسوائل وهو ايضاً تشرب الجوامد للغازات .

٤٦٨٣ - تَبَلُّور (F). Crystallization (E).

هي الاشكال الهندسية التي يكتسبها الجسم عند استحالتة من الميوعة الى الصلابة .

٤٦٨٤ - تَبْلِيد ، تَوَطِين ، تَأَقْلِم (F). Acclimatation (E).

هو اخضاع الحيوان او النبات الى مناخ جديد لم يألفه .

٤٦٨٥ - تَبْلِيل ، تَرَشَّاش (F). Irroration (E).

Dew-bath (E).

تعريض الشيء للتدلى او البلل .

٤٦٨٦ - تَبْن (F). Teben

التبن عصفية الزرع من بر ونحوه . الواحدة تبنة . وتبن : جعل التبن في المتبن . وتبن الدابة : علفها التبن .

٤٦٨٧ - تَبْن مَكَّة (F). Scenanth (E).

راجع لإذخرم .

٤٦٨٨ - تَبْنَة ، رُف (F). Paille hachée

٤٦٨٩ - تَبُوع

Tabacs, Nicotianas (F).

Tobaccos, Nicotianas (E).

هي مجموعة ضروب واصرام التبغ المزروعة في بلاد ما لا رابط بينها سوى رابط البلاد او الوحدة الاقليمية .

٤٦٩٠ - تَبُوع ، تَجَرُّم (F). Sporulation, Sporallation (E).

Sporulation, Sporation (E).

هو حصول البوغ في النباتات المستورات الزهر .

٤٦٩١ - تَبْوِير (F). Laisser une terre en friche (E).

To let a piece of ground lie fallow (E).

هو ترك الارض بوراً اي بلا زرع .

٤٦٩٢ - تَبْوِيز (F). Bossage (E).

Embossement (E).

Déclaration (F).

Déclaration (E).

هو اعلان او شهر او ابانة الحالة القانونية او الفعلية القائمة .

٤٦٩٤ - تَبْيَع

هو ولد البقرة اول سنة . وبقرة تبيع : معها ولدها . والاثني تبعة . ج تباع .

٤٦٩٥ - تَبْيَع (F). Congestion

راجع احتقان .

٤٦٩٦ - تَبْيَكَّة * (F). Phyllachora

جنس فطور مجهرية من اليبايات وفصيلة العشويات . تتميز باصانها المركبة المخوفة القائمة على وليمة لاجولية . بوغها وحيد الخلية يضي الشكل شفاف || له نوعان اقتصاديان وهما :

٤٦٩٧ - تَبْيَكَّة العَرْن (F). Phyllachora lathyri

Diachora onobrychidis. Placosphaeria onobrychidis (S).

فطر مجهري يصيب بعض القرنيات اخصها العرن . مظهره الخارجي بقع مستطيلة ، لونها الى السمرة ، تركيب النصل ، تفصلها عن بعضها العروق والشرابين || اضراره جسيمة اذا استحكمت وسمحت له العوامل الجوية لانه يسبب يباس الاوراق .

٤٦٩٨ - تَبْيَكَّة النجيلِيَّات

Phyllachora graminis (S).

فطر مجهري يركب بعض النجيليات . اخصها النجيل والثرغول والثيل والمكرش والتسيل والعصوية والدخن . مظهره الخارجي بقع قديمة الشكل لونها الى السمرة تصيب العصف واعمالها على صفحاتها العليا فتسبب جفاف النسيج ثم يباس .

٤٦٩٩ - تَبْيُوكَة (F). Tapioca (E).

صيد خشن مأكول غني بهيدرات الكربون سريع الهضم يصنع من دقيق المنيوت ، راجع منيهوت .

٤٧٠٠ - تَتَابُع ، تَسَلُّس (F). Séquence (E).


Sequence (E).

٤٧٠١ - تَتَانُوس ، تَيْتَانُوس (F). Tétanos (E).

هو الكزاز مرض وييل ، اطلبه .



تبغ



تبغ

٤٧٠٢ - تترافوسفات الكلس

Tétraphosphate de chaux (F). Tetrphosphate limestone (E).
سماد كيمائي فسفاتي يحوي نحو ٦٢٪ من الحامض الفسفوري.

٤٧١٢ - تشفل

التشفل : شجر يسميه أهل الحجاز مشط الذئب .
« : نبات مثل الاصبع انخضر في نخضرته خطبة .
« : ما يبس من العشب .

Colmatage, Limonage (F). تشقين
Warping (E).

هو ارسال الماء الزغل في الارض لتجود . يقال تقن الارض .

Tabacs en feuilles (F). تشن
Tobacco leaves (E).

هو التبغ الجاف بعد رزمه وتضييحه وتحت بعض الوقت .

Tabac haché (F). تشن مفروم
Mixed tobacco, Choped tobacco (E).

هو التبغ الجاف المفروم الممكن لفه وتدخينه .

Terreautage (F). Moulding (E). تشيرب
التشيرب هو توزيع التيرب او الزبل المشرب .

Téthys (F). Tethys (E). تشيس

اسم اسطوري يطلقه علماء الجغرافية ، في هذا العصر ، على البحار الاستوائية ذات المياه الساخنة الكثيرة الملوحة .

Nivation (F). تشجين

كل تخديد في الحضيض سببه السيل منها كان مركزه ومنها بلغ قدره .

Renardeau (F). Fox-cub (E). تشفل
ولد الثعلب .

Trisection تشليث
قسمة الشيء الى ثلاثة اجزاء متساوية .

Tierçage (F). تشليث
هو حرث التربة ثالث مرة لتطيب بعد تفكيك مدرها واندماجها .

٤٧٢٢ - تشمين ، تشقدير الشمين ، تشمين الشمين
Estimation en argent (F). Appraising, Valuation (E).
هو تعيين ثمن الشيء المكشوف عليه او المراد بيعه .

Réassurance (F). تشمينية التأمين
Reinsurance (E).

Essaimage (F). Swarming-time (E). تشوئل
هو اجتماع النحل عند مدخل الخلية او القفير او المباءة قبل الافراق او عندما يكون على اهبة الافراق .

Amativité (F). تشجاذب
Amativeness (E).

التجاذب ، عند محترفي فراسة الدماغ او من يتعاطاها ، اسم يطلق على الميل الطبيعي الذي يتكون بين مخلوقين فيقودهما الى التعارف والتعاطب .

Maquignonnage (F). تجارة الخيل
Horse-dealing, Underhand wort (E).
عرض الخيل للبيع والشراء . وتدعى جنيزة ونحاسة .

Tetranychus (S). تترانيك

Tétranyque, Araignée rouge (F). Tetranychus, Red spider (E). Rote Spinnen (D).

جنس حشرات ضارة من فصيلة الخاشيات انواعه عديدة جميعها بيضية الشكل طولها يراوح من ٥.٠ الى ١.٠ مم . اثوابها الى الحمرة الصفراء المواج ، جرائزها اربعة ازواج . مكنها ذري القد ، مستدير الشكل ابيض اللون او احمر تمتحه الانثى على النبات داخل شبكة من النواس الدقيق فينفف عن يرقات تعرف بالعناكب الحمر تتعدى على مسام النصل وخلاياه ونسغه فتؤذيها وتعطب النبات .

٤٧٠٤ - تترانيك الاشجار المثمرة

Tenuipalpus oudemansi (S).
حشرة من التترانيك ثوبها احمر اللون تركب اوراق وثمار التفاح والاباص والدراق والخوخ والمشمش واللوز... فتؤذيها اشد الاذى بعد ان توشها برقشة من البثور المجهرية السراء اللون .

٤٧٠٥ - تترانيك الحمضيات
Anychus latus (S).
حشرة من التترانيك ثوبها الى الخطي الاصفر . تركب اوراق وثمار الحمضيات اخضها الليمون الحلو وقد لا تعف عن بعض اشجار الزينة واللبخ والخروع .

٤٧٠٦ - تترانيك القراض
Tetranychus urticae, Tetranychus altheae (S).

حشرة من التترانيك ثوبها الى الحمرة الصفراء المواج تركب القراضيات والقراصيات واللوبياء والفول فتؤذيها اشد الاذى .

٤٧٠٧ - تترانيك النجيل
Dolichotetranychus floridanus (S).

حشرة من التترانيك ثوبها الى الجؤوة تصيب النجيل وبعض النباتات العشبية البرية التابعة للفصيلة نفسها .

٤٧٠٨ - تترانيك تيلاريوس


Tetranychus telarius (S).
حشرة من التترانيك كثيرة الاذى تركب مختلف النباتات العشبية والليفية والخشبية . ثوبها الى الحمرة الزاهية ، يصفر مع العمر وعند يياتها الشتوي . اجيالها الحولية ثلاثة . جيلها الصيفي يتم باكل من اسبوعين وهي لذلك تتكاثر بسرعة وتعتبر من الحشرات المؤذية .

٤٧٠٩ - تترانيكيات


Tetranychidae (S).
Tétranychidés (F). Tetranychidae, Red spiders, Red spider unites (E). Rot Spinnen, Spinnmilben (D).
هي فصيلة الخاشيات ، اطلبها .

٤٧١٠ - تشومس
Lupinose (F). Lupinosis (E).
هو التسمم الذي يحصل من اكل حب الترمس او نباته مدة طويلة .

٤٧١١ - تشريب
Terrage (F). Earthwork (E).
التشريب هو نقل تراب زراعي حسن التركيب وبسطه على ارض قليلة الحصب بقصد تحسينها . راجع لتراب .



تترانيك



تترانيك الاشجار المثمرة



تترانيك الحمضيات



تترانيك تيلاريوس




تشجين

٤٧٤٠ - تجزئة ، تقسيم Démembrement (F).
Dismemberment (E).
هو فصل بعض حقوق من ملكية العين ونقلها الى غير مالك العين فتصبح هذه الحقوق عينية يملكها هذا الغير وتحوطه بعض صفات مالك العين كحق الاتفاق والانتفاع .

٤٧٤١ - تجسيم Stéréométrie (F). Stereometry (E).
التجسيم ومنهم من قال التكوين هو قياس الاجرام المحسوسة .
٤٧٤٢ - تجعد ، تجعيد Frisolée (F). Crinkle (E).
هو الزفن وصم يعري البطاطا .

٤٧٤٣ - تجصيص Plâtrage (F). Plastering (E).
هو الاصلاح بالجص اي باضافة الجص الى التراب بغية اصلاح تركيبه .



تجويل مترادف

٤٧٤٤ - تجفيف ، قيبس ، تنشيف Dessiccation, Séchage (F). Desiccation, Drying (E).
هو ازالة الماء او العصارة المائية التي يخشى العطش من بقائها في معظم المحاصيل الزراعية .

٤٧٤٥ - تجفيف Effoliage (F).
هو قطع رؤوس الزرع اذا طال تخفيفاً له وخوفاً من الضجعان .

٤٧٤٦ - تجلبس Lathyrisme (F). Lathyrism (E).
هو التسمم الذي يحصل من غلف الحيران جلبساً مدة طويلة .

٤٧٤٧ - تجلية Performance

٤٧٤٨ - تجنيس Homogénéisation (F).
Homogeneization (E).

٤٧٤٩ - تجنيف Talutage (F). Sloping (E).
التجنيف جعل الشيء منحدرًا كالتجنيف .

٤٧٥٠ - تجهيز Equipement (F).
Outfit, Fittingout (E).

٤٧٥١ - تجويل مترادف* Cloisonnement
simultané (F). Dividing membrane (E).

٤٧٥٢ - تجويل معترض* Scissiparité,
Cloisonnement transversal (F). Scissiparity,
Schizogenesis (E).

٤٧٥٣ - تحات Cryergie (F). Cryergy (E).
التحات العمل الانحطائي الذي يسببه الجليد وذوبانه في الصخور وفي التربة .

٤٧٥٤ - تحاريق Etiage (F). Low-water mark (E).
راجع بروض .

٤٧٥٥ - تحال ، تنافذ Osmose (F).
Osmose, Osmosis (E).

التحال هو التبادل الذي يحصل بين السوائل المختلفة الكثافة والمفصولة بعضها عن بعض بغشاء عضوي حتى يتم تجانس تركيبها . والتحال قد يكون داخلي او خارجي .

٤٧٧٧ - تجارة السمك Mareyage (F).
Fresh-fish trade (E).

٤٧٢٨ - تجانس ، تناسب Homogénéité (F).
Homogeneity (E).
صفة الاشياء المتشابهة الخلق او الشكل .

٤٧٢٩ - تجاوز حد الانتفاع Abus de jouissance (F).
هو تجاوز حق المنفعة المحدود على عين ما كارتكاب الافعال التي تحط من قيمة الملك .

٤٧٣٠ - تجيب نوع من التجويل يعرف عنه بان لا يتجاوز بياض القوائم الركبتين او العرويين بل يستقر تحتها .

٤٧٣١ - تجبين Empréurage, Caséation (F).
Caseation (E).

هو اضافة المسوة او المنفحة الى الحليب بغية تخثيره وجعله جبناً .

٤٧٣٢ - تجديد ، مواصلة Reconduction (F).
Renewal of a lease or tenancy (E).
هو تجديد او مواصلة مفعول العقد اذا لم يعلن احد الطرفين فسخه الى الآخر ضمن مدة معينة .

٤٧٣٣ - تجديد التحريج ، تاجيم Reboisement (F).
Retimbering, Reafforestation (E).
هو اعادة غرس الاشجار او بذرهما في ارض كانت مشجرة وقطعت او اقتلعت اشجارها .

٤٧٣٤ - تجديد المزاد Sureenchère (F).
Higher bid, Outbidding (E).
هو انه اذا رسا رسمياً مزاد عقار على شار تقدم احد الراغبين في العقار في المدة القانونية وهي عشرة ايام فالتزم بشراء العقار بالثمن الذي رسا به على الشاري الاول مع زيادة عشر هذا الثمن وحينئذ تحدد جلسة للمزاد الجديد ويجوز لكل راغب آخر ان يزيد فيها .


٤٧٣٥ - تجديد ضمني Tacite reconduction (F).
Renewal by tacit agreement (E).
هو تجديد عقد الايجار عند انتهائه دون ان يعارض المؤجر في ذلك .

٤٧٣٦ - تجدير Extraction
عملية حساية غايها معرفة جذر العدد .

٤٧٣٧ - تجريب Essai (F). Essay, Experiment (E).
التجربة هي الاختبار والامتحان مرة بعد اخرى وذلك لمعرفة مقدور الشيء او امكانياته او للتثبت منه او من بعضه .

٤٧٣٨ - تجزؤ ، تخذيع Parcellement (F).
Parcelling (E).
قسة الارض الزراعية الى عدة قطع تنظيمياً للعمل .

٤٧٣٩ - تجزؤ الملكية Morcellement de la propriété (F).
Parcelling out (E).
توزيع الارض المشتركة على مالكيها او تقسيمها الى حصص مختلفة .



تجويل معترض

Boisement (F). **٤٧٦٩ - تخريج**

Planting land with trees (E).

هو إنشاء الحراج في ارض كانت خلواً من الاشجار.

Mue (F). Moulting (E). **٤٧٧٠ - تحشير**

هو استبدال الريش عند الطير.

Améliorations (F). **٤٧٧١ - تحسينات**

Ameliorations, Improvements (E).

كل ما من شأنه رفع مستوى الاستثمار الزراعي والصناعي.

Coulure (F). **٤٧٧٢ - تحشيف، صاصة**

Falling off, Dropping off (E).

سقوط الزهر بعد امتناع الاخصاب.

Macadamisage, **٤٧٧٣ - تحصيب، تكديم**

Macadamisation (F). Macadamization (E).

رصف الطرقات بالحصب لتعيدها على طريقة ماك آدم.

Réserves (F). Reservation (E). **٤٧٧٤ - تحفظات**

Drainage **٤٧٧٥ - تحفيض**

صرف المياه الزائدة من التربة المعرضة لاستيعاب الكثير منها. وقد يتم ذلك بواسطة المنازح او الاقنية.

Vérification (F). Verification (E). **٤٧٧٦ - تحقيق**

اجراء يرمي الى التأكد مما اذا كان الشيء الممرض ينطبق على المطلوب.

Arbitrage (F). Arbitration (E). **٤٧٧٧ - تحكيم**

التحكيم هو تسوية منازعة على يد فرد او افراد يقال لاحدهم حكم.

Phytographie (F). **٤٧٧٨ - تحليلية**

Phytography (E).

التحليلية في علم النبات البحث المختص بالوصف الشكلي الدقيق.

Description **٤٧٧٩ - تحلية**

هي وصف الشكل الحيواني او النباتي كما يبدو للعين.

Ampélographie (F). **٤٧٨٠ - تحلية الكروم**

Ampelography (E).

هو علمها النباتي الشامل مع وصف النوع والضرب.

Escargotage (F). **٤٧٨١ - تحليز**

التحليز هو القضاء على الحلزونات وقد يكون ذلك اما بجمعه او باستعمال المساحيق الفعالة التي تبنيه كالمالدهيد وغيره.

Analyse (F). Analysis (E). **٤٧٨٢ - تحليل**

هو تفريق عناصر جسم معين لمعرفة ماهيتها ومقاديرها.

٤٧٨٣ - تحليل التربة، فحص التربة

Analyse des terres (F). Analysis of soils (E).

هو تفريق وتحديد العناصر والمواد التي تتركب منها التربة.

Eudiométrie (F). **٤٧٨٤ - تحليل الغازات**

Eudiometry (E). هو تحديد الغازات ومعرفة نسبها.

١٤٧٥٦ - **تحال خارجي، تنافذ خارجي**

Exosmose (F). Exosmose, Exosmosis (E).

هو مجرى نفوذ السائل من الداخل الى الخارج وقد يتم غالباً ببطء.

٤٧٥٧ - **تحال داخلي، تنافذ داخلي**

Endosmose (F). Endosmose, Endosmosis (E).

هو مجرى نفوذ السائل من الخارج الى الداخل وقد يتم غالباً بوقت قصير.

٤٧٥٨ - **تحايي**

التحايي ثلاثة كواكب حذاء الهمة. واحدها تحياة.

Effritement (F). **٤٧٥٩ - تحشت، تفتت**

Exhaustion, Crumbling (E).

Sous-sol (F). **٤٧٦٠ - تحتربة، هوم**

Subsoil, Substratum (E).

(التحتربة لفظة حديثة منحوتة من تحت التربة اما الهوم فرعية قديمة.) || طبقة التراب الكائنة تحت ما يتناولها المحراث من التربة الزراعية.

Prédétermination (F). **٤٧٦١ - تحتمية**

Predetermination (E).

التحتمية نظرية بيولوجية فحواها ان البويضة تحوي في كنهها جميع مركبات الجسم من خلايا ونسج واعضاء. وان الانسكام او التسمم يحوي النسج والاعضاء فتكاثر وتظهر وتنمو.

Hypotrishes (F). **٤٧٦٢ - تحشيات الهدب**

Hypotrishes (E).

رتبة من النقيعات الهدديات تشمل ست فصائل وعدة اجناس مع مئات الانواع.

٤٧٦٣ - **تحجبر، تحجير، تصلب**

Pétrification (F). Petrification (E).

تحول شيء الى حجر.

Balzane (F). White stocking (E). **٤٧٦٤ - تحجيل**

هو البياض في قوائم الفرس قل او كثر. والفرس تدعى بحجلة.

Arcure (F). Arching (E). **٤٧٦٥ - تحجين***

حجن او صرد العود : عويجه وعطفه فجاء مستديراً.

Délimitation (F). **٤٧٦٦ - تحديد، وضع الحدود**

Delimitation. Fixing of boundaries (E).

هو تعيين الحد بين عقار وعقار.

Roulage (F). **٤٧٦٧ - تحديل، حذل، تمليس**

Rolling (E).

هو حذل التربة لتسوية سطحها وتفتيت المدر في التراب المندمج. وللحدل اهداف اقتصادية عديدة جميعها في صالح التربة وزراعتها.

Prospection des mines (F). **٤٧٦٨ - تحوري المعادن**

Prospecting of mines (E).

حفر التربة تفتيشاً عن المعادن.



تحجين

٤٧٩٩ - تخ **Fermentation**
هو الاختيار ، اطلبه . وهو عصارة السم اي دهنه المعروف بالسرج .

٤٨٠٠ - تخارج **Partage, Quote-part (F).**
Sharing, Quota (E).
التخارج هو اقتسام الحصص . يقال تخارج الشركاء :
اتقسموا فانخذ بعضهم المال وبعضهم الدار وبعضهم الارض ...

٤٨٠١ - تخالض **Décharge (F). Discharge (E).**
راجع ابراء .

٤٨٠٢ - تخت * **Réceptacle (F). Receptacle (E).**
ينهم من قال قرص الزهرة وكربي الزهرة . هو الجزء القاعدي من الزهرة الذي يجتمع حوله الكأس والتبريج والاسدية واخبية المبيض .

٤٨٠٣ - تخثير **Condensation**
التخثير هو تكثيف الشيء او تجميده . الصقيع يكثف البخار في الجو || والتخثير كيمائياً هو اتصال واتحاد جزيين او اكثر .

٤٨٠٤ - تخديم **Balzane petite (F).**
Small white-footed (E).
هو عندما يجاوز بياض التحجيل الارياغ .

٤٨٠٥ - تخويق **Remplacement des manquants (F).**
هو استبدال الشتول والنصوب الميتة باخرى سليمة .

٤٨٠٦ - تخس * **Phocoena (S).**
Marsouin (F). Porpoise (E).

جنس حيوانات لبونة من رتبة الحيتان وفصيلة الدلفينيات انواعه ثلاثة اجسامها وشية الشكل تطول من ١٢٠ الى ١٥٠ سم . ظهورها الى الرمادي الاسود العابق . بطونها الى الطحلة البيضاء الزاهية الموج . رؤوسها مستديرة ، مناسفها قصيرة ، زعانفها الصدرية منفرجة الزوايا المقطوعة اما الظهرية فتلاية مقربة || موطنها جميع البحسار تكثر في الاوقيانوس الاطلسي والبحر المتوسط والاسود والاحمر والاقيانوس الهندي والهادي . تقترب من المياه الاقليمية وتدخل مصبات الانهار . || تعيش جماعات كثيرة العدد ترافق اسراب الرنكة والشابل والاسقمري والسلمون || اناثها تضع في شهر ايار جرواً واحداً طوله نحو ٥٠ سم . وزنه ٥ كيلو || تصاد للحما المأكول ولشحها الكثير الاستعمال وجلدها الصناعي .

٤٨٠٧ - تخس الكرسنة * **Tychius quinquepunctatus (S).**

حشرة من السوسيات طولها نحو ٣ سم . ثوبها حنطي اللون يملوه تخطيط وتجليع اصفر وجلباب من الحمل المذهب . تعيش على القطنيات اخصها النباتات الكرسنية . يرقاتها تركب حب الكرسنة والبيقية فتتخره وتعيش في داخله كامل حياتها البرقية .

٤٨٠٨ - تخشيب **Lignification**
تحول المواد العشبية او الليفية الى خشية .

٤٧٨٥ - تحليل حكيمى **Analyse physique (F).**
Physical analyse (E).
هو معرفة وتحديد العناصر الرئيسية التي تتركب منها التربة كالرمل والصلصال والجص .

٤٧٨٦ - تحليل كمي **Analyse quantitative (F).**
Quantitative analyse (E).
هو تحديد كمية ونسبة العناصر التي تتركب منها التربة .

٤٧٨٧ - تحليل كيمائى **Analyse chimique (F).**
Chemical analyse (E).
هو تحديد المواد الكيمائية الموجودة في التربة اخصها الازوت والبوتاس وحامض الفسفور .

٤٧٨٨ - تحليل ميكانيكى **Analyse mécanique (F).**
Mechanical analyse (F).
هو تحديد قدر الاجرام ونسبتها .

٤٧٨٩ - تحميت **Edulcoration (F).**
Sweetening (E).

اضافة بعض السكر او المواد السكرية على غيرها من المواد النافهة الطعم او المرة لتحسين مذاقها .

٤٧٩٠ - تحميم **Etuvage (F). Bathing (E).**
هو التجفيف بالبخار او بالهواء الساخن .

٤٧٩١ - تحميم الملت **Tourailage (F).**
Malt-kiln desiccation (E).
هو تجفيف الشير الناش والناتج عن صناعة الجعة (البيرا) .

٤٧٩٢ - تخميص **Acidification (F).**
Acidification (E).

تحويل المادة الى حامض .

٤٧٩٣ - تخميل **Mouillage (F). Wetting (E).**
هو اضافة بعض الماء الى الخمر او غيرها من المشروبات الروحية .

٤٧٩٤ - تخنير **Voussure (F). Curve (E).**
حناية العقد وتقبينه .


٤٧٩٥ - تخول ، تعكيس **Inversion (F).**
Reversal (E).
هو تبدل طبيعة الشيء كتحويل السكر العادم قابلية الاختار الى سكر قابل الاختار .

٤٧٩٦ - تخوير * **Blanc, Maladie du blanc (F).**
وصم فطري يصيب النبات في بعض اعضائه اخصها الاوراق والجذور . سببه فطور مجهرية مختلفة تركب العضو السليم فتسقطه بوشاح من نواصها الابيض الاغبر يقضي على مسام البشرة وخلايا النسيج || اشهر الفطور التي تسبب التخوير هي الازداد والطريم والفسخ والنباغ .


٤٧٩٧ - تخوير **Dessollement (F).**
Altering the rotation of crops (E).

تنظيم تماقب الزراعات الحقلية خلافاً لما تقتضيه الدورة الزراعية .

٤٧٩٨ - تحويل **Conversion**
هو تغيير التركيب والشكل .



تخوير



بعض اشكال التخت



تخس



تخس الكرسنة

بترك العقان على ارويات الشجر المقطوع واما صنياً ببذر البزور او تنصيب الفراس || والتخليف هو ايضاً تجديد اسماء الاحواض .

٤٨٢٥ - تخليل (F). Acetification (E). تحويل انتقع الكحولي الاختار الى خل .

٤٨٢٦ - تخم ، تخمة ، عسر هضم ، بشتم ، سنّف ، حَمَر Indigestion (F). Indigestion, Surfeit (E).

هو توقف الهضم في المعدة والامعاء لسبب ما ، كشرب الماء البارد او الافراط في العلف او لابتلاع علف صعب الهضم الى آخره . وعسر الهضم عند الخيل يدعى حمر .

٤٨٢٧ - تخم* ، تخم Borne (F). Landmark (E). هو الفصل بين الارضين من المعالم والحدود . ج تخوم وهو كذلك منتهى كل ارض او قرية او بلدة .

٤٨٢٨ - تخمير Levurage (F). Yeasting (E). وضع خميرة العنب في العصير ليختمر فيصير خمرأ .

٤٨٢٩ - تخميس* Plantation en quinconce (F). Quincunx planting (E). هو الغرس المتعارض الانباق على شكل خمسات .

٤٨٣٠ - تخمين ، تقدير Estimation en matière (F). Valuation (E). هو معرفة وتحديد مقدار الشيء المكشوف عليه .

٤٨٣١ - تخمين الثمن ، تقدير الثمن ، تسمين Estimation en argent (F). Appraising (E). هو تحديد الثمن او وضع الثمن التقريبي للشيء المكشوف عليه من اي نوع كان .

٤٨٣٢ - تخنيق ، كتم Buttage, Chaussage (F). Raising, Mounding, Girdling (E). هو جمع التراب حول ساق النبات .

٤٨٣٣ - تداخل Interférence (F). Interference (E). هي الظاهرة الناتجة عن تنظيم الحركات الارتجاجية بين بعضها . شرحها وضبطها يعودان الى العالم « فرسل » .

٤٨٣٤ - تدبير ، إجراء Measure (F). Measure (E). كل احتياط يتخذ لمنع هلاك الاموال او للاهتمام الى الحقيقة .

٤٨٣٥ - تدبيق Engluement (F). Grafting-wax (E). اطلب دبق .

٤٨٣٦ - تدبيل ، إدبال Humification هو تحول المواد العضوية الى دبال .

٤٨٣٧ - تدجين Domestication هو جعل الحيوان الوحشي حيواناً داجناً .

٤٨٣٨ - تدخين Fumage, Fumigation (F). Smoking, Fumigation (E). هو معالجة بعض المأكولات بالدخان لتحسينها وحفظها اخصها اللحوم والاسماك .

٤٨٣٩ - تدريج Falsan (F). Pheasant (E). هو التدريج ، اطلبه .

٤٨٠٩ - تخشير Epamprement (F). Lopping off (E). هو في الشيع نزع الاوراق السفلى التي تلامس التراب ولا قيمة لها .

٤٨١٠ - تخشيل Elimination. راجع خشل .

٤٨١١ - تخصيص ، إختصاص Affectation هو تعيين القصد الذي يستعمل المال في سبيله .

٤٨١٢ - تخصيص الحصص Assignation des parts (F). Assignment (E). هو اجراء قسمة مال مشترك وتعيين الحصص وقبول كل شريك الحصة التي اختصه بها المقتسمون دون اللجوء الى القرعة .

٤٨١٣ - تخصيب Mordancage (F). Mordicancing (E).

عملية تحضيرية تؤهب المادة لاقتبال الانوان .

٤٨١٤ - تخضير Engazonnement, Gazonnement (F). Turfing (E). جعل الارض خضيراً مع الاعتناء ببيئتها .

٤٨١٥ - تخضين Eburnation, Eburnification (F). Eburnation (E).

التخضين تحويل العظم الى مادة شبيهة بالعاج بصلابتها وبثقلها النوعي .

٤٨١٦ - تخفيض ، إلتقاص Réduction, Réfaction (F). Reduction, Rebate (E). هو رفع بعض المتوجب تأديته .

٤٨١٧ - تخفيف ، خفف ، تفريج ، تفريد Eclaircissage (F). Clearing up (E). هو اقتلاع النباتات الزائدة او الكثيفة التجميع التي تعيق نمو رفيقاتها .

٤٨١٨ - تخفيف ، تدويب ، مدق Dilution اضافة ما يلزم من الماء او غيره لتركيز الليار المطلوب .

٤٨١٩ - تحلل Abandon (F). Relinquishment (E). هو التخلص من شخص او حيوان او شيء او التنازل عن حق .


٤٨٢٠ - تحلف الشرط Défaillance de la condition (F). Fainting fit (E). هو الشرط الذي لم يتحقق .

٤٨٢١ - تخليب Epamprement (F). Lopping off (E). انتزاع الاوراق التي تلامس التراب او الاوراق السفلى من النبات بعد ان قل نفعها .


٤٨٢٢ - تخليط Métissage (F). Cross-breeding (E). من طرائق الاسفاد . قوامه انزاع الهجين على الهجين .

٤٨٢٣ - تخليف ، تمليخ Céilletonnage (F). Layering (E). طريقة تكثير بعض النباتات بنواميها او خلوفها وملوخها .

٤٨٢٤ - تخليف ، إخلاف Repeuplement (F). Repeopling, Restocking (E). هو تجديد الحرجة التي قطع شجرها وقد يكون اما طبيعياً



تخم



تخميس



تَدْرُوم



تَدْرِج شَائِع



تَدْرِج فَضِّي

٤٨٥١ - تَدْفُق ، مَدَّ Flux (F). Flux, Flow (E).
هو ما يدعونه المد اي اندفاع مياه البحر نحو الشط في موافيتها . وهو كمية الضوء المندفقة في ثانية واحدة . وهو ايضاً فيض الدم ، من العوارض التي تتناب الاجسام الحيوانية .

٤٨٥٢ - تَدْمِيم Revêtement (F). Revetment (E).
هو طلي احواس ومحاقن الماء بالاصاد الواقى منعاً للتشيع .

٤٨٥٣ - تَدْنِين Cuvage, Cuaison (F).
Fermenting, Cuaison (E).
هو جعل عصير العنب يختمر في الدن .

٤٨٥٤ - تَدْوِين Enregistrement (F).
Enregistering (E).
تسجيل الكتابة في سجل رسمي .

٤٨٥٥ - تَدْبِيل Javelage (F). Laying (E).
عملية صناعية تبني قوامها حفظ خيطان التبغ المشكوك في الظلمة الدامسة مدة من الوقت تراوح من ٢٤ الى ٤٨ ساعة قبل تعليقها على المنشر وتعرضها لاشعة الشمس .
الغاية منها ايقاف مفاعيل الخشب وتحضير الخلايا النباتية الى تفكيك موادها الغذائية وتحولها واستيعاب الحرارة والبرد بدون اذى .

٤٨٥٦ - تَدْرِج ، تَدْرِج Phasianus (S). Faisan (F). Pheasant (E).
جنس طير من فصيلة التدرجيات . انواعه عديدة جميعها برية تألف الحراج والاجام الفضة الاشجار || يتميز بشكل ذيله المتراكب الريش المستطيل ، الضمي . التجميع ، المستدق الطرف . اجنحته قصيرة مستديرة . رأسه صغير الطرة الناعمة الريش . منقاره محدوب الفك الاعلى .
محسره لعلولي الجلد . رشفه املط || قوته التهام والحبوب والاعشاب والحشرات والضفادع والحلزونات || انثاء تبيض من ١٢ الى ١٦ بيضة تحضنها وحدها في افحوص تدثنه في الارض بين العوسج والادغال الكثيفة . اعرف واشهر انواعه ما يتبع .

٤٨٥٧ - تَدْرِج شَائِع * Phasianus colchicus (S).
Faisan ordinaire, F. de Colchide, F. commun (F).
طائر من التدرج بحيل الثوب المتراكب الالوان العديدة . هذه الشرق الاوسط ومنه انتشر في اوروبا الجنوبية والشرقية والشمالية || رأسه الى الخضار الازرق الاسفع الموج . صدره وبطنه وخشاه الى الجؤرة الخطية ، رباشها سود الخافة . ظهره وجناحاه الى الصبهة السمراء المشومة بالابيض . افنيكه احمر اللون يعلو موج ارجواني اسفع .

٤٨٥٨ - تَدْرِج فَضِّي * Phasianus argentatus (S).
Faisan argenté (F).
طائر من التدرج كبير الجثة مستطيل الذيل . كشته كثيفة مستطيلة الريش الاسود الناعم النائم على الرأس . محسره املط البشرة الحمراء اللون || ثوبه ابيض فضي يعلو خطوط سود ضيقة العرض . صدره الى الزرقة السمراء الفضية الموج || موطنه الصين الجنوبية . وهو سهل التدجين والربية . انثاء تبيض نحو ١٦ بيضة تحضنها من ٢٥ الى ٢٦ يوماً .

٤٨٥٩ - تَدْرِج مُخَضَّب Phasianus versicolor (S).
Faisan versicolore, F. bigarré (F).
قريب الشبه من التدرج الشائع لكنه اقصر ذيلاً واعبق لوناً . رأسه وعنقه وصدره الى الزرقة السوداء اللامعة .

٤٨٤٠ - تَدْرِجِيَّات Phasianidés (F). Phasianidae (E).
هي فصيلة التدرجيات ، اطلبها .

٤٨٤١ - تَدْرُن رِئَوِي Phtisie pulmonaire (F).
Phthisis pulmonary (E).
هو السل الرئوي .

٤٨٤٢ - تَدْرُوم ، طَائِر الزَّوَابِع * Thalassidroma (S). Thalassidrome (F).
جنس طير من كفيات القدم وفصيلة الرغائيات . انواعه المعروفة اربعة اعطائها معظم مجادح بحار العالم باستثناء الشمالية والقطبية || تألف اوقاب الصخور . مسرحها العادي يستمر من العصر الى فحمة الليل . اما في العواصف والزوايع فانها تفرح من الفجر الى النجر . قوتها الاسماك والقشريات والرخويات || اجسامها صغيرة تطول من ١٥ الى ١٩ سم . مناقبها محببة الافاك العليا . اجنحتها مستطيلة ، ذلقة ، تلحف الاذنان وتتجاوزها . اذنانها معتدلة الطول ، منها المقطوبة ومنها الفارقة والمستديرة . اثوابها الى السمرة السوداء الكستنية الموج . بعض انواعها يعلو تبقيج ابيض في مؤخر البطن من اليمين واليسار ، وبعضها ابيض الافنيك || اناثها تبيض في كل نقرة تجدها بين الصخور . حضنتها بيضة واحدة . وقد تبيض وتحضن اربع مرات في الحول || اما انواعه الاربعة فهي التالية :

٤٨٤٣ - تَدْرُوم اَبْيَض الْاَفْنِيك Thalassidroma leucorhoa (S).
Thalassidrome cul-blanc (F).
نوع من التدروم يكثر وجوده في بحار الارجتين والبرازيل .

٤٨٤٤ - تَدْرُوم الْعَاصِفَة Thalassidroma pelagica (S).
Thalassidrome tempête (F).
نوع من التدروم يكثر وجوده في بعض مناطق البحر الابيض المتوسط وفي معظم بحار اروبة .

٤٨٤٥ - تَدْرُوم الْمَحِيط Thalassidroma oceanica (S).
Thalassidrome océanien (F).
نوع من التدروم يكثر وجوده في بحار المكسيك والانتيل .

٤٨٤٦ - تَدْرُوم بُلُور Thalassidroma Bulweri (S).
Thalassidrome de Bulwer (F).
نوع من التدروم يكثر وجوده في بحار افريقية الشمالية .

٤٨٤٧ - تَدْرِيج Gradation (F).
Gradation, Climax (E).
الازدياد او الانتقاص المتوالي بترتيب .

٤٨٤٨ - تَدْرِيج Marcottage (F). Layering (E).
او التعقيل اطلبه .

٤٨٤٩ - تَدْرِين ، تَعَسُّف Tubérisation (F).
Tuberisation (E).
تحويل القسم السفلي من النبات او بعضه الى عسافل .

٤٨٥٠ - تَدْعَص Putréfaction (F).
Putrefaction, Putrescence (E).
هو التآدم اي انحلال المواد النيتروجينية العضوية بفعل الجراثيم .

٤٨٧١ - تَرَابَةٌ ، إِسْمَكْت Ciment (F).

Cement (E).

مزيج من الصلصال والجص يعرف كإسمنتاً بسليلكات الالومين المزدوجة أو سيليكات الكلس المزدوجة . يحضر في أفران خاصة ويستعمل في البناء . من ميزاته سرعة انكماشه وتصلبه .

٤٨٧٢ - تَرَاتُلوُوجِيَّة Tërátologie (F).

Teratology (E).

هي علم التعاجيب . علم يبحث عن أسباب غرائب المخلوقات كالأخداج والأغراب والشعلة .

٤٨٧٣ - تَرَاخِيلُومٌ * ، زَهْرَةُ العِنَقِ

Trachellum (S). Trachélie (F). Throatwort (E). Halskraut (D). Trachelio (I).

جنس نباتات طبية وزينية محولة أو معمرة من فصيلة الجريسيات . يقال أنها تنفع أوجاع العنق || أنواعه قليلة أشهرها التراخيلوم الأزرق . سوقها منتصب كثيرة الفروع تعلو من ٤٠ إلى ١٠٠ سم . لحاء سوقها مخططة بالأزرق والبنفسجي . أوراقها معنقة ، متعاقبة ، سنانية ، فصلها مالمس البشرة ، منشاري الحافة || أزهارها زرقاء اللون ثم ليلكية || أزهارها يستمر من حزيران إلى آب .

٤٨٧٤ - تَرَارٌ * Euplocamus (S).

Euplocome (F). Euplocamus (E).

جنس طير من الدجاجيات وفصيلة التدرجيات . أنواعه المعروفة ثلاثة : ترار ملقة وترار صوته وترار بورنيو المعروف بالترار النبيل || أجسامها متقاربة وأثوابها كذلك . جميعها صغيرة الرؤوس المتوجة بكشاة تعلو مؤخر الرأس . أرساغها عفية . أجنحتها معتدلة الطول وإذياها كذلك . الإناث لا تتحل بأثواب الذكور || أما الترار النبيل فتوجه إلى الزرق البنفسجية المواج . ظهره ذهبي اللون . رفال ذنبه بيض . محسراه ولحاصه إلى الزرق . كشته زرقاء اللون سوداء المواج .

٤٨٧٥ - تَرَاصُعُ Accouplement des oiseaux (F).

Copulation of birds (E).

هو التصادف في الطيور إخصها الإهلية .

٤٨٧٦ - تَرَأَقُ Huître (F). Oyster (E).

حيوان ذو صدف يعلق بالصخور في الماء المالح . اطلب محار مألوف .

٤٨٧٧ - تَرَاكْثُورٌ ، جَرَّارَةٌ Tracteur (F).

Tractor (E).

جرارة آلية تستعمل في مختلف الأعمال الزراعية إخصها أعمال التربة كالحراث والمذق والخف .

٤٨٧٨ - تَرَبٌ

الترب : الكثير التراب . يقال ترى ترب وتربة تربت .

٤٨٧٩ - تَرُبٌ ، طُرْبٌ Tourbe (F). Peat (E).

تراب عضوي قابل الاشتعال تكوّن من البقايا النباتية المفحمة .

٤٨٨٠ - تَرَبٌ وضع عليه التراب .

٤٨٨١ - تَرَبَاءٌ ، طُرْبَاءٌ Tourbière (F).

Peat-bog, Peat-moss (E).

هو المكان الذي يكثر فيه الترب .

أجنحته وأفنيكه متراكبة الألوان الموشجة ، المؤذرة والمنشدة . موطنه الصين واليابان .

٤٨٦٠ - تَذْرِجٌ مُّذْهَبٌ * Phasianus oratus (S).

Faisan doré, F. à collerette, Thaumalé (F).

طائر من التدرج . مستطيل القد والأفنيكه . يتميز بكشاة رأسه الملحبة وبطيبة ، من الريش الناعم المنتصب ، تطوق عنقه . ثوبه متراكب الألوان يغلب فيه الأبيض والأصفر المذهب . قوامه إلى الجؤوة . أباهره إلى الزرق السفعاء ، زمكه أحمر الريش ، أفنيكه إلى الصهبة الصفراء المذهب || موطنه الشرق الأقصى وهو سهل التدجين والتربية .

٤٨٦١ - تَذْرِجٌ مُّكْرَمٌ * ، تَذْرِجٌ مَلَكِي

Phasianus Reevesii (S). Faisan vénéré, F. royal, Oiseau-flèche, Tche-ky (F).

طائر من التدرج كبير القد . يطير كالسهم . يتميز باستطالة ريش أفنيكه || ثوبه متراكب الألوان يرتكز على الأبيض والأصفر الذهبي . توشيمه بقع وزراکش جؤوية وجؤزية وسوداء اللون || موطنه أحراج الصين .

٤٨٦٢ - تَذْرِجٌ مُّنْغُولِيٌّ * ، لُومٌ

Phasianus chrysomelas (S). Faisan de Mongolie, F. à collier (F).

طائر من التدرج موطنه بلاد المنغول وهو سهل التدجين والتربية . أثناء تبيض نحو ٦٠ بيضة || ثوبه عديد الألوان الزاهية المتراكبة المرتكزة على الأخضر الأصفر الجميل . يتميز بطوقه الأبيض وبزركشة أفنيكه وتوشيمه .

٤٨٦٣ - تَذْرِجَةٌ Faisane (F). Hen-pheasant (E).

أنثى التدرج .

٤٨٦٤ - تَذْرِجِيَّاتٌ ، تَذْرِجِيَّاتٌ

Phasianidae (S). Phasianidés (F). Phasianidae (E).

فصيلة طير من رتبة الدجاجيات تتميز بسرعة عدوها ، يقلة وضعف طيرانها ، بقوة مقارها وباستدارة أجنحتها . مهدها العالم . أجناسها ثمانية : الارغوس والتدرج والحنقط والعترقان والسيفنة والشنكيس والطاوس والقبيط .

٤٨٦٥ - تَذْكِرَةٌ شَحْنٌ Connaissance (F).

Bill of lading (E).

هي سند الشحن ، إيصال بالبضائع المشحونة في السفينة يقدمه ربانها إلى مستأجرها ويشتمل عادة على كل شروط عقد النقل .

٤٨٦٦ - تَذْنِيبٌ * Accouplement des insectes (F).

Copulation of insects (E).

التذنيب للضباب والفراش إذا أراد التعاقل والسفاد (اللسان)

٤٨٦٧ - تَذْوُقٌ ، تَحْمُزٌ Dégustation (F).

Tasting (E).

هو الاستمذاق .

٤٨٦٨ - تَرٌّ

Cordeau (F). Cord (E).

هو الخيط الذي يمد البشاء فيبني عليه .

٤٨٦٩ - تَرَابٌ التراب : ذراع الشاة والكبش .

٤٨٧٠ - تَرَابٌ

Terrain, Terre, Sol (F).

Ground, Land, Soil (E).

هو الجزء من تراب الأرض الذي يتناوله الحراث ويعرف بالتربة .



تدرج مذهب



تدرج مكرم



تدرج منغولي



تذنيب



تراخيلوم



ترار

٤٨٩٣ - تربة دولوميتية (F). Terrain dolomitique (F).
Dolomitic earth (E).
ارض مركبة من صخور كلسية مغنيزية اطلق عليها اسم الصخور الدولوميتية.

٤٨٩٤ - تربة دماشاء (F). Terre franche (F).
هي التربة الخصبة الرغاب التي اكتمل تركيبها الحكيمي والكياوي الممكن تحديده كما يلي :
طين من ٢٠ الى ٣٠٪
كلس « ٧ » ١٢٪
رمل « ٥٠ » ٧٠٪
دبال « ٤ » ١٠٪

٤٨٩٥ - تربة رغباب (F). Terrain perméable (F).
Permeable soil (E).
هي التربة التي ينفذ منها الماء أو بالاحرى هي التربة التي تركيبها يمنعها من التشبث بحفظ الماء.

٤٨٩٦ - تربة رملية ، تربة صوانية (F). Terrain siliceux (F).
Silicous soil (E).
هي التي تحوي من ٦٠ الى ٨٠٪ من الرمل.

٤٨٩٧ - تربة رملية طينية ، تربة رملية صلتصالية (F). Terrain silico-argileux (F).
Silicous-clayey soil (E).
هي التربة الرملية التركيب التي تكثر فيها نسبة الصلصال.

٤٨٩٨ - تربة رملية كلسية ، تربة رملية جصية (F). Terrain silico-calcaire (F).
Silicous-calcareous soil (E).
هي التربة الرملية التركيب التي تكثر فيها نسبة الجص.

٤٨٩٩ - تربة زراعية (F). Terre arable (F).
Arable soil, Tillable (E).
هي طبقة التراب السطحية التي تتناولها الاعمال الزراعية من حرارة وغيرها.

٤٩٠٠ - تربة طباشيرية (F). Terrain crétacé (F).
Cretaceous ground (E).
تمود الى الحقبة الثانوية . ومعظم تراب هذه الحقبة يتألف من الطباشير . والارض الطباشيرية تقسم الى فئتين الطباشيرية العليا والطباشيرية السفلى .

٤٩٠١ - تربة طينية ، تربة صلتصالية (F). Terrain argileux (F).
Clayish soil (E).
هي التي تحوي من الطين أو الصلصال أو الغضار من ٣٠٪ وما فوق .

٤٩٠٢ - تربة طينية رملية ، تربة طينية صوانية (F). Terrain argilo-siliceux (F).
Clayish-silicous soil (E).
هي التي تحوي ما لا يقل عن ١٥٪ من الطين ومقدار كبير من الرمل .

٤٩٠٣ - تربة طينية كلسية ، تربة صلتصالية جصية (F). Terrain argilo-calcaire (F).
Clayish-calcareous soil (E).
تعتبر من احسن التربة تركيباً . تحوي من ١٥ الى ٢٥٪ طين ومن ١٠ الى ١٥٪ كلس ومن ٦٠ الى ٧٠٪ رمل.

٤٨٨٢ - تربة (S). Tillaea (S).
Tillée (F). Tillaea (E).
جنس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة المخلدات . انواعها المعروفة قليلة العدد ، منها الطوعي رمال بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط || سوقها فرعاء تعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم . اوراقها متقابلة ، رحيمة النصال اللحمية الحمراء اللون . ازهارها ابضية الارتكاز . بيضاء اللون او وردية || تنويرها ربيعي او صيفي .

٤٨٨٣ - تربة قزط (F). Carthame des teinturiers (F).
Safflower (E).
هو قرط الصباغين ، اطله .

٤٨٨٤ - تربة ، تراب (F). Terrain, Sol (F).
Ground, Soil (E).
التربة من الوجهة العملية هي الجزء من تراب الارض الذي يتناوله المحراث . والتربة قد تكون زراعية وغير قابلة للزراعة كما قد تختلف تركيبها . اما اقسامها واشكالها فعديدة . اعلمها التالية .

٤٨٨٥ - تربة أعبلية ، تربة غرانيتية (F). Terrain granitique (F).
Granitic ground (E).
هي التربة الناتجة عن تفتت الصخور الاعبلية .

٤٨٨٦ - تربة جورية (F). Terrain jurassique (F).
Jurassic ground (E).
ارض جيولوجية من الحقبة الثانوية . والكلمة منسوبة الى جبال جورا في فرنسا حيث تكثر هذه التربة .

٤٨٨٧ - تربة خصبة (F). Terre fertile (F).
Fertile soil (E).
ارض تكثر فيها العناصر الغذائية فيجود نباتها . ومن اسمائها المستعملة : خصبة ، غصبة ، غصاب ، طيبة ، مرمعة .

٤٨٨٨ - تربة خلنجية (F). Terre de bruyère (F).
Heath soil (E).
التربة الخلنجية او تراب الخلج تربة حرجية تكثر فيها نسبة العناصر العضوية المتأينة عن تراكم الاوراق وسائر المواد النباتية المنحلة . وهي تفتقر عادة الى فسفات الكلور .

٤٨٨٩ - تربة خواردة (F). Terrain meuble (F).
Mellow soil, Loose ground (E).
هي التي سلت ونعمت بالدبال والحرق .

٤٨٩٠ - تربة دبالية (F). Terrain humifère (F).
Mould soil (F).
وتدعى تربة عضوية . هي كل تربة منسوبة التركيب الحكيمي تحوي من ٨ الى ١٥٪ من الدبال .

٤٨٩١ - تربة دلولية (F). Terrain dévonien (F).
Devonian ground (E).
طبقة جيولوجية من الحقبة الاولى منسوبة الى احدى كور انكلترا .

٤٨٩٢ - تربة دلفانية (F). Terre glaise (F).
Clay, Potter's earth (E).
هي التي تحوي من ٤٠ الى ٤٥٪ من الطين مع ٥٠ الى ٥٥٪ من الرمل الصواني والحزفي الناعم والشديد النعومة .

٤٩١٧ - تربية الدواجن
Elevage des animaux domestiques (F).
فن توليد وتربية الحيوانات الالهيّة واستثمارها اقتصادياً .

٤٩١٨ - تربية السرطان ، سرطنة
Astaciulture (F).

فن تسريء السرطان وتربيته والعناية بصغارها ريثما تصلح للبيع . وقد يتم ذلك في أحواض خاصة ومواقع ملائمة من الوجهة البيئية والتقنية .

٤٩١٩ - تربية السمك
Pisciculture (F).
Pisciculture, Fish-culture (E).

فن تسريء الاسماك والعناية بها وقد يتم في أحواض خاصة او في اهور طبيعية ملائمة .

٤٩٢٠ - تربية الطيور الداجنة
Aviculture (F).
Bird-raising, Poultry-farming (E).

علم يبحث في العناية بجميع الطيور الداجنة اخصها الدجاج والبط والاوز والحمام ...

٤٩٢١ - تربية العلق ، سلاعة
Hirudiniculture (F). Leech-culture (E).

فن تربية العلق وتكثيره ان في المناقع الطبيعية او في آبار صناعية .

٤٩٢٢ - تربية المائيات
Aquiculture (F).
Water-culture (E).

فن تربية الحيوانات والاسماك والنبوت المائية .

٤٩٢٣ - تربية المحار
Ostréiculture (F).
Oyster-culture (E).

فن العناية بالمحار واستثماره اقتصادياً .

٤٩٢٤ - تربية الميضية
Mytiliculture (F).
Mussel-culture (E).

علم توليد وتربية الميضية اي بلح البحر .

٤٩٢٥ - تربية دود القز
Sériciculture (F).
Sericulture, Silk-culture (E).

فن العناية بدود القز .

٤٩٢٦ - تربية القز
Arrosage par submersion (F).
Watering submersion (E).

هو الاسقاء بالغمر .

٤٩٢٧ - تربية
Quadrature
تحويل الاشكال المختلفة الى مربعات معادلة .

٤٩٢٨ - تربية الجذع
Equarissage (F).
Squaring (E).

هو نشر جوانب ساق الشجرة المقطوعة لتتوازي سطوحها الاربية .

٤٩٢٩ - تربيعي
Quadratique (F). Quadratic (E).

هو شكل مربع او مختص بمربع .

٤٩٣٠ - قرقرة
Hibiscus mutabilis (F).
Rose changeante (F). Changeable rose (E). Sine-sische rose, Veränderlicher cibirische (D). Rosa cangiante. Fior cangiante (I).

بجلة تزيينية معمرة من الحيازيات ازهارها جميلة الشكل ، كبيرة القد ، متداخلة الالوان الزاهية . تعيش وتنمو في

٤٩٠٤ - تربة كيم
Terre imperméable (F).
Watertight soil (E).

هي التربة التي تمسك الماء وتمنع نفوذه كالتربة الطينية مثلاً .

٤٩٠٥ - تربة كلسية ، تربة جصية ، تربة جيرية
Terrain calcaire (F).
Calcareous soil (E).

هي التي تحوي من ٢٠ ٪ وما فوق من كربونات الكلس .

٤٩٠٦ - تربة كلسية رملية ، تربة جصية رملية ، تربة كلسية صوانية
Terrain calcaro-siliceux (F). Calcareous-siliceous soil (E).

هي التي يكثر فيها عنصر الرمل بعد الكلس .

٤٩٠٧ - تربة كلسية طينية ، تربة جصية صلتصالية
Terrain calcaro-argileux (F).
Calcareous-clayish soil (E).

هي التي يكثر فيها عنصر الصلتصال بعد الكلس .

٤٩٠٨ - تربة مجدية
Terrain improductif (F).
Unproductive ground (E).

التربة المجدية والجلباء والمجدة والمجداب والمحال والحلة هي العديمة الخصب والاثاء .

٤٩٠٩ - تربة مغلل ، تربة مرباع
Terrain productif (F). Productive ground (E).

هي التربة الخصبة الوافرة الاتاء .

٤٩١٠ - تربة مندية
Terrain compact (F).
Compact ground (E).

هي التربة المنكمشة المتساكة الذرات .

٤٩١١ - تربة
Ipomoea turpethum, Convolvulus turpethum (S).
Turbith (F). Turbeth (E). Turbith (D). Turblide (I).

نبات عشبي طربي بري من فصيلة اللبلايات . جذوره مسهلة ومطهرة للمعدة والامعاء . راجع الثمان تربة .

٤٩١٢ - تربية الجذر
Endorhize (F).
Endorhize (E).

نعت تعريفي يطلق على كل نبات ينشأ جذره في التربة .

٤٩١٣ - تربية
حنطة حراء وسنبليها ايضاً احمر ناصع الحمرة وهي رقيقة تنتشر مع ادنى ريح او برد (التاج عن ابي حنيفة) .

٤٩١٤ - تربية الارانب
Cuniculture, Cuniculiculture (F). Rabbit-culture (E).

فن توليد الارانب والعناية بها .

٤٩١٥ - تربية الحلزون
Helliculture (F).
Snail-culture (E).

فن العناية باكثار الحلزون وتربيته المجدية .

٤٩١٦ - تربية الخيل
Hippotechnie (F).
Hippotechny (E).

فن تربية الخيل وترويضها وهو يشمل كل ما له علاقة بالانساب والتربية والصفات وتمهيد الحجور وتناجها والترويض والعلف الخ .



تربة



تربية الجذع



تربة

٤٩٤٠ - ترخيل الإعتياد ، نقل الإعتياد

Report de crédit (F).

اجراء مالي يعتبر استثناء في سنية الميزانية مؤدا ان ترخيل الى السنة المالية التالية اعتمادات مقيدة في السنة الحاضرة لم تستنفد بأكملها .

٤٩٤١ - ترخون ، سهنون

Trachinus (S). Vive (F). Weever, Sting-fish (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الترخونيات ورقبة شائكات الزعانف . انواعها المعروفة عديدة معظمها من اسماك المحيط الاطلسي والهادي وبعضها يستوطن البحر الابيض المتوسط || جميعها اهليلجية او رحيمة الشكل ، متوسطة الحجم او صغيرة . رؤوسها غليظة خذروفية . اخطامها شبه جالسة الاشدق . عيونها رفيعة الارتكاز متقاربة . زعانفها الظهرية مشطية مستطيلة تتقدمها زعانف شعاعية شائكة المناخس الحادة الاطراف . زعانفها الشرجية تمتد من الخوص الى قاعدة الذنب || لحومها جيدة الصنف ، مستحبة الطعم ، الا انها من الاسماك المؤذية التي يخشاها الصياد لان مناخس زعانفها الظهرية الاولى قذشب في كفه اذا تناولها وتنش في رجله اذا وطئ مخابها في الرمال المنمورة بالماء . شكها مؤلمة تستمر بعض الوقت وقد تكون مؤذية || اشهر انواعها الاربعة التالية :

٤٩٤٢ - ترخون صغير ، سهنون صغير ،

Trachinus vipera (S). درقني ، درقنة

Vive petite (F). Smaller Weever (E).

سمكة بحرية من الترخون . اعطانها البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي || جسمها صغير القد ، يطول من ١٢ الى ١٥ سم . ثوبها الى الريدة الصفراء السفعاء الموج يعملوها تمشيح حنطي يسمر في الظهر . بطنها الى الغبرة الفضية . رأسها مستطيل الشكل ، قصير الخطم ، شبه جالس الفم . صياها صغيرتان ، جاسفتان . زعنفتها الظهرية الاولى خاسية المناخس الجامدة ، الحادة ، المسمة الاطراف . ويعملوها في كل من سفطها الايمن والايسر منخس ذرب مستطيل مسم الطرف || لحمها جيد الصنف مرغوب فيه .

٤٩٤٣ - ترخون عنكبوتي ، سهنون عنكبوتي

Trachinus araneus (S).

Vive araignée (F). Spider-Weever (E).

سمكة بحرية من الترخون . اعطانها المحيط الهندي والبحر الاحمر || جسمها شبه اهليلجي الشكل ، يطول من ٢٠ الى ٣٠ سم . ثوبها الى الحنطي الاسمر يعملو تجذيع ازرق في الظهر وتسنيج معترض اصفر في الجانبين ، بطنها الى الغبرة العاجية . رأسها مستعرض القفن . غليظ الشكل ، واسع الشدق الجالس . مناخس زعانفها الظهرية الاولى والسفطية مسمة || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٤٩٤٤ - ترخون مبدول ، سهنون مبدول

Trachinus draco (S). Vive commune, Vive grande (F). Common Weever, Common string-fish (E).

سمكة بحرية من الترخون . اعطانها البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي || جسمها شبه اهليلجي الشكل يطول من ٢٥ الى ٤٠ سم . ثوبها متداخل الالوان . ظهرها الى الحنطي الاسمر المجذع بالازرق . جانبها الى

جميع الاتربة الزراعية وهي لا تخشى سوى المعارض الشامية الباردة في الشتاء .

٤٩٣١ - ترخون

Astrild (F). Astrild (E).

الترخون عصفور مشهور باسم بنغالي ، اطلبه . ومنه :

ترخون أزرق الطوق Bengali cordon-bleu (F).

ترخون أشهب أزرق Bengali gris-bleu (F).

ترخون أكهب Astrild gris (F).

٤٩٣٢ - ترتيب الدين

Collocation (F).

Sum allowed to a creditor, Classification (E).

اجراء قضائي مؤدا تعيين درجة احد الدائنين وتقرير حقوقه بالنسبة الى الآخرين .

٤٩٣٣ - ترخير

Eriosperrum (S).

Eriosperrum (F). Eriosperrum (E).

جنس نباتات دوفضية جادحة من فصيلة الزنبقيات . منبتها بعض مناطق افريقية الحارة والمعتدلة الحرارة . اوراقها قرصية لاطنة سمكة النصل المعتدل الطول والعرض . ازهارها جرسية الشكل صغيرة || تزرع للتزيين . ترغب في الاتربة المتوسطة الانساج الوافرة العناصر الغذائية || اعرف انواعها واشهرها التالية :

٤٩٣٤ - ترخير أزغب

Eriosperrum

pubescens (S). Eriosperrum pubescent (F).

نوع من الترير . منبته بعض اقاليم افريقية الجنوبية . زناده يعملو نحو ٣٠ سم . ازهاره الى الخضار الاغبر . اوراقه مستطيلة شبه قلبية الشكل . مزغبة النصل || تنويره يستمر طوال شهر حزيران .

٤٩٣٥ - ترخير ميكن

Eriosperrum

Mackeni (S). Eriosperrum de Macken (F).

نوع من الترير . نبات دوفضي جادح . منبته بعض مناطق افريقية الشامية والجنوبية . زناده يعملو نحو ٣٠ سم . ازهاره ذهبية اللون . اوراقه اهليلجية الشكل ، مالة النصل ، عادية الضلوع والعروق || تنويره يستمر طوال شهر تموز .

٤٩٣٦ - ترخان

Mélisse (F). Lemon-balm (E).

هو الترخان ، اطلبه .

٤٩٣٧ - ترجة

Tergite (F).

هي في الحشرات احدى الحلقات البطنية العلوية .

٤٩٣٨ - ترجيب

Echalassage (F). Propping (E).

الترجيب ان تدعم الشجرة اذا كثر حملها لئلا تنكسر اغصانها .

٤٩٣٩ - ترخيل ، نقل

Report (F).

Carrying forward, Bringing forward (E).

الترخيل هو من مصطلحات المحاسبين ومؤدا نقل حساب او قيد من صحيفة الى صحيفة او من دفتر الى دفتر او من سنة حسابية الى اخرى || اما النقل فهو من مصطلحات المصنف وهو صفتان احدهما على البيع والثانية على الشراء تنعقدان في لحظة واحدة وفي مصنف واحد لتأجيل تنفيذ احد العقود .



ترخون



ترخون مبدول

٤٩٥٢ - تَرْسُونٌ نَهْرِيَّةٌ ، تَرْسُونٌ صَبَّارِيَّةٌ *

Trionyx fluviatilis, T. ferox (S). Trionyx fluviatilis, T. ferox (F). Trionyx fluviatilis, T. ferox (E).

سلحفاة مائية لاحمة من فصيلة الترسيات . طولها نحو ٣٨ سم . بما فيه الذنب المقداني الشكل الذي يطول نحو ٦ سم . ذيلها ترسي الشكل عديم القتر الناشئة ، محجب الصفحة يطول نحو ٢٤ سم . ويعرض نحو ٢٠ سم . ثوبها الى الخضار الزيتي الاسمر الموج . رأسها اسطواني الشكل . عيناها مستديرتان . خطمها ينتهي بخروط منحرفه خنثابتان . فكها الاسفل يتقدم الاعلى بعض الشيء . لسانها متوسط الطول . عنقها كثيرة الاخاديد || تألف الأنهر والبحيرات . مسرحها في البر دجوي لا يتجاوز الضفاف ولا يستغرق من الوقت أكثر من ثلاث ساعات || قوتها البلايط والاسماك والحشرات المائية والحيات والحراطين والحلزونات والبزاق || يقال انها تعيش نحو ١٢٠ سنة .

٤٩٥٣ - تَرْسُونٌ صَبَّارِيَّةٌ .

Turslops (S). Tursiop (F). Blower (E).

جنس حيوانات بحرية ولودة لبونة من فصيلة الدلفينيات ورتبة الحيتان . انواعها المعروفة خمسة اعطائها مترامية الاطراف من المحيط الاطلسي الى الهادي والهندي والبحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر . ملجئها الحياتي جماعي . اسرابها تعد من ٥٠٠ الى ١٥٠٠ يقودها ذكر مسن . قوتها الاسماك والحبار والرخويات || اجسامها شبه وشية الشكل تطول من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم . مسوكها عادية الثقل . اثوابها الى الشبهة الزرقاء تعلوها مابجات تختلف مع الانواع . رؤوسها معتدلة الاحجام ، منحروطة الاخطام . اسنانها حادة متائلة في الفكين . عيونها صغيرة ماسحة . نياستها تتوسط الجباء . زعانفها الظهرية والصدرية معتدلة الحجم ، منبعية الشكل . زعانفها الذيلية فارقة || تصاد لمسوكها وزيتها ولحمها المتوسطة الصنف || اعرف انواعها واشهرها التالية :

٤٩٥٤ - تَرْسُونٌ أَبُو سَلَامٍ .

Turslops abusalam (S). Turslop abusalam (F).

نوع من الترسوب . اعطائه الخليج العربي والبحر الاحمر . سربه متوسط العدد || جسمه يطول من ٢٥٠ الى ٣٠٠ سم . ثوبه الى الشبهة الزرقاء تعلوها موج اسمر في الظهر وفي الجانبيين . يتميز باستطالة زعانفه الصدرية || يصاد لمسكه ولزيتته الجيد الصنف . لحمه متوسط الصنف مأكول .

٤٩٥٥ - تَرْسُونٌ نَفَّاسٌ .

Turslops tursio (S). Turslop néarnak, Souffleur (F). Tursio blower (E).

نوع من الترسوب . اعطائه بعض مناطق المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط والمحيط الهندي والخليج العربي . سربه وافر العدد || جسمه يطول من ٣ الى ٤ امتار . ثوبه الى الشبهة الزرقاء تعلوها موج جوؤي في الظهر والجانبيين || يصاد لمسكه وزيتته الجيد الصنف . اما لحمه فكان الصنف قل من يرغب فيه .

٤٩٥٦ - تَرْسُونٌ صَبَّارِيَّةٌ .

Tarsus (S). Tarsier (F). Tarsier (E).

جنس حيوانات لبونة من فصيلة الترسويات . انواعها المعروفة قليلة اعطائها صومتره والفيلين وبورنيو ... || تتميز برؤوسها المستضخمة وبعيونها الكبيرة الجاحظة وبآذانها المملقية الشكل المستعرضة الصيوان ، ويقوامها الخلفية

الخطفي الاصفر يعلوه تسليج معتبر أزرق اللون واسمر . بطنها والقسم الاسفل من جانبيها الى الصفار التبي الفضي الموج || رأسها مستضخم الشكل ، قصير الخطم ، منتصب القم الواسع الشدق . عيناها ناشرتان ، رفيعة الارتكاز ، يعلوها فوق حاجبيها منحن منقرف صغير || زعنفتها الظهرية الاولى خماسية المناخس الجامدة الصلبة الحادة المسمة الاطراف . مناخسها السقفية مسمة ايضاً || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

٤٩٥٥ - تَرْسُونٌ مُشْعٍ الرَّأْس ، سُهْنُونٌ مُشْعٍ

Trachinus radiatus (S).

الرأس

Vive à tête rayonnée (F).

سمكة من الترخون . اعطائها بعض اقالي المحيط الاطلسي . جسمها اهليلجي الشكل يطول من ٢٠ الى ٣٠ سم . ثوبها ثوب الترخون المبذول باستثناء رأسها المسنج بالاسمر على شكل الشعاع || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

٤٩٥٦ - تَرْسُونِيَّاتٌ ، سُهْنُونِيَّاتٌ

Trachinidae (S). Trachinidés (F). Trachinidae (E).

فصيلة اسماك بحرية بيوضة من رتبة شائكات الزعانف . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . اعطائها معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . من المحيط الهادي الى الهندي والبحر الاحمر والمحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط || اجسامها صغيرة القد او متوسطة تطول من ١٢ الى ٤٠ سم . تتميز برؤوسها المستغلظة وبعيونها الرفيعة الارتكاز اذ انها تتأخم قة الرأس . وباشداقها الكبيرة المستعيلة الفكوك الجالسة . ثم بزعانفها الظهرية الامامية الشائكة المسمة . واخيراً بالشوكة الذرية الحادة التي تعلق الاعكام الخيشومية في سقاطها الايمن والايسر || اشهر اجناسها الترخون والكورب .

٤٩٥٧ - تَرْخِيصٌ ، رُخْصَةٌ ، تَصْرِيحٌ

Permis (F). Permitted, Allowed (E).

سند رسمي يجب الحصول عليه لمباشرة عمل او اجراء . كترخصة البناء والصيد والمرور بقيادة السيارة والملاحة الجوية والبحرية ومزاولة المهنة .

٤٩٥٨ - تَرْخِيصٌ ، حَفَافَةٌ

Accoupage, Couvalson (F). Incubation, Brooding-time, Sitting (E).

اطلبة .

Geler (F). To freeze (E).

تَرْزٌ

تَرْزُ الْمَاءِ تَرْزاً : جمد من الصقيع .

٤٩٥٩ - تَرْسُ الْمَاءِ * .

Hydracéas nymphoides (S). Hydrocléide, Hydrocleis (F). Water poppy (E). Wasserschlüssel (D). Idrocléide (I).

جنس نباتات عشبية مائية ترينية من فصيلة المزاريات . انواعه ٤ مهدا امريكة الاستوائية . اوراقها قلبية الشكل كبيرة الحجم تطفو على سطح الماء . ازهارها كبيرة القد ، فردية التجميع ، مستطيلة الزناد ، ثلاثية البتلات الصفرة .

٤٩٥٩ - تَرْسُونَةٌ * .

Trionyx (S). Trionyx, Tyrse (F). Tyrse, Soft turtle (E).


جنس سلاحف قاذبة من فصيلة الترسيات . انواعها نحو ١٥ اعطائها مياه المناطق الحارة . تفضل الأنهر على البحيرات . طولها يراوح من ٦٠ الى ٨٠ سم . جميعها مفترسة قوتها الاسماك والضفادع والحيات والطيور المائية .



ترس الماء



ترسة



ترسة نهريّة

٤٩٦٣ - ترسيب
Précipitation (F).
Precipitation (E).
هو ما يحصل عند انفصال جسم عن المادة المائعة التي كان ممزوجاً بها ، ان ماء أو غيره ، وهبوطه الى اسفل الاناء .

٤٩٦٤ - ترسيب ، دكينس
Thyrstites (S).
Thyrstite (F). Thyrstites (E).
جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة السيفيات .
انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد الحارة ||
اجسامها شبه وشية الشكل تطول من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم .
زعانفها الظهرية قاطبة ، زعانفها الشرجية فارقة ، هلالية
الشكل . اثوابها تراوح من الريدة الفضية المواج الى السمرة
العابقة || لحومها مأكولة لكنها دون الوسط .



ترسوس أصهب

٤٩٦٥ - ترشيح
Filtration
هو جعل الماء أو أي مائع آخر يمر بالمصفاة أو ما يقوم مقامها ليروق .

٤٩٦٦ - ترصيم ، رضم
Hourdage (F).
Rough-walling (E).
هو البناء بالرصم .

٤٩٦٧ - ترطيب ، تثرية ، تبليل ، تطبيع
Humidification (F). Damping, Moistening (E).
مد الشيء بالرطوبة اللازمة لتسكين شغله أو مناعاً لمطبه .

٤٩٦٨ - ترعة
الترعة شجرة صغيرة تنبت مع البقل وتيسر معه وهي أحب
الشجر الى الحنجر (اللسان) .

٤٩٦٩ - ترعة
Canal (F). Channel (E).
مجرى ماء محفور يستمد ماءه من النهر اذا كان للري أو
للملاحة الداخلية ويستمد ماءه من البحر اذا كان للملاحة
البحرية كما هو الحال في ترعة السويس وبنا وكيال .

٤٩٧٠ - ترغلة ، أطرغلة
Turtur (S).
Tourterelle (F). Turtle-dove (E).
جنس طير من فصيلة الحماميات . انواعه ٦ جميعها رشيقة
القوام . طولها يراوح من ٢٦ الى ٣٠ سم . مناقيدها جالسة
دقيقة . اجنحتها مستطيلة . ارساغها ومخالبها ملط . اثوابها
عديدة الالوان المتراكبة الموشحة والمنقطة يغلب فيها الازغبس
الاصهب المواج || اكثر انواعها من القواطع . قوتها
الحبوب على اختلافها . تدن في الادغال والاشجار القليلة
الارتفاع . اناثها تضع بيضتين تحضنها بمناوبة الذكور .
اما انواعها فهي التابعة :

٤٩٧١ - ترغلة أسبوية
T. orientalis (S).
T. orientalis (F).

٤٩٧٢ - ترغلة الجزيرة
T. arenicola (S).
T. de l'Arabie (F).

٤٩٧٣ - ترغلة الغاب
T. auritus (S).
T. des bois (F).

٤٩٧٤ - ترغلة شائعة
T. turtur (S).
T. commune (F).

٤٩٧٥ - ترغلة صهبا
T. douraca (S).
T. blonde (F).



ترغلة شائعة

المستطيلة الارساغ || اناثها ترمص جرراً واحداً ترضعه بعض
الوقت || اعرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية :

٤٩٥٧ - ترسوس أصهب
Tarsius fuscus (S).
Tarsier fauve (F). Fawn Tarsier (E).

نوع من الترسوس . موطنه جزر الزابج . يألف الغابات
ويتسلق الاشجار . ملجئه الحياتي زوجي . مسرحه دجوي .
قوته الحشرات والوزغ والعنقاء والثعابين || جسمه صغير القد
يطول نحو ٥٢ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ ٢٧ سم .
رأسه مستطيل الشكل . عيناه كبيرتان جاحظتان منشقة .
صغير الجرم . فمقه قصير وعريض الشدق . اذناه
كبيرتان . ثوبه الى الصهبة تسمر في الرأس والظهر وتغير
في الاطليين والبطن . ذنبه كاس ، قصير الوبر .

٤٩٥٨ - ترسوس الفيليبين

Tarsius philippinensis (S). Tarsier des
Philippines (F). Philippines Tarsier (E).

نوع من الترسوس . موطنه جزيرة الفيليبين . يألف الغابات
والاحراج . مسرحه دجوي . قوته الحشرات والدويبات
والعنقاء والثعابين || جسمه يطول نحو ٥٥ سم . بما فيه
الذنب الذي يبلغ ٣٠ سم . ذنبه كاس قصير الوبر .
ثوبه الى السمرة السوداء اللامعة . وجهه ادبس . صدره
وبطنه الى السمرة الخنطية .

٤٩٥٩ - ترسوس شبح
Tarsius spectrum (S).
Tarsier spectre (F). Spectre Tarsier (E).

نوع من الترسوس موطنه سجاو وبورنيو وصومتره وبنكا
وتيمور . يألف الغابات ويتنقل على اغصان اشجارها بخفة
لا مثيل لها . ملجئه الحياتي زوجي . يسرح في الليل ويبعث
في النهار . قوته الحشرات والوزغ والثعابين || جسمه صغير
القد يطول نحو ٤٠ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ ٢٥ سم .
رأسه متدل الضخمة . عيناه كبيرتان ، جاحظتان مطوختان
بالاسود . منشفة صغير الجرم . فمقه قصير ، ماسح .
اذناه ملعقتا الشكل . اطراف اصابعه مجهزة بطبب يمكنه
من الترسخ عند القفز من غصن الى غصن || ثوبه الى
السمرة السوداء . ذنبه كاس قصير الوبر .

٤٩٦٠ - ترسوسيات
Tarsiidae (S).
Tarsiidae (F). Tarsiidae (E).

فصيلة حيوانات لبونة من الليموريات . اجناسها وانواعها
المعروفة قليلة العدد اعطائها جزر صومتره وبورنيو
والفيليبين || جميعها صغيرة القد ، مستطيلة القوام الخلفية
والاذناب . ملجئها الحياتي زوجي . تألف الغابات وتتسلق
الاشجار وتنقل بين الاغصان بخفة السنجاب || اعرف
اجناسها واشهرها الترسوس .

٤٩٦١ - ترسمي

الترسمي حشيشة تشبه الترس (اللسان) .

٤٩٦٢ - ترسيات

Trionychidae (S).
Trionychidae (F). Trionychidae (E).
فصيلة حيوانات زاحفة بيوضة من رتبة السلاحف اجناسها
سنة جميعها مفترسة قازية . مهدا البلاد الحارة تألف
الانهر والبحيرات تتميز بذبلها البيضي الشكل ، المتبسط
الصفحة المستنجة والمزركشة بالاسود || اشهر اجناسها الترس .

نحو ٥٥ منتشرة في معظم اصقاع العالم || اجسامها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل . اطولها تراوح من ١٠ الى ١٧ مم . كواسلها الى الزرقة السوداء المواج . انحدارها الى الزرقة الجميلة المبضعة بالاحمر او بالاصفر || تسرح في النهار . قوتها رحيق ازهار الفصيلة الصيوانية . يرقاتها قانصة تقضي على يرقات الحشرات الخاشبة وعلى دباب المنشيل والنحل البري .

٤٩٨٥ - ترغود النخاريب °

Trichodes alvearius (S). Trichode des alvéoles (F). Trichodes alvearius (E).

حشرة واشعة قانصة من فصيلة الزونحيات ورقبة مغمدات الاجنحة . خنافسها تعيش على رحيق الازهار البرية . يرقاتها تقترس اساريع الحشرات الخاشبة ودباب النسوح والمنشيل والنحل البري || جسمها متوسط القد ، كثيف الهلب ، يطول من ١٢ الى ١٥ مم . ثوبها ازرق الرأس والكوسل والبطن والجرايم ، اخر الظهران المجدع بالازرق . رأسها معتدل الجرم ، مستطيل التأشير . زباناها صولجانيان . عينها صغيرتان بارزتان . ظهرانها مستعرض الطرف اللاحف ، عادم التحزيز الغمدي . ارساغها خماسية المعقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملافة في اواسط نيسان وتعيش حتى اواخر تموز . تسرح في النهار . تسافد بعد ظهورها باربعة اسابيع . تمتنع المكن تحت لحاء الاشجار او تحت الجشالة || اليرقة عند بلوغها الكمال الجسموري تطول من ٢٠ الى ٢٢ مم . جسمها مردني الشكل ، سداسي الرواجب ، ضليح التأشير ، اسمر اللون كثيف الهلب اسود الرأس || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٣٠ يوماً ينقضي في الجشالة او تحت اللحاء .

٤٩٨٦ - ترقييد * Marcottage (F). Layering (E).

الترقييد والتدريج والتعقيل والتعكيس هي احدي طرائق تكثير النبات . قوامها حني النقص ودفنه في التربة دون فصله عن امه الى ان يشرش فيفصل عن امه ويغرس .

٤٩٨٧ - ترقييد الكرمة Provignage (F).

Layering of vines (E).
الغاية منها تكثير شروش الكرمة او اكثار عقلها .

٤٩٨٨ - ترقيع ° Phléoplastie (F).

Phlooplasty (E).
الترقيع عملية قوامها تجديد القشور المعطوبة في الاشجار .

٤٩٨٩ - ترقيق ، تبسطيط Aplatissage (F).

Flattening (E).
سحق الخبواب العلفية كالشعير والشوفان .. لتسهيل اكلها على الحيوان .

٤٩٩٠ - ترقيين Hachure

هو تخطيط الرسوم وغيرها للدلالة . ومنهم من استعمالها بمعنى تدوين وتسجيل .

٤٩٩١ - ترك ، تحلل Abandon (F).

Relinquishment (E).
هو التخلص او التنازل ، راجع تحلل .

٤٩٩٢ - تركة ، ميراث Succession

هي الذمة المالية التي يخلفها الميت وتنتقل بعده الى غيره .

٤٩٩٣ - تركيب ، صيغة Formule (F). Formula (E).

٤٩٧٦ - ترغلة مطوقة * T. risorius (S).

T. à collier, Streptopélie rieuse (F).

٤٩٧٧ - ترغول Tragule (F).

هو القنشير حيوان لبون مجتر . اطلبه .

٤٩٧٨ - ترغون * ، اسبانخ زيلنده

Tetragonia expansa (S). Tétragone, Tétragonie, Epinaud de la Nouvelle Zélande (F). New Zealand spinach, N. Z. ice plant (E). Echter Neuseeland-spinat (D). Tetragonla, Spinace della Nova Zelanda (I).

بقلة زراعية من فصيلة الغضريات اوراقها كثيرة العدد كبيرة الحجم تستعمل استعمال الاسبانخ . زراعتها سهلة . تتكاثر بالبذور . تعيش في جميع الاثربة تجود في الحواره .

٤٩٧٩ - ترغاس ، ترغيز Terfezia (S).

Terfex, Truffe des lions (F).
فطر ديماسي من الترفيزات يشبه الكفا . اغبر البشرة . تبني اللباب ، مأكول مستحب الطعم .

٤٩٨٠ - ترغيزيات ° Terfeziaceae (S).

Terféziacées (F). Terfeziaceae (E).
عمارة فطور ديماسية من فصيلة الوقسيات ورقبة الزقيات . اجناسها وانواعها عديدة غير مؤذية .

٤٩٨١ - ترغيدة ° Thereva (S).

Thérève (F). Thereva (E).
جنس حشرات من فصيلة الترفيديات ورقبة ذوات الجناحين . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها متوسطة القد ، مستغلظة الشكل ، تطول من ٩ الى ١٥ مم . رؤوسها كبيرة مستعرضة . عيونها كبيرة ، فارقة عند الشقين . قرونها الاستشعارية قصيرة ، ثلاثية الفصل . اعظامها رقيقة . ملاسها صغيرة . كواسلها وبطنها متكاثفة الحمل مبعثرة الهلب . رواشها كبيرة . قوائمها كثيرة الهلب الشائك . اثوابها ملونة || تألف البراري والاراضي المزدحمة . جميعها قانصة . يرقاتها وانجحة تعيش في الجشالة وفي التربة .

٤٩٨٢ - ترغيديات ° Therevidae (S).

Thérévidés (F). Therevidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم . تألف البراري والحراج المبعثرة الاشجار . معظم انواعها نائل وبعضها واشع او واثج || اجسامها متوسطة القد ، تطول من ٧ الى ١٥ مم . رؤوسها مستعرضة . عيونها كبيرة ، فارقة عند الشقين . قرونها الاستشعارية قصيرة ، ثلاثية الفصل . اعظامها رقيقة . كواسلها وبطنها متكاثفة الزغب ، مبعثرة الهلب . رواشها كبيرة . قوائمها شائكة || يرقاتها كمة ، دودية الشكل . اكثرها واثج وبعضها خاضل او دامن || اشهر اجناسها الترفيدة .

٤٩٨٣ - ترغوة Clavicule (F). Clavicle (E).

الترغوة عظم يصل بين القص والعائق اي مشط الكتف من الجانبين .

٤٩٨٤ - ترغود ° Trichodes (S).

Trichode (F). Trichodes (E).
جنس حشرات من فصيلة الزونحيات . انواعها المعروفة



ترغلة مطوقة




ترغون



ترغود النخاريب



ترقيد



ترلاس



ترمس أزرق



ترمس أصفر عطر



ترمس زراعي

٥٠٠٩ - ترمس أزرق* *Lupinus hirsutus* (S).

Lupin bleu, Lupin hérissé (F).

عشبة حولية فردية الساق الزباء تعلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أوراقها خاسية أو سباعية الوريقات. أزهارها زرقاء اللون. أزهارها يستمر من نيسان إلى حزيران.

٥٠١٠ - ترمس أزغب *Lupinus pubescens* (S).

Lupin pubescent (F).

عشبة حولية فردية الساق الزباء تعلو من ٥٠ إلى ٧٠ سم. أوراقها سباعية أو تساعية الوريقات. أزهارها تبدو بنفسجية الاطراف والسطح الخارجي بيض الداخل ثم تنحرف إلى القرمزي. أزهارها يستمر من تموز إلى تشرين أول.

٥٠١١ - ترمس أصفر عطر *Lupinus luteus* (S).

Lupin jaune (F).

عشبة حولية فردية الساق تعلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أوراقها سباعية أو تساعية الوريقات الزباء النصل. أزهارها زاهية الصفار، عطرية. أزهارها يستمر من آذار إلى تموز.

٥٠١٢ - ترمس الشاطئ *Lupinus litoralis* (S).

Lupin du littoral (F).

عشبة ممررة فرعاء الساق تعلو من ٢٠ إلى ٣٠ سم. أوراقها خاسية أو سباعية الوريقات القليلة الزغب. أزهارها إلى الزرقة الموشحة بالأصفر. أزهارها يستمر طوال فصل الصيف.

٥٠١٣ - ترمس الصحاري *Lupinus aridus* (S).

Lupin des déserts (F).

عشبة حولية فرعية الساق القصيرة تعلو من ٢٠ إلى ٣٠ سم. أوراقها سباعية الوريقات الزباء النصل. زغبها أصفر اللون. أزهارها إلى الزرقة البنفسجية يعلوها توشيح أبيض. أزهارها يستمر من حزيران إلى أيلول.

٥٠١٤ - ترمس أنمر *Lupinus varius* (S).

Lupin bigarré (F).

عشبة حولية فرعاء الساق الزباء. تعلو من ١٥ إلى ٢٠ سم. أوراقها خاسية الوريقات نصلها حلقي البشرة، فضي الزغب. أزهارها كبيرة القد زرقاء اللون موشحة بالأبيض. أزهارها يستمر من حزيران إلى تموز.

٥٠١٥ - ترمس تخلي *Lupinus pilosus* (S).

Lupin velu (F).

عشبة حولية فردية الساق الزباء. تعلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أوراقها تساعية الوريقات الحملية النصل. أزهارها وردية اللون. أزهارها يستمر من نيسان إلى أيار.

٥٠١٦ - ترمس زراعي* ، جرجير

Lupinus termis (S). *Lupin cultivé, L. d'Egypte* (F). *Egyptian lupine* (E). *Ägyptische lupine* (D). *Lupino egiziano* (I).

عشبة زراعية حولية تعلو من ٣٠ إلى ٧٠ سم. أوراقها لاقبسية التجميع منها الخاسية والسباعية والتساعية الوريقات نصلها أهليلجي الشكل أزغب البشرة. أزهارها إلى الزرقة الوردية. يستخرج من حبها مادة زيتية قلبية لها استعمالها الطبي || يزرع الترمس كعلف للمواشي ولحبي حب المأكول بعد نقعه بالماء، بغض الوقت، للقضاء على مرارته. ويستعمل أيضاً للتسويد الخفري. أما دقيق حب فيدخل في تركيب أكثر المساحيق الجلدية لانه يصفل البشرة ويلينها.

٤٩٩٤ - توكيب *Synthèse* (F). *Synthesis* (E).

٤٩٩٥ - توكيب *Combinaison chimique* (F). *Chemical combination* (E).

٤٩٩٦ - توكيب القوى *Composition des forces* (F). *Forces composition* (E).

٤٩٩٧ - توكيب النسب

Composition des rapports (F).

٤٩٩٨ - توكيبني *Synthétique* (F). *Synthetic* (E).

٤٩٩٩ - تركيز *Dosage* (F). *Dosing* (E). التركيز هو إضافة ما يجب من مواد عادمة الفاعلية على المواد الفعالة لجعلها صالحة للاستعمال دون أذى.

٥٠٠٠ - توكيب *Falunage* (F). *Shell-marl* (E). هو اصلاح التربة بالركام او بالرميل المحاري.

٥٠٠١ - توكيب ، تكديس *Accumulation* (F). *Accumulating* (E). تجميع الشيء وتثاقفه.

٥٠٠٢ - توكيب *Empotage* (F). *Potting* (E). هو التأصيص، اطلبه.

٥٠٠٣ - توكيب *Investissement* (F). راجع إركان.

٥٠٠٤ - ترلاس* ، لتيس *Drepans* (S). *Drépane* (F). *Drepans* (E).

ترلاس هو الاسم الهندي ولتيس الاسم الماليزي. جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة السحليات. انواعه المعروفة قليلة العدد. اعطانها تمتد من المحيط الهندي إلى ماليزية وأستراليا || اجسامها مبطلعة، مستعرضة، تطول من ٢٥ إلى ٣٠ سم. وتعرض من ٢٠ إلى ٢٥ سم. رقوسها عريضة، صغيرة الاخطام والاشداق. عيونها كبيرة، ناشزة، متقاربة. ظهورها هرمية الشوزن. زعانفها كبيرة، الظهرية الاولى سباعية المناخس الشائكة. الشرجية تقابل الظهرية وتماثلها وهي ثلاثية المناخس الامامية. زعانفها الصدرية مستطيلة، منجلية الشكل. اثوابها زاهية، فاقعة، سفاد الموج || لحمها متوسطة الصنف، مأكولة.

٥٠٠٥ - ترمدان *Pépinière* (F). *Nursery* (E). هو المشتل. عن ابن العوام.

٥٠٠٦ - ترمداني، مشائلي *Pépiniériste* (F). *Nurseryman* (E). هو من تعاطى استئجار المشاتل.

٥٠٠٧ - ترمدي *Faucon chicquera* (F). *Falcon cherrug* (E). هو صقر الفزال أي الشرق، اطلبه.

٥٠٠٨ - ترمس *Lupinus* (S). *Lupin* (F). *Lupine* (E).

جنس نباتات عشبية وبجلية من فصيلة القطانيات انواعه عديدة معظمها حولي وبعضها معمر. أوراقها مركبة ورتبة التجميع. وريقاتها بيضوية الشكل، خلية الصفحة. أزهارها صنفودي التجميع، طرفي الارتكاز || أشهر انواعه ما يتبع.

ازهارها بيض تعلوها مشحة ليلية وهي غزيرة الريح
يحرسها النحل || اوراقها وازهارها فواحة العطر الليموني
العرف. تستعمل في عدة علاجات صحية وهي من مقويات
القلب ، توقف الاسهال والتشنج . نقيعها منه وقد يزيل
عسر الهضم . يستخرج من اوراقها بالتقطير زيوت طيارة
وكحول نافعة .

٥٠٢٨ - تَرُنْجَان نَتْن *

Melittis melissophyllum (S). Mélitte, M. à feuilles
de mélisse, M. sauvage, M. des bois, Herbe saine (F).
Bastard balm, Balm melittis, Honey-balm (E).
Echter immenblatt, Bastardmelisse (D). Melissa
batarda, Melino, Bocca di lupo (I).

نبات عشبي بري طيب معمر من فصيلة الشفويات .
يكثر في الاراضي الكلسية . يعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم .
اوراقه معنقة ، بيضيه ، زباء ، خشنة ، قائمة الخضار .
ازهاره مستطيلة الشكل . اوراقه وازهاره قوية العرف المستهجن .

٥٠٢٩ - تَرُنْجَبِين Manne (F). Manna (E).
هو اللبن ، اطلبه .

٥٠٣٠ - تَرُنْجَة Cédrat (F). Cedrat (E).
هي الاتربة ثمرة الاترج .

٥٠٣١ - تَرُنْجَبِي Serin (F). Canary (E).
هو النفر ، اطلبه .

٥٠٣٢ - تَرُنْسَة هي الترسه حفرة تحت الارض .

٥٠٣٣ - تَرُنْشَاه ، تَرُنْشَان

Centaurea cyanus (S). Bleuet, Bluet, Barbeau
bleu, Aubifoin, Casse-lunette, Centaurée barbeau
(F). Blue-bottle, Bachelor button, Corn-flower (E).
Kornfloekenblume, Kornblume (D). Fioraliso,
Fioralino, Farinello, Clano (I).

نبات عشبي بري حولي من فصيلة المركبات يعلو من
٣٠ الى ٩٠ سم . اوراقه ملتحة الانتشاب ، خيطية
الشكل والنصل . ازهاره الى الازرقاق السايوي .

٥٠٣٤ - تَرُنُونِيَّات Treronidae (S).
Tréronidés (F). Treronidae (E).

فصيلة طير من الجواثم حاميات الشكل . اجناسها وانواعها
المعروفة قليلة العدد موطنها معظم مناطق افريقية الاستوائية
والحارة || جميع انواعها جوازة تسمى في طلب الرزق .
قوتها البزور والحبوب والحشرات || اعرف اجناسها واشهرها
الترون والحساس .

٥٠٣٥ - تَرُهَة : دويبة في الرمل (التكملة) .

٥٠٣٦ - تَرُوْتَة * ، أَطْرُوْط Trutta (S). Truite (F).
جنس اسماك نهريّة وبحرية من السلمونيات . انواعه عديدة
مختلفة القد واللون . منها النهريّة التي لا تفارق المياه العذبة
ومنها البحرية التي تترك البحر الى النهر في زمن السرم .
طولها يراوح من ٤٠ الى ٨٠ سم . ووزنها من ٢ الى ١٥
كيلو . انواعها عديدة فيها الاخضر البحري والاخضر
الشفاف والاخضر العابق والاسمر || جميعها من الاسماك
المأكولة المستحبة الطعم .

٥٠١٧ - تَرْمُس كَبِيرِيَّيْ Lupinus sulphureus (S).
Lupin de Menzies (F).

عشبة حولية فردية الساق تعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم . اوراقها
تساعية الوريقات . ازهارها تبدو كبريتية ثم برتقالية
قليلة العرف . ازهارها يدوم من حزيران الى ايلول .

٥٠١٨ - تَرْمُس مُشَجَّر Lupinus arboreus (S).
Lupin en arbre (F).

جنية معمرة تعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . وريقاتها ذلقة
الزام الاخير ، مدببة العقصة . نصلها امرد الصفحة العليا
ازغب السفلى . ثمارها قرون مستطيلة تعد من ١٠ الى ١٢
حبة لونها الى السواد الفحمي . ازهارها كبريتية اللون ،
فواحة العرف المستحب || ازهارها يستمر من نيسان
الى ايلول .

٥٠١٩ - تَرْمُس مُعَمَّر Lupinus perennis (S).
Lupin vivace (F).

عشبة معمرة فرعاء الساق تعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم . اوراقها
سباعية او تساعية الوريقات نصلها امرد الصفحة العليا
ازغب السفلى . ازهارها الى الزرقة الموشحة . ازهارها يستمر
من ايار الى تشرين .

٥٠٢٠ - تَرْمُس مُغَيَّر ، تَرْمُس مُلَوَّن

Lupinus mutabilis (S). Lupin muant, L. changeant (F).
عشبة حولية فرعية الساق تعلو من ١٠٠ الى ١٧٥ سم .
اوراقها سباعية او تساعية الوريقات القليلة الازغب .
ازهارها قوية العرف متراكبة الالوان الموشحة بالاصفر
والازرق والابيض . ازهارها يستمر من تموز الى
تشرين اول .

٥٠٢١ - تَرْمُسَة ، تَرُنْسَة

الترسة او الترسه هي الحفرة تحت الارض .

٥٠٢٢ - تَرْمُسِين Lupinine (F). Lupinin (E).
مادة شبه قلوية توجد في حب الترمس .

٥٠٢٣ - تَرْمِيد Incinération (F). Incineration (E).
تحويل الشيء الى رماد .

٥٠٢٤ - تَرْمِيد Parturitlon
هو الاضرع ، اطلبه .

٥٠٢٥ - تَرْمِيل Sablage (F). Sanded (E).
توزيع الرمل على التربة . وهو عمل مفيد يصلح التربة
المندجة وينشط فيها اعمال الجراثيم الهوائية النافعة .

٥٠٢٦ - تَرُنْج Cédralier (F). Cedrat tree (E).
هو الاترج ، اطلبه .

٥٠٢٧ - تَرُنْجَان * ، تَرُنْجَان ، حَبَق تَرُنْجَانِي ،
حَشِيْشَة النَحْل ، بَادَرُنْجَبُوْتَة ، مَلِيْسَة

Melissa officinalis (S). Mélisse, M. officinale.
Citronelle (F). Lemon-balm, Bee-balm, Balm-leaf.
Zitronenmelisse, Citronenmelisse (D). Melissa,
Cedronella, Applastro (I).

بجلة عشبية ليفية معمرة من فصيلة الشفويات . ساقها فرعاء
تعلو من ٤٠ الى ٨٠ سم . اوراقها متقابلة معنقة
اذنيه بيضيه مسننة . ازهارها عذقي التجميع ابطي الارتكاز .



ترنجان



ترنجان ثن



ترنشاہ



تروية

٥٠٤٦ - ترياسي Trias (F). Trias (E).

نعت تعريفية يطلق على الحقبة الأولى من الألباج الثاني المعروف أيضاً بالوسط. يقال العصر الترياسي والحقبة الترياسية || تتميز هذه الحقبة ، من الوجهة الحيوانية ، بازدهار بعض اللافقاريات كالسفور وصفيحيات الخياشيم والعمونيات وبانقراض معظم سقفيات الرؤوس . وبانتشار الاسماك اخصها مزدوجات التنفس . وبظهور بعض الزحافات والثدييات || وتتميز من الوجهة النباتية بمتابعة ازدهار عريانات البذور وبظهور بعض انواع الصنوبريات .

٥٠٤٧ - ترياق Antidote, Contrepoinson (F).

Antidote, Counter-poison (E).

كل دواء مضاد للسموم .

٥٠٤٨ - ترياق أبيض Arum (F). Calf's foot (E).

هو الاروم ، اطلبه .

٥٠٤٩ - تريسة Côte (F). Rib (E).

الترائب عظام الصدر . الواحدة تريسة .

٥٠٥٠ - ترييس Thrips

جنس حشرات صغيرة القد من فصيلة الترييسيات . انواعه عديدة جميعها مستطيلة الشكل طولها من ١ الى ٢ مم . اجسامها اسطوانية ، اجنحتها طويلة ضيقة هدية . عظمها مخروطي ، متكها ثاقب ماص . زباناها قلادية مؤلفة من ثنائي عقل . ارجلها عادية مكونة من حرقفة ومدور وفخذ وساق ورسغ ثنائي العقل والعقلة الطرفية تنتهي بوسادة ومخمج . بطنها ترجي يعلوه هلب دقيق . مرزها منشاري حاد الحمة || تكاثرها قد يكون عادياً كما في معظم الحشرات او لا جنسياً عندما تقل الذكور . الانثى تبيض نحو ٢٠٠ مكنة تمتحها واحدة واحدة داخل بشرة النسيج . المكنة ذرية القد ، كلوية الشكل تنقف بعد وضعها بثلاثة او خمسة ايام عن يرقة صغيرة شفافة الجسم تبلغ كامل نموها في تسعة ايام حيث تتحول الى عذراء ومنها الى حشرة كاملة || اجيالها الحولية تراوح من الخمسة الى الستة . دورتها الحياتية الصيفية من المكنة الى الحشرة الكاملة تدوم من ١٥ الى ١٨ يوماً . تظهر الحشرة الكاملة في اواسط نيسان وتختفي في اوائل آب حيث تخلد الى السكينة في بيئاتها الشتوي بانتظار الربيع المقبل . تركيب عدة نباتات اخصها التبغ والقطن والزرع والبصل والباذنجان والبطاطا والزيتون والكرمة والتفاح والاجاص والخوخ ...

٥٠٥١ - ترويس الزرع* Thrips cerealium,

Limothrips cerealium (S). Thrips des céréales (F).

Corn thrips, Grain thrips (E). Getreideblasenfuss (D).

نوع من الترييس . الانثى مجنحة سوداء اللون طولها نحو ٢ مم . الذكر عديم الجناح بني اللون اصغر قدماً من الانثى . الانثى تمتنع مكنتها في عصف الزرع فينقف عن يرقات صفر طولها نحو ١ مم . تنتقل الى القنايع حيث تمتص العصارة النسجية فتمنعها عن الازهار التي تبيج قبل ان يتكون فيها الحب .

٥٠٣٧ - تروّج

تروّج الشجر : تفطر بالورق قبل الشتاء من غير مطر . وقيل اذا تفطر بورق بعد ادبار الصيف (اللسان) .

٥٠٣٨ - تروزيلين Trosilin -

اسم شامل يطلق على عدة مركبات تستعمل في تنظيف مختلف الادوات التابعة للصناعات الزراعية والمنزلية ، اخصها عدة معامل الالبان والاجبان والخمور حيث يستعمل بمعدل ٥ ٪ . واذا ادخل على لياط الباطون في توريق الاقبيبة الرطبة فانه يمنع العفن عن جميع الحيطان التي يدخل في تركيب لياطها .

٥٠٣٩ - تروزيلين «ج» Trosilin G

مركب من التروزيلين يستعمل في تنظيف قناني الحليب والزيت وكل ما له علاقة بالزيت والدهن والشحم . استعماله يستلزم بعض الادوات الخاصة كالغراشي . محلوله يركز ٧ ٪ في تنظيف قناني الحليب ومن ١ الى ٢ ٪ في تنظيف قناني الزيت .

٥٠٤٠ - تروزيلين «ف» Trosilin F

مركب من التروزيلين يستعمل في تنظيف القناني . انواعه خمسة صار ترتيبها وفقاً لقساوة المياه ، الممكن استعمالها ، على الشكل التالي :

التروزيلين «FW» يستعمل في المياه التي تراوح قساوتها من ١ الى ١٠ .

التروزيلين «F» يستعمل في المياه التي تراوح قساوتها من ٨ الى ١٥ .

التروزيلين «FH» يستعمل في المياه التي تراوح قساوتها من ١٢ الى ٢٠ .

التروزيلين اكسترا يستعمل في معظم المياه العادية التي تراوح قساوتها من ٠ الى ٤٠ .

التروزيلين اولترا يستعمل في جميع المياه التي تراوح قساوتها من ٠ الى ٥٠ .

استعماله لا يستلزم شيئاً من الادوات الخاصة . محلوله يركز من ٣ ٪ الى ٥ ٪ نظراً لحالة القناني وما تحمله من اوساخ .

٥٠٤١ - ترويب ، تخثير ، تجميد Coagulation

تحيض الحليب بالروبة .

٥٠٤٢ - تروينج ، تهوية Ventilation (F).

هو تجديد الهواء . Ventilation, Airing (E).

٥٠٤٣ - ترويض Gymnastique fonctionnelle (F).

Functional gymnastic (E).

ومنهم من قال رياضة الاعضاء . وهو ترويض خاص بسائر اعضاء الحيوان او ببعضها غاية الوصول الى اكبر حد من الاستفادة .

٥٠٤٤ - ترويض ، تطبيع Dressage (F).

Training (E).

اخضاع الحيوان بالعلم والتدريب والرياضة لمشيئة الانسان ، وهيئة للعمل المطلوب منه .

٥٠٤٥ - ترويق Collage, Défecation (F).

Clarifying, Defecation (E).

تصفية الخمور ببعض المواد الخاصة كالغلام والآخ الخ .



ترييس الزرع

العقل الطرفية. مؤخر بطون انثاها مخروطي الشكل.
مرزاتها منشارية حادة الحمة.

٥٠٦١ - تريسين Trypsine (F). Trypsin (E).
هي خيرة الحلوة. الحمية التي تحلل المواد البروتينية الموجودة
في عصير الخلوة (البنكرياس) راجع حلون.

٥٠٦٢ - تريوتون Tributon arbustox
باجول زراعي مادته الفعالة شديدة النشاط تقضي على
النباتات الليفية المعمرة || يستعمل في الاسراج وعلى
جوانب الطرقات والاقنية وفي المراعي الثابتة للقضاء على
الفسرين والعوسج والعليق والصفصاف والخنان والجلهم
وصريمة الجدي والوزال والقندول واللتين والاقنشا
والقراص والسورنجان والارقطيون والسرفل البري والعراوة.
وهو يستعمل نضجاً بمعدل يراوح من ٦ الى ١٠ ليتر لكل
١٠٠٠ ليتر ماء في مساحة هكتار من الاسراج وجوانب
الطرقات. وبمعدل يراوح من ٤ الى ٦ ليتر لكل ١٠٠٠
ليتر ماء في مساحة هكتار من المراعي.

٥٠٦٣ - تريوتون «د» Tributon D
باجول زراعي يستعمل في القضاء على ارومات الاشجار
الحرجية اخصها السنديان والشرم والزنان والبشية والسفندر
والبتولا والزعرور والبرقوق الشائك || تركيزه يراوح
من ٣ الى ٥ ٪ والهكتار يستوجب من ٣٠٠ الى ٥٠٠
ليتر. وهو لا يذوب في الماء انما يذوب في الزيوت
المعدنية كزيت ديزل.

٥٠٦٤ - تريوليوم Tribolium
جنس حشرات من فصيلة الغشيات ورقية غمديات الاجنحة.
انواعه عديدة جميعها من الحنافس الصغيرة القند طولها من
٣ الى ٤ سم. اجسامها ضيقة مقلطحة. اثنائها قائمة
تختلف مع النوع. قرونها الاستشعارية دقيقة قصيرة
صولجانية. اغمارها مستطيلة. قوائمها قصيرة ارساغها
الامامية والوسطى خماسية الفصل اما الخلفية فرباعية.
تعيش على الدقيق والمجمونات والحبوب والثمار الجافة.
حياتها طويلة قنوم من ٢٠ الى ٢٤ شهراً || انثاها
تبيض نحو ١٠٠٠ مكنة بظرف ٤٠٠ يوم بمعدل
يومي يراوح من المئتين الى الثلاث مكنات. مكنتها
مستطيلة الشكل، ابيض اللون، دبق البشرة ينقف بعد
متحه بأسبوع او اسبوعين، نظراً لحرارة المحيط،
عن يرقات تبني اللون خيطية الشكل تبلغ كامل تطورها
بعد نفقها بثلاثة اشهر وبعد مرورها بثمانية انسلاخات.
ثم تتحول الى حورية خدارتها تنوم من ٧ الى ٩ ايام
تظهر بعدها الحشرة الكاملة || احيائها الحولية عديدة
تكثر في الاقاليم الحارة وتقل في الباردة || اعرف واخر
انواعه الثلاثة التالية.

٥٠٦٥ - تريوليوم الدقيق، خنفساء الانبار

T. castaneum (S).

٥٠٦٦ - تريوليوم حديدية T. ferrugineum (S).

T. navale (F).

٥٠٦٧ - تريوليوم مبهمة T. confusum (S).

٥٠٦٨ - تريومة Tritoma (S). Tritome (F).

جنس نباتات تريينية زهرية من فصيلة الزنبقيات. مهدا

٥٠٥٢ - ترييس الفول* Thrips flavus (S).
Thrips des fèves (F). Pea thrips (E). Erbsenblasen-
fuss (D).

حشرة صغيرة القند طولها يراوح من ١ مم. الى واحد وثلاثة
خطوط. ثوبها شديد السمرة. تركيب عدة نباتات زراعية
اخصها الفول والحمص واللوبياء.

٥٠٥٣ - ترييس القرنفل Haplothrips cottel (S).
حشرة سوداء اللون طولها نحو ٢ مم. يرقاتها الى الصفار
المذهب تركيب اوراق القرنفل وتوقع بهسا الاذى.
تكافح عند ظهورها باستعمال احد الحواشير الفعالة اخصها
المركزة على الروتينون.

٥٠٥٤ - ترييس الكتان Thrips linarius (S).
Thrips du lin (F). Flax thrips (E). Flachsfliege (D).
حشرة سوداء اللون تظهر في اوائل ايار، تمتع مكنتها في
نصل اوراق الكتان فينف عن يرقات فستقية اللون تقطع
غضيب الاوراق وتعرضها الى غزو الفطور المجهرية.

٥٠٥٥ - ترييس المنغو Sclerthrips mangiferae (S).
حشرة رمادية اللون طولها نحو ١ مم. يرقاتها صفر تركيب
اوراق المنغو فتجدها وتؤذيها.

٥٠٥٦ - ترييس النجيليات Anaphothrips striatus (S). Thrips des graminées (F).
نوع من الترييس لا جنسي التكاثر، عادم الذكور.
ثوبه الى الصفرة الخطية. طولها نحو مليمتر وثلاثة خطوط.
يرقاته تركيب معظم النجيليات البرية والزراعية تمتص
عصارة الاوراق ونسها.

٥٠٥٧ - ترييس سوري Thrips syriacus (S).
Thrips syrian (F). Syrian thrips (E). Syriatische
thrips (D).
حشرة سوداء اللون طولها نحو ١ مم. تركيب الكرمه والحنطة.
يرقاتها الى الصفار الوردي. تؤذي وتجعد اوراق الكرمه
وتعطب عصف الحنطة.

٥٠٥٨ - ترييس شائع* Thrips communis, T. tabaci (S). Thrips commun,
T. du tabac (F). Tobacco thrips (E). Tabakblasen-
fuss, Tabakthrips (D).
حشرة صغيرة سمراء اللون حنطية الموانج طولها نحو ٢ مم.
يرقاتها صفراء اللون شفافة تركيب النسخ والبطاطا والشوندر
والبصل والملفوف والحنطة والاشجار المثمرة فتقسط غضيب
الاوراق وتمتص عصارة النسخ والنسخ الناصع.
يكافح عند ظهوره باستعمال احد الحواشير الفعالة على ان
يعاد النسخ على ثلاث مرات وذلك للقضاء على جميع
الانسال المتتابة.

٥٠٥٩ - ترييس مصري Retithrips aegyptiacus (S).
Thrips égyptien (F).
حشرة بنية اللون طولها نحو ١ مم تركيب الكرمه. يرقاتها
تبلي شفاقة تقسط الغضيب فتجعد الاوراق وتؤذيها.

٥٠٦٠ - ترييسيات Thripsidae (S).
Thripsidés (F). Thripsidae (E).

فصيلة حشرات من هديات الاجنحة. اجناسها وانواعها
عديدة جميعها متساوية الاجنحة الهدية عند وجودها.
قرونها الاستشعارية عديدة الفواصل. ارساغها محجنية



ترييس الفول



ترييس سوري



ترييس شائع



تريوليوم



تريومة

الجذاعة . الزوج العلوي مستطيل ومعيون ، اما السفلي فقصير . تجويفها الرئوي يتركز تحت الصدفة .



تريجة

٥٠٧٧ - تريستانيه ٥
Tristania (S).
Tristania, Tristanie (F). Brisbane box, Brush box (E). Weidenirgel (D). Tristania (I).

جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة الآسيات . انواعها نحو ٢٠ جميعها اشجار وشجيرات معمرة . اوراقها عروية متعاقبة اهليلجية سنانية معنقة . ازهارها عذقي التجميع ، محوري وتاجي الارتكاز . ازهارها عديدة الالوان السوية التخضيب يكثر فيها الاصفر || اشهر انواعه التزيينية ما يلي .

٥٠٧٨ - تريستانيه دلفية ٥
Tristania nerifolia (S).
Tristanie laurier-rose (F).

جنية فرعاء دلفية الاوراق . ازهارها وردية اللون . ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

٥٠٧٩ - تريستانيه ضمية الورق ٥

Tristania conferta (S). Tristanie à feuilles en bouquets (F).

شجرة كبيرة القد رفيعة تملو من ٣-٤ م . اوراقها لسنة مستطيلة ضمية التجميع . ازهارها صفر . ازهارها يستمر من تموز الى آب .

٥٠٨٠ - تريستانيه عطرية ٥
Tristania suaveolens (S).
Tristanie odorante (F).

شجيرة فرعاء كثيفة الورق . ازهارها الى الصفار الكبيرتي . ازهارها يستمر من حزيران الى آب . اوراقها وازهارها عطرية الرائحة يستخرج منها بالتقطير عطر رائج الاستعمال .

٥٠٨١ - تريشين ٥
Trichina (F). Trichina (E).

هي دودة الخنزير وتسمى ايضا تريخين .

٥٠٨٢ - تريك ، تريكو ٥
Sauclet (F).

هو القشقوق ، سمكة بحرية ، اطلبه .

٥٠٨٣ - تريك ٥

المنقود أكل ما عليه . والعدق نفص ما عليه من بسر .

٥٠٨٤ - تريكة ٥ هي البيضة بعد خروج الفرخ منها .

٥٠٨٥ - تريكودرمة ٥
Trichoderma

جنس فطور مجهرية من الماصويات وفصيلة الوطحيات . انواعه قليلة العدد والاذى . شبيهه نذلي الشكل ، لبد التجميع ، مداد الانتشاب . جرابه الكنيدي مجداني التركيب متناسب الاقسام . كنانته وبويضاته صغيرة شفافة او ملونة || يكافح بالكبريت والنحاس . احرف انواعه ما يلي .

٥٠٨٦ - تريكودرمة كوننجي ٥

Trichoderma koningii (S).

فطر مجهري يركب جذور التفاح في الاراضي الرطبة فيعطها . ويركب درنات البطاطا الحلوة فيؤذيها . مظهره الخارجي يقع مستديرة سمراء اللون محددة السطح تصيب البشرة وتغور في الجراة او في اللب .

المناطق الافريقية الاستوائية . انواعها المعروفة نحو ٢٠ . اوراقها حرشقية التركيب عصفية النصل الضيق المستطيل . جنورها لحية بدينة . شراخها قرصي الارتكاز ، اجوف ، مستطيل ، تملو نورة متتابعة الصفوف متراسة الازهار . الزهرة بوقية الشكل اما لونها فيختلف باختلاف النوع ، يكثر فيها الارجواني الموشح والاصفر المشرب .

٥٠٦٩ - تريايكال ٥
Triticale (F). Triticale (E).

نبات جديد من التجيليات وفئة الحبوب الغذائية نتج عن تصالب القمح مع الشيلم || زراعته الاختيارية كانت جد مشجعة لان متطلباته التربة لا تختلف عن متطلبات الشيلم ، ولان معدل انتاجه لا يقل عن ٧٠٠ كيلو للدم الواحد ، ولان محواه الغذائي شبيه بمحوى الخنطة || بوشر بزراعته الحقلية في مختلف المناطق والاقليم منذ عام ١٩٧٩ .

٥٠٧٠ - تريشيبة ٥
Photaxisme (F).
Photaxism (E).

التريشة مجموعة المناشع التي تؤخر النوبة في النبات وتغزي الى الضوء اي الى مغايل اشعة الشمس .

٥٠٧١ - تريجيكة ٥
Diapensia (S). Diapensie (F).

جنس نباتات برية ، ليفية ، معمرة ، من فصيلة التريجيحات . انواعها المعروفة قليلة لا تتجاوز السبعة . اعطانها جبال البلاد المتدلة الحارة || سوقها فرعاء . اوراقها صغيرة ، لسينية النصال ، خلية القشار . ازهارها صغيرة صفراء اللون او بيضاء .

٥٠٧٢ - تريجيحات ٥
Diapensicaceae (S).
Diapensicacées (F). Diapensicaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة القملات . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، اعطانها جبال البلاد المتدلة الحارة || جميعها نباتات معمرة ، صغيرة الحجم ، ليفية غشوشية . اوراقها صغيرة ، متعاقبة ، متقاربة ، كثيرة العدد . ازهارها خنثوية ، خاسية الاجزاء . تويجاتها متحدة القملات النظامية . وزيمها مرتفع . مبيضها ثلاثي الاخبية الكثيرة البويضات || اشهر اجناسها التريجة .

٥٠٧٣ - تريخين ٥
Trichine (F). Trichina (E).

هي دودة الخنزير من الديدان الخيطية تركب الخنزير وتنتقل مع لحمه الى الانسان .

٥٠٧٤ - تريخينوز ، تريشينوز ٥
Trichinose (F).
Trichinosis (E).

هو مرض دودة الخنزير .

٥٠٧٥ - ترييس ٥
Aspidiske

التريس او ترس السفينة نجم ثير من كوكبة السفينة .

٥٠٧٦ - ترييسة ٥
Parmacella (S).
Parmacella (F). Parmacella (E).

جنس حيوانات قاذبة من الرخويات معديات الارجل ، رئوية ، وفصيلة البزاقيات . انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها قاذبة ، بعضها يعيش في البرازيل والبعض الآخر في مدغسكر . يكثر وجودها على ضفاف البحيرات والمناقع || اجسامها اهليلجية ، مستطيلة ، رفيعة الوسط الذي يحمل صدفة صغيرة كلسية المادة ، مسطحة ، مفرصة الحنار الامامي . رؤوسها قليلة الوضوح ، رباعية الملاصق



تريخين



تريسة



تريستانيه عطرية



تريكودرمة كوننجي

٥٠٩٨ - **تَزْيِيل** ، **تَزْيِيلَة** Fumure (F).

Spreading of dung on land (E).
التزيبيل هو اضافة المواد الخصبية الى التربة . راجع تسميد.
والتزيبيلة هي ما وضع من زبل لزراعة معينة .

٥٠٩٩ - **تَزْمِيع** Gemmiparité (F). Gemmiparity (E).

طريقة تكاثر لاشتي خاصة ببعض الحيوانات والنباتات
الدنيا الوحيدة الخلية كما هي الحال في خيرة الجملة
والاسفنجيات والمحجوفات والحيوانات الطحلبية والخراطين...

٥١٠٠ - **تَزْنِين** Nervulation (F).

Nervulation (E).
التزئين شكل الزنن والاعصاب ان في روشن الحشرة وجناحها
ام في نصل الورقة .

٥١٠١ - **تَزْوِيق** Décoration, Ornementation (F).

Decoration, Ornementation (E).
فن التزين والزخرفة .

٥١٠٢ - **تَزْيِد** ، **غَبْض** Exostose (F).

Exostosis (E).
عارض يصيب الدواب وهو انتفاخ سطح العظم . وقد
تختلف التزيدات او الفيوض باختلاف مواقعها من العضو
المصاب . راجع جرد ودخس .

٥١٠٣ - **تَزْيِيت** Hullage, Lubrification (F).

Oiling, Lubrication (E).
دهن الشيء او سحه بالزيت .

٥١٠٤ - **تِسَاعِي** Nonuple (F). Ninefold (E).

حاو تسع مرات .

٥١٠٥ - **تِسَامِي** Sublimation

صفة تتميز بها بعض الاجسام فتسامى اذا سخنت وتتكشف
اذا بردت .

٥١٠٦ - **تِسَالِد** ، **بَلَك** ، **تِرَاعِص** ، **كُوش** ، **نُزُو**

Reproduction, Accouplement
بجامعة الذكر انشاء .

٥١٠٧ - **تَسْبِيق** Baguage (F). Ringing (E).

التسبيق وضع السباق في رجل الطائر .

٥١٠٨ - **تَسْتُول** Testule (F). Testule (E).

التستول الغلاف الخارجي للبيضة .

٥١٠٩ - **تَسْتِيف** ، **تَسْبِيق** Manutention (F).

Management (E).
جمع الشيء وسفه بترتيب ودراية .

٥١١٠ - **تَسْجِيل** Transcription

هو ان تلتخ في سجلات خاصة صورة طبق الاصل عن المقد
القانوني المراد تسجيله .

٥١١١ - **تَسْرِئَة** Frai (F). Fraying, Spawning (E).

التسرئة هي لقاء السرم عند السمك .

٥١١٢ - **تَسْرِئَة** ، **تَسْرِير** Grainage (F).

Silkworm eggs (E).
هي العملية التي بواسطتها يتمكن الاختصاصي او المربي
من الحصول على سرم دود القز .

٥٠٨٧ - **تريكوذرمه لينورم** * Trichoderma lignorum (S).

فطر مجهري يكثر في البلاد الحارة . يركب بعض الثمار
كالليمون فيعشها ويمفن جذور المصان ودرنات البطاطا
الخلوة . يكافح بمركبات الكبريت والنحاس .

٥٠٨٨ - **تريكوستوريه** * Trichoseptoria (S).

جنس فطور مجهريه من فصيلة الصنبيات . بكتيداته
جراية تنشأ محصورة في الادمه ثم تنمو وترقى فتصعد
البشرة بعد ان تقرحها وتصلبها . قصباته لحمية النسيج
هلبية . بربغاته شفافة مؤثورة يملوها قطرات براقه .
انواعه قليلة اشهرها تريكوستوريه التفاحيات .

٥٠٨٩ - **تريكوستوريه التفاحيات** * Trichoseptoria fructigena (S).

فطر مجهري يركب ثمار التفاح والاحاص والسفرجل في
انحاء خزنها || مظهره الخارجي قروح صغيرة لاقياسية
الشكل والحجم تبدو وردية اللون ثم تنحرف نحو الخطي
وتستقر على السمرة || تتركب الثمار المخزونة عند ارتفاع
الحرارة والرطوبة فتشوهها . يكافح باجتناب الاسباب .

٥٠٩٠ - **تريبوليت** * Tribolites

فئة من القشريات تدعى ثلاثيات الفلق ، اطلها .

٥٠٩١ - **تريشمة** ، **ديتريمة** * Ditrema (S).

Ditrème (F). Ditrème (E).

جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة المندوليات.
انواعها المعروفة عديدة اعطانها تمتد من الهند الى اليابان ||
اجسامها شبه بيضية الشوزن ، معتدلة التسطيط ، تطول
من ١٨ الى ٢٤ سم . رؤوسها كبيرة خذروفية الشكل .
مخاطمها بحاجة مندفة صغيرة الاشدق . عيونها ماسحة .
زعانفها الظهرية مستطيلة . منخسية النصف الامامي .
زعانفها الذيلية فارقة || اثوابها تراوح من الفضي الى
الصنابي والذهبي ، ظهورها اعقب خضاباً من بطونها ||
لحومها مأكولة متوسطة الصنف .

٥٠٩٢ - **تريينكس** * Thrinax (S). Thrinace (F).

جنس نباتات برية وزينية من فصيلة الخليات . انواعه
سته مهدها جزر الاثليل وجوارها . جيمها صغيرة القد
تزرع في الحدائق والمراكن . اعما انتشاراً ما يلي .

٥٠٩٣ - **تريينكس برازيلية** * T. Brasiliensis (S).

T. du Brésil (F).

٥٠٩٤ - **تريينكس صغيرة الزهر** T. parviflora (S).

T. à petites fleurs (F).

٥٠٩٥ - **تريينكس فضية** T. argentea (S).

T. argenté (F).

٥٠٩٦ - **تَزْيِيب** Passerillage (F).

راجع إزباب .

٥٠٩٧ - **تَزْيِيد**

Cardage du coton, Effilochage. (F). Carding (E).
تزويد القطن : تنفيشه . يقال زبدت المرأة القطن : نفشته
وجودته حتى يصلح لان تغزله (اللسان) .



تريكوذرمه لينورم



تريكوستوريه



تريكوستوريه التفاحيات



نرعة



تريينكس برازيلية

٥١٢٦ - تسليح Armature (F). Reinforcement (E).

هو ما تستويجه اعمال الباطون من مختلف اشكال الجهاز الحديدي . والتسليح قد يكون :

تسليح حلزوني Armature en hélice (F).
Spiral reinforcement (E).

تسليح طولي Armature longitudinale (F).
Longitudinal reinforcement (E).

تسليح عرضي Armature transversale (F).
Traverse reinforcement (E).

تسليح مضاهي Armature symétrique (F).
Symmetrical reinforcement (E).

٥١٢٧ - تسليم ، تسليم العين

Livraison, Délivrance, Mise en possession (F).
Delivery, Give possession (E).

هو دفع مادة العين المنقولة الى مستحقها او الى من له الحق في حيازتها .

٥١٢٨ - قسّم ، قسّم

Empoisonnement, Intoxication (F). Poisoning (E).
تعطيل اعضاء الجسم عن العمل وقد يحصل من بلع مواد سامة نباتية او عضوية او معدنية .

٥١٢٩ - تسّم الدم Sépticémie (F).
Septicaemia, Septicemia (E).

مرض عديد الاشكال يحصل من نفوذ الميكروب الى الدم .

٥١٣٠ - تسّميد Fumure (F). Dung (E).
هو ما يدفن في التربة من اسمة لحد النبات مما يفتقر اليه من عناصر غذائية ضرورية لحياته ونموه وأثماره . والتسميد قد يكون إما عضوياً او معدنياً او خضرياً .

٥١٣١ - تسّميد خضري Sideration (F).
Sideration (E).

هو التسميد بالنباتات القطائية كالباقية والترمس وما اشبه . وقد يتم ذلك بتمر النباتات المعنية للانتفاع من خاثرها العضوية المفيدة ومن محتوياتها الغذائية اخصها الازوت .

٥١٣٢ - تسّميد عضوي Fumure organique (F).
Organic dung (E).

هو التسميد بالمواد العضوية منها كان مصادرها كالتربل على اختلاف تراكيبه وكمرس المعز والضأن وروث الخيل وسائر الدواب وخصي البقر وسلح الحمام والدجاج ومساحيق العظام والدم ورواسب المواد النباتية وقامة المدن الخ .

٥١٣٣ - تسّميد معدني Fumure minérale (F).
Mineral dung (E).

هو التسميد بالمواد المعدنية على اختلاف عناصرها وتراكيبها اخصها الازوت وحامض الفسفور والبوتاس .

٥١٣٤ - تسمين Engraissement (F). Fattening (E).
هي المبالغة في تغذية الحيوان حتى يجتمع الشحم في عضله لتحسين لحمه ولزيادة وزنه .

٥١٣٥ - تسمين بالدقيق Pouture (F).
هو التسمين بدقيق الحبوب الملقية .

٥١١٣ - تسريح ، تنبيه بالإخلاء

Congédiement (F). Discharging (E).
هو التصريح بالاستغناء .

٥١١٤ - تسريح ، زبارة ، جزومة

Taille de la vigne (F). Pruning of wine (E).
هو تشحيل الكرم وتقليمه .

٥١١٥ - تسطيع Stéréographie (F).
Stereography (E).
رسم الاجسام على سطح .

٥١١٦ - تسطيعي Stéréographique (F).
Stereographic (E).
ما كان سطح الرسم .

٥١١٧ - تسعير ، سمانة Cotation, cote (F).
Quotation (E).

السامنة او التسعير بيان سعر المعاملات والاسهم .

٥١١٨ - تسفية Ebarbage (F). Paring (E).
نزع السفا الذي لا يزال عالقا بحب الشجير بعد الدراس .

٥١١٩ - تسكير Saccharification
تحويل النشا والسكرور الى غلوكوز قابل للاختبار .

٥١٢٠ - تسكيم Segmentation (F).
Segmentation (E).

التسكيم الانقسام الى سكم او التجزئة الى اقسام . ومن الوجهة التشريحية : الانقسام الكامل او غير الكامل للاجزاء التي يتألف منها الجسم او عضو من الجسم || ومن الوجهة البيولوجية : مجموعة الانقسامات التي تحصل في مختلف الاطوار الانتقالية للبيضة المزكوبة .

٥١٢١ - تسلم ، قبول Réception (F).
Receiving (E).

هو الاعتراف بتسلم الشيء المطلوب . وقد تستعمل في عدة صيغ منها تسلم الاعمال وتسلم البضائع .

٥١٢٢ - تسلم الاعمال Réception de travaux (F).

هو ان يعترف صاحب الاعمال للمقاول بصحة تنفيذها ورضائه عنها وهذا الاعتراف دليل قبولها وبرهان على كشف سابق عليها || وتسلم الاعمال غير تناولها الفعلي وربما سبقه او لحق به .

٥١٢٣ - تسلم البضائع Réception de marchandises

هو ان يتسلم المرسل اليه او وكيله البضائع من متعهد النقل وبهذا التسلم ينتهي عقد النقل .

٥١٢٤ - تسلم التركة Saisine (F). Seizin (E).

حق يستنده بعض الورثة من القانون او يستنده منفذ الوصية من الموصى .

٥١٢٥ - تسلم العين Prise de possession (F).
Occupancy (E).

هو العمل الذي يصبح به المرء حائزاً للعين .




تسنة



تسنة الكرمة



تسنة ثلجية



تسنة



تشحيل



تشحيل

Fluidification ٥١٤٥ - تسهيل ، تميع

Amphimixis (F). ٥١٤٦ - تشابك ٥

Amphimixy (E). التشابك المرحلة الثالثة من الاخصاب ذلك عندما يتم التقارب فالاتصال بين النصب الذكورية والانثوية .

Isoméris (F). Isomerid (E). ٥١٤٧ - تشابه الاجزاء

Allogamie (F). ٥١٤٨ - تشاكس ٥

Allogamy, Cross-fertilization (E). التشاكس الاخصاب المتصالب بين نباتين .

Erotisme (F). Erotism (E). ٥١٤٩ - تشبب

التشبب والغزل مترادفان ، راجع غزل .

Dispersion ٥١٥٠ - تشتيت

Hivernage (F). ٥١٥١ - تشيية

Winter-ploughing, Winter-foddering (E). زرع الركون الى الثبات الحولي عند بعض الحيوانات ومعظم الحشرات .

Repiquage, Piquetage (F). ٥١٥٢ - تشثيل

Transplantation (E). هو نقل النبتة او الفرس من المثل الى مستقرها .

Polypode de chêne (F). ٥١٥٣ - تشتيوان

Polypody wall fern (E). راجع بسايح .

Taille (F). ٥١٥٤ - تشحيل ، تقليم ، تقصيب

Pruning (E). هو قطع بعض الاغصان او الافنان اما لاعطاء الشجرة الشكل المرغوب فيه او لتنظيم الثمار او الحث على زيادته .

Diagnostic (F). Diagnostics (E). ٥١٥٥ - تشخيص

التشخيص هو الاسترشاد الى معرفة المرض من وصف الاعراض وصفاً دقيقاً يفهمها عن الشك والريبة .

Prévision du temps (F). ٥١٥٦ - تشخيص الجو

Prevision of time (E). الاستدلال عن حالة الطقس من معالم الجو .

Balivage (F). Staddling (E). ٥١٥٧ - تشخيل

هي الطريقة القوية المتبعة ، في قطع شجر الخيس . تقوم على ترك المشاغل اي بعض الفروع او الاشجار الفتية لتكبر وتصير اعجاز .

Ebourgeonnement (F). Nipping of buds, Disbudding (E). ٥١٥٨ - تشديخ البراعم ، نزع البراعم

قطع الاغصان او الافناد العادمة القائدة او التي تعمق نمو الشجرة او تسيء الى شكلها .

Eilage (F). Lopping (E). ٥١٥٩ - تشذيب

علم يبحث في تركيب وصفات الاعضاء والانسجة الحيوانية والنباتية وفي شكلها وهيئتها وكيفية نموها .

Anatomie (F). Anatomy (E). ٥١٦٠ - تشريح

علم يبحث في تركيب وصفات الاعضاء والانسجة الحيوانية والنباتية وفي شكلها وهيئتها وكيفية نموها .

Plasmopara ٥١٣٦ - تسنة ٥*

جلس فطور مجهرية من عمارة الوصنيات وفصيلة الصنائيات تتميز بنحوتها البوغية التاجية الارتكاز ، المتقودية الشعب والعمودية الانتشاب . تكاثرها بوغي ، مرافقها مستديرة او بيضية الشكل || انواعها المعروفة كثيرة لا يدخل منها ضمن نطاق هذا البحث سوى التسنة الثلجية وتسنة الكرمة .

Mildiou du tabac (F). ٥١٣٧ - تسنة التبغ ٥

هي صناء التبغ ، اطلبه .

Plasmopara viticola (S). Mildiou de la vigne, Rot gris, R. brun, R. juteux (F). Downy mildew of grape (E). Falscher Mehltau des Weinstockes (D). ٥١٣٨ - تسنة الكرمة ٥*

ومنهم من قال «مرض اهداء العنب» . فطر مجهري من التسنة يركب الكرمة فيؤذيها في اوراقها وثمارها . مظهره الخارجي يقع فيحصة لا قياسية الشكل والحجم تعلو فصل الاوراق على صفحاتها العليا فتبدو سمراء اللون يقابلها على الصفحات السفلى خلل اخضر اطحل يقضي على الفنج والحلايا بعد ان يحرمها التعامل والتفاعل ويمنعها عن القيام بوظائفها الحياتية || وعندما يصيب الازهار يمنعه عن التفطيج فتتلصص قبل الانمقاد || وتنتج اصاب حب المنقود يفشي بوشاح اطحل يسبب العفن والمريان والجفاف . يكافح عند ظهوره باستعمال سائل بورغينيون المحلول ٢٪ ومنهم من استعمال سائل بورردو المحلول ١٪ يضاف اليه اخضر النحاس بمعدل ١٪ ونحو ٥٪ من الاوكسيلكوريد . وهذه المكافحة تتركز على عدة رشات اقلها ثلاث واكثرها خمس . الاولى عند ظهور الوصم او عند العقد والثانية بعد الاولى باسبوعين والثالثة بعد الثانية باسبوعين وهكذا الرابعة والخامسة .

Plasmopara nivea ٥١٣٩ - تسنة ثلجية ٥*

وصم سببه فطر مجهري يركب ورق مختلف نباتات الفصيلة الميرواتية واخصها الجزر والسيصارون فيؤذيها ويعطلها . مظهره الخارجي يقع لا قياسية تبدو الى الصقرة وتنتشر على الصلبة . يملؤها خلل كثيف ابيض اللون كالثلج . يكافح باستعمال بعض الادوية التي تتركز على النحاس .

Oomycetes (F). Oomycetes (E). ٥١٤٠ - تسنيات ٥

مرتبة من رتبة الفطور البيضية تشمل ثلاث فصائل : السلاقيات والصنائيات والفمسيات .

Tuteurage (F). Propping (E). ٥١٤١ - تسنييد

هو وضع المسند قرب الفرس او النبتة لربطها عليه حفاً لساق من الانواء او الانكسار .

Règlement (F). Regulation (E). ٥١٤٢ - تسوية

هي تصفية المتنازع فيه والصلح عليه .

٥١٤٣ - تسوية ، تصويب ، تعديل

Péréquation (F). Equalization (E).

عملية تقسيم وتوزيع الضرائب وغيرها نسبة الى حالة المعيشة او تطبيقاً على حالة نسبية معينة .

Politisation (F). ٥١٤٤ - تسيس

Giving of a political aspect to sth. (E).

التسيس ادخال السياسة حيث لا يجب ان تكون . كقولك تسيس دوائر الدولة .

Dissection

٥١٦١ - تَشْرِيح

قطع الشيء وفصل بعضه من بعض .

Zootomie (F).

٥١٦٢ - تَشْرِيح حَيَوَانِي

Zootomy (E).

علم يبحث في تشريح الجسم الحيواني .

Phytotomie (F).

٥١٦٣ - تَشْرِيح قَبَائِي

Phytotomy (E).

علم يبحث في تشريح النبات . راجع فيتوتومية .

Législation rurale (F).

٥١٦٤ - تَشْرِيع زَرَاعِي

Rural legislation (E).

مجلة القوانين والمراسيم والانظمة المرعية الاجراء المتعلقة بالزراعة .

Octobre (F). October (E).

٥١٦٥ - تشرين الاول

يعرف ايضاً بـ أكتوبر الشهر العاشر من السنة الشمسية وهو من شهور الحريف مدته واحد وثلاثون يوماً . في العقد الاول منه تهيج الصبا وفي الثاني تكثر الرياح وفي الثالث يبرد الجو والهواء ..

تقويمه الزراعي - اعماله الزراعية عديدة ، اخصها :

١ - في الزراعات العامة الموسمية : متابعة جني القطن وفرزه . متابعة وانجاز قطف وتجفيف اوراق التبغ والتبناك والمباشرة بتوصيب ورزم القطفات الاولى . حرث الحواكير المعدة لزراعة التبغ فور الانتهاء من القطف وبعد اقتلاع الشتل . توزيع الاسمدة العضوية والمعدنية على الحقول المعدة لزراعة الحنطة ثم تحضير تربة حقول الحنطة والشعير والشوفان والباقية والترمس الخ .

٢ - في الاشجار المثمرة : تحضير التربة المعدة لاقتبال النصبوب الجديدة بالنقب العميق . تعيين مواقع النصبوب واعداد الحفر اللازمة وتركها بعض الوقت عرضة للشمس والهواء . متابعة قطف الثمار المتخارة والعناية بها مع اجتناب الرض والتخديش . رفع حواجز جميع الماشاي والاقنية الداخلية في المتافع ومختلف الجنائن والبساتين لتصريف مياه الامطار الممكن هطولها على حين غفلة .

٣ - في الحمضيات : متابعة قطف الليمون الحامض المعد للتصدير . والعناية بالبرتقال واليوسفي على اختلاف ضرورهما وتزويد الاشجار الضعيفة او الكثيرة الحمل ببعض الاسمدة الازوتية السريعة التمثيل .

٤ - في الاشجار المختلفة : متابعة قطف العنب المعد لصناعة الخمر والكحول . ابتداء موسم الزيتون الاخضر . المباشرة بحرث الزراعتين بعد قطف الثمار وتقليم الاشجار . غرس مشاتل الاشجار الحرجية واخصها التنوب والصنوبر .

٥ - في البقول والزهور : بذر وتشتيل جميع انواع الخضار الشتوية كالجزر واللفت والفجل والبازيلا والبصل والخس الخ ... بذر مشاتل الشوندر والارضني شوكي . انجاز زراعة البطاطا الشتوية على الساحل . متابعة غرس الزهور البصلية على انواعها ..

Novembre (F). November (E).

٥١٦٦ - تشرين الثاني

يعرف ايضاً بنوفمبر . الشهر الحادي عشر من السنة الشمسية وهو من شهور الحريف . مدته ثلاثون يوماً . في العقد الاول منه تهب الجنوب وفي العقد الثالث يبلغ المد والجزر غاية الاقبال والادبار .

تقويمه الزراعي - اخص اعماله الزراعية ما يتبع :

١ - في الزراعات العامة الموسمية : بذر الحنطة والشعير والشوفان والبقول وجميع انواع النباتات المليفية . متابعة توصيب ورزم اوراق التبغ الجافة .

٢ - في الاشجار المثمرة : متابعة تحضير التربة واعداد الحفر اللازمة لاقتبال النصبوب الجديدة . العناية بتسميد جميع الاشجار اخصها اللوزية كالكوز والمشمش والخوخ والدراقن والكرز ... المباشرة بغرس نصوب اللوز والخوخ والدراقن والمشمش ... المباشرة بالمكافحة الشتوية فور الاعمال . تغليف سوق الاشجار لوقايتها من الارنب البري وفأر الحقل . اخذ جميع الاحتياطات اللازمة لتصريف المياه عن البساتين .

٣ - في الحمضيات : متابعة موسم تصدير الليمون الحامض والمباشرة بقطف البرتقال واليوسفي . عدم التأخير في استعمال الاسمدة الازوتية السريعة التمثيل لجميع الاشجار الضعيفة والكثيرة الحمل .

٤ - في الاشجار المختلفة : متابعة وانهاء موسم قطف العنب المعد للخمر والكحول . تسميد الكرمة ابتداء من العقد الثالث . متابعة قطف موسم الزيتون ثم تقليم الاشجار وحرث الزراعتين بعد التسميد العضوي او الكيماوي الكامل التركيب . المباشرة بغرس نصوب الخرنوب والسنديان والصنوبر والتنوب في المواقع القليلة والمتوسطة الارتفاع .

٥ - في البقول والزهور : متابعة بذر البقول وغرس الزهور البصلية . الاهتمام بمكافحة العناكب وببوضها .

Ramification

٥١٦٧ - تَشْعُب

هو التفرع ، اطلبه .

Capillarimétrie (F).

٥١٦٨ - تَشْعِير

Capillarimetry (E).

علم يبحث في مختلف خصائص وقياسات الانابيب الشعرية .

Fanage (F). Tossing, Tedding (E).

٥١٦٩ - تَشْعِين

هو تبييس الكتلة .

٥١٧٠ - تَشْقِيق ، شِقَاق ، حَوَالَة شَقْ

Ranchage (F).

هي الحراثة المتباعدة الاتلام .

Taille de formation (F).

٥١٧١ - تَشْكِيل

Formation pruning (E).

هو التنصين ، اطلبه .

Rationnement (F). Rationing (E).

٥١٧٢ - تَشْكِيم

طريقة اطعام الحيوان وذلك بتحديد كمية العلف اليومي وتوقيت ميعاد كل شكلة .

Dégermage (F).

٥١٧٣ - تَشْلِيخ ، تَشْلِيْط

Egermage (E).

هو انتزاع او فصل العيون او الزرع او النوامي عن عسقل البطاطا المدخرة .

Incération (F).

٥١٧٤ - تَشْمِيع

التشميع كياوياً هو دمج الشمع بمادة اخرى .

Dépente (F).

٥١٧٥ - تَشْنِيْق

Sling. Depending (E).

عملية قوامها تمليق مشاكيك غيوط التبغ الجاف في الحواصل وتركها الوقت الكافي قبل تطعيمها ورزما .

٥١٩٢ - **تَصْرِيفِيَّة** ٥ Cybernétique (F).

Cybernetics (E).

التصريفية نظرية علمية محورها الاشراك والتقيادة في الجهاز الآلي وعند الكائنات الحية .

٥١٩٣ - **تَصْرِيح** Autorisation (F).

Authorisation (E).

هو الاذن الذي يجب على الافراد الحصول عليه قبل قيامهم باعمال معينة .

٥١٩٤ - **تَصْرِيد** Arrosage léger (F). Sprinling (E).

التصريد : سقي دون الري .

٥١٩٥ - **تَصْرِيف المياها ، قَلَس** Drainage

هو تجويد الارض بصرف مياها الزائدة الضارة .

٥١٩٦ - **تَصْفِيد** Sublimation

هو التسامي .

٥١٩٧ - **تَصْفِيَّة ، تَشْخِيل** Filtrage (F).

Filtering (E).

هو تنظيف السوائل من الاجرام والمواد الغريبة بواسطة المصفاة .

٥١٩٨ - **تَصْفِيَّة** Liquidation (F). Settlement (E).

هي العمل الذي به تنظم وترصد الحسابات وتعين مبالغها نهائياً كتصفية الديون والمصروفات .

٥١٩٩ - **تَصْفِيح** Laminage (F). Laminating (E).

جعل الشيء صفائح رقيقة بواسطة المصفاح .

٥٢٠٠ - **تَصْفِيط** Manoquage (F). Handling (E).

فرز اوراق التبغ وجمعها الى صفطات او بازات .

٥٢٠١ - **تَصْفِيْق ، إِصْفَاق** Soutirage (F).

Drawing off (E).

هو نقل الشراب والسوائل من اناء الى آخر لتصفو .

٥٢٠٢ - **تَصَلْب** Sclérose (F). Sclerosis (E).

نشاف يحصل في نسيج الحيوان او النبات يمنعا عن القيام بوظيفتها على الوجه الاكل .

٥٢٠٣ - **تَصَلْب المفاصيل** Aposphorose

اطلب أفسفور .

٥٢٠٤ - **تَصْلِيح** Décoconnage (F).

Crop of cocoons (E).

هو انتزاع الصلج اي الشرائق من الشيج وجمعها .

٥٢٠٥ - **تَصْنَع ، إِصْنَاع ، صِرْتَم**

Gommose (F). Gummosis (E).

وصم يصيب معظم الاشجار المثمرة والتزيينية والحرجية في سوتها وفروعها فيؤذيها وقد يميتها . اسبابه عديدة منها فطرية ومنها فيزيولوجية .

٥٢٠٦ - **تَصْمِيم** Projet, Plan (F). Project, Plan (E).

درس تبياني اعدادي تذكر فيه التفاصيل باقتضاب .

٥١٧٦ - **تشهير ، وَصَف** Signalement (F).

Description (E).

هو ذكر اهم الصفات والاشكال الفارقة ان في الحيوان او في النبات والاشياء للتعريف والدلالة .

٥١٧٧ - **تشويط** Flambage (F). Singeing (E).

هو معالجة سوق وفروع الاشجار باللهب للقضاء على الطفيليات والحشرات مع يوضها . راجع إلهاب .

٥١٧٨ - **تشويل** Etrapage (F).

اقتطاع الجذام .

٥١٧٩ - **تشويه** Mutilation

٥١٨٠ - **تَصَاعُد** Progressivité (F).

Progressivety (E).

٥١٨١ - **تَصَاعُدِي** Progressif (F). Progressive (E).

٥١٨٢ - **تَصَالِب** Croisement (F).

Cross-breeding (E).

من طرائق الاسفاد . قوامه ان يكون الذكر والانثى من نوع حيواني واحد ولكن من سلالتين او عرقين مختلفين كاتزاء حصان عربي عتيق على حجر كنديش او كقفط ثور هولندي على بقرة بلدية .

٥١٨٢ - **تَصْبِير** Taxidermie,

Empaillement (F). Taxidermy (E).

التصبير نوع من التحنيط الخاص بالحيوان والطيور ، قوامه تجويف الجثة ومعالجتها بالادوية اللازمة ثم حبسها وتركيزها في الوضع المطلوب .

٥١٨٤ - **تَصْبِين** Saponification

تحويل الشيء الى صابون او صناعة الصابون .

٥١٨٥ - **تَصْحِيح** Rectification

٥١٨٦ - **تَصْخِير ٥** Lithogénèse (F).

Lithogenesi (E).

التصخير النمط الذي اتبعته الصخور الرسوبية في تكوينها .

٥١٨٧ - **تَصَدُّع** Cadranure (F).

هو التصدع ، اطلبه . Malady of old trees (E).

٥١٨٨ - **تَصْدِير** Exportation

اخراج البضائع وكل ما له قيمة نقدية من البلاد . والتصدير يخضع لائتمنة لا بد من التقيد بها منها البيان والرخصة والرسوم .

٥١٨٩ - **تَصْدِيق** Homologation (F).

Ratification (E).

موافقة السلطة على عمل يدخل في نطاق نشاطها .

٥١٩٠ - **تَصَرَّف** Disposition

٥١٩١ - **تَصَرَّف تدليسي** Stellionat (F).

Fraudulent selling (E).

هو التصرف في مال الغير وهو على انواع منها بيع مال الغير او رهنه ومنها بيع المال الواحد الى شارين مختلفين بطريقة الخداع ومنها ايهام الشاري بخلو المقار المبيع من الديون . الخ .



تصنع

٥٢١٦ - **تَضْمِير** (F). Entraînement, Suée (F).
Training, Sweating (E).
هو تهيئة الفرس بالترويض وغيرها من الوسائل للاشتراك بحلبة السباق.

٥٢١٧ - **تَطْبِيق** (F). Application
اخضاع الحالة الفردية للأوامر العامة.

٥٢١٨ - **تَطْبِيق** (F). Abatement (E). Rabattement (F).
الحركة الاستدارية المحورية التي تمر بها السطوح المستوية قبل استقرارها في سطح المسقط.

٥٢١٩ - **تَطْرِيق** (F). Laying (E). Pondaion (F).
التطريق هو زمن يبض الطير.

٥٢٢٠ - **تَطْعِم** (F). Greffage, Greffe (F).
Grafting, Graft (E).
عملية جراحية تقوم على وصل نبات بآخر أو جزء من النبات بجزء آخر لينتجها وينميا كنبات واحد. فالجزء ذات الجذور وهو القائم في التربة يدعى المطعم والجزء الثاني الداخل على الأول يدعى الطعم. والنبات الذي تكون من مطعم وطعم يدعى المطعوم || فوائد التطعيم وغاياته عديدة نلخصها بما يلي :

١ - تكثير الانواع النباتية الجيدة مع الاحتفاظ بجميع صفاتها المميزة.

٢ - التمكن من استبدال نوع بآخر دون اللجوء الى القلع والغرس.

٣ - تجديد فتوة الاشجار التي بلغت دور الانحطاط.

٤ - اكثار الانواع المرغوب فيها في تربة لا تلائمها كتطعيم الاجاص بالسفرجل في التربة الجصية الرطبة.

٥ - تأمين انسجام الهيكل الشجري والطاقة الثمرية.

٦ - تأمين الطلع في الاشجار الثنائية المسكن كالفتق والكستنا.

اما التطعيم فقد يتم على عدة اشكال ضمن نطاق بعض الشروط الواجبة اخصها التجانس النوعي، الزمن الانسب، سلامة الاعضاء، والعملية. لإحكام الالتحام وتأمين عدم الجفاف. اما اهم الاشكال المستعملة فهي ما يتبع.

٥٢٢١ - **تَطْعِمُ احْتِطَاطِي**

Contre-greffe, Surgreffage (F). Counter-graft (E).
طعم احتياطي، الغاية منه تمكين الاستعاضة عند الحاجة.

٥٢٢٢ - **تَطْعِمُ ادْغَامِي** (F). Greffe par approche (F).
Graft by approach (E).

هو التطعيم بالادناء وقد يتم في بادئ امره بين مطعمين ويأتي كذلك حتى الالتحام التام حيث يقطع مطعم من الاثنين.

٥٢٢٣ - **تَطْعِمُ انْكِليْزِي** (F). Greffe anglaise (F).
Whip-grafting (E).

شكل من التطعيم بالشق قوامه الاعتماد على المادة الخشبية في تركيز وتنشيط الطعم.

٥٢٢٤ - **تَطْعِمُ بالشق** * ، مَزْلُوف

Greffe en fente (F). Cleft-graft (E).
نوع من التطعيم قوامه ادخال قضيب الطعم في خشب المطعم مع الانتباه لوجوب ملاسة قشور الطعم والمطعم.

٥٢٠٧ - **تَصْمِيمُ مُعَاكِس** (F). Contre-projet (F).
Counter-plan (E).
درس تبياني واعدادي يناقش جملة أو جزئياً التصميم الموضوع.

٥٢٠٨ - **تَصْنِيف** (F). Classification
التصنيف هو ترتيب وتنسيق وتفصيل الكائنات الى ممالك واقسام ورتب وفصائل واجناس وانواع وضروب الخ... على الوجه الآتي:

مملكة (F). Règne (F)

قسم (F). Division, Embranchement (F).

صف (F). Classe (F).

طائفة ، صفيف (F). Sous-classe (F).

شعبة (F). Section (F).

طبقة (F). Super-ordre (F).

رتبة (F). Ordre (F).

رُتْبِيَّة ، مرتبة (F). Sous-ordre (F).

لئة (F). Super-famille (F).

فصيلة (F). Famille (F).

سبط ، قبيلة ، ردف (F). Tribu (F).

عمارة (F). Sous-famille (F).

جنس (F). Genre (F).

عرة (F). Sous-genre, Genre spécifique (F).

نوع (F). Espèce (F).

ضرب (F). Variété (F).

صرم ، سمخة (F). Sous-variété (F).

سلالة ، عرق (F). Race (F).

فئة (F). Groupe (F).

٥٢٠٩ - **تَصْنِيفُ الحَيَوَانَات** (F). Zootaxie (F).

منهاج ترتيب وتنسيق الحيوانات (E). Zootaxy (E).

٥٢١٠ - **تَصْوِيب** (F). Péréquation (F). Equalization (E).

هو التسوية ، اطلبها.

٥٢١١ - **تَصَيِّح ، تَصَدِّع** (F). Cadranure, Gélivure (F). Star-shake (E).

هو حصول شق مستطيل في لحاء ساق الشجرة سببه شدة البرد.

٥٢١٢ - **تَضَامُن** (F). Solidarité (F). Solidarity (E).

٥٢١٣ - **تَضَامُنُ زِرَاعِي** (F). Mutualité agricole (F).

Agricultural mutuality (E).

هو تضامن محترفي الزراعة أو المشتغلين بالشؤون الزراعية

وجميات أو تعاونيات هذا التضامن.

٥٢١٤ - **تَضَخُّم** (F). Hypertrophie (F).

Hypertrophie, Hypertrophy (E).

هو فرط النمو وعدم اتزانه في عضو ما.


٥٢١٥ - **تَضْمِيد** (F). Pansement (F). Grooming (E).

الضميد والتضميد هو وضع العلاج واللفائف على الجرح

ليشفي.



تطعيم إدغامي



تطعيم إنكليزي



تطعيم بالشق

٥٢٣٩ - تَعَاوُن (F). Mutualité (F). Mutuality (E).

نوع من الادخار وتبادل المعونة يرتكز على نظام يتعهد بموجبه المتسبون ، مقابل اشتراك يدفعونه ، ان يؤمنوا بعضهم البعض من اخطار يعينونها .

٥٢٤٠ - تَعَاوُنِيَّة (F). Mutuelle (F). Mutual (E).
التعاونية شركة تقوم على مبدأ التعاون .

٥٢٤١ - تَعَاوُنِيَّة زِرَاعِيَّة (F). Coopérative agricole (F). Agricultural co-operative (E).

جمعية غايتها تعاون الافراد على القيام بالاعمال الزراعية الاقتصادية كنظيم بيع المحاصيل او حفظها .

٥٢٤٢ - تَعَايُش ، مُعَايِشَة (F). Symbiose (F). Symbiosis (E).

اشتراك في المعيشة بين فردين مختلفين وهو لا يصح بين الذكر والانثى او بين الاب والابن او بين العائل والطفلي .

٥٢٤٣ - تَعْبِثَة ، بَقْط ، رَزْم ، صَرّ (F). Emballage (F). Packing up (E).

٥٢٤٤ - تَعْتِيق ، تَفْرِيد (F). Démariage (F). Clearing up (E).

هو في الزراعة اقتلاع النباتات الزائدة او الضعيفة لاستبقاء القوة . وقد تجري هذه العملية في عدة زراعات اخصها القطن والشوندر والخيار .

٥٢٤٥ - تَعَجْرُد ، نَقْض (F). Défoliation (F). Defoliation (E).

سقوط وتناثر اوراق الشجر .

٥٢٤٦ - تَعْدَاد (F). Recensement, Dénombrement (F). Census, Enumeration (E).

هو التحرير الذي تجريه السلطة لمعرفة عدد الحيوانات والاشجار ويختلف الاشياء الممكن فرض الاتاة عليها .

٥٢٤٧ - تَعْدِي (F). Violation

هو خرق الحرمة التي ينص عليها القانون .

٥٢٤٨ - تَعْدِيل (F). Amendement (F). Amendement (E).

تعديل في مشروع مطروح للمناقشة في جمعية .

٥٢٤٩ - تَعْرِيف ، فَكَاك (F). Débuccage, Déchaussement (F). Déruellage (F). Laying bare the root of a plant (E).

التعريف هي نقيض التخنيق او الكم .

٥٢٥٠ - تَعْرِيف ، تَحْدِيد (F). Définition (F). Definition (E).

٥٢٥١ - تَعْرِيفَة (F). Tarif (F). Tariff (E).

هي القيمة الواجبة الاداء التي تحددها السلطة وقد تستعمل في صيغ شتى اهمها تعريف الحاجيات وتعريف الحماية والتعريف الجمركية .

٥٢٥٢ - تَعْرِيز الحِسَاب (F). Soutènement de compte (F). Written of account (E).

يراد به الوسائل والبيانات التي من شأنها التدليل على صدق حساب مقدم في دعوى .

٥٢٥٣ - تَعَس (F). Dégénérescence (F). Degeneracy (E).

التعس هو الانحطاط الجسموري والشوزي في الحيوان والنبات .

٥٢٢٥ - تَطْعِيم تَاجِي * (F). Greffe en couronne (F).

Crown-graft (E).
نوع من التطعيم قوامه تركيب العلم المزلول اي القصب المزلول في فُرْص حُضْر في خَشْب المَطْم .

٥٢٢٦ - تَطْعِيم رُقْعِي * ، تَطْعِيم بِالْعَيْن (F). Greffe en écusson (F). Graft by gems (E).

نوع من التطعيم يرتكز على تثبيت برعمة العلم بين لحاء وشكبر المَطْم .

٥٢٢٧ - تَطْعِيم مِزْمَارِي * (F). Greffe en flûte (F). Graft by flute (E).

نوع من التطعيم البرعسي قوامه استبدال رقعة من لحاء العلم برقعة من لحاء العلم تعادها مساحة ويقوم فيها عين جلية رافخة .

٥٢٢٨ - تَطْهِير (F). Antiseptie, Assainissement, Désinfection (F). Antisepsis, Sanitation, Disinfection (E).

هو استعمال وسائل الحيلة والوقاية والمكافحة التي تمنع انتشار الامراض وتقضي على الميكروبات .

٥٢٢٩ - تَطْوَر (F). Transformisme (F). Transformism (E).

التطوّر نظرية بيولوجية تقول باستمرار تطور الانواع الحية ، وهي بذلك تعاكس نظرية الركاة وتندمج اذا صح التعبير بنظرية الارتقاء .

٥٢٣٠ - تَطْوِير (F). Processus (F). Process (E).

اطلب مدرج .

٥٢٣١ - تَطْوِيس (F). Submersion

هو الاسقاء بالغمر او التريص .

٥٢٣٢ - تَطْوِيش (F). Castration (F). Gelding (E).

انزاع خصيتي الذكر في الحيوان .

٥٢٣٣ - تَطْوِيق ، حَضْر (F). Enclave (F). Enclave, Gore (E).

هو حالة عين ثابتة تحيط بها اعيان مملوكة لغير فلا يبق لها منفذ الى الطريق العام او ان لها منفذاً لا يفي بالحاجة .

٥٢٣٤ - تَطْهِير (F). Endossement (F). Endorsement (E).

هي صيغة الاذن بالدفع التي يحررها صاحب السند .

٥٢٣٥ - تَعَادُلِي ، تَمَالِي (F). Symétrique (F). Symmetrical (E).

ما كان متعادلاً الاجزاء او متماثلها .

٥٢٣٦ - تَعَار (F). Hémitrague de l'Arabie (F).

حيوان عاشب مجتر يدعى جهول الجزيرة العربية ، اطلبه .

٥٢٣٧ - تَعَاقِبُ الزُرُوع (F). Rotation des cultures (F). Rotation of crops (E).

هو المنهاج المتبع في تنامي الزروع قوامه الحفاظ على خصب التربة وعدم تعريضها لفقدان انسجام عناصرها الغذائية .

٥٢٣٨ - تَعَاقُدي (F). Contractuel (F). Stipulated (E).

ما هو مشروط في عقد .



تطعيم تاجي



تطعيم رقعي



تطعيم مزماري

٥٢٦٩ - تَعَفِين Mycogénie (F). Mycogeny (E).
التعفين انتاج العفن .

٥٢٧٠ - تَعْقِيل ، تَدْرِيع ، تَرْقِيد Marcottage (F). Layering (E).
احدى طرق تكثير النبات . قواها ليّ الفصن وتحجينه ودفنه بالتراب حتى تبرز له الجذور . فيفصل عن امه اذ يكون نبتة مستقلة .

٥٢٧١ - تَعْقِيم Stérilisation (F). Sterilization (E).
هو القضاء على جميع الخبائر الموجودة في المادة المقصودة .

٥٢٧٢ - تَعْكِيْس Inversion (F). Reversal (E).
راجع تحول .

٥٢٧٣ - تَعْلِيْس Expérimentation (F). Experimentation (E).
التعليس القيام بالامتحان والتجربة والاختبار .

٥٢٧٤ - تَعْلِيل Etiologie (F). Aetiology (E).
هو معرفة ودرس اسباب وعوامل المرض . والمرض قد يكون موضعياً فيصيب عضواً خاصاً في النبات كالجذر والساق والورقة ... وقد يكون عاماً فيصيب اجزاء النبات عامة .

٥٢٧٥ - تَعْلِيم زِرَاعِي Enseignement agricole (F). Agricultural teaching (E).

٥٢٧٦ - تَعْلِيم فَنِّي ، تَعْلِيم مِهَنِيّ Instruction professionnelle (F). Professional instruction (E).

٥٢٧٧ - تَعْمِيم Vulgarisation (F). Popularization (E).
التصميم نشر المعارف بالطرق البسيطة السهلة الادراك .

٥٢٧٨ - تَعْمَهُد ، صِيَانَةٌ Entretien (F). Maintenance (E).
الحفاظ على الشيء .

٥٢٧٩ - تَعْمَهُد Engagement
هو الالتزام اي استئجار النفس لاجل عمل معين .

٥٢٨٠ - تَعْوِيْض Indemnité (F). Indemnity (E).
هو ما يعطى المرء مقابل عمل قام به يستحق الجزاء .

٥٢٨١ - تَعْوِيْض عَنِ الضَّرَرِ Dédommagement (F). Indemnification (E).
هو ما يعطى المرء مقابل ضرر لحق به .

٥٢٨٢ - تَعْوِيْضَات ، تَضْمِيْنَات Dommages et intérêts (F). Damages (E).

٥٢٨٣ - تَعْوِيم Gerbage (F). Sheaf of wheats (E).
هو جمع غبوط الحصيد الى غامات وتكديسها .

٥٢٨٤ - تَعْوِيم الخشب Flottage du bois (F). Floating of wood (E).
هي احدى طرق نقل الاشخاب نهراً وذلك بتركها طافية على سطح الماء ودفنها الى المكان المقصود .

٥٢٥٤ - تَعَسُّقُل ، تَكْرِيْن Tubérisation (F). Tuberisation (E).

٥٢٥٥ - تَعْسِيْد Diagnose (F). Diagnosis (E).
تحلية النبات ووصف ميزاتة .

٥٢٥٦ - تَعْسِيْل Miallée (F). Honey-time (E).
التسيل او زمن التسيل هو الزمن الذي تكثر فيه الازهار المغثرية التي يجرسها النحل ويحولها الى عسل .

٥٢٥٧ - تَعْسِيْم Assèchement, Dessèchement (F). Drying up, Dryness (E).
هو تصريف المياه الزائدة عن التربة او اسالتها بشق الوسائل تجنباً لمواقها الوخيمة فيما لو زادت او استنقمت .

٥٢٥٨ - تَعْسِيْب Désherbage (F). Clearing (E).
هو اباداة الاعشاب .

٥٢٥٩ - تَعْسِيْكَ Scissiparité (F). Scissiparity, Schizogenesis (E).
التناسل بالانقسام الى شطرين .

٥٢٦٠ - تَعْسِيْكَ Lotissement (F). Allotment, Dividing into lots (E).
هي تقسيم عقار ما الى عدة اجزاء تسهلاً لبيعه . والتعسية تخضع لقوانين خاصة منها حد المساحة الادنى ووجوب قيام الطرقات المعبدة الخ ...

٥٢٦١ - تَعْطِيْل ، اِبْطَال Caducité (F). Caducity (E).
التعطيل او الابطال هو حالة عمل قانوني أصبح عقماً بسبب حدث جديد .

٥٢٦٢ - تَعْطِيْل Dénaturation (F). Denaturing. Medication of spirit (E).
راجع إفساد .

٥٢٦٣ - تَعْطِيْل Inactivation (F). Inactivation (E).
التعطيل ، طبياً ، اناء مفعول مادة دُعافية في الجسم .

٥٢٦٤ - تَعْطِيْن Rouissage (F). Steeping, Retting (E).
هو نقع سوق القنب والكتان وما اشبه لانحلال وزوال المواد الصمغية من اليافها .

٥٢٦٥ - تَعَفْنُ الجُلُود ، قَسَخ ، حَالُوط Pourridié (F). Rot (E).
وصم نباتي وخيم العاقبة اسبابه فطور مجهرية عديدة . اطلبها باسمائها .

٥٢٦٦ - تَعَفْنُ الظِّلْف Piétin (F). Foot-rot (E).
مرض معد يعرف بمرض الظلف يصيب اظلاف الضأن .

٥٢٦٧ - تَعْفِيْر Poudrage, Soufrage (F). Powdering, Sulphuring (E).

ذر احدى المساحيق الزراعية المستعملة لمكافحة او معالجة او وقاية النبات من الاوصام والحشرات .

٥٢٦٨ - تَعْفِيْص Tanisage
احدى طرق معالجة الخمر . ترتكز على اضافة بعض الحامض الثقيل الى الخمر لزيادة حموضتها وتسهيل حفظها .

٥٣٠٠ - تَفَرُّط (F). Defecation (E). دفع المواد البرازية أو السليمة.

٥٣٠١ - تَغْيِم (F). Nebulosity (E). هو السدوم والدجن راجعها .

٥٣٠٢ - تَفَّ

التف : دودة صغيرة تؤثر في الجلد (اللسان) .

٥٣٠٣ - تَفَّ (F). Poa (S). Paturin (F).

Meadow-grass, Spear-grass (E).

جنس نباتات عشبية من العكروشيات وفصيلة النجيليات أنواعه عديدة نحو ٢٠٠ معظمها معمر وبعضها حولي . عصفها مسطح النصل مستطيل . أزهارها سنبل . جميعها نباتات كلائية ترعاها الماشية ومنها زراعية يكثر استعمالها في المراعي وبعضها يخضوري يصلح كخضير في الحدائق . اعم وأشهر أنواعه ما يتبع .

٥٣٠٤ - تَفَّ البر ، قَلْتَب

Poa communis, P. trivialis (S). Paturin commun (F). نبات عشبي بري وزراعي معمر يعلو من ٣٠ إلى ٥٠ سم . يوجد في كل مكان . يكثر في الأتربة القليلة والمتوسطة الاندماج . ينذر في المراعي الاصطناعية لانه مرغوب من الماشية ويسمها . يصلح كخضير حدائق قابل الجز لكنه يخشى دوس الاقدام ولا يتحمل الجز أكثر من ٤ اعوام متتالية يضعف بعدها نشاطه .

٥٣٠٥ - تَفَّ الغاب

Poa nemoralis (S).

Paturin des bois (S).

نبات عشبي بري معمر يعلو نحو ٥٠ سم . يرغب في المواقع الظليلة . يوجد في الأتربة الرملية . يستعمل لتخضير الحدائق الوارفة الظل . لا يخشى الجز لكنه لا يتحملة أكثر من ٤ سنوات متتالية .

٥٣٠٦ - تَفَّ المروج ، كِلَانِيَّة (S). Poa pratensis (S).

Paturin des prés (F). Meadow-grass, Spear-grass (E). Rispengras (D). Fienarola, Poa del prati (I).

نبات عشبي بري وزراعي معمر . يعلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم . يكثر في المراعي المتوسطة الرطوبة ، يوجد في جميع الأتربة المعتدلة والقليلة الاندماج . ينذر في المراعي الاصطناعية لانه مرغوب من الماشية وقد تسمن عليه . يصلح كخضير حدائق قابل الجز لكنه يخشى دوس الاقدام التي تعطب عصفه وبنياته .

٥٣٠٧ - تَفَّ المناقع

Poa palustris (S).

Paturin des marécages (F).

نبات عشبي بري معمر يعلو من ٤٠ إلى ٨٠ سم . يعيش في جميع الاماكن الرطبة مها كانت تربتها وأخصبها المناقع ومجاري الماء .

٥٣٠٨ - تَفَّ حَبَشِي

Poa Abyssinica (S). Paturin d'Abyssinie, Teff d'Abyssinie (F). Teff of Abyssinia (E). Abessinische korn (D). Fienarola d'Abissinia (I).

نبات عشبي بري معمر يكثر في المروج الطبيعية المعتدلة الرطوبة وفي ظل الاشجار الحرجية . ترعاها الماشية بشهية . ومن قائل انه لا يخلو من بعض الخواص الطبية .

٥٢٨٥ - تَغْيِب (F). Dénaturation (F).

Denaturing (E).

راجع إفساد .

٥٢٨٦ - تَغْيِير ، كَيْل (F). Jaugeage (F).

Gauging (E).

هو تحديد مقدار الاستيعاب الفعلي العائد الى وعاء معين ما .

٥٢٨٧ - تَغْيِير الماء ، كَيْل الماء

Jaugeage de l'eau (F). Water-gauging (E).

هو تحديد كمية صبيب المياه الجارية في الثانية او في اليوم .

٥٢٨٨ - تَغْيِين (F). Désignation, Détermination (F).

Designation, Determination (E).

هو تبيان مظهر العين الثابتة وتعریف اخص صفاتها . وهو أيضاً اسناد عمل الى امرى بعينه .

٥٢٨٩ - تَغْيِين محل الوفاء

Domiciliation pour paiement (F). Domiciliation (E).

هو في القانون التجاري تعيين محل وفاء الدين .

٥٢٩٠ - تَغَب (F). Défait (F). Default (E).

التغيب : العيب والنقص . يقال فرس ما فيه تغبة اي ما فيه عيب . وثمار خالية من كل تغبة اي من كل عيب .

٥٢٩١ - تَغْبِيْط (F). Javelage (F). Laying in swathes (E).

هو جمع قبضات الزرع المحصول الى غبوط .

٥٢٩٢ - تَغْذِيَّة (F). Alimentation

هي مد الحيوان والنبات بالغذاء اللازم .

٥٢٩٣ - تَغْذِيَّة صَوَابِيَّة ، تَغْذِيَّة مُقَنَّنَة

Alimentation rationnelle (F). Rational nourishment (E).

هي التغذية المرتكزة على العلم وعلى معرفة خواص كل مادة مع مقدورها وعدد وحداتها الغذائية .

٥٢٩٤ - تَغْرِسَة (F). Transplantation

نقل الفراس من مكان الى آخر او من الكود الى المكن .

٥٢٩٥ - تَغْرِيد ، زَقْرَقَة ، صُدَّاح (F). Ramage (F).

ارتفاع صوت الطائر والتطريب به .

٥٢٩٦ - تَغْس (F). Stratus léger (F). Light stratus (E).

التغس : لطف سحاب رقيق في السماء (ابن دريد) .

٥٢٩٧ - تَغْصِين ، تَشْكِيل

Taille de formation (F).

هو التشكيل الخاص الذي يعطي هيكل الشجرة الشكل المقصود .

٥٢٩٨ - تَغْطِيس ، تَغْمِيس ، إِنْغِمَاس

Immersion (F).

Immersion, Dipping (E).

قس الشيء في الماء او في اي سائل آخر .

٥٢٩٩ - تَغْلِيف (F). Enrobage (F).

Coating. Wrapping (E).

احدى الوسائل الصناعية المستعملة لحفظ بعض المحاصيل الزراعية والحيوانية من عبث الهواء وما ينتج عنه . كلف الثمار بالورق الخاص وتغطيس البيض في ماء الكلس الخ ...



تف المروج



تف المناقع



تف حبشي



تفاح



تفاح الورد



تفاح بارون برلبش



تفاح جشان



تفاح دليش، ستاركن



تفاح رد استراكان



تفاح رد جون

والاندماج . يحسن تعليمها بالايست مولين رقم ٢ . اوراقها حساسة تحشى السوائل الكبريتية والسلفوكلسية || خصبها طوعي . حملها حولي متتابع . ثمارها صغيرة ومتوسطة القد ، جيدة الصنف ، لذيدة الطعم والنكهة .

٥٣١٨ - تفاح جشنان* Jonathan

ويعرف ايضاً باسم جنارد وبلانك جون . ضرب من التفاح امريكي المهد . وهو شجرة متوسطة الحجم والنشط ، فارشة الاغصان المتدلية الاطراف . تجود في جميع الاودية الخوارة القليلة والمتوسطة الاندماج || خصبها طوعي ، طلعها وافر الجدرات النشيطة الغذاء التي تساهم في اخصاب غيرها . حملها حولي متتابع . ثمارها صغيرة القد مستطيلة الاذن . بشرتها ملساء ، لونها احمر قائم يعلوه توشيح عقيقي . لبها صلب المكسر ، اصفر اللون ، ناعم الرقعة ، مستحب المذاق العطري .

٥٣١٩ - تفاح خوخى الورق Malus prunifolia (S). Pommier à feuilles de Prunier (F).

نوع من التفاح البري والتزييني . شجرته تعلو من ٦ الى ١٠ امتار . اوراقه ضيقة النصل . خوخية الشكل ، باهتة الخضار ، زياء الصفحة السفلى . ازهاره الى البياض المشرب الصفار . ثماره صغيرة حامضة صفراء اللون . ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

٥٣٢٠ - تفاح دليشيس* ، ستاركن Delicious (starking)

ضرب امريكي المهد يشمل بعض الفجوة اخصبا رد دليشيس ، وستاركن دويل رد ، وستاركن ريتش رد ، وشتويل دليشيس . فوارقها لون الثمار ومواج الاوراق || شجرته كبيرة القد ، قوية النشط ، باسقة ، تتحمل البرد القارس . تنمو وتجود في جميع الاودية الرغاب القليلة والمتوسطة الاندماج لكنها قليلة المناعة ضد التبقع والعناكب احمر . خصبها غوثي ، حملها متناوب . ثمارها متوسطة وكبيرة القد ، مخروطية الشكل ، مضلعة الحوض العميق . انها طويلة قوية ، قشورها سمكة ، بشرتها ملساء لونها الى الاحمر يعلوه توشيح جزوي بنفسجي المواج . لبها صلب المكسر ، ابيض اللون ، ناعم الرقعة ، غض العصير ، لذيد الطعم ، عطري العرف .

٥٣٢١ - تفاح رد استراكان* Red Astrakhan

ضرب من التفاح الشرقي مهده مرتفعات بحر قزوين . شجرته كبيرة القد فرعاء تجود في المناطق المنحرفة نحو البرد وفي معظم الاودية المتوسطة الاندماج || خصبها لا قياسي ، حملها حولي متتابع . ثمارها مبكارة متوسطة الحجم . انها دقيقة منعقة . بشرتها ملساء فسقية الاساس حراء المشحة يعلوها خل شمعي اطحل اللون . لبها جامد المكسر ، ناعم الرقعة ، عطري العرف ، غض العصارة مشبع الحموضة .

٥٣٢٢ - تفاح رد جون* Red June

ومنه كرولينه رد جون . ضرب امريكي المهد شجرته قوية منبسطة الاغصان تجود في المناطق التهامية المعتدلة الارتفاع . خصبها غوثي . حملها متناوب . ثمارها مبكارة ، متتابعة الادراك ، صغيرة القد . انها دقيقة طويلة . بشرتها لامعة ملساء ، لونها اصفر الاساس جزوي المشحة . لبها جامد المكسر ، ناعم الرقعة ، ابيض اللون ، غض العصارة ، مشبع الحموضة المستحبة .

٥٣٠٩ - تفاح حولي Poa annua (S).

Pâturin annuel (F).

نبات عشبي بري حولي صغير القد يعلو من ١٠ الى ٢٠ سم . يكثر في الاراضي الجبلية المروية .

٥٣١٠ - تفاح ضمتي ، عنزيعة Poa compressa (S). Pâturin comprimé (F).

نبات عشبي بري معمر يعلو من ١٥ الى ٣٠ سم . يكثر في الاودية الكلسية وهو من نباتاتها الطوعية . ساقه ضمية الفروع ضيقة العصف النحيل . ترعاه الماشية قبل ادراك زهره واخشياش قروعه .

٥٣١١ - تفاح* ، سييب Malus (S). Pommier (F). Apple-tree (E). Apfel (D). Melo (I).

جنس اشجار وجنبات مشمرة من سبط التفاحيات . انواعه المعروفة نحو ٥٠ منها نوعان مأكولان الثمار ضروريها تربو على الثلاثة آلاف . اما الانواع الاخرى فبرية وبعضها يزرع للتزيين || ساقه قصيرة . اغصانه منفرجة . اوراقه معتقة متعاقبة . نصلها بيضي الشكل لسن الزام الاخير المذهب ، وهو ناشز العروق والشرابين ، مسن الحافة ، امرد البشرة او خملها . ازهاره نوري التجميع . ازهاره صغيرة القد ، مستديرة البتلات الوردية او البياض اللون . مآبرها صفر . اقلامها مندغمة القاعدة ثلاثية او خماسية التجميع . ثماره مستديرة الشكل جامدة اللباب || اعرف انواعه وضروبه الزراعية ما يتبع .

٥٣١٢ - تفاح الارض Matricaire camomille (F). Wild chamomile (E).

هو البابونج ، اطلبه .

٥٣١٣ - تفاح العجائب Pomme de merveille (F). Balsam apple (E).

هو المنض البلسمي ، اطلبه .

٥٣١٤ - تفاح الفيل Féronie (F). Elephant apple tree (E).

هو الفيرونية ، اطلبها .

٥٣١٥ - تفاح الورد* ، جشبوذة ، خوخ ملابار Eugenia jambos, Jambosa vulgaris (S). Jambosier, Jambose, Jambolin, Jambosier, Pomme rose, Eugénier jambos, Prunier de Malabar (F). Rose apple, Malabar plum, Jambosa (E). Jambosenbaum, Jambos (D). Pomo rosa, Eugenia, Melo rosa, Prugna di Malabar (I).

شجرة صغيرة مشمرة من فصيلة الآسيات . منبتها الاصلي بلاد الهند ومنها انتقلت الى جميع الاصقاع الحارة . اوراقها عروية معتقة ، متعاقبة ، اهليلجية النصل . ازهارها جميلة الشكل ، كبيرة القد ، طرفية الارتكاز . ثمارها نوية ، حراء اللون ، وردية العرف ، حجمها حجم التفاحة وهي مأكولة مستحبة الطعم . يستحضر من عصيرها مرطب صحي جزيل النفع .

٥٣١٦ - تفاح ابار Pomme de Mai (F).

نبات جذموري معمر يدعى بدفيل درقي ، اطلبه .

٥٣١٧ - تفاح بآرون برلبش* Baron de Berlepsch

ضرب من التفاح سويسراني المهد . شجرته متوسطة الحجم والنشط تجود في جميع المواقع والارضية المعتدلة التركيب

اللون. ثماره صغيرة حامضة، لونها الى الصفار الصنابي. ازهاره يستمر من نيسان الى ايار.

Malus theifera (S).

٥٣٢٩ - تفاح صيني

Pommier-thé (F).

نوع من التفاح الصيني المنبت. بري وتزييني. شجرته تعلو من ٥ الى ٨ أمتار. أوراقه مسننة الحافة، ضلعها احمر اللون وزنادها كذلك. ازهاره بيض البتلات، حمر النصل، عطرية العرف. ثماره صغيرة القد، صناعية اللون || ازهاره ربيعي.

٥٣٣٠ - تفاح ضيق الورق. Malus angustifolia (S).

Pommier à feuilles étroites (F).

نوع من التفاح الامريكى المنبت. بري وتزييني. شجرته تعلو من ٤ الى ٥ أمتار. أوراقه عابقة الخضار ضيقة النصل طولها من ٣ الى ٥ سم. وعرضها من ٨ الى ١٥ مم. ازهاره وردية اللون، قصيرة البتلات، عرقية الرائحة. ازهاره يستمر من اذار الى ايار.

٥٣٣١ - تفاح عطر، تفاح كوروناريه

Malus coronaria (S). Pommier odorant (F).

نوع من التفاح الامريكى المنبت. بري وتزييني. شجرته تعلو من اربعة الى خمسة أمتار. أوراقه البالغة قليلة الشكل ملطاة النصل. ازهاره وردية اللون بتفجسية العرف. ثماره صغيرة القد حامزة الطعم، فواحة العرف، لونها الى الخضار الفستقي || ازهاره ربيعي يستمر نحو ٧ اسابيع.

٥٣٣٢ - تفاح فلورنتيه. Malus florentina (S).

Pommier florentin (F).

نوع من التفاح الايطالي المنبت. بري وتزييني. شجرته تعلو من ٣ الى ٤ أمتار. افنادها وافنادها حنطية اللون. أوراقها زباء الصفحة السفلى. ازهارها تاجي الارتكاز. ازهارها بيض. ثمارها حمر اللون عند الادراك. طول الثمرة نحو ١٢ مم. وعرضها ١٠ مم. || ازهارها ربيعي.

٥٣٣٣ - تفاح كثير الزهر، تفاح منور

Malus floribonda (S). Pommier floribond (F).

نوع من التفاح الياباني المنبت. بري وتزييني. شجرته تعلو من ٣ الى ٤ أمتار. فروعها نحيلة متدلية. أوراقها بيضية طولها نحو ٥ سم. وعرضها ٣، نصلها امرد البشرة عل صفحتيه. ازهارها كاسية وردية اللون تكثر فيها المكسبة. ثمارها اهليلجية طولها من ٦ الى ١٢ مم. لونها الى الصفار الحنطي.

٥٣٣٤ - تفاح كرافنشتين * Gravenstein

ومن كرافنشتين تريبل رد ورد كرافنشتين. غرب الماني المهد شجرته كبيرة باسقة قوية متفرجة الاغصان تجود في المواقع المتوسطة الارتفاع التي تعلو من ٧٠٠ الى ١٢٠٠ م. عن سطح البحر. ترغب في الاتربة الخصبة المتوسطة الاندماج. تحشى المعارض الطليقة لأنها لا تتحمل الرياح القوية || خصبها غوثي عسير. حملها حولي متتابع. ثمارها مبكارة متوسطة وكبيرة الحجم. انها قصيرة وغلظية. بشرتها خشنة الملمس برتقالية الاساس حمراء المشعة. لبها صلب المكسر، ثني اللون، ناعم الرقعة، جيد النكهة، لذيد الطعم، عطري العرف، قليل الحموضة.

٥٣٣٥ - تفاح كرزى * Malus-baccata (S).

Pommier à bales, P. baccifère (F).

نوع من التفاح البري والزراعي المأكول الثمار. شجرته تعلو

٥٣٢٣ - تفاح رينت كندا * Reinette du Canada

ضرب فرنسي المهد شجرته متوسطة الحجم، نشيطة، فارشة الاغصان، سريعة الانتاج. ترغب في المواقع المرتفعة القليلة الرطوبة. تجود في الاتربة الخصبة المتوسطة الاندماج. خصبها لا قياسي. حملها حولي متتابع. ثمارها كبيرة القد، مستديرة، مفلطحة. انها قصيرة غليظة. قشرتها سمكية، بشرتها خشنة، لونها الى الاخضر الفستقي. لبها صلب المكسر، ابيض اللون، غزير العصارة، لذيد الطعم، عطري العرف.

Malus zumi (S).

٥٣٢٤ - تفاح زومى

Pommier zumi (F).

نوع من التفاح الياباني المنبت. بري وتزييني. شجرته تعلو من ٦ الى ١٠ أمتار. أوراقها طويلة الزناد، نصلها مائل البشرة. ازهارها رحية البتلات لونها الى الوردي. ثمارها نووية حقيقتية قطرها نحو ٢ سم. || ازهارها ربيعي يستمر شهراً واحداً.

Malus sargentii (S).

٥٣٢٥ - تفاح سترجنسي

Pommier de Sargent (F).

نوع من التفاح الياباني المنبت. بري وتزييني. شجرته صغيرة تعلو من المترين الى الاربعة. افنادها وافنادها حمر اللحاء أوراقها شديدة الخضار. نصلها ازغب الصفحة السفلى. ازهارها بيض. ثمارها صغيرة قطرها نحو ١٠ مم. لونها الى الحمرة يعلوها موج مخلي.

٥٣٢٦ - تفاح سينبولدي Malus sieboldi (S).

Pommier de Siebold (F).

نوع من التفاح الياباني المنبت. بري وتزييني. شجرته شائكة تعلو من المترين الى الثلاثة. أوراقها معتقة اهليلجية، نصلها ازغب الصفحة السفلى. ازهارها حمر من الخارج بيض من الداخل. ثمارها صغيرة القد، قطرها يراوح من ٥ الى ٧ مم. لونها الى الصفار الحنطي.

٥٣٢٧ - تفاح شائع * Malus communis (S).

Pommier, Egrasseau (F). Apple tree (E). Apfelbaum (D). Pomo, Melo (I).

نوع من التفاح الزراعي الشائع الاستعمال. ضروبه المتداولة تربو على ثلاثة آلاف جميعها مأكولة الثمار. اشجارها متباينة الحجم والهيكل منها البجلة والجنية والشجيرة والشجرة. ثمارها متفاوتة القد والشكل واللون والطعم والعرف || اشهر ضروبه الرئيسية التي ارتكزت عليها واثبتت منها الضروب والمهاج الحالية هي :

Malus paradisilaca

تفاح الجنة

Malus acerba

تفاح حامز

Malus sylvestris

تفاح حرجي

Malus mitis

تفاح حلو

Malus aurea

تفاح ذهبي

Malus apetala

تفاح عادم البتلات

Malus pumila

تفاح قزم

اما ضروبه الزراعية المأكولة الثمار، المشهورة، فراجعها في مواقعها.

٥٣٢٨ - تفاح شرقي * Malus spectabilis (S).

Pommier à bouquets (F).

نوع من التفاح الشرقي المنبت. بري وتزييني. ضروبه عديدة. اشجاره تعلو من ٦ الى ٨ أمتار. أوراقه جلدية النصل زاهية الصفحة العليا، زباء السفلى. ازهاره وردية




تفاح رينت كندا



تفاح شائع



تفاح شرقي



تفاح كرافنشتين



تفاح كرزى

٥٣٤٢ - تفاح ووتر بنانا * Winter banana

ضرب هولندي الاصل . شجرته متوسطة النشط فارشة . تجود في معظم الاثربة والمواقع . تخشى البرد والتربة الكثوم . خصبها طوي لا قياسي . حبلها حولي متتابع . ثمارها جيدة الصنف ، كبيرة القد ، مخروطية الشكل . انها ربة ، قشورها سميكة . بشرتها ملساء ، لونها الى الاصفر الفاقع تفشاء مشحة حراء باتجاه معرض الشمس . لبها صلب المكسر الخشن الرقة ، اصفر اللون ، لذيق الطعم ، قليل الحموضة ، مسكي العرف .



تفاح كلدن ديلش

٥٣٤٣ - تفاح يلو بلفلور * Yellow belleflower

ضرب امريكي المهد شجرته كبيرة الحجم باسقة نشيطة فارشة . تجود في المواقع المتوسطة الارتفاع . رغب في المعارض الجنوبية والاثربة الخصب . الرغب المتوسطة الاندماج . خصبها غوثي عسير . حبلها متتابع . ثمارها جيدة الصنف متوسطة وكبيرة الحجم ، مخروطية الشكل ، انها دقيقة مستطيلة ، بشرتها ناعمة ، لونها الى الصفار الليموني تعلو حمرة خفيفة من جهة معرض الشمس . لبها جامد المكسر ، قبي اللون ، غزير العصارة العطرية .



تفاح كوكس أوردنج بين

٥٣٤٤ - تفاحة * Pomme (F). Apple (E).

ثمرة التفاح . تأتي التفاحة في تصنيف الثمار وبالنظر الى نكهتها وأقبال الناس عليها بالمرتبة الثانية ، بعد الدراق وقبل الاجاص . || يختلف لون التفاحة وشكلها وحجمها وطعمها ومكسر لبها ومقدار عصيرها باختلاف ضربها وموقع زراعتها وحالة بيئتها التربة ومقدار ما استهلك من مساء ، الخ... ومع ذلك ورغم التفاوت الاكيد نقول اولاً ان التفاحة تقسم الى ثلاثة اجزاء :

جزء القشور وقد يبلغ نحو ٥ %

وجزاء اللباب ومقداره نحو ٩٤ %

وجزاء البزور وقدره نحو ١ %

ثم نقول بناء على تحاليل « كونيغ وبالن » ان متوسط ما يحواه لباب التفاحة المأكولة من مواد هو :

مواد دهنية ٠,٥٨ %

مواد ازوتية ١,٤٤ %

مواد سكرية ١٤,٦٠ %

مواد استخلاصية ١٦,٥٠ %

سليولوز ١,٣٠ %

رماد ٠,٣٠ %

حريرات ٦٨٠ %

ويحوي اللباب ايضاً بعض الكميات الضئيلة من مختلف الحوامض العضوية التالية : التفاحي والحلي والكبري والنملي . اما العناصر المعدنية التي يحويها فهي

كبريت ٨ %

فسفور ١٠ %

كلور ٣ %

بوتاس ١٢٠ %

صوديوم ٢ %

منيزا ٥ %

كلسيوم ٤,٥٠٠ %

حديد ٠,٣٠٠ %

نحاس ٠,١٢٠ %

زنك ٠,١٠٠ %

منغنيزا ٠,٥٠٤٥ %

يود ٠,٠٠٢ %

اما الفيتامينات فتقدر على الوجه التالي :

فيتامين ا ١٠٠ وحدة دولية

فيتامين ب ١ ٣٠

فيتامين ب ٢ ٣٠

فيتامين ث من ٢ الى ٣٨ %

من ٣ الى ٥ امتار . اوراقه عابقة الخضار مسنة الخافة . ازهاره وردية اللون . ثماره صغيرة قطرها نحو ٥ سم . لونها الى الصفار المشرب الحمرة . لبها حامض الطعم .

٥٣٣٦ - تفاح كلدن ديلشيس * Golden delicious

ضرب امريكي المهد . شجرته معتدلة النشط والحجم ، سريعة الانتاج تنمو وتجود في معظم الاثربة . رغب في المواقع المتوسطة الارتفاع التي تعلو من ٨٠٠ الى ١٢٠٠ م . عن سطح البحر . اوراقها وثمارها تتأثر بالاملاح النحاسية . خصبها طوي . طلعها واقر الجدرات النشيطة . حبلها حولي متتابع . ثمارها متوسطة وكبيرة القد . انها طويلة . قشورها رقيقة ، بشرتها ملساء ، لونها اصفر ذهبي . لبها جامد المكسر ، قبي اللون ، ناعم الرقة ، لذيق الطعم ، جيد النكهة ، فواح العرف العطري .

٥٣٣٧ - تفاح كوكس أوردنج بين * Cox's orange pippin

ضرب بريطاني المهد شجرته معتدلة الحجم متوسطة النشط ، دقيقة الاغصان الكثيفة . رغب في الاثربة الطينية المتوسطة الاندماج . اوراقها تتأثر بالسوائل النحاسية || خصبها طوي . حبلها حولي متتابع . ثمارها متوسطة القد ، انها قصيرة وغلظة . بشرتها ملساء ، لونها اصفر الاساس احمر الوشاح تعلو خطوط جووية حنطية الموج . لبها جامد المكسر ، زبدى اللون ، خشن الرقة ، غصص العصير الحامض العطري العرف .

٥٣٣٨ - تفاح ماهي * Cédricier (F).

راجع أريج .

٥٣٣٩ - تفاح مكنتوش * Mc Intosh

ضرب كندي المنبت شجرته متوسطة القد مستديرة منبسة الاغصان الفرعاء . تجود في جميع الاثربة . رغب في المواقع الريفية التي تعلو نحو ١٥٠٠ م . عن سطح البحر . خصبها غوثي ، حبلها متتابع حولي . ثمارها فاخرة الصنف متوسطة وكبيرة الحجم . انها قصيرة وغلظة . بشرتها ملساء سهلة الانسلاخ . لونها الى الاحمر تعلو مشحة بنفسجية ينشأها خل شمعي متراكب الموج . لبها جامد المكسر ناعم الرقة غزير العصارة ، عطري العرف ، لذيق الطعم ، جيد النكهة ، قليل الحموضة .

٥٣٤٠ - تفاح نرلين سبي * Northern spy

ضرب امريكي المهد شجرته كبيرة القد متوسطة النشط فارشة الاغصان متدلية الانداد والافنان . رغب في المواقع الجردية الريفية تجود في الاثربة المعتدلة التركيب المتوسطة الاندماج . خصبها غوثي عسير . حبلها حولي متتابع . ثمارها كبيرة القد . انها ربة قوية . قشورها رقيقة . بشرتها ملساء ، لونها الى الاصفر تعلو مشحة حراء متفاوتة الخصب . لبها جامد المكسر ، اصفر اللون ، ناعم الرقة ، شديد الحلاوة ، قليل الحموضة ، عطري العرف .

٥٣٤١ - تفاح هاليانا * Malus Halliana (S).

Pommier de Hall (F).

نوع من التفاح الصيني المنبت . بري وتزييني . جنثته تعلو من مترين الى اربعة . اوراقها زياء الضلع . ازهارها وردية مستطيلة البتلات || ازهارها يسمر من ايار الى حزيران .



تفاح مكنتوش



تفاح نرلين سبي



تفاح ووتر بنانا



تفاح يلو بلفلور

- 5356 - **تفتت** Désagrégation (F).
Crumbling (E).
تفتت الاجزاء التي من جمعها وتدمجها يتركب جسم .
- 5357 - **تفتح** Deniscence (Bot.) (F).
Dehiscence (E).
طريقة الانفلاق الطبيعي في بعض الاعضاء النباتية كالمكبر والسنف والكبير .
- 5358 - **تفتيت** Affouillement (F).
Undermining, Washing away (E).
هو الانحثاث .
- 5359 - **تفتيت المد** Emottage (F).
Clod-crushing (E).
عملية زراعية القصد منها تكسير التلج لتنعيم التربة . تم باستعمال الحدي الادوات الزراعية الموضوعة لهذه الغاية كالمسلفة والطباب .
- 5360 - **تفحيم** Carbonisation (F).
Carbonization (E).
التحويل الى فحم كتحويل العظام والخطب .
- 5361 - **تفجير** Effritement (F).
Crumbling into dust (E).
الاحتاث وتكسير الحجارة القائمة وقد يكون السبب اما نوع الحجر او عوامل خارجية .
- 5362 - **تفدين** Nivellement (F). Levelling (E).
التفدين هو قياس الارتفاع اي تعيين الارتفاع النسبي لختلف اجزاء الارض ومواقعها .
- 5363 - **تفير**
التفير : النبات القصير الزمر (اللسان) . والتفيرة : كل نبات له ورق ولا تتمكن منه الزراعة الصغرى (التاج) . يقال ارض متفيرة : فيها كلاء صغير لا تمكن منه الزراعة .
- 5364 - **تفريات** Feuilles mortes (F).
Dead-leaves (E).
التفريات : ما تساقط من اوراق الشجر (ابن منظور) .
- 5365 - **تفريجة ، قوت** Espace entre 2 doigts
ج . تفريج وافوات .
- 5366 - **تفريز** Téphrosie (F). Surinam poison (E).
جنس نباتات قرنية تعرف بالخوراء ، اطلها .
- 5367 - **تفريع ، تشعب** Ramification
الانتشاب المتأني عن مصدر واحد .
- 5368 - **تفروق** Cupule
هو قع الثمرة .
- 5369 - **تفريت** Tephritis (S). Téphrite (F).
جنس حشرات ذبابة الشكل من فصيلة الخرشيات . طولها من ٤ الى ٦ مم . ألوانها متعددة اجنحتها شفافة مخززة ومخططة . تمتع مكها على سوق نباتات الفصيلة الصبوانية اخصها القنطريون والبابونج فيقتنف عن يرقات صغيرة تفرض السوق وتلتهم الحراشف الزهرية . اشهر انواعه .
- 5370 - **تفريت البابونج** *
Tephritis matricariae (S). Téphrite de la matricaire, Mouche de la matricaire (F).
نوع من التفريت طولها من ٢ الى ٤ مم . جهتها برتقالية


- 5345 - **تفاحي** Mélonide, Pommé (F).
Grown to a round head (E).
نمت وصني لشكل من اشكال الثمار يشبه التفاح .
- 5346 - **تفاحيات** Pomacées (F). Pomaceae (E).
سبط من الفصيلة الوردية يشمل جميع اجناس وانواع التفاح البري والزراعي .
- 5347 - **تفاضل** Différentiation (F).
Différenciation (E).
عملية توامها الوصول الى الدالة المولدة او المشتقة .
- 5348 - **تفاعل** Réaction (F). Reaction (E).
التحاويل التي تتعرض لها الاجسام عند امتزاجها .
- 5349 - **تفاعل ايوني ، تفاعل شاردي** Réaction ionique (F). Ionic reaction (E).
التفاعل الايوني او الشاردي عبارة رقية تدل على نسبة حامضية او حرضية الوسط او البيئة المطلوب معرفة تفاعلها . رمزه الدالف (pH) .
- 5350 - **تفاف** Sonchus (S). Laiteron (F).
جنس نباتات برية من فصيلة المركبات السببية الزهر . انواعه نحو ٣٠ معظمها عشبي وبعضها شجيري يعلو من ١ الى ٤ اربعة امتار . سوقها غليظة لبنية العصارة . اوراقها متعاقبة مركبة مفروضة الحافة الشائكة . ازهارها رؤسية يكثر فيها اللون الاصفر ثم الازرق والليلكي . اشهر انواعه التفاف المعروف وتفاف الحقل وتفاف المناقع .
- 5351 - **تفاف الحقل ، تفاف** Sonchus arvensis (S).
Laiteron des champs, Laceron (F).
عشبة من التفاف نجيلة الساق والفروع القليلة العدد . تكثر بين الزروع وفي الاراضي البور . تعلو نحو المتر . اوراقها صغيرة قليلة الشوك . ازهارها الى الزرقة .
- 5352 - **تفاف المناقع ، جعظيض** Sonchus palustris (S). Laiteron des marais (F).
جنية مستطيلة الساق ، قليلة الفروع ، تعلو من متر الى اربعة امتار . تكثر في الاراضي الرطبة وقرب مجاري الماء وعلى ضفاف الانهر .
- 5353 - **تفاف معروف ، بقلة يهودية ، سبزيك** Sonchus oleraceus, S. ciliatus (S). Laiteron commun, L. potager, Laitue des lièvres, Chardon blanc, C. de porc (F). Sow thistle, Milk thistle, Hare's lettuce (E). Gemeine saudistel (D). Cicerbita comune, Cres-pina, Lattuga, Sevone (I).
نوع من التفاف يوجد في جميع اترية المناطق المعتدلة . وهو عشبة برية ، جوفاء الساق ، غزيرة العصارة اللبنة . اوراقها يأكلها البشر والحيوان .
- 5354 - **تفالس ، افلاس تدليسي** Banqueroute frauduleuse (F). Fraudulent bankruptcy (E).
جريمة يقتربها التاجر الذي يخفي دفاتر حساباته او يدمها او يهرب موجودات متجره او يبتدع ديونا ليست عليه او يزور في حساب متجره الختامي .
- 5355 - **تفة** Lynx caracal (F).
Caracal, Red lynx (E).
هو عناق الارض اي وشق القفر .



تفاف الحقل



تفاف المناقع



تفاف معروف



تفريت البابونج



تفريث الحنّس



تفريث القنطريون



تفريث الإيجاص



تفريث الحور



تفريث الدراق واللوز



تفريث السنديان

ويؤخر نمو الشجرة . مظهره الخارجي يقع مستديرة لاقياسية تعترى صفحة النصل العليا . تبتدي خضراء اللون ثم ذهبية وتنتهي بالوردي الزاهي .

٥٣٨٤ - تفريث الخوخ ، مجعثة الخوخ ، جيوب الخوخ ، قرون الخوخ

Taphrina pruni, *Exoascus pruni* (S). *Maladie des pochettes du prunier* (F). *Plum pockets* (E). *Narrenoder*, *Taschenkrankheit der Pflaumen* (D).

وصم يصيب مدقات أزهار الخوخ عند تأبيرها فيحول دون تكوينها الخليلوي الصحيح ونموها الطبيعي ويوجهها نحو الاستطالة فتتفقد الشجرة استدارة شكلها وعصارة لحيتها ونواتها وتصبح كالقرن الصغير طولها من ٤ إلى ٦ سم . ومكها من ١ إلى ٢ سم . لحيتها جامدة جافة ، داخلها فارغ لا نواة فيها . يكافح وقائياً باستعمال أحد الادوية الفاطورية قبل الازهار وبعد التفطيط وسقوط البتلات (التويجات الزهرية) .

٥٣٨٥ - تفريث الدراق واللوز ، مجعثة الدراق واللوز

Taphrina deformans, *Exoascus deformans* (S). *Cloque du pêcher et de l'amandier* (F). *Peach leaf curl* (E). *Kräuselkrankheit der Pfirsiche* (D).

وصم يصيب أوراق وافنان وثمار الدراق واللوز وهو اشد وقعا على الدراق ، يركب الأوراق الفتية فيجمعها ويجمدها ويمتها عن القيام بوظيفتها . يضفي على الافنان فيحول دون نموها بعد ان يعطب قشورها . ويعترى الثمار فيؤذيها ويعيبها || يظهر عادة في اوائل الربيع وقد يستمر حتى الصيف || يكافح باستعمال أحد الادوية الفاطورية المرتكزة على النحاس أو الكبريت .

٥٣٨٦ - تفريث الدردار ، مجعثة الدردار

Taphrina ulmi, *Exoascus Ulmi*, *E. campester* (S). *Cloque des feuilles d'Orme* (F).

وصم يصيب أوراق الدردار فيسبب يباسها . مظهره الخارجي يقع مستديرة خضراء اللون ثم طحلاء فسمراء تركب النصل فتجمعه وتعيته .

٥٣٨٧ - تفريث السنديان ، مجعثة السنديان

Taphrina coerulescens, *Exoascus coerulescens*, *T. quercus*, *T. quercina* (S). *Cloque foliaire du chêne* (F).

وصم يصيب أوراق السنديان في أواخر الربيع فيعطها ويؤذي الشجرة || مظهره الخارجي يقع مستديرة تبدو زاهية الخضراء ثم تميل نحو الصهبة فالسمة . تركب الأوراق في زامها الأخير وعلى صفحتها بالسواء .

٥٣٨٨ - تفريث الشرم ، عكد الشرم

Taphrina carpini, *Exoascus carpini* (S). *Baie de sorcière du charme* (F).

وصم يصيب جذوع واغصان وافناد الشرم فيخلط عليها تجمعات عديدة من الافنان الدقيقة التي تقضي على اتران الشجرة ويسر نموها الطبيعي . مظهره الخارجي ابلات كثيفة الافنان الدقيقة المستطيلة التي يبلغ قطر كل منها المتر تملأ الشجرة من جذعها الى اقنادها . اما الأوراق المصابة فتبدو صغيرة وقصيرة ، مجمدة النصل ، رصاصية اللون يعلوها موج آخر .

٥٣٨٩ - تفريث الكاكاو ، عكد الكاكاو

Taphrina bussei (S). *Cloque du cacaoyer* (F).

وصم يصيب الافناد عند انتشارها على الاغصان فيحتمل

اللون . ارجلها الى الصهبة الخطية . تسرح من اذار الى ايلول . يرقاتها تعيش على الحراشف الزهرية .

٥٣٧١ - تفريث الحنّس ، تفريث مستحب

Trypanea amoenæ (S). *Téphrite des laitues*, *T. agréable* (F).

حشرة من التفريث طولها من ٤ الى ٥ مم . جسمها اغس اللون . ارجلها صفراء . مرزها اسود . تسرح من حزيران الى ايلول . يرقاتها تعيش على حراشف الحنّس الزهرية .

٥٣٧٢ - تفريث القنطريون ،

Orellia jaceae (S). *Téphrite de la centaurée* (F).

حشرة من التفريث طولها من ٤ الى ٦ مم . رأسها وارجلها صفراء . تسرح من تموز الى ايلول . يرقاتها تعيش على حراشف القنطريون الزهرية .

٥٣٧٣ - تفريث ،

Eclaircissage (F). *Clearing up* (E). راجع تخفيف .

٥٣٧٤ - تفريث ،

Eclosion (F). *Opening* (E). راجع نقف وتفتيس .

٥٣٧٥ - تفريث ،

Essaimage (F). *Swarming* (E). راجع افراق النحل .

٥٣٧٦ - تفريث ، هو التفتيق ، اطلبه .

٥٣٧٧ - تفريث ،

Déchargement (F). *Unloading, Unlading* (E).

٥٣٧٨ - تفريث كهربائي ،

Effluve électrique (F). *Electric effluvia* (E). اندفاع الشحنة الكهربائية .

٥٣٧٩ - تفريث كهربائي ،

Décharge électrique (F). *Electric discharge* (E).

الظاهرة التي تحصل عند تفريث شحنة كهربائية .

٥٣٨٠ - تفريث ،

Dissociation التفريق كماويك هو تفكيك العناصر المركبة عن بعضها .

٥٣٨١ - تفريث الإيجاص ، مجعثة الإيجاص

Taphrina bullata, *Exoascus bullatus* (S). *Cloque des feuilles de poirier* (F).

وصم يصيب أوراق الإيجاص والسفرجل . مظهره الخارجي يقع فردية او مجموعة ، قطر الواحدة منها نحو سنتيمتر مربع . تبدو خضراء اللون ثم صفراء واخيراً وردية ، يقابلها على صفحة النصل السفلى عرصات التفريث التي تجعد النسيج وتشل نشاطه فيسر ويدبل ، ويقضي على كامل الورقة فتلاوى وتسقط || يكافح باستعمال أحد الادوية الفاطورية المرتكزة على النحاس أو الكبريت .

٥٣٨٢ - تفريث البتولا ، مجعثة البتولا

Taphrina betulæ, *Exoascus betulæ* (S). *Cloque foliaire du bouleau* (F).

وصم يصيب أوراق البتولا فيميتها . مظهره الخارجي يقع مستديرة تملأ صفحة النصل العليا فتجمعها ، تبتدي خضراء اللون ثم غبراء وتنتهي باللون الرمادي الاصفر .

٥٣٨٣ - تفريث الحور ، مجعثة الحور

Taphrina aurea, *T. populina*, *Exoascus aureus* E. *populi*, *Ascomyces aureus* (S). *Cloque du peuplier* (F).

وصم يصيب أوراق الحور في اوائل الصيف فيقضي عليها

ظويلة وكثيفة كالمكنسة تملو الفصن وتنبه افقياً ثم عمودياً . اما الاوراق فتبدو مجمدة النصل خلية الصفحة السفلى تكتنفها غبرة طحلاء اللون تستعمل يابسها وسقوطها . يكافح بقطع الاغصان المصابة وباستعمال احد الادوية الفاطورية قبل الاكناخ وبعده .

٥٣٩٦ - تَفْرِئِيَّاتٌ مُجَعَّدَاتٌ ٥ Exoasceae, Taphrinaceae (S). Exoascées, Taphrinacées (F). Exoasceae, Taphrinaceae (E). فصيلة فطور مجهرية تنتمي الى مرتبة النغضيات ورتبة الزقيات . تتميز بازقاق عريضة تلحفها غلفة العن . انواعها عديدة بعضها يسبب تجميد الورق وبعضها يجمع الثمار وبعضها يعكس الافئاد والافئاد . اشهرها واعرفها :

تفريئة الدراق واللوز	مجمدة
« الاجاص »	«
« الحور »	«
« السديان »	«
« الدردار »	«
« المغث »	«
« المغث الغروي »	«
« البتولا »	«
« الخوخ »	مجمدة
« شبرقة الحور »	«
« شبرقة المغث »	«
« عكس الكرز »	ممكنة
« الخوخ »	«
« البتولا »	«
« الشرم »	«
« الكاكاو »	«

٥٣٩٧ - تَفْرِئَةُ Hachage (F). Chopping (E). هي القرم اي قطع او تجزئة العلف الطويل والكبير الحجم قبل تقديمه الى الماشية .

٥٣٩٨ - تَفْسِخٌ Putréfaction (F). Putrefaction (E). التفسخ أي الفساد هو انحلال المواد العضوية بتأثير الجراثيم .

٥٣٩٩ - تَفْسِخٌ Synchronisation (F). Synchronizing (E). التفسخ تحديد التوقيت .

٥٤٠٠ - تَفْطِيعٌ Autofécondation (F). Autofecundation (E). هو التأثير الذاتي .

٥٤٠١ - تَفْقِيسٌ ، تَفْرِيجٌ Ecllosion (F). Opening (E). هو نقف البيض وقد يكون ذلك عند انفلاق القربة بعد اكتمال الحلقة .

٥٤٠٢ - تَفْلِقٌ Rallus (S). Râle (F). Rall (E). جنس طير من فصيلة التفليات . انواعه عديدة جميعها صغيرة القد طولها من ٢٥ الى ٣٠ سم . مناقرها جالس مستطيل ، ذيلها مستدق صغير ، ارجلها وارساغها ومخالبها طويلة . ثوبها موشع ومحرز . معظمها من القواطع وبمفها آبد يألف المناطق والغابات الكثيرة الجداول . قوتها الحشرات وبعض حبوب النجيليات || تدن في الاعشاب الكثيفة وبين القصب والفرار . اناثها قبيض من ٦ الى ١٠ بيضات تحضنها وحدتها نحو ثلاثة اسابيع .

وينشعلها على اخلاف النواهي الابطية العديمة النفع والانتاج . مظهره الخارجي مكانس ضمية الشكل قصيرة القضببان الكثيفة تملو الافئاد هنا وهناك . والافئاد المصابة تجم عن الازهار . اما اوراقها فتبدو مجمدة رصاصية اللون تملوها شحة خلية وردية الموج .

٥٣٩١ - تَفْرِئَةُ الكَرَز ٥ ، عَكْسُ الكَرَز ٥ ، مَكْنَسَةُ السَعَلَةِ ٥ Taphrina cerasi,

Exoascus cerasi, E. wiesneri, E. Gilgii (S). Balai de sorcière du cerisier (F). Witchesbroom of cherries (E). Kirschenhexenbesen (D). وصم يصيب اغصان وافئاد الكرز فيميت نواهي الطبيعية ويحشها على اخلاف غيرها قصيرة وكثيفة لا غير فيها ولا نفع . مظهره الخارجي ضمة من الافئاد الكثيفة تشبه المكنسة تملو بعض اغصان الشجرة هنا وهناك . يكافح بقطع الاغصان المصابة وباستعمال احد الادوية الفاطورية قبل الاكناخ وبعده .

٥٣٩١ - تَفْرِئَةُ المَغْث ٥ ، مُجَعَّدَةُ المَغْث ٥ Taphrina tosquetii, Exoascus tosquetii, T. alni-torqua, E. alni (S). Cloque foliaire de l'aune (F).

وصم يصيب اوراق المغث فيقضي عليها . مظهره الخارجي يقع مستديرة او مستطيلة تركب النصل فيبدو اخضر اللون ثم اصفر وينتهي بالاطحل الى ان يتم التمتع فيسر وييسر .

٥٣٩٢ - تَفْرِئَةُ المَغْث الغروي ٥ ، مُجَعَّدَةُ المَغْث الغروي ٥ Taphrina sadebeckii, Exoascus

flavus (S). Cloque foliaire de l'aune glutineux (F). وصم يصيب اوراق المغث الغروي فيقضي عليها . مظهره الخارجي يقع مستديرة فسيحة تركب النصل وقد تغشي كامل الصفحة . تبدو ارجوانية اللون وتبقى عليه حتى اكتمال التمتع الذي يزيد بحجم الورقة . ثم تنحرف نحو الليكي وتنتهي بالاصهب الاسمر .

٥٣٩٣ - تَفْرِئَةُ شَبْرَقَةِ المَغْث ٥ ، مُجَعَّدَةُ المَغْث ٥ Taphrina alni-incanae, Exoascus alni-incanae, E. amentorum (S). Cloque des chatons de l'aune (F).

وصم يصيب في المغث الشبارق الاثني فيعطب كرزها ويحول دون نمو الطبيعي وتكوينه الصحيح . مظهره الخارجي استطالة حراشف الشبارق وكبر حجم الازهار ثم تضخمها واستحالتها الى جرب صفار وردية اللون طول الجراب منها من ٢ الى ٣ سم .

٥٣٩٤ - تَفْرِئَةُ عَكْسِ البَتُولَا ٥ ، عَكْسُ البَتُولَا ٥ Taphrina turgida, Exoascus turgida (S). Balai de sorcière du bouleau (F).

وصم يصيب اغصان وافئاد البتولا فيقضي على نواهي الطبيعية ويحشها على اخلاف غيرها من النواهي الابطية العديمة النفع || مظهره الخارجي ابالة من الافئاد الدقيقة القصيرة الكثيفة قمرها نحو المتر تملو الاغصان وتعيها .

٥٣٩٥ - تَفْرِئَةُ عَكْسِ الخوخ ٥ ، عَكْسُ الخوخ ٥ Taphrina insitiae, Exoascus insitiae (S). Balai de sorcière du prunier (F). Witchesbroom of plums (E). Pflaumen-hexenbesen (D).

وصم يصيب اغصان وافئاد الخوخ فيحشها على اخلاف الافئاد الدقيقة المستطيلة العديمة النفع والمضرة بهيكل الشجرة وبانتاجها || مظهره الخارجي اثنان دقيقة نحلة



تفريئة الكاكاو



تفريئة الكرز



تفريئة المغث الغروي



تفريئة شبرقة المغث



تفريئة عكس الخوخ



تفلق

كوجه ذا وجه هذا في تدوره
كأنه منه في الاجفان معدود
له من الليث ناباء ومخلبه
ومن غرير الظباء النمر والجيد
إذا رأى الصيد اخفى شخصه أدباً
وقلبه باقتناص الطير مزود



تفلوس دوري

٥٤١٠ - تَفْلُوسِيَّات
حق يحول صاحبه الخيار بين حالات قضائية شتى .

٥٤١١ - تَفْلُوسِيَّات
سبب من التجليات .

٥٤١٢ - تَفْلُوسِيَّات
Cannabina (S). Linot, Linotte (F). Linnet (E).

جلس عصافير شبيهة بالدوري من فصيلة الشرشوريات .
انواعه المعروفة ١٥ ألوانها متعددة ضاربة الى الحمرة
والصفرة . تألف التهام والحدائق وحواشي الاراضي المزروعة .
قوتها البزور البرية والزراعية وتفضل بزر الكتان على
كل شيء . تدن في الادغال والاشجار المثمرة . انثاها
تحضن من ٤ الى ٦ بيضات اهليلجية الشكل سمائية
اللون مرقوشة بالاحمر والاسمر .

٥٤١٣ - تَفْلُوسِيَّات مَبْدُول

Cannabina linota, Carduelis cannabina (S).
Linotte vulgaire, Linotte mélodieuse (F).
Common Linnet, Common Redpoll (E).

عصفور غريد من فصيلة الشرشوريات . موطنه بعض
مناطق حوض البحر الابيض المتوسط . اعطاه الالبانية
تمتد من السواحل الى الجرد والبقاع || جسمه صغير
القد ، قريب الشبه بالدوري ، طوله نحو ١٤ سم .
وبسطه نحو ١٧ سم . منقاده مخروطي الشكل . اسمر
اللون . عيناه كستينيان . جناحه ذلق مستطيل . ذنبه
مقرق فارق . رسفاه الى السمرة || ثوبه يختلف باختلاف
الشق والعمر وفصول السنة . الذكر البالغ يكون في فصل
الربيع احمر الجبهة ومقدم الرأس ، اربد القعن والحسر
والعنق ، كستني الرداء وخلف الجناح . قوادمه ومناكبه
واباهره سمر النصال ، بيض الحواشي . زوره ومقدم صدره
وانتيكه الى الشبهة الغبراء المرقوشة بالاسود . صدره الى
الحمرة الاربعونية . بطنه الى البياض العاجي . وهو في فصل
الخريف يستبدل بالاحمر والاربعوني بالاصهب والاشهب ||
الثوب الربيعي ، عند الانثى ، لا حمرة فيه وهو الى الصبهة
الموشة والمنشدة بالاسمر تملوها ماجة بنية تلحف العنق
والرداء والظهر والعجز حتى الزمكاه . اما الثوب الخريفي
فلا فارق بينه وبين ثوب الذكر || تألف المصناب والتهام
وحواشي الاراضي المزروعة . يعيش في القفص ويتشيز
بانتداه شذر غيره ويتصالب مع الكتار والنفر . قوته
البزور البرية والزراعية اغصتها الكتان والخس والنفل
وبعض الهوام والخشرات || يدن حش في الادغال والاشجار
المثدونة الداسية . الانثى تحضن من ٤ الى ٦ بيضات نحو
١٣ يوماً والذكر يؤمن لها الغذاء والحماية || يعتبر من
العصافير المتوسطة النفع .

٥٤١٤ - تَقَادُم
Prescription
احد طرق اكتساب الملكية او اسقاط بعض الحقوق بانقضاء
مدة من الزمن يحددها القانون .

٥٤١٣ - تَفْلِقِيَّات Rallidae (S).

Rallidés (F). Rallidae (E).

فصيلة طيور مائية من رتبة طوال الساق تشمل عدة اجناس
وانواع اشهرها التفلق والغر ودجاج الماء . جميعها من
الطيور القواطع النافعة التي تلتهم الحشرات واخصها
القمصيات .

٥٤١٤ - تَفْلُوسِيَّات دُودِي * Typhlops

vermicularis (S). Typhlops vermiculaire (F).

حية بيوض ، جاسة ، لامؤذية ، من فصيلة التفلوسيات .
موطنها المناطق الحارة من الشرق الادنى والوسط || جسمها
دودي الشكل يطول من ٣٠ الى ٣٥ سم . ثوبها بني اللون
يملوه موج اسمر . سفها اسود الخثار الداخلي عند الذكر ||
تألف المواقع المعتدلة والرطوبة والاتربة المعتدلة الاندماج
حيث تنمن على اعماق تراوح من ٢٥ الى ٥٠ سم . ||
قوتها الحشرات والديدان .

٥٤١٥ - تَفْلُوسِيَّات مُنْقَطَّه

Typhlops punctatus (S). Typhlops punctué (F).

حية بيوض ، جاسة ، لامؤذية ، من فصيلة التفلوسيات .
موطنها معظم مناطق افريقية الاستوائية || جسمها اسطواني
الشكل يطول من ٧٠ الى ٨٠ سم . ثوبها متراكب الاسود
والاصفر ، يملوه تنقيط اغبر || تألف المواقع الرطبة
والاتربة القليلة الاندماج . قوتها الحشرات والديدان وبعض
العطاء اخصها الوزغ .

٥٤١٦ - تَفْلُوسِيَّات Typhlopidae (S).

Typhlopides (F). Typhlopidae (E).

فصيلة حيات بيوضة ، جاسة ، عديمة الاذى . انواعها
المعروفة ١٢٠ اعطائها البلاد الاستوائية والحارة من العالمين
القديم والجديد . قوتها الحشرات والديدان || اجسامها
اسطوانية الشكل تطول من ٢٠ الى ٨٠ سم . قشارها مقوس
السيف المتماثل في جميع انحاء الجسم . رؤوسها تكاد لا
تتميز . عيونها صغيرة ، مستديرة ، ماسحة ، يغطيها
بكاملها او يجز منها فشاء سهفي-المادة . فكوكها السفلى
عادية الاسنان . اما اسنان فكوكها العليا فصغيرة الجرم ،
قليلة العدد .

٥٤١٧ - تَفْلُوسِيَّات ، تَوَزِيع Répartition (F).

Distribution (E).

تقسيم الارض الزراعية الى مشاير تسهلاً لتوزيع زراعتها .

٥٤١٨ - تَفْلُوسِيَّات Phyllodie, Frondescence (F).

Phyllody (E).

شلوذ جسموري يطرأ على بعض اجزاء النبات اخصها
اعناق الاوراق فيحوها الى فلد ورقية كما في السط
والخاض والقطة وعلق الماء .

٥٤١٩ - تَفْلُوسِيَّات Lynx pardinus (S). Lynx pardé (F).

Southern lynx (E). Pardelluchs (D).

هو الوثق الفهدي . شكله وجهه بين الفهد والسنور .
يقال انه يألف وان صيده في غاية الجودة . وقد وصفه
الناس في ابيات منها :

حلو الثبائل في اجفائه وطف

صاني الادم هضم الكشح لسود

فيه من البدر اشياء توافقه

منها له منع في وجهه سود



تفليجي



تفليجي مبدول

٥٤٣٠ - تَقْسِيم (F). Dividing (E).
هو تقطيع الأرض الزراعية الى عدة قطع تنظيمياً للعمل الحالي وتسهيلاً للأعمال المقبلة .

٥٤٣١ - تَقْسِيم الحُصَص (F).
Allotment (E).

هو تبيض الملك حتى تميز حصص المتقاسمين عن بعضها البعض .

٥٤٣٢ - تَقَشِير (F). Décortication (E).
Decortication (E).

التقشير أو الكشط هو إزالة الغلف والسفقات عن البزور .

٥٤٣٣ - تَقْضِيب (F). Taille des arbres d'ornement (E).
Pruning (E).

هو تشحيل الأشجار الزينية .
٥٤٣٤ - تَقْطِير (F). Distillation
هو الفصل بواسطة الحرارة الاصول الطيارة عن الاصول الثابتة . وأكثر استعمال التقطير في صناعة الكحول والمطهر .

٥٤٣٥ - تَقْطِيع الجنين (F). Embryotomie (E).
Embryotomy (E).

عملية يقوم بها الطبيب البيطري عند تعسر الولادة .
٥٤٣٦ - تَقْطِيع (F). Débourement (E). Bursting (E).

راجع إكلح .
٥٤٣٧ - تَقْع (F). Chelmon
جنس اسماك بحرية من فصيلة السحليات . انواعه المعروفة اربعة جميعها صغيرة القد ، مستديرة الشكل ، مبططة الجسم . اعظامها بارزة كالمناقيد . زعانفها الظهرية والشرجية مثثة الشكل كبيرة القد . اثنائها متراكبة الالوان الزاهية يملوها تخطيط مستعرض ازرق او اسود . اعظامها بحار البلاد الحارة تكثر في بحار الهند وفي البحر الاحمر . تعيش قرب الشواطئ الحشقة .

٥٤٣٨ - تَقَلِّبات جَوِيَّة (F). Variations atmosphériques (F).
Atmospheric variations (E).

هي الاحداث الجوية العادية منتظرة كانت او غير منتظرة .

٥٤٣٩ - تَقْلَص ، تَقْلِص (F).
Constriction, Contraction

هو الضغط الدائري الذي يزيد انكماش الشيء فيقصر قطره .

٥٤٤٠ - تَقْلَص استِدَارِي (F). Péristaltique (F).
Peristaltic (E).

هي الحركة الدورية الخاصة بالاعضاء القنوية وبالامعاء عند انقباضها اثناء البلع والهضم .

٥٤٤١ - تَقْلِيف (F). Dessèchement des fruits (F).
Drying of fruits (E).

تجفيف الثمار او تجفيفها لحفظها .
٥٤٤٢ - تَقْلِيم (F). Taille des arbres fruitiers (F).
Pruning of fruit-trees (E).

هو تشحيل الاشجار المثمرة .
٥٤٤٣ - تَقْن (F). Limon (F). Mud, Silt (E).

التقن : رسابة الماء في الارض وفي الجدول .

٥٤١٥ - تَقَادُم مُكْسِب (F). Prescription acquisitive, Usucapion (F).
Acquisitive prescription (E).

هو التقادم الذي يكسب المرء حقوقاً عينية اصلية على منقولات او ثوابت بحياتها مدة من الزمن عينها القانون اقصاها خمس عشرة سنة .

٥٤١٦ - تَقَارُب مغْنَطِيسِي (F). Induction magnétique (F).
Magnetic induction (E).

٥٤١٧ - تَقَاطُع (F). Intermittence (F).
Intermission (E).

صفة ما هو متقاطع الحركة كالنبض .

٥٤١٨ - تَقَالَة (F). Caranx fusus

نوع من الشيم وهي سمكة صغيرة مأكولة توجد في المتوسط .

٥٤١٩ - تَقَانَة ، طَمِي ، غَرِين (F). Limon (F).
Silt, Ooze, Mud, Alluvium (E).

جميع ما تحمل المياه العكرة من رواسب تتركها في الارض .
٥٤٢٠ - تَقَاوِي (F). Semence (F).
Seed (E).

راجع بذار .
٥٤٢١ - تَقَبْض (F). Crispation (F).
Crispation (E).

التقبض انقباض الاعصاب .

٥٤٢٢ - تَقَّة * ، تَافُول (F). Tacca
جنس نباتات عشبية عنقولية زراعية من فصيلة التفقيات . انواعه قليلة تكثر زراعتها في الهند الصينية والكوشنشين وجزر أقيانيه ومدغسكر حيث يدعونها تافول (Tavoul) . عساقلها لحمية مأكولة اللباب ويستخرج منها مادة نشوية مستحبة الطعم لذيدة .

٥٤٢٣ - تَقْدَة ، تَقْدَة (F). Coriandre (F).
Coriander (E).

هي الكزبرة او الكسبرة ، اطلبها .
٥٤٢٤ - تَقْدِير (F). Evaluation (F).
Valuation or estimate (E).

٥٤٢٥ - تَقْدِير الثَمَن (F). Estimation en argent
راجع ثمين .

٥٤٢٦ - تَقْدِير الدخَل (F). Allivrement
هو تقدير الدخل الصافي الذي تقرره مصلحة المساحة للاملاك العقارية لتحسب الضريبة على قاعدته .

٥٤٢٧ - تَقْرِير الغَيْبَة (F). Déclaration d'absence
حكم يقرر حالة الغيبة ويسمح بقيام حقوق واتخاذ اجراءات عينها القانون حماية لمصالح شئ معلقة بسبب غيبة الغائب الذي يعتبر مفقوداً .

٥٤٢٨ - تَقْرِير المِلْكِيَّة (F). Etablissement de propriété
بيان يدرج في متن العقد يبسط فيه كل من باع عيناً ثابتة او أنشأ حقاً عينياً على هذه العين طريقة ملكيته وملكية اسلافه لها .

٥٤٢٩ - تَقْرِيس ، تَبْرِيد (F). Réfrigération (F).
Refrigeration (E).


عملية قوامها تخفيض درجة الحرارة الى المستوى الحراري الذي يناسب الشيء المطلوب تقيسه .



تقالة



تقة



تقع

٥٤٦٠ - تَكَّة٥ Thèqua (F). Theca (E).

خلية نباتية تتحول الى كهرس صغير ينشأ فيه بوغ الفطور.
ج. ثككات وتكك .

٥٤٦١ - تَكْثِيف Densimétrie (F). Densimetry (E).

قياس الكثافة أي الثقل النوعي .

٥٤٦٢ - تَكْحِيل Vinage (F).

Putting alcohol into wine (E).
اضافة ما يجب من الكحول الى الخمر او غيرها من
العصارات النباتية لتجود .

٥٤٦٣ - تَكْدِيس Bottelage (F).

Tying up in bundles (E).
جمع الثن اي الكلا اليابس الى اكداس .

٥٤٦٤ - تَكْدِيم Blocage (F). Blocking (E).

رصف الحجارة ورصها .

٥٤٦٥ - تَكْرُورِي* Pristipoma bennetti (S).

Pristipome ronfleur (F).
سمكة من الشجرم تنتمي الى فصيلة الفرغيات . يكثر
وجودها في البحر المتوسط والبحر الاحمر . طولها نحو
٦٠ سم . تتميز بكثافة حراشفها وبقوة زعانفها الشائكة .

٥٤٦٦ - تَكْرِيْب Culture en terre vierge (F).

التكريب هي الزراعة في الكريب الذي لم يزرع قط .

٥٤٦٧ - تَكْرِير Rectification

عملية يقصد بها تنقية الكحول وذلك بفصل جميع المواد
الغريبة عنها . قوامها الرئيسي اعادة التقطير .

٥٤٦٨ - تَكْنِزِيد Echenillage (F).

Ridding of caterpillars (E).
عملية غايتها القضاء على مختلف الديدان التي تعيش في
اطراف افنان الاشجار . وقد تم بقطع الافنان المائلة ثم
جمعها وحرقها .

٥٤٦٩ - تَكْسُو Tacso

هي آلامية تكسو ، جنبه عازشة مشرة .

٥٤٧٠ - تَكْسُودِيَوْمُ ، طَقْسُوسِي Taxodium (S).

Taxodier (F). Sabino tree (E).
جنس اشجار حرجية وزينية من السرويات وفصيلة
الصنوبريات . انواعه قليلة اعرفها واشهرها التاكسوديوم
الاقرع .

٥٤٧١ - تَكْسُودِيَوْمُ أَقْرَع*

Taxodium distichum (S). Taxodier chauve, Cyprès
chauve (F). Common bald cypress, Sabino tree,
America bald (E). Echte sumpleibe (D). Cipresso
calvo, C. gaggia, C. della Virginia (I).

نوع من التاكسوديوم شجرته كبيرة القدر مدنية الشكل تعلو
من ٤٠ الى ٥٠ م . ساقها منتصبه . اغصانها متتابعة لينة .
اوراقها حشوية مهدبة لونها الى الخضرة الزاهية . ثمارها
اكواز بيضية الشكل صغيرة القدر طولها نحو ٣ سم .
وهو من الاشجار الحرجية والزينية التي ترغب في الاراضي
الرطبة العميقة الغور .

٥٤٤٤ - تَقْن

تقن ارضه : سقاها الماء الخار لتجود .

٥٤٤٥ - تَقْسِين Restriction (F).

Restriction, Limitation (E).
الاتصار على الحاجة فقط .

٥٤٤٦ - تَقْوُسُ الخَوْشَب Bouleture (F).

Upright on fetlock-joint (E).
عيب في قوائم الفرس ، راجع بروز الخوشب .

٥٤٤٧ - تَقْوِيس Arcure (F). Arching (E).

التقويس او التحجين هو حي التقبيب على شكل القوس .

٥٤٤٨ - تَقْوِيز Histolyse (F). Histolyse (E).

التقويس اضمحلال النسيج الحية عند الحيوان او الحشرة .

٥٤٤٩ - تَقْوِيم Prisée (F). Appraisalment (E).

هو تعيين جردة التركة من متقولات وامثلة الذي يقوم
به احد كتاب المحكمة .

٥٤٥٠ - تَقْوِيم ، رُزْنَامَة Calendrier (F).

Calendar (E).
جدول فصول السنة وشهورها وايامها وتواريخ اعيادها .

٥٤٥١ - تَقْوِيم زِرَاعِي ، رُزْنَامَة زِرَاعِيَة

Calendrier agricole (F). Agricultural calendar (E).
جدول مواعيد الاعمال الزراعية المختلفة اخصها المواسم .

٥٤٥٢ - تَقْصِيَّات Taccacées (F). Taccaceae (E).

فصيلة نباتية من وحيدات الفلقة قريبة الشبه من الترجسيات
تشمل التقة والشيزوكبسا .

٥٤٥٣ - تَقْصِيَح Purulence

حالة الجرح الفاسد المادة الذي يعلوه القيح .

٥٤٥٤ - تَقْصِيد Enregistrement (F).

Enregistering (E).
هو التدوين او التسجيل .

٥٤٥٥ - تَكَّ طائر يقال له ابو تمر (التاج) .

٥٤٥٦ - تَكَاثُر ، تَكْثِير Multiplication

ازدياد العدد .

٥٤٥٧ - تَكَاثُف Valence

تكاثف المنصر ، كياويا ، هو عدد ذرات الهيدروجين
التي تتحد بذرة واحدة من هذا المنصر .

٥٤٥٨ - تَكَاثُف Parité (F). Parity (E).

هو ان تكون قيمة النقد المعدني بالنسبة الى نقد آخر
متكافئة مع وزن المعدن الذي تحواه || اما في القيم
المنقولة فيقال ان سعرها متكافئ اذا كان سعر اصداؤها
او ييمها او تسديدها متكافئاً مع قيمتها الاسمية .

٥٤٥٩ - تَكَامُل Rédintégration (F).

Redintegration (E).
طاقة كامنة في بعض الحيوانات الدنيا اخصها الحراطين
تمكنها عند قطع واحد منها الى شطرين من تجديد الاعضاء
المتبورة في كل قسم فيعود كل واحد من القسمين فرداً
كاملاً .



تكروري



تاكسوديوم اقارع

nensis, Tecoma grandiflora, Bignonia grandiflora (S). Tecoma de Chine, T. à grandes fleurs, Bignone de Chine, Campsidie de Chine (F).

نوع من التكومة التزيينية وهي جنية متسلقة تمتد نحو ٤ أمتار أوراقها مركبة تساعية الوريقات الجميلة الخضراء. فصلها مسنن الحافة مبعر الزغب. أزهارها كبيرة القذ، عنقودية التجميع، برتقالية اللون.

٥٤٨٤ - **تكومة فيرجينية** Tecoma radicans, Bignonia radicans, Campsis radicans (S). Tecoma de Virginie, Bignone de Virginie, Jasmin trompette, Jasmin de Virginie, Campsidie (F).

جنية متسلقة تمتد نحو ١٠ أمتار. ضروبها عديدة. أوراقها تساعية الوريقات المشارية التحزير. فروعها مستطيلة مستدقة حمر اللحاء. أزهارها عنقودية التجميع يختلف لونها باختلاف الضرب. يكثر فيها الأحمر ومشتقاته.

٥٤٨٥ - **تكومة منتصبة** Tecoma stans (S). Tecoma dressée (F).

نوع من التكومة وهي شجرة منتصبة، ساقها تعلو نحو ٤ أمتار. أوراقها تساعية الوريقات فصلها مسنن الحافة، أزغب الصفحة السفلى. أزهارها تاجي الارتكاز أزهارها إلى الصفار الزاهي الجميل.

٥٤٨٦ - **تكومة ياسمينية*** Tecoma jasminoïdes, Bignonia jasminoïdes, Pandorea jasminoïdes (S). Tecoma jasminoïde (F).

نوع من التكومة وهي جنية تزيينية متسلقة تمتد نحو ٦ أمتار أوراقها خماسية أو سباعية الوريقات. فصلها ملس البشرة، جميل الخضار الزاهي. أزهارها إلى البياض يملوها من الداخل توشيح أحمر متوازي الخطوط.

٥٤٨٧ - **تكوين** Mise en boule (F).

٥٤٨٨ - **تكوين** Genèse (F). Genesis (E).

شغل الكون والتكوين بال فلاسفة وعلماء الفلك منذ أقدم العصور وهو لا يزال مدار بحث أصحاب الاختصاص. أما الرأي السائد عن نشأة الكون ومداه فهو أن الكون المحدود نشأ منذ الوف ملايين السنين من كتلة غازية تراكت بتأثير العوامل الطبيعية المختلفة واستحالت إلى مجموعات شمسية مستقلة. أما مدى الكون، وهو درس خيالي لأنه يرتكز على تقدير السدم، فيراوح من ١٠٠٠٠ مليون إلى ٥٠٠ ألف مليون سنة ضوئية. أما التكوين بالمعنى المجازي الاصطلاحي فهو مجموعة الحوادث أو العناصر التي ساهمت في إيجاد الشيء.

٥٤٨٩ - **تكبيومتر*** Tachéomètre (F). Tacheometer (E).

آلة تستعمل في أرائة الأرض ومساحتها لأخذ القياسات بالسرعة الكلية.

٥٤٩٠ - **تكبيس، تغليف، غم، تمل، تغم** Ensachage (F). Sacking (E).

وضع الشيء ضمن الكيس أو الغلاف.

٥٤٩١ - **تكيف** Adaptation

هو تنويع النبات واستدراجه إلى مقتضيات الحاجة والاقليم.

٥٤٧٧ - **تكسيح القضبان** Plage des barres (F). Bending of bars (E).

عملية لي قضبان الحديد.

٥٤٧٣ - **تكسين** Toxine (F). Toxin (E).

التوكسين والتكسين أي القيشب : مادة سامة مختلفة التركيب تفرزها بعض الميكروبات أو البكتيريات.

٥٤٧٤ - **تكش** التمش هو البازي المسن.

٥٤٧٥ - **تكقيب** Cubage, Cubature (F).

تحويل قياسات حجم الشيء إلى وحدات مكعبة.

٥٤٧٦ - **تكقيب الخشب** Cubage des bois (F).

Cubage of wood (E).

قياس حجم الخشب وقد يتم ذلك بضرب الطول بالعرض والارتفاع أو السماكة.

٥٤٧٧ - **تكفور** * Thecaphora

جنس فطور مجهرية من فصيلة الراهرييات تتميز ببثورها البوغية التي تتركب مختلف أعضاء النبات من الجذور والمساقل إلى الأوراق والأزهار || أنواعه عديدة تتطفل على القرنيات والمحموديات والمركبات وعلى بعض القطيفيات والسعديات والشببات والصيوانيات والفويات || مظهره الخارجي بثور بوغية لا قياسية الشكل والحجم. طيلاسها حشودة جامدة متجانسة تنفلق عند بلوغها عن غبريات هبابية لونها إلى السمرة الداكنة.

٥٤٧٨ - **تكليس، تكلس** Calcination

التحويل إلى كلس بواسطة النار.

٥٤٧٩ - **تكنولوجيا زراعية** Technologie agricole (F).

Agricultural technology (E).

هي علم الصناعات الزراعية.

٥٤٨٠ - **تكومة** Tecoma (S).

Tecoma, Tecome (F). Red trumpet flower (E).

Tecoma, Trompetenblume (D). Tecoma (I).

جنس شجيرات وجنابات برية وتزيينية من فصيلة البغونيات منبها البلاد المعتدلة. أوراقها متقابلة مركبة ريشية. أزهارها كبيرة بوقية الشكل مختلفة الألوان. خشابها صلبة عطرية الرائحة. أنواعها عديدة أشهرها ما يلي.

٥٤٨١ - **تكومة أسترالية** Tecoma australis, Pandorea australis (S). Tecoma d'Australie (F).

نوع من التكومة وهي جنية صغيرة عارشة تمتد نحو ٢٠٠ سم. أوراقها مركبة خماسية أو سباعية الوريقات، فصلها مسنن الحافة مبعر الزغب. أزهارها تبنية اللون يملوها، من الداخل، توشيح أرجواني.

٥٤٨٢ - **تكومة القطب** Tecoma capensis, Tecomaria capensis, Bignonia capensis (S). Tecoma du Cap (F).

نوع من التكومة التزيينية وهي جنية عارشة تمتد نحو ٥ أمتار أوراقها مركبة تساعية الوريقات. فصلها مسنن الحافة أزغب الصفحة السفلى. أزهارها إلى الحمرة النارية.

٥٤٨٣ - **تكومة صينية** Tecoma chinensis, Bignonia chinensis, Campsis chi-



تكفور



تكومة ياسمينية



تكبيومتر

Intensification (F). **٥٥١٠ - تَلْخِيب**
Intensification (E).
التلخيب استعمال اضمن الوسائل لاكثر الانتاج .

Voiles de bateau (F). **٥٥١١ - تَلْعَات**
Sails (E).
التلعات هي قُلُوع السفن . م تلعة (التاج) .

Glèbe, Motte de boue (F). **٥٥١٢ - تَلْعَة**
Glebe, Clod (E).
هي المدرة أي الكتلة من التراب .

Conopode à tige nue (F). **٥٥١٣ - تَلْغُوطَة**
Earth-nut (E).
نبات يدعى آكثر اجرد ، اطلبه .

Thelygonum (S). **٥٥١٤ - تَلْغُون ***
Thélygone (F). Dog's cabbage (E). Hundskohl.
Sprunkraut (D). Teligono (I).
جنس نباتات عشية حولية برية من سبط التلغونيات .
انواعه عديدة جميعها اعشاب فرعاء السوق . فروعها غيد
ايئة لذيدة الطعم . اوراقها بيضية معتقة مالة النصل .
ازهارها خضراء اللون . منبها مختلف كور حوض البحر
المتوسط .

Cynocrambe prostrata (S). **٥٥١٥ - تَلْغُون واهين**
Cynocrambe prostré, Thelygoné prostré (F).
نوع من التلغون ، نبات عشبي بري حولي منبته معظم
مناطق حوض البحر الابيض المتوسط || مائه فرعاء .
اوراقه متقابلة ، معتقة ، بيضية النصال المالة . ازهاره
صغيرة القد لونها الى الخضار الاصفر المواج .

Thélygonées (F). **٥٥١٦ - تَلْغُونِيَّات**
سبط نباتات عشية حولية برية من فصيلة اللكيتيات .

Lacron (F). **٥٥١٧ - تَلْغَاف**
هو تغاف الحقل ، اطلبه .

Telephorus (S). **٥٥١٨ - تَلْفُور ***
Téléphore (F). Telephorus (E).
جنس حشرات مبدولة من غديات الاجتحة الينة وفصيلة
التلفوريات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في جميع اصقاع
العالم || اجسامها صغيرة تطول من ١٢ الى ١٨ م .
رؤوسها شبه مستديرة . عيونها جاحظة . قرونها الاستشعارية
مستطيلة . اغمارها لينة ، لاحفة . اثوابها تختلف مع
اختلاف الانواع ، يكثر فيها البني الاشجع المواج .

Telephoridae (S). **٥٥١٩ - تَلْفُورِيَّات ***
Téléphoridés (F). Telephoridae (E).
فصيلة حشرات من غديات الاجتحة الينة . اجناسها
وانواعها عديدة منتشرة في جميع اصقاع العالم || بجميع انواعها
لينة الاغمار ، بخيلة الالوان الزاهية . بعضها بصاص يشع
في الظلمة || اشهر اجناسها التلفور والذلاق .

Relargage (F). Soapy (E). **٥٥١٠ - تَلْفِيد**
عمل قوامه سكب الماء المزوج بالقطرون ، ماء القل ،
فوق الزيت وتحريكه ليتصب || والتلفيد يعني كياروا
التصبين بالمعنى الشامل .

Telfairia (S). **٥٥١١ - تَلْفِيرِيَّة ***
Telfairie, Kouème (F).
جنبة معمرة عارضة برية وزراعية من فصيلة القرعيات .

Coteau (F). **٥٤٩٢ - تَلّ ، تَلّة**
Slope, Little hill (E).
قطعة من التراب ارفع قليلاً عما حوفا .

Cohésion (F). **٥٤٩٣ - تَلَاحُجْ ، تَمَاسُك**
Cohesion (E).
المقدور التلاصقي الطوعي الذي يجمع جزيئات الاجسام
الى بعضها .

Thladiantha (S). Thladianthe (F). **٥٤٩٤ - تَلَادِيَانْتَه**
جنس نباتات مدادة معمرة من فصيلة القرعيات . انواعها
قليلة تزرع للزيين . جذورها عسقلية غير مأكولة .
اوراقها معتقة متعاقبة . قلبية الشكل ، زباء النصل .
ازهارها ذهبية اللون ثنائية المسكن ، الانثوية فردية
التجميع اما الاكبرية فعنقودية . ثمارها بيضية الشكل
طولها يراوح من ٦ الى ٨ سم . لونها الى الحمرة القائمة .


Anastomose (F). Anastomosis (E). **٥٤٩٥ - تَلَاصُصْ**
هو في النبات اقتراب عروق الاوراق من بعضها البعض
الى حد الجمع .

Intersection **٥٤٩٦ - تَلَاقِي**
نقطة او نقط التقاء خطين او سطحين او جرمين .

٥٤٩٧ - تَلْبُوفِيلَة عَجُولَة *
Thalophila matura, Celaena matura (S).
Thalophile empressé, Celaene empressée (F).
Thalophila matura (E).
حشرة من فصيلة النفسيات ورقبة حشرقيات الاجتحة .
موطنها بعض اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط .
فراشها جارسة فونها رقيق الازهار . سرفها خاضلة تعيش
على النجيليات || جسمها معتدل القد يطول نحو ١٧ م .
جسطنها تراوح من ٣٨ الى ٤٠ م . رأسها صغير الجرم .
عينها كبيرتان . زباناها خيطيان . مرشفها معتدل الطول .
جوشنها كثيف الحمل حنطلي اللون . بطنها شبه مردفي
الشكل ، اسمر اللون ، اصفر المواج || رواشها عند
الشقين الى الحنطلي يعلوه في الزوج الامامي تيقيق وزركمة
وتبضج تراوح من الجفوري الى الكسفي . ويعلوه في الزوج
الخلفي بقجة طرفية كمنية . اهدابها الى الحنطلي || لها
جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في حزيران وتبقى حتى
ايلول . تسرح في الليل . تعاغل بعد ظهورها بنحو ستة
اسبوع . تمتح المكن لطخاً على الصفحات السفلى من
نصال الاوراق || السرة عند بلوغها الادراك التام تطول
نحو ٣٥ م . جسمها شبه اسطواني الشكل . ثوبها الى
السرة يعلوها وواج اخضر وثلاثة خطوط قاطبة جزوية .
وخطوط معتزة تبنية تملو جميع السكم من الجهتين اليمنى
واليسرى . رأسها الى الجفوة . مدها ورواجها الى السرة
القائمة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينتفضي
في التربة حيث تنفخ السرة على عمق ٤ او ٥ سم .

Glaze (F). Ice (E). **٥٤٩٨ - تَلَج**
راجع جمد .

Aiglon (F). Eaglet (E). **٥٤٩٩ - تَلَجْ ، تَلْد**
التلج هو فرخ العقاب والتلد ايضاً .



تلوفيله عجولة



تلغون



تلفور



تلفيرية

الجرم مكور الشكل ، مستطيل الخطم الراشف . زباناها صولجانيان . عينها صغيرتان . ظهرانها مستدير الطرف اللاحف ، متتابع التحزيم الغمدي القاطب . ارساغها خماسية العقل || لها جبل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتميش حتى حزيران . تسرح في النهار . تسافد بعد ظهورها بنحو ثلاثة اسابيع . تمتح المكن بين الحاء الاشجار وقشورها || البرقة عند بلوغها الادراك التام ، تطول نحو ١٥ مم . جسمها مردئي الشكل ، سداسي الرواجب ضليع التأشير ، اسمر اللون ، اسود الرأس || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٢٥ يوما يتقضي تحت الحاء او القشور .

٥٥١٩ - تلويث Pollution (F). Pollution (E).

استعمال ما من شأنه افساد الهواء او تدنيس المياه .

٥٥٢٠ - تليسة Testicule (F). Testicle (E).

هما تليستان في ذكور الحشرات . والتليسة هي الخصية .

٥٥٢١ - تم ، تيم ، ققنس Cygnus (S).

Cygne (F). Swan (E).

جنس طيور مائية من فصيلة البطيات . تعمر نحو مئة عام . انواعه خمسة . مهدها العالم . جميعها من القواطع مستطيلة العنق ، كبيرة المنقار المفلطح ، فضفاضة الجناح ، قصيرة الذيل المستدير || تألف المياه القليلة الغور وتميش على سطحها اسرابا كبيرة يراوح عددها من ٢٠ الى ٥٠٠ زوج . حياتها الجماعية ذكرا وانثى لا يفرقان . قوتها النباتات المائية والبرية والجذور والاوراق والحبوب والحشرات واليرقات والديدان والورغ والضفادع والسلك . الانثى تبيض من ٦ الى ٨ بيضات تحضنها وسعدها من ٥ الى ٦ اسابيع تحت حراسة الذكر في افحوص كبير القد تدثته في الارض او في عش تقيمه على سطح الماء بين العشب والاسل .

٥٥٢٢ - تم آخرس * Cygnus clor, C. mansuetus (S).

Cygne muet, C. commun (F). Domestic swan, Mute or tame swan (E).

نوع من التم طوله نحو ١٤٥ سم . وبسطة سقطيه من ٢٥٠ الى ٣٠٠ سم . ثوبه ناصع البياض . منقاره احمر اللون اسود الحافة . رجلاه الى الجؤوة . موطنه المياه الاسيوية من الصين واليابان الى الشرق الاوسط والبحر الاسود .

٥٥٢٣ - تم اسود * Cygnus atratus (S).

Cygne noir (F). Black swan (E).

نوع من التم طوله نحو ١٤٠ سم . وبسطة سقطيه من ٢٣٠ الى ٢٨٠ سم . ثوبه اسود . اباهره ببيض . منقاره قرمزي . رجلاه سوداوان . موطنه بحيرات ومناقع استراليا .

٥٥٢٤ - تم صداح * Cygnus musicus, C. ferus (S).

Cygne chanteur, C. sauvage (F). Whistling swan, Wild swan (E).

نوع من التم طوله نحو ١٦٠ سم . وبسطة سقطيه من ٣٠٠ الى ٣٥٠ سم . ثوبه ابيض تعلو رأسه مشعة من الصفار المذهب . منقاره اصفر اللون اسود الانتشاب . رجلاه الى السمرة . موطنه شواطئ البحار الباردة والمعتدلة من ايسلند الى افريقيه .

٥٥٢٥ - تم قزم * Cygnus minor (S).

Cygne nain, C. de Bewick (F). Swan of Bewick (E).

نوع من التم طوله نحو ١٢٥ سم . وبسطة سقطيه من

مهدا افريقيه الاستوائية || ساقها تطول من ١٥ الى ٣٠ م اوراقها متعاقبة مركبة وقربة التجميع ، ثلاثية او خماسية الوريقات المنعقة البيضية النصل المسنن الحافة . نصالها تطول من ٨ الى ١٢ سم . وتعرض من ٤ الى ٧ سم . ازهارها بنفسجية اللون ، ثنائية المآبر . الانثوية فردية التجميع ، عنقودية التجميع ، ثلاثية المآبر . الانثوية فردية التجميع ، خماسية البتلات المهذبة الاطراف . حوالقها مستطيلة ، متشعبة || ثمارها قرعية الشكل ، خضراء اللون ، كبيرة القد ، طولها يراوح من ٥٠ الى ١٠٠ سم . وقطرها من ٤٠ الى ٧٥ سم . ومتوسط وزنها نحو ٢٠ كيلو . سوزقها سميك المادة اللبائية المليافية المأكولة يغلف مجموعة من البزور يراوح عددها من ٢٠٠ الى ٣٠٠ || بزورها مستديرة ، مبطنه ، صلبة القشور ، جامدة الالبوب العاجي اللون ، اللوزي الطعم . تؤكل مسلوقة او محمصة ويستخرج منها بالمصر نحو ٤٠ ٪ من الزيت الاصفر اللون الصافي الذي يضاهي زيت الزيتون .

٥٥١٢ - تلقیح ، حمل Fécondation (F).

اخصاب اناث الحيوان . Fecundation (E).

٥٥١٣ - تلقیح ، إلقاح Vaccination

تلقيم مادة الطعم في الجسم السليم .

٥٥١٤ - تلقیح ذاتي Auto-vaccination (F).

Self-vaccination (E).

هر التطعيم الذاتي الذي يجري بدون وساطة .

٥٥١٥ - تلم ، تلم Sillon (F). Furrow (E).

هر اثر الموية التي يحرث بها في التربة . ج أتلانم وتلام .

٥٥١٦ - تلور Tellure (F). Tellurium (E).

معدن بسيط مشكال يوجد في الطبيعة على اشكال مختلفة اعماها المتبلور . اكتشف عام ١٧٨٢ . رمزه (تل) ، وقه الاتومي ٥٢ ، وزنه الاتومي ١٢٧.٦١ ثقله النوعي نحو ٦.٣ ، ينصهر عند ٤٥٢ ° سغ . وينلي عند ١٣٩٠ ° سغ . تكافؤه الايجائي ٦ والسليبي ٢ .

٥٥١٧ - تلوس ٥ Tillus (S).

Tille (F). Tillus (E).

جنس حشرات خنفسية من فصيلة الزوحنيات . انواعه المعروفة نحو ٤٠ منتشرة في معظم المناطق الحارة والمعتدلة من المالمين القديم والجديد . اجسامها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل . اطولها تراوح من ٤ الى ١٢ مم . اثوابها عديدة ومختلفة الالوان انما تكثر فيها الالوان السوية || مسرحها نهاري . قوتها رحيق الازهار اخصها ازهار الفصيلة الخيمية || يرقانها خاشبة تعيش على جذوع السنديان والزان والصفصاف والملول والحور الرجراج .

٥٥١٨ - تلوس مستطيل ٥ Tillus elongatus (S).

Tille allongé (F). Tillus elongatus (E).

حشرة واشعة خاشبة من فصيلة الزوحنيات ورتبة مفصدرات الاجنحة . تألف البراري والاحراج . خنافسها تعيش على رحيق ازهار الصيوانيات . يرقانها تركب جذوع السنديان والمقص والملول والحور .. || جسمها صغير القد يطول من ٦ الى ٩٠ مم . ثوبها ازرق الرأس والظهران في الشقين ، اسود الكوسل عند الذكر ، احمر عند الانثى . رأسها صغير



تلوس مستطيل



تم آخرس



تم اسود



تم صداح



تم قزم



تم مطوق



تمر هندي



تمر

تدعى الخضيب توجد في اوراق النبات واجزائه الخضراء. تمتص ثاني اكسيد الكربون من الجو فيتحد بالماء داخل الخلايا النباتية ويولد الاكسجين ويكوّن بعض المواد الهيدروكربونية كالكسكرو والنشا || من المعروف والثابت ان احتراق الوقود والفسل والخشب يستهلك الكثير من الاكسجين فنظام الطبيعة المحكم الدورة يقضي بان يعوض هذا النقص الذي يحدث في اكسجين الهواء بكيميات الاكسجين الذي يتولد من عملية التمثيل الخضيب. ولما كان التفاعل الكيماوي الذي يحدث في التمثيل عكس التفاعل الذي يحدث في احتراق المواد الهيدروكربونية وغيرها ... ولما كان احتراق المواد الهيدروكربونية يولد مقداراً من الطاقة. وحيث ان المصدر الذي يمد النبات بهذه الطاقة هو الشمس. لذلك نشهد ان النبات لا يتم نموه الا بضوء الشمس. وانه يدخر الطاقة في سائر اعضائه. وانه عندما تحترق قطعة من الخشب مثلاً يتولد عنها مقدار من الحرارة هي في الواقع جزء من طاقة الشمس المدخنة فيها. وانه عندما يأكل الانسان الفاكهة او الحبوب او الخضراوات يستمد منها الطاقة اللازمة لجسمه وهي الطاقة التي يرجع مصدرها الى الشمس.

٥٥٤٠ - تمحيص Sucrage, Chaptalisation (F).
Sucaring (E).
اضافة السكر اللازم الى الحمر لرفع نسبة كحولها.

٥٥٤١ - تمخيض Barattage (F). Churning (E).
عمل يراد به تجميع الكريات الزبدية وفصلها عن المخيض.

٥٥٤٢ - تمديد Dilatabilité (F). Dilatability (E).

٥٥٤٣ - تمديد Dilatation (F). Dilation (E).

٥٥٤٤ - تمديد طولي Dilatation linéaire (F).
Linear dilation (E).

٥٥٤٥ - تمر هندي*، حومر، حمر Tamarindus indica (S). Tamarinier, Tamarin (F).
Tamarind tree (E). Tamarindenbaum (D). Tamarindo, T. dulce, T. dizio (I).

شجرة زراعية مشمرة من فصيلة القرنيات. تملو من ٢٠ الى ٢٥ م. اوراقها عابلة متعاقبة معنقة ريشية. ازهارها عنقودي الشجيع تاجي الارتكاز. ازهارها صفر وحمراء. منبتها الهند وقد انتشرت زراعتها في جميع الاصقاع الحارة نظراً لكثرة فوائدها. اوراقها طاردة للدود. ازهارها تفيد الكبد. ثمارها تنفع المعدة وتسهلها، وتربب ويستعمل منها شراب مفيد. قشورها غنية بالمواد القابضة تستعمل ضد الاسهال المزمن. خشبها صلب. اوراقها علفية تأكلها الماشية.

٥٥٤٦ - تمراد، تمرير Colombier (F).
Pigeon-house (E).
التمراد هو برج الحمام والتمرير ايضاً ج تمرير.

٥٥٤٧ - تمران Tamarin (F).
هو الميداس من القرود الندية.

٥٥٤٨ - ثمرة*، رطبة Datte (F). Date (E).
هي ثمرة التخليل الجافة. وقد جاء في الحديث الشريف: «اما الرطب فطعام مريم ولو علم الله طعاماً خيراً منه لاطعمها اياه». وجاء في سورة مريم: «وهزي اليك

٢٠٠ الى ٢٤٠ سم. ثوبه ابيض ناصع. منقاره ورجلاه الى السمرة. موطنه شواطئ بحار سيبيريا وشمال اوروبا.

٥٥٢٦ - تم مطوق* Cygnus nigricollis (S).
Cygne à cou noir (F).

نوع من التم طولها نحو ١٥٠ سم. وبسطة سقطة من ٢٥٠ الى ٣٠٠ سم. ثوبه ناصع البياض رأسه وعنقه الى السواد اللامع. منقاره اطحل اللون، رجلاه الى الحمرة. موطنه بحيرات ومناقع امريكا الجنوبية.

٥٥٢٧ - تم السمكة Muflier des jardins (F).
Dragon's mouth (F).

هو السيسم الماجوسي نبات زراعي تزييني عديد الضروب والالوان الجميلة الزاهية. اطلب سيسم ماجوس.

٥٥٢٨ - تمائل، تمحاكة Homothétie
Homothétie (F). Similarity (E).

٥٥٢٩ - تمائل الاجزاء Métamérisation (F).
Metamerisation (E).

حالة الاجسام او الاعضاء المتماثلة الاجزاء.

٥٥٣٠ - تماري Thary
التماري: شجرة لها مصع كصع العرجع الا انها اطيب منها وهي تشبه النبع. (اللسان).

٥٥٣١ - تماس، ملامسة، تماس Contact, Osculation (F). Contact, Touch, Osculation (E).

٥٥٣٢ - تماسيح Crocodilidae (S).
Crocodilidés (F). Crocodilidae (E).
فصيلة التماسيح من رتبة الزحافات.

٥٥٣٣ - تمباك Tombac
راجع تمباك.

٥٥٣٤ - تمت Calepina (S). Calépine (F).

نبات عشبي، حولي، بري، وحيد الجنس والنوع من فصيلة الصليبيات. اعطانه تمتد من الشرق الاوسط الى بعض مناطق اوروبا الجنوبية والغربية || ساقه فرعاء تعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم. اوراقه متعاقبة، السفلى منها قيثارية الشكل اما العليا فسنانية النصال. ازهاره صغيرة، ابطية وطرفية الارتكاز، بيضاء اللون.

٥٥٣٥ - تممة، تممة
هي الجزة من الشمر والوبر والصوف.

٥٥٣٦ - تمتمم التتم هو السباق. راجعه.

٥٥٣٧ - تمثير Mètre, Mètre (F).
Measurement (E).
القياس بالمتر وحاصل القياس.

٥٥٣٨ - تمثيل Assimilation
هو العمل الذي تقوم به بعض اعضاء الاحياء فتحول المواد الغذائية الميسورة او المتوفرة لها الى مواد نافعة يستفيد منها جسم تلك الاحياء.

٥٥٣٩ - تمثيل خضيبى Photosynthèse (F).
Photosynthesis (E).
عملية تحدث في ضوء الشمس. العامل في حدوثها مادة

٥٥٥٦ - تَمْسَاح كَيْتَمَان* ، كَيْتَمَان (F). Caïman
Calman, American crocodile (E).
جنس تمساح يعد بعض الأنواع المتفاوتة القد . بعضها
كبير الجثة طوله يراوح من ٥ الى ٧ امتار . وبعضها
صغير القد طوله نحو ٢٠٠ سم . أشهر أنواعه الكيان
الامريكي وكيان النيجر وكيان الصين .

٥٥٥٧ - تَمْسَاحِيَّات (F). Crocodilliens
Crocodiles (E).
مرتبة من الزحافات تشمل فصيلة التماسيح .

٥٥٥٨ - تَمَشِيط ، مَشَط (F). Hersage
Harrowing (E).
عملية زراعية الغاية منها اما تنعيم التربة بتفتيت مدرها
او تبسيطها بعد الحرث لتسوية اخاديدھا مع جمع اعشائها
او لطمر البذار والسماد .

٥٥٥٩ - تَمَعَّج (F). Boursoufflure
Bloatedness (E).
ارتفاع والتواء وتثني سطح فصل الورقة .

٥٥٦٠ - تَمَغْنُط ، مَغْنَطَة (F). Aimantation
Magnetization (E).
الحاق خواص المغنطيس بالجسم المقصود .

٥٥٦١ - تَمَغْنُط كَهْرَبِيّ (F). Electromagnétique
Electromagnetic (E).
كل ما له علاقة بعوامل المغنطيس والكهرباء .

٥٥٦٢ - تَمَغْطِيط ، إِنْغِطَاط (F). Extensibilité
Extensibility (E).
قابلية الشيء الى التمدد .

٥٥٦٣ - تَمَقْلُب ، مَقْلَبَة (F). Tropicalisation
Tropicalisation (E).
التقلب او المقلبة جعل المواد واللوازم الصناعية وجوئها
لا تتأثر بالمناخ المقلبي .

٥٥٦٤ - تَمَكَّك (F). Bosse du chameau
Hump, Hunch (E).
سنام الجمل .

٥٥٦٥ - تَمَكِّنَة (F). Pondaison des insectes
Laying of insects (E).
التمكنة زمن القاء المكن او متحه عند الحشرات .

٥٥٦٦ - تَمَتَّلَكَ (F). Acquisition
Acquisition, Acquiring (E).
راجع اكتساب الملكية .

٥٥٦٧ - تَمْلُوس (F). Thymallus
Ombre (F). Umber, Grayling (E).
جنس اسماك نهريه من مفتوحات المثانة وفصيلة السلمونيات .
انواعه المعروفة خمسة جميعها من اسماك البلاد الباردة والمعتدلة
الحرارة . يكثر وجودها في معظم انهر اروبة الوسطى
والشمالية || اجسامها وشعبة الشكل . زعانفها الظهرية
كبيرة . زعانفها الشرجية فارقة . لحمها جيدة الصنف ||
اشهر انواعه التملوس المبطل .

٥٥٦٨ - تَمْلُوس مَبْدُول (F). Thymallus
vaxillifer (S). Ombre commun (F). Common
Umber (E).
سمكة من التملوس . اعطانها معظم الانهر الاروبية والتركية
السريعة الانسياب || جسمها وشعي الشكل يطول نحو

يخرج النخلة تساقط عليك . رطباً جنياً فكلي واشربي وقرى
عيناً . || وقال فيها شوقي :
« طعام الفقير وحلوى الغني وزاد المسافر والمغترب » .
وهي من الثمار الغذائية الغنية بالاملاح المعدنية القلوية
وبالفيتامينات « ا » و « ث » . وحداتها الغذائية تبلغ
٨٥ ٪ متوسط تركيب لبها المأكول :

هيدرات الكربون	٧٨,٥ ٪
بروتين	٢,٥ ٪
مواد دهنية	٢,٥ ٪
مواد معدنية	١,٥ ٪

٥٥٤٩ - تَمْرَة (F). Cinnyril
راجع تمر .

٥٥٥٠ - تَمَرُّز (F). Dégustation
Tasting (E).
راجع تذوق .

٥٥٥١ - تَمْزِيق (F). Lacération
Laceration (E).
هو تقطيع الشيء كالصحيفة .

٥٥٥٢ - تَمَسُّ أَحْمَرُ الزَّوَر (F).
Bucco ruficollis (S). Tamatia à gorge rouge (F).
طائر من البتاق . موطنه بعض مناطق المكسيك . يألف
الغابات الكثيفة الاشجار ولا يقترب من الاماكن الآهلة ||
جسمه متوسط القد ، ربع القامة ، يطول نحو ٢٠ سم .
يتميز بكبر رأسه وبسباله المهدبة وبمنقاده المخروطي الذرب
الطرف . ثوبه الى الشبهة المتفاوتة الموج يعلوها توشيم
احمر . زوره الى الحمرة الفاقمة يحدھا طوق اسمر ينتهي
بالشبهة . صدره وبطنه الى الشبهة الموشمة بالاسمر . جناحه
معتدل الطول . ذنبه مستدير الطرف . ساقه دقيقة سمراء
اللون . حدقة عينه الى الصفار العسلي || قوته الحشرات على
اختلاف اشكالها وانواعها والنمل || يدثن عشه في تجاويف
الاشجار . الانثى تبيض من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها
نحو اسبوعين بينا الذكر يؤمن لها الغذاء .

٥٥٥٣ - تَمْسَاح (F). Crocodilus
Crocodile (S).
جنس حيوانات قازية لاحة من فصيلة التماسيح . انواعه
عديدة مهدها مياه البلاد الحارة والاسعوانية من اسبوية
وافريقية وامريكية . جميعها مستطيلة الاجسام الخشنة
تتميز بطول رؤوسها واذنابها ، بقوة فكوكها الكبيرة
وبصغر عيونها الجاحظة . مناخرها مرتفعة طرفية الارتكاز ،
جرامزها رباعية ، جانبية ، قصيرة . جلودها صفنية
قاسية . اثوابها الى السرة الرصاصية الخضراء الموج .
يطونها اقل سمرة من ظهورها . وهي من الحيوانات الشديدة
البطش المؤذية . اناثها تبيض على الشطوط الرملية بين الخز
والطلي .

٥٥٥٤ - تَمْسَاح الهنْد* ، أَرْوْم (F). Gavial
نوع من التماسح يعيش في مياه الهند . طوله نحو ٦ امتار .
يتميز باستطالة رأسه وفكيه . يقال انه لا يخشى البحر وقد
شوه على بضعة اميال من الشاطئ .

٥٥٥٥ - تَمْسَاح امريكي* ، أَلْيَهَانُور (F). Alligator
نوع من التماسيح الكبيرة القد . مهد المياه الامريكية .
طوله نحو خمسة امتار . يقال انه شرس الاخلاق كثير
الشبق لا يقلب انشاء التي يستبطنها لسفادها الا بعد كلة
الثام او عند اقتراب ذكر آخر .



تَمَسُّ أَحْمَرُ الزَّوَر



تَمْسَاح الهنْد



تَمْسَاح امريكي



تَمْسَاح كِيَان



تَمْلُوس مَبْدُول

٥٥٨١ - تمنور أعرف ، يرومي

Myrmecophaga jubata (S). Tamanoir à crinière, Grand Fourmilier, Yurumi (F). Great Ant-eater (E).

حيوان لين أورد وحيد الجنس والنوع من دوديات الالسة وفصيلة النملات. أعطائه بعض مناطق أمريكا الاستوائية. يألف البراري والاماكن القليلة الاشجار. ملجئه الحياتي فردي. لا يقترب الذكر من الانثى الا في زمن الوداق. الانثى تضع جرواً واحداً ترضعه نحو اربعة اشهر. قوته النمل وبعض الحشرات || جسمه مستهجن الشكل يطول نحو ٢٠٠ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٧٠ سم. ارتفاعه نحو ٦٠ سم. رأسه صغير الجرم مستطيل الفم الخرطومي الشكل. لسانه خنجر ينشب عند قذفه نحو ٥٠ سم عيناه صغيرتان واذناه ايضاً. قوائمه ضخمة غليظة. قائمته الاماميتان مجهزتان باظافر مستطيلة محببة. عفرته تمتد من الرأس الى الذنب. ذنبه جليل السبب الذي يطول من ٢٠ الى ٤٠ سم. ثوبه الى الرمكة تشوبها نمشة سوداء ويعلوه في عنقه وصدره جده سوداء تمتد وتضيق حتى الكفل ويطوق الجدة حثار ابيض. قائمته الاماميتان ميججتان بالاسود || الانثى اصغر قدماً من الذكر وسبب ذنبها اقصر من سببه.



تمندوة

٥٥٨٢ - تمنور مقعر الذنب

Temnurus albicollis (S). Temnure à queue échanquée, Priotèle à queue échanquée (F).

طائر من فصيلة الطرغوثيات. موطنه جزيرة كوبا. يألف الغابات والاحراج. ملجئه الحياتي جماعي. جماعته قليلة العدد. قوته المواد النباتية انحصارها الثمار والبزور || جسمه صغير القد يطول نحو ١٨ سم. يتميز باستطالة ذنبه المقعر الرقال. ثوبه العلوي اسفع لامع متداخل الازرق والاخضر. صدره ابيض. بطنه احمر. منقاده قرمزي اللون. جناحاه وذنبه مبقعة بالابيض || يدن عشه في تجاويف الاشجار الانثى تخضع بمنابرة الذكر نحو اربع بيضات. الترخيم يستمر نحو ١٥ يوماً.



تمنور أعرف

٥٥٨٣ - تمنور ينس منقط البطن

Cléone piqueté (F).

هو الكونج. المنقط البطن، حشرة مؤذية من السوسيات، اطلبها.

٥٥٨٤ - تمنوشيل زرقاء

Temnochila bleu (F). حشرة تدعى اسطوانة الصنوبر. راجع رقم ١٤٠٩.

٥٥٨٥ - تمنوفيل

Thamnophilus (S). Thamnophile (F). Thamnophilus (E).

جنس طير من الجواثم مشرومات المناقير وفصيلة الجيئليات. انواعه المعروفة قليلة منتشرة في بعض انطار القارة الامريكية انحصارها الجنوبية. تألف الاحراج والغابات الخريفة البائقة. ملجئها الحياتي زوجي. قوتها الحشرات والدوديات والعطاء... اجسامها ربة تطول من ١٨ الى ٢١ سم. رؤوسها كبيرة مناقيدها ضليعة. اجنحتها واذنابها معتدلة الحجم، مستديرة الاطراف. اثوابها تختلف مع الانواع، جميعها مبلقة بالالوان الزاهية || اعرف انواعه واشهرها التمنوفيل الاشهب.

٥٥. سم. ظهرها الى الربدة الفراء بعد الزرقاة الخافتة التي تعلوه في زمن النمو. جانبها وبطنها الى الربدة الفضية. رأسها ونحطها الى الربدة السمراء. محسراها منقطة بالاسود || لحمها لذيق الطعم، صغري العرف، مرغوب فيه.

٥٥٦٩ - تمنول

التمنول: نبت يكثر في اول الربيع وايام الدف (التاج).

٥٥٧٠ - تمليح

Salage (F). Salting (E).

رش الملح على العلف او الحشيش او على بعض المأكولات المعدة للحفظ كالسمك واللحم الخ...

٥٥٧١ - تمليح

Celletonnage (F). Layering (E).

راجع تخليف.

٥٥٧٢ - تمليس

Roulage (F). Rolling (E).

راجع تعديل.

٥٥٧٣ - تمليك

Aliénation (F). Alienation (E).

هو نقل ملكية عين او حق.

٥٥٧٤ - تمليكة

Brède caya (F).

Bastard mustard (E).

راجع ابو قرن.

٥٥٧٥ - تمليين

Malléination, Malléinisation

(وضع الامير مصطفى الشهابي) هو حقن الفرس بسائل المليون (Malléine) لتشخيص مرض الرعام.

٥٥٧٦ - تمندوة ، دقير الحراج

Tamandua (S). Tamandua, Puant de la forêt (F). Middle Ant-eater (E).

جنس حيوانات لبونة درداء من دوديات الالسة وفصيلة النملات. انواعه المعروفة اربعة. اعطائها امريكية الاستوائية. ملجئها الحياتي فردي لا تجتمع الا في زمن الوداق. تألف البراري والاحراج. مسرحها دجوي. تتسلق الاشجار بحففة في طلب النمل والحشرات والعسل || اجسامها تطول من ٨٥ الى ١١٠ سم. بما فيه الاذناب التي تطول من ٣٥ الى ٤٦ سم. ارتفاعها يراوح من ٢٠ الى ٣٤ سم. رؤوسها صغيرة، مستطيلة، شبه مخروطية الشكل. السنن شبه اسطوانية الشكل، حشاحة. عيونها واذنابها صغيرة. قوائمه قصيرة، الامامية منها محببة الاظافر القوية، اللامتساوية الطول. اذنانها مستطيلة، سرحة، أخاذة. اثوابها تختلف مع الانواع || اناتها اصغر قدماً من ذكورها وتضع جرواً واحداً ترضعه نحو اربعة اشهر. اما انواعه فهي التالية :

٥٥٧٧ - تمندوة أسود

Tamandua nigra (S). Tamandua noir (F).

٥٥٧٨ - تمندوة يئسي اللون

Tamandua straminea (S). Tamandua couleur de paille (F).

٥٥٧٩ - تمندوة مسروج

Tamandua sellata (S). Tamandua à selle (F).

٥٥٨٠ - تمندوة مستطيل الذيل

Tamandua longicauda (S). Tamandua à longue queue (F).

والنسرين والاعتناء بجميع الزهور الصيفية مع مكانة حشراتنا وأوصافها الفطرية .

٥٥٩١ - تمنوفيل - Rotation (F). Rotation (E).
الحركة حول محور أو دورة محورية .

٥٥٩٢ - تمنوفيل - Financement (F).
Financing (E).
التمويل الامداد بالمال .

٥٥٩٣ - تمير* ، تميرة* ، أبو تميرة* ، ابن تميرة*
Cinnyris, Nectarina (S). Souis-Mangas, Suce-fleurs (F). Sunbird, Bloom-suyger, Suyker-woogel (E).

جنس طير من فصيلة المغريات ورثة الجواثم الرقيقات المناقير . انواعه ٢٣ أعطائها افريقية ومدغشكر وبعض الجزر والمناطق الاسيوية الحارة . جميعها عصافير صغيرة القد مستطيلة المناقير والالسة المنمطة الخيطية الزوائد الطرفية . اثواب ذكورها جميلة الالوان المتراكبة المتداخلة الزاهية . وهي تجرس الزهر كالنحل وتأكل التمر وكل ثمر حلو المذاق || تدن في الادغال القليلة الارتفاع . اناثها تضع من ٤ الى ٦ بيضات تحضنها بمنوبة الذكور . اشهر انواعه ما يتبع .

٥٥٩٤ - تمير أبيض البطن ، نسك
Cinnyris albiventris (S).
تمير صغير القد ابيض البطن موطنه الخليج الفارسي .

٥٥٩٥ - تمير النيل
Nectarina metallica (S).
نوع من التمير صغير القد متراكب الالوان السفعية الموج موطنه وادي النيل والحبشة والصومال .

٥٥٩٦ - تمير حبشي
Cinnyris habessinicus (S).
نوع من التمير صغير القد متراكب الالوان الزاهية موطنه الحبشة واثريه وحوض البحر الاحمر .

٥٥٩٧ - تمير فلسطيني ، أبو الزهور
Cinnyris oseea (S).
نوع من التمير صغير القد جميل الالوان الزاهية . موطنه فلسطين ولبنان الجنوبي . يكثر في غور الاردن .

٥٥٩٨ - تميككة صغيرة* ، قوبعة البراعم ، قوبعة الزعرور ، قوبعة الأشجار المثمرة .

Recurvaria nanella, R. crataegella (S).
Teigne des bourgaons, T. de l'aubépine, T. des arbres fruitiers (F). Lesser bud moth (E).

حشرة من فصيلة القوبيات حشرقيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الادنى الى اوروبا وامريكا . فراشتها عسفة تعيش على مخزونها الامعائي . سرفتها خاضعة لاغمة تثقب البراعم الزهرية وتعيش في داخلها وتقضم نصل الاوراق . تركب الزعرور والتفاح والمشمش والخوخ والدراق ولا تمف عن اللوز والكرز والاجاص || جسمها صغير قضيبي يطول نحو ٤ مم . بسطتها تراوح من ١٠ الى ١٢ مم . رأسها صغير الجرم ، اسمر الطحله . عينها صغيرتان . زباناها خيطيان . ملامسها نحيلة . مرشفها جذعة . جوشها اطحل اللون حنطي الموج كالبطن || روشنها الاماميان الى الطحلة الخنطية يعلوها تسبيج وزرشة بيضاء . روشنها

٥٥٨٦ - تمنوفيل أشهب* ، بطرحة*
Thamnophilus cinereus (S).
Thamnophile gris, Batara (F).

طائر من التمنوفيل وفصيلة الجيثلديات . موطنه غابات البرازيل . ملجئه الحياتي زوجي . قوته الحشرات والديدان والوزغ وفئران الحقل .. || جسمه ربعة يطول نحو ٢١ سم . رأسه كبير الجرم تملوه كشة صغيرة منعدلة على القفن . منقاده ذرب ضليع . ثوبه الى الشبهة . رأسه وكشته الى الجؤوة . زوره وصدره مقلدان بالجؤوة السعفاء الموج . جناحاه مبقمان بالاحمر الالفس . ذنبه مجذع بالاحمر الامفر || يدنن عشه في الاشجار الرفيعة الملتفة الافناد والافنان الانثى تحضن وحدها من ٤ الى ٥ بيضات . الذكر يؤمن لها الغذاء والحماية .

٥٥٨٧ - تميه
Ranci (F). Rancid (E).
التمه من الدهن واللبن واللحم والطعام : الذي فسد وتغير ريحه وطعمه .

٥٥٨٨ - تموء
Hydratation (F). Hydration (E).
التموء عملية اتحاد الماء او مركباته مع بعض المعادن او الاجسام .

٥٥٨٩ - تموجي
Ondulatoire (F). Undulatory (E).
نمت تمريني يطلق على ما كان طابعه الحركة الموجية .

٥٥٩٠ - تموز
Juillet (F). July (E).
يعرف ايضا بـ يوليو . الشهر السابع من السنة الشمسية . وهو من شهور الصيف الحارة . مدته واحد وثلاثون يوماً . في العقد الاول منه تطلع الشعرى وفي اليوم الثامن عشر تبندى الباحور العربية (راجع باحور) .
تقويمه الزراعي - اعماله الزراعية عديدة اخصها :

١ - في الزراعات العامة الموسمية : العناية بزراعة القطن ، متابعة عرقها وربها وتعشيبها مع مكافحة حشراتنا واوصافها الفطرية . توزيع الاسمدة على الاراضي المعدة للزراعات الشتوية . تعشيب زراعات التبغ ومتابعة قطاف الاوراق وتجفيفها . متابعة اسقاء التبوغ المروية اخصها الفرجينية وعدم الاسراف في سقاية التبنك . متابعة الاعتناء بجميع الزراعات الصيفية ووقايتها من الحشرات والاوصام .

٢ - في الاشجار المثمرة : متابعة الاسقاء والعرق والتعشيب والتطعيم . مكافحة الحشرات والاوصام على اختلاف انواعها . توزيع الاسمدة الكيماوية اللازمة على التفاح والاجاص والسفرجل والدراق . لتسكينها من الادخار اللازم للسوم الثقيل . متابعة وانهاء التطعيم الرقي في اللوزيات .

٣ - في الحمضيات : متابعة العرق والتعشيب والاسقاء . يحسن من الاشجار الكثيرة الحمل ببعض الاسمدة الازوتية السريعة التمثيل كالنترات . المباشرة بتطعيم النصبوب . متابعة مكافحة الحشرات القشرية .

٤ - في الاشجار المختلفة : اسقاء الموز وتعشيبه وتوزيع الاسمدة الكيماوية المركبة مع الانتباه لجوب اكلتار عنصر البوتاس الضروري للثمر . اما في الكرومة فن الواجب متابعة استعمال الفواطير الخاصة بالارماد والميلديو .

٥ - في البقول والزهور : اعداد مشاتل البندوة والباذنجان والملفوف ... بذر مشاتل الزهور الشتوية . تطعيم الورد



تمنوفيل أشهب



تمير



تميككة صغيرة

٥٦١١ - **تَنَاسُلُ يَرْقِيّ** ^٥ Paedogenèse.

Pédogenèse (F), Paedogenesis (E).

التناسل اليرقي ملجن وراثي يكيّف استمرار الحياة عند بعض فئات الحشرات والحيوانات الدنيا فينجم اما عن القمعة او عن اخصاب العناصر الجنسية او عن التوالد العذري .

٥٦١٢ - **تَنَاسُلِيّ، نَزْوِيّ** ^٥ Génital, Génésique (F).

Genital (E).

صفة ما يعود الى التناسل او ما يمت الى اعضاء التناسل .

٥٦١٣ - **تَنَاسُلِيّ** Générationnel (F).

Generational (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما يتم عن طريق التناسل او التوالد .

٥٦١٤ - **تَنَاف، تَنَافُر، تَنَاقُص**

Incompatibilité (F), Incompatibility (E).

هو عدم ملائمة الاشياء بعضها الى بعض .

٥٦١٥ - **تَنَافُذ** Osmose (F), Osmose, Osmosis (E).

التنافذ او التحال او الانتشار الغشائي هي الخاصية التي تمكن مرور السوائل والمواد البلورية المذابة خلال الحواجز الطبيعية ذات المسام .

٥٦١٦ - **تَنَافُذُ خَارِجِي** Exosmose

راجع تحال خارجي .

٥٦١٧ - **تَنَافُذُ دَاخِلِي** Endosmose

راجع تحال داخلي .

٥٦١٨ - **تَنَافُذِيّ، تَنَاضُجِيّ** Osmotique (F).

Osmotic (E).

صفة ما هو خاضع للتنافذ .

٥٦١٩ - **تَنَافُر** Discordance (F), Discordancy (E).

صفة الشيء العادم التناسب والانسجام .

٥٦٢٠ - **تَنَافُسِيّ** Compétitif (F).

Competitive (E).

ما هو قابل المنافسة او له علاقة بها .

٥٦٢١ - **تَنَاقُصِيّ** Dégressif (F).

Decreasing (E).

٥٦٢٢ - **تَنَاوُب** Relais (F), Relay (E).

٥٦٢٣ - **تُنْبَاك، تُمْبَاك** Tombac

نبات زراعي صناعي تكثر زراعته في ايران وسورية ولبنان حيث يستعملون اوراقه الجافة للتدخين بواسطة الازاكيل . وهو نبات حولي متوسط الانتاج يستلزم الري . زراعته كزراعة التبغ تخضع لنظام الحصر ان في لبنان او في سورية || ضروره عديدة اشهرها الاصفهاني والشيرازي .

٥٦٢٤ - **تُنْبَاك أَصْفَهَانِي***

Nicotiana petunioides alata persica (S).

ضرب من التنباك يتميز باوراقه الخاصة الفارشة . نصلها كبير القد ، متمج الصفحة ، قلبي القاعدة ، ذرب الزام الاخير || منه تحدر التنباك اللبناني الذي تحافظ على سلامته ادارة حصر التبغ ومنه ايضاً تحدر التنباك اللاذقاني الذي اصبح الآن سمخة مستقلة || زراعته مروية . يعود

الخطفيان الى الشبهة السورية . اهدابها كبيرة || لها جبل واحد في الحول . تظهر الفراشة في حزيران . حياتها قصيرة الامل تعيش نحو ١٥ يوماً . تسرح من الغروب الى فحة الليل . تعاغل بعد ظهورها بيومين وتباشر متح الممكن بعد الكوم بيوم واحد وتلقه مبحادياً في مجموعات لامتناهية العدد على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة عند بلوغها الادراك التام تطول من ٥ الى ٦ م . جسمها اسطواني الشكل ، دقيق الجسم ، امغر اللون ، اسود الرأس ، يعلوه في ثيج الظهر ثعل جؤوية صغيرة يتوسطها هلب قصير منتصب || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً يتقضي ضمن صلجة تنسجها السرفة داخل طيات الاوراق المشبوكة التي حبكتها في آخر طورها اليرقي .

٥٥٩٩ - **تُمَيْلَة** دوية على قدر الهرة (الجاحظ) .

٥٦٠٠ - **تَمَيِّيز** Différenciation (F).

Differentiation (E).

تقدير الفرق بين شيئين او اكثر .

٥٦٠١ - **تُنْ** Thon (F), Tunny-fish (E).

هو التون ، اطله . الواحدة تنه .

٥٦٠٢ - **تَنَاتُل** Hétérogénéité (F).

Heterogeneity (E).

التناتل والزمع والزماع هي صفة الاشياء غير المتجانسة .

٥٦٠٣ - **تَنَاجُل** Multiplication

هو التكاثر عند الحيوان والحشرات .

٥٦٠٤ - **تَنَازُل** Désistement (F), Desistance (E).

هو ان يترك المرء بمطلق ارادته حقاً له او فائدة تعود عليه .

٥٦٠٥ - **تَنَاسُب** Homogénéité (F).

Homogeneity (E).

راجع تجانس .

٥٦٠٦ - **تَنَاسُق، تَنَاطُر، مُطَابَقَة، مُعَادَلَة**

Symétrie (F), Symmetry (E).

ترتيب اجزاء مماثلة في مجموعة واحدة منسجمة التنظيم .

٥٦٠٧ - **تَنَاسُقِيَّة** ^٥ Uniformitarisme (F).

Uniformitarism (E).

نظرية تأهسية تقول بوجود ايفساح ماضي الكرة الارضية والكائنات الحية بناء على المعطيات الحالية واستناداً الى مدى تأثيراتها التطويرية في الوثل الحكمي والاضاضي العام .

٥٦٠٨ - **تَنَاسُل، قَوَالِد** Reproduction

هو في الحيوان والنبات مجموعة الطرائق المتبعة في الاكثار التناسلي الصحيح للوصول الى الافراد والسلالات المقصودة . وقد يتم ذلك بالاصطفاء والتصلب والتيجين والتخليط .

٥٦٠٩ - **تَنَاسُلُ تَنَاطُي** Généagenèse (F).

Geneagenesis (E).

ريدعى التناسل الدوري او التعاقبي .

٥٦١٠ - **تَنَاسُلُ شَقِيّ** Sexiparité (F).

Sexiparity (E).

التناسل الشقي تناسل يوجب التحام الركن الذكري بالانثوي .



تنباك لبناني أصفهاني الأصل

والمشتى || اثوابها جميلة الالوان . اجسامها صغيرة . مناقيرها مخروطية غليظة . قوائمها معتدلة الطول . اجنحتها ذلقة الاطراف . اطول قوائمها الثانية والثالثة والرابعة ، اما الاولى والخامسة فتساويتان || تألف الحياة الجاهلية والحراج والغابات . قوتها البزور البرية والحشرات || تتميز باقتباس الالحان وترديدها || أشهرها التنجي القرمزي والتنجي الوردي .

٥٦٣٤ - تنجبي قيرمزي *

Carpodacus erythrins, Erythrins erythrins (S).
Roselin cramoisi (F). *Scarlet grosbeak* (E).

طائر من التنجي موطنه الشرق الاوسط وبعض مناطق اوروبا الجنوبية والغربية || جسمه يطول نحو ١٤ سم . ثوبه الى الحمرة القرمزية السفعاء الموج يعقب في الرأس والرداء والظهر والصدر وتعلوه مابجات مختلفة في الجناح والذنب تراوح من الكلسة الى الشبهة . بطنه الى الحمرة الصنابية تحف وتبيض مع اقترابها من الافنيك . عيناه عسلتان . مناقره وقائمته واصابعه الى السمرة || يألف الحراج والغابات والاجام ومجاري الماء والحدائق . سر به لا يتجاوز عشرة ازواج || قوته البزور البرية والحشرات الصغيرة || يدثن عشه في الاشجار القليلة ، الاثني تضع من ٤ الى ٥ بيضات مرة واحدة في العام . الحفن يستمر نحو ١٢ يوماً تقوم به الاثني دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء || يألف القفص ويقتبس الالحان والتأديب .

٥٦٣٥ - تنجبي وزدي

Carpodacus roseus, Erythrins rosea (S). *Roselin rose* (F).
طائر من التنجي موطنه اوروبا الوسطى وروسية || جسمه يطول نحو ١٥ سم . ثوبه الى الحمرة القرمزية الوردية الموج . جبهته بيضاء وجناحاه مجذعان بمجذتين لونهما الى الوردية البيضاء الماجة || يألف حراج السديان والبتولا . سر به نحو ستة ازواج . قوته البزور البرية وبعض الحشرات || يدثن عشه في الاشجار القريبة من مجاري الماء .

٥٦٣٦ - تنسخ

Acclimater (F). *To acclimatize* (E).
اخضع الحيوان او النبات الى مناخ لم يألفه سابقاً .

٥٦٣٧ - تندر

Tundra (F). *Tundra* (E).
التندر سهول مترامية الاطراف تمتد على شواطئ بحر الجليد من سيبيريا الى دائرة القطب . تربتها لا تعرف ذوبان الجليد السطحي الا في فصل الصيف . نباتها الطوعي طحالب وخزاز ولا يعيش فيها من الحيوان الاليف سوى قطمان الرنة .

٥٦٣٨ - تنسيق ، ترتيب

Manutention (F). *Management* (E).
٥٦٣٩ - تنشيع
هو التركيز .

٥٦٤٠ - تنشيف

Séchage (F). *Drying* (E).
٥٦٤١ - تنصّاب ، عراض
من عرض الشيء لتصريفه او بيعه .

٥٦٤٢ - تنصّب ، سداد

Capparis sodada (S). *Câprier du désert* (F).
نبات معمر مداد عارض من فصيلة الكبريات . يكثر

في الاتربة المتوسطة الاندماج ، العميقة الغور ، الغنية بالمواد العضوية والعناصر المعدنية . يزرع بمعدل ٤ شتول في المتر المربع . تقرف شتوله قبل الازهار وبعد انتزاع الاوراق السفلى العادمة الفائدة . ويترك على الساق الواحدة من اربع الى خمس ورقات تقطع وتجفف عند اكتمال ازرباها .

٥٦٢٥ - تنباك شيرازي

Nicotiana rustica asiatica persica (S).
ضرب من التنباك يتميز باوراقه المنعقة القلبية الشكل . نصلها مالم الصفحة المتوسطة القد . اوراقه الجافة عادمة التبقيج ، سوية اللون الكستني الفاتح || يزرع ويعامل كالتيغ دون اللجوء الى القرف او خصي الازهار . يجفف باقتلاع الشتول وتعريضها لاشعة الشمس . يوصف ويرزم بسوقه واوراقه وازهاره . يستعمل استعمال التنباك الاصفهانى .

٥٦٢٦ - تنبل

Betel, Temboul (F). *Betel pepper* (E).
راجع تامول .

٥٦٢٧ - تنبيت

Levée (F). *Raising* (E).
التبيت هو اول خروج النبات . راجع قصوع .

٥٦٢٨ - تنبيغ ، جب

Pollinisation artificielle (F). *Artificial pollinization* (E).
هو تعفير الازهار الانثوية بمجذرات ولبع الازهار الذكرية . وهي عملية شائعة الاستعمال بالنخل وبغيره من النباتات الثنائية المسكن او الضعيفة الاخصاب الذاتي .

٥٦٢٩ - تنسيق ، تنسيق ، تنسيق

Plantation en lignes (F). *Planting in lines* (E).
هو الفرس بالصف في خطوط متساوية الابعاد . يقال صف وفسق وقسط ونبق النصب اي غرسها صفوف متتامة متساوية الابعاد .

٥٦٣٠ - تنبيه

Avertissement, Information
راجع إنذار .

٥٦٣١ - تنثورة مجيدة

Tanyptera gloriosa (S). *Tanyptère glorieuse* (F).
حشرة لامؤذية من فصيلة القمصيات . جسمها معتدل القد يطول من ١٤ الى ٢٤ سم || ثوبها الى السمرة القاتمة يعملوها طوق احمر يكتنف الزام الاول من البطن || زباناها قلادينان . روشناتها الى الصفار الكبريتي . قوائمها حنطية ، صنابية الموج || الاثني اكبر قدماً من الذكر . تظهر الحشرة الجملانة من ايار الى آب . تألف الحراج والغابات والحدائق || تمتع الاثني مكنها في لحاء الاشجار الحرمة النخرة ، اخصها السديان ، فيتنف عن يرقات تعيش على المواد النهائية المنحلّة .

٥٦٣٢ - تنثيش

Egermage (F).
ازالة نتوش الشعر المعد لصنع الجعة .

٥٦٣٣ - تنجبي

Carpodacus, Erythrins (S). *Roselin* (F).
جنس طير من فصيلة الشرشوريات ورتبة الجواثم مخروطيات المناقير . انواعه المعروفة نحو ٥ منتشرة من اليابان الى الشرق الاوسط واروبة . جميعها من الضوارب التي تنتقل من منطقة الى اخرى سعيًا وراء الكرزق او طلباً للمصيف



تنجي قيرمزي

زوج ومنها السرب الذي يعد من ١٠٠ إلى ١٠٠٠ زوج وأكثر || اجسامها تراوح بين الصغيرة والوسطى . مناقيدها مخروطية الشكل او شبه مخروطية ، مسننة اطراف الافاك العليا . اجنحتها واذناها معتدلة الطول . اثنائها متداخلة الالوان الزاهية || قوتها الثمار والبذور والحشرات || اعرف انواعها واشهرها التنفر والبيرنيسة والرمفوسيل والعزاف والوسيم ...



تنصيد

٥٦٥٠ - تَنْغِيل Métissage (F). Cross-breeding (E).
راجع إنثال وتغيل .

٥٦٥١ - تَنْفَس Respiration
عمل فيزيولوجي طبيعي تقوم به الاجسام الحية غايته ادخال الاكسجين على دم الحيوان ونسج النبات وطرده الحامض الكربونيكي والماء .

٥٦٥٢ - تَنْفِيذ، تَحْقِيق Exécution, Réalisation (F). Execution, Realization (E).
اجراء ما صار الاتفاق عليه .

٥٦٥٣ - تَنْقُس Tanche (F). Tench (E).
هو الكمه من الاسماك النهرية ، اطلبه .



تنظ

٥٦٥٤ - تَنْقِيب Forage (F). Boring (E).
البحث ، بسر الغور ، عن المعادن والمياه .

٥٦٥٥ - تَنْقِيَة Raffinage (F). Refining (E).
هي التصفية الفنية التي بواسطتها يمكن تحديد نسبة جميع العناصر .

٥٦٥٦ - تَنْقِيل Dépotage, Rempotage (F). Unpotting, Repotting (E).
التنقل او تبديل الاصيص او تغيير المكن هو نقل التينة من شقفة الى اخرى اكبر حجماً او اجود تربة .

٥٦٥٧ - تَنْكُور Thincore
جنس طير من فصيلة النفرقيات . انواعه قليلة . قوتها الاعشاب والحبوب والحشرات . تألف السهول والحقول والمراعي . شكلها بين الحجل والحباري . مستدقة الجثة طولها من ١٨ الى ٢٠ سم . ثوبها الى الرعدة الصهباء الموشحة والموشة بالابيض والخطي والاسمر || الاثني تدن في الارض بين الاعشاب . تبطن افحوصها بالقش والوبر تبيض وتحضن من ثلاث الى اربع بيضات .



تنقرة

٥٦٥٨ - تَنْوَب Ables (S). Sapin (F). Fir-tree, Silver fir (E). Tanne (D). Abeto (I).
جنس اشجار عروة دائمة الخضار من التنوبيات وفصيلة الصنوبريات . انواعه نحو ٢٥ منتشرة في جميع اصقاع العالم . منها الباسقة العظيمة القد التي يبلغ ارتفاعها نحو ٩٠ م . ومنها المتوسطة الحجم التي تملو نحو ٢٠ م . اخشابها شائعة الاستعمال . يستخرج منها عصارة وانتجية بلسمية عيمة النفع والاستعمال || اشهر انواعه الحرجية والتزيينية ما يتبع .



تنكور

٥٦٥٩ - تَنْوَب أبيض
هو التنوب السوي اللون ، اطلبه .

٥٦٦٠ - تَنْوَب إسباني هو التنوب الصنوبري ، اطلبه .

وجوده في البلاد الصحراوية الحارة . ثماره عننية حمراء اللون مأكولة || ثمرته تدعى تنصبة .

٥٦٤٣ - تَنْصِيد Stratification
هو وضع البذور الصلبة القشور بين طبقات من الرمل الرطب لتسهيل انتاشها والسرعة فيه . ويستعمل ايضاً للفاسائل والعقل فيسهل بروز جذورها .

٥٦٤٤ - تَنْطَل Tantale (F). Tantalus (E).
جنس طير من طوال الساق ينتمي الى فصيلة التنطليات انواعه اربعة جميعها من القواطع . تجوب البلاد الحارة والاستوائية الافريقية والامريكية . تتميز باستطالة مناقيدها الاسفينية الشكل المقوسة . اثنائها مختلفة الالوان فيها الابيض السوي والابيض الموشح بالاسود ثم الوردي المتمازج والوردي الموشم بالاغبر || تألف المناقع وصفاف الأنهر ومجاري الماء . قوتها العطاء والصفادع والاسماك والحشرات والجيف الخ .

٥٦٤٥ - تَنْطَلِيَّات ، حَارِسِيَّات Tantalidae, Ibididae (S). Tantalidés, Ibididés (F). Ibididae (E).
فصيلة طير من رتبة طوال الساق . اجناسها عديدة نحو ٢٢ جميعها من الطيور القواطع . قريبة الشبه من البلشون والقلق . تتميز بمناقيدها المستطيلة ، الاسفينية الشكل ، المقوسة .

٥٦٤٦ - تَنْظِيف ، كَرِي ، قَبْث Curage (F). Cleansing (E).
هو تنظيف المجاري والاقنية من الاعشاب والرحول ..

٥٦٤٧ - تَنْظِيم Alignement (F). Alinement (E).
هو تخطيط الطرق العامة .

٥٦٤٨ - تَنْفَرَة Tangara (S). Tangara (F). Tanager (E).
جنس طير من فصيلة التنفريات . انواعه المعروفة نحو ٦٠ مواطنها تمتد من امريكا الجنوبية الى الوسطى وبعض مناطق الشمالية . تألف الادغال والغابات والاسراج المبهمة الاشجار . نظامها الحياتي جماعي . اسراها متفاوتة العدد || اجسامها صغيرة القد . مناقيدها صغيرة مخروطية الشكل . اجنحتها رتاجية معتدلة الحجم . اذناها متوسطة القد ، مستديرة الاطراف . ارساغها دقيقة . اصابعها نشيطة . اثنائها جميلة الالوان الزاهية ، المتداخلة ، الملبقة ، فيها الاحمر والاصفر والاسود والاخضر والازرق والالطلح والارمك والاصهب والصنابي || معظم انواعها يعيش على البذور والحشرات وبعضها على البذور والثمار || تدن اعشاشها في الادغال وفي الاشجار الداسية على ارتفاع بضعة اقدام عن سطح الارض . اناثها تضع من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور من ١٣ الى ١٥ يوماً .

٥٦٤٩ - تَنْفَرِيَّات Tanagridae (S). Tanagridés (F). Tanagridae (E).
فصيلة طير من الجواثم مخروطيات المناقير . انواعها المعروفة كثيرة العدد ، نحو ٤٢٠ ، تنضم الى عدة اجناس . جميعها من طيور امريكا الجنوبية والوسطى ولا يوجد منها في امريكا الشمالية سوى الصوارب التي تمضي فصل الصيف ثم تعود الى اعطائها . نظامها الحياتي جماعي . مجموعاتها متفاوتة العدد ، منها الفوج الذي يعد من ٤٠ الى ١٠٠ .

٥٦٦١ - تنوب القفقاس

هو التنوب المسكوبي ، اطلبه .

٥٦٦٢ - تنوب أناضولي ، تنوب كيليكية ،

قطراني أصفر

Abies cilicica (S).
Sapin de Cilicie, S. cilicien (F). Cilician fir, Cilician pruce (E). Cilicianische tanne (D). Abeto del Cilicia (I).

شجرة سبروتية متوسطة القد تعلو من ٣٠ الى ٣٥ م. اهدابها صغيرة تطول نحو ٣ سم. اكرازها مستطيلة الشكل سطحية الاسقاط لونها الى الخضرة .

٥٦٦٣ - تنوب باماسي *

Abies grandis (S).
Sapin élané, S. de Vancouver (F).

شجرة باسقة تعلو من ٦٠ الى ٩٠ م. اهدابها حرشفية مسطحة تبدو كاسنان المشط . اكرازها مخروطية الشكل ، متوسطة القد ، غائرة الاسقاط .

٥٦٦٤ - تنوب بياسي هو التنوب السوي اللون ، اطلبه .

٥٦٦٥ - تنوب جميل ، تنوب ظريفي ، تنوب

مستحب ، قطراني

Abies amabilis (S).
Sapin gracieux (F). Spruce, Silver fir (E). Liebliche tanne, Silber tanne (D). Abeto amabile (I).

شجرة سبروتية كبيرة القد تعلو من ٥٠ الى ٦٠ م. اهدابها صغيرة طولها نحو ٣ سم. لونها الى الخضار الزاهي ، دعكها فواح العرف الراتنجي . اكرازها مستطيلة تبدو جؤوية اللون ثم تنحرف الى الخطي الاصفر . اسقاطها عادية ظاهرة الجوانب .

٥٦٦٦ - تنوب رومي

Abies cephalonica (S).
Sapin de Céphalonie, S. hellénique (F). Greek fir, Black mountain fir (E) Fichten tanne (D). Abeto d'Ellenico (I).

شجرة سبروتية متوسطة القد تعلو من ٢٠ الى ٢٥ م. اهدابها شائكة العقصة ، صغيرة ، طولها نحو ٣ سم. لونها الى الاخضر الزاهي . اكرازها مستطيلة نافرة الاسقاط لونها الى الخضرة .

٥٦٦٧ - تنوب سوي اللون ، تنوب بياسي ،

تنوب أبيض

Abies concolor (S).
Sapin concolore, Sapin blanc (F). White silver fir, White spruce (E). Kalifornische tanne (D). Abeto bianco (I).

شجرة كبيرة القد سريعة النمو تعلو من ٣٠ الى ٥٠ م. اهدابها مزدوجة الانتشاب طولها من ٦ الى ٨ سم. عرضها من ٢ الى ٣ م. افئفاتها الفتية ونواميها الى الريدة الطحلاء . اكرازها مستطيلة يراوح طولها من ٨ الى ١٤ سم. وقطرها من ٣ الى ٥ سم.

٥٦٦٨ - تنوب سيبيري

Abies sibirica (S).
Sapin de Sibérie (F).

شجرة سبروتية متوسطة القد تعلو من ٣٠ الى ٤٠ م. اهدابها خيطية لونها الى الريدة الطحلاء . اكرازها صغيرة طولها من ٥ الى ٨ سم. قطرها ٣ سم. لونها الى السمرة البنية . اسقاطها غائرة .

٥٦٦٩ - تنوب صنوبري ، تنوب إسباني

Abies pinsapo (S). Sapin pinsapo, Pinsapo (F).

شجرة سبروتية جميلة الشكل متوسطة القد تعلو من ٢٠ الى ٢٥ م. اهدابها قصيرة ثخينة مدبة الطرف ، سوية اللون الاخضر الاطل ، اكرازها جؤوية اللون طولها من ١٠ الى ١٥ سم. قطرها نحو ٤ سم. اسقاطها غائرة .



تنوب باسق



تنوب فخيم

٥٦٧٠ - تنوب ظريفي هو التنوب الجميل ، اطلبه .

٥٦٧١ - تنوب قاحير ، تنوب نبييل

Abies nobilis (S). Sapin noble (F). Noble fir (E). Edel tanne (D). Abeto nobile (I).

شجرة كبيرة الحجم جميلة الشكل تعلو من ٧٠ الى ٩٠ م. اوراقها حرشفية مسطحة طولها نحو ٣ سم. اكرازها تبدو زرقاء اللون العابق ثم تنحرف الى البني الاسمر ، طولها من ١٥ الى ٢٥ سم. قطرها من ٦ الى ١٠ || تجود في جميع الاودية العميقة الغور التي لا تخلو من الرطوبة .

٥٦٧٢ - تنوب فخيم *

Abies magnifica (S).
Sapin magnifique, S. majestueux (F).

شجرة سبروتية كبيرة القد تعلو من ٥٠ الى ٧٥ م. اهدابها صغيرة ، طولها نحو ٢ سم. دعكها فواح العرف الراتنجي ، لونها اخضر الصفحة العليا فضي السفلى . اكرازها صغيرة مخروطية غائرة الاسقاط .

٥٦٧٣ - تنوب فضي هو التنوب المشطي ، اطلبه .

٥٦٧٤ - تنوب فيرما ، تنوب مؤمي

Abies firma (S). Sapin momi (F).

شجرة متوسطة القد تعلو من ٣٥ الى ٥٠ م. اهدابها سوية اللون الاخضر الباهت ، مدبة العقصة الشائكة . اكرازها صغيرة مستطيلة . اسقاطها نافرة . يكثر وجودها في الصين واليابان .

٥٦٧٥ - تنوب كيليكية هو التنوب الاناضولي ، اطلبه .

٥٦٧٦ - تنوب مسكوبي ، تنوب القفقاس

Abies nordmanniana (S). Sapin du Caucase (F).

شجرة سبروتية جميلة الشكل متوسطة النمو تعلو من ٣٠ الى ٥٠ م. اهدابها صغيرة ، مقطوبة الطرف ، شديدة الخضار . اكرازها بنية عابقة ، طولها من ١٥ الى ١٧ سم. قطرها نحو ٤ سم. اسقاطها ظاهرة . موطنها القفقاس والشرق الاوسط .

٥٦٧٧ - تنوب مشطي ، تنوب فضي

Abies pectinata, A. alba (S). Sapin pectiné, S. argenté, S. des Vosges (F). Common silver fir tree (E). Weiss tanne (D). Abeto comune, A. maschio (I).

شجرة كبيرة القد هرمية الشكل ، متوسطة النمو . تعلو من ٢٠ الى ٦٠ م. اهدابها مشطية الارتكاز متتامة . لون صفحة نصلها العليا يختلف من لون الصفحة السفلى . نواميه زباء . اكرازها مستطيلة لونها الى البني الاسمر . طولها من ١٠ الى ١٨ سم وقطرها من ٣ الى ٥ .

٥٦٧٨ - تنوب نبييل هو التنوب الفاخر ، اطلبه .

٥٦٧٩ - تنوبيات

Abletaceae (S).
Abletaceae, Pinaceae (F). Abletaceae (E).

عمارة من الصنوبريات تشمل التنوب والصنوبر والارز والاتسوفة والابيسة والسكوا وغيرها .

٥٦٨٠ - تنوبيات

Abletinées (F). Abies (E).

سبط من عمارة التنوبيات وفصيلة الصنوبريات .

٥٦٨١ - تنوخ

Ecologie (F). Ecology (E).

علم اثر البيئة على الكائنات الحية من حيوان ونبات .

ازهارها الى الصفار الزاهي الوهاج . ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٥٦٩٢ - تنوم القفقاس (S).
Trollie du Caucase (F).

عشبة برية وزراعية تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم. ازهارها برتقالية البتلات ، ارجوانية الاسدية والمياسم . ازهارها ربيعي .

٥٦٩٣ - تنوم رهيل (S).
Trollie lâche (F).

عشبة برية وزراعية تملو من ١٠ الى ٢٠ سم. ازهارها خاسية او سباعية الفصل . بتلاتها نحو ١٥ لوناً فستقي . ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

٥٦٩٤ - تنوم قعير (S).
Trollie épanoui (F).

عشبة تملو من ٤٠ الى ٨٠ سم. ازهارها جميلة الصفار المذهب . ازهارها ربيعي .

٥٦٩٥ - تنوم نجمي (S).
Trollie acule (F).

عشبة نجمية تملو من ٦ الى ١٠ سم. ازهارها سباعية الفصل الالقية الارتكاز ، البرتقالية اللون . بتلاتها صفر مذهب . ازهارها يستمر شهراً واحداً .

٥٦٩٦ - تنوير (F). Efflorescence (E).
راجع ازهار .

٥٦٩٧ - تينين (F).
the Dragon, Draco (E).

التنين كوكبة من ثمانين نجماً تشبه بشكلها ذاك الحيوان الخرافي المعروف بالتينين . موقعها الشمال . رأس التنين الذي يتشمل باربعة نجوم والقريب من كوكبة القيثارة ، يحابه كوكبة الجاني . اما جسمه فيمتد بين كوكبتين الدب الاكبر والاصغر . وذنبه منحرف نحو القطب || والعرب تسمي النجم الذي على اللسان « الرابض » ، والاربعة التي على الرأس العوائد ومنها « انور العوائد » و « اخفى العوائد » و « رأس الثعبان » . وفي وسط العوائد نجم صغير جداً يدعى « الربيع » . وتسمي التيرين اللذين على مؤخره « اللذين » . واللاتين اللذين هما في غاية الخفاء ، قبل اللذين ، « اظفار اللب » . وفي أصل اللب نجم يدعى « الذبيح » .

٥٦٩٨ - تينين مجنح * (S). Dragon ailé (F).
Flying dragon (E).

جنس حيوانات زحافة من العطاء المحميات الالسة . انواعها المعروفة ٨ اعطانها الهند الصينية وجزر الزابج جميعها صغيرة القد تطول من ١٥ الى ٢٠ سم. تحمل على جانبها اجنحة غضروفية تلتشرها كالمظلة ساعة تشاء تتمكنها من الانتقال بين الاشجار حيث تعيش . قوتها الحشرات والهوام .

٥٦٩٩ - نهبط (F).
Coliou à joues blanches (F).

طائر من الموزاييات يدعى حنطور ابيض المحاسر ، اطله .

٥٦٨٢ - تنوخ جماعي (F).
Synecology (E).

التنوخ اي علم اثر البيئة الذي يشمل جماعة نباتية تعيش في منطقة معينة محدودة || ويقابل التنوخ الجماعي تنوخ نوعي او فردي يقتصر على نوع واحد من النبات او على فرد واحد دون سواء .

٥٦٨٣ - تنوخي (F). Ecological (E).
ما هو منوط بالتنوخ اي باثر البيئة على الكائنات الحية .

٥٦٨٤ - تنور (F).
التنور هو الكانون يخبز فيه . وهو محفل ماء الوادي . وكل مفجر ماء .

٥٦٨٥ - تنوط * (S). Tisserin (F).
Weaver-bird (E).

جنس عصافير صغيرة القد ، بحجم الدوري ، من فصيلة التنوطيات . انواعها عديدة موطنها البلاد الحارة . اثنائها متراكبة الالوان فيها الاسود والابيض والاصفر والاخضر . تعيش جماعات كبيرة قوتها البزور والحشرات . تألف مجاري الماء . يقال لها النساجة لانها تنسج عشها وتحبكه بعناية فائقة . فيبدو بشكل ققمة متدلية فوق سطح الماء رباطها خيوط ليفية قوية || الانثى تبيض من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها اما الذكر فيعتني بالصفار من يوم نقفها الى حين طيرانها .

٥٦٨٦ - تنوطيات (S).
Plocéides (F). Plocéidae (E).

فصيلة طيور من الجواثم الخروطيات المناقير . اجناسها عديدة جميعها صغيرة القد اشهرها التنوط .

٥٦٨٧ - تنوم (F). Hemp-seed (E).
Chenevis (F).

ويدعى الطلام والقنبز وحب الشاهدانج .

٥٦٨٨ - تنوم (S). Trollie (F).
Globe-flower (E). Trollblume, Trollen (D). Luparia, Papparia (I).

جنس نباتات عشبية معمرة من الخربقيات وفصيلة الشقيقيات . اوراقها متعاقبة كفية مفرصة . ازهارها جميلة مستديرة عديدة البتلات تزرع للزينة || انواعها البرية والزراعية عديدة اعرفها ما يلي .

٥٦٨٩ - تنوم اوروبي * (S).
Trollie d'Europe, Boule d'or (F).

عشبة برية وزراعية تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم. ازهارها تاجية ، قرصية ، وحيدة ، كروية الشكل لونها الى الصفار العابق || ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

٥٦٩٠ - تنوم اسيوي (S).
Trollie d'Asie (F).

عشبة تزيينية تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم. ازهارها كبيرة القد لونها الى الصفار البرتقالي ، ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

٥٦٩١ - تنوم الصين (S).
Trollie de Chine (F).

عشبة برية وتزيينية متبها الصين تملو من ٣٠ الى ٤٠ سم.



تنوط



تنوم اوروبي



تينين مجنح

٥٧١٥ - **تَوَاقُتْ** (F). Isochronisme (F). Isochronism (E).
هو تساوي الدوام أو المدة .

٥٧١٦ - **تَوَالٍ ، خَلَوِيَّات** (F). Métazoaires (F).
Metazoa (E).

هي الحيوانات الدنيا من ذوات الخلايا المتعددة . تنمو وتتجمع بانقسام البويضة . وهي مركبة من خلايا كثيرة مختلفة الشكل والوظيفة . كما وأنها تقسم الى فئتين فئة ذوات المسام التي تتغذى بواسطة مسامها الدقيقة القائمة على سطوح أجسامها وفئة ذوات القناة الهضمية التي تتغذى بواسطة افواهها اللاقطة :

٥٧١٧ - **تَوَالِد** Reproduction
هو التناسل راجعه .

٥٧١٨ - **تَوَالِدٌ خَارِجِيٌّ** (F). Ectogénèse (F).
Ectogenesis (E).
النمو خارج الجسم .

٥٧١٩ - **تَوَام** (F). Jumeau (F). Twin (E).
التوأم من جميع الحيوان : المولود مع غيره في بطن واحد .
ج توأم وتوأم .

٥٧٢٠ - **تَوَامَان**
التوأمين عشبة صغيرة لها ثمرة مثل الكمون كثيرة الورق تثبت في القيعان مسطحة ولها زهرة صفراء (أبو حنيفة) .

٥٧٢١ - **تَوَامِي** (F). Gémíné (F). Geminé (E).
نعت وصفي يدل على كل ما هو ثنائي الترتيب .

٥٧٢٢ - **تَوَامِي الزَّهَر** Gémelliflore, Gémíniflore
نعت وصفي يطلق على الازهار الشفعية العدد ، الثنائية الترتيب .

٥٧٢٣ - **تُوبَال الحديد ، خَبَث الحديد ، سكوري توماس ، فُسْفَاة توماس**

Phosphates métallurgiques, P. Thomas, Scories de déphosphoration, S. Thomas
نوع من الاسمدة الفسفورية المعدنية القاعدية الناجمة عن صناعة الحديد والناتجة عن استعمال طريقة توماس في تحويل الفسفور المفصول عن الحديد الى فسفات الكلس || مظهره الخارجي مسحوق ناعم ، رصاصي اللون ، قليل التحسس بالرطوبة ، ثقيل الوزن النسبي ، لا يذوب بالماء العذب نظراً لاتحاد الحامض الفسفوري بالكلس والسيليس ولا ينجرف بمياه الري ولا يغور من الامطار بل يذوب تدريجياً تحت تأثير المياه المشبعة بالحوامض العضوية ، اخصها الحامض الكربوني || ومن ميزاته الخاصة ان املاح التربة وحوامضها لا تمنع انفعاله وتمثيله . اما متوسط تركيبه العنصري فهو ما يلي :

حامض فسفوري	من ١٥	الى ٢٣ %
كلس	من ٤٥	الى ٥٥ %
سيليس	من ٧	الى ١٠ %
أكسيد الحديد	من ٧	الى ٩ %
منغنيزا	من ٤	الى ٥ %
منيزا	من ٢	الى ٦ %

ويحوي ايضاً بعض العناصر المكونة الزهيدة النسبة كالكبريت والنحاس والكروم والكوبلت الخ ... يستعمل أولاً في تسميد الاشجار المثمرة على اختلاف اجناسها وانواعها ثم في تسميد معظم الزراعات الحولية كالحنظل

٥٧٠٠ - **تَهْنِيد** (F). Défécation (F).
Defecation, Clarification (E).
هي في صناعة السكر ، تصفية العصارة السكرية بواسطة الكلس .

٥٧٠١ - **تَهْنِجِين** (F). Hybridation (F). Hybridization (E).
هو في النبات تأبير نباتان من نوعين أو ضربين مختلفين .

٥٧٠٢ - **تَهْدِيب** (F). Cueillette (époque) (F).
Gathering-time (E).
زمن جني الثمار .

٥٧٠٣ - **تَهْدِيل ، تَهْصِير**
انعطاف والتواء أغصان الشجرة نحو الارض .

٥٧٠٤ - **تَهْرِيف** (F). Précocité (F). Precocity (E).
هو الإبكار ، اطلبه .

٥٧٠٥ - **تَهْمَة** Terre orientée vers la mer
التهمة والتهم والتهايم والتهايم : الارض المنصوبة الى البحر .

٥٧٠٦ - **تَهْنُون** * (S). Bathyergus (S).
Bathyergue, Oryctère (F).

جنس حيوان من فصيلة الخلدات . انواعه قليلة العدد . اجسامها اسطوانية غليظة طويلاً نحو ٢٥ سم . قوائمها قصيرة . اطرافها جاسة قوية . عيونها خرزية صغيرة . آذانها لا قوفية . اذنانها تحمل شعر تعلق جرداع . اثوابها كثيفة الشعر لونها الى الصهبة المختلفة الموج تعبق مع اقترابها من ثبج الظهر || اناته تضع من الجروين الى الاربعة . يألف الشطوط الرملية . اجحاره عميقة الغور ، متشعبة الاتفاق العديدة . قوته ما استطاع من النبات .

٥٧٠٧ - **تَهْوِيَة** (F). Aération (F). Airing (E).
اطلاق المجال للهواء الرطب .

٥٧٠٨ - **تَهْيِيشَة** (F). Préformation (F).
Preformation (E).
نظرية علمية تعتبر ان جميع اعضاء الجسم مهيشة شكلياً في الملقوحة .

٥٧٠٩ - **تَهْيِيشَة الغَرْسَة** (F). Habillage du plant (F).
عملية زراعية الغاية منها تحضير الغرسة قبل وضعها في التربة وذلك بتشذيبها وتخفيف جذورها الكثيفة واقتطاع المعطوب منها الخ .

٥٧١٠ - **تَوَائِل** Condiments
هي المواد التي تضاف الى الاطعمة فتزيد الشهوة الى اكلها . والملح هو التابل الرئيسي للحيوان .

٥٧١١ - **تَوَاتُر** (F). Fréquence (F). Frequency (E).
التواتر هو التكرار الموقوت .

٥٧١٢ - **تَوَاتُرُ الأَخْطَار** (F). Fréquence des risques (F). Frequency of risks (E).
تكرار الاخطار في ظروف واوقات تبث الرية .

٥٧١٣ - **تَوَازُن القِيَوِي** (F). Equilibre des forces (F).
Equilibrium of forces (E).
هي المعادلة الحقيقية بين القوى المختلفة .

٥٧١٤ - **تَوَاطُؤ** Collusion
هو الاتفاق سراً بين اثنين أو أكثر على ايقاع الضرر بالغير .



تهنون

٥٧٣٠ - تَوْتُ الْعَلِيْق * Ronce framboise (F).

Loganberry (E).

هلاج من الفرامبواز والعليق صار تحقيقه في امريكة وهو جنبه معمرة مشمرة شائكة سوقها مدادة تطول من ٣ الى ٤ امتار. اوراقها مركبة لاقياسية التجسيم. وريقاتها شديدة الخضار، بارزة العروق، مسننة الحافة، خلية الصفحة السفلى. ثمارها شاميل كبيرة القدر وردية اللون لذيدة الطعم. زراعتها تدوم من ١٢ الى ١٥ سنة. تتكاثر بالفسائل التي تغرس على ابعاد بينية تراوح من ٢٥٠ الى ٣٠٠ سم. وابعاد متخللة تراوح من ٢٠٠ الى ٢٥٠ سم. || وهي ترطب في الارربة العميقة، المتوسطة الاندماج، الحسنة التركيب.

٥٧٣١ - تَوْتُ الْوَرَق Broussonetia papyrifera,

Morus papyrifera (S). Broussonétie, Mûrier à papier (F). Paper-mulberry (E). Japanischer papierbaum (D). Gelso papirifero, Moro da carta (I).

نوع من التوت الزراعي الصناعي مهدد الشرق الأقصى. اشجاره تعلو من ١٠ الى ١٥ م. اوراقه معنقة متعاقبة كاملة مسننة الحافة، ملساء النصل. ازهاره ثنائية المسكن. ثماره شمولية حراء اللون. قشور قصبانه تستعمل في صناعة الورق الصيني.

٥٧٣٢ - تَوْتَة ، تَوَلَة ، تَهْمُول Mûre (F).

Mulberry (E).

ثمرة التوت.

٥٧٣٣ - تَوْتَر Tension

حالة ما هو متوتر.

٥٧٣٤ - تَوْتِيَا Tuthie, Tutle (F). Tutty (E).

التوتيا والتوتياء هي اكسيد الزنك، اطلب ذلك.

٥٧٣٥ - تَوْتِيَا ، كَرْتَمَان Echinus melo (S).

Oursin melon (F). Sea urchin (E).

نوع من الاخينوس المأكول. اعطانه بحار البلاد الحارة يكثر في بحري المتوسط والقلزوم وهو كروي الشكل كثير الشوك مستطيل الجرامز الدقيقة المنتهية بمحاجم ونمية القدر.

٥٧٣٦ - تَوْتِيَا Moracées, Morées (F).

Moraceae (E).

سبط من فصيلة الانجريات اجناسه وانواعه عديدة اشهرها التوت.

٥٧٣٧ - تَوْتِيَا Sorosa

شكل من اشكال الثار يشبه التوتة.

٥٧٣٨ - تَوْجِيَه Orientation

راجع انحاء.

٥٧٣٩ - تَوْجِيَه الْيَمِين Délation de serment (F).

Informing of oath (E).

هو الزام احد الخصوم بحلف اليمين.

٥٧٤٠ - تَوْجِيَه Dirlisme (F). Dirligism (E).

التوجيهية مذهب سياسي اقتصادي زمانه بيد السلطة. راجع انتعائية.

٥٧٤١ - تَوْخِيْف Macération (F). Maceration (E).

اطلب ونحف.

والبطاطا والبوندر والبندورة والباذنجان وقصب السكر والتبوغ والزرور والنباتات الزيتية. ولما كان لا يجوز مزجه بسائر الاسمدة على السواء نقول:

١ - انه يمكن مزجه قبل الاستعمال وبدون تحديد وقت بنيترات الصودا ونيترات الجير والسياناميد ومساحيق العظام.

ب - انه يمكن مزجه عند الاستعمال فقط باملاص البوتاس وبصلحات الجص والمغنيزا والبورق.

ج - لا يجوز مزجه بالاسمدة الامونياكية كسلفات الامونياك ونيترات الامونياك وسلفونيترات الامونياك.

د - لا يجوز استعماله مع الاسمدة العضوية كروث الماعز ونشكة الحيل ونخي البقر وبعر الجبال وسلح الدجاج الخ... الا بعد توزيع وطمر هذه الاسمدة بنحو اسبوعين.

٥٧٢٤ - تَوْبِير

التوبير: اخفاء معالم الاثر وقد يمارسه عفوياً بعض الحيوان كالارنب الوحشي، القواقع.

٥٧٢٥ - تَوْت ، تَوْت ، فَرَصَاد Morus (S).

Mûrier (F). Mulberry-tree (E).

جنس اشجار برية وزراعية من سبط التوتيات منبها البلاد الحارة وقد انتشرت في معظم الاصقاع المعتدلة || انواعه المعروفة لا تقل عن ٢٥ منها التوت الابيض الذي يربي عليه دود القز ومنها التوت الاسود المأكول الثمار والتوت الاحمر الخ.. جميعها لبينة العصاره سنبلية الازهار.

٥٧٢٦ - تَوْتُ أبيض، تَوْتُ الْقَز Morus alba (S).

Mûrier blanc (F). White mulberry-tree (E). Weisser maulbeerbaum, Weisse maulbeer (D). Moro, Gelso blanco, G. moro, G. romano (I).

نوع من التوت الزراعي الصيني الاصل. ساقه فراء. اوراقه عابله، معنقة، متعاقبة، قلبية الشكل، نصلها اخضر اللون، ثلاثي او خماسي التفصيص. ثماره شاميل مستطيلة، قصيرة الاذن، بيضاء او وردية اللون، مأكولة حلوة المذاق || اوراقه غذاء دود القز.

٥٧٢٧ - تَوْتُ أَحْمَر Morus rubra (S).

Mûrier rouge (F). Red mulberry-tree (E).

نوع من التوت الزراعي التزييني. اشجاره كبيرة القدر تعلو من ٢٠ الى ٢٥ م. اغصانه غليظة فارشة. اوراقه معنقة متعاقبة، نصلها قلبي الشكل، مستدير القاعدة، ناعم البشرة خلي الصفحة السفلى، خملها اطحل اللون. ثماره شمولية اسطوانية الشكل، ارجوانية اللون، تطول نحو ٣ سم. اخشابها ناعمة الرقعة، صلبة المكسر، صفراء اللون، تستعمل في الصناعات الخشبية.

٥٧٢٨ - تَوْتُ أَسْوَد ، تَوْتُ شَامِي Morus nigra (S). Mûrier noir (F). Black mulberry,

Sycamine, Blackberry bush (E). Schwarzer maulbeerbaum (D). Gelso nero (I).

نوع من التوت الزراعي الشرقي المنبت يزرع لثماره المأكولة المرية. اشجاره دائمة كبيرة القدر تعلو من ٨ الى ١٥ م. اوراقه عابله معنقة متعاقبة قلبية الشكل خشنة الملمس زباء الصفحة السفلى قائمة الخضار. ثماره شاميل لذيدة الطعم لوئها الى السواد الاحمر.

٥٧٢٩ - تَوْتُ الْأَرْض Fralsier (F).

Strawberry-plant (E).

هو الشيلك، اطلبه.



توت أسود



توت العليق

٥٧٤٩ - تودس ^٥ Todus (S).

Todier (F). Todus (E).

جنس طير من فصيلة التودسيات . انواعه المعروفة عديدة جميعها من عصافير امريكة الوسطى وجزر الانتيل || اجسامها صغيرة تطول من ١١ الى ١٣ سم . مناقيرها مستطيلة ، مبططة ، ذرّة الملاقط . السنتها رقيقة ، قرنية الطرف . اجنحتها عريضة ، معتدلة الطول . اذنانها مقطوعة . ارساغها قصيرة || قوتها الحشرات والهوام . تدثن في تجاويف الاشجار أو في اوجار تخلدها في التربة على عمق ٢٠ او ٣٠ سم . اوجارها انفاق مستطيلة تنتهي برداء فسيحة كروية الشكل تبطّنها الاناث بالحشيش والتيل || أشهر انواعه التودس الاخضر .

٥٧٥٠ - تودس أخضر ^٥ Todus viridis (S).

Todier vert (F).

نوع من التودس . موطنه يشمل معظم مناطق امريكة الوسطى . يألف المواقع المبعثرة الاشجار ثم الادغال ولا يخشى الاقتراب من الاماكن الآهلة || جسمه صغير القد طوله نحو ١٢ سم وبسطه نحو ١٨ سم . ثوبه متباين الالوان . ظهره الى الخضار الازرق الموج . جناحاه الى الخضار الاغبر الارمد . زوره وردي اللون . جوشنه الى الربدة الصنابية الموج . بطنه الى الصفار التبي . ذنبه اخضر القاعدة والوسط ، اطحل الاطراف . منقاره ورسناه حمر || قوته الحشرات والهوام يقتنصها طائفة ويلتقطها سارحة على الاشجار || يدثن افحوصه في وجار يخلده في التربة على عمق ٢٥ سم . مسلكه نفق مستطيل ، عديد التعاريج ، لا يقل طوله عن ١٢٠ سم . || الانثى تحضن من مرتين الى ثلاث مرات في العام . حضنتها تتألف من ٤ الى ٥ بيضات ترخمها وحدها بينما الذكر يؤمن لها الغذاء .

٥٧٥١ - تودسيات ^٥ Todidae (S).

Todidés (F). Todidae (E).

فصيلة طير من الجواثم سنيات المناقير . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة . موطنها جميع الاقاليم الحارة من البلاد الامريكية . تألف الادغال والغابات || اجسامها صغيرة القد . تتميز بمناقيرها المبططة ، المستعرضة القواعد || اعرف اجناسها واشهرها التودس .

٥٧٥٢ - توديّة Nivellement (F). Surveying (E).

هي التفردين .

٥٧٥٣ - تودريج Sisymbre (F).

Hedge mustard (E).

راجع سمارة .

٥٧٥٤ - توداني ^٥ Turonien

الساف الاوسط من الطبقة الطباشيرية .

٥٧٥٥ - تورد القمّة

مرض فتاك يسببه نوع من الفيرس المهم التحديد يصيب الموز فيركب عصارة النبات ويسير معها الى كامل الاعضاء || مظهره الخارجي سقم في النبات يعقبه تحول في الاوراق التي تبدو وردية اللون ، صغيرة الحجم ، ضيقة النصل ، ضمية التجميع تنشأها مادة شمعية لزجة تسبب صلك اليافها || وهو من اعطى امراض الموز واشدها فتكاً . ينقله الارق وغيره من الحشرات التي تعيش على عصارة النبات || يكافح باقتلاع وحرق النباتات الموصومة وبطهير التربة .

٥٧٤٢ - تود ^٥ Sorbaria (S). Sorbaire (F).

جنس شجيرات برية وزراعية تزيينية من فصيلة الورديات . اوراقها عابلة ، متعاقبة ، مركبة ، وتريّة العدد الذي يراوح من ١١ الى ٢١ . وريقاتها سنافية النصل ، منشارية الخفاف . ازهارها عشكولية التجميع ، صندرة القد بيضاء اللون || انواعه المعروفة عديدة ، أشهرها التالية .

٥٧٤٣ - تود شجري ^٥ Sorbaria arborea (S).

Sorbaire en arbre (F).

نوع من التود . مهدد الهند . ساقه كبيرة غليظة تعلو نحو عشرة امتار . اوراقه مركبة ، وريقاتها تطول من ٥ الى ٨ سم . وتعرض من ١٥ الى ٣٠ سم . نصالها خلية الصفحات السفلى . عشكوله الزهري كبير القد ، قطره يراوح من ٣٠ الى ٤٠ سم .

٥٧٤٤ - تود صيني ^٥ Sorbaria sinensis (S).

Sorbaire de Chine (F).

نوع من التود . موطنه بعض مناطق الصين . ساقه تعلو من مترين الى ثلاثة امتار . افناده وافنانه جرداء اللحاء . اوراقه مركبة . وريقاتها ضيقة النصل الناعمة الملمس . عشكوله الزهري كبير القد ، قطره نحو ١٨ سم .

٥٧٤٥ - تود ضيق الورق ^٥

Sorbaria angustifolia (S).

Sorbaire à feuilles étroites (F).

نوع من التود . موطنه بلاد الافغان . ساقه تعلو نحو ١٥٠ سم . اوراقه تطول نحو ٢٢ سم . وتعرض نحو ١٤ سم . وريقاتها ضيقة النصل التي تطول نحو ٧ سم وتعرض نحو ١٣ سم . عشكوله الزهري كبير القد ، قطره من ١٥ الى ١٨ سم .

٥٧٤٦ - تود غبيريالي ^٥ Sorbaria sorbifolia (S).

Sorbaire à feuilles de sorbier (F).

نوع من التود . مهدد يمتد من اليابان الى سيبيرية . ساقه تعلو من متر الى مترين . افنانه مزغبة اللحاء . اوراقه مركبة تطول نحو ٣٠ سم . وريقاتها تطول نحو ٨ سم . وتعرض نحو ٢ سم . عشكوله الزهري كبير القد ، قطره يراوح من ٢٥ الى ٣٠ سم .

٥٧٤٧ - تود كبير الزهر ^٥

Sorbaria grandiflora (S).

Sorbaire à grandes fleurs (F).

نوع من التود . موطنه بعض المناطق الروسية اخصها سيبيرية . ساقه تعلو من ٦٠ الى ٨٠ سم . اوراقه مركبة . وريقاته قصيرة النصل الضيقة تطول من ٢ الى ٤ سم . وتعرض من ١٠ الى ١٢ سم . عشكوله الزهري صغير القد قطره نحو ١٢ سم . ازهاره مستطيلة كبيرة .

٥٧٤٨ - تود منتصب ^٥ Sorbaria assurgens (S).

Sorbaire dressée (F).

نوع من التود . مهدد الصين . ساقه تعلو من مترين الى ثلاثة امتار . افنانه جرداء اللحاء . اوراقه مركبة . وريقاتها خلية الصفحات السفلى . عشكوله الزهري كبير القد ، قطره نحو ٢٥ سم .



ورقة تود شجري



تودس اخضر



تورم مصري



توريلس



تورينيه زرقاء



توز صندلي



توز مخزني

اهليلجية الشكل ، تطول من ٢ الى ٤ سم. وتعرض من ٨ الى ١٦ م. نصالها مسننة الخفاف. ازهارها هامي. ازهارها الى الارجواني اللبس. قطر الزهرة نحو ٣٥ م. تنويرها صيفي. منبتها بعض اصقاع الهند ومليزيا.

٥٧٦٤ - **تورينيه اسيوية** (S). *Torenia asiatica* (F).
Torénie asiatique (F).

نوع من التورينيه. عشبة حولية معتدلة الجرم تعلو من ١٥ الى ٣٠ سم. ساقها ملساء. اوراقها متقابلة ، مسننة ، اهليلجية الشكل ، تطول من ٣ الى ٥ سم. وتعرض من ١٠ الى ١٨ م. نصالها مسننة الخفاف. ازهارها محوري الانتشاب ، شبه عثكولي التجميع. ازهارها ارجوانية اللون يعلوها موج ليكني. تنويرها يستمر من الصيف الى الخريف. منبتها الهند وسيلان وجاوا وقد انتشرت زراعتها التزينية في معظم اقطار العالم.

٥٧٦٥ - **تورينيه زرقاء** *

Torenia Fournieri (S). *Torénie de Fournier* (F).
نوع من التورينيه. عشبة حولية معتدلة الحجم. ساقها ملساء تعلو من ٢٠ الى ٣٠ سم. اوراقها متقابلة ، مسننة ، تطول من ٢ الى ٤ سم. نصالها قليلة القواعد ، ذلقة الاطراف ، منشارية الخفاف. ازهارها محوري الانتشاب. ازهارها بنفسجية الكؤوس ، زرق البنات المبيضة ، قطرها نحو ٤ سم. تنويرها صيفي. منبتها الهند الصينية وقد عمت زراعتها التزينية معظم اقطار العالم.

٥٧٦٦ - **تورينيه صفراء** (S). *Torenia flava* (S).
Torénie jaune (F).

نوع من التورينيه ، عشبة حولية صغيرة القد. ساقها مزغبة تعلو من ١٥ الى ٢٠ سم. اوراقها متقابلة ، مسننة ، تطول من ٢ الى ٤ سم. نصالها بيضية الشكل ، مسننة الاطراف. ازهارها محوري هامي. ازهارها صفراء اللون. تنويرها صيفي. منبتها البلاد الاسيوية اخصها الهند الصينية وصومترا.

٥٧٦٧ - **توز** (S). *Pterocarpus* (F).

جنس اشجار وشجيرات حرجية وزينية من فصيلة القرنيات الفراشية. انواعه نحو ٢٠ اوراقها متعاقبة مركبة ثلاثية. وريقاتها بيضية النصل الجامد المماس البشرة. ازهارها بيض وصفر. ازهارها عثكودي او عثكولي التجميع ، محوري الارتكاز او هامي. اخشابها صناعية فاخرة الصنف. اشهر انواعه ما يلي.

٥٧٦٨ - **توز صندلي** * ، صندلان

Pterocarpus santalinus (S). *Ptérocarpe santal* (F).
Red sandal wood, Ruby wood (E). Roter sandelbaum (D). Sandalo rosso (I).

نوع من التوز الطبي والصناعي. شجرته كبيرة القد. ازهاره طيبة. اخشابها صناعية مرغوب فيها ويستخرج منها صباغ احمر شائع الاستعمال.

٥٧٦٩ - **توز مخزني** * ، دم الاخوين

Pterocarpus draco (S). *Ptérocarpe officinal*, P. sang-dragon (F). Dragon gum tree (E). Drachenbaum (D). *Pterocarpus draco* (I).

نوع من التوز الطبي والصناعي. شجرته كبيرة القد تعلو نحو ٢٠ م. اوراقها جميلة الخضار ، طويلة الزناد. ازهارها الى البياض الاصفر. يستخرج منها عصارة حمراء اللون

٥٧٥٦ - **تورق الزهر** Chloranthie (F).
شذوذ جسموري يقبل الزهر ورقاً.

٥٧٥٧ - **تورم ، قطقاط ، سقساق ، طير التمساح** Pluvianus (S).
Pluvian (F). Plover (E).

جنس طيور مائية من طوال الساق. انواعه قليلة جميعها صغيرة القد بلقاء الثوب تحمل في جناحيها شوكتان هما سلاحها. يقال انها تدخل في التمساح وتنتهي. من اللود وتخرج واذا اطبق عليها التمساح فه تفتحه فيفتح فاه فتخرج || قوتها انديدان والحشرات وبعض البزور. تألف الانهار والبحيرات الافريقية. تدن افعوصها في رمال الشواطئ || اعرف انواعه واشهرها التورم المصري.

٥٧٥٨ - **تورم مصري** * ، أبو ظفر

Hoplopterus spinosus (S). *Pluvian d'Egypte* (F).
Spur-winged plover (E).

نوع من التورم يألف ضفاف النيل وسائر انهر وبحيرات افريقية الشرقية والشمالية. طوله نحو ٢٢ سم. ثوبه ابلق اللون يعيش كالحمام ذكراً وأنثى. عدد سربه يراوح من اربعة الى ستة ازواج.

٥٧٥٩ - **تورمالين** Tourmaline (F).
Tourmaline (E).

التورمالين مادة معدنية متبلورة مركبة ، خاصة ، من بوروسيليكات الالومنيوم وتحتوي بغض البوتاس والصودا والمغنيزا والليثين واكسيد الحديد واكسيد المنغنيز || ثقلها النوعي يراوح من ٢,٩ الى ٣,٢. درجة صلابتها من ٧ الى ٧,٥ وهي اصلد من المرمر واقل صلابدة من الزبرجد || من ابرز خصائصها تكهرجها بالاحتكاك. لونها السائد الاسود ومنها الاحمر والازرق والاخضر والاصفر. ومنها الشفاف وشبه الشفاف والمعتم || تستعمل استعمال الاحجار الكريمة في مصنوعات الخلى.

٥٧٦٠ - **توريق** Feuillaison (F). Foliation (E).
هو تجدد ورق النبات السنوي.

٥٧٦١ - **توريلس** * Torilis (S). Torilide (F).
Hedge parsley (E). Zirmet, Drehkraut (D). Torilide (I).

جنس نباتات عشبية برية حولية ومحولة من فصيلة النجيليات. انواعه عديدة بعضها من نباتات الاراضي المذحاة والبعض الآخر يوجد في الاسراج الجبلية. اوراقها مركبة وتربية او شغمية التفصيل الريشي.

٥٧٦٢ - **تورينيه** (S).
Torénie (F). Torenia (E).

جنس نباتات عشبية حولية ومحولة من فصيلة الخنازيريات. معقودة التعريف على اسم العلامة السويدي «ألف تورين» سوقها منتصبة ، مركبة الزوايا والصلوع. اوراقها متقابلة. ازهارها معتدلة الحجم. كؤوسها مخمسة الفصل المبيضة || انواعها المعروفة نحو ٦٠ اشهرها الاربعة التابعة.

٥٧٦٣ - **تورينيه ارجوانية** *

Torenia atropurpurea (S).
Torénie pourpre foncé (F).

نوع من التورينيه. عشبة حولية صغيرة القد تعلو من ١٥ الى ٢٠ سم. ساقها ملساء. اوراقها متقابلة ، مسننة ،

- Acclimatation (F). **٥٧٨١ - تَوَطِين**
Acclimatization (E). راجع تبليد .
- Tugon **٥٧٨٢ - توغون**
حاشور يستعمل في مكافحة حشرات المنازل والاسطبلات والزرائب اخصها الذباب وبنات وردان (الصرابير) والجذاجد واللاحسات والنمل || استعماله يستوجب بمض اليقظة لانه يحذر ان يكون بمتناول الحيوانات .
- Epargne (F). Saving (E). **٥٧٨٣ - تَوْفِير**
هو الادخار ، اطلبه .
- Combinaison (F). Combination (E). **٥٧٨٤ - تَوَلِيْق**
جمع الاشياء وتدميجها وفقاً لترتيب مقرر . ج توافيق وتوقيقات .
- Dipterocarpus (S). **٥٧٨٥ - تَوَفِيل ***
Diptérocarpe (F).
جنس اشجار حرجية وصناعية من فصيلة التوفيليات . انواعه المعروفة نحو ٢٥ اعطانها بعض المناطق الاستوائية والحارة من القارة الاسيوية والجزر || جميعها اشجار كبيرة فرعاء . اوراقها متعاقبة ، معنقة ، بيضبة النصال . ازهارها كبيرة . ثمارها ليفية البث الذي يلف عجمة صغيرة || اخشابها صناعية ويستخرج منها مادة زيتية داملة تنفع الجرح .
- Dipterocarpaceae (S). **٥٧٨٦ - تَوَفِيلِيَّات ***
Diptérocarpacées (F). Dipterocarpaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة القعالات مرتفعة المحيط . انواعها المعروفة نحو ٢٠٠ تجمعها سبعة اجناس . اعطانها معظم مناطق البلاد الاستوائية || جميعها اشجار وشجيرات . سوقها مالة القشور ، فرعاء اوراقها متعاقبة ، معنقة . نصالها غائرة العروق المتوازية الترتيب ، مبعثرة العدد المشحونة بمواد دهنية راتنجية . ازهارها كبيرة . ثمارها فقيرة ، اخنية وفيئة . اخشابها صناعية || اشهر اجناسها التوفيل والتيلك .
- Chronométrage (F). **٥٧٨٧ - تَوَقِيت**
Time-Keeping (E). التوقيت تحديد المقياس الزمني .
- Mutage (F). **٥٧٨٨ - تَوَقِيف الاختيار**
راجع ايقاف الاختيار .
- Confirmation **٥٧٨٩ - تَوَكِيد**
راجع اقرار .
- ٥٧٩٠ - تَوَكِيل الحساب**
Affirmation d'un compte (F). Affirmation an account (E).
الاقرار بصحة الحساب .
- Procuration **٥٧٩١ - تَوَكِيل**
تعيين نطاق الاعمال التي اسندت الى الوكيل .
- Nidation (F). **٥٧٩٢ - تَوَكِين ***
التوكين استقرار الببيضة المزكوبة في الغشاء المخاطي الرحمي عند ابتداء الحمل في اناث اللبونات .
- Tularémie (F). **٥٧٩٣ - تولاريم**
مرض يصيب القواضم فيسم دما ويميتها .

تدعى دم الاخوين تستعمل في بعض المستحضرات الصحية والطبية . خشبها احمر اللون ، ناعم الرقعة صلب المكسر فاخر الصنف مرغوب فيه .

٥٧٧٠ - تُوُز مرجاني
Pterocarpus angolans (S).
Pterocarpe d'Angola (F). Angola wood (E).
نوع من التوز مهدد افريقية الاستوائية . شجرته كبيرة القد . خشبها فاخر الصنف مرجاني اللون يعرف بالخشب المرجاني الصلب .

٥٧٧١ - تُوُز مَلَبَار
Pterocarpus marsupium (S).
Pterocarpe du Malabar P. d'Amboine, Kino (F).
نوع من التوز . شجرته متوسطة القد ثماره حامزة الطعم صناعية يستخرج منها مادة قريبة من الكاد تستعمل استعماله .

٥٧٧٢ - تُوُز هندي
Pterocarpus indicus (S).
Pterocarpe de l'Inde (F). Red sandal wood, India wood (E).
نوع من التوز مهدد الهند . شجرته كبيرة القد . خشبها فاخر الصنف احمر اللون مرغوب فيه ، يعرف بخشب السندل الاحمر .

٥٧٧٣ - تُوُزيت *
Tuzet (Tuzan)
التوزيت او التوزان فطور زراعي مركب يرتكز على عدة مواد فعالة اخصها مشتقات الزنك والزرنيخ || يستعمل في مكافحة تبقيع الاشجار المثمرة اخصها الاجاص . يركز المحلول بمعدل ١٢٥/١٠٠ اي ١٢٥ غ . توزيت لكل ١٠٠ لتر ماء || يباشر بالاستعمال بعد سقوط التويجات الزهرية لانه يؤدي النحل . ويمنع النضج قبل جني الثمار باربعة اسابيع .

٥٧٧٤ - تُوُزيع
Répartition (F). Distribution (E).
هو قسمة او تجزئة اموال او تركة او موجودات ودفع كل حصة الى مستحقها .

٥٧٧٥ - تُوُزيع الاسمدة
Epandage des engrais (F).
هو ذر الاسمدة او نشرها على التربة .

٥٧٧٦ - تُوُزيع الضرائب
Répartement (F).
Assesment (E).
تعيين محصنات المناطق الادارية بما استوفى من الضرائب .

٥٧٧٧ - تُوُزيع المحاصة
Distribution par contribution (F).
هو التوزيع على القرياء بالنسبة الى ديونهم .

٥٧٧٨ - تَوَسُّف *
Desquamation (F).
Desquamation, Peeling (E).
عارض يصيب البشرة فتتقق وتنقشر كالخراشف الصغيرة .

٥٧٧٩ - تَوَسِّيع ، تَفْسِيح ، تَفْرِيج
Eclaircie (F). Opening (E).
هو قطع بعض الاشجار النخيلة او القريبة من رفيقاتها بغية ترك الفسحة اللازمة لنمو الاشجار الباقية . وهي من الاعمال الحرجية .

٥٧٨٠ - تَوَصِيم *
Pathogénicité (F).
Pathogenesis (E).
التوصيم مبحث في اسباب تناسل الارصام .



توفيل



توليب الزغارين



توليب إيشلر



توليب برّي



توليب عين الشمس



توليب كوفن

٨ سم. لونها الى الصفار الزاهي السوي الموج || ازهاره يدوم طوال شهر ايار .

٥٨٠٤ - **تُولِب عَطِر** Tulipa suaveolens (S).

Tulipe odorante (F).
نوع من التوليب اوراقه صغيرة النصل الضيق . شراخه يعلو من ١٥ الى ٢٥ سم. زهرته قواحة العرف العطري تطول نحو ٧ سم. ثوبها الى الحمرة القرمزية حنارها مذهب اللون او ارجواني || ازهاره يستمر من اذار الى نيسان .

٥٨٠٥ - **تُولِب عَيْن الشمس***

Tulipa oculus-solis (S). Tulipe oeil du soleil (F).
نوع من التوليب اوراقه قليلة العدد نصلها يطول نحو ٢٥ سم. ويعرض نحو ٤ سم. شراخه يعلو من ٢٥ الى ٤٠ سم. زهرته كبيرة القد ، حمراء اللون ، بنفسجية القاعدة المطوقة بالاصفر || ازهاره يستمر من اذار الى نيسان .

٥٨٠٦ - **تُولِب كلوزيانه** Tulipa clusiana (S).

Tulipe de l'Ecluse (F).
نوع من التوليب اوراقه ضيقة النصل . شراخه يعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. زهرته وردية اللون يعلوها تجذيع ابيض ومشعة غبراء . اقلامها واسديتها الى السمرة اللامعة || ازهاره يستمر من اذار الى ايار .

٥٨٠٧ - **تُولِب كوفن*** Tulipa kaufmanniana (S).

Tulipe de kaufmann (F).
نوع من التوليب اوراقه مستطيلة القد عريضة النصل . شراخه يعلو نحو ٥٠ سم. زهرته كبيرة الحجم تطول نحو ٨ سم. لونها الى الصفار الزاهي يعلوه توشيم احمر || ازهاره ربيعي .

٥٨٠٨ - **تُولِب مبكّر** Tulipa praecox (S).

Tulipe précoce (F).
نوع من التوليب اوراقه ٤ نصلها يطول من ٢٥ الى ٣٠ سم. ويعرض نحو ٨ سم. شراخه يعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. زهرته مستطيلة قليلة الانشراح لونها الى الحمرة القرمزية يشوبها تمشيع داخلي وسطي الارتكاز اصفر اللون || ازهاره يستمر من اذار الى نيسان .

٥٨٠٩ - **تُولِب مدبّب** Tulipa acuminata (S).

Tulipe cornue (F).
نوع من التوليب اوراقه مستعرضة النصل المدبب الطرف . شراخه يعلو من ٣٠ الى ٤٠ سم. زهرته كبيرة القد تطول نحو ١٠ سم. لونها الى البياض الوردي تعلوه مشعة عتيقة صفراء الموج || ازهاره يستمر شهراً واحداً .

٥٨١٠ - **تُولِب مشخّار** Tulipa strangulata (S).

Tulipe tardive (F).
نوع من التوليب اوراقه مستطيلة القد . ضيقة النصل الازغب المجنح . شراخه يعلو من ٣٠ الى ٤٥ سم. زهرته قرمزية اللون || ازهاره يستمر شهراً واحداً .

٥٨١١ - **تُولِبِيَّات** Tulipacées (F). Tulipaceae (E).

سبط من فصيلة الزنبقيات انواعه وضروبه كثيرة العدد جميعها بصلية . بصلها مكرر الشكل . سوقها قرصية الانتشاب ، شراخية ، جوفاء . ازهارها فردية ، هامية ، تركيب الشمراخ .

٥٨١٢ - **ثوم** Ail (F). Garlic (E).

اطلب ثوم زراعي .

٥٧٩٤ - **تُولِب** Anon (F). Ass's foal, Young ass (E).

التولب هو الجحش . ويقال للثان ام تولب . ويقال اطوع من تولب .

٥٧٩٥ - **تُولَج ، دُولَج**

التولج الكناس الذي يلج فيه الطي وغيره من البهيم . وقد يتخذ في اصول الشجر .

٥٧٩٦ - **تُولِب** Tulipa (S). Tulipe (F).

Tulip (E). Tulpe (D). Tulipano (I).

جنس نباتات بصلية برية وزينية من سبط التوليبات وفصيلة الزنبقيات . انواعه نحو ١٠٠ اما ضروره فتبلغ الالف . جميعها قرصية الاوراق المستطيلة العريضة النصل . سوقها شراخية جوفاء وحيدة الزهرة الهامية || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

٥٧٩٧ - **تُولِب اُزْغَب** Tulipa pubescens (S).

Tulipe pubescente (F).

نوع من التوليب اوراقه شاحبة الخضار نصلها ضيق الصفحة المستطيلة ، مخلي البشرة شراخه يعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. زهرته متوسطة القد مختلفة اللون || ازهاره يستمر طوال شهر نيسان .

٥٧٩٨ - **تُولِب الزَّهَّارِين*** Tulipa gesneriana (S).

Tulipe des fleuristes, Tulipe de Gesner (F).

اشهر انواع التوليب واكثرها ضرورياً واللوناً . اوراقه قليلة العدد ، عريضة النصل ، تطول نحو ٢٠ سم. شراخه امرط البشرة يعلو من ٢٠ الى ٦٠ سم. زهرته كبيرة القد جؤوية القاعدة ملوانة الصفحة || ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

٥٧٩٩ - **تُولِب المُرُوج** Tulipe des prés (F).

هو عرار الغاب ، اطلبه .

٥٨٠٠ - **تُولِب إيشلر*** Tulipa Eichleri (S).

Tulipe d'Eichler (F).

نوع من التوليب اوراقه مستطيلة . نصلها ميزالي الشكل مرتفع الحنار . شراخه يعلو من ٤٠ الى ٥٠ سم. زهرته الى الحمرة القرمزية يعلوها تقيج اسود طوقه اصفر وابيض . ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

٥٨٠١ - **تُولِب برّي*** Tulipa sylvestris (S).

Tulipe sauvage (F).

نوع من التوليب اوراقه مستطيلة نصلها ضيق الصفحة . شراخه يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. زهرته عطرية العرف لونها الى الصفار الزاهي . اقلامها واسديتها مهدبة الزغب . ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

٥٨٠٢ - **تُولِب توكستان**

Tulipa kolpakowskiana (S). Tulipe de kolpa-

kowski (F).

نوع من التوليب اوراقه مهدبة الحافة ضيقة النصل . شراخه يعلو من ٢٥ الى ٤٥ سم. زهرته مستطيلة الشكل ، نارية اللون || ازهاره يستمر شهراً واحداً .

٥٨٠٣ - **تُولِب زَنْبَقِي** Tulipa retroflexa (S).

Tulipe-tis (F).

نوع من التوليب اوراقه مستطيلة النصل الضيق . شراخه يعلو من ١٥ الى ٢٥ سم. زهرته كبيرة القد تطول نحو

٥٨٢٠ - تُون معروف* ، تُون شائع

Thynnus thynnus (S). Thon commun (F). Common tunny-fish (E).

سمكة كبيرة القد يبلغ طولها نحو خمسة امتار ووزنها ٩٠٠ كيلو. ثوبها الى الازرقاق الفولاذي، ايطاليا الى الريدة بطنها فضي الموج. تكثر في المحيط الاطلسي وفي شمالي البحر المتوسط.

٥٨٢١ - تُونَة

Toona odorant (F). هي السدرال شجرة حرجية وزينية. False cedar (E).

٥٨٢٢ - تَوَهَج

Incandescence سطوع الفياء من الاجسام الملتبة.

٥٨٢٣ - تَوَى

Insolvabilité (F). Insolvency (E). راجع إعسار.

٥٨٢٤ - تُوَيَا

Thuya (F). Arbor vitae (E). جنس اشجار حرجية وزينية دائمة الخضار من سبط السرويات وفصيلة الصنوبريات. انواعه خمسة مختلفة القد جميعها هرمية او مغزلية الشكل يراوح علوها من ٧ الى ٥٠ م. اوراقها صغيرة جميلة الخضار. اكرازها مخروطية صغيرة. اخشابها صناعية فواحة العرف. يستخرج منها مادة راتنجية شائعة الاستعمال. اشهر انواعه ما يتبع:

٥٨٢٥ - تُوَيَا شَرْقِيَّة* ، شَجَرَة الْحَيَاة

Thuya orientalis (S). Thuya oriental, Arbre de vie, A. de paradis (F). Arbor vitae, Chinese arbor vitae (E). Echter Fächerlebensbaum, Lebensbaum (D). Tuia d'Oriente, Albero della vita (I).

شجرة من التويا السروية البطيئة النمو المتوسطة القد تعلو من ٧ الى ١٥ م. اوراقها خافتة العرف لونها الى الخضار السوي الذي ينحرف الى الجؤوة من اواسط الخريف الى آواخر الشتاء ثم يعود الى الاخضر العابق فالزاهي فالباهت. اكرازها صغيرة مخروطية شديدة الخضار. تصلح للزينة. اخشابها صناعية.

٥٨٢٦ - تُوَيَا عَقْدِيَّة

Thuya articulé (F). هي السندر، اطلبه. Sandarach tree (E).

٥٨٢٧ - تُوَيَا كَبِيرَة* ، شَجَرَة الْحَيَاة الْكَبِيرَة

Thuya gigantea, T. plicata (S). Thuya géant, T. de Lobb, Arbre de vie (F). White cedar, Giant arbor vitae (E). Riesenlebensbaum, Gelbe cypresse (D). Tuia, Tuglia, Libocedrus (I).

شجرة من التويا السروية السريعة النمو الكبيرة القد تعلو من ٢٠ الى ٥٠ م. اوراقها صغيرة عابقة الخضار طحلاء الضلع فواحة العرف البلسي. اكرازها صغيرة مخروطية الشكل. تزرع لصدر الرياح. اخشابها صناعية.

٥٨٢٨ - تُوَيَج

Corolle (F). Corolla (E). هو غلاف الزهرة الداخلي الذي يحيط بالاسدية والمدقة.

٥٨٢٩ - تُوَيَجِيَّة

Pétale (F). Petal (E). راجع بتلة.

٥٨٣٠ - تَبَار ، مَجْرَى

Courant (F). Current (E).

٥٨١٣ - تُوْمَافِيكْس

Tomafix هرمون زراعي يستعمل على البندورة فيحثها على الازهار ويمنع تكوين البزور في الثمار || يركز المحلول بمعدل ١٪ وتنضخ الازهار عند انبلاجها. الليتر الواحد من المحلول يكفي نحو ٥٠٠ زهرة || يحسن استعمال مياه المطر واجتناب المياه الكلسية وعدم نضخ اوراق الشتول لانها تتحجن وتلتف.

٥٨١٤ - تُوْمَة

Ouf de l'Atruche (F). التومة: بيضة النعام ج قوم. Egg of ostrich (E).

٥٨١٥ - تُوْمَلَة

Thaumalea (S). Thaumalée (F). Thaumalea (E).

جنس حشرات من فصيلة التومليات ورقية ذوات الجناحين. انواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها جبال البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة، هيفاء، تطول من ٣ الى ٥ مم. رؤوسها صغيرة. عيونها صغيرة، متقاربة عند الشقين. قرونها الاستشعارية قصيرة ودقيقة، حشارية الفصل. ملاسها طويلة. مرافقها قصيرة. كواسلها مستطيلة. بطونها شبه افبوية الشكل. رواشها كبيرة، تبنية اللون. قوائمها مستطيلة || تألف المواقع الرطبة وضفاف مجاري الماء. قوتها رحيق الازهار. يرقاتها هواكة قوتها النفايات النباتية التي يكثر وجودها قرب الماء.

٥٨١٦ - تُوْمَلِيَّات

Thaumalaeidae (S). Thaumaléidés (F). Thaumalaeidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين. اجناسها وانواعها المعروفة بتوسطة العدد، تألف البلاد الباردة والمناطق الجبلية || اجسامها صغيرة القد تطول من ٣ الى ٥ مم. رؤوسها صغيرة عيونها متقاربة عند الشقين. قرونها الاستشعارية دقيقة، حشارية الفصل، اقصر من الملامس، ملاسها طويلة. مرافقها قصيرة. كواسلها اهليلجية. رواشها كبيرة، تبنية اللون، صفراء الموج || يرقاتها تعيش على المواد النباتية وعلى النباتات المجهرية كالمشطورات || اشهر اجناسها التوملة.

٥٨١٧ - تُون ، طُون ، تْن

Thynnus (S). Thon (F). Tunny-fish (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الاسقمريات ورتبة شائكات الزعانف. انواعه المعروفة قليلة. خمسة او ستة جميعها مأكولة يكثر وجودها في بحار الاقاليم الحارة. اشهرها الثلاثة التالية:

٥٨١٨ - تُون أَيْض* ، جُرْمُون ، كَنْعَد ، كَعْنَد

Thynnus aialonga (S). Thon blanc, Germon (F). Whit tunny-fish (E).

سمكة من التون صغيرة القد طولها نحو ١٠٠ سم. وزنها يراوح من ١٢٠ الى ١٨٠ كيلو. ثوبها الى الزرقة الفاتحة يعلوها موج اسفع. بطنها اغبر اللون فضي الموج || يعتبر من اجود انواع التون وقد يكثر وجوده في المتوسط.

٥٨١٩ - تُون الْمتوسط*

Thynnus brachypterus (S). Thon brachyptère (F). Brachypterus tunny-fish (E).

سمكة كبيرة يبلغ طولها نحو ٣ امتار ووزنها ٥٠٠ كيلو. ثوبها الى الريدة العابقة. بطنها فضي الموج تكثر في البحر المتوسط والبحر الاسود.



تون أبيض



تون المتوسط



تون معروف



تويا شرقية



تويا كبيرة

متنصبة فرعاء تعلو من ٨٠ الى ٣٠٠ سم. أوراقها معنقة، متعاقبة، ثلاثية التفصيص والعروق تشبه أوراق التين. نصلها جامد الصفحة، خيلي البثرة. ازهارها رؤسية، قرصية التجميع، مختلفة الالوان فيها الاصفر والبرتقالي والارجواني والاحمر. بزورها مستطيلة الشكل رباعية التضلع، متوجة القاعدة || ازهارها صيني.

٥٨٤٥ - تيتيس *
Tethys (S).

Téthys (F). Tethys (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل خلفيات الخياشيم العديدة. انواعه المعروفة ثلاثة، اعطانها بحار البلاد المعتدلة الحرارة. تعيش معظم حياتها في القاع على اعماق تراوح من ٣٠ الى ١٠٠ م. || اجسامها عريضة، كبيرة، هلامية، اهليلجية، مبطلة، تطول من ٢٥ الى ٣٢ سم. رؤوسها مبطلة، كبيرة، ترسية الشكل، مطوقة برداء فارش نصف دائري الشكل، مهدب الحثار. افواهها خطمية يلحفها الرداء. لوامسها سطحية تعلو الافواه. خياشيمها ظهرية الارتكاز، ناشزة، ثنائية الصف. ويعاوها في جانبي ظهرها حلقات صغيرة يراوح عددها من سبعة ازواج الى تسعة. اثوابها الى الرمكة او الربة || اشهر انواعه التيتيس الارنبي (Tethys leporina) الذي يبلغ طوله نحو ٣٢ سم.



تيتيس

٥٨٤٦ - تيتيدييات *
Tethyidae (S).

Téthydés (F). Tethyidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل خلفيات الخياشيم العديدة. انواعها المعروفة سبعة تجتمع الى جنسين التيتيس والمليب. اعطانها بحار البلاد المعتدلة الحرارة ومنها البحر الابيض المتوسط. ملجئها الحياتي جماعي. مجموعاتها متوسطة العدد. تعيش معظم حياتها بين نبوت القاع || اجسامها عريضة متفاوتة الجرم. اطوالها تراوح من ١٠ الى ٣٠ سم.

٥٨٤٧ - تيجن *
Fasciolaria (S).

Fasciolaire (F). Fasciolaria (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة التيجنيات. انواعه المعروفة عديدة بعضها من متحجرات الاحقاب الثالثة وبعضها معاصر منتشر في معظم بحار العالم || اصداقها متوسطة الاحجام او صغيرة، متباينة الاشكال يكثر فيها البرمعي المقلوب القاعدة المحصورة. فوهاتها فرجية مستطيلة.



تيجن

٥٨٤٨ - تيجنييات *
Fasciolaridae (S).

Fasciolaridés (F). Fasciolaridae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل مشطيات الخياشيم مسننات اللسنة. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة بعضها من متحجرات الاحقاب الثالثة والطحاشيرية والبعض الآخر منتشر في معظم بحار العالم || اصداقها اشكال هندسية مزوزقة ومطعمة يكثر فيها البرمعي والقمقي. فوهاتها شبه بيضية منفصلة الجوانب || اعرف اجناسها واشهرها التيجن والردون والشكس.

٥٨٤٩ - تيجنة *
Tije (F).

التيجنة طائر من التنفريات يدعى رمفوسيل، اطلبه.

٥٨٥٠ - تيدليات *
Taeidae (S).

Téidés, Tejidés (F). Taeidae (E).

فصيلة حيوانات زحافة من العطاء. اجناسها وانواعها

٥٨٣١ - تيار الخليج
Courant du Golfe,

Gulf-Stream (F). Gulf-Stream (E).

تيار مياه حارة في المحيط الاطلسي. يعود اكتشافه الى البحارة الاسبان في اواسط عام ١٥١٣ || اشيع نظرية تقول ان هذا التيار او النهر، ينبع بالقرب من افريقية الجنوبية ويتجه نحو البرازيل ويمر بين امريكة الوسطى وجزر الانتيل فيدور حول فلوريدا ثم يتحول من جراء اصطدامه بالمياه الباردة القادمة من اللبرادور الى شبه مروحة تمتد شعبا او ضلوعا الى الارض الجديدة وايرلنده والنرويج... وهو من منبعه حتى فلوريدا يجري بسرعة ٨ كيلومتر بالساعة. عمقه نحو ٨٠٠ متر. عرضه نحو ٨٠ كيلومتر. حرارة مياهه ٢٨° سنغراد. وبعد فلوريدا، حيث ينشعب، تصبح سرعته نحو ٥ كيلومتر. وعمقه نحو ٢٠٠ متر. وحرارته نحو ٢٠°. اما عرضه فيختلف مع الشعب لكنه لا يقل عن ٤٠ كيلومتر ولا يتجاوز ١٣٠ كيلومتر.

٥٨٣٢ - تيار ايجابي
Courant positif (F).

Positive current (E).

٥٨٣٣ - تيار تناوبي
Courant alternatif (F).

Alternative current (E).

٥٨٣٤ - تيار حاث، تيار هوثر
Courant inducteur (F). Inductor current (E).

٥٨٣٥ - تيار سلبي
Courant négatif (F).

Negative current (E).

٥٨٣٦ - تيار طردي
Courant direct (F).

Straight current (E).

٥٨٣٧ - تيار كهربائي
Courant électrique (F).

Electric current (E).

٥٨٣٨ - تيار متواصل
Courant continu (F).

Uninterrupted current (E).

٥٨٣٩ - تيار محثوث، تيار متأثر
Courant induit (F). Induced current (E).

٥٨٤٠ - تيسان
التيسان نجمان (محيط المحيط).

٥٨٤١ - تيسيس
Dessiccation (F). Desiccation (E).

هر التجفيف، اطلبه.

٥٨٤٢ - تيتان، تيتانيوم
Titane (F). Titanium (E).

عنصر فلزاتي شديد الصلابة، سريع الانفثات، ابيض المكسر، براق، يجرح الفولاذ || رمزه (Ti) ثقله النوعي ٤٨ ووزنه الاتومي ٥٠. يلدوب ويتبخر في الحرارة العالية. يشتعل في الاوكسيجن ويحترق في الفليور والازوت عند بلوغ ٨٠٠ درجة سف.

٥٨٤٣ - تيتل
تحريف تيتل وهو نوع من بقر الوحش.

٥٨٤٤ - تيتونيه
Tithonia (S). Tithonie (F).

جنس نباتات عشبية ليفية حولية من فصيلة المركبات.

انواعه المعروفة ٨ منبتها بلاد امريكة الجنوبية. سوقها

في ذوبانه || ومن الطرق الوقائية تخفيف كثافة البذار نحو ٢٠٪ وحدل التربة عند الحراجه والاستماضة عن الزروع الباكورية بزروع عادية او متأخرة .

٥٨٦٠ - تيل *Eléotrague (F).*
هو الغفر ، اطلبه .

٥٨٦١ - تيل * ، جملجل *Hibiscus cannabinus (S).*
Chanvre du Deccan, Ketmie à chanvre (F). Deccan hemp, Hemp mallow (E). Hanfblättriger elbisch (D). Canapa del Deccan (I).
نبات من الخطمي وفصيلة الخبازيات ساقه منتصبه رفيعة قوية تعلو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقه معتقة خماسية التفصيص مسننة الحافة . ازهاره خماسية الفصل حراء اللون || يزرع لاليانه المستعملة في صناعة الاكياس والحبال .

٥٨٦٢ - تيل بلدي * ، تيل قنبي ، خبيرة قنابية *Althea cannabina (S). Canebas, Gulmauve à feuilles de chanvre (F). Egyptian hemp (E). Hanfstockmalve, Hanfpappel (D). Altea salvatica, Canapa salvatica (I).*
نبات معمر من الخبازيات . ساقه دقيقة منتصبه تعلو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم . اوراقه معتقة خماسية التفصيص . نصلها منشاري الحافة ، ياهت الخضار ، اطحل الصفحة السفلى . ازهاره وردية اللون مضلمة ، طويلة الزناد .

٥٨٦٣ - تيل شيطاني *Ketmie d'Afrique (F).*
Bladder Katmia (E).
راجع خطمي افريقي .

٥٨٦٤ - تيلة *Fibre de coton (F).*
Fibre of cotton (E).

٥٨٦٥ - تيلس * *Thylacynus cynocephalus (S).*
Thylacine, Tasmanian wolf (E).

حيوان مفترس وحيد الجنس والنوع من الجربايات وفصيلة الذبوريات . موطنه جزيرة تسمانية . يسرح في الليل ويبست في النهار في اوعر المواقع واظلمها كالكهوف واوقاب الصدوع والفجاج لانه يحشى النور . وهو شرس الاخلاق بطاش يسطو على كل حيوان اضعف منه اخصها الغنم || شكله شكل الكلب والذئب في آن واحد . طوله نحو ١٥٠ سم . بما فيه الذئب الذي يبلغ نحو ٥٠ سم . ارتفاعه نحو ٨٠ سم . رأسه شبه مخروطي الشكل . عيناه كبيرتان . اذناه جالستان . وبره قصير معتدل الخشونة . ثوبه الى الكهبة يعلوه في ظهره تجذيع معترض اسود || الانثى اصغر قدماً من الذكر وتتحل بنفس الثوب وهي رباعية الاطباء تحمل في اسفل بطنها جراب تقيم فيه ادراصها التي يراوح عددها من ٢ الى ٥ حتى الفطام .

٥٨٦٦ - تيلندس * *Tillandsia (S). Tillandsie (F).*
Old man's beard, Long moss (E). Tillandsie (D). Tillandsia (I).

جنس نباتات عشبية معمرة من التيلندسيات . انواعه قليلة معظمها نباتات تزيينية ضية الاوراق اللحية الكبيرة . ازهارها سفلية التجميع مستطيلة يحملها شراخ طويل اجوف مستقيم . ومنها نباتات برية مقعدة تعيش على بعض الاشجار الحرجية دون ان تؤذيها .

٥٨٦٧ - تيلندسيات *Tillandsiées (F).*
Tillandsiae (E).

سبط من الانناسيات يشمل بعض الاجناس والانواع النباتية البرية والتزيينية جميعها عشبية اشهرها التيلندس .

المعروفة زهاء ٢٠٠ جميعها من عطاء البلاد الامريكية اخصها الجنوبية والوسطى || وهذه الفصيلة تمثل في امريكا ما تمثله الضبايات او السقايات في العالم القديم || اشهر اجناسها التاغو والعساس والفيوق والميجل .

٥٨٥١ - تيرب *Terreau (F). Mould (E).*
هي التربة التي زادت فيها نسبة المواد العضوية الدبالية عن ٥٠٪

٥٨٥٢ - تيس *Bouc (F). He-goat (E).*
هو ذكر الماعز المد للضراب .

٥٨٥٣ - تيس الجمل *Bouquetin (F).*
Bouquetin, ibex (E).
هو الوعل .

٥٨٥٤ - تيفس الكلب *Maladie de Stuttgart*

٥٨٥٥ - تيفود الدجاج *Salmonellosis gallinarum*
مرض معد يصيب الدجاج .

٥٨٥٦ - تيفولا *Typhula*
جنس فطور ثعلوية مجهرية من فصيلة الدبوسيات تتميز بثعالينها الكروية البيض اللباب . غلافها يبدو اغبر اللون ثم ينحرف نحو الصفرة وينتهي في الخطمي الاسمر . انواعه عديدة اما المؤذية التي تتطفل على النباتات الزراعية فقليلة . اعرفها الثلاثة التالية .

٥٨٥٧ - تيفولا الشوندرو * *Typhula betae.*
Typhula brassicae, Sclerotium semen (S).


فطر مجهري يتطفل على الشوندرو والبطاطا والملثوف والجزر فيعطب البشرة وما تحتها من النسيج الخليوية والليفية . مظهره الخارجي ثعاليل لاقياسية الحجم قطرها يراوح من ١ الى ٢ سم . ثوبها عديد الالوان يغلب فيه الابيض والخطمي والاسمر وهو دائماً ابيض المحور والمقطع || يكافح باجتنااب البذار الموصوم وباجتنااب التربة الرطبة القوية الاندماج .

٥٨٥٨ - تيفولا النفل * *Typhula trifolii*

فطر مجهري يعيش في البلاد الباردة يتطفل على معظم النباتات القرنية وعلى النفل والفصة فيعطب الاوراق بعد السوق ويسبب ذبولها وسقوطها || مظهره الخارجي اسوداد يحل بالاوراق يعقبه نواس مشيجي يكتنف المعاليق مصدره الثعاليل القائمة على السوق . وهذه الثعاليل تبدو بيضاء اللون ثم تنحرف الى السمرة .

٥٨٥٩ - تيفولا إيتوانا * ، تيفولا النجيليات ، عفن الثلوج *Typhula itoana, T. graminum, Sclerotium fulvum (S). Pourriture des neiges (F).*

فطر مجهري يتطفل على الزروع وسائر النجيليات البرية فيعطب العصف ويؤذي السوق ويؤخر النمو وقد يقضي عليه || يكثر وجوده في البلاد الباردة لانه ربيب الثلوج وارتفاع الحرارة يفقده كل نشاط وحيوية . حرارته الفضلى من صفر الى ٨ درجات . وقد يتكاثر ايضاً بين ٨ و ١٥ درجة شرط ان يكون ذلك بمأمن من النور || مظهره الخارجي بثور صغيرة متراصة تركب نصل العصف فتوشه بقروح مستديرة قطرها من ١٠ الى ٢٠ مم . لوها الى الجؤوة ثم ينحرف الى السمرة العابقة || يكافح باستعمال الاسمدة البوتاسية التي يجب نثرها على الثلج لانها تسرع



تيفولا الشوندرو



تيفولا النفل



تيفولا إيتوانا



تيل



تيل بلدي



تيلس



تيلندس



تيملة مبدولة



تين المطاط

تعلو من ١٠ الى ١٥ م. أوراقها معنقة متعاقبة مستطيلة الشكل ، نصلها مائل الصفحة العليا خلي السفلى ، زغبها أصهب اللون . تزرع للتزين .

٥٨٧٧ - تين الأرض (F). Euphorbe monnayer (F).
Crenated annual spurge (E).
هو الخماسوقي ، اطلبه .

٥٨٧٨ - تين الأصنام (F). Figuiers des Pagodes (F).
Peepul tree (E).
هو اثاب الهند ، اطلبه .

٥٨٧٩ - تين البر، تين حاميز (S). Ficus hispida (S).
Figuiers âpre (F). Red-wood fig tree (E). Rangoon-kautchuk-feigenbaum (D). Fico hispida (I).
نوع من التين ، وهو شجرة كبيرة دائمة ، اقليمها البلاد الحارة ، تعلو من ١٢ الى ١٧ م. أوراقها كبيرة كفية معنقة ، نصلها خشن الصفحة . ثمارها حامزة لا تؤكل لكنها تستعمل في عدة علاجات طبية محلية .

٥٨٨٠ - تين البنغال (F). Figuiers de Bengale (F).
Bengal fig (E).
هو الاثاب ، اطلبه .

٥٨٨١ - تين الصمغ المر (F). Figuiers à caoutchouc (F).
Indian rubber tree (E).
هو تين المطاط ، اطلبه .

٥٨٨٢ - تين الفيل (F).
هو الهال الجوزي ، اطلبه .

٥٨٨٣ - تين المجوس (F).
هو اثاب الهند ، اطلبه .

٥٨٨٤ - تين المطاط* (S). Ficus elastica (S).
Figuiers à caoutchouc, Caoutchouc des jardins (F). Indian rubber tree (E). Gummifeigenbaum, Gummibaum (D). Albero di gomma elastica, Fico della gomma (I).
نوع من التين ، وهو شجرة كبيرة القد تعلو من ٢٠ الى ٢٥ م. أوراقها عروية معنقة متعاقبة رباعية الشكل ، نصلها جلدي مصقول لامع تقطبه من جهتي الضلع عروق كثيرة مستقيمة الزاوية يبلغ عددها نحو ٥٠ زوجاً . يستخرج منها بحز سوقها عصارة صفية لزجة تستعمل استعمال المطاط .

٥٨٨٥ - تين الهند (F).
هو صبار الهند ، اطلبه .

٥٨٨٦ - تين بري (F). Caprifiguler (F). Wild fig (E).
هو الذكار ، اطلبه .

٥٨٨٧ - تين جبلي، حماط (S). Ficus variegata (S).
Figuiers de Sumatra (F). Getah fig tree (E). Wachs-feigenbaum (D). Fico de Somatra (I).
نوع من التين ، وهو شجرة متوسطة القد قلنسوية الشكل تعلو من ٤ الى ٧ امتار ، مهدها سويترة والمناطق الحارة . ثمارها صغيرة حامزة الطعم . تزرع للتزين .

٥٨٨٨ - تين رباعي الورق (S). Ficus pandurata (S).
Figuiers panduriforme (E).
نوع من التين ، وهو شجرة متوسطة القد مهدها الصين ، تعلو من ٨ الى ١٢ م. أوراقها كبيرة الحجم طولها من ٣٠ الى ٦٠ سم. وعرضها من ٢٠ الى ٢٥ . نصلها امرط البشرة على صفحتيه تعلو عروق ناشزة عديدة الشرايين || يزرع للتزين يعيش في المراكن وفي البيوت .

٥٨٨٩ - تين شوكي (F). Figuiers de Barbarie (F).
Barbary fig (E).
هو الصبار المعروف ، اطلبه .

٥٨٦٨ - تيلودين (S). Tylo-dinea (S).

Tylodine (F). Tylo-dinea (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل سقفيات الخياشيم وفصيلة المظاعيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض شطوط المحيط الهادي اخمصها ماليزيا وفورموزا || اصداؤها صغيرة مظلية الشكل قليلة الارتفاع . اجسامها مستديرة مبطة . ارجلها فضفاضة . عيونها جاحظة . خياشيمها ورقية الشكل . ارجلها وحيدة رحية الانبساط مائلة الصفحة السفلى .

٥٨٦٩ - تيماء (F). Etolles d'Orion (F).
Orion stars (E).
التيماء هي نجوم اجزاء .

٥٨٧٠ - تيممة
التيممة والتيممة : النعجة المفصولة عن القطيع تربي وتعلف على حدة .

٥٨٧١ - تيمكة مبدولة* (S). Timalia vulgaris (S).
Timalie vulgaire (F).

طائر من فصيلة التيمليات ورتبة الجواثم . موطنها يمتد من الهند الى ماليزيا : تألف الادغال والاحراج المبعثرة الاشجار || جسمها متوسط القد يطول نحو ٢٢ سم. ثوبها العلوي الى الشقحة السمرى تعلوها تمشيع فحمي في الجناح والذنب . رأسها موشح بالاحمر الجوزي . عنقها وصدرها وبطنها الى الصخرة المرقوشة بالاسمر والاسود . منقادها وساقها الى السمرة الخطية الموج . حذقة عينها كستنية اللون || طيراتها خفيف الحركة ، معتدل الشوط . قوتها النمل والديدان والاساريح والحشرات الصغيرة والحوام والثمار العنبية || تدفن عشها في الدغل الكثيف على ارتفاع متر او مترين عن سطح الارض . الانثى تضع من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٤ يوماً .

٥٨٧٢ - تيمليات (S). Timaliidae (S).
Timaliids (F). Timaliidae (E).

فصيلة طير من الجواثم رقيقات المناقير . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة . معظمها من طيور البلاد الاسيوية والافريقية وبعضها يعيش في امريكا الجنوبية || تألف الادغال والاحراج المبعثرة الاشجار . معظم انواعها من الاوابد وبعضها من القواطع || اشهر اجناسها التيملة والثائرة والغرلقة .

٥٨٧٣ - تيمنية (F). Holantarctique (F).
Holantarctic (E).

نعت تعريفي يطلق على كامل المنطقة الجنوبية بما فيها القطبية .

٥٨٧٤ - تيمول (F). Thymol
مادة دهنية عطرية تستخرج من السعتر .

٥٨٧٥ - تين (S). Ficus (S). Figuler (F). Fig-tree (E).
جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية ، منتضبة وعارشة من سبط التوتيات وفصيلة الانجريات . سوقها فرعاء لينة العصارة . أوراقها كاملة معنقة متعاقبة || انواعه كثيرة العدد مهدها البلاد الحارة والمعتدلة . اعرفها واشهرها مايتيج .

٥٨٧٦ - تين أصهب (S). Ficus rubiginosa (S).
Figuiers rouillé (F).
نوع من التين ، وهو شجرة متوسطة القد مهدها استراليا

الثمرة الجافة من عناصر ومركبات ، نقلًا عن الدكتور
تراير ما معده :

مواد سكرية	من ٥٠ الى ٥٨ %
مواد بروتينية	٥ %
مواد نشوية	٨ %
مواد دهنية	١ %
سليولوز	٥ %
رماد	من ٢ الى ٣ %
ماء	من ١٧ الى ٢٤ %

٥٨٩٦ - تينيا . Taenia (S). Taenia, Ténia (F).
Taenia, Tap-worm (E).

جنس ديدان ، من فصيلة التينيديات ، انواعه عديدة
بعضها ضار بالانسان .

٥٨٩٧ - تينيا رثماء . Bothricephalus
هي النقيرة ، نوع من التينيا .

٥٨٩٨ - تينيا شو كية . Taenia echinococcus (S).
Ténia échinocoque (F).
نوع من التينيا ثوبها امعاء الكلاب حيث تعيش وتتكاثر .

٥٨٩٩ - تينيا عزلاء . Taenia saginata (S).
Ténia inerme (F).
نوع من التينيا ثوبها عضل البقر وقد تعيش في امعاء
الانسان .

٥٩٠٠ - تينيا قزمية . Hymenolepis murina (S).
Ténia nain (F).
نوع من التينيا صغيرة القد ، نحيلة . ثوبها القواضم تعيش
في امعائها وقد تنتقل الى الانسان .

٥٩٠١ - تينيا مخززة . Taenia serrata (S).
Ténia dentele (F).
نوع من التينيا تصيب الارانب و كلاب الصيد .

٥٩٠٢ - تينيا مسكحة ، دودة وحيدة . Taenia solium (S). Ténia armé, Ver solitaire (F).
نوع من التينيا ثوبها الخنزير وقد تنتقل الى امعاء الانسان .

٥٩٠٣ - تينيديات . Teniadae (S).
Téniadés (F). Teniadae (E).
هي الفصيلة التينيدية من رتبة المنطقيات العريضة ،
اجناسها وانواعها عديدة جميعها من الديدان القدية الشكل
المستقيمة المستطيلة .

٥٩٠٤ - تينية . Sycone
نعت تعريفي وصفي يطلق على الثمار اللحمية التينية الشكل .

٥٩٠٥ - تينه . Labyrinth (F). Labyrinth (E).
كل مكان لا علامة فيه يهتدى بها منعاً للضلال .

٥٩٠٦ - تيهور ، ثلثة ، هيار . Eboulis (F).
المواد المنهارة اخصها الصخور . Fallen rocks (E).

٥٩٠٧ - تينهي . Labyrinthique (F).
Labyrinthian (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالتينه .

٥٩٠٨ - تينوع . Plante lactifère (F).
Lactiferous plant (E).
كل نبات يسيل منه عصارة لبنية متى قطع .

٥٨٩٠ - تين فرعون . Sycomore (F). Pharaoh's fig (E).
هو الجميز ، اطلبه .

٥٨٩١ - تين قزم . Ficus pumila (S).
Figuler nain (F).
نوع من التين ، وهو جنبة عارضة صغيرة القد . اوراقها
بيضية الشكل قصيرة الاعناق . نصلها لامع الصفحة ،
جمل الخضار الزاهي || تكثر زراعتها في المراكز وفي
البيوت .

٥٨٩٢ - تين قنفذي . Ficus hirta (S).
Figuler hérissé (F).
نوع من التين ، وهو شجرة صغيرة مهدا الصين تعلو من
٤ الى ٥ امتار . فروعها الفتية زياء اللحماء . اوراقها لينة
مستطيلة . ثمارها صغيرة كروية مقطوعة القاعدة هلبية
البشرة . || تزرع للتزيين تعيش في المراكز والبيوت .

٥٨٩٣ - تين معروف ، بكلس . Ficus carica (S).
Figuler commun, Carique (F). Common fig tree (E).
Echter feigenbaum (D). Fico, Ficaia (I).
نوع من التين ، وهو شجرة زراعية فرعاء دائمة ، تعلو من
٣ الى ١٠ امتار . ساقها طحلاء اللون غزيرة العصارة اللينة
اللزجة الكاوية . اوراقها عابلة ، معنقة ، متعاقبة ، كفية
الشكل ، ثلاثية او خماسية التفريخ ، جامدة النصل ،
زيا الصفحة السفلى || ثمارها صغيرة القد ، لا قياسية
الشكل ، ملساء البشرة ، سكرية اللب غذائية تؤكل رطبة
وجافة || ضرره كثيرة العدد جميعها سبوتية تجود في
جميع الارربة من الريلية الى الطينية . وهي تتكاثر بالتفصيل
والترديخ والتفريد || اشهر ضرره الزراعية اللبنانية
ما يتبع :

البقراطي * : ثمرته متوسطة القد ، اجاصية الشكل ،
خضراء القشرة ، وردية اللب ، سكرية المذاق ، لذيدة ،
تنضج في آب .

البياضي * : ثمرته متوسطة القد ، اجاصية الشكل ، بياض
القشرة ، صفراء اللب ، سكرية المذاق ، جيدة النكهة ،
تنضج في آب وايلول .

الحميري : ثمرته متوسطة القد ، كروية الشكل .
قشرها خضراء اللون يعلوها موج بنفسجي . لها الى الحمرة
سكري المذاق ، لذيد النكهة . ثماره تنضج في آب وايلول .

الخصيري : ثمرته صغيرة القد ، مستديرة الشكل .
قشرها خضراء اللون . لها وردي غزير العصارة السكرية
اللذيدة . تنضج في آب وايلول .

السويدي * : ثمرته صغيرة القد ، كروية الشكل . قشرها
بنفسجية اللون . لها احمر عابق سكري الطعم المستحب .
تنضج في آب وايلول .

الشتوي : ثمرته متوسطة القد ، اجاصية الشكل
مستطيلة . قشرها خضراء اللون . لها احمر مستحب الطعم
فيه بعض الحموضة . تنضج في تشرين الاول والثاني .

الفرنجي : ثمرته كبيرة القد ، اجاصية الشكل ، قشرها
خضراء اللون . لها وردي غزير العصارة السكرية القليلة
النكهة . تنضج في حزيران .

٥٨٩٤ - تين مدغسكار . هو الادبو ، اطلبه .

٥٨٩٥ - تينة . Figue (F). Fig (E).
هي ثمرة التين تتركب خضراء وجافة . تفيد بنوع خاص
الحوامل والرضع . تقدر قيمتها الغذائية ، اي مساهمتها




تين بقراطي



تين بياضي



تين سويدي



ث



ث

٥٩١٨ - ثاني سُلْفَيْت

Bisulfite (F).

Bisulphite (E).

راجع ييسلفيت .

٥٩١٩ - ثَاوَة

Brebis âgée (F). Elderly ewe (E).

الثاوة هي النعجة الهرمة وهي أيضاً الشاة المهزولة .

٥٩٢٠ - ثَايَة ، ثَوِيَّة ، جَدِيْرَة

Bergerie (F).

Sheepfold (E).

هي مأوى الضأن اذا بنيت بحجر .

٥٩٢١ - ثِيَالَة

Limnologie (F). Limnology (E).

علم يبحث في جميع المناشع الحكيمية والبيولوجية العائدة الى البحيرات والاهوار .

٥٩٢٢ - ثِيْت

Francoiin vulgaire (F).

Common francolin (E).

هو الدراج الشائع ، اطلبه .

٥٩٢٣ - ثَبَة

Centre du bassin (F).

Centre of the basin (E).

الثبة : وسط الحوض .

٥٩٢٤ - ثَبَج

Milieu du dos (F).

Middle of the back (E).

الثلج هو وسط الظهر . ج أثباع .

٥٩٢٥ - ثُبَج

Scops (S). Scops, Petit-Duc (F).

Scops, Owl (E).

جنس طير من البوم ينتمي الى عمارة البهويات . انواعه كثيرة العدد جميعها صغيرة القد طولها يراوح من ١٨ الى ٢٢ سم . رؤوسها معتدلة الحجم ، محاسرها خافتة ، مناسرها قصيرة منعقفة سواقطها مستطيلة تلحف الاذنان القصيرة المربعة الشكل . ارساغها دقيقة كاسية . مخالبها خالية من الريش || اعطانها جميع البلاد المعتدلة الحرارة . نظامها جماعي . تعيش اسراباً كبيرة . وهي من الطيور

٥٩١٩ - ثَاد

الثاد هو النبات الناعم الغض وهو الندى وهو الرطوبة .

٥٩١٠ - ثَافْسِيَا

Thapsie (F). Drias plant (E).

هو الدرياس نبات بري طبي .

٥٩١١ - ثاقِب الأذن

Perce-oreille (F). Earwig (E).

Ohrwurm (D).

هو النهيلك ، اطلبه .

٥٩١٢ - ثاقِب الورق

Perce-feuille (F).

Hare's-ear (E).

هو الحليلاب المستدير الورق ، اطلبه .

٥٩١٣ - ثاقِبَات الأذن

Forficulidés (F).

Forficulidae (E).

هي النهيلكيات ، اطلبها .

٥٩١٤ - ثَالِث أُكْسِيْد

Trioxyde (F). Trioxid (E).

٥٩١٥ - ثَالِثِي ، ثَلَاثِي

Ternaire (F). Ternary (E).

ما هو مركب من ثلاثة اجزاء .

٥٩١٦ - ثَامِرَات

Frugivores (F). Frugivorous (E).

هي آكلات الثمر من الحيوانات والحشرات .

٥٩١٧ - ثَالِي أُكْسِيْد الكَرْبُون ، غَاِز الكَرْبُون

Anhydride carbonique (F). Carbon dioxide, Anhydrid carbonic (E).

غاز عديم اللون والرائحة . اقل من الهواء . لا يساعد على الاحتراق بل يستخدم في اطفاء الحرائق وهو قليل الذوبان في الماء || تعريفه الرمزي (CO₂ - ك) يوجد في الهواء يأتيه من تنفس الاحياء ومن الاختبارات واحتراق المواد الكربونية ويعود من الهواء الى النبات بعمل الخشب المعروف بالتمثيل الخشبي .

اوراقها ضيقة النصال تطول من ٣٠ الى ٥٠ سم. لونها الى الخضار البحري. ازهارها قرمزية اللون || تنويرها يستمر من حزيران الى آب.

٥٩٣٦ - ثَبِينَة
Urceolina (S).
Urcéoline (F). Urceolina (E).

جنس نباتات عشبية دوفضية من فصيلة النرجسيات. مهدا بعض مناطق امريكا الجنوبية. اوراقها صغيرة معشقة. ازهارها صفراء اللون او حمراء، صيوانية التجميع، ترتكز على شمرايح مصمتة منتفخة القواعد، مستطيلة الاعناق الضيقة، تنتهي بانتفاخات ثنائية اجاجية الشكل ترتكز عليها الازهار || تزرع للتزيين ضمن البيوت وفي الحدائق. ترغب في الاتربة المعتدلة الاندماج الوافرة المواد الغذائية العضوية والمعدنية، الغنية بعنصر الكلور || انواعها المعروفة قليلة العدد، اشهرها التالية.

٥٩٣٧ - ثَبِينَة قِرْمِزِيَّة
Urceolina miniata (S).
Urcéoline écarlate (F).

نوع من الثبينة. عشبة دوفضية سبروتية. شمرايحها يرتفع من ٢٠ الى ٣٠ سم. اوراقها تعد من ٣ الى ٤ نصالها تطول من ١٥ الى ٢٠ سم. لونها الى الخضار البحري. ازهارها دقيقة الالوان، تطول نحو ٤ سم. لونها الى الحمرة القرمزية السفعاء المواج || تنويرها يستمر طوال شهر ايلول.

٥٩٣٨ - ثَبِينَة مُتَهَدِّلَة
Urceolina pendula (S). Urcéoline pendante (F).
نوع من الثبينة. عشبة دوفضية جاذحة متطيلة. شمرايحها محجن الطرف المتهدل يطول نحو ٣٠ سم. اوراقها قليلة العدد الذي يراوح من ١ الى ٣ نصالها تطول من ٨ الى ١٢ سم. ازهارها دقيقة الالوان تطول نحو ٥ سم. لونها الى الصفار الكبريتي يعلوه طوق حثاري ابيض || تنويرها يستمر من تشرين الاول الى الثاني.

٥٩٣٩ - ثَبْت
الثبت الشق او الفلع في الصخرة.

٥٩٤٠ - ثَبْتِي
الثبي : حطام الثبن ودقاق الثبن او حسافة الثمر وكل شيء حشوت به غرارة بما دق فهو الثبي || وقال ابو حنيفة الثبنة والثبي : قشر الثمر وردشه (اللسان).

٥٩٤١ - ثَبَجَالَة جَبَلِيَّة
Trichocera montana (S).
Trichocère de montagne (F).

حشرة لامؤذية من فصيلة الثبجائيات ورتبة ذوات الجناحين || جسمها صغير القد، نحيل، يطول من ٤ الى ٦ سم. رأسها شبه مكور الشكل. عينها زئيمتان. زباناها غليظتان. روشنها كبيران، مهدبا الاطراف. قوائمها نحيلة، مستطيلة. ثوبها الى الرمكة القبراء || تألف جميع المواقع المشجرة. تظهر الحشرة الجمالنة في اوائل الخريف وتبقى حتى اوائل الربيع. تسرح في النهار || الالفى اكبر قدا من الذكر. بطنها مردني الشكل. تبرز الانثى مكنها في الجثالة فينقف عن يرقات تعيش على المواد النباتية المنحلة.

٥٩٤٢ - ثَبَجَالِيَّات
Trichoceridae (S).
Trichocérídes (F). Trichoceridae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين. اجناسها وانواعها

القواطع تأوي الى الاحراج المبعثرة الاشجار والكروم والجناث النائية. تلتصق قوتها في الليل. تصيد جميع انواع الحشرات والقواضم.

٥٩٢٦ - ثَبَجَارَة
الثبجارة حفرة يحفرها ماء الميزاب.

٥٩٢٧ - ثَبْرَة
Calloutis (F). Broken stones (E).
حضيض حصبة حصم وحصى.

٥٩٢٨ - ثَبَل ، ثَبَل
Lie (F). Lees, Drags (E).
البقية الراسبة في اسفل الاناء وغيره.

٥٩٢٩ - ثَبْنَة
Panier (F). Pannier, Basket (E).
هي الحجرة تحمل فيها الفاكهة. ج ثبان. اشكالها واحجامها لاقياسية لانها تعود الى نوع الثمار المرغوب في نقلها.

٥٩٣٠ - ثَبَوْت
Cibotium (S). Cibote (F).
نبات سرخسي مشجر من السيتاسيات. جذعه يعلو نحو ٤ امتار. قشوره ليفية زغبية. زغبه ناعم الملمس مستطيل، لونه الى السمرة. اوراقه قرصية هامية تطول من مترين الى ثلاثة امتار وتعرض من ٦٠ الى ١٢٠ سم. نصالها كثير التفريش، باهت الخضار يعلوه مواج ازرق. كبرها متوسط الضخامة كثيف الزغب الخنطي اللون. يزرع للتزيين. يخشى الاتربة الكلسية. يرغب في المواقع الرطبة.

٥٩٣١ - ثَبِيْت
Insécable (F). Indivisible (E).
صفة ما لا يقبل التجزيء والتحطيم.

٥٩٣٢ - ثَبِيَجَة
Anigosanthus (S).
Anigosanthe (F). Anigosanthus (E).
جنس نباتات برية وتزيينية عشبية معمرة من فصيلة النرجسيات. مهدا بعض مناطق الشرق واسترالية. سوقها منتصب، مورقة. اوراقها ضيقة النصال السيفية الشكل. ازهارها انبوبية، مستطيلة الزغب، لانظامية الترتيب || انواعها المعروفة عديدة، اشهرها التالية.

٥٩٣٣ - ثَبِيَجَة اَرْجَوَانِيَّة
Anigosanthus thyrianthinus (S).
Anigosanthe pourpre (F).

نوع من الثبيجة. ساقها مزغبة اللحاء في ثلثها الاول ثم مرطاه في الثلثين التاليين. ترتفع نحو ١٠٠ سم. اوراقها ضيقة تطول نحو ٣٥ سم. نصالها الى الخضار العابق. ازهارها ارجوانية اللون يعلوها تبقيج ابيض وزغب بنفسجي || تنويرها يستمر طوال شهر ايار.

٥٩٣٤ - ثَبِيَجَة فَاخِرَة
Anigosanthus pulcherimus (S).
Anighosanthe superbe (F).

نوع من الثبيجة. ساقها ترتفع نحو ١٠٠ سم. اوراقها ضيقة للنصل المثلل. ثملها نجمية الشكل سمراء اللون. ازهارها صفراء اللون كثيفة الزغب الاشقر || تنويرها يستمر من ايار الى تموز.

٥٩٣٥ - ثَبِيَجَة قِرْمِزِيَّة
Anigosanthus coccineus (S).
Anigosanthe écarlate (F).


نوع من الثبيجة. ساقها مهدبة اللحاء ترتفع نحو ١٥٠ سم.



ثَبْنَة



ثَبِيَجَة اَرْجَوَانِيَّة



ثَبِيَة مُتَهَدِّلَة

الأمريكية . وهي قريبة الشبه بفصيلة الحمحميات لافارق بينهما سوى الأزهار السمي المصّل الشكل || أشهر أجناسها الشجيرة والدقيقة والوبيرة .

٥٩٥١ - نَجْن ٥
Nive
كل الخدود أو ساقية وما أشبه سببه السيل .

٥٩٥٢ - نَجْبِيج
Débit (F).
Measurement, Duty, Flow (E).
نَجْبِيج ونَجْر الماء : كال مقدار انصبابه . ومقدار انصبابه بالثانية يدعى نَجْبِيجاً .

٥٩٥٣ - نَجْبِير
Marc (F). Residuüm (E).
هو ثفل عصير الثمار كالعنب والتفاح والتين وغيرها ، وقيل ثفل كل شيء يعصر .

٥٩٥٤ - نَجْبِرَاء
Vinsasse (F).
Bad wine, Very weak (E).
هو ما يبقى من العصرة مع ثفلها في تقطير المشروبات الكحولية .

٥٩٥٥ - نَجْحَاة
Melasphaerula (S).
Mélaspérula (F). Melasphaerula (E).
نبات عشبي دولفي وحيد الجنس والنوع من فصيلة السوسنيات . منبته بعض المناطق الإفريقية المعتدلة الحرارة . ساقها دقيقة ترتفع من ١٥ إلى ٣٠ سم . أوراقها عسفية الشكل ، بخيلة الخضار الزاهي . أزهارها عسكولي التجميع . أزهارها صغيرة القد ، أهليلجية البتلات الفستقية اللون يعلوها تجذيع أرجواني || تزرع للزينة ضمن البيوت وفي الحدائق || تنويرها يستمر طوال شهر نيسان .

٥٩٥٦ - نَجْحُحَة *
Philesia (S).
Philésie (F). Philesia (E).
جنبه معمرة ، أبدية ، مبروتية من فصيلة الزنبقيات . وحيدة الجنس والنوع . مهدا بلاد الشيلي وقد انتشرت زراعتها التريينية في معظم أقطار العالم . ساقها فروع تعلو من ١٠٠ إلى ١٢٠ سم . أوراقها متعاقبة ، لاطئة ، أهليلجية الشكل تطول نحو ٤ سم . نصلها جامدة الصفحة ، وحيدة الضلع . أزهارها طرفية الارتكاز ، ثنائية التجميع ، حمراء اللون || تنويرها يستمر من الربيع إلى الخريف .

٥٩٥٧ - نُحْرُط
Angustura vera, Galipea
officinalis (S). Angustura, Cusparée, Galipée (F).
Angostura Bark (E).
شجرة حرجية طبية وصناعية من فصيلة السذابيات منبها الأصلي بعض مناطق أمريكا الجنوبية اخصها فنزويلا على ضفاف الأورينوك || ساقها رفيعة فروع دائمة تعلو نحو ٣٥ متراً . أوراقها كبيرة ، مستطيلة الزناد ، ثلاثية التجميع . أزهارها عنقودي . أزهارها خماسية البتلات البيض . ثمارها حبوب مستطيلة ، مبططة ، سوداء اللون ، عطرية العرف || خواصها الطبية في لحاء السوق والأغصان ، مسحوقها مقو ودافع للملح .

٥٩٥٨ - نُحْطَرُط
Aegiphile (F).
جنس نباتات عشبية مدادة معمرة من فصيلة الساجيات . مهدا البلاد الحارة والاستوائية || يقال أن عصارة أوراقها مضادة لسم الافاعي .

المعروفة عديدة معظمها من عظم الاقاليم الباردة . يكثر وجودها في الغابات وفي الحدائق قرب المساكن . تعيش على رحيق الأزهار || أجسامها صغيرة ، نحيلة ، عيونها زهمية . قرونها الاستشعارية خيطية تتألف من ١٦ فصلة . قوائمها مستطيلة ، نحيلة ، قصبة || أناثها أكبر قدماً من ذكورها . يرقاتها تعيش على المواد النباتية المنحلة .

٥٩٤٣ - نَجَّة

هي الروضة فيها حياض ومساكن للماء . ج نجات .

٥٩٤٤ - نَجْر
Large (F). Wide (E).
نعت وصفي بمعنى عريض . يقال ورق نَجْر أي عريض . والجذر يأتي بذات المعنى .

٥٩٤٥ - نَجْرَة
Milieu d'une vallée (F).
Midst in valley (E).
هي وسط الوادي وقد تكون تربتها عيقة الغور وافرة الغذاء اذا حفظت من عبث الانجراف .

٥٩٤٦ - نَجْمَة ٥
Hydrophyllum (S).
Hydrophyll (F). Hydrophyllum (E).
الاسم العلمي من اليوناني بمعنى « أوراق مليئة بالماء » . جنس نباتات عشبية من فصيلة النجميات . مهدا بعض مناطق أمريكا الشمالية . أوراقها كبيرة فضفاضة ، الجذعية منها متعاقبة . أزهارها بيضاء اللون أو زرقاء || أنواعها المعروفة عديدة ، أشهرها التالية :

٥٩٤٧ - نَجْمَة بُنْقُوسِيَّة ٥
Hydrophyllum capitatum (S).
Hydrophyll capité (F).
نوع من النجمة . عشبة معمرة . جعثنها لحمية . ساقها قصيرة تعلو نحو ٢٠ سم . أوراقها مركبة من خمس أو سبع وريقات فضفاضة . أزهارها بنقوسية رأسية الارتكاز قصيرة المعاليق ، زرقاء اللون || تنويرها يستمر من أيار إلى حزيران .

٥٩٤٨ - نَجْمَة فيرجينية *
Hydrophyllum virginicum (S).
Hydrophyll de Virginie (F).
نوع من النجمة . عشبة معمرة . ساقها تعلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم . أوراقها الجذعية خماسية أو سباعية الوريقات المنشارية الحتار . أزهارها مستطيلة المعاليق ، بيضاء اللون ، تطول نحو ٨ سم . فصلها مهدبة الأطراف || تنويرها يستمر من أيار إلى حزيران .

٥٩٤٩ - نَجْمَة كَنَدَا ٥
Hydrophyllum Canadense (S).
Hydrophyll du Canada (F).
نوع من النجمة . عشبة معمرة . ساقها تعلو من ٤٠ إلى ٧٥ سم . أوراقها كبيرة سباعية أو تساعية الفصوص ، تطول نحو ٣٠ سم . وتعرض نحو ٢٥ سم . فصوصها مسننة الحتار . أزهارها أرجوانية اللون ، مستطيلة المعاليق || تنويرها يستمر من أيار إلى حزيران .

٥٩٥٠ - نَجْمِيَّات ٥
Hydrophyllaceae (S).
Hydrophyllacées (F). Hydrophyllaceae (E).
فصيلة نباتية من متحذات القملات مرتفعات المبيض . أجناسها وأنواعها عديدة ، معظمها من نباتات القارة



نَجْمَة فيرجينية



نَجْحَاة

٩٠٠٠ تفتني الى ٩٣٢ جنساً ، تجمعها حسب التصنيف الحديث ١١٨ فصيلة تنفوي تحت لواء ١٤ رتبة كما هو مبين في الجدول التابع الذي يضم معظم الفصائل وأشهر الاجناس .

٥٩٦٩ - ثَرَاء ٥ Divitisme (F). Divitism (E).
الثناء اليسر المفرط الفاحش .

٥٩٧٠ - ثَرَاء ٥ Ixioliron (S).
Ixiolire (F). Ixioliron (E).

جنس نباتات عشبية دوفضية من فصيلة النرجسيات . مهدا الشرق الاذى . سوقها نخيلة مورقة . اوراقها رقيقة النصال الضيقة . ازهارها جميلة ، صغيرة ، عنقودية التجميع او صيوانية رتاجية || تزرع للزيين ضمن البيوت وفي الحدائق . ترغب في الاتربة المعتدلة الاندماج الوافرة المواد الغذائية || انواعها المعروفة قليلة العدد أشهرها الثراء الجبلية .

٥٩٧١ - ثَرَاء جبالية ٥ Ixioliron montanum (S).
Ixiolire montagnard (F).
نوع من الثراء . عشبة دوفضية سبروتية . ساقها نخيلة ترتفع من ٣٠ الى ٥٠ سم . اوراقها سنانية الشكل تطول من ٨ الى ١٢ سم . نصالها بحرية الخضار ، محددة الصفحات . ازهارها عنقودي التجميع . ازهارها الى الزرقا البنفسجية اللامعة تطول من ٣ الى ٤ سم . || تنويرها يستمر من نيسان الى ايار .

٥٩٧٢ - ثَرَاة ٥ Xénologie (F). Xenology (E).
الثراة علم موضوعي يبحث في المشاكل التاريخية والاجتماعية والاخلاقية الناتجة عن اسكان غرباء في وطن معين .

٥٩٧٣ - ثَرَامَة ٥ Hygrophorus (S).
Hygrophore (F). Hygrophorus (E).
جنس فطور كاملة التركيب من فصيلة الغاريقونيات . انواعها المعروفة نحو ٣٠ جميعها ملونة . اعطائها معظم اقاليم المناطق المعتدلة الحرارة . تعيش على المواد النباتية المتحللة في المواقع الرطبة . تتميز ببوغها الابيض اللون وباطراسها شبه الشفافة المعتدلة التقارب . بعض انواعها دبق الارسوسة والساق || منها انواع مأكولة لذيدة الطعم واخرى كاعنة غير مرغوب فيها .

٥٩٧٤ - ثَرَامَة الحيراج ٥ *

Hygrophorus nemoreus (S).
Hygrophore des bois (F).
نوع من الثرامة ، فطر كاعن الصنف غير مرغوب فيه . رائحته رائحة الدقيق . ارسوسه كبيرة القد ، تبينة اللون يملوها موج اسمر . وهو من الفطور المبذولة في اكثر الحراج .

٥٩٧٥ - ثَرَامَة الماعز ٥ *

Hygrophorus caprinus (S).
Hygrophore des chèvres (F).
نوع من الثرامة ، فطر كاعن الصنف غير مرغوب فيه . يكثر وجوده في حراج الصنوبريات . ارسوسه مخروطية الشكل في اول عهدها ثم محدودة ، فطرها نحو ١٠ سم . لونها الى الطحلة السمراء .

٥٩٥٩ - نُخَيْلَة ٥ Hypogastrura (S).
Hypogastrure (F). Hypogastrura (E).

جنس حشرات قافزة قارضة من فصيلة النخيليات ورتبة الكهدليات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة والمنحرفة نحو الباردة || اجسامها صغيرة تطول من ١ الى ٣ مم . اثنائها وحيدة اللون يكثر فيها الاسمر القاتم والاسود والاخضر الاليس . رؤوسها نائقة ، ضخمة . قرونها الاستشعارية صغيرة . عيونها ماسحة . جهازها القفزي ثنائي الاقدام ، صغير القد . ارساغها وحيدة الظفر المحجن الدرب || يكثر وجودها تحت الحجارة والاشخاب وفي الجلالة .

٥٩٦٠ - نُخَيْلِيَّات ٥ Hypogastruridae (S).
Hypogastruridés (F). Hypogastruridae (E).

فصيلة حشرات قافزة قارضة من رتبة الكهدليات . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها شديدة الصغر ، مستطيلة الشكل ، مبعثرة الحلب . رؤوسها نائقة ، مكورة . عيونها ، عند وجودها ، نقيمة الارتكاز . قرونها الاستشعارية قصيرة رباعية الفصل . صدورها ثلاثية الحلقات . بطونها سداسية السكم مجهزة بجهاز قفزي وبحويصلات تفرز مادة لزجة تساعد الحشرة على تسلق السطوح الناعمة . قوائمها قصيرة . ارساغها وحيدة الظفر الدرب او ثنائيتة || اعرف اجناسها النخيلة .

٥٩٦١ - نُخَيْنُ البتلة Crassipétale (F).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات بتلات ازهاره أنخن من المؤلف .

٥٩٦٢ - نُخَيْنُ الفلّس Crassisque (F).
نعت تعريفي يطلق على كل سمكة نخينة الحراشف .

٥٩٦٣ - نُخَيْنُ القوائم Crassipède (F).
نعت تعريفي يطلق على كل حشرة نخينة القوائم .

٥٩٦٤ - ثَدَاء

الثداء : نبات يجف في الصيف ويخضر في الشتاء (اقرب الموارد) || الثداء : نبت له ورق الكراث وقضبان طولاً تدقها الناس وهي رطبة فيتخذون منها أرشية يسقون بها . (قول ابي حنيفة) || الثداء : شجرة طيبة يحبها المال ويأكلها وأصوبها بيض حلوة ولها نور مثل نور الخطمي الابيض . في اصلها شيء من حرة يسيرة وينبت في أضعافها الطرائث والضغائيس (قول مرة) .


٥٩٦٥ - ثَدَام * ، مصفأة Filtre (F). Filter (E).
اداة تمبرها المياه والسوائل فتخرج منها نظيفة من الاذى .

٥٩٦٦ - ثَدَن Raccourcir (F). To shorten (E).
ثدن وأئدن الشيء : قصره . اشجار ثدنة : ناقصة . اشجار مثدنة ومشدونة الاغصان : صغيرتها وقصيرتها .

٥٩٦٧ - ثَدَن Gras, Replet (F). Fat, Bulky (E).
الثدن هو الكثير اللحم من كل ذي ظلف كالبقر والضأن . والماعز . والائثي ثدنة .

٥٩٦٨ - ثَدِيَّات ، هَرَعِيَّات ، لَبُونَات

Mammifères (F). Mammalia (E).
صف من مملكة الحيوان . انواعه المعاصرة المعروفة نحو



ثَدَام



ثَرَامَة الحراج



ثَرَامَة الماعز

الثدييات

الرتبة	الفصيلة	الجنس	
وحيدات المسلك	Monotrèmes	نضاضيات	Echidné Zaglosse
		نضاض	Echidnides
		ذغلو ص	
		خلد الماء	Ornithorhynque
			Ornithorhynchidés
جرايات	Marsupiaux	ذوات الجرابين	Opossum Péramys Sarigue
		أبو سوم	Didelphidés
		بيرميس	
		سريع	
		دزوريات	Dasyure Sarcophile Phascogale
		دزوريديس	Dasyuridés
		نيلس	Thylacine
		لقافات الارضة	Thylacinidés
		لقافات الارضة	Myrmecobius
		لقافات الارضة	Myrmecobiidés
		زيزيات	Péramèle
		زيزيات	Péramélidés
		تلكميس	Thalacomys
		كميات	Notoryctes
		كميات	Notoryctidés
		سينولستيات	Coenolestes
		سينولستيات	Coenolestidés
		فلنجريات	Phalanger
		فلنجريات	Phalangéridés
		بطورس	Petaurus
		بيلوان	Acrobate
		درميس	Dromicia
		كولج	Koala
		فارة العسل	Tarsipe
		قنفر	Kangourou
		قنفر جرذي	Rat-Kangourou
		ولاب	Wallabie
		بباط	Wombat
		بباط	Phascologyidés
فرد شرخوية	Edentés xénarthres	ناملات	Tamanoir Tamandua Cyclope
		ناملات	Myrmecophagidés
		دابة	Bradype
		دابة	Bradypodidés
		مدرعات	Tatou Tatousia
		مدرعات	Dasypodidés
فرد مانسة	Edentés pholidotes	قرفيات	Pangolin géant, Smutsia Pangolin, Uromanis Pangolin, Manis Phatages
		قرفيات	Manidés
		ام قرفة جبار	
		ام قرفة مستطيل الذنب	
		مانس	
		فتاج	

الرتبة	الفصيلة	الجنس	
ذُرْد منجمرة	Tubulidentés	منجمرات	Oryctérope
قواضم	Rongeurs	سنجانيات	Sciuridés
		سنجاب	Ecureuil
		تاميه ، صيدنافي	Tamias
		هوقل	Spermophile
		بلطوش	Pelatouche
		مرموطيات	Marmotidés
		مرموط	Marmotte
		سينوميس	Cynomys
		بهرتات	anomaluridés
		بحر	Anomalure
		حاروديات	Castoridés
		حارود	Castor
		حاروديات الجبال	Aplodontidés
		حارود الجبال	Aplodonte
		برنيات	Pédetidés
		برنب	Pédète
		جوميديات	Géomyidés
		جوميس	Géomys
		طوميس	Thomomys
		هتروميسيات	Hétéromyidés
		هتروميس	Hétéromys
		ديدميس	Dipodomys
		بربوعيات	Dipodidés
		بربوع	Gerboise
		زغيات	Muscardinidés
		قرقدن	Loir
		فرنپ	Lérot
		زغبة	Muscardin
		غفيور	Graphiure
		لفيوميات	Lophiomyidés
		ام هوس ، لفيوم	Lophiomys
		مناجد	Spalacidés
		ريزوميس	Rhizomys
		فأرة عمياء ، خلد	Spalax
		فأريات	Muridés
		دوميس	Déomys
		فأرة الزرع	Arvicole
		لمين	Lemming
		عكبر	Campagnol
		جرذ ممسك	Rat musqué
		رينكوميس	Rhynchomys
		جربيل	Gerbille
		عضل	Psammomys
		تتيره	Tatera
		جرذ قصير الذنب	Otomys
		قنّاد همستر	Hamster
		هيدروميس	Hydromys
		دندر	Dendromus
		جرذ	Rat
		فأرة	Souris
		دثيمة	Mulot
		كوشة	Coucha

الرتبة	الفصيلة	الجنس	
قوارض	Rongeurs	فأريات	Muridés
		قذاز	Cricetomys
		ركين	Bandicot
تهنيات	Bathyergidés	تهنون	Bathyergue
		هليوفوبوس	Heliophobius
		جوريكوس	Géorychus
قنقليات	Cuniculidés	باكاس ، قنقول	Paca
دينوميديات	Dinomyidés	دينوميس	Dinomys
شنشيليات	Chinchillidés	شنشيلة	Chinchilla
		لغستوم	Viscache
غرزونيات	Eréthizontidés	غرزون	Eréthizon
		قندوس	Coendou
		قطموس ، شطموس	Chaetomys
شردقيات	Dasyproctidés	اغوتي	Agouti
شيميات	Hystrioidés	شيم	Porc-épic
		اطرور	Athérure
		دلدل صومره	Trichys
اخميسيات	Echimyidés	اخميس	Echimys
		كبروميس	Capromys
		قباع	Aulacode
غندقيات	Cténodactylidés	غندي	Gundi
		مسوتيره	Massoutiera
		لوفه	Felovia
كوبائيات	Caviidés	كوباي	Cobaye
		كردون	Kérodon
		مارة	Mara
		كاياء	Cabiai
بيكيات	Ochotoniides	بيكة	Ochotona
ارنيات	Léporidés	ارنب	Lapin
		قواع	Lièvre
حافريات	Ongulés	دمائيات	Procaviidés
		دمان	Procavia, Daman de rochers
		زلم	Dendrohyrax, Daman d'arbres
		طيسون	Heterohyrax, Daman des steppes
فليات	Eléphantidés	فيل	Elephant
كركدنيات	Rhinocerotidés	كركدن	Rhinocéros
سناديات	Tapiridés	سناد ، تابير	Tapir
خيليات	Equidés	خيل	Chevaux
		حمير	Anes

الرتبة	الفصيلة	الجنس	
حافريات	Ongulés	خيليات	Equidés
		حمير الزرد	Zèbres
		فراء التبت ، هميون	Hemione
		فراء اشوري	Hemippe
		الخدر	Onagre
	هيموتيات	Hippopotamidés	هيموت ، فرس البحر
			Hippopotame
	خنزيريات	Suidés	رت ، خنزير
		هلوف	Sanglier, Porc
		هلوف	Phacochère
		هلوف	Potamochère
		هوشر	Hylochère
		بابيروسة	Babirossa
		بجلاح	Pécari
	بقريات	Bovidés	بقر اهلي
		جاموس ، ذئب	Bœufs domestiques
		قطاس	Buffles
		جيهل	Yack
		بيسون	Gayal
		ثور المسك	Bison
		بازن ، بزل	Bœuf musqué
		وعل	Pasang
		جهل ، نغار	Bouquetin
		أروية	Hémitrague, Thar
		ضأن	Mouflon
		ماعز	Mouton
		شمواء ، فادر	Chèvre
		نمرود	Chamois
		طخيم ، طاقان	Nemorhède
		صمغور	Budorcas, Takin
		سيكا ، مهاة سيكا	Oreamne
		جيهل	Saiga
		قنمار	Tragélaphe
		يرع	Limnotrague
		قرمود	Nyala
		اروس	Koudou
		علب	Oreas
		ابو زلاف	Bongo
		شخارة	Nylgaut
		حريم	Tétracère
		جللوم	Bubale
		نو	Damalisque
		علب ، ابو عرف	Gnou
		ارخ	Hippotrague
		ابو عدس	Oryx
		مرامري	Addax
		ظبي	Cobes
			Antilope

الرتبة	الفصيلة	الجنس	
حافريات	Ongulés	بقريات	Bovidés
		غزال	Gazelle
		نراق، ابو صفن	Antidorcas, Springbock
		هليم	Céphalophe
		اديس	Ourebie
		طفاقر	Oréotrague
		مدوكة	Madoqua
		شدان	Raphicère
زرافيات	Giraffidés	زرافة	Girafe
		وكاب، وكبي	Okapi
جمليات، ايليات	Camélidés	جمل	Chameau
		لاما	Lama
أيليات	Cervidés	أيل	Cerf
		يامور، يحمور	Chevrenil
		ايل : ادرع	Daim
		أيل الهند، صمبر	Sambar, Rusa
		أيل خنزيري	Para
		أيل ارقط	Chital, Axis
		مجاك	Muntjac
		سيكه	Sika
		أيل فيرجينية، كريكور	Cariacou
		مزامه	Mazama
		بودو	Pudu
		ألكة	Elan
		دنة، رندبر	Renne
		أيل المسك	Chevrotain porte-musc
ترغوليات	Tragulidés	قنشير، ترغول	Tragule
		شفار	Chevrotain
حوتيات	Cétacés	باليات	Balaenidés
		مركوليات	Balaenopteridés
		ناليات	Rachianectidés
		فوقيات	Delphinaptéridés
		حريش البحر، قوفي	Narval
		بالوغة، حفش روسي	Béluga
عنبريات	Phytéridés	عنبر	Cachalot
		زفيوس	Ziphius
		دخاس	Hyperoodon
		محبول	Mesoplodon
دلفينيات	Delphinidés	دلفين	Dauphin
		توسوب	Tursiop
		دلفين الأنهر	Sptalia
		تحس	Marsouin
		اركة	Orque

الرتبة	الفصيلة	الجنس	
حوتيات	Cétacés	دلفينيات	Delphinidés
		جرش	Grampus
		جرأقة	Globicéphale
		نحس أسود	Marsonin noir
	جبحليات	Platanistidés	جبحل ، سبوق
		Plataniste	
		اينيا ، بوتو الامازون	Inia, Boutou de l'Amazone
		لبوت	Lipote
خيلائيات	Siréniens	خراف البحر	Manatidés
		اطوميات	Halicoridés
		غيتنيات	Rhytidés
		خراف البحر	Lamantin
		اطوم ، زالخة	Dugong
		غيتين	Rhytine
زعفيات الالدام	Pinnipèdes	فقميات	Phocidés
		فقمية	Phoque
		مقرنس	Macrorhine
		أثاريات	Otariidés
		فطيات	Trichéidés
		أثاريه	Otarie
		فقط ، فيل البحر	Morse
لواحم	Carnivores	سنوريات	Félidés
		سنور	Chat
		وشق	Lynx
		عسلق	Ocelot
		مرغي	Margay
		جغورندي ، سبتي امريكي	Jaguarondi
		ايره	Eyra
		بوما ، كوجر	Puma
		اسد	Lion
		ببر	Tigre
		نمر	Panthère, Léopard
		جغوار	Jaguar
		سج	Serval
		فهد	Guepard
	زباديات	Viverridés	زيادة
			Civette
			رباح
			Genette
			زيادة النخل
			Paradoxure
			زيادة سوداء
			Binturong
			فلنوك
			Euplère
			غملاس
			Crossarche
			نمس
			Mangouste
			سرقاط
			Suricate
			عساس
			Cryptoprocte
	ضبعيات	Hyénidés	ضبع
			Hyène
			عسبار
			Protèle
	كلبيات	Canidés	كلب
			Chien
			ذئب
			Loup
			ذنكو ، ذئب استراليه
			Dingo
			ابن آوى
			Chacal

الرتبة	الفصيلة	الجنس	
لواحم	Carnivores	كلبيات	Canidés
		ثعلب	Renard
		فئك	Fennec
		ضهل	Dohle
		هنياس	Otocyon
		ضيفب	Icticyon
		ميمع	Lycan
	رأونيآت	Procyonidés	Panda
		بندا	
		راتون ، راكون	Raton
		قوطي ، نزواة	Coati
		كينكاجو	Kinkajou
	ديآت	Ursidés	Ours
		دب	
		دب اشعط	Grizzly
		دب امريكي ، بريبال	Baribal
		دب الخيزران	Ailuope
	سرعويآت	Mustélidés	Belette
		سرعوب	
		هرمين ، قاقم	Hermine
		ابن عرس	Putois
		ابن مقرض	Furet
		فيزون	Vison
		ظريل	Zorille
		راتل	Ratel
		سمور	Marte
		دلق	Fouine
		شره ، غلوطن	Glouton
		غرزون ، هورن	Grison
		غريب ، زيزب	Blaireau
		ميدوس	Mydaus
		ظريان امريكي	Mouffette
		قنباط	Conépaté
		قضاة	Loutre
		هدريس	Loutre de mer
مجنحات الايدي	Chiroptères	وطواطيآت	Ptéropidés
		شقاة	Roussette
		حبر	Epomorphe
		مقطوم	Cynoptère
		مئاة	Macroglosse
		حبوش ، اشرف	Nésonyctéris
		رداسة	Cynonyctéris
		سرحاب	Eonyctéris
		مساة	Harpie
		مساة الفيليين	Harpyionyctéris
	منطايآت	Mégadermidés	Mégaderme lyre
		منطاب قشاري	
		منطاب جبار	Megaderme géant

الرتبة	الفصيلة	الجنس	الجنس
مخنجات الابدی	Chiroptères	وحريات	Nyctéridés
		وحرة	Nyctère
		عماشيات	Rhinolophidés
		عماش	Rhinolophe
		دوبر	Aselle
		حناطل	Triaclops
		دباش	Phyllorhine
		دملوح	Anthops orné
		ذنباب	Coelops
		ورقيات	Phyllostomidés
		نراف	Vampire
		ورقية	Phyllostome
		رينوفيل	Rhinophylla
		مصاص	Glossophaga
		عربط	Artibeus
		علوق	Desmodus
		عولق	Diphyllia
		عينومات	Rhinopomatidés
		عينوم	Rhinopoma
		رئاسيات	Emballonuridés
		رئاس	Emballonura
		خضوف	Saccopteryx
		دئاس	Diclidura
		دومس	Furie
		شقذان	Taphien
		نكتيل	Noctilion
		خفاشيات	Vespertilionidés
		خفاش	Vespertilion
		خفاش فاري	Murin
		نقطول	Noctule
		خفدود	Pipistrelle
		سرتين	Serotine
		كرينوله	Kérivoula
		عطلاف	Atalapha
		خشاف	Vesperugo
		طمروق	Oreillard
		سحاة	Barbastelle
		ذعماط	Scotophile
		نيكتوفيل	Nyctophyle
		زنباع	Minioptère
		نثلوسيات	Natalidés
		نثلوس	Natalus
		هوجن	Furipterus
		ثيروب	Thyroptère
		مزبوديات	Myzopodidés
		مزبود	Myzopode

الرتبة	الفصيلة	الجنس	
مجنحات الابهدي	Chiroptères	هيميريات	Molosse Nyctinome Chiroméle Mystacine
حشرات	Insectivores	زبائيات	Musaraigne Crocidure Crossope
		طويينيات	Taupe Desman Uropsile
		بيايات	Potamogale
		قنفذيات	Hérisson Gymnure
		مذاليات	Tenrec Ericule Hemicentète Microgale Limnogale
		حذاديات	Macroscélide
		طوياجيات	Toupaie
		كوبيات	Galéopithèque
رئيسات	Primates	ترسوسيات دوبنتونيات	Tarsier Aye-Aye
		وسائيات	Loris Nycticèbe Galago Ojam
		كليثريشيات	Ouistiti Tamarin Singe-lion Callithriche
		ليموريات	Lemur, Maki Hapalémur Lépilémurè Chirogale Microcèbe

الرتبة	الفصيلة	الجنس	
رئيسات	Primates	ليموريات	Lémuridés
		عندريس	Indri
		سيفق	Propithèque
		ليمور مصوف	Avahi
	سيوسيات	Cébidés	دروكولي
			Douroucouli
			Saki
			Ouakari
		ستنتور ، زيات	Hurleur
		سيوس ، ساجو	Sajou
		كريزوتريكس ، سيمريس	Saimiri
		آتل	Atèle
		لغوتريش	Lagotriche
		براكتيل ، اريود	Brachytèle
	قطروبيات	Colobidés	هبار
			Semnopithèque
			Rhinopithèque
		نزيك ، كاكو	Nasique
		قطروب ، قطروب	Colobe
	هجرسيات	Cercopithécidés	ماكاك
			Macaque
			شديم
			Magot
			Cynopithèque
			Cercopithèque
			Nisnas
			Cercopithèque de saba
			Diane
		هجرس ديانا	
		هجرس اسيل ، ابو شنب	Moustac
		حودل	Mangaby
		هجرس احمر ، بطاس	Patas
	فردوحيات	Papioidés	فردوح بيوان ، رنج
			Babouin
			فردوح خنزيري ، شقمة
			Chacma
			رنج
			Hamadryas
			ميمون
			Mandrill
			عوفر
			Theropithèque
	هيلوباتيات	Hylobatidés	جبون ، هيلوبات
			Gibbon
			جبون سيامان
			Siamang
	اشباه الانسان	Anthropoidés	سحلاة
			Orang
			بعامة
			Chimpanzé
			غول ، غوريلا
			Gorille



ثَرَامَةُ المَرَاعِي



ثَرَامَةُ بَيْغَاء



ثَرَامَةُ حَمْرَاء



ثَرَامَةُ خَضْرَاء المَوَاج



ثَرَامَةُ سَمْرَاء اللّون



ثَرَامَةُ عَاجِيَةِ اللّون

الشكل في اول عهدها ثم منبسطة ، لونها الى الحمرة . اطراسها الى الصفار الباهت .

٥٩٨٤ - ثَرَامَةُ نَظْرُونِيَّةِ الرَّايِحَةِ ٥

Hygrophorus nitratu (S).

Hygrophore à odeur nitreuse (F).

نوع من الثَرَامَةِ ، فطر كاعن الصنف غير مرغوب فيه . يكثر في المَرَاعِي . ارسوسته مظلية الشكل ، دابقة ، قطرها نحو ٥ سم . لونها الى الكهبة السمرء . رائحتها نظرونية مستهجنة . ساقها قصيرة .

٥٩٨٥ - ثَرُوب

Epiploon
شمم رقيق على الكرش والامعاء . ج ثروب وأثرب . يقال أثرب الكرش اذا زاد ثربه اي شحمه .

٥٩٨٦ - ثَرَبَاء

Grasse (F). Fatty (E).
الانثى السمينة الكانزة اللحم من الضأن والماعز .

٥٩٨٧ - ثَرَبِيّ

Epiplôque (F), Epiplôic (E).

٥٩٨٨ - ثَرَبِيَّة ٥

Stylophorum (S).
Stylophore (F). Stylophorum (E).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الخشخاشيات . سوقها دقيقة تعلو من ١٥ الى ٥٠ سم . اوراقها ريشية ، مخرمة ومفصصة . نصالها بحرية الخضار ، خلية الزغب . ازهارها صفراء اللون || تزرع للزئين . انواعها المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية .

٥٩٨٩ - ثَرَبِيَّةِ اليابان ٥

Stylophorum japonicum (S).

Stylophore du Japon (F).

نوع من الثَرَبِيَّة . ساقها دقيقة تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم . اوراقها ريشية مخرمة ومفصصة . ازهارها محورية الارتكاز كازهار الخشخاش ، وهي كبيرة القد ، صفراء اللون || تنويرها يستمر طوال شهر ايار .

٥٩٩٠ - ثَرَبِيَّة ثُنَائِيَّةِ الأورَاق ٥

Stylophorum diphyllum (S).

Stylophore à 2 feuilles (F).

نوع من الثَرَبِيَّة . ساقها دقيقة تعلو من ١٥ الى ٣٠ سم . اوراقها قريبة الشبه باوراق عروق الصباغين وهما اثنتان لاغير . ازهارها هامية الارتكاز ، قليلة العدد ، من ٢ الى ٤ ، صفراء اللون ، مستطيلة الاذن || تنويرها في ايار يستمر نحو ١٥ يوماً .

٥٩٩١ - ثَرَّة ، ثَرُور

Bonne laitière (F).

Great deal of milk (E).

الثرة والثُرور هي الغزيرة اللبن من اناث اندواجن كالبقرة والشاة والعنز والناقة . ج ثرار وثرر .

٥٩٩٢ - ثَرَنَارَةٌ ٥

Crateropus (S).

Cratérope (F). Babbler (E).

جنس طير من الجواثم . انواعه نحو ٢٠ اعطانها البلاد الحارة جميعها متوسطة القد قدرها قدر الشعور . اثوابها الى الصهبة والكهبة تعلوها رقشة لاقياسية الشكل ، غبراء اللون . وهي كثيرة الزفرقة قوتها الحشرات والهوام .

٥٩٩٣ - ثَرْدُمَةُ ٥

Blaste, Blastème (F).

Blastus, Blastema (E).

من الشيط ، الجزء الذي يشمل القصرة والسويق .

٥٩٧٦ - ثَرَامَةُ المَرَاعِي ٥*

Hygrophorus pratensis (S).

Hygrophore des prés (F).

نوع من الثَرَامَةِ ، فطر كاعن الصنف غير مرغوب فيه . يكثر وجوده في المَرَاعِي . ارسوسته صفراء اللون كالمشمش ، قطرها نحو ٤ سم . اطراسها الى المغرة .

٥٩٧٧ - ثَرَامَةُ بَيْغَاء ٥*

Hygrophorus psittacinus (S).

Hygrophore perroquet (F).

نوع من الثَرَامَةِ ، فطر كاعن الصنف غير مرغوب فيه . يكثر وجوده في الغابات الظليلة . ارسوسته مخروطية الشكل ثم قمية ، قطرها نحو ٣ سم . لونها الى الخضار البحري الاصفر المواج . ساقها صفراء اللون تخضر وتزرق مع الاقتراب من الارسوسة .

٥٩٧٨ - ثَرَامَةُ حَمْرَاء ٥*

Hygrophorus puniceus (S).

Hygrophore rouge ponceau (F).

نوع من الثَرَامَةِ ، فطر مأكول يكثر وجوده في احراج السنديان . ارسوسته مظلية الشكل ، قطرها نحو ٨ سم . لونها الى الحمرة الدودية .

٥٩٧٩ - ثَرَامَةُ خَضْرَاء المَوَاج ٥*

Hygrophorus chlorophanus (S).

Hygrophore à reflets verts (F).

نوع من الثَرَامَةِ ، فطر مأكول يكثر وجوده في احراج الصنوبر ارسوسته مخروطية او جرسية الشكل ، قطرها نحو ٦ سم . لونها الى الصفار المذهب الاخضر المواج .

٥٩٨٠ - ثَرَامَةُ سَمْرَاء اللّون ٥*

Hygrophorus leucophaeus (S).

Hygrophore brunâtre (F).

نوع من الثَرَامَةِ ، فطر كاعن الصنف غير مرغوب فيه . يكثر وجوده في احراج الصنوبريات . ارسوسته شبه قمية الشكل قطرها نحو ٤ سم . لونها الى الصفرة السمرء تعلوها مادة لزجة .

٥٩٨١ - ثَرَامَةُ عَاجِيَةِ اللّون ٥*

Hygrophorus eburneus (S).

Hygrophore blanc ivoire (F).

نوع من الثَرَامَةِ ، فطر كاعن الصنف غير مرغوب فيه . يكثر وجوده في احراج الصنوبريات . ارسوسته لزجة ، قلنسوية الشكل ، قطرها نحو ٧ سم . لونها الى البياض العاجي ، رائحتها رائحة الكرفس .

٥٩٨٢ - ثَرَامَةُ قَرْمِزِيَّةِ اللّون ٥*

Hygrophorus coccineus (S).

Hygrophore rouge cochenille (F).

نوع من الثَرَامَةِ ، فطر كاعن الصنف غير مرغوب فيه . يكثر وجوده في الغابات . ارسوسته صغيرة القد ، قلنسوية الشكل ، قرمزية اللون .

٥٩٨٣ - ثَرَامَةُ مَخْرُوطِيَّةِ الشَّكْلِ ٥

Hygrophorus conicus (S).

Hygrophore conique (F).

نوع من الثَرَامَةِ ، فطر كاعن الصنف غير مرغوب فيه . يكثر وجوده في الغابات . ارسوسته صغيرة القد مخروطية

٦٠٠٤ - ثَرْغُول مُسْهِل Bromus purgans (S).
Brome purgatif (F).
عشبة حولية برية تعلو من ٢٥ الى ٤٥ سم جذورها غليظة
طبية نقيعها يسهل المعدة .

٦٠٠٥ - ثَرْم ، دُرْد Edentés (F). Edentates (E).
رتبة من الحيوانات الالبونة تتميز بقلة اسنانها او بانعدامها .
من فصائلها المشهورة آكلات النمل والذباب والقرفيات
والكسالى .

٦٠٠٦ - ثَرْمَان Hablitzia (S). Hablitzie (F).
نبات بري من السرمقيات ترعاه الابل والغنم . اوراقه
متعاقبة منعقة نصلها قلبي الشكل مدبب العقصة مالمس
الصفحة فاقع اللون الاخضر . ازهاره عنقودية التجميع ،
صغيرة القد ، خضراء اللون .

٦٠٠٧ - ثَرْمَدَة
الثرمدة : من الحمض تسمو دون الذراع وهي اغلظ من
القلام اغصان بلا ورق خضراء شديدة الخضرة واذا
تقادت سنتين غلظ ساقها فاتخذت امشاطاً لجودتها وصلابتها .
تصلب حتى تكاد تعجز الحديد ويكون طول ساقها اذا
تقادت شبراً . ج ثرمد وثرمدات (اللسان) .

٦٠٠٨ - ثَرْي Humecter (F). To humectate (E).
ثرى التربة ثرية : بلها . وثرى المكان : رشه بالماء .

٦٠٠٩ - ثَرْي Divitiaire (F).
الثري من كان صاحب يسر فاحش .

٦٠١٠ - ثَرْيَا Pléiades (F). Pleiad (E).
الثريا كوكبة من سبعة انجم على كاهل الثور وعنته .
سميت بذلك لاقتراب نجومها من بعضها البعض . والثريا
ايضاً منزل من منازل القمر الشامية ينزلها القمر في الليلة
الثالثة من الشهر . ورفيب الثريا يدعى الاكليل .

٦٠١١ - ثَطَاء* ، ثَطَاء ، ثَطَاء

Laches perversa (S).
Lache pervers (F). Laches perversa (E).
دويبة من العناكب الجواللة من فصيلة الهبوريات رباعيات
الروايا والمشاتين || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٦ مم .
عند الذكر ونحو ٢٦ مم عند الانثى . صدراسها مجني الشكل
حنطي اللون ، تعلوه زخرفة صفراء ولثوه بلوطي الشكل
يدعى الرأس ، عينها زيميتان . شيفها قويان . فكها
مستغلظا الطرف . جوامزها نشيطة ، كثيفة الهلب . بطنها
حنطي اللون ، اسود التسنيج ، ينتهي بزائدتين متلاصقتين ||
تألف الاراضي المذحاة . شعها متوسط القد تحيكة بين
الحجارة والنباتات الدغلة . عكديتها بيض بعيد الغور
تحتفره تحت الحجارة . مسرحها دجوي وتغير موضع شعها
كلما دعت الحاجة || بياتها الشتوي يستمر نحو خمسة
اشهر . تعيش نحو ثلاث سنوات . والانثى تمتح المكن في
غشاء تلفقه وتحمله لاصقاً بمشاتها حتى النقف || لسمها
مؤلمة ومؤذية .

٦٠١٢ - ثَعَارِير الثمارير : نبات كاهليون يخرج ابيض (التاج) .

٥٩٩٤ - ثَرَر Humecter (F). To humectate (E).
نضج الشيء بالماء ليرطبه .

٥٩٩٥ - ثَرْعَلَة Camail (F). Hackle (E).
هي البرائل : الريش المحتج على عنق الديك .

٥٩٩٦ - ثَرْعَمَة * Meretrix (S).
Meretrix, Mérétrice, Cythérée, Conque de
Vénus (F). Meretrix (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الحياشيم
معديات الارجل وفصيلة الزهريرات || انواعها المعروفة
نحو ١٣٠ منشرة في معظم بحار البلاد الحارة والمتدلة
الحارة || اصداقها متباينة الاشكال ، يكثر فيها الصيواني .
مصاريعها متساوية ، ثلاثية الاسنان الرئيسية . اصفاها
مالسة او متتابعة التحزير الدقيق . اطرافها مستنة الختار .
مناعبها ثنائية ، طليقة ، نهضة الاطراف || تعيش منغممة
في الرمال المغورة بالماء او بين الصخور || لحومها
مأكولة ، جيدة الصنف .

٥٩٩٧ - ثَرْغُل ، ثَرْمَلَة Renarde (F).
She-fox, Vixen (E).
هي انثى الثلب .

٥٩٩٨ - ثَرْغُول Bromus (S). Brome (F).
جنس نباتات عشبية من فصيلة النجيليات . انواعه عديدة
منها الحولية والحولة والمنمرة . ومنها البرية والزراعية العلفية
والطبية || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

٥٩٩٩ - ثَرْغُول الحَقِيل* ، عَلَقِيَّة Bromus arvensis (S). Brome des champs (F). Corn
brome grass (E). Ackertrespe, Hudelgras (D). Bro-
mo, Forasacchi dei campi (I).

عشبة كلاتية معمرة تعلو من ٤٠ الى ٨٠ سم . تكثر في
الاراضي البور . تتغلفها الماشية بشية . تزرع في المراعي
الاصطناعية مع غيرها من الاعشاب الكلاتية .

٦٠٠٠ - ثَرْغُول الشِيلَم Bromus secalinus (S). Brome des seigles, Sélin (F).
Cheat, Chess-grass, Drake (E). Roggentrespe, Ger-
sten-trespe (D). Segallno, Ventolano, Erba lolio (I).
عشبة برية حولية تعلو من ٤٠ الى ١٠٠ سم . تكثر بين
الزروع اخصها زروع الشيلم . ترعاها الماشية وتعتلفها .
تعتبر من الاعشاب الضارة . يقضى عليها ببعض العواشيب .

٦٠٠١ - ثَرْغُول دَنَقَة* ، كَوَي Bromus tectorum (S). Brome des murs, B. des toits
(F). Wall brome grass (E). Dach-trespe, Manertrespe
(D). Fieno tettaolo, Forasacchi dei tetti (I).
عشبة برية حولية تعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم . تكثر في
الاماكن القاحلة ، ترعى في التربة الكلسية . ترعاها
الماشية فيحسن صنف درجتها .

٦٠٠٢ - ثَرْغُول شَرَادِر Bromus Schrader (S).
Brome de Schrader (F).
عشبة كلاتية زراعية معمرة تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم . توجد
في جميع التربة . زراعتها تعمس خمس سنوات . انتاجها
وافر العلف الجيد الصنف . تبذر في اذار او نيسان
بمعدل ٥ كيلو للدم الواحد .

٦٠٠٣ - ثَرْغُول كَنَارِيَّة Bromus Canariensis (S). Brome des Canaries (F).
عشبة برية حولية تعلو من ٣٠ الى ٨٠ سم . حصفها ازغب
النصل تكثر في الاراضي الرطبة . ترعاها الماشية .



ثَرْعَمَة



ثَرْغُول الحَقِيل



ثَرْغُول الشِيلَم



ثَرْغُول دَنَقَة



ثَطَاء

مرتبة	فصيلة	عمارة	جنس
Tylenchoidea	Tylenchidae	Hoplolaiminae	Hoplolaimus Rotylenchus Helicotylenchus
		Pratylenchinae	Paratylenchus Radopholus Nacobbus Rotylenchulus
		Tylenchinae	Tylenchorhynchus Tetylenchus Ditylenchus Anguina Tylenchus Psilenchus Chitinotylenchus Trophurus Paranguina Atylenchus
	Tylenchulidae	Tylenchulinae	Tylenchulus Throphotylenchulus
		Sphaeronematinae	Sphaeronema Throphonema
	Heteroderidae	Heteroderinae	Heterodera Meloidogyne
	Cricone-matidae	Paratylenchinae	Meloidodera Paratylenchus Cacopaurus
		Criconematinae	Criconema Criconemoides Hemicycliophora
	Neotylenchidae	Neotylenchinae	Neotylenchus Hexatyus Deladenus
		Nothotylenchinae	Nothotylenchus Thada Boleodorus
		Paurodontinae	Halenchus Paurodontus Stictylus
Aphelenchoidea	Aphelenchidae	Aphelenchinae	Aphelenchus Aphelenchoides Anomyctus
		Paraphelenchinae	Paraphelenchus Metaphelenchus



ثعبان مرقط



ثعبانية الجذور

لما أنواعها فكثيرة العدد يعرف عنها ، حالياً ، بالنبات أو بالعضو النباتي الذي تنطفل عليه كقولك ثعبانية الحنطة و ثعبانية الجذور الخ ...

٦٠٢١ - ثَعْبَانِيَّة ٥ ، دودة ثَعْبَانِيَّة

Tylenchus (S). Anguillule (F).

جنس دويديات صغيرة من الثعبانيات ، أنواعه عديدة جميعها اسطوانية خيطية الشكل طولها من ١ الى ٥ سم . تركيب مختلف النباتات في مختلف اعضائها || اعماها واشهرها ثعبانية الجذور والحنطة والساق والشوندور .

٦٠٢٢ - ثَعْبَانِيَّة الجُدُور ٥ ، دودة الجذور الثعبانية

Heterodera radicola (S). Anguillule des racines (F). Wurzelälchen (D).

نوع من الثعبانيات . تركيب اكثر من ألف نوع من النبات غير انها لا تضر وتؤدي الأ بعضها ، منها البطاطا والتبغ والبنندوره والبطيخ والشمام والخيار الخ ... مظهرها الخارجي ثآليل عدسية وجرابية الشكل مملوءة بالبويضات والديدان تحيق بالجذور وتمنعها عن القيام بعملها الطبيعي .

٦٠١٣ - ثَعَالَة Renard (F). Fox (E).

الثعالة هو الثعلب . ويقال ارض مشعلة اي كثيرة الثعالب كما يقال معقرة للارض الكثيرة العقارب . ويقال اروغ من ثعالة .

٦٠١٤ - ثَعَام ٥ Tylopoma (S).

Tylopome (F). Tylopoma (E).

جنس دويبات قازبة سرلودة من الرخويات المعديات الارجل اماميات الخياشيم وفصيلة البلدونيات . انواعه المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في معظم الاقطار الاسيوية والاروبية تعيش على ضفاف المناقع وبحاري المساء . اصداها حلزونية الشكل رقيقة القشار الكلسي .

٦٠١٥ - ثَعَب

الثعب : مسيل الماء في الوادي ج ثعبان .

٦٠١٦ - ثَعْبَان Le Serpent (F). The serpent (E).

الثعبان كوكبة نجوم شمالية الموقع تمتد بين الجاني والفكة وراعي الشتاء وبرج العذراء فتطوق حور وحية وتعرف نحو العقاب . تشمل العديد من السدم واكداس النجوم . عدد نجومها الواضحة المرققة ٦٤ .

٦٠١٧ - ثَعْبَان Serpent (F). Serpent, Snake (E).

اسم شامل يقع على الذكر والانثى يطلق على معظم الحيات ان خبيثة او غير خبيثة .

٦٠١٨ - ثَعْبَان مَرْقَط * ، أبو السُّور ، صَافِرَة

Psammophis sibilans (S). Couleuvre-chapelet, Chapelet (F). Hissing sand snake (E).

حية بيوض من البواغيات وفصيلة الحنشيات خلفيات الاغاريذ . جسمها يطول من ١٢٠ الى ١٥٠ سم . ثوبها الى الزرقاء السمره يعلوها ثلاثة خطوط قاطبة وتنقيط اسود . رأسها بيضي الشكل ، افطس الحطم . شدقها ضيق الملاقى واسع الانفراج . عدد اسنانها ٥٤ منها ٣٠ في الفك الاسفل و ٢٤ في الفك الاعلى من اصلها اربعة عناق مخددة ثابتة خلفية الارتكاز تبخ السم في كل عضو تصيبه عندما يرقى حتى مستواها الداخلي || تبلغ كامل نموها بعمر ١٥ سنة وتعيش نحو ١٢٠ سنة . الانثى تسافد بعمر ست سنوات وتضع من ١٥ الى ٤٠ بيضة مجموعة في سبحتين تخفيها في نفقين متباعدين معرضها الجنوب || تألف البر وتعيش بين الصخور . تسرح في النهار وفي اوائل الليل || بياتها الشتوي يستمر نحو خمسة اشهر . قوتها القواضم والمظاء والثعابين . تقضي على الكبير من القواضم بالتقليص لتتمكن من ابتلاعه || فحيحها صفير صار يعلو وينخفض اكثر من دقيقة || تعتبر من الثعابين المؤذية .

٦٠١٩ - ثَعْبَانِي Serpignoux (F). Serpignous (E).

نعت تعريفية يطلق على العلل الجلدية المتلوية التبضيع .

٦٠٢٠ - ثَعْبَانِيَّات ، دِيدَان ثَعْبَانِيَّة

Tylenchoidea

رتبة حيوانات دنيا من طبقة السلكيات تشمل مرتبتين وست فصائل وثلاث عشرة عمارة ونحو ثلاثة وأربعين جنساً . تفصيلها باسمائها العلمية اللاتينية ما يتبع :

تلقاها أيداً إلا فاتحة فاهها وهي من شر الدواب تلدغ فلا يكاد يبرأ سليماً . اعطائها فسيحة الأرجاء تمتد من افريقية الشمالية الى السودان والحبشة والصومال والجزيرة وسورية وفلسطين . تعيش في الاماكن الجرداء قوتها الجراد والجنادب والاساريح والعناكب والنمل . ج ثعب .

٦٠٣٠ - ثُعْبَع * Huitre perlière, Pintadine (F). Pearl-oyster (E).

هو الصدفة اللؤلؤية نوع من المحار ينتمي الى الرخويات الصفيحيات الخياشيم . يربي اللؤلؤ في جوفه . يكثر وجوده في البحر الاحمر والخليج العربي وقرب شطوط سرديب وفي مضيق موزمبيق وفي بعض خلجان اليابان .

٦٠٣١ - ثُعْد : الثمد : الرطب الغض من البقل .

٦٠٣٢ - ثُعْر ، ثُعْرُ Suc vénéneux (F). Poisonous juice (E). هو العصارة النباتية السامة .

٦٠٣٣ - ثُعْرَان ، ثُعْرَوَان Trayons supplémentaires (F). Supplementary dug, Additional dug (E). حلتان زائدتان في زرع البقرة والشاة والعز .

٦٠٣٤ - ثُعْرُور

الثعورور : الطرثوث وقيل طرفه وهو نبت يؤكل (التاج) . والثعورور هو اصل العنصل الابيض (التاج) . والقشاة الصفار وثمر الذونون وشجرة مرة . ج ثعارير (التاج) .

٦٠٣٥ - ثُعْطَة Œuf gâté (F). Spoiltegg (E). الثعطة : البيضة المذرة (اللسان) .

٦٠٣٦ - ثُعْل Trayon supplémentaire (F). Supplementary dug (E).

الثعل : خلف زائد في اخلاف الناقة وضرع الشاة والبقرة . ج ثعول . يقال ما أبين ثعل هذه البقرة .

٦٠٣٧ - ثُعْل Cladosporium, Megacladosporium جنس فطور مجهرية من عمارة الزناخيات وفصيلة اللطحيات جريه الكنديية واضحة الشكل اسطوانية معوجة الطرف . كنانته صولجانية ، مؤثرة . بويضاته ثنائية الخلية . انواعه قليلة تكثر في بعض النباتات وأخصها الاشجار المثمرة فتوصفها بالتبعق .

٦٠٣٨ - ثُعْل البَنْدُورَة Cladosporium fulvum (S). Cladosporiose de la tomate (F). Leaf mould of tomato (E). Braun-oder, Samtfleckigkeit der tomate (D).

فطر مجهري يعمرى اوراق البندورة فيعطها ويلويها . مظهره الخارجي يقع لاقياسية الشكل والحجم تركيب النصل فتطوح بلونه على الصفحة العليا وتمنطقه يوشاح ليد التركيب خلي النسيج ، زيتوني اللون يعطب الطبقة الادمية ويلويها فيسبب يباس الاوراق يعقبه انملاص الازهار وذبول الشلة والثمار || يكافح باستعمال السوائل السلفوكلسية المحلولة ١٪ او السوائل المركزة على بوليسلفور الباريوم المحلول ٢٪ || ويدارك ايضاً باجتنااب الاكثار من الاسمدة الازوتية لانها تنشط هذا الوسم الفطري .

٦٠٣٩ - ثُعْل الصِّيَوَانِيَّاتِ * Cladosporium depressum

فطر مجهري يعمرى بعض النباتات الصيوانية ، اخصها

٦٠٢٣ - ثُعْبَانِيَّةُ الحَنْطَةِ * ، دُوْدَةُ القَمْحِ الثُعْبَانِيَّةُ Tylenchus tritici (S).

Anguillule du blé (F). Wheat nematode (E). Weizenälchen (D).

نوع من الديدان الثعبانية . ذكوره واناثه متساوية الحلقة . طولها نحو ١ مم . لونها الى السرة الحنطية الشفافة . تركيب البر فتؤذيها وتسبب له مرض الخرم . وذلك لانها تدخل السنايل عند تكوين برها فتتخره وتستقر في داخله ثم تنجب وتبقى على هذه الحالة حتى زمن البذار حيث تقتنص من رطوبة التربة فتخرج من سباتها او يياتها الزمن وتسرح في طلب قوتها فتتركب سوق الزرع وحذفه وينتهي بها المطاف الى السنايل والبر .

٦٠٢٤ - ثُعْبَانِيَّةُ الخَلِّ * Anguillula acetii (S). Anguillule du vinaigre (F).

دويذة من السلوكيات الكمية . جسمها خيطي نحيل يطول نحو ٢ مم . خطمها عادم الحلقات . قشارها شديد النعومة . تعيش في الخل الصادر عن الخمر لانه يحوي بعض المواد السكرية والزلالية التي تعيش عليها بعض الخشيات الدنيا والفطور المجهرية التي تركيبها الثعبانية لامتصاص ما فيها من عناصر ازوتية ركيزة قوتها الوحيدة .

٦٠٢٥ - ثُعْبَانِيَّةُ السَّاقِ * ، دُوْدَةُ السَّاقِ الثُعْبَانِيَّةُ Tylenchus devastatrix (S). Anguillule de la tige (F). Stem eelworm (E). Stengelälchen (D).

نوع من الديدان الثعبانية طولها من ١ الى ٢ مم . جسمها ابيض شفاف . اناثها تكبر ذكورها وتزيد بها بنحو ١ مم . تركيب عدة نباتات فتؤذيها وتسبب لها بعض الامراض الفطرية . اكثر النباتات عرضة لاذى هذه الديدان الخراطال والجوئن .

٦٠٢٦ - ثُعْبَانِيَّةُ الشُونْدَرِ * ، دُوْدَةُ الشُونْدَرِ الثُعْبَانِيَّةُ Heterodera schachtii (S). Anguillule des betteraves (F). Beet and potato eelworm (E). Rüben-und kartoffelälchen (D).

نوع من الثعبانيات ذكورها اسطوانية خيطية . اناثها اجاصية الشكل طولها نحو ملليمتر واحد . تركيب جذور وجذيرات الشوندر فتتخرها وتحترقها وتوقع بها اشد الاذى خاصة في الصروب السكرية .

٦٠٢٧ - ثُعْبَانِيَّةُ الشَيْلِكِ * Aphelenchoides fragariae, Aphelenchus fragariae (S). Anguillule du fraisier (F). Strawberry eelworm (E). Erdbeerälchen (D).

نوع من الديدان الثعبانية طولها يراوح من ١ الى ٢ مم . ذكورها واناثها متساوية القدر . ثوبها الى البياض التبي يملوه موج وردي . تركيب جذور الشيلك فتؤذيها اشد الاذى وقد تسبب انملاص الازهار .


٦٠٢٨ - ثُعْبَة الثعبة شجرة شبيهة بالثعوبة الا انها احشن ورقاً وساقها اغبر وليس لها حمل ولا منفعة فيها وهي من شجر الجبل ولها ظل كنيف (التاج) .

٦٠٢٩ - ثُعْبَة * Acanthodactylus pardalis (S). Acanthodactyle panthère (F).

رذغة خبيثة طولها يراوح من ١٦ الى ١٧ سم . تشبه سام ابرص غير انها خضراء الرأس والحلق جاحظة العينين لا




ثُعْبَانِيَّةُ الحَنْطَةِ



ثُعْبَانِيَّةُ الخَلِّ



ثُعْبَانِيَّةُ السَّاقِ



ثُعْبَانِيَّةُ الشُونْدَرِ



ثُعْبَانِيَّةُ الشَيْلِكِ




ثُعْبَة



ثُعْبَع

البش والسر والمكن عند بعض الطير والسماك والحشرات




طير: 1 حوام - 2 مفر - 3 باشق - 4 شحور - 5 سم - 6 غلاف - 7 درنة كبيرة - 8 نقاذ - 9 دوري - 10 ششور - 11 حشة - 12 درنة القصب - 13 رواق - 14 غريس
 ملتان - 15 صيق - 16 وصة - 17 كاسر الجوز - 18 عذليب - 19 صوة - 20 عصفور الشوك - 21 مفتح - 22 دخلة النزار - 23 هازجة - 24 دخلة - 25 قرق - 26 ذعلوقة -
 27 حناب - 28 قشر - 29 صفاية - 30 عذ ايكوب - 31 عذ - 32 تدرج - 33 حجل - 34 فرأية - 35 نكات - 36 طيطوي سلطاني - 37 زقراق - 38 زقراق
 فريجية - 39 طيط - 40 طيطوي اخضر - 41 عرشة - 42 زيم - 43 عرشة صغيرة - 44 زنج الماء - 45 غراس - 46 لم - 47 بطريق - 48 مقار - 49 مقار - 50 فطاس
 قوارب واسماك: 51 حمة - 52 ملحفاة - 53 غراء ملبجة - 54 غراء منشقة - 55 قرش - 56 حوجل - 57 جلكن - 58 سبار - 59 حشرات - 60 وراك -
 61 عوربه - 62 قرد - 61 ديلويه - 64 حجان - 65 صغلوب - 66 لفيفة - 67 عرمس - 68 انوس - 69 رسالة - 70 بشرة - 71 برفيل - 72 عيلة


لدييات




- 1 سملا ، شمام - 2 جيتون رشيق - 3 هتار ، قرد مقدس - 4 هجرس اسيل - 5 مكالك الفات - 6 قردوح مزواج - 7 قردوح يمني - 8 آبل - 9 ميداس - 10 ليور مكي - 11 شقشقة - 12 حيتير - 13 مزال - 14 ذقب امفر - 15 ثعلب - 16 قنك ، اصر - 17 ضبع مجذعة ، عرقاء - 18 اسد - 19 بير - 20 نمر - 21 بوماء ، اسد امريكى - 22 بيج - 23 رباح - 24 زياده - 25 واثون - 26 قوطي - 27 دب اسمر - 28 دب سوري - 29 دب ابيض - 30 راتل - 31 منثور - 32 قاتم ، هريمين





- 1 طاكبان ، ملخيم - 2 مارغور - 3 بزل ، وعل فارسي - 4 وعل ارويتي - 5 ارويتي الاردان - 6 ناهور - 7 ثور المسك - 8 جاموس الملا - 9 جاموس ارلي - 10 بيسون امريكة - 11 قطاس ، غشقاء - 12 جهيل - 13 درياني - 14 زرافة - 15 وكتاب - 16 نالج - 17 جل - 18 ألبك ، لانه - 19 بلطوش - 20 سنجاب - 21 قردون - 22 يربوع - 23 شيم - 24 ماره - 25 باكاس - 26 حارود - 27 دآب آي - 28 مدرع - 29 تَمَنُور - 30 ام قرة - 31 تيلس - 32 فلنجر - 33 هلولان - 34 نفقر - 35 نخله الماء - 36 نصفاض



1 أنثى ، أميد البحر - 2 فظ - 3 مقرينس - 4 شيخ البحر - 5 فقمه ، عجل البحر - 6 بال المحيط - 7 حريش البحر - 8 فيل افريقي - 9 كركدن هندي - 10 سناذ هندي - 11 حمار
الزرد - 12 حمار الزرد الموطني - 13 فراء التبت - 14 فرس البحر ، هيموت - 15 رت ، غنير بري - 16 هاتوف - 17 حاتوف ، غنير النهر - 18 أيل - 19 أيل إلد - 20 يامور -
21 أيل ايل - 22 رنة ، رندير - 23 اروس - 24 غزال - 25 مراسي - 26 حيرة - 27 أرخ ، ماريتة - 28 حذلوم أغز - 29 نو - 30 اروس القطب - 31 ابو عرف ، غلب








- 1 قايون، قرلي - 2 قيون الغاب - 3 قيون جليل - 4 قيون ازرق - 5 قيون ازغب - 6 دقيش اكحل - 7 دقيش ويدل - 8 غثاث - 9 ارقش - 10 هريق - 11 هريق الجنوب
 12 هريق المكسيك - 13 هريق كويا - 14 طوقان مزتر - 15 طوقان بوهانه - 16 طوقان اكطر - 17 طوقان اصغر الزور - 18 طوقان احمر المنقاد - 19 بوقير ابيض الفريزة - 20 اورانورمين
 21 يحوم، ققيع مدني - 22 عقادة هبة - 23 درسي - 24 ابو كشة - 25 ديسي - 26 قطاة - 27 شرقة - 28 طيهوج - 29 حبل ريمي، شنار - 30 هكس - 31 فعامه
 32 روهاء، ري - 33 أسو - 34 كزور، شيم - 35 كوي - 36 يمجبي، طير البوق - 37 حباري - 38 طيبط - 39 قزاع - 40 طول، ابو ساق - 41 حارس احمر، غز احمر
 42 ملاعقي ودي، ابو مسوط - 43 ابو سن - 44 طنطل - 45 بلشون ارجواني، بجمفة - 46 بلشون ارند، دنكلة - 47 كركي متوج - 48 رهو الجنة، دوكاد - 49 فرفو، فرخة سلطانية
 50 بشروش - 51 نحام، سرخاب - 52 وز قطني - 53 وطار - 54 كيش، ابو مالك - 55 غفاس كبير - 56 غاق - 57 زمج الماء، نورس - 58 بجم، حوصل - 59 متار


بعض قراش الحشرات الأجيحة



- 1 مقنون - 2 هينام الزراوند - 3 أبولون - 4 كليوپترا - 5 غرة جميلة - 6 فولد - 7 بهرم - 8 جزيريس - 9 نمفولة - 10 اريبيس البراري الكبير - 11 لولاية صغيرة - 12 لقينة سيلار - 13 لقينة ادونيس - 14 طوقل زمردي - 15 بشورة الغروب - 16 بشورة انتيوبيا - 17 بشورة النهار - 18 بشورة الصيف - 19 مسجان موره - 20 عربوة - 21 صمل الدقل - 22 صمل السم - 23 صبقم - 24 بزة - 25 بشورة الليل - 26 لفة ايزابيل - 27 سفاطة - 28 حرمدة اكثارة - 29 هلاسة خضراء - 30 كوكلة مفتضحة - 31 قهوة زرقاء - 32 غمغمة



ثعلب الصوانيات



ثعلب القرعيات



ثعلب الموزيات



ثعلب البرازيل



ثعلب البنغال



ثعلب أمريكية



ثعلب تدرى



ثعلب عادي

٦٠٤٧ - ثعلب الماء (Loutre (F). Otter (E).

هو القضاة ، اطلبها .

٦٠٤٨ - ثعلب أمريكية* (Vulpes fulva (S).

Renard d'Amérique, R. rouge (F). Red fox (E).

ويدعى الثعلب الأحمر . نوع من الثعالب اعطانه البلاد الأمريكية . يكثر في الولايات المتحدة . وهو كبير الجثة مستطيلها وبره احمر اللون اسمر المواج .

٦٠٤٩ - ثعلب تدرى* ، ثعلب كيرشيا ، قرصاق (Vulpes corsac (S).

Renard corsac, R. adire, R. kirsa (F). Corsac (E).

نوع من الثعالب الصغيرة القد اعطانه بلاد التتر والمنغول وصفاف بحر قزوين . وبرها اغبر اللون اشقر المواج ، ذيلها مشيز بخطوط سود او رمادية اللون .

٦٠٥٠ - ثعلب سنجابي (Vulpes virginiana, Urocyon cinereo-argenteus (S).

Renard de Virginie, R. gris (F). Grey fox (E).

نوع من الثعالب الأمريكية اعطانه تمتد من الولايات المتحدة الى المكسيك وكستريكا . وهو صغير الجثة ، سنجابي اللون . فروه جميل اللون الناعم ، ثمين القيمة .

٦٠٥١ - ثعلب عادي* ، ثعلب معهود (Vulpes alopex, V. vulgaris (S).

Renard commun (F). Common fox (E).

هو الثعلب الشائع المعروف المنتشر في معظم اقطار العالم القديم . ضرابه تسعة . اعرفها :

الثعلب الجبلي (Vulpes vulgaria montana (S).

Renard de montagne (F).

الثعلب السوري (Vulpes vulgaria syriaca (S).

Renard de Syrie (F).

الثعلب الفارسي (Vulpes vulgaria persica (S).

Renard de Perse (F).

الثعلب المصري (Vulpes vulgaria aegyptiaca (S).

Renard d'Egypte R. du Nil (F).

الثعلب الياباني (Vulpes vulgaria japonica (S).

Renard du Japon (F).

٦٠٥٢ - ثعلب فضي (Vulpes argentea, V. argentata (S).

Renard argenté, R. noir (F). Silver fox (E).

نوع من الثعالب الأمريكية . اعطانه مختلف مناطق نهر المسيسيبي . جثته متوسطة القد . ثوبه الى الرصاصي الفضي المواج . وبره شديد النعومة والكثافة . فروه جيد الصنف غالي الثمن .

٦٠٥٣ - ثعلب قطبي ، ثعلب أزرق (Vulpes lagopus (S).

Renard polaire, R. bleu, Isatis (F). Arctic fox, White fox, Blue fox (E).

نوع من الثعالب الصغيرة القد القصيرة الارجل يتميز باستطالة خطمه واستدارة اذنه . ثوبه مقيار اللون يتبدل مع فصول السنة من الابيض الى الازرق . وبره شديد النعومة والكثافة . فروه فاخر الصنف غالي الثمن . اعطانه بلاد القطب الشمالي .

٦٠٥٤ - ثعلب كندا (Vulpes velox (S).

Renard de Canada (F). Black fox (E).

نوع من الثعالب الأمريكية . موطنه بلاد كندا . وهو اصفر جثة من الثعلب العادي ، ثوبه الى السمرة الرمداء يملوها مواج فضي . فروه متوسط الصنف بخس الثمن .

الثمار والسذاب وحشيشة الملاك || يركب الاوراق على صفحاتها السفلى فيوشمها ببقع صغيرة رمادية اللون صفراء الحثار تقضي على النسيج المنحارة وتسبب ذبول ويابس الاوراق || يكافح باستعمال مركبات الكبريت وغيرها من الادوية الحديثة .

٦٠٤٠ - ثعلب القرعيات* (Cladosporium cucumerinum, Scolicotrimum melophthorum (S).

Cladosporiose du melon, Nulle du melon, N. du concombre (F). Scab of cucumbers (E). Gurkenkrätze (D).

فطر مجهرى يصيب بعض القرعيات اخضها الشام والبطيخ والخيار . يركب الاوراق فيرقشها ببقع سود تطوح بالنسج المنحارة . ويركب الثمار فيرقشها ببقع قرحية رمادية اللون ، دساعة ، صمغية الصبغة اللزجة تتكور في اللب فتتفطنه وتقضي عليه || يكافح باستعمال مركبات الكبريت والزنك بعد اجتثاث الزراعة في التربة الطينية الرطبة الشديدة الاندماج .

٦٠٤١ - ثعلب اللوزيات* (Cladosporium carpophilum, Megacladosporium carpophilum (S).

Tavelure du pêcher, T. de l'aman-dier, T. de l'abricotier, T. du prunier (F). Schrotschub-krankheit (D).

فطر مجهرى عيم الانتشار يركب الاوراق والاغصان والثمار فيصدع البشرة ويشقق الادمة ويقرحها ويحطب اللحاء وينطق الثمار ببثور القرعية الجافة الصلابة الفحمية اللون || يكافح عند ظهوره باستعمال احد الفوطير الفعالة الكثيرة العدد في وقتنا هذا .

٦٠٤٢ - ثعلب ، ثعلب اصغر (Renard (F).

Vulpecula (E).

الثعلب او الثعلب الاصغر كوكبة نجوم موقعها الشمال . مركزها بين الدفين والمقاب والدجاجة .

٦٠٤٣ - ثعلب (Vulpes (S).

Renard (F). Fox (E).

جنس حيوانات وحشية من فصيلة الكلبيات . انواعه ١٠ اما ضرابه فعديدة . اوطانه معظم اصقاع العالم القديم والجديد . وهو قريب الشبه من ابن آوى لا يفرقه عنه سوى حدقة عينه اللوزية الشكل وذنبه الاكث . قوته ما استطاع اليه سبيلا من الحيوان والطير والعطاء والحشرات والثمار السكرية . انشاء تفصع من اربعة الى ستة جراء تبصر النور بعد وضعها باسبوعين || وهو مشهور بالتحيل والروغان . الذكر منه يدعى ثعلبان وكنيته ابو الحصين وابو النجم وابو نوفل وابو الوثاب وابو الحبص . والانثى تدعى ثعلبة وكنيتها ام عويل .

٦٠٤٤ - ثعلب أزرق (Renard bleu (F).

Blue fox (E).

هو الثعلب القطبي ، اطلبه .

٦٠٤٥ - ثعلب البرازيل* (Vulpes azarae (S).

Renard du Brésil (F). Brazilian fox (E).

نوع من الثعالب يعيش في البرازيل والبلاد المتاخمة لها . جثته جثة الثعلب العادي . وبره اصعب اشقر يزاد اسمرارا مع اقترابه من ثيج الظهر اما رأسه فارمد اللون .

٦٠٤٦ - ثعلب البنغال* (Vulpes bengalensis (S).

Renard du Bengale, Renard indien (F). Indian fox (E).

نوع من الثعالب صغير القد يعيش في الهند . وبره اصعب اللون تملوه سمرة وسواد . فقرته وحدقة عينه سود .

طرفي الارتكاز || أوراقه وسوقه تشتمل في الصناعات القشبة كالسلال والحصر وغيرها .

٦٠٦٩ - ثُغْرِي ، قَرْجِي Vulvaire (F).
Vulval, Vulvar (E). مختص بالشعر أي الفرج .

٦٠٧٠ - ثُغْم Chien féroce (F). Fierce dog (E).
الضاري من الكلاب .

٦٠٧١ - ثُفَا* ، ثُفَّة ، ثُفَّة Felis chaus (S).
Chaus, Chat commun des jungles (F) Jungle cat (E).
نوع من السنابير البرية كبير الجثة طوله الكامل نحو ٩٠ سم. ثوبه إلى الكهبة يسمر ويعبق مع اقترابه من ثبج الظهر . قوائمه وذنبه مجذعة بالاسود . طرف ذنبه عابق السواد . اعطانه قسيحة الارحاء تشمل كامل آسية الصغرى وايران وافغانستان وبرمانية .

٦٠٧٢ - ثُفَّاء Senebière (F). Wart-cress (E).
هو الرشاد البري ، اطلبه .

٦٠٧٣ - ثُفَّاجَة* Ocydromus (S).
Ocydrome (F). Ocydromus (E).
طائر وحيد الجنس والنوع من طوال الساق وفصيلة التفلقيات . اعطانه تمتد من الهند إلى ماليزية وزيلندا الجديدة . ملجته الحياقي بخاعي . جماعاته قليلة العدد . مسرحها دجوي يستمر من الغروب إلى الفجر . تألف البراري والاحراج القريبة من جداول الماء . قوتها الحشرات على اختلاف اجناسها وانواعها وبعض بزور النجيليات || جسمها ربعة ، متوسط القد ، يطول نحو ٢٧ سم. تتميز باستطالة المنقاد الجالس ، بصغر الجناح المستدير الطرف ، وبقصر الذيل المخروطي الشكل . ساقاها واصابعها شديدة النشاط . ثوبها إلى الشققة يعلوها توشيح وتوشيم جفوي واسمر || تدثن انحوصها في المواقع الدغلة بين الاعشاب الكثيفة الملتفة . الانثى تبيض من ٦ إلى ١٠ بيضات . الترخيم يستمر نحو ثلاثة اسابيع تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء .

٦٠٧٤ - ثُفَّافِيد Cirro-cumulus
الثفافيد هي الغيوم البيض المستطيلة المتراكبة .

٦٠٧٥ - ثُفَّال Meulière (F). Millstone grit (E).
الحجر الاسفل من الرحي .

٦٠٧٦ - ثُفَّد* Productidae (S).
Productidés (F). Productidae (E).
فئة من عضديات الارجل المفصليات يعود ظهورها إلى الالباج الاول . احافير اجناسها وانواعها تمتد من الحقبة الديفونية إلى البرمية .

٦٠٧٧ - ثُفَر ، حياصة Crouplère (F). Crupper (E).
يقال ثُفَر الدابة وثُفَرها وضع لها الثُفَر . ج اثناء .

٦٠٧٨ - ثُفْرُوق Pédoncule de la datte (F).
Peduncle of date (E). علاقة قع البلجة .

٦٠٧٩ - ثُفْرُوق Rafle (F). Grape-stalk (E).
هو ما يبقى من عنقود العنب بعد اكل حبه او عنبه .

٦٠٥٥ - ثُعَلَب مَعْهُود Renard commun (F).
Common fox (E). هو الثعلب العادي ، اطلبه .

٦٠٥٦ - ثُعَلْبِيَّة Alopécure (F).
Meadow foxtail grass (E). هي ثعلبية الحقول وثلبية المروج تعرف بذنب وذيل الثعلب .

٦٠٥٧ - ثُعَلُول Papille (F). Papilla (E).
كل زائدة طبيعية صغيرة القد تنشب في الجسم وتعلو سطحه .

٦٠٥٨ - ثُعَلِيل Scutum (F). Scutum (E).
الثلليل الجزء السفلي من البرجاد عند الحشرات .

٦٠٥٩ - ثُعَلْبِيَّة Pelade (F). Pelada, Fox-evil (E).
هي داء الثعلب مرض عضوي يسبب انمعاط وبر وصوف الحيوان . وسقوط ريش الطير .

٦٠٦٠ - ثُعَيْلَة Spicule (F). Spikulet (E).
اسم يطلق على بعض الاجرام الصغيرة المنزلة من سيليس او كربونات الكلسيوم التي تأخذ ، غالباً ، شكل الشوك ويؤلف اجتماعها واتحادها هياكل الاسفنج .

٦٠٦١ - ثُغَاء ، رُغَاء Bèlement (F). Bleating (E).
صوت ذوات الحلف كالشاء والمعز وما شاكلها .

٦٠٦٢ - ثُغَارِير Thugair
ضرب من البطيخ طيب الرائحة معلم بخطوط حر وصفر (فريتغ) .

٦٠٦٣ - ثُغَام Thugam
شجر ابيض الزهر والثمر . واحدته ثغامة .

٦٠٦٤ - ثُغَب* Décongelation (F).
Thawing (E). الثغب ذوبان جليد الأصراد او الاستصراد .

٦٠٦٥ - ثُغَر ، ثُغَر Vulve (F). Vulva (E).
الحياء لجميع ضروب السباع ولكل ذات مخلب (اللسان) .

٦٠٦٦ - ثُغَرَة Lacune (F). Lacuna, Air-cell (E).
كل فراغ داخل نسيج الجسم .

٦٠٦٧ - ثُغَرَة Thugere
الثغرة : من خيار العشب وهي خضراء وقيل غبراء تضخم حتى تصير كأنها زنبيل مكفأ بما يركبها من الورق والنصنة وورقها على طول الاظافر وعرضها وفيها ملحقة قليلة مع خضرتها . وزهرتها بيضاء . ينبت لها غصنة في اصل واحد . وهي تنبت في جلد الارض ولا تنبت في الرمل . والابل تأكلها اكلاً شديداً ولها أرك اي تقيم الابل فيها وتعاود اكلها . ج ثغر (اللسان) .

٦٠٦٨ - ثُغَرُور Lygaea (S).
Lygée (F). Lygaea (E). نبات عشبي بري معمّر من فصيلة النجيليات . موطنه حوض البحر الابيض المتوسط . منهته المناقع ومضاف مجاري الماء || كمبرته قرصية دوفصية عديدة السوق . سوقه دقيقة ، منتصبة تعلو من ١٠٠ إلى ١٢٠ سم. أوراقه صفية أسلية ضيقة مستطيلة . ازهاره سنبل التجميع ،



ثُغَارِير



ثُغَام



ثُغَرَة



ثُغَارِير



ثلثي التجزيء



ثلثي التجميع




ثلثي التركيب



ثلثي الزوايا



ثلثي الشوك



ثلثي الفصوص



ثلثي المساكين

- ٦٠٩٢ - ثلثي البزور Trisperme (F).
Trisperm (E).
نعت تعريفي يطلق على ما سوى ثلاث بلور .
- ٦٠٩٣ - ثلثي التجزيء* Trifida (F). Trifid (E).
نعت تعريفي يطلق على الاعضاء النباتية والحيوانية الثلاثية التجزيء .
- ٦٠٩٤ - ثلثي التجميع* Trifolié (F). Trifoliated (E).
نعت تعريفي يطلق على الاوراق الثلاثية التجميع .
- ٦٠٩٥ - ثلثي التركيب* Trichotome (F).
Trichotoma (E).
نعت وصفي يدل على الاعضاء النباتية الثلاثية التركيب او التجميع .
- ٦٠٩٦ - ثلثي الحدود Trinôme (F).
Trinomial (E).
كيفية جبرية ثلاثية او ذات ثلاثة حدود .
- ٦٠٩٧ - ثلثي الحول Triennal (F). Triennial (E).
كل ما استمر ثلاث سنوات .
- ٦٠٩٨ - ثلثي الذريبات Tricuspid (F).
Tricuspid (E).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات ثلثي الاطراف او الرؤوس كالجنجل والسفرس .
- ٦٠٩٩ - ثلثي الزوايا* Trigone (F). Trigon (E).
نعت تعريفي وصفي يطلق على الاعضاء النباتية الثلاثية الزوايا اخصها الاوراق والخرايب والافنان والجار .
- ٦١٠٠ - ثلثي الشكل Trimorphe (F). Trimorphous (E).
نعت تعريفي يطلق على المواد القابلة للتبلور في ثلاثة اشكال متناقضة .
- ٦١٠١ - ثلثي الشوك Tricanth (F). Tricanthus (E).
نعت تعريفي يطلق على الشوك الثلاثي التركيب .
- ٦١٠٢ - ثلثي الصف Tristique (F).
Tristichous (E).
ما كان ترتيبه ثلاثي الصف .
- ٦١٠٣ - ثلثي العروق Trinervé (F).
Trinervate (E).
نعت تعريفي يطلق على اتصال الاوراق الثلاثية العروق .
- ٦١٠٤ - ثلثي الفصوص Trilobé (F).
Trilobate (E).
ما كان مركب من ثلاثة فصوص .
- ٦١٠٥ - ثلثي المحور Triaxe (F). Triaxle (E).
ما كان محوره ثلاثي الاجزاء .
- ٦١٠٦ - ثلثي المداخلات Trigyne (F).
Trigynous, Trigyn (E).
نعت تعريفي يطلق على الازهار الثلاثية الاقلام ومدقاتها .
- ٦١٠٧ - ثلثي المساكين Triloculaire (F).
Trilocular (E).
ما كان ينقسم الى ثلاثة احيية .

- ٦٠٨٠ - ثفل Dépôt (F). Sediment (E).
ما سفل من كل شيء وهو خثارته . يقال علا صفوه ورسب ثفله .
- ٦٠٨١ - ثفل الجيعة ، ثفل البيرو Drèche (F). Draff (E).
هو ما يبقى من الشعير بعد استحلاب مواده اللازمة لصناعة البيرو وهو يستعمل كعلف للدواجن اخصها البقر الخلوب . ومن الواجب اجتناب تخميره فيما لو حفظ عدة ايام لذلك يحسن تجفيفه .
- ٦٠٨٢ - ثفل الدباغ Tannée (F). Tanned (E).
هو ما يبقى بعد ديبغ الجلود من قشور ومواد مختلفة .
- ٦٠٨٣ - ثفل القصب Bagasse (F).
Bagasse, Cane-trash (E).
هو ما يبقى من الياق قصب السكر بعد سحقه لاستخراج عصيره السكري .
- ٦٠٨٤ - ثفنة Grasset (F). Stifle (E).
الثفنة او الداغصة في رجل الفرس هي موصل الفخذ بالساق . والثفنة من البعير : ما يقع على الارض من اعضائه اذا استناخ كالركبتين .
- ٦٠٨٥ - ثقبابة* Teredo (S).
Taret (F). Teredo, Ship-worm (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الحياشيم وفصيلة الغورثيات . انواعها المعروفة قليلة العدد . اعطائها بحار اربعة الشمالية || اجسامها دودية ، شبه مردنية الشكل . اصداها صغيرة تلحف القليل من مقدم الجسم || تعيش على الاخشاب العائمة وعلى اخشاب المراكب والصادات فتثقبها وتسبب الاضرار الجثيمة . وهي التي سببت انهيار الكثير من الاسدة الهولندية عام ١٧٣٤ .
- ٦٠٨٦ - ثقل ، ثقالة ، رزانة Pesanteur (F). Weight, Heaviness (E).
قوة جذب الارض للجسام نحو نقطتها المركزية وهي مستقيمة الاتجاه شدتها تساوي وزن الجسم الملبط .
- ٦٠٨٧ - ثقل نوعي ، ثقل نسبي ، وزن نسبي Densité (F). Density, Specific gravity (E).
هو مقياس وزن المادة ومقارنته بوزن حجم من الماء مساو له اذا كانت المادة جامداً او سائلا اما اذا كانت المادة من الغازات فقارنتها تكون مع الهواء .
- ٦٠٨٨ - ثكنة هي السرب من الحمام وغيره .
- ٦٠٨٩ - ثلثي ، مثلث Triple (F).
Treble, Triple (E).
ما حوى الشيء ثلاث مرات .
- ٦٠٩٠ - ثلثي الادوار Triphasé (F). Triphased (E).
نعت تعريفي يطلق على التيار الكهربائي الثلاثي الادوار .
- ٦٠٩١ - ثلثي الوجه ، ثلثي الصفحات Trièdre (F). Trihedral (E).
نعت تعريفي يطلق على الرسوم الهندسية الثلاثية السطوح المحدودة بنقطة تقاطعها .

خماسية التفريص. ازهارها عناقيد متدلية لونها الى البياض الوردى ، مآبرها صفر. ثمارها صغيرة مستديرة فستقية اللون يستخرج منها بعض المواد الطبية . عصير ساقها وفروعها مر المذاق ثم حلوه .

٦١٢١ - ثلثان كبير المثير

Solanum macrantherum (S). *Morelle à grandes anthers* (F).

جنية عارشة برية وتزيينية مهدها المكسيك . ساقها تمتد من مترين الى ثلاثة . اوراقها اهليلجية الشكل ، مستديرة القاعدة . زباء النصل . ازهارها بنفسجية اللون غليظة المآبر السمر . ثمارها صغيرة ، بيضية ، حمراء اللون .

٦١٢٢ - ثلثان ويندلندي

Solanum Wendlandi (S). *Morelle de Wendland* (F).

جنية عارشة برية وزراعية تزيينية مهدها البلاد الامريكية ، كوستاريكا وجوارها . ساقها تمتد من ٥ الى ٨ امتار . فروعها قليلة الشوك القصير الاحجن . اوراقها ملساء النصل بحيلة الخضار الزاهي . ازهارها طرفية الارتكاز متدلية لونها الى الزرقة اليلكية .

Solanum jasminoides (S). *Morelle-jasmin* (F).

جنية عارشة برية وتزيينية مهدها البرازيل . ساقها مرطاة تمتد من متر الى مترين . فروعها نحيلة مستطيلة . اوراقها اهليلجية . نصلها امس البشرة مسن الحافة . ازهارها عنقودية التجميع لونها الى البياض تعلو مشحة زرقاء .

Neige (F). *Snow* (E).

ماء جامد يسقط رضاباً من الغيوم الدجنة والركام واحده ثلجة والجمع ثلوج . والثلج يقي الزرع اضرار الجمد ويندي التربة بالماء احسن من المطر كما انه يقضي على الكثير من الحشرات وبعض الفطور المجهرية .

Algion (F). *Eaglet* (E).

الثلج هو فرخ العقاب .

Selago (S). *Sélagine* (F).

جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة الثلجيات . انواعها المعروفة نحو ١٢ جميعها معمرة . معظمها جنبي وبعضها مجلي ونحبي . فروعها متراكبة دقيقة . اوراقها متعاقبة خيطية . ازهارها سنبلية التجميع . صغيرة القد . خماسية البتلات الزرق .

Selaginaceae (S).

Sélaginacées (F). *Selaginaceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة القعالات . نباتاتها قريبة الشبه من الحزازيريات . اجناسها ثلاثة اشهرها الثلجينة .

٦١٢٨ - ثلخ، ثلث

Bouse de vache (F). *Cow-dung* (E).

هو غثي البقر الرقيق وقد يحصل من اكل الربيع .

Ecorcher (F). *To skin, To peel off* (E).

انزع البشرة مع شيء من الماء .

٦١٣٠ - ثلثة - الثلثة هي الثمار الساقطة المفشخة .

٦١٠٨ - ثلاثي المصارع

Trivalve (F). *Trivalvular* (E).

نعت تعريفي يطلق على ما حوى ثلاثة مصارع .

Trivalent

٦١٠٩ - ثلاثي التكافؤ

نعت تعريفي يطلق على العناصر الكيماوية الثلاثية التكافؤ .

٦١١٠ - ثلاثي المنطش

Triploïde (F). *Triploid* (E).

النباتات الثلاثية المنطش هي التي يبلغ عدد نشبها ضعف عدد فردية المنطش .

٦١١١ - ثلاثيات الفلق ، ثلثيات ، ثلثيات

Trilobites (F). *Trilobites* (E).

فئة من القشريات حشريات الصدف . جميع انواعها من متحجرات الاحقاب الغابرة العائدة الى الاباج الاول || اجسامها مركبة من مجموعة حلقات مقسومة الى ثلاثة فصوص متلاحة ومؤلفة من ثلاثة اجزاء : الصدراس بما فيه الجبهة ونقرتا العين ثم الحلقات السكمية المتساوية الفلق الجانبية ثم القصيص .

Glacière (F).

Ice-cave, Ice-house, Freezing-machine (E).

هي المكان الطبيعي او الصناعي لحفظ الثلج وهي أيضاً الآلة التي تصنع الثلج واللواء الذي تحفظ فيه الاشياء الممكن تثلجها .

Troupeau de mouton (F).

Flock of sheep (E).

٦١١٤ - ثلثة ، فرز

القطيع من الغنم كثر عدده .

Eboulis (F). *Fallen rocks* (E).

هي التهور ، اطلبه .

Thélytoque (F).

٦١١٦ - ثلثوكي

نعت تعريفي بيولوجي يطلق على الولادة العذرية الانثوية للنسل او السلالة .

Tripler (F). *To treble, To triple* (E).

٦١١٧ - ثلث

كثر الشيء ثلاثة اضعاف .

٦١١٨ - ثلثال

الثلثال : ضرب من الحمض (القاموس) .

Morelle (F). *Nightshade* (E).

٦١١٩ - ثلثان

عرة من الباذنجان انواعها قليلة العدد تتميز بنباتاتها العارشة المعمرة . اعرفها بما يلي .

Solanum dulcamara (S). *M. douce amère, Vigne de Judée, Bourreau des arbres* (F). *Bitter-sweet, Wood nightshade, Felon-wort* (E). *Bittersüss, Bittersüss-nachtschatten* (D). *Dulcamara, Solatro dulcamara, Vite di Giudea* (I).

٦١٢٠ - ثلثان لثلان* ، حلومر ، عب الذنب

جنية مدادة متسلقة برية وتزيينية . ساقها تمتد من مترين الى اربعة امتار . فروعها ملس الماء . اوراقها ثلاثية او



ثلثان ثلثان



ثلجينة

Millet à chandelle, Sorgho-à épis, Couscou (F).
Pearl millet, Indian millet (E).

عشبة علفية زراعية ساقها غليظة وطويلة تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. عصفها ازغب البشرة طويل النصل عريضه . سيلتها منتصبه ، اسطوانية الشكل قصيرة الهدب .

٦١٤١ - ثمام حَبَشِي (S). Pennisetum Ruppeli (S).

Pennisetum de Ruppel, P. d'Abyssinie (F).
عشبة علفية زراعية عديدة الضروب مهدا الحبشة . ساقها تعلو من ٥٠ الى ١٢٠ سم. سيلتها اسطوانية الشكل طوطا من ١٠ الى ٢٠ سم. اهدابها عديدة الالون فيها الوردي والاحمر والعقيقي والبنيقسي .

٦١٤١ - ثمام صُوفِي (S). Pennisetum villosum (S).

Pennisetum laineux (F).
عشبة علفية برية وزراعية مهدا حوض البحر المتوسط والصومال والحبشة . ساقها تعلو من ٣٠ الى ٧٥ سم. عصفها متوسط الطول والعرض . سيلتها بيضية الشكل طوطا من ٥ الى ١٠ سم. اهدابها طويلة وكثيفة تبدو كجز الصفوف .

٦١٤٢ - ثمام هِنْدِي (S). Pennisetum macrostachyum (S).

Pennisetum à grands épis (F).
عشبة علفية زراعية مهدا الهند . ساقها تعلو من ١٢٠ الى ٢٥٠ سم. عصفها عريض مستطيل . سيلتها كبيرة القد طولها من ٢٠ الى ٣٠ سم. لونها ال احمره العابقه .

٦١٤٣ - ثمام يَابَانِي (S). Pennisetum japonicum, P. compressum, P. purpurascens (S).

Pennisetum japonais (F).
عشبة علفية زراعية مهدا اليابان . ساقها تعلو من ٦٠ الى ٩٠ سم. عصفها ضيق مستطيل . سيلتها اسطوانية قصيرة لبده لونها ال الارجواني .

٦١٤٤ - ثماني أعضاء الثنائيت (F). Octogyne (F).

صفة الازهار التي تحمل ثمان مدقات . Octogynous (E).

٦١٤٥ - ثماني أعضاء التذكير (F). Octandre (F).

صفة الازهار التي تحمل ثمانية مآبر . Octandrian (E).

٦١٤٦ - ثماني الاضلاع (F). Octogonal

ما كان شكله الهندسي مركب من ثمان زوايا وثمانية اضلاع متساوية .

٦١٤٧ - ثماني الأوجه (F). Octaèdre (F).

ثماني أو ثمنن الارجح أو الصفحات . Octahedron (E).

٦١٤٨ - ثمة (F). Faisceau, Poignée d'herbe (F).

القبضة من الحشيش ومن الميدان اللقيقة . Bundle (E).

٦١٤٩ - ثشم (F). Chien de chasse (F).

Dog of hunting (E).
الثشم هو كلب الصيد من أي عرق كان .

٦١٥٠ - ثمرة (F). Fruit

الثمرة ج. ثمر وثمار هي نتيجة التطور الطبيعي الذي يحل بالمبيض بعد تأبير مدقته لذلك فهي لتاج النبات لاستمراره . والثمار تقسم الى فئتين رئيسيتين الاولى تشمل الثمار الغضة

٦١٣١ - ثليب ، ثماعة (S). Thalictum (S).

Pigamon (F).
جنس نباتات عشبية معمرة برية من فصيلة الشقاريات اوراقها مركبة ثلاثية ملساء البشرة || انواعه نحو ٧٠ منتشرة في جميع البلاد المعتدلة الحرارة . اعماها ما يلي .

٦١٣٢ - ثليب أصفر * ، كزبرة الحبشة (S). Thalictum flavum (S).

Pigamon des prés, P. jaune, Rue des prés, Pied de milan, Fausse rhubarbe (F).
Common meadow-rue, Feu-rue, False rhubarb (E).
Gelbe weissenraute, Falscher rhabarber (D).
Pigamo, P. delle palude, P. giallastro, Ruta falso, R. del prati (I).

نبات عشبي بري معمر . ساقه مضلعة تعلو من ٤٠ الى ١٥٠ سم . اوراقه لامعة النصل جؤوية العروق يقال انها مسهلة للمعدة . ازهاره صباغية لونها ال الاصفر الزاهي . ازهاره يستمر في حزيران وتموز .

٦١٣٣ - ثليب صغير * (S). Thalictum minus (S).

Pigamon mineur, Petit pigamon (F). Small meadowrue, Lesser meadowrue (E).
Kleine welsenraute (D). Erba scopala (I).

نبات عشبي بري معمر يوجد بين الصخور في المناطق الجبلية . ساقه مضلعة تعلو من ٣٠ الى ١٠٠ سم . ازهاره صغيرة القد لونها ال الخضار الاصفر . ازهاره يستمر من ايار الى ايلول .

٦١٣٤ - ثمار ، غلّة (F). Fruits

هي ما يغلّه المال في اجال موقوتة دون ان يفقد او يستبدل شيئاً من جوهره . فاذا كانت من منتجات الطبيعة فهي الثمار الطبيعية . واذا تدخل في انتاجها الانسان فهي الثمار الصناعية كحاصل الارض من الحبوب والفاكهة . واذا كانت ربحاً يحق من مال كفوائد رؤوس الاموال بقيمة اجارة المنازل فهي الثمار المدنية .

٦١٣٥ - ثمار ٥ (F). Caprophile (F).

Caprophilous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل حشرة تعيش على الثمار وفيها . او على بعض انواع الطير الذي يرغب في الثمار .

٦١٣٦ - ثمارّة (F). Fruitier (F).

مكان حفظ الثمار . Fruiterer, Green-grocer (E).

٦١٣٧ - ثمام * (S). Pennisetum (S).

Pennisète (F).
جنس نباتات عشبية برية زراعية من فصيلة النجيليات انواعه عديدة بعضها معمر . يتميز بسنبلاته الحريرية الاهداب || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

٦١٣٨ - ثمام أرَجَنْتِي (S). Pennisetum latifolium (S).

Pennisetum à larges feuilles (F).

عشبة علفية زراعية مهدا الارجنتين . ساقها تعلو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم . عصفها ازغب النصل ضيق العرض مستطيل الصفحة . سيلتها مركبة متدلية سيلاتها صغيرة القد كثيفة التجميع .

٦١٣٩ - ثمام أزْغَب * (S). Pennisetum typhoideum, P. americanum (S).



ثليب أصفر



ثليب صغير



ثمام



ثمام ازغب

٦١٦٢ - ثنائي البويضة. Biovalé (F). Bioval (E).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات زهرته ثنائية البويضة.

٦١٦٣ - ثنائي التخرم* ، تجزل.
Bifide (F). Bifid (E).
نعت تعريفي يطلق على بعض اجزاء النبات الثنائية الانفلاق الطولي.

٦١٦٤ - ثنائي التوام.
Bigéminé (F).
Bigeminate (E).
نعت تعريفي يطلق على كل تنوير يضم في زبد واحد توأمين من الأزهار.

٦١٦٥ - ثنائي الجنس.
Bigénère (F).
Bigenerous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل هجين ناتج عن تصالب جنسي.

٦١٦٦ - ثنائي الجيل.
Bivoltain, Bivoltin (F).
Bivoltin (E).
اسم يطلق على كل شجرة تعيد دورتها الحياتية الكاملة ، المعروفة بالجيل ، مرتان في الحول ومنها بعض أنواع قزبة الحرير اي دودة القز.

٦١٦٧ - ثنائي الحدود ، ذو حدين.
Binôme (F). Binomial (E).
عبارة جبرية مركبة من حدين تجمعها علامة + او - .

٦١٦٨ - ثنائي الحول ، محول.
Biennal (F).
Biennial (E).
ما يستمر سنتان او ما يتم بحولين .

٦١٦٩ - ثنائي الخباء*.
Biloculaire (F).
Bilocular (E).
نعت تعريفي يطلق على الثمار المزدوجة الخدر او الخباء.

٦١٧٠ - ثنائي السداة.
Diandre (F). Diandrous (E).
هو في النبات المزدوج العضو الذكري .

٦١٧١ - ثنائي الغلاف.
Dipérianthé (F). Diperianth (E).
نعت تعريفي يطلق على الأزهار المزدوجة الكم .

٦١٧٢ - ثنائي الفص.
Bilobé (F). Bilobate (E).
نعت تعريفي يطلق على ما هو منقسم الى فصين .

٦١٧٣ - ثنائي القعالة.
Dipétale (F). Dipetal (E).
نعت تعريفي يطلق على الأزهار المزدوجة القعالات اي البتلات .

٦١٧٤ - ثنائي المحور.
Biaxe (F). Biaxis (E).

٦١٧٥ - ثنائي المدقة.
Digyné (F). Digynous (E).
هو في النبات المزدوج العضو الانثوي .

٦١٧٦ - ثنائي المسكن.
Dioïque (F). Dioecious (E).
هو كل نبات تكون أزهاره الانثوية على نبتة وأزهاره الذكورية على نبتة أخرى كالنخل والفسق والكستنا .

٦١٧٧ - ثنائي المكافئ.
Bivalent
نعت تعريفي يطلق على الاجسام الكيماوية الثنائية التكافؤ .

وهي التي تتضمن فيها اجزاء خاصة تمكنها من اختزان المواد الغذائية والثانية تشمل الثمار الجافة وهي التي يحف جدار مبيضها ومحتوياته عند النضج .

٦١٥١ - ثمرة فقيرة ، فقيرة ، أكنة.
Achaine, Akène (F). Achene, Akene (E).
هي كل ثمرة جافة او يابسة مطبقة وحيدة البذرة اللامتلاصقة بغلافها . كالبدقة واللوزة والكستناء .

٦١٥٢ - ثمن.
Octant (F). Octant (E).
الثلث كوكبة نجوم موقعها بالقرب من القطب الجنوبي مركزها تحت كوكبة الطاوس || والثلث يعني ، في علم الرياضيات ، ثمن الدائرة اي ٥/٣ٶ.

٦١٥٣ - ثمن ، قيمة.
Coût (F). Costs (E).
هو قدر الشيء بالعملة المتداولة .

٦١٥٤ - شمش.
Arbuste, arbrisseau (F).
Shrub, Shrubby tree (E).
الشمش من اشجار ما كان بين العشب والشجر . والكلمة يونانية الاصل من استعمال ابن البيطار .

٦١٥٥ - ثميلة*.
Platylophus (S).
Platylophe (F). Platylophus (E).
جنس طير من الجواثم وفصيلة الفراشيات . انواعه المعروفة قليلة العدد موطنها جزر الزابج . ملجئها الحياتي جماعي . افواجها تعد من ١٠ الى ٢٠ زوجاً . قوتها الحشرات والدوريات والثمار || اجسامها شبيهة بالزرياب . رؤوسها متوجة بفتازع ضمية الشكل . اذناها مقطوعة الاطراف . اثوابها جميلة الالوان الزاهية التي تختلف مع الانواع || تدن في الاشجار الرقيقة الوارفة . اناثها تضع من ٢ الى ٤ بيضات تحضنها وحدها بينما الذكور تؤمن لها الغذاء .

٦١٥٦ - ثين.
Foin (F). Hay (E).
الثن هو يابس الحشيش . قال الراجز تكي اللواقح اكلة من ثين .

٦١٥٧ - ثنائي ، ثنائي .
Binaire (F). Binary (E).
ما هو مركب من عنصرين او ما هو يرتكز على عدد ٢ .

٦١٥٨ - ثنائي الأتوم ، ثنائي الذريرة.
Blatomique, Diatomique (F). Blatomic, Diatomic (E).
نعت تعريفي يطلق على الاجسام الكيماوية المركبة من اتيومين اي ذيرتين .


٦١٥٩ - ثنائي الأساس ، ثنائي القاعدة.
Bibasique (F). Dibasic (E).
نعت تعريفي يطلق على كل جسم كيمائي يتميز بارتدواج خاصته القاعدية .

٦١٦٠ - ثنائي البذور.
Dispermatique, Disperme (F). Disperm (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ثمرة مزدوجة البذور وعلى كل نبات ثماره ثنائية البذور .


٦١٦١ - ثنائي البرعمة.
Bigemme (F).
Bigemmus (E).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات يحمل براعم مزدوجة .



ثميلة



ثنائي التخرم



ثنائي الخباء

والابيض || تنويرها يستمر من اوائل الصيف الى اواسط الخريف .

٦١٨٩ - ثَوَاجِيَّات ٥ Theophrastaceae (S).

Theophrastacées (F). Theophrastaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة القملات اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض المناطق الحارة اخصها امريكة الجنوبية || نباتاتها بحال وجنبات متفاوتة الارتفاع . اوراقها متعاقبة ، قصيرة الاذينات . نصالها سنائية الشكل ، جامدة . ازهارها محوري الانتساب ، ضمي التجميع . ازهارها كبيرة جميلة الالوان الزاهية . اشهر اجناسها الشوابة .

٦١٩٠ - ثَوَار ٥ Eruptif (F). Eruptive (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما يثور فجأة .

٦١٩١ - ثَوَال ٥ Essaimant (F). Swarming (E).

نعت تعريفي يطلق على بعض الحشرات المجتحة الجملاء . وهو في النحل والنمل والارضة والعقيدان نعت الذكور والاناث المجتحة .

٦١٩٢ - ثَوَج ٥

الثوج هو «الصابورية» شبه جوق من الخوص يستعمل في نقل التراب وغيره .

٦١٩٣ - ثَوَجَل ٥ Sarcodon (S).

Sarcodon (F). Sarcodon (E).

جنس فطور من فصيلة الابريات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها الغابات والحراج الجبلية . يعيش على المواد النباتية المتحللة . يتميز ببوخته الابيض وبنكاهه الكبيرة المختلفة الاشكال . بعض انواعه جيد الصنف مأكول والبعض الآخر كاعنه او رديته || اعرف انواعه واشهرها الخمسة التالية .

٦١٩٤ - ثَوَجَل أَشَقَح ٥

Sarcodon rufescens (S). Sarcodon rufescent (F).

نوع من الثوجل . يوجد في الغابات المختلطة الاشجار من وريقة وعروة وصنوبريات . ساقه معتدلة الضخامة والارتفاع ، صفراء اللون . نكته صابجية الشكل محدودة ، لونها الى الشقحة السعفاء ، قطرها نحو ٨ سم . || لحميته جامدة المكسر ، جيدة الصنف ، مأكولة .

٦١٩٥ - ثَوَجَل سَوِي ٥

Sarcodon laevigatum (S). Sarcodon uni (F).

نوع من الثوجل . يوجد في غابات الصنوبر . يعيش على المواد النباتية المتحللة . ساقه قصيرة ، غليظة ، طلاء اللون . نكته كبيرة القد ، قمية الشكل ، سوية السطح الذي يتشقق عند الادراك ، قطرها من ١٥ الى ٢٠ سم . لونها الى الرمكة العفراء || لحميته كاعنة الصنف ، مرة المذاق ، لا تؤكل .

٦١٩٦ - ثَوَجَل قَارَش ٥

Sarcodon repandum (S). Sarcodon étalé (F).

نوع من الثوجل . يعيش جماعات وافرة العدد في ظل السديان الاخضر والملول . ساقه قصيرة ضخمة غبراء اللون يعلوها موج اطحل . نكته فارشة ، حلبة ، مجمدة ومفلقة ،

٦١٧٨ - ثَنَائِيَّي المنطش ، زَوَجِيَّي المنطش

Diploide (F). Diploid (E).

النباتات الثنائية المنطش هي التي يبلغ عدد نسلها ضعف عدد وحيدات المنطش . فالضروب الثنائية المنطش في التفاح مثلاً تحمل اربعاً وثلاثين نسلية في حين ان فردية المنطش تحمل ١٧ .

٦١٧٩ - ثَنَائِيَّات الفِصَل

Disépale (F).

Disepal (E).

من الازهار من كانت مركبة من فصلتين منفصلتين .

٦١٨٠ - ثَنَائِيَّات الفَلَقَّة ، مُزْدَوِجَات الفَلَقَّة

Dicotylédones (F). Dicotyledons (E).

احد قسمي مستورات البزور . اما القسم الثاني فوحيدات الفلقة .

٦١٨١ - ثَنَائِيَّات القِصَال ٥

Dimyales (F).

شعبة من الرخويات صفيحيات الحياشيم . فصائلها واجناسها وانواعها عديدة جميعها ثنائية العضلات المصرية القافلة .

٦١٨٢ - ثَنَّة ٥

Fanon (F). Fatlock (E).

هو الشعر الطويل في مؤخر حوشب الفرس اي في رصنها .

٦١٨٣ - ثَنَثَل ، ثَنَثَلَة ٥

Œuf gâté (F).

Damaged egg (E).

الثنثل والثنثلة هي البيضة المذرة .

٦١٨٤ - ثَنَظ ٥

Levée des semis (F). Gathering (E).

الثنظ هو آتبات اذا صدع الارض وظهر (التاج) والثنظ هو خروج الكمأة من الارض .

٦١٨٥ - ثَنِيَّي ٥

Doublon (F). Doubleon (E).

هو من الدواجن بوجه عام ومن النعم والمعر بوجه خاص كل من اكمل سن السنتين ودخل في الثالثة . والاثني ثنية .

٦١٨٦ - ثَنِيَّة ٥

Incisive, Pince (F).

Incisive tooth, Incisor (E).

هي السن القاطعة في الخيل والبقر والغنم والماعز ... وهما ثنيتان في كل فك .

٦١٨٧ - ثَهْلُولَة ٥

Beschorneria (S).

Beschornerie (F). Beschorneria (E).


جنس نباتات عشبية معمسة من فصيلة النرجسيات . مهدا بلاد المكسيك . اوراقها ضبية الانتساب كاوراق الباهرة واليوكا . نصالها كبيرة القد تطول من ٢٠ الى ٥٠ سم . وهي جامدة الصفحة ، لحمية الضلع ، مستنة الخفاف ، لونها الى الخضار الاطحل . ازهارها انبوية الشكل ، صغيرة القد ، صفراء اللون او حمراء او خضراء . تتركز على شماريخ منتصبة ترتفع من ٥٠ الى ٢٠٠ سم || انواعها المعروفة سبعة الفارق بينها حجم الاوراق واستطالة السراخ ولون الازهار || تزرع للتزيين ومزغب في المواقع المعتدلة الحرارة .

٦١٨٨ - ثَوَاجَة ٥

Theophrasta (S).

Théophraste, Coquemollier (F).

جنس نباتات جنبية وبجلمية من فصيلة الثواجيات انواعها المعروفة اربعة ، جميعها شائمة الاستعمال التريبي || سوقها قرعاء . اوراقها متعاقبة . نصالها سنائية جامدة ، جميلة الخضار الزاهي . ازهارها كبيرة فيها الاحمر والازرق



تهلولة



ثوجل سوي



ثَوَجَلٌ مُحَرَّشَفٌ



ثَوَجَلٌ مَرَصُوفٌ



ثَوْرُ الْمَاءِ



ثَوْرُ الْمَسْكِ



ثَوَلٌ



ثَوَمٌ أَيْضٌ

قطرها نحو ١٠ سم. لونها الى الصفرة يعلوها موج تبني يخالطه الاسمر. أطرافها الى الصفرة السمر || لحميته جامدة المكسر ، جيدة الصنف ، مأكولة .

٦١٩٧ - ثَوَجَلٌ مُحَرَّشَفٌ *

Sarcodon scabrosus (S). Sarcodon écailléux (F).

نوع من الثوجل . يوجد في غابات الصنوبر . يعيش جماعات وافرة العدد على المواد النباتية المنحلة . ساقه قصيرة ، غليظة مخددة ، كستنية اللون ، غبراء الموج . نكته فارشة ، محدودة ، متارجة ، محرشفة ، كبيرة القد ، قطرها نحو ١٥ سم. لونها الى البني الاشجع الاسفع الموج || لحميته كريهة الرائحة ، مرة المذاق ، لا تؤكل .

٦١٩٨ - ثَوَجَلٌ مَرَصُوفٌ *

Sarcodon imbricatum (S). Sarcodon imbriqué (F).

نوع من الثوجل . يوجد في غابات الصنوبر . يعيش على المواد النباتية المنحلة . ساقه قصيرة ، غليظة ، غبراء اللون . نكته فارشة ، مرصوفة بالشعول الصغيرة الحادة الرؤوس ، لونها الى البني الاسفع الموج ، ثمونها الى البني الكستني . قطرها نحو ١٢ سم. || لحميته كاعنة الصنف ، غير مرغوب فيها .

٦١٩٩ - ثَوْرٌ

Taureau (F). Bull (E).

هو ذكر البقر الصالح للنط . ج ثيران وثيار وثوار .

٦٢٠٠ - ثَوْرُ الْمَاءِ ، مِرْجَانِيَّةٌ

Corallina (S). Coralline, Mousse marine (F). Corallina (E). Korallenalge (D). Corallina (I).

جنس نباتات بحرية طيبة من الاشنيات . انواعه نحو ٢٠ عشرة منها محصورة ببحار المناطق الحارة والعشرة الاخرى منتشرة في جميع بحار العالم . تعيش بمعظمها على الصخور المرتفعة بمياه البحر وبعضها يتطفل على الفؤوس . يقال انها لا تخلو من المنافع الطبية .

٦٢٠١ - ثَوْرُ الْمَاءِ الْمُخْزَفِي ، مِرْجَانِيَّةٌ تَخْزِنِيَّةٌ

Corallina officinalis (S). Coralline officinale, Brion (F). Corallina of the shops (E). Echte Korallenalge, Korallen moss (D). Corallina officinali (I).

نوع من ثور الماء وهو نبات بحري طيب يعيش طفيلياً على الفؤوس . يستعمل كطارد للديدان .

٦٢٠٢ - ثَوْرُ الْمِسْكِ *

Ovibos moschatus (S).

Ovibos, Boeuf musqué (F). Musk-ox (E).

حيوان لبون يجتر من ذوات الاخلاف . يشبه الثور والكبش معاً . طوله نحو ٢٤٠ سم. وارتفاعه ١٠٠ سم. اما وزنه فن ٣٠٠ الى ٣٥٠ كيلو . وهو غليظ القرن قصير الذيل . موطنه البلاد الباردة الواقعة بين ٦٠ و ٨٣ من درجات خطوط العرض . يعيش قطعان كبيرة يراوح عددها من ٣٠ الى ١٠٠ وازود || وهو يدعى ثور المسك لان لحم الثور يحمل رائحة المسك .

٦٢٠٣ - ثَوْرٌ وَحْشِيٌّ

Bos primigenius (S). Aurochs, (F). Aurochs, Urus (E).

نوع من الثيران البرية التي انقرضت منذ بضعة اجيال .

٦٢٠٤ - ثَوْرَانٌ

Eruption

حالة الشيء الثائر كالبركان ينفذ الحم .

٦٢٠٥ - ثَوَمٌ

« شجر من اشجار البلاد عظام تسو له ساق غليظة وعناقيد

كعناقيد البطم وهو بما تدوم خضرته وورقه مثل ورق الجوز وهو سبط الاغصان وليس له حمل ولا ينتفع به في شيء . « واحدته ثومة (اللسان) .

٦٢٠٦ - ثَوَمٌ كَمَّةٌ

Neurada (S).

Neurade (F). Neurada (E).

جنس نباتات عشبية ، برية ، حولية او معمسة من فصيلة الورديات . انواعها المعروفة عديدة اعطائها بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط ، اخصها الشطوط الافريقية || سوقها مزغبة فرعاء بعضها يفرش الارض . اوراقها شعاعية ، اذينية ، خلية النصال . ازهارها فردية ، ابطية الارتكاز ، صغيرة القد ، زنادية ، وردية اللون او تبنية || تنويرها يستمر من اواسط الربيع الى اواسط الصيف .

٦٢٠٧ - ثَوَلٌ *

Essaim (F). Swarm (E).

الثول هو جماعة النحل عند الافراق بعد هجرها القفير الام وقبل دخولها النحיתה الجديدة . وهو مؤلف من ملكة مبكوكة وبعض الذكور وعدة الاف من العاملات .

٦٢٠٨ - ثَوَلٌ

عارض جنون يصيب الغنم والماعز . يقال : شاة ثولاء وتيس اثل .

٦٢٠٩ - ثَوَلٌ ، ثَوَلٌ ، ثَوَلٌ

Fourreau (F). Sheath (E).

هو وعاء قضيب البعير والثور والتيس . واصله في البعير وقيل هو القضيب نفسه (اللسان) .

٦٢١٠ - ثَوَلٌ ثَوَلٌ

Verrue (F). Wart (E).

خراج في الجسم ناقى صلب مستدير .

٦٢١١ - ثَوَمٌ

Allium (S). Ail (F). Garlic (E).

جنس نباتات بصلية عشبية من فصيلة الزنبقيات . انواعه عديدة معظمها بري وبعضها زراعي بقلي كالثوم والكراث والقفلوط || اوراقها قرصية الانتشاب عصفية الشكل خفيفة النصل . ازهارها نورة خيمية قائمة على شبراخ قرصي لبني منتصب اجوف . ثمارها بزور دقيقة مسترقة سوداء اللون . اعرف انواعه ما يتبع .

٦٢١٢ - ثَوَمٌ أَيْضٌ *

Allium neapolitanum (S).

Ail blanc (F). White garlic (E).

نوع من الثوم البري والزراعي التريبي . اوراقه عصفية مسننة . شراخه مضلع الزوايا ثلاثيها يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. ازهاره زهلة بيضاء اللون . ازهاره يستمر من اذار الى ايار .

٦٢١٣ - ثَوَمٌ الْحَيَّةِ

Germandrée aquatique (F).

هو الاسقورديون المائي ، اطلبه .

٦٢١٤ - ثَوَمٌ الشَّرْقِ

Ail d'Orient (F).

هو الكراث النبطي ، اطلبه .

٦٢١٥ - ثَوَمٌ الْغَزَالِ *

Allium victorialis (S).

Ail de cerf (F). Long rooted garlic (E). Mäusellauch, Wilder knoblauch (D). Cipolla salvatica, Nardo falso, Aglio con foglie di piantaggine (I).

نوع من الثوم البري يكثر في الاحراج الجبلية . اوراقه مستطيلة مملقة الزام الاخير .



ثوم النزال



ثوم بري



ثوم جبلي



ثوم زراعي



ثباتوتيس أحمر البطن



ثبتل

٦٢٢٧ - ثومكلاء

Spilanthus, Spilanthus (S).

Spilanthus (F). Spilanthus (E).

جنس نباتات عشبية حولية ومعمرة من فصيلة اللثديات أو المركبات اللثديات. أنواعها المعروفة ١٢ أعطائها بعض المناطق الحارة من العالمين القديم والجديد || معظم أنواعها طلي يحوي بعض الادهان الأساسية النشطة العرف العطري والحريفة الطعم || أشهر أنواعها ثومكلاء أكلة المعروفة بحشيشة النطق. وثومكلاء بارا المعروفة بحشيشة التناق.

Bergerle (F). Sheepfold (E).

٦٢٢٨ - ثوية

هي مأوى الغنم.

Uliginaire, Uligineux (F).

٦٢٢٩ - ثشد

Uligineux, Uliginal (E).

م. ثشدة. نعت تعريفي يطلق على كل نبات يعيش في المواقع الرطبة.

Thiamine (F).

٦٢٣٠ - ثيامين

الثيامين هو الاسم العلمي لفيتامين ب١ ويدعى أيضاً أنورين، اطلبه.

٦٢٣١ - ثباتوتيس أحمر البطن

Cyanotis rubigastrea (S).

Tachuris à ventre rouge (F).

طائر وحيد الجنس والنوع من الجواثم مشرومات المناقير وفصيلة النصفويات. يألف المروج والغابات وضياف مجاري الماء. قوته الحشرات. موطنه بعض مناطق أمريكا الجنوبية اخصها الشيلي || جسمه متوسط القد يطول نحو ٢٢ سم. ثوبه جميل الالوان المزوقة. رأسه متوج بكشة مستديرة قليلة الارتفاع تشبه التاج. رأسه وكشته وسائر الصفحة العليا الى الخضار اللبس يعلوه تجذيع ابيض في الجناح وفي الذنب. ذنبه معتدل الحجم، مستدير الطرف. كشته خضراء الحافة الداخلية، حمراء الخارجية. زوره وصدره وبطنه الى الحمرة الزاهية. خوافه الى الشفحة. ايطلاه مرقوشتان بالاسود || يدشن عشه في الاشجار الرفيعة. الانثى تحضن بمتابعة الذكر من ٤ الى ٥ بيضات. الترخيم يستمر نحو اسبوعين.

٦٢٣٢ - ثبتل، ثبتل، أبو زلاف

Boselaphus, Portax, Tragelaphus trago camelus, Tragelaphus picta (S). Boselaphe, B. Nilgaut, Tragelaphe (F). Tragelaph (E).

حيوان من بقر الوحش وحيد الجنس والنوع كبير الجثة طوله يراوح من ٢٤٥ الى ٢٧٠ سم. وارتفاعه من ١٣٠ الى ١٤٠ سم. وهو اكهب الثوب تعلوه سمرة وزرقة. مستطيل الرأس، عريض الصدر والزور. مرتفع الحارك. منحدر الكفل. قائمتاه الاماميتان ارفع من الخلفيتين. للذكر قرنان صديران منعطفان فوق رأسه وهما اصغر واحدة من قرني الوعل. طول القرن نحو ٢٢ سم. اما الانثى فجاء وللذكر عقيصة شعر جثل تقلد زوره. وصغار الثبتل تدعى أرخية. اجله يراوح من زوجين الى خمسة ازواج. موطنه الحالي يمتد من الخليج الفارسي الى جنوب حملايا.

Ordinateur (F).

٦٢٣٣ - ثقف، كمبيوتر

Computer (E).

الثقف جهاز الكتروني ينظم المعطيات بغائق السرعة ويعطي جميع الحواصل المطلوبة في جميع المجالات.

٦٢١٦ - ثوم بري، شقرديون

Allium silvestrum, A. xiphopetalum (S). All sauvage (F). Wild garlic (E). Wilder knoblauch (D). Aglio salvatico, (I).

هو الثوم البري المبذول. مهدد البلاد المعتدلة الحرارة. اوراقه تحضن جزءاً من الشمراخ المستطيل الغليظ الانتشاب.

Allium carinatum (S).

٦٢١٧ - ثوم جبلي

Ail à feuilles carinées (F). Mountain garlic, Keeled garlic (E). Berglauch, Waldlauch (D). Aglio di montagna, A. carinata (I).

نوع من الثوم البري. يكثر في الجبال والأتربة الطينية. اوراقه مستطيلة لسنة. ازهاره سماوية اللون.

Ail doré (F).

٦٢١٨ - ثوم ذهبي

Yellow garlic (E).

هو الحمزل الابيض، اطلبه.

٦٢١٩ - ثوم زراعي، ثوم، ثوم

Allium sativum, Porrum sativum (S). All cultivé (F). Garlic (E). Knoblauch (D). Aglio (I).

نوع من الثوم وهو البقلة الزراعية المعروفة. ضروره عديدة تختلف بشكل وحجم ولون فصوصها وزمن زرعها وسرعة ادراكها || زراعته عميقة يحد في جميع الأتربة الخفيفة والمتوسطة الاندماج يحسن صفته في الأتربة الحوارة الرغاب.

٦٢٢٠ - ثوم فلسطيني، ثوم شوبر

Allium Schuberti (S). Ail de Palestine, Ail de Schubert (F). Schubert garlic (E).

نوع من الثوم البري والزراعي التزييني. مهدد فلسطين اوراقه عصفية مستطيلة. شمراخه يملو من ٣٠ الى ٤٠ سم. نورته خيمية كبيرة كثيفة الارهار العديدة. لونها الى الابيض الوردي. ازهاره يستمر طوال فصل الصيف.

Ciboule (F). Stone-leek (E).

٦٢٢١ - ثوم قصبي

هو السبول، اطلبه.

Allium odorum (S).

٦٢٢٢ - ثوم مروح

All odorant (F). Odoriferous garlic (E).

نوع من الثوم البري والزراعي التزييني اوراقه عصفية ضيقة مستطيلة. شمراخه الزهري يملو من ١٥ الى ٥٠ سم. ازهاره كثيفة التجميع بيضاء اللون. ازهاره يستمر من ايار الى حزيران.

Ciboulette (F). Chive (E).

٦٢٢٣ - ثوم معمّر

هو القرط، اطلبه.

٦٢٢٤ - ثومة

الثومة ج. ثوم. الثوم شجر طيب الريح عظام واسع الورق اخضر اطيبي رينحاً من الآس يبسط في المجالس كما يبسط الرينحان وتتخذ منه المساويك (اللسان).

٦٢٢٥ - ثومرن

الثومرن: نبات بزره قوي الحرارة (فريتغ).

٦٢٢٦ - ثومس

نبات يعرف بصمتر الحمار (اللسان).

فتها الاستطالة . اغدادها عادمة التخديد ، معظمها لا يلحف
كامل البطن . اثوابها بنية او سمراء || جميعها مفترسة
وبعضها عاشب . مسرحها دجوي . معظمها يعيش كراشن
في قرى النمل || اشهر اجناسها التيكّم .

Verge du chameau (F).

Rod of camel (E).

٦٢٣٦ - تيسل

قضيبي البعير .

٦٢٣٧ - تيسل * ، كيسل

Cynodon dactylon, Panicum dactylon, Dactylon
officinalis, Digitaria stolonifera (S). Herbe des Ber-
mudes, Chiendent pied de poule, Gros chiendent,
Paspale (F). Bermuda-grass, Dog's-tooth-grass, Scut-
ch-grass (E). Echter hunds Zahn, Bermudagrass (D).
Gramigna maggiore, Dente canino (I).

نبات عشبي عرضي مداد معمر من فصيلة النجيليات .
مبدول في جميع الاصقاع يكثر في الاتربة المروية . يعتبر
من النباتات الضارة المؤذية .

Dactyle pelotonné (F).

Hard grass (E).

٦٢٣٨ - تيسل 'عمران

هو الدكتيل المكعب ، اطلبه .

Pêcherie de perles (F).

Pearl fishery (E).

٦٢٣٩ - نين

صيد اللؤلؤ واستخراجه من البحر .

Paussus (S).

Paussus (F). Paussus (E).

جنس حشرات من فصيلة التيكميات ورتبة غمديات
الاجنحة . انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض
اقاليم البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة
تطول من ٣ الى ٥ مم . رؤوسها صغيرة . عيونها ناشزة .
قرونها الاستشعارية ثنائية الفصل ، الفصل الاول صغيرة
الجرم اما الثانية فكبيرة ، مستضخمة ، اسطوانية الشكل ،
حيدية السطح . تأشيرها وفكوكها وملامسها صغيرة . كواسلها
ضيقة . بطونها مستعرضة . اغدادها عادمة التخديد ،
مقطومة المؤخر ، لا تلحف كامل البطن . قوائمها نشيطة .
اثوابها كستنية او بنية او شديدة السمرة || الحشرة الجملانة
مفترسة . مسرحها دجوي وبعض انواعها يعيش في قرى
النمل .

Paussidae (S).

Paussidés (F). Paussidae (E).


فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها
المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة
والمعتدلة الحرارة من العالم القديم || اجسامها صغيرة ،
معتدلة التبسيط ، تطول من ٤ الى ٦ مم . رؤوسها صغيرة ،
مستعرضة . عيونها ناشزة . قرونها الاستشعارية ثنائية
الفصل ، الفصل الاول صغيرة اما الثانية فكبيرة ،
مستضخمة ، اسطوانية الشكل . كواسلها لاقياسية ، تكثر



تيكّم



تيسل



٦٢٤٧ - جَادِي Crocus, Safran (F).
هو الزعفران ، اطلبه . Crocus, Saffron (E).

٦٢٤٨ - جَادِبُ النَّسْغِ Tirs-sève (F).
Drawing-sap (E).
قضيبي يترك على النبتة الام في اثناء التطعيم لجذب النسغ.

٦٢٤٩ - جَادِبِيَّة Attraction, Gravitation
احدى الظواهر الطبيعية التي تنظم علاقة قوة الجر والانجرار في الاجسام || صيغة قانون الجاذبية كما وضعه نيوتن تنص :
« كل جسم يتجاذب مع كل جسم آخر بقوة تتناسب طردياً مع حاصل ضرب كتلتيهما وعكسياً مع ربع البعد بينهما . » وهو ما يفسر دوران الكواكب والارض حول الشمس ودوران القمر حول الارض .

٦٢٥٠ - جَادِبِيَّةُ الْمَاءِ Hydrocroplisme (F).
راجع شذخ .

٦٢٥١ - جَادِبِيَّةُ النُّورِ Phototropisme (F).
راجع ندد .

٦٢٥٢ - جَادِبِيَّةُ شَعْرِيَّة Capillarité (F).
Capillarity (E).
ظاهرة طبيعية تجعل النسغ يصعد في النبات . ويجعل الماء يصعد في التربة من العمق الى السطح حيث يتبخر .

٦٢٥٣ - جَادِر Rhizophage (F).
Rhizophagous (E).
الجاذز من الحيوان والحشرات الذي يقضي على جلود النبات .

٦٢٤٠ - جَاب Onagre (F). Onager (E).
الجَاب : الفليظ الشين من حر الوحش .

٦٢٤١ - جَابَة الجابة هي بقرة الوحش

٦٢٤٢ - جَائِي ، رَاقِص Hercule (F).
Hercules (E).

الجائي او الراقص كوكبة نجوم شمالية الموقع ، تحيطها من اليسار القيثارة ومن اليمين الفكة ومن الجنوب العواء . وهي صورة رجل قد مد يده وجثا على ركبته ، احدى رجليه على طرف عصا العواء ، وهي اليمنى ، والاخرى عند الاربعه التي على رأس التنين والتي تسمى العوائد || عدد نجومها ١١٣ ألمعها من المرتبة الثالثة والرابعة . أشهرها « رأس الجائي » ويدعى ايضاً « كلب الراعي » .

٦٢٤٣ - جَاحِم ، مَعْيُون Oculifère (F).
Oculiferous (E).

نعت تعريفي يطلق في علم التاريخ الطبي على كل من يحمل عيناً .

٦٢٤٤ - جَادِح Demi-rustique, assez rustique (F).
Sufficiently rustic (E).

نعت تعريفي يطلق على النباتات التي تتطلب بعض العناية ولا تجود إلا في اقاليم معينة واثربة خاصة .

٦٢٤٥ - جَادِر Onagre (F).
Onager, Wild ass (E).

الجادر حمار الوحش .

٦٢٤٦ - جَادِسَة Terre inculte (F). Waste land (E).
كل ارض لم تعمّر ولم تحرث ولم تزرع . ج . جوادس .

٦٢٧٠ - **جَاسٌ** (F). Burrowing (E).
صفة الحيوان أو الشيء الذي يحفر التربة .

٦٢٧١ - **جَاسِدٌ ، جَسِيدٌ** (F). Coagulé (sang) (F).
هو الدم متى جمد وبيس .

٦٢٧٢ - **جَاسَنَتٌ** (F). Hyacinth (E).
هو الجوثن اطلبه .

٦٢٧٣ - **جَاضِمٌ*** (F). Labrum (E).
هو في الحشرات عضو يتصل بازار البخق ويلحف التأثير
مركزه مركز الشفة وقد يمثلها .

٦٢٧٤ - **جَاعِرَةٌ ، رَقْمَةٌ** (F).
Buttock, Rump (E).
الجاعة هي إلية الحيوان وهما جاعرتان ورقتان قال الاصمعي
هما حرفا الوركين المشرفان على الفخذين . ومنهم من قال
مضرب الفرس بذنبه على فخذيه .

٦٢٧٥ - **جَافٌ** (F).
Déraciner (F).
To root up, To deracinate (E).
يقال جاف الشجرة من جذورها أي اقتلعها .

٦٢٧٦ - **جَافِرٌ** (F).
Anaphrodisiac (E).
الجافر كل ما من شأنه اضعاف الشهوة الجنسية عند
الانسان والحيوان .

٦٢٧٧ - **جَافِيَاتٌ** (F).
Ampelophages (F).
الحشرات من اي فصيلة كانت تقضم الكرمة وتقربها .
مفردا جافن وجافنة .

٦٢٧٨ - **جَاكَآ*** ، **أَرْتُوكَرُبُسٌ** ، **شَجَرَةُ الْخُبْزِ**
Artocarpus (S). Artocarpe, Arbre à pain, Jacquier,
Jaquier (F). Bread tree, Bread fruit tree (E). Brod-
baum, Brotfruchtbaum (D). Artocarpo, Albero de
pane, Frutto di pane (I).

جنس اشجار من سبط الخبزيات وفصيلة الانجريات .
انواعه المعروفة نحو ٢٠ اعطانها البلاد الاستوائية . جميعها
اشجار دائمة تملو من ١٥ الى ٢٠ م . سوقها غليظة .
اغصانها منبسطة . اوراقها مفروسة تشبه اوراق التين .
ثمراها ضخمة بطيخة الشكل تطول من ٢٥ الى ٣٠ سم .
قشورها محببة خضراء اللون . لبها ابيض . بذورها
كستنية الشكل والقذ واللون . لبها نشوي التركيب
مأكول بعد سلقه او شيه او طبخه . طعمه طعم الخبز مع
شيء من الارضي شوكي .

٦٢٧٩ - **جَاكْسُونِيَّة*** ، **جَاكْسُونِيَّة**
Jacksonia (S). Jacksonia (F).

جنس جنبات برية وتربينية من فصيلة القرنيات الفراشية
منبتها استراليه . انواعها المعروفة ٣٠ سوقها منتصبه .
قليلة الفروع ، كثيرة الاغصان . اوراقها حشوية الشكل .
ازهارها لاقياسي التجميع يكثر فيه العنقودي والسبلي .
ازهارها فواحة العرف المستحب ، ارجوانية اللون او صفراء .

٦٢٨٠ - **جَاكُو*** ، **بَبَقَاءَ رَمَادِيَّة**
Psittacus erythacus (S).
Perroquet cendré, Jaco (F).
طائر من البقهاء . موطنه بعض مناطق افريقية الشمالية .

٦٢٥٤ - **جَادُورٌ** (F). Radicivore (F). Radicivorous (E).
آكل جذور النبات . نعت تعريف ي يطلق على كل حيوان
او حشرة تقرض جذور النبات وتعيش عليها .

٦٢٥٥ - **جَارٌ** (F). Luxuriant
الجَار من النبات : النض الريان .

٦٢٥٦ - **جَارُ الْمَاءِ** (F). Common alder (E).
هو المغث ، اطلبه .

٦٢٥٧ - **جَارُ النَّهْرِ*** ، **سَلَقُ الْمَاءِ** ، **لِسَانُ الْبَحْرِ**
Potamogeton natans (S). Potamogeton flottant,
Epi d'eau, Potamot (F). Pondweed, Deill's spoons,
Tench weed (E). Schwimmdendes laichkraut (D). Po-
tamogeto maggiore, Lingua d'acqua (I).
نبات عشبي مائي مداد من فصيلة عرائس الماء . اوراقه
حاضنة ، بيضيه ، جلدية النصل ، شبه شفافة ، متقابلة .
ازهاره سنبل التجميع محوري الارتكاز . ازهاره خنثوية ،
طويلة الزناد خضراء اللون || كان ولا يزال من النباتات
الطبية ذات الاستعمال الخارجي نقيعه يفيد الحكاك .

٦٢٥٨ - **جَارَةُ الْمَاءِ** (F).
Aponogeton (F).
Water hawthorn (E).
راجع ابقونه .

٦٢٥٩ - **جَارَةُ الْمَاءِ السُّبُلِيَّة*** (F).
Aponogeton en épis
راجع ابقونه سنبلية .

٦٢٦٠ - **جَارِحَةٌ** (F).
Bête de chasse
ما تعلم الاصطياد من كلب او فهد او بازي او نحو ذلك
ج . جوارح .

٦٢٦١ - **جَارِدٌ** (F).
Acridophagous (E).
نعت تعريف ي يطلق على كل من يأكل الجراد من انسان
وطائر وحيوان وحشرة .

٦٢٦٢ - **جَارِسٌ** ، **وَاشِعٌ** (F).
Anthophage, Floricole (F). Floricol (E).
نعت تعريف ي يطلق على كل طائر او حشرة مرتعها الزهر .

٦٢٦٣ - **جَارِنٌ** (F). Young serpent (E).
Serpenteau (F).
ولد الحية من يوم نفضته حتى الثلاثة او الاربعة اشهر .

٦٢٦٤ - **جَارِنُكٌ** (F).
Prunier abricoté (F).
هو الجارنك ، اطلبه .

٦٢٦٥ - **جَارُودٌ** (F).
Raticide (F). Rat-poison (E).
الجارود : السنة الشديدة الحل .

٦٢٦٦ - **جَارُودٌ** (F).
كل مادة سامة تستعمل للقضاء على الجرذان واشباهها .


٦٢٦٧ - **جَارُوشٌ*** ، **مَجْرَشَةٌ** ، **مِرْضَاخٌ** ، **مِرْضَخَةٌ**
Concasseur (F). Bruising-mill, Crushing-mill (E).
آلة تستعمل لجرش الحبوب التي تتلفها الدواجن .

٦٢٦٨ - **جَارِزَةٌ** (F).
Espalier (F).
الجازعة هي كل خشبة معروضة بين شيتين ليحمل عليها .

٦٢٦٩ - **جَارِلٌ** (F).
Dimère (F).
نعت تعريف ي يطلق ، في علم التاريخ الطبيعي ، على كل
عضو مركب من مفصلين أو جزئين .



جار النهر



جاروش



جاضم



جاكا



جاكسونيه



جاكو



جاكوبين



جاكينية



جاموس أرنبي



جاموس أصهب



جاموس الخلا

أخطامها مستعرضة . جباهها نافرة محدبة وقصيرة . قرونها مستغلطة ، منعققة ، متتابعة الحيد ، مدببة الأطراف . أذناها كبيرة متدلية . أذناها متوسطة الطول || موطنها البلاد الآسيوية والأفريقية ، تألف المناقع وضياف الأنهار والبحيرات حيث تكثر من الإقامة في الماء . قوتها الأعشاب . أناثها أصغر جثة من ذكورها وهي حولية الحمل فردية التاج ترضع صغيرها من ٣ إلى ٤ أشهر || أما أنواعه السبعة فهي ما يتبع .

٦٢٩١ - جَامُوس أَرْنَبِي * Bubalus arni (S).

Buffle arni, Arni (F).

نوع من الجاموس الآسيوي . أعطانه فسيحة الأرجاء تمتد من الهند إلى الهند الصينية وتجاووزها . يقال أنه يفرض الاحترام على البير والنمر ويقتحم الغيل إذا تعدى على مرعاه . وهو أكبر الجواميس جثة وأشدّها بأساً وبطشاً . يعلو نحو ٢٣٠ سم . ويطول نحو ٣٥٠ .

٦٢٩٢ - جَامُوس أَصْهَب * Bubalus b. fulvus (S).

Buffle fauve (F).

يقال أنه ضرب من النوع الهندي دجن منذ زمن بعيد يرتقي إلى عصر كنفوشيوس أو قبله . وهو يتميز باعتدال غلاظة أطرافه وبغزارة لبنه الأبيض || وما الجاموس الأفغاني والایراني والعراقي والسوري والمصري والتركي والارمني واليوناني والایطالي والدانوبي سوى سلالات تحدرت من هذا الضرب .

٦٢٩٣ - جَامُوس البَرّ

Bubalus pumilus, B. brachyceros (S). Buffle brachycère, Niari, Vache des buissons (F).

نوع من الجاموس الأفريقي . أعطانه فسيحة الأرجاء تمتد من حدود الصحراء الكبرى إلى شواطئ الأطلس وإلهادي . وهو صغير الجثة والقرن يعلو نحو ١٣٠ سم . ويطول نحو ٢٢٠ . يألف السهل والجبل على السواء لكنه لا يبتعد عن الماء أكثر من مسير ثلاث ساعات . أجله لاقياسي العدد . يكثر في السهل ويقل في الجبل .

٦٢٩٤ - جَامُوس الخَلَا * ، جَامُوس الكَفَر

Bubalus caffer (S). Buffle de la Cafrerie (F).

نوع من الجاموس الأفريقي . أعطانه فسيحة الأرجاء تمتد من بحيرة فيكتوريا نيارزا إلى ضفاف الأورنج وبلاد الأنكولا . وهو ضخم الجثة كبيرها . يعلو نحو ١٤٠ سم . ويطول نحو ٢٤٥ سم . أما قرنه فلا يقل عن ٨٥ سم . وذنبه ٨٠ سم . وأذنه ٣٠ سم . أجله يراوح من ٥٠ إلى ٣٠٠ نفر .

٦٢٩٥ - جَامُوس النَّشَل

Bubalus acquinoctialis (S). Buffle équinoxial (F).

نوع من الجاموس الأفريقي . أعطانه تشمل كافة مناطق خط الاستواء الأفريقية التي لا تخلو من المناقع وبجاري الماء . وهو أصغر جثة من جاموس الكفر وأقصر قرناً وأذاً . أجله يراوح من ٢٠ إلى ٢٠٠ نفر .

٦٢٩٦ - جَامُوس الهِنْد

Bubalus bubalus (S).

Buffle de l'Inde (F).

نوع من الجاموس الآسيوي دجن وتحدت منه جميع السلالات الأهلية المعروفة . يتميز باستطالة جثته وذنبه ، بقصر رأسه وانبساط جبهته ، بكبر أذنه وبصر عينه . علوه يراوح من ١٣٠ إلى ٢٠٠ سم . وطوله من ٢٨٠ إلى ٣٢٠ سم . أما ذنبه فن ١٠٠ إلى ١٢٠ سم .

يألف الغابات وضياف مجاري الماء . ملجئه الحياتي بخافي الأ في زمن التساند والحضانة . قوته الثمار والحبوب . يقتبس الكلام ويردده بسهولة فائقة خاصة إذا كان لا يزال نياً || ثوبه إلى الشبهة الرمادية الزرقاء الموج . ذنبه أحمر . عينه مطوقة بالأبيض . حدقة عينه كستنية اللون . متقاده ورسفاه وأصابه سود || يدثن عشه في تجاويف الأشجار . الأنثى لا تضع أكثر من بيضتين تحضنها وحدها بينما الذكر يؤمن لها الغذاء .

٦٢٨١ - جَاكُوبِين * Heliiothryx (S).

Jacobine (F). Heliiothryx (E).

جنس طير من الجواثم رقيقات المناقير وفصيلة الفريسيات . أنواعه المعروفة سبعة موطنها معظم مناطق أمريكا الاستوائية . تألف الرياض وضياف الأنهر والمواقع الدغلة . قوتها الحشرات أخصها المجنحة وبعض الثمار العنبية البرية . أجسامها صغيرة تطول من ١٠ إلى ١٥ سم . تتميز باستطالة مناقيرها الجائسة وبكبر أذنان ذكورها . أثوابها العلوية متباينة الألوان العابقة الصفراء الموج . صدورها وبطنها عاجية . أناثها أصغر قدماً من ذكورها وأهت ثوباً .

٦٢٨٢ - جَاكِيَّة Jackia (S). Jackie (F).

جنس أشجار حرجية وتزيينية من فصيلة القويات . منبتها الهند الصينية وجزر الزابج . أنواعها المعروفة قليلة العدد جميعها مغزلية الشكل ، بأسقة القد . أوراقها منعقة ، متقابلة ، متوسطة النصل . أزهارها عنقودية التجميع . ثمارها جلدية ، ثنائية البزور تستعمل في بعض المستحضرات الطبية .

٦٢٨٣ - جَاكِينِيَّة * Jacquinia (S).

Jacquiele, Jacquiner (F). Jacquinia, Bracelet wood (E). Jacquinia (D). Jacquinia (I).

جنس جنات برية وتزيينية من فصيلة الربيعيات أنواعها المعروفة ستة . مهدها أمريكية الاستوائية . أوراقها منعقة ، متماقبة . نصلها أهليلجي الشكل ، لامع البشرة . أزهارها جميلة القالب ، عنقودية التجميع ، متدلية .

٦٢٨٤ - جَالِحَة ، سَبِيخَة ، تَحْمِيَّة

Flocon (F). Flock, Tuft (E).

الجوالح ما تظاير من رؤوس القصب والبردي يشبه القطن .

٦٢٨٥ - جَالُون Jalon (F). Levelling-staff (E).

راجع أرفة .

٦٢٨٦ - جَام ، قَدَح Goblet (F). Goblet (E).

شكل من أشكال تشذيب الأشجار المثمرة يكثر استعماله في التفاح .

٦٢٨٧ - جَامِس Desséché (F). Dried (E).

نبات جامس : ذهب غرضوته ورطوبته فول وجسا .

٦٢٨٨ - جَامَسَة Nelombo

اطلب نيلوفر قبطي .

٦٢٨٩ - جَامُورَة هي الجارة ، اطلبها .

٦٢٩٠ - جَامُوس ، ذُنُوب Bos bubalus (S).

Buffle (F). Buffalo (E).

جنس حيوانات وحشية وداجنة من فصيلة البقريات . أنواعه المعروفة سبعة جميعها ربعة الأجسام الغليظة .

٦٣٠٧ - جَاوْدَار - Seigle (F). Rye (E).

هو الشيلم ، اطلبه .

٦٣٠٨ - جَاوَشِير - Opopanax

هو الكاوشير ، اطلبه .

٦٣٠٩ - جَاوِي - Impératoire des montagnes (F).

راجع تاغندست . Fellow grass (E).

٦٣١٠ - جَائِحَة - Fléau (F). Calamity (E).

الجائحة والجوائح كل آفة سماوية تحتاج النبات فتؤذي أو تقضي على ثماره أو انتاجه .

٦٣١١ - جَبَّ - Pollinisation (F). Pollinization (E).

هو التأيير ، اطلبه .

٦٣١٢ - جُبَّ - البئر الكثيرة الماء البعيدة القمر .

٦٣١٣ - جَبَّء - Truffe rouge (F). Red truffle (E).

الجبء واحد الجبأة وهي الحمر من الكفاة . قال الاحمر : الجبأة هي التي الى الحمرة . والكفاة هي التي الى الغبرة والسواد . والققعة البيض . وبنات او بر الصغار . (اقرب الموارد) .

٦٣١٤ - جَبَا - الجبا : شفة البئر .

٦٣١٥ - جَبَّاء - الجباء هو طرف قرن الثور .

٦٣١٦ - جَبَّاب - Pollinisation des dattiers (F).

Pollinization of date trees (E).

الجباب هو تنبيغ النخل . وجب النخل : نبغه . وزمن الجباب : زمن تأيير النخل .

٦٣١٧ - جَبَّاب * - Spathé

هو رعاء الطلع ويدعى جف وكافور .

٦٣١٨ - جَبَّار ، جَوَزَاء - Orion (F). Orion (E).

الجبار او الجوزاء كوكبة نجوم جنوبية الموقع تمتد الى ما فوق خط الاستواء بالقرب من برج الثور || عدد نجومها ٧٨ وهي على صورة رجل قائم في ناحية الجنوب بيده عصا وعلى وسطه سيف . والعرب تسمى الكواكب الثلاثة التي على الوجه «الهنة» . والنير الاعظم الذي على منكبه اليمنى «منكب الجوزاء» و«يد الجوزاء» ايضاً . والكوكب النير الذي على المنكب اليسرى «النابد» و«المرزم» ايضاً . والثلاثة المصطفة التي على وسطه «منطقة الجوزاء» . والثلاثة المنحدرة المتقاربة «سيف الجبار» . والنير العظيم الذي على قدمه اليسرى «رجل الجبار» . والكوكبان اللذان يتقدمان الرجل «الناعقان» . وتسمى التسعة المقسومة التي على الكم «تاج الجوزاء» || وتحت منطقة الجوزاء ينتشر سديم الجوزاء الذي اكتشفه «هوفنس» عام ١٦٥٦ .

٦٣١٩ - جَبَّار - Hypermétrique (F).

Hypermétric (E).

نعت يطلق على جبابرة الحيوانات الداجنة من اي نوع كانت من الطير الى الثدييات .

٦٣٢٠ - جَبَّاس ، مَمْبَة ، شَجَرَة الأنداء

Mammea (S). Mammée (F). Mamey (E).

جنس اشجار مشمرة برية وزراعية من فصيلة الكلوزيات . النوع خمسة منبها البلاد الاستوائية . جميعها اشجار كبيرة

٦٢٩٧ - جَامُوس خِرْبَانِي * - Bubalus kerabau (S).

Buffle kérébau, Kérébau (F).

نوع من الجاموس الاسيوي المتوسط القد يعلو نحو ١٤٥ سم . ويطول نحو ٢٠٠ أما ذنبه فنحو ٦٦ سم . يتميز باستطالة قرويه المنبطحة المقومة . اعطانه فسيحة الارحاء تشمل الهند وسرنديب والهند الصينية وجزر الزابج . يربونه للجر والقصابه . اناته متوسطة الدر .

٦٢٩٨ - جَامُوس غِينِيَّة - Bubalus centralis (S).

Buffle central (F).

نوع من الجاموس الافريقي مهدد غينيه ومناطق شمال السودان . جسمه ربع القامة متوسط القد . قرنه منبسط الانتشاب ، اعوج الشكل ، منحرف الى الوراء . هله مبعثر ، نادر الوجود ، حنطي اللون . اجله يراوح من ٢٠ الى ١٢٠ نفر .

٦٢٩٩ - جَامُوسَة - Bufflesse (F). She-Bufferalo (E).

انثى الجاموس .

٦٣٠٠ - جَانِبِي - Latéral (F). Lateral, Side (E).

نعت تعريفي يطلق على ما كان مركزه في جانب الشيء .

٦٣٠١ - جَانِبِي الخَبَاء ° - Pleurocarpe (F).

Pleurocarpous (E).

نعت تعريفي يطلق على كل طحلب تنبت سديناته على جانب الساق او الفرع .

٦٣٠٢ - جَانِبِيَّات العَوَم ، مُفْلَطَحَات

Pleuronectidés, Poissons plats (F). Pleuronectidae (E).

فصيلة من الاسماك المسطوات تشمل بعض الاجناس المفلطحة الشكل كسمك موسى وسمك الترس وغيرها .

٦٣٠٣ - جَانِبِي ° - Radicole (F).

Root-eating (E).

نعت تعريفي يطلق على كل حشرة تعيش على اجنات وشروش النبات وتقتات منها .

٦٣٠٤ - جَانِرِك * ، جَارْنِك

Prunus armenioides (S). Prunier abricoté, Abricotée, Mirabellier (F).

شجرة مشمرة من فصيلة الورديات . منهم من قال ان الجانرك ينتمي الى الكرز ومنهم من اتبعه بالخوخ . خسرويه عديدة ، اشجاره متوسطة الحجم اوراقه معنقة متعاقبة اطول من اوراق المشمش واصغر منها خضرة . ازهاره نوري . ثماره مختلفة الاشكال والاحجام والالوان والطعم والحلاوة والحموضة . جميعها مأكولة وزبيب ويستخرج منها بالتقطير ، بعد التخدير كحول جيد الصنف || يغرس وينمو في جميع الاودية . يرجع الكاملة التركيب العميقة الغور . يوجد في المناطق المتوسطة الارتفاع الممكن رها . يتكاثر بالبذر والتطعيم || اشهر انواعه التفاحي والحامض والسكري .

٦٣٠٥ - جَانِرِكَة - Mirabelle (F).

Mirabelle plum (E).

الجانركة والجانركة هي ثمرة الجانرك .

٦٣٠٦ - جَانُوس ° - Janus (F).

هو الضيكل ، حيوان من الرخويات ، اطلبه .



جاموس خرباني



جانرك



جباب



جَبَّاسْ أَمْرِيكَة



جَبَّحْلُ الصِّينِ



جَبَّحْلُ الكَنْجِ



جَبْدْ



جَبْكْسْ

٦٣٢٧ - جَبَّحْلِيَّاتْ ٥ Platanistidae (S).

Platanistidae (F). Platanistidae (E).

فصيلة حيوانات مائية ، نهريّة ، لبونة من مرتبة متاثلاث الاسنان ورقبة الخوئيات || انواعها المعروفة ثلاثة : جَبَّحْلُ الكَنْجِ او السيسوق ، وجَبَّحْلُ الصِّينِ او البوت ، وبوتو الامازون .

٦٣٢٨ - جَبْدْ ٥ Millerandage (F).

جَبْدُ العنب : صنروقفف . والجَبْدُ هو ان يكون العنب صغيراً مقفلاً وان لا ينعقد بعض زهره .

٦٣٢٩ - جَبْدَة الجبارة قبل ان يكشط عنها الليف .

٦٣٣٠ - جَبْرْ Algèbre (F). Algebra (E).

علم رياضي ينسب ابتكاره الى العرب وهو علم يشترك مع الحساب في موضوعاته ويختلف عنه في استخدام الرموز لذلك اصبح اشمل من الحساب في معالجة المسائل الرياضية . ومع ذلك فكل قانون في علم الحساب له ما يناظره في علم الجبر . والرموز الجبرية هي حروف ابجدية فاذا ضربت بعضها في بعض او قسمت بعضها على بعض سمي ذلك بالحد الجبري . واذا استخدمت الاعداد مع الرموز سمي العدد بالمعامل الحسابي وهو يسبق دائماً الحد الجبري . واذا استبدلت الرموز باعداد فهي عملية التعويض . ويتميز الجبر عن الحساب باستعمال الاشارتين + و - للدلالة على ان الكمية الاولى موجبة والثانية سالبة . ومن ابحاث علم الجبر : المعادلات والجذور واللوغاريتم الخ .

٦٣٣١ - جَبْرَة

الجبرة : نبت اكثر ما يكون في المغرب طولها نحو ثلاث اصابع . (اقرب الموارد) .

٦٣٣٢ - جَبَّسْ Pastèque (F). Water-melon (E).

راجع بطيخ .

٦٣٣٣ - جَبْسْ Sélénite (F). Selenite (E).

هو سلفات الكلس .

٦٣٣٤ - جَبْسْ Ourse (F). She-bear (E).

الجبس انثى الدب .

٦٣٣٥ - جَبْسِيْن ، جَبْسِيْن ، جَبْسِيْن Gypse (F). Gypsum (E).

هو كبريتات الكلس المائي الطبيعي المتبلور .

٦٣٣٦ - جَبْكْسْ ٥ Japyx (S).

Japyx (F). Japyx (E).

جنس حشرات ناهمة من فصيلة الجبكيديات ورقبة لاطثات المتك . انواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم المناطق الحارة وفي بعض المناطق المعتدلة الحارة || اجسامها ضعيفة ، مستطيلة ، معتدلة التبسيط ، مبعثرة الحلب الدقيق . اطواها تراوح من ٨ الى ٢٤ سم . اثوابها الى البياض التني . رؤوسها شبه مربعة الشكل . عيونها كهة . قرونها الاستشعارية قلادية ، مركبة من ٣٠ فصلة . صدورها ثلاثية الحلقات . بطونها عشارية السكم ، تنتهي بزوج من السرك الصغير الكلافي الشكل الاسمر اللون . قوائمها قصيرة ، دقيقة . ارساغها وحيدة العقول ، ثنائية الاظفار اللامتساوية القد || يكثر وجودها تحت الحجارة في المواقع الدافئة . قوتها المواد العضوية المنحلة .

القد هرمية الشكل تعلو من ١٠ الى ٢٠ م . اورقها عروية ، متقابلة ، معتقة ، بيضية ، جلدية النصل . ازهارها كبيرة القد بيضاء اللون فواحة العرف مبعثرة على الافناد والافنان . ثمارها لحمية اللب كروية الشكل قطرها يراوح من ١٤ الى ٢٠ سم . لونها الى الصفار الكبريتي || اشهر انواعه وافضلها جباس امريكة .

٦٣٢١ - جَبَّاسْ أَمْرِيكَة ٥ ، مِشْمِشْ أَمْرِيكَة ،

مَمِيَّة أَمْرِيكَة Mammea americana (S).

Mammée d'Amérique, Abricotier de St. Dominique, Arbre aux mamelles (F). Mamme apple, Mamey, Wild apricot (E). Amerikanischer brüstenbaum (D). Mamel, Albicocco d'Americo (I).

نوع من الجباس منبته امريكة الاستوائية . شجرته كبيرة القد هرمية الشكل مأكولة الثمار الصفراء اللون الذكية العرف .

٦٣٢٢ - جَبَّايَا Trouis de plantation (F).

الجبايا : الركايا التي تحفر وتنصب فيها قضبان الكرم .

٦٣٢٣ - جَبْيِيَّة ٥ Panchéisme (F).

Pancheism (E).

الجبتيّة او الوهية الكون مذهب فلسفي يعترف بالاله انما في جميع الكائنات .

٦٣٢٤ - جَبَّحْ ، جَبَّحْ Ruchée sauvage (F).

Wild Hivful (E).

هي الاوقاب الصخرية الطبيعية التي تسكن فيها النحل . ج ابيح وأجباح وجبوح وجباح .

٦٣٢٥ - جَبَّحْلُ الصِّينِ ٥ ، لَبُوتْ ٥

Lipotes vexillifer (S).

Dauphin de Chine, Lipote (F).

حيوان مائي ولود لبون من فصيلة الجبعليات ورقبة الخوئيات . اعطانه بعض المياه الصينيه اغصها بحيرة توغ - تنغ . قوته الاسماك || جسمه اهليلجي الشكل يطول نحو ٢٠٠ سم ثوبه في الشطر الاعلى الى الزرقه السوداء الموج ، وفي الشطر الاسفل والبطن الى البياض الاغبر . رأسه اسفني الشكل . خطمه كالمنقار الجالس المبط . اسنانه صغيرة ، كثيرة ، ذربة . عيناه صغيرتان ، ماسحتان . نيسمه نفرة صغيرة تتوسط الجبهة . زعنفته الظهرية متوسطة الحجم . زعنفته الصدرية سنانيتا الشكل ، اما الذيلية ففارقة ومتساوية الفلق || لحمه متوسط الصنف ، مأكول .

٦٣٢٦ - جَبَّحْلُ الكَنْجِ ٥ ، سَبْسُوقْ ٥

Platanista gangetica (S).

Plataniste du Gange, Sousouk (F).

حيوان مائي ولود لبون من فصيلة الجبعليات ورقبة الخوئيات . اعطانه المياه الهندية اغصها الكنج . والهندوس والبرما بوترا || جسمه شبه وشي الشكل يطول نحو ٢٥٠ سم . ثوبه اسود الشطر الاعلى ، ابيض الاسفل . رأسه واضح المعالم والحدود . خطمه ذلق مستطيل . اسنانه كبيرة وكثيرة . عيناه صغيرتان ، مستديرتان ماسحتان . نيسمه نفرة صغيرة تتوسط الجبهة . زعنفته الظهرية صغيرة ، هرمية الشكل . زعنفته الصدرية سنانيتا الشكل ، معتدلة الحجم . زعنفته الذيلية كبيرة فارقة ، متساوية الفلق || لحمه متوسط الصنف ، مأكول .

٦٣٤٦ - جَبُونَنْدِي الْأَنْتِيل

Pilocarpus racemosus (S).

Jaborandi des Antilles (F).

نوع من الجبورندي . منبته الانتيل . تصنيفه يأتي في المرتبة السادسة لانه ضعيف المادة الطبية المتوسطة الصنف .

٦٣٤٧ - جَبُونَنْدِي رِيشِي الْوَرَق

Pilocarpus pennatifolius (S).

Jaborandi de Paraguay (F).

نوع من الجبورندي . منبته جنوبي غربي البرازيل وبلاد البراغواي . يعتبر من الاصناف الجيدة الوافرة المادة الطبية . مركزه التصنيفي يأتي في المرتبة الثانية اي بعد المخزني .

٦٣٤٨ - جَبُونَنْدِي سِيَارَا

Pilocarpus trachylophus (S).

Jaborandi de Ceará (F).

نوع من الجبورندي متوسط الجودة والمادة الطبية . منبته مقاطعة سيارا . اوراقه صغيرة النصال . مركزه في المرتبة الرابعة .

٦٣٤٩ - جَبُونَنْدِي شَالِك

Pilocarpus spicatus (S). Jaborandi d'Aracaty (F).

نوع من الجبورندي . منبته مقاطعة الريو وبمض مقاطعة سان باولو . اوراقه بسيطة ذريرة شائكة العقصة تطول من ٥ الى ١ سم . وهو ضعيف المادة الطبية ، متوسط الجودة ، تصنيفه يأتي في المرتبة الخامسة .

٦٣٥٠ - جَبُونَنْدِي صَغِير الْوَرَق

Pilocarpus microphyllus (S).

Jaborandi de Maranhão (F).

نوع من الجبورندي جيد الصنف وافر المادة الطبية . منبته مقاطعات البارا والباراهيبيا والمارانهام . تصنيفه يأتي في المرتبة الثالثة بعد المخزني والريشي الورق .

٦٣٥١ - جَبُونَنْدِي مَخْزَنِي

Pilocarpus officinalis, Pil. Jaborandi (S).

Jaborandi officinal, J. de Pernambuco (F).

نوع من الجبورندي جيد الصنف غزير المادة الطبية . منبته مناطق الشمال والشمال الشرقي من البرازيل ويجود خاصة في منطقة برنمبوك التي تنتج اجود الاصناف . مركزه يأتي في المرتبة الاولى .

٦٣٥٢ - جَبُون ، جَبُون ، هِيلُوبَات

Hylobates (S). Gibbon (F). Gibbon, Long-armed apes (E).

جنس قرد من فصيلة اشباه الانسان . انواعه ١٠ جميعها رشيقة القوام والحركة . اجسامها متوسطة القد . قاماتها معتدلة لا تتجاوز المتر . صدورهم مقوسة . ايديهم مستطيلة . اناثها تضع ولداً واحداً ترضعه نحو ٦ شهور . موطنه البلاد الاسيوية الحارة انحصاراً شبه جزيرة الهند الصينية وما جاورها من القارة والجزر . اشهر انواعه ما يتبع .

٦٣٥٣ - جَبُون رَشِيْق ، أُونْكُو

Hylobates agilis (S). Gibbon agile, Ungko (F). Agile gibbon, Ungko (E).

نوع من الجبون ، رشيق القوام . قامته نحو ٧٢ سم . ثوبه يراوح بين البياض الاغبر والصفار الحنطي . موطنه احرار السيام وجزيرة سومطرة . قوته الثار . يعيش على الاشجار . قفزته من شجرة الى اخرى تبلغ ١٠ امتار .

٦٣٣٧ - جَبَكْسِيَّات

Japygidae (S).

Japygides (F). Japygidae (E).

فصيلة حشرات دامتة وناهمة من رتبة لاطئات المتك . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد معظمها من عظم البلاد الحارة . اجسامها ضعيفة ، مستطيلة ، مبعثرة . الهلب . رؤوسها مربعة او شبه مكورة . عيونها كهة . قرونها الاستشعارية مستطيلة . صدورهم ثلاثية الحلقات . بطونهم عشارية السكم . قوائمهم نحيلة . اسراكهم صغيرة كلابية الشكل كما في النيك . اثنائها الى البياض التبي او الاغبر . اعرف اجناسها الجبكس .

٦٣٣٨ - جَبُل

Arbres desséchés (F). Dried trees (E).

الجبل هو الشجر اليابس .

٦٣٣٩ - جَبِيلَة ، نَوَاق

Noyau (F). Nucleus (E).

الجيلة هي الجزء الحي القابل للتكاثر في الخلية . والجيلة تتركب من شبكة نووية تدعى مهية مكونة من نشب صغيرة تسبح في سائل خاص يعرف بالسائل النووي . ويحيط بالجيلة من الخارج غشاء رقيق يدعى الغشاء النووي . وقد يوجد داخل الجيلة جسم كروي صغير يدعى المنة . وقد تحوي الجيلة منة واحدة او اكثر .

٦٣٤٠ - جُبْن ، جُبْن

Fromage (F). Cheese (E).

حليب جبن وقولب وحضر فاصبح صالحاً للاكل . انواعه عديدة مختلفة الطعم والمذاق والرائحة . جميعها غذائية غنية ببعض الفيتامينات .

٦٣٤١ - جَبْنَاز ، كَازِيَاز

Caséase (F).

Casease (E).

خيرة تذيب الجبنين المختر .

٦٣٤٢ - جَبْنِين ، كَازِيِين ، دَوَغ

Caséine (F). Casein (E).

المادة الازوتية البيضاء اللون الموجودة في حليب الثدييات .

٦٣٤٣ - جَبْهَة

Front (F). Forehead (E).

هي الجزء الاعلى من الوجه . تمتد من حاجب العين الى حدود مستوى الشعر . وهي في الحشرات الجزء الامامي من البطن .

٦٣٤٤ - جَبْهَة

Algaiba, Aigleba


الجهة منزل من منازل القمر الشامية ، ويقال لها جهة الاسد ايضاً . وهي اربعة النجم . ينزلها القمر في الليلة العاشرة . رقيب الجهة يدعى سعد السمود .

٦٣٤٥ - جَبُونَنْدِي بِيلُوكَرْبِين

Pilocarpus (S). Pilocarpe, Jaborandi, Jagua-

randy (F). Jaborandy (E).

جنس نباتات جنبية ، طبية من فصيلة السذابيات . انواعه المعروفة ستة مهددا البرازيل . جميعها جنبات كبيرة . اوراقها متباينة الاشكال والارتكاز . منها البسيطة المتعاقبة والمتقابلة ومنها المركبة الورقية . نصالها اهليلجية ، جامدة الوثل ، كثيرة الاعصاب تتخللها نكت زيتية اللون او حنطية تم عن وجود جيوب الافرازات الوثلية . ازهارها خاسية البتلات والمآبر . ازهارها لا تياسى التجميع . منه المتقودي والمشكولي والسنبلي . منافعها الطبية عديدة ، فهي معرقة ومرضاية وبلسمية وتدر البول وتفيد الظهارة الكلوية . ويستخرج منها مادة عطرية واخرى قلووية تدعى بيلوكربين (Pilocarpine) تستعمل خاصة في علاج العين . اما انواعه الستة فهي النابمة :



جيلة



جبورندي مخزني



جبون رشيق



جِبُون رَمَادِي



جِبُون سِينْدَكْتِيل



جِبُون لَار



جِيَّة



جَشُون



جَشِيث

٦٣٦٤ - جُثَّ - Péricarpe (F). Pericarp (E).

الجُثَّ هو غلاف الثمرة.

٦٣٦٥ - جُثَّ - Dessouchement (F). Stumping (E).

راجع استئصال .

٦٣٦٦ - جُثَّالَة - Feuilles mortes (F). Dead leaves (E).

ما تنثر من اوراق الشجر .

٦٣٦٧ - جُثَّجَات -

الجُثَّجَات ثبت من احرار الشجر وهو اخضر ينبت بالقيظ له زهرة صفراء كأنها عرصة طيبة الريح تأكله الابل . واحدته جُثَّجَانَة (ابن البيطار) .

٦٣٦٨ - جُثَّالَة - Arbre touffu (F). Tufted tree (E).

الجُثَّالَة : الشجرة الكثيرة الورق الضخمة (القاموس) .

٦٣٦٩ - جُثَّالَة - Fourmi moissonneuse (F).

هي النملة الحصادة ، اطنبها .

٦٣٧٠ - جُثَّام -

الجُثَّام من الزرع : الذي ارتفع عن الارض واستقل نباته .

٦٣٧١ - جُثَّامَة - Remblai (F).

Embanking, Filling up (E).

الجُثَّامَة ومنهم من قال الردمية هي التراب اللازم لردم حفرة او لتسوية ارض .

٦٣٧٢ - جُثَّوَة * - Glomérule (F). Glomerule (E).

ازهار لبد التجميع قصير المحور كما في الكشوث .

٦٣٧٣ - جُثَّوَة - Tas de terre (F). Heap of shore (E).

هي الكومة من التراب .

٦٣٧٤ - جُثَّيْث * - Rejet de dattier (F).

Sprout of date tree (E).

الجُثَّيْث هو فصيل النخل وما غرس من فراخه لا من النوى الواحدة جُثَّيْثَة (اقرب الموارد) .

٦٣٧٥ - جُثَّيْثَات الذَّكَب ، دَرْيُورِيَّات هـ

Dasyuridae (S). Dasyuridés (F). Dasyuridae (E).

فصيلة حيوانات لبولة من رتبة الجرايات . انواعها المعروفة عشرة تنتمي الى جنسين . اعطائها المناطق البرية من استرالية وزيلندا الجديدة وغنية الجديدة وجاوا .

٦٣٧٦ - جُجَّ - Melon cantaloup (F). Cantaloup (E).

الجُجَّ هو الشمام المستدير المشنج الصغير القد . واحدته جُجَّة . اطلب شمام .

٦٣٧٧ - جُجَّاف - Courant d'eau violent

جدول دفاق المياه السريعة التي تجرف كل شيء وتذهب به .

٦٣٧٨ - جُجَّال - Poison végétal (F).

Vegetable poison (E).

كل سم نباتي مرجعه المواد القلوية الموجودة في العصارة النباتية او في النسيج الخلوي .

٦٣٧٩ - جُجَّالِي - Vénéneux (F). Poisonous (E).

ما كان سمه نباتياً .

٦٣٨٠ - جُجَّجَح -

الجُجَّجَح : بقلة تثبت نبتة الجزر . ويقال لها الخنزاب .

٦٣٥٤ - جِبُون رَمَادِي * ، يُوُو

Hylobates leuciscus (S). Gibbon cendré, G. oa, Wouwou (F). Silvery gibbon (E).

نوع من الجبون متوسط القامة، ثوبه الى الاربدة . صدره اكهب عابق . مختار وجهه اشيب || موطنه جزر الزابج والسولو . يعيش جماعات تعد من ٦٠ الى ١٠٠ . قوته الثار والبراعم والنوامي .

٦٣٥٥ - جِبُون سِينْدَكْتِيل * ، جِبُون سِيَامَان ،

سِيَامَان Hylobates syndactylus (S).

Gibbon siamang, Siamang (F). Siamang (E).

من اكبر انواع الجبون . قامته نحو ٩٠ سم . جسمه كثيف الشعر الاسود . ذقنه اغبر الشعر . موطنه ملقه وجزر الزابج . يعتبر من الانواع القليلة النهم . قوته الثار . يتسلق الاشجار بخفة . يعيش جماعات قليلة العدد .

٦٣٥٦ - جِبُون لَار * ، لَار Hylobates lar (S).

Gibbon lar, Lar, Gibbon à mains blanches (F).

نوع من الجبون رشيق القوام قامته نحو ٧٥ سم . ثوبه الى السواد العاتم . وجهه مطوق بمختار من الشعر الابيض . يذاه ورجلاه بيض || موطنه احراج شبه جزيرة ملقه . يعيش جماعات صغيرة متوسط عددها يراوح من ١٢ الى ٢٠ .

٦٣٥٧ - جِبُون هُولُوكْ Hylobates hoolock (S).

Gibbon hoolock (F).

نوع من الجبون قامته نحو ٨٠ سم . ثوبه الى الثمرة السوداء . حاجبا عينيه ومختار وجهه بيض . موطنه بلاد الاصنام من اعمال البنغال . يألف الغابات . جماعته تعد من ٢٠ الى ٤٠ . يعيش على الاشجار . قوته الثار والبراعم والنوامي وبعض الحشرات والعناكب وبيض العصافير || يعتبر من افهم قروود هذا الجنس .

٦٣٥٨ - جِبِيَّة هـ * - Gebia (S).

Gébie (F). Gebia (E).

جنس دوبيات بحرية من القشريات عشاريات الارجل طويلات الذيل وقصيلة الطلاسميات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم اخصها المعتدلة الحارة || اجسامها مستطيلة الشكل . بطونها حديدية التركيب . قوائمها الامامية كبيرة شديدة النشاط || تعيش منفردة في الاسماك والرمال المغشورة بانتظار ما تستطيع قتله .

٦٣٥٩ - جَبِيْس - Ourson (F). Bear's cub (E).

صغير الدب وهو الديسم .

٦٣٦٠ - جَبِيْسُوم حَاطِي الشَّكَل

Gibbium psylloïde (F).

هو المبون الاحدب ، اطلبه .

٦٣٦١ - جَتَّر - Tonnelle (F). Arbour, Bower (E).

خيمة لاقياسية الشكل والحجم تكثر فيها الاستطالة تملوها النباتات العارضة .

٦٣٦٢ - جَتَّرُفَة - Médecinier cathartique (F).

Jatropha (E).

اطلب دند الملوك .

٦٣٦٣ - جَتَّ - Cire (F). Bees wax (E).

هو الشمع السلي . مادة لينة لدنة صفراء اللون يصطنها النحل لبنان نحاريه .



جُخْب



جُخْلَم



جُخْم



جُخْبَار



جُخَادِب



جُخَادِب



جُخْدُب المَصَارِي

٦٣٩٢ - جُخْم *
Ossifraga (S). Ossifrage,

Briseur d'os, Mallamoque (F). Ossifraga (E).

طائر وحيد الجنس والنوع من كفتيات القدم وفصيلة جلميات الماء. أعطانه تشمل القطب الجنوبي وبعض المناطق الأفريقية والأمريكية. يتميز بمنقاده الكبير الضليع المصفتح الملاقط. جسمه كبير القد يطول نحو ١٠٠ سم. ذنبه جدعة ذلقة. ثوبه كستني اللون تعلوه نمشة غبراء. قوته الاسماك والطير وبقايا الحيوان.

٦٣٩٤ - جُخْمَة
Cell (F). Eye (E).

الجمجمة العين وجحمتا الانسان والحيوان : عيناء .

٦٣٩٥ - جُخْمَرَش
Lapine (F). Brood-rabbit (E).

الجحمرش : الارنب المرضع ج. جحمر (الجاحظ).

٦٣٩٦ - جُخْمِي *
Oculiforme (F).

Oculiform (E).

نعت تعريفي يطلق في علم التاريخ الطبيعي على كل ما كان شكله كالمين .

٦٣٩٧ - جُخْن *
Carence (F). Hunger signs (E).

هو المظهر الخارجي الذي يعبر عن العوز الملح الى بعض العناصر الغذائية .

٦٣٩٨ - جُخْنَبَار *
Nicandra (S).

Nicandre (F). Nicandra (E).

عشبة حولية زعفرية الرائحة من فصيلة الباذنجانيات . ساقها فرعاء تعلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. أوراقها متعاقبة ، معنقة ، قلبية الشكل . نصلها بحرية الخضار . ازهارها زرقاء اللون ، صغيرة القد ، فردية او ثلاثية التجميع ، محورية الارتكاز . ثمارها زيتونية الشكل والقد ، لونها الى الزرقة العابقة || تنويرها يستمر من حزيران الى تشرين الاول .

٦٣٩٩ - جُخَادِب *
Saga pedo, S. serrata (S).

Magicienne dentelée (F).

نوع من الجنادب المفترسة من فصيلة القبوطيات . ذكوره مجهولة . انثاه كبيرة الجثة طولها من ٦٢ الى ٧٨ مم. فخذها الخلفي نحو ٤٥ مم. ومرزها ٤٠ مم. ثوبها الى الخضار الباهت يقطبها من كلتي جانبيها ، من العين الى المرز ، خط ابيض وردي . أفضاها وسيقانها وارساغها مذكارية شائكة . تكثر في الصيف والخريف . تسرح على الارض بين الاعشاب والادغال . قوتها الحشرات الصغيرة .

٦٤٠٠ - جُخْدُب *

Phasgonura viridissima, Tettigonia viridissima (S). Grande sauterelle verte (F). Green Grasshopper, Meadow grasshopper (E). Heupferd, Grünes Heupferd (D).

نوع من الجنادب من فصيلة القبوطيات . كبير الجثة ثخينها . اخضر اللون . طوله يراوح من ٢٨ الى ٤٦ مم. أفضاها الخلفية نحو ٢٨ مم. وأغماره من ٣٥ الى ٦٠ مم. الانثى اكبر جثة من الذكر . مرزها نحو ٣٠ مم. كوسلها أملس . حذافرها شائك . سرك الذكر مستطيل || يكثر وجوده في الصيف والخريف . يألف الاراضي المزروعة والادغال والاشجار .

٦٤٠١ - جُخْدُب المَصَارِي *

Tachycines asynamorus (S). Sauterelle de serres (F).

جندب من القبوطيات طوله يراوح من ١٣ الى ١٦ مم.

٦٣٨١ - جُخْر
Terrier (F). Burrow, Hole (E).

الجحر هو مكن السباع او كل مكان تحتفره الوحوش لأيلولتها واختبائها .

٦٣٨٢ - جُخْش
Anon (F). Ass's foal, Young ass (E).

هو ولد الاثان لا يزال يتبع امه .

٦٣٨٣ - جُخْف
Charrier (F). To drift, To scud (E).

جحف الريح الغيم : سار به . وجحف الماء الشيء : ذهب به .

٦٣٨٤ - جُخْف
Dragage, Dragage (F).

هو جرف الرمل .

٦٣٨٥ - جُخْف ، ذُكْد
Pacage (F).

Pasture-land (E). كل مرعى قليل الكلاء رديته .

٦٣٨٦ - جُخْفَة
Heron pourpre (F).

Purple heron (E). راجع بلشون ارجواني .

٦٣٨٧ - جُخْفَلَة
Babine (F). Pendulous lip (E).

شفة كل ذي حافر .

٦٣٨٨ - جُخْفَلَة الفَرَس

جحفلة الفرس نجم من كوكبة قطعة الفرس اي الفرس الصغير .

٦٣٨٩ - جُخْل
Abeille femelle (F).

Queen bee (E).

الجحل ويدعى الملكة . هي النحلة الانثى الكاملة الشوار الشقي . اطلب ملكة .

٦٣٩٠ - جُخْلَب *

Rougetius roujeti (S).

Rougetius du Choa (F).

طائر من طوال الساق وفصيلة التفلقيات . اعطانه بلاد الحبشة || جسمه متوسط القد . منقاده مخززي الشكل . ذنبه جدعة . جناحاه لاحقان . ثوبه العلوي الى السمرة السوداء . ثوبه السفلي الى الصهباء . بطنه منمش بالاسود . محسراه رماديا اللون . عيناه مكحلتان بالاصفر || يألف البراري ويجاري الماء . قوته الحشرات والحوام وبعض الاعشاب والبرور البرية .

٦٣٩١ - جُخْلَم *

Blaberopus (S).

Blabérope (F).

جنبة معمرة ابيدة من فصيلة الدفليات . موطنها بعض المناطق الحارة من البلاد الاسيوية . عصارة سوقها حلوبية المادة جحالية ، مميته . تستعمل في القضاء على الحيوانات المفترسة || ساقها كثيرة الاشطاء والفروع تعلو نحو ثلاثة امتار . أوراقها عروية ، معنقة ، متعاقبة ، ثلاثية التجميع . نصلها سناني الشكل ، قصير المنق ، ذرب الطرف ، جامد البزل . ازهارها ضمي التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهارها نجيلة ، خماسية البتلات ، صفراء اللون . ثمارها سنفية مستطيلة . بزورها بيضوية الشكل ، مبططة ، شديدة السمرة ، صغيرة الحجم .

٦٣٩٢ - جُخْلِيَّات

Méganisoptères (F).

Meganisoptera (E). رتبة حشرات من طبقة الرعيسيات .



جداء

٦٤١٣ - جُدْأَمَة ، جُدْأَمَة (F). Glume supérieure (F).
Upper glume (E).
الجدامة هي قشرة الحبة العليا اما قشرتها السفلى فيقال لها القصرة والجشرة .

٦٤١٤ - جُدْأَمَة (F). Gazelle (jeune) (F).
Gazelle (Young) (E).

هي الغزالة قبل استكمالها الحول وهي من الطيأ بمنزلة المناق من المعز .

٦٤١٥ - جُدْأَمَة ، جُدْأَمَة ، مُجْدَب

٦٤١٦ - جُدْأَمَة (F). Sterile, Barren (E).
Stérile (terre) (F).
هي التربة الماحلة العديمة الخير .

٦٤١٦ - جُدْأَمَة (F). Stripe, Stroke (E).
Rale (F).
الجددة هي الخط في الثوب مهما عرض واستطال ج. جدد .

٦٤١٧ - جُدْأَمَة ، صِرَّار الليل (S). Gryllus (S).
Grillon (F). Cricket (E).

جنس حشرات من فصيلة الجُدْجُدِيَّات . أنواعه عديدة منتشرة في جميع أقطار العالم . تتميز بفلاظة رؤوسها واستطالة قرونها الاستشعارية المستدقة . ذكورها مجهزة بعدة صرارية نشيطة تستعملها في الليل والنهار || وهو من الحشرات المبشرة التي تعيش على المواد العضوية والنباتية . أشهر أنواعه ما يلي .

٦٤١٨ - جُدْأَمَة ، صِرَّار الغَيْط

Liogryllus bimaculatus (S). Grillon bimaculé (F). Bimaculated cricket (E).

نوع من الجُدْجُد كبير الجثة المخروطية الشكل . طوله يراوح من ٣ الى ٤ سم . أنثاه اكبر قدماً من ذكوره وقد يبلغ طول اشرة الانثى نحو ١٥ مم . ثوبه الى السواد اللامع الاسفع المواج يعلوه عند قواعد انتشار ظهرانه بقع صفراء حنطية ضيقة في الذكور ، فسيحة في الاناث .

٦٤١٩ - جُدْأَمَة ، صِرَّار أهلي (S). Gryllus domesticus (S).
Grillon domestique (F). House-cricket (E).
Hausgrille (D).

نوع من الجُدْجُد مخروطي الشكل اصعب اللون طوله يراوح من ١٥ الى ٢٠ مم . يعيش في المنازل المأهولة ويكثر في المطاحن حيث لا يخشى الجوع .

٦٤٢٠ - جُدْأَمَة ، صِرَّار حَقْلِي

Gryllus campestris (S). Grillon champêtre (F). Sylvan-cricket, European field cricket (E). Feldgrille (D).

نوع من الجُدْجُد غليظ الجثة طوله يراوح من ٢٠ الى ٣٠ مم . ثوبه الى السواد اللامع . يعيش في جميع الاماكن اغصها البساتين والارربة المزروعة . وهو من الدويبات النافعة لانه يلتهم النمل واكثر الحشرات الضارة الصغيرة القد .

٦٤٢١ - جُدْجُدِيَّات (F). Gryllidae (E).
Gryllidae (S).

فصيلة حشرات من رتبة مستقيمات الاجنحة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد أشهرها الجُدْجُد والحالوش . من ميزاتهما الخاصة ان قرونها الاستشعارية طويلة دقيقة . أرجلها الخلفية معدة للقفز . ارساغها مركبة من ثلاث عقل . ذكورها عديمة الملامس الكونية . أنثاها مبرجة

ثوبه الى الريدة يعلوه تسنيج اسمر . زبانه مستطيلة دقيقة . جسمه ربع الشكل . اجنحته اثرية . سرکه مالس وجليظ . يكثر وجوده في المواقع الدافئة اغصها المصاري حيث يقضم جميع انواع الاوراق والازهار || يكافح بالروتينون وسائر الحواشير الفتاكة .

٦٤١٢ - جُدْأَمَة (F). Produit de la multiplication (F).
Product of multiplication (E).

الجداء هو الحاصل من ضرب عدد في عدد كالاربعة الحاصلة من ضرب اثنين في اثنين .

٦٤١٣ - جُدْأَمَة

الجداء التي لا لبن لها من كل حلوية لآفة ايست ضرعها . والجداء من الغنم والابل : المقطوعة الاذن .

٦٤١٤ - جُدْأَمَة (F). Caranx djeddaba

نوع من الشيم وهي سمكة مأكولة تكثر في بحر القلزم .

٦٤١٥ - جُدْأَمَة ، جُدْأَمَة (F). Caranx djeddaba

٦٤١٦ - جُدْأَمَة (F). Marchand de vin (F).

الجداد هو بالغ الخمر ومعالجها . Dealer of wine (E).

٦٤١٧ - جُدْأَمَة (F). Pterois (F).

سمكة بحرية من الجلائخ . طولها نحو ٣٠ سم . رأسها غريب الشكل المستهجن . زعانفها كبيرة شائكة . ثوبها الى الحمرة يعلوه تجزيع معترض متباين اللون يكثر فيه الابيض والاسمر . اعطائها بحار البلاد الحارة والمحتلة .

٦٤١٨ - جُدْأَمَة ، جُدْأَمَة (F). Parol (F).

هو الغلاف المنظور من حافر القرس . Coat, Wall (E).

٦٤١٩ - جُدْأَمَة ، جُدْأَمَة (F). Parietal (E).

نعت تعريفي يطلق على الاجزاء الجسورية الدعامية .

٦٤٢٠ - جُدْأَمَة ، دُجْأَمَة (F). Juidas, Lamprotornis (S).

٦٤٢١ - جُدْأَمَة ، جُدْأَمَة (F). Juida, Merle métallique (F). Juidas (E).

جنس طير من الجواثم سيات المناقير وفصيلة الزرزوريات . انواعه المعروفة نحو ٦٠ منتشرة في معظم الاصقاع الافريقية . جميعها متوسطة القد ، قريبة الشبه من الزراذير . اثنوب معظم انواعه الى السواد الفحامي يعلوه مواج اسفع او ذهبي او زهرجدي او فضي .

٦٤٢٢ - جُدْأَمَة (S). Dolichoderus (S).

Dolichodère (F). Dolichoderus (E).

الواحدة جدالة . جنس حشرات من غشائيات الاجنحة المنصورة وفصيلة النمليات . انواعها المعروفة عديدة معظمها من عظم امريكا الجنوبية والبعض الآخر منتشر في البلاد الحارة الاسيوية والافريقية || اجسامها صغيرة تطول من ٣ الى ٤ مم . رؤوسها شبه اسطوانية الشكل . بطونها كبيرة مجهزة في اطرافها بمناحس حادة تهريق منها مادة سامة تفرزها غدة شرجية مركزها فوق المنخس || اثنوبها تراوح من الحمرة الجوزية الى السواد الفحامي ، ومنها انواع سود الرؤوس حر البطون او المعكس .

٦٤٢٣ - جُدْأَمَة (F). Juida, Merle métallique (F). Juidas (E).




جداس



جدال



جدجد البر



جدجد أهلي



جدجد حقلي

السلكوتيات . انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها افريقية . تعيش في الادغال قوتها ما تفتقره من دويبات وحشرات صغيرة وديدان || اجسامها تطول من ١٠ الى ١٣ مم . رؤوسها مستعرضة . تأشيرها ضليعة . قرونها الاستشعارية غيطة . عيونها مكورة ناشزة . كواسلها مستعرضة مصفحة . اثوابها تراوح من السمرة القائمة الى السواد الفحمي || مسرحها دهوي ، تبيت في النهار تحت الجشالة وفي كل مكان مظلم .

٦٤٣١ - جُدَرِيّ البَقَر Vaccine, Variole (F).
Vaccinia, Cowpox (E).
مرض كثير العدوى قليل الاذى يصيب البقر . مظهره الخارجي بثور قرجية تعلو الجلد في اماكن معينة من الجسم كالضرع والمشفرة والفم .

٦٤٣٢ - جُدَرِيّ الخَيْل Vaccine (F).
Vaccinia, Horse-pox (E).
مرض كثير العدوى قليل الاذى يصيب الخيل وينتقل الى الانسان . مظهره الخارجي بثور رافعة لؤلؤية تعلو الجلد في اماكن معينة اخصها المناطق السرمية والزوية والجحفية والبصرية . يكافح بالتلقيح .

٦٤٣٣ - جُدَرِيّ الضَّأْن ، نَبْخ ، قَعَاص Clavelée, Clavelade, Claveau, Picotte, Rougeole, Variole ovine (F). Sheep-pox (E).
مرض معد يصيب الغنم دون الماعز .

٦٤٣٤ - جُدَرِيّ الطَّيْر ، دِيفْتَرِيَا الطَّيْر Epithelloma contagium, Variola avium (S). Diphthérie variolique, Variole des volailles, Epithéliome contagieux, (F). Bird-pox, Chicken-pox. (E).
مرض معد ونخيم العواقب يصيب الدجاج وبعض الطيور الداجنة الاخرى كالخيش وغيره .

٦٤٣٥ - جُدَش Terre inculte (F).
الجدش كلي ارض غليظة غير مستصلحة .

٦٤٣٦ - جُدَعَة Moignon (F). Stump (E).
ما يبقى من العضو او الجزء المقطوع .

٦٤٣٧ - جُدَف الجدف نبات بالين ينفي آكله عن شرب الماء .

٦٤٣٨ - جُدَل Faucon sacre (F). Saker falcon (E).
هو الصقر اطلبه . والجدل هو حب الخنطة النضيج .

٦٤٣٩ - جُدَلَة Pilon du mortier (F).
الجدلة : مدقة الهاون اي المهراس . Pestle of mortar (E).

٦٤٤٠ - جُدَم الجدم : طير كالعصافير حمر المناقير (الجاحظ) .

٦٤٤١ - جُدَمَة هي الجدامة قشرة الحبة العليا .

٦٤٤٢ - جَدَوَار أسود Zédoaire noir (F).
Black zedoary (E).
هو الكركم الاسود نبات طبي زراعي اطلبه .

٦٤٤٣ - جَدَوَار أندلسي Anthore (F).
Wholesome aconite (E).
راجع أكونيت اسود .

اللامس الشرجية مرزاتها ثنائية التركيب اسطوانية الشكل مدببة الحمة . وهي تعيش في انفاق مستطيلة قليلة التعاريج والعمق تحفرها في التربة الحلوة والاماكن الرقيقة التي لا تخشى غمر الماء .

٦٤٢٢ - جَدَد Agalaxie (F). Agalactia, Agalaxy (E).
هو انقطاع الدُر عند اناث الدواجن .

٦٤٢٣ - جَدَد مُعَد ، جُدَاد Agalaxie contagieuse (F). Contagious agalaxy (E).
مرض معد يصيب البقر والنعاج والماعز في ضرورها فيسبب رفع الحليب .

٦٤٢٤ - جُدَر جذر العنب : صار حبه فوريق النفص . وجذر الزرع : كثرت اشطاؤه . وجذر الشجر : طلعت رؤوسه في اول الربيع . ويقال أجدر الشجر فهو جذر حتى يطول فاذا طال تفرقت اشطاؤه .

٦٤٢٥ - جُدَر ، جِيدَر نبات رملي واحدته جدرة قال ابو حنيفة وابن البيطار : الجدر كالحلمة غير انه صغير يربل وهو من نبات الرمل ينبت مع المكر . ج جذور .

٦٤٢٦ - جُدَر Bilon (F). Ridge, Rafter (E).
هو ظهر التلم .

٦٤٢٧ - جُدَر ، سَدَّ المَكْسَر Diguette (F).
هو الحاجز الذي يمسك الماء عند السقاية . Dam (E).

٦٤٢٨ - جُدَرَة Grain de Pollen (F).
Pollen grain (E).

الجدرة هي حبة الطلع . وقد تختلف هذه الحبة شكلاً وحجماً ولوناً مع اختلاف نوع النبات . غير انه يغلب فيها الحجم الذري والشكل الكروي فالبيضي فالراقودي فالقضيبي فالانبوبي . اما اللون البائد فهو الاصفر مع مشتقاته ثم الاخضر الباهت والاحمر والاعبر والاسمر || والجدرة تتكون من سائل سيتوبلازمي يحوي جيلتين تمثلان خليتين ، الخلية التناسلية والخلية الزادية ، لا جدار بينهما مغلفتين معاً بغشاء داخلي يدعى « انتين » يطوقه غلاف خارجي يدعى « اكسين » . ولكل من الخليتين دور خاص . فالخلية التناسلية اي الذكرية تقوم بالاخصاب اما الخلية الزادية فهي التي تمد رفيقها بالغذاء . وهذا الغذاء يتكون من المواد التالية :

حامض تفاحي
فسفات الكلس والمغنيزا
هلام عضوي
مواد آحينية جافة
فيتامينات من مختلف الفئات .

اما اشهر النباتات التي يكثر فيها الطلع اي المكبر الذي يحنيه النحل فهي موضوع الجدول الاول . اما الجدول الثاني فانه يمثل شكل الجدرة وحجمها الميكروني كما تشاهد تحت عدسة المجهر . (صفحة ٣٥٨ و ٣٥٩) .

٦٤٢٩ - جُدَرَة أُم Grain mère de pollen (F).
Mother pollen grain (E).

٦٤٣٠ - جُدَرُوم * Geodromus (S).
Géodrome (F). Geodromus (E).
جنس حشرات مفترسة من غديات الاجنحة وفصيلة



جدروم

Centromère (F). ٦٤٥٨ - جذر بركة ٥

Centromere (E).

حبيبة شديدة الصغر توجد في النشب تساهم في تكوين الوشيمة عند الانقسام المجرى أو الخليوي .

Bergerie (F). Sheepfold (E). ٦٤٥٩ - جذر بركة

هي الثوية، أطلبها .

Multiple (F). Multiple (E). ٦٤٦٠ - جذر آء

هو حاصل العدد المضروب في ذاته .

Tronc volumineux (F). ٦٤٦١ - جذر آء

Voluminous trunk (E).

الجذارة هي جذع الشجرة العظيمة . ج جذاء .

Glanure (F). Gleanings (E). ٦٤٦٢ - جذر آءة

جذارة الزرع : ما بقي بعد الحصد .

Culmifère (F). ٦٤٦٣ - جذر آءي ٥

Culmiferous (E).

نعت تعريفي يطلق على كل نبات ساقه جوفاء كما في القمح والشعير والشيلم ...

٦٤٦٤ - جذر ب

Bourgeon terminal du dattier (F). Terminal bud of date tree (E).

الجذب والجذاب : الشحمة التي تكون في رأس النخلة يكشط عنها الليف فتؤكل || وجذب النخلة : قطع جذعها .

Racine carrée (F). ٦٤٦٥ - جذر ، جذر

Square root (E).

الجذر والجذر المربع هو العدد المضروب في نفسه . العشرة في حساب الضرب هي جذر مائة . جذر العدد : حاصل جذره .

Racine (F). ٦٤٦٦ - جذر ، جذر ، شرش

Root (E).

عضو رئيسي في النبات يمكنه من التغذية والصمود في التربة . والجذر يكون عادة في التربة وينمو باتجاه العمق من فوق الى تحت يتميز بشعيراته الماصة التي تمتص الماء والغذاء ويحفظه الطرفي الذي يشق له الطريق || والجذر لا ينمو من طرفه بل من منطقة نمو الواقعة بين الشعيرات الماصة والحوئل || والجذور قد تكون بالنسبة الى شكلها واتجاهها وموقعها وتدية وعرضية ومتشعبة وهوائية وتنفسية .

Racine adventive (F). ٦٤٦٧ - جذر عرضي *

Adventitious root (E).

هو كل جذر ينتش من الساق مباشرة .

٦٤٦٨ - جذر متشعب * ، جذر حزمي ،

Racine fasciculée (F).

Fasciculate root (E).

يدعى الجذر متشعباً او حزمياً عندما يكون نموه يضاهي نمو الجذر الاصيل كما في الخنطة والبصل .

Zédoaira (F). Zedoary (E). ٦٤٤٤ - جذر آء عقيد

هو الكركم الزدوار نبات عشقولي زراعي .

Troupeau (F). ٦٤٤٥ - جذر آءة

Flock, Herd, Drove (E).

الجدوة هو السرب وهو ايضاً القطيع ج . جدد .

٦٤٤٦ - جذر آءة

النعجة التي قل لبنها من غير بأس ويقال للعز مصور .

Affluent ٦٤٤٧ - جذر آءة

Cote (F).

Price-list, Share-list (E).

٦٤٤٨ - جذر آء الاسعار

Ordre du jour (F). ٦٤٤٩ - جذر آء الأعمال

Order of the day (E).

هو جدول المواضيع المطلوب بحثها في الاجتماع .

٦٤٥٠ - جذر آءة ترقيم ، طمئل ٥

Table de pointage (F). Table of pointing (E).

جدول قياسي تحدد فيه قيمة الجزء من الشيء بالنسبة الى كامله .

Cabri, Chevreau (F). Kid (E). ٦٤٥١ - جذر آءي

هو الذكر من اولاد المزمز . الجمع جذاء وجديان وأجد .

Algedi ٦٤٥٢ - جذر آءي ، جذر آءي الفرقند

الجدي نجم الى جنب القطب يدور مع بنات نعش تعرف به القبلة .

Littorina (S). ٦٤٥٣ - جذر آءة ٥

Littorine (F). Littorina (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الجديحيات . انواعها المتعاصرة المعروفة نحو ١٣٠ منتشرة في معظم بحار العالم . تعيش على الشواطئ الرملية المغشورة . اكثر انواعها كبير القدر مأكول ، مرغوب فيه || اصداؤها سمكة ، شبه مخروطية الشكل ، محلزة الاعقاب ، جانبية الفوهات اللاقياسية الاستدارة . اعرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية :

Littorina littoralis (S). ٦٤٥٤ - جذر آءة الشواطئ

Littorine de rivage, Vignot, Bigorneau (F).

Littorina scabritia (S). ٦٤٥٥ - جذر آءة خشنة

Littorine scabre (F).

Littorina rudis (S). ٦٤٥٦ - جذر آءة غليظة

Littorine rude (F).

Littorinidae (S). ٦٤٥٧ - جذر آءة

Littorinidés (F). Littorinidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل اماميات الخياشيم المشطية . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم . تعيش على الشواطئ الرملية والخصية المغشورة || اصداؤها متسامكة بيضية الشكل او مخروطية ، بعضها جميل الالوان المتناسقة || اعرف اجناسها واشهرها الجديحة .



جذيرة




جذر عرضي




جذر متشعب

النبات	La Plante	خزام	Réséda	عصل	Rhododendron
أثرارة	Épine-vinette	خزامي	Lavande	عوسج	Ronce
أجاص	Poirier	خلاف	Eleagne	غاليون	Gaillet
أخيون	Vipérine	خلنج	Bruyère	فاشرتين	Tamier
أذريون الماء	Populage des marais	خوخ	Prunier	فربيون	Euphorbe
أربس	Arabette	دراق	Pêcher	قصة	Luzerne
أرقطيون	Bardane	دردار	Orme	فول	Fève
آس ، حبلاس	Myrte	ذيل الثعلب	Alopécure des champs	فيرونكا	Véronique
إشقييل	Scille	ريحان بري	Calament acinos	قبرية	Corydalle
أضاليا	Dahlia	زعرور	Aubépine	قت	Minette
أكيدنيا	Néflier du Japon	زعفران	Crocus; Safran	قوعيات	Cucurbitacées
الأمية	Passiflore	زمرديق	Gaïnier	قصاب	Pervenche
أوكالبتوس	Eucalyptus	زنبق	Lis	قندلي	Marronnier
ايريترون	Erythrone	زهرة الثلج	Perce-neige	قطريون	Centauree
بنولا	Bouleau	زهرة الربيع	Primevère	قوقحان	Matricaire
يرقوق	Prunier épineux	زهرة اللبن	Galanthe	قويسة	Sauge
يقس	Buis	زيزفون	Tilleul	قيقب	Érable
بليس ، عنصيف	Pâquerette	سرفل	Cerfeuil	كرز	Cerisier
بندق	Noisetier	سرفل بري	Chérôphylle	كستنة	Châtaigner
بنفسج	Violette	سطاقس	Épiaire	كشمش	Groseillier
بوصير	Molène	سعادى	Laiche	كفنة مذادة	Lierre terrestre
بيقية	Vesce	سكع	Cyclamen	كنسوده	Consoude
بيلسان ، خمان	Sureau	سلجم	Colza	لاميون	Ortie fétide
تيغ	Tabac	سقفورين	Symphorine	لبلاب	Liseron
ترمس	Lupin	سنديان	Chêne	لئين ، شبرق	Bugrane
تفاح	Pommier	سسط	Acacia	لخنيس	Lychnis
تفاف	Laiteron	سورنجان	Colchique	لزان	Cytise
توليب	Tulipe	سيسارون	Chervis; Panais	لزولة	Luzule
تين	Figuier	شرم	Charme	لسان الحمل	Plantain
ثوم	Ail	شرونة	Seneçon	ليلك	Lilas
جلبان	Gesse	شقار	Anémone	ليمون	Citrus
جوز	Noyer	شقيق	Coquelicot	مازريون	Daphné
جويسة	Asperule	شمار	Fenouille	مران	Frêne
حرف الماء	Cardamine des prés	شمرة مرة	Tabouret	مشمش	Abricotier
حسيكة	Bident	شيلك	Fraisier	ملفوف	Chou
حشيشة الحفر	Barbarée	صعتر	Thym	نبق	Nerprun
حشيشة الخطاف	Chélidoine	صفصاف	Saule	نرجس	Narcisse
حشيشة السعال ، فرفارة	Tussilage	صناب	Cardamine	نسرين	Églantier
حشيشة الفراز ، لبن	Mouron des oiseaux	صنوبر	Pin	نفسم	Sarrasin
حندقوق	Mélilot	طقسوس	If	نفل	Trêfle
حودان	Renoncule	عدس	Lentille	هندب بري	Pissenlit
خبازي	Mauve	عون	Sainfoin	هندباء	Chicorée
خبيزة	Guinauve	عشبة البواسير العقدا	Scrofulaire	هليون	Asperge
خربق	Rose de Noël	عشقة	Lierre grimpante	ورد	Rosier
خردل بري ، لبان	Moutarde des champs	عصاف	Passerage	وزال	Ajonc


الجدول الثاني - شكل جذرة الطلع
وحجمها الميكروني




(٢٥) خبازي. (٢٦) خبيزة. (٢٧) خريق. (٢٨) خراسي. (٢٩) خلتج.
(٣٠) خوخ. (٣١) ذراق. (٣٢) دردار. (٣٣) ذيل الثعلب. (٣٤) زعرور.
(٣٥) زعفران. (٣٦) زمزريق. (٣٧) زنبق. (٣٨) زهرة الربيع. (٣٩) زهرة
اللين. (٤٠) زيزفون. (٤١) سطاقرس. (٤٢) سكج. (٤٣) سلجم.
(٤٤) سديان. (٤٥) سسط. (٤٦) شرم. (٤٧) شقار. (٤٨) شقيق.



(١) اثرارة. (٢) اجاص. (٣) اريس. (٤) اشقيل. (٥) اضاليا. (٦) الآبة.
(٧) اوكاليتوس. (٨) ايريترون. (٩) بنولا. (١٠) بقس. (١١) بندق.
(١٢) بلسج. (١٣) بيقية. (١٤) تبج. (١٥) نقاج. (١٦) توليب.
(١٧) تين. (١٨) نوم. (١٩) جوسة. (٢٠) حرف الماء. (٢١) حشيشة
السعال. (٢٢) حشيشة القزاز. (٢٣) حوذان. (٢٤) حور.



(٧٣) كرز. (٧٤) كشمش. (٧٥) كنسودة. (٧٦) لاميون. (٧٧) ليلاب.
(٧٨) لبنين. (٧٩) لزان. (٨٠) لزولة. (٨١) يون. (٨٢) مازريون.
(٨٣) حطب. (٨٤) شمش. (٨٥) ملحي. (٨٦) ملفوف. (٨٧) مشور.
(٨٨) نبق. (٨٩) لرجس. (٩٠) لسرين. (٩١) لقسم. (٩٢) نقل.
(٩٣) هليون. (٩٤) فيفجان. (٩٥) ورد. (٩٦) رزال.



(٩٧) شيار. (٩٨) شبلق. (٩٩) صبقر. (١٠٠) صمغاف. (١٠١) صاب.
(١٠٢) صنوبر. (١٠٣) طقسوس. (١٠٤) عرن. (١٠٥) عشبة البواسير.
(١٠٦) حصن. (١٠٧) حوسج. (١٠٨) غاليون. (١٠٩) فاشرشين. (١١٠) فرامبواز.
(١١١) فريون. (١١٢) فول. (١١٣) قنيرة. (١١٤) قن. (١١٥) قريعات.
(١١٦) قطرم. (١١٧) قنللي. (١١٨) قوقحان. (١١٩) قوسة. (١٢٠) قيقب.

٦٤٨٣ - جذمة
بلحات يخرجن في قع واحد . مجموعها يقال له جذمة .
Rhizome
٦٤٨٤ - جذمور* ، ريزوم
هو الساق النباتية الأرضية الشبيهة بالجذر العرضي .

٦٤٨٥ - جذموريات الرؤوس
Rhizocéphales (F). Rhizocephales (E).
رتبة من القشريات الدنيا . فصائلها وأجناسها قليلة العدد .
جميع أنواعها طفيلية . بعضها كالمعلقين والبيغور يتطفل
على القشريات اغصها عشاريات الارجل || اجسامها
جرابية الشكل . دعابصها فقط تتصف بصفات القشريات .

٦٤٨٦ - جذور طفيلية
Racines endophytes (F). Endophytes roots (E).
هي جذور النباتات الطفيلية التي تنمو وتتغذى من النباتات
التي تعيش عليها .

٦٤٨٧ - جذير* ، شريش
Radicelle (F). Radicle (E).
هو من الجذور ما يتفرع عن الاصيل والعرضي والوتدي
الخ ... وهو الذي يحمل الشمر الماصة والحرفل .

٦٤٨٨ - جذيم
Rhizophère (F). Rhizopter (E).
الجذيم الطبقة من التربة التي تكثر فيها جذور النبات .

٦٤٨٩ - جذيمة*
Troncatella (S). Troncatelle (F). Troncatella (E).
جنس حيوانات برية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة
الجذيمات . انواعها المماصرة المعروفة عديدة منتشرة في
معظم اقطار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . تعيش بين
الاعشاب وتحت الجثالة في المواقع الرطبة || اصداقها رقيقة ،
شفافة ، ملونة ، اسطوانية الشكل ، مستطيلة ، مقطومة
الاعقاب ، نحاسية اللون الحلزونية ، غائرة الخط اللولبي .

٦٤٩٠ - جذيميات
Troncatellidae (S). Troncatellidés (F). Troncatellidae (E).
فصيلة من الرخويات معديات الارجل اماميات الحياشيم .
اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد
الحارة والمعتدلة الحرارة || اصداقها رقيقة ، ملونة ، متباينة
الاشكال ، يكثر فيها الاسطواني . جميعها نحاسية اللون
الحلزونية . اجسامها صغيرة . انواعها مجهزة باخطام غليظة
مستطيلة || اعرف اجناسها واشهرها الجذيمة والفصيمة .

٦٤٩١ - جذينة*
Amphiprionus (S). Amphiprion (F). Amphiprionus (E).
جنس اسماك بحرية بيوض من شالكات الزعانف وفصيلة
الفرخيات . انواعها المعروفة كثيرة العدد تألف بحار
المناطق الحارة اغصها المحيط الهندي والبحر الاخر ||
اجسامها صغيرة ، شبه بيضية الشكل ، مبطلة الجرم ،
تطول من ١٢ الى ٢٠ سم . اثوبها بحيلة الالوان الزاهية
الزاهية اغصها الاحمر والازرق والصنابي والاكهيب ،
جميعها مجذعة بخط معترض اسود || لحومها متوسطة الصنف ،
ماكولة .

٦٤٦٩ - جذر هوائي*
Racine aérienne (F). Aerial root (E).
هو جذر عرضي كما في الاثاب يخرج من الساق الهوائية
ومن فروعها ويتدل في الفضاء حتى التربة حيث ينشعب
فيها جذيراته .

٦٤٧٠ - جذر وتدي* ، جذر عمودي ،
جذر جنسي
Racine pivotante (F). Tap root (E).
هو الجذر الاصيل نمت وعظم وغار في الارض عمودياً .

٦٤٧١ - جذري
Radical

٦٤٧٢ - جذريات
Rhizopodes (F). Rhizopoda (E).
صف كائنات حيوانية دنيا من الاوالي عديد الفصائل
والاجناس تجمعها أربع رتب تنتمي الى شعبتين شعبة
الجذريات الشبكية وشعبة الجذريات الفصية . معظمها
يعيش في البحار وبعضها في الماء العذب .

٦٤٧٣ - جذريات شبكية
Rhizopodes réticulés (F). Reticulated rhizopoda (E).
شعبة من الجذريات تشمل رتبة الشعاعيات ورتبة المنخرات

٦٤٧٤ - جذريات فصية
Rhizopodes lobés (F). Lobate rhizopoda (E).
شعبة من الجذريات تشمل رتبة الشيمسيات ورتبة النفاضات .

٦٤٧٥ - جذع
Taurillon (F). Young bull (E).
هو العجل في السنة الثانية من عمره والانثى جذعة .

٦٤٧٦ - جذع
Antenais (F). Teg (E).
هو من القبان ما له سنة كاملة تامة . والانثى تدعى جذعة
والجمع جذاع .

٦٤٧٧ - جذع
Stipe
هو ساق النخل وما اشبه تكون بمعظمها شبه اسطوانية
لا فروع لها . اوراقها هامية .

٦٤٧٨ - جذعي
Caulinaire (F). Cauline (E).
نعت لهرقي يطلق على الاوراق الناشئة في الساق بخلاف
الاوراق النامية على الفروع .

٦٤٧٩ - جذل
Culée, Estoc, Souche, Moignon (F). Trunk, Stock, Stump (E).
الجذل هو اصل الشجرة او الجزء من الجذع او الارومة
الباقى في الارض بعد قطع الفرع . ج جذال وأجذال
وجذول .


٦٤٨٠ - جذم
Racine (F). Root (E).
الجذم الجذر : ج جذوم واجذام .

٦٤٨١ - جذم
Section
هو المقطع .

٦٤٨٢ - جذم عرضي ، قطع عرضي
Section transversale (F). Transversal section (E).




جذر هوائي



جذر وتدي



جذيمور



جذير



جذيمة



جذينة

٦٦٢٥ - جَرْنِيطِيّ ٥ Campicole (F).

نعت تعريفي يطلق على كل من يعيش في الحقول .

٦٦٢٦ - جَرَيْثُ الْبَحْرِ Congre (F).

سمكة بحرية مشهورة باسم زرقوم ، اطلبها .

٦٦٢٧ - جَرَيْثُ الْبَحْرِ الْمَبْدُول

Congre commun (F).

هي الزرقومة المبدولة ، من الاسماك البحرية ، اطلبها .

٦٦٢٨ - جَرِيدَة

هي السفة التي تجرد من نصوصها كما يجرد القضييب من ورقه . ج جريد وجرائد .

٦٦٢٩ - جُرَيْس ، جُرَيْسَة Campanula (S).

Campanule (F). Campanula (E).

جنس نباتات عشبية من سبط الجريسات وفصيلة الجريسيات . انواعه نحو ٢٣٠ منشرة في جميع اصقاع العالم . معظمها نباتات عشبية متعاقبة الاوراق . ازهارها محوري وهامي الارتكاز . ازهارها جميلة الشكل الجرمي عديدة الالوان . اعم انواعه واشهرها ما يتبع .

٦٦٣٠ - جُرَيْسُ الزَّغَبِ الزَّهَرِ

Campanula lanata (S). Campanule laineuse (F).

نوع من الجريس المشبي المعمر يعلو من ٢٠ الى ٢٥ سم . اوراقه زغبية ، قلبية الشكل ، معنقة . ازهاره خلية زرقاء اللون . ازهاره يستمر في حيزان وتموز .

٦٦٣١ - جُرَيْسُ اَعْجَن * ، مُسْتَب ، خَبَز

العُقَاب ، ذَنْبُ الْاَيْل

Campanula laciniata (S). Campanule lacinée (F). Bell-flower, Hare-bell (E). Glockenblume (D). Campanella (I).

نوع من الجريسات وهو نبات عشبي معمر يعلو نحو ٣٠ سم . اوراقه ريشية مخمرة رباعية . ازهاره عشودي التجميع ازهاره زرق . تنويره يستمر طوال الصيف .

٦٦٣٢ - جُرَيْسُ السَّت * ، قَفَّاز مَرَّيْم

Campanula trachelium (S). Campanule à feuilles d'ortie, C. gantée, Gantelée, Gant de Notre-Dame, Herbe aux tranchées (F). Blue foxglove, Hask-wort, Throatwort (E). Braune fingerhütcher, Nesselglockenblume (D). Campanella guantata, Guanto del madona (I).

نوع من الجريس المخشوش المعمر . يعلو من ٣٠ الى ١٠٠ سم . سوقه مضلعة زباء . اوراقه السفلى تشبه المثلثات . نصلها هلبي الزغب ، مسنن الحافة . ازهاره متعددة الالوان فيها الازرق والابيض والبنفسجي .

٦٦٣٣ - جُرَيْسُ دَرَّافِي الْوَرَق

Campanula persicifolia (S). Campanule à feuilles de pêcher (F).

نوع من الجريس الامرط المخشوش المعمر . يعلو من ٤٠ الى ١٠٠ سم . اوراقه تشبه اوراق الدراقن . ازهاره مكبسة كبيرة القد ، قليلة العدد لونها الى الزرقة يعلوها اطار ابيض او بالمعكس || ازهاره يستمر من حزيران الى آب .

٦٦١٢ - جَرْنِيط Genette du Sénégal (F).

هو رباح السنغال ، اطلبه . Civet cat of Senegal (E).

٦٦١٣ - جِرْهَاس ، جِرْهَام Lion

من اسماء الاسد .

٦٦١٤ - جَرَهَة ٥ Ecaille de cône (F).

هي سفة كرز الصنوبر وما اشبه . Scale of cone (E).

٦٦١٥ - جَرُو Chiot (F). Puppy (E).

الجرو : ولد الكلب تخصيصاً وكل سبع عامة .

٦٦١٦ - جَرُو ، حِق ، عَلْبِيَّة ، كُغْبُور

Capsule (F).

كل ثمرة جافة منتفخة رقيقة الغلاف تحوي العديد من البذور . وهي لاقياسية الشكل وقد تكون شعية او وربية الاخبية .

٦٦١٧ - جَرُود Anagyre fétide (F).

هو اليفوت النتن ، اطلبه . Stinking wood (E).

٦٦١٨ - جَرُول Assise rocheuse (F).

Stratum stony (E).

جرول ج جراول . هي الارض الصخرية . يقال حفر التربة فبلغ الجراول او الجراول .

٦٦١٩ - جَرُومَة * ، صُقْرَاب

Cecropia (S). Cécropie, Bois trompette (F). Trumpet tree, Snake wood tree (E). Kanonenbaum (D). Legno trombetta (I).

جنس اشجار دماغية برية من فصيلة الانجريات . مهدا امريكة الوسطى والجنوبية . انواعها المعروفة ٤٠ سوقها اسطوانية منتصبة فارغة متباعدة الخيد تملو من ٣ الى ١٠ امتار . اوراقها ترسية مفصصة معنقة طويلة الزناد . ازهارها قوية التجميع || خشبها ابيض اللون ، خفيف الوزن ، خشن الرقمة . جذوعها تستعمل استعمال القساطل والنقر .

٦٦٢٠ - جَرِي Régisseur (F).

Manager, Steward (E).

الجري هو الذي يدبر شؤون مصلحة او مزرعة او معمل وليج امره نيابة عن صاحبه او بدلاً منه .

٦٦٢١ - جَرِي * ، جَوِي ، جَرِيث ، سِلُور الْفَرَات

Silurus glanis (S). Silure commun (F). Sheat-fish (E).

سمكة نهريّة من فصيلة السلوريات العاديات الحراشف يكثر وجودها في بحر قزوين وفي بعض بحيرات وانهر الشرق واروبة كالفرات والدانوب والفولكا . وهي من الاسماك المأكولة المتوسطة الصنف ، الكبيرة القد التي يبلغ طولها نحو ٥ امتار . ثوبها الى السمرة الخنطية الخضراء يعبق مع اقترابه من ثيج الظهر وينعرف الى الصفرة قرب البطن .

٦٦٢٢ - جَرِيثَة ، جَرِيَّة Mulette, Ventricle (F).

Ventricle (E).

٦٦٢٣ - جَرِيَال Vin rouge (F). Red wine (E).

النبيذ الاحمر اللون .

٦٦٢٤ - جَرِيَب Champ cultivé (F).

Cultivated ground (E).

هو الحقل المزروع .



جروية



جرو



جريس أعجن .



جريس الست



جريس رهل الورق



جريس ضبي



جريس مديوم



جريس موشم



جريس هرمي



جرين

٦٦٤١ - جُرَيْس هَرَمِي*

Campanula pyramidalis (S). Campanule pyramidale (F).

نوع من الجريس المعمر يعلو من المتر الى المترين. جنثه غليظ وتدي. ساقه مضلعة. اوراقه ملتحة معتقة مستطيلة. ازهاره قمية الشكل الهرمي، ثلاثية الارتكاز، عنقودية التجميع، عنقودها منتصب يعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. لوها الى الزرقاء || ازهاره يستمر من تموز الى ايلول.

٦٦٤٢ - جُرَيْس هَلْسِي الزَهْر

Campanula barbata (S). Campanule barbue (F).

نوع من الجريس العشبي البري المعمر يعلو من ٢٥ الى ٤٠ سم. اوراقه ضبية مراكبة. ازهاره هلبية النصل زرقاء اللون. ازهاره يستمر من حزيران الى آب.

٦٦٤٣ - جُرَيْسَات

Campanulées (F).

سبط من فصيلة الجريسيات. اجناسه وانواعه عديدة معظمها نباتات عشبية وبعضها محشوش. عصارها لبنية. ازهارها جريسية الشكل عديدة الالوان.

٦٦٤٤ - جُرَيْسِي

Campanulé (F).

Campanulate (E).

نعت تعريفي يطلق على الازهار الجريسية الشكل.

٦٦٤٥ - جُرَيْسِيَّات

Campanulaceae (S).

Campanulacées (F). Campanuliferae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة القعالات. عديدة الاجناس والانواع. جميعها نباتات عشبية وجنيبة تحوي عصارة لبنية مرة المذاق. اوراقها باكثريتها متعاقبة مسننة. ازهارها جريسية جميلة يغلب في الوانها الازرق والابيض.

٦٦٤٦ - جُرَيْن ، رَحْبَة

Séchoir à fruits (F).

Drying-room (E). هو الموضع الذي تجفف فيه الثمار.

٦٦٤٧ - جُرَيْن

Aire (F). Area (E).

راجع بيدر.

٦٦٤٨ - جُرَيْن *٥

Tridacna (S).

Tridacne, Bénitier (F). Tridacna (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة الجرينيات. انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد الحارة || اصداؤها كبيرة متفاوتة الاحجام. اطوالها تراوح من ٥٠ الى ١٤٠ سم. واثقالتها من ٤٠ الى ٢٥٠ كيلو. وهي ثنائية المصاريح اللامتساوية، متراكبة الصفيحات المحدبة البالغة التخديد || تعيش لاصقة بالصخور المغورة بالماء. ليفها غزير المادة نشيطها.

٦٦٤٩ - جُرَيْن التَّجِير

Maie (F).

Kneading-trough, Bread-pan (E). جورة مكبس العصر.

٦٦٥٠ - جُرَيْنِيَّات ٥

Tridacnidae (S).

Tridacnides (F). Tridacnidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد. اعطائها بحار البلاد الحارة || اصداؤها ثنائية المصاريح اللامتساوية، متراكبة الصفيحات المضلعة والمحددة، متفاوتة الاشكال

٦٦٣٤ - جُرَيْس رَهْلُ الْوَرَق *

Campanula mollis (S). Campanule à feuilles molles (F).

نوع من الجريس العشبي المعمر يعلو من ٢٠ الى ٣٥ سم. اوراقه كاملة خلية النصل المتمتع المماوج. ازهاره منتصبه مرطاء لوها الى الزرقاء الزاهية || ازهاره يستمر من ايار الى آب.

٦٦٣٥ - جُرَيْس سُنْبُلِي

Campanula spicata (S).

Campanule en épi (F).

نوع من الجريس المحشوش الحولي. يعلو من ٣٠ الى ١٠٠ سم. سوقه واوراقه زباء خشنة. اوراقه لاطئة حاضنه ازهاره الى الزرقاء البنفسجية يعلوها خل كثيف زغبى الملمس || ازهاره يستمر شهري تموز وآب.

٦٦٣٦ - جُرَيْس ضُمِّي *

Campanula glomerata (S).

Campanule à bouquets (F).

نوع من الجريس العشبي المعمر يعلو من ٢٥ الى ٦٠ سم. اوراقه السفلى معتقة قلبية، اوراقه الوسطى لاطئة وقرية الفواصل. ازهاره كبيرة القد بعضها مكبس. لوها الى الزرقاء يعلوه مواج بنفسجي عابق. ازهاره يستمر من حزيران الى آب || ضرابه واصرامه عديدة.

٦٦٣٧ - جُرَيْس شَرِق

Campanula dichotoma (S).

Campanule dichotome (F).

نوع من الجريس الحولي. يعلو نحو ٣٠ سم. سوقه وفروعه فرقة زباء. اوراقه لاطئة. ازهاره زرق. ازهاره يستمر من تموز الى آب.

٦٦٣٨ - جُرَيْس مِدْيُوم *

Campanula medium (S). Campanule carillon, C. des

Jardins, Carillon, Violette de Marie (F). Canterbury bells, Mercury's violet (E). Gartenglockenblume (D). Campanella a fiori grandi, Violetta di Maria (I).

نوع من الجريس الحول الازغب الساق والاوراق. ضرابه واصرامه عديدة. ساقه تعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه اهليلجية سنانية الزام الاخير. مسننة الحافة. ازهاره عنقودي. ازهاره كبيرة القد مكبسة متدلية. الوانها عديدة يغلب فيها الازرق البنفسجي ومنها الابيض والبيجي والوردي والارجواني والموشح || ازهاره يستمر من ايار الى آب.

٦٦٣٩ - جُرَيْس مُوَشَّم *

Campanula punctata (S).

Campanule ponctuée (F).

نوع من الجريس المعمر يعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقه السفلى معتقة قلبية الشكل. ازهاره خلية متدلية لوها الى الصفار يعلوه توشيح جزوي ومنها بنفسجية اللون قرمزية التوشيم || ازهاره يستمر من ايار الى تموز.

٦٦٤٠ - جُرَيْس نَنَّا

Campanula nana,

C. alpestris (S). Campanule naine (F).

نوع من الجريس العشبي البري المعمر. يعلو من ١٠ الى ١٥ سم. سوقه مدادة. اوراقه خبطية. ازهاره الى الزرقاء الساوية. يوجد في الجبال. ازهاره يستمر شهري تموز وآب.

٦٦٦٠ - جَزَاب مُخَرَّق ، دَهَامِين مُخَرَّق

Erodium laciniatum (S). Erodium lacinié (F).

نبات عشبي حولي ازغب . ساقه متكة كثيفة الهلب .
أوراقه السفلى بيضية كاملة الفصوص والعليا مفصصة
قصيرة الخرق . ازهاره زنادية سداسية التجميع || ازهاره
ربيعي يوجد على الساحل السوري اللبناني .

٦٦٦١ - جَزَاب مِسْكِي ، دَهَامِين مِسْكِي ، مِسْكِي

Erodium moschatum (S). Erodium musqué, Erodium musqué (F). Ground needle, Musk-erodium, M. clover (E). Bisamreiherschnabel, Moschus bisamkraut (D). Geranio muschiato, Erba moscada (I).

نبات عشبي حولي عطري ازغب لزج . ساقه منتصبه تعلو
من ٢٠ الى ٥٠ سم . أوراقه مركبة ريشية بيضية النصل
المزدوج القسنيين . ازهاره وردية اللون يعنوها توشيح ليلي .
ازهاره يستمر من نيسان الى ايلول .

٦٦٦٢ - جَزَاب مِصْرِي ، دَهَامِين مِصْرِي

Erodium aegyptiacum (S). Erodium égyptien (F).

نبات عشبي حولي ازغب . ساقه فرعاء . أوراقه بيضية
مستطيلة ثلاثية الفصوص . ازهاره زنادية كثيرة التجميع ،
لونها الى الالبيض الكدر || ازهاره ربيعي . يوجد
في مصر .

٦٦٦٣ - جَزْأَة

الجزأة هي مغرز الذنب ومنهم من قال اصل ذنب البعير .

٦٦٦٤ - جَزْأَة

Echelas (F). Vine-prop, V-stick (E).

هي المرنج ، خشبة يرفع بها الكرم عن الارض .

٦٦٦٥ - جَزَّاز ، جَزَّاز

هو زن جز النعم وحصاد الزرع او صرام النخل وغيره .

٦٦٦٦ - جَزَّاف

Forfait (F). Contract (E).

هو التعاقد على صفقة بمبلغ مقطوع معين .

٦٦٦٧ - جَزَّافِي

Forfaitaire (F). Contractual (E).

ما تم الاتفاق عليه مقابل ثمن مقطوع .

٦٦٦٨ - جَزَّال

Fagots (F). Faggots (E).

حطب غليظ يابس (فريتغ) .

٦٦٦٩ - جَزَّالَة ٥

Dichapetalum (S).

Dichapétale (F).

جنس نباتات جنبيه ، معمرة ، برية من فصيلة الجزاليات .
انواعها المعروفة نحو ٣٠ اعطائها المناطق الاستوائية الاسيوية
والافريقية || جنباتها فرعاء تعلو من مترين الى خمسة
امتار . أوراقها معنقة ، متعاقبة . نصالها اهليلجية ،
متسمة ، غائرة المروق ، شديدة الخضار . ازهارها
عنقودي التجميع ، متشعب مستطيل . ازهارها متباينة
الالوان يكثر فيها الوردي ثم الاصفر والتبني والابيض
الذنس || ثمارها مغلفة السوذك لا تؤكل . عجباتها آحية .

٦٦٧٠ - جَزَّالِيَّات ٥

Dichapetalaceae (S).

Dichapétalacées (F). Dichapetalaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة القعالات . اجناسها
ثلاثة اما انواعها فكثيرة العدد ، اعطائها الاصقاع
الاستوائية والحارة || جميع نباتاتها جنبات فرعاء متفاوتة
الارتفاع . أوراقها متعاقبة ، معنقة ، اذينية . نصالها

والاحجام . جميعها كبيرة القد ومنها الحارة الكبر || اعرف
اجناسها واشهرها الجرين والهيوب .

٦٦٥١ - جَزَّ

Tonte (F).

Sheep-shearing, Clipping (E).

هو قلع صوف الضأن .

٦٦٥٢ - جَزَاء نَقْدِي

Amende (F). Penalty (E).

غرامة نقدية تفرض فرضاً بصفة عقوبة .

٦٦٥٣ - جَزَاب * ، دَهَامِين

Erodium, Erodion

جنس نباتات عشبية من فصيلة الغرنوقيات انواعه نحو
٥٠ اعطائها جميع اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة من
السواحل الى الجرد || اشهر انواعه ابرة العجوز
وأبو مشقة ومسيكة .

٦٦٥٤ - جَزَاب أَغْبَرِ الْوَرَق ، دَهَامِين أَغْبَرِ الْوَرَق

Erodium glaucophyllum (S). Erodium glauque (F).

نبات عشبي معمر . ساقه مستقيمة متشعبة ملساء . أوراقه
بيضية ، مستطيلة ، زغبية النصل المفصص ، غبراء
اللون . ازهاره زنادية لونها الى اليباض الاغبر || ازهاره
ربيعي . يوجد في يادية التيه وسينا وشرقي البحر الاحمر .

٦٦٥٥ - جَزَاب عَفْثِي ، دَهَامِين عَفْثِي ، بَدُو

Erodium hirtum (S). Erodium hérissé (F).

نبات عشبي معمر . ساقه قصيرة متكة . أوراقه مركبة
ثنائية التقسيم الريشي . ازهاره زنادية خماسية او سداسية
التجميع لونها الى اليباض الاغبر || ازهاره ربيعي .
يكثر في فلسطين .

٦٦٥٦ - جَزَاب عُنُقُودِي ، دَهَامِين عُنُقُودِي

Erodium botrys (S). Erodium en grappes (F).

نبات عشبي حولي ازغب . ساقه منتصبه زباء . أوراقه
مركبة ، ثنائية التقسيم الريشي ، ضيقة الخرق ، خلية النصل .
ازهاره زنادية قليلة التجميع والعدد . لونها الى اليباض
الليلكي || ازهاره ربيعي يوجد في تهام لبنان وسورية .

٦٦٥٧ - جَزَاب فَتَّاشِرِي الْوَرَق ، دَهَامِين

فَتَّاشِرِي الْوَرَق ، مَرُغِيَط

Erodium bryoniaefolium (S). Erodium à feuilles de

bryone (F).

نبات عشبي حولي . ساقه مستقيمة . أوراقه السفلى
مغضة قلبية ثلاثية الفصوص والعليا متصاغرة . نصلها
حريري الملمس فضي الموج . ازهاره زنادية شفعية .
البتلات اطول من الكأس لونها الى اليباض . ازهاره ربيعي .
يوجد في فياني فلسطين وبادية سينا .

٦٦٥٨ - جَزَاب كُرْكِي ، دَهَامِين كُرْكِي

Erodium gruinum (S). Erodium à bec de grue (F).

نبات عشبي حولي ازغب . ساقه تعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم .
أوراقه مركبة مفصصة . ازهاره زنادية كبيرة القد بنفسجية
اللون || ازهاره ربيعي يستمر من نيسان الى ايار يوجد
في جميع مناطق حوض البحر المتوسط .

٦٦٥٩ - جَزَاب لَقْلَقِي ، دَهَامِين لَقْلَقِي

Erodium cichonium (S). Erodium à bec de

cigogne (F).


نبات عشبي حولي ازغب لزج . ساقه منتصبه تعلو من
٢٠ الى ٦٠ سم . أوراقه مركبة ريشية . ازهاره زنادية ،
متوسطة القد ، زرقاء اللون || ازهاره ربيعي . يوجد في
تهام فلسطين ولبنان وسورية .



جَزَاب



جَزَّالَة



جزر



جزر الرعدة



جزر بري



جزبون أزرق

٦٦٨٤ - جَزْل ، هَدِيل Roucoulement (F).
Cooling (E).

هو صوت الحماق ومهم من شخص الهديل بوحشها .

٦٦٨٥ - جَزْم

الجزم : بيع الثمرة في اكمامها بالدرهم . (ابن الاعرابي).
واجزم الشجرة : اشترى ثمرها فقط .

٦٦٨٦ - جُزْي ، ذَرَّة Molecule (F). Molecule (E).
اصفر جزء طليق من جسم ما .

٦٦٨٧ - جُزْيَة Impôt foncier (F). Land-tax (E).
هي الضريبة العقارية او الخراج . تجبى من الاراضي الزراعية والعقارات المبينة .

٦٦٨٨ - جُزْيُون Jaslone

جنس اشباب برية حولية ومحولة ومعمرة من فصيلة الجريسيات . انواعه نحو ١٢ جميعها من نباتات حوض البحر المتوسط واروبه الغربية . سوقها نحيلة تعلو نحو ٥٠ سم . اوراقها صغيرة لسنة ازهارها تاجية الارتكاز طويلة الزناد لونها الى الازرق او الليلي . اعما انتشاراً الجزيون الازرق .

٦٦٨٩ - جُزْيُون أَزْرَق

Jaslone montana (S). Jaslone de montagne, Herbe bleue, H. à midi, Fausse scabieuse (F). Common sheep's-bit scabious (E). Blaue flockenblume, Kleine scabiose (D). Lapacello annuo, Scabiosa falsa (I).

نوع من الجزيون وهو نبات طبي محول . جذره وتدي ، ساقه ملطاء تعلو من ٢٠ الى ٦٠ سم . اوراقه صغيرة لسنة . ازهاره زرقاء اللون جميلة الشكل || ازهاره يستمر من سزيان الى ايلول .

٦٦٩٠ - جَسْ Palpatio

٦٦٩١ - جَسَاة Callosité, Dureté (F). Callosity (E).
تكاثف وتصلب الادمة او البشرة .

٦٦٩٢ - جُسَاة ، كَنْب Caliose
علة تصيب البشرة او الادمة فتصلبها وتمنعها من القيام بعملها الطبيعي .

٦٦٩٣ - جُسَّاد Crocus, Safran (F).
Crocus, Saffron (E). هو الزعفران ، اطلبه .

٦٦٩٤ - جِسْلُوم Geissoloma (S).

Geissolome (F). Geissoloma (E).
جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة الجسلومييات . انواعه المعروفة قليلة العدد مهددا بعض اصقاع افريقية الجنوبية || نباتاته شجيرات صغيرة تعلو نحو اربعة امتار . افنادها وافنانها رباعية الاضلع . اوراقها متقابلة ، معتقة . ازهارها محورية الانتشاب ، فردية . يكثر فيها اللون الاحمر ثم الاصفر .

٦٦٩٥ - جِسْلُومِيَّات Geissolomataceae (S).
Geissolomatacées (F). Geissolomataceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها وانواعها قليلة العدد اعطائها بعض مناطق افريقية الجنوبية || نباتاتها شجيرات وجنبات برية وزراعية تزيينية . سوقها متعصبة

اهليجية ، غائرة العروق والاعصاب . ازهارها عنقودي . ازهارها ثنائية الكم ، تويجاتها متحدة البتلات . ثمارها لاقياسية الانفلاق . عجباتها آحية || اشهر اجناسها الجزالة والطابورة .

٦٦٧١ - جِزْب Part (F). Part, Share (E).
هو النصيب والحصة .

٦٦٧٢ - جِزَّة Tolson (F). Fleece (E).
مجموع ما يجز من صوف النعجة او الكباش .

٦٦٧٣ - جِزَح جرح الشجرة : ضربها ليحت ورقها .

٦٦٧٤ - جِزْر Reflux (F). Reflux, Ebb (E).
الجزر ضد المد وهو رجوع ماء البحر الى خلف .

٦٦٧٥ - جِزْر Abattage (F). Slaughtering (E).
هو ذبح حيوانات القصابة .

٦٦٧٦ - جِزْر * ، إصطقلين

Daucus carota sativa (S). Carotte (F). Carrot (E).
Karrotten, Echte möhre (D). Carota (I).
نبات حولي زراعي غليظ الجذر المأكول من فصيلة الخيميات . ضروبه كثيرة . فوائد الصحية عديدة تتمثل بمادة الكاروتين التي تتحول الى فيتامين «ا» (راجع جدول الفيتامين) وينفع القوة الجنسية والحضم والاعصاب والتوازن الغددي وينشط المناعة الجسدية وطاقة مقاومتها الامراض المعدية ويمنع تكوين الحصى في الكلى . الجزر الاصفر انفع من الاحمر .

٦٦٧٧ - جِزْر أبيض Panais cultivé (F).
Common-parsnip (E). هو السيسارون الكبير ، اطلبه .

٦٦٧٨ - جِزْر إقْلِيْطِي Sécacul (F).
Rough parsnip (E). هو الشقاقل نبات طبي بري ، اطلبه .

٦٦٧٩ - جِزْر الرُعَاة * ، دُوْقُس

Athamanta cretensis (S). Athamante de Crète, Daucus de Candie (F). Candy carrot, Cretan carrot (E).
Kretische augenwurz (D). Dauco Cretico, D. di Candia (I).

نبات عشبي بري معمر غليظ الجذر الجنئي من فصيلة الخيميات يقال انه لا يخلو من بعض المنافع الطبية لكنها مبهمة ولذا لم نذكرها .

٦٦٨٠ - جِزْر الشَّبْطَان Cerfeuil (F).
Cerfolium (E). راجع أطريال .

٦٦٨١ - جِزْر بَرِّي * Daucus carota (S).
Carotte sauvage, Pastenade (F). Wild carrot, Parsnip (E). Pastinake (D). Carota salvatica, Falso sisaro (I).

نوع من الجزر وهو نبات عشبي بري من فصيلة الخيميات يتميز بشخانة جتته الذي يتحلل ، من الوجهة الطبية ، بجميع خصائص جنسه .

٦٦٨٢ - جَزْل Bifide (F). Bifid (E).
هو كل عضو من اعضاء النبات ثنائي التفليق .

٦٦٨٣ - جَزْل ، سَخْد Bifidité (F). Bifidity (E).
التصاق عضوان نباتيان ببعضهما البعض كورقتين وعسلوجين .

والاستوائية. معظمها اعشاب صغيرة ومتوسطة القد. وبعضها جنات وشجيرات. اوراقها بسيطة متقابلة. ازهارها مختلفة الالوان، خاسية البتلات، رباعية الاسدية، وحيدة الميسم القصير القلم.

٦٧٠٣ - جُسُوء، صِلَابَة. Rigidité (F). Rigidity (E).

٦٧٠٤ - جَسْثِي، صَفِيْق. Pachyderme (F). Pachydermatous (E).

٦٧٠٥ - جَسْثِيَّات. Pachydermes (F). هي رتبة صفيقات الجلد من الثدييات. Pachyderms (E).

٦٧٠٦ - جُسَيْمَات. Corpuscles (F). Corpuscles, Corpuscles (E). من الحيوانات الدنيا ما كانت اجسامها ذرية القد.

٦٧٠٧ - جُشْ، *، كُشْ، عَطِيْل. Androcée (F). Androcium (E). هو جهاز التذكير في النبات.

٦٧٠٨ - جَشَّاب. هو الندى الذي يقع على البقل.

٦٧٠٩ - جَشَّار. Angiopteris (S). Angioptère (F). Angiopteris (E).

جنس نباتات سرخسية، جبارة، معمرة. انواعه المعروفة قليلة العدد موطنها بعض مناطق آسية الاستوائية وجزر المحيط الهندي || حراشفها مجنات متراكبة. مراحمها جبارة تطول أكثر من سبعة امتار. اكياس بوغها ضخمة بحجم الجوز || تعيش في جميع المواقع الحارة الرطبة لكنها لا تبلغ الحجم المعهود الا في اقاليمها الطوعية.

٦٧١٠ - جُشْب. Ecorces de grenade (F). قشور الرمان. قابضة وتستعمل في الدباغة واحده جشيب.

٦٧١١ - جَشْرَة. Glume inférieure (F). Inferior glume (E). الجشرة او القصرة: القشرة السفلى التي على حبة الحنطة.

٦٧١٢ - جُسْنَة، جُسْنَة، عُرَيْرَاء. Anthus (S). Pipit, Pit-pit (F). Pipit (E). جنس طير من الجوائم انواعه عديدة جميعها عصافير صغيرة القد. مصيفها البلاد المعتدلة الحارة، مشتاتها البلاد الحارة. طولها يراوح من ١٥ الى ١٨ سم. منقارها دقيق مستقيم. اجنحتها مستطيلة. اذنانها عامرة مقعرة. ارساغها ومخالبها دقيقة. اثنائها متعددة الالوان المتداخلة || اشهر انواعها الثلاثة التالية.

٦٧١٣ - جُسْنَةُ الْحَقْل، طُرْسُوم، كَيْخَن. Agrodroma campestris, Anthus campestris (S). Agrodrome champêtre, Pipit rousseline, Rousse-line (F). Tawny pipit (E).

طائر من الجسنة وفصيلة الذعريات. اعطاه العالم القديم يألف الحقول والبور والسهول. قوته الحشرات والديدان. طيرانه سفيف وحوم وهو قريب الشبه بطيران القبر || جسمه صغير القد، رشيق القوام يطول نحو ١٨ سم. وبسطه نحو ٢٤ سم. ثوبه متراكب الالوان. رأسه ورداؤه وظهره الى السمرة الزيتية المنسنة بالقرني. جناحاه رتاجيا الريش. الاسمر العابق. كلاء مطوقة بالابيض. عيناه

فراء. فروعها مربعة الاصلع. اوراقها متقابلة، قصيرة الاعناق، اهليلجية النصال الضيقة. ازهارها فردية، محورية الارتكاز، منها الاحمر والاصفر والليلكي || اشهر اجناسها الجسوم.

٦٦٩٦ - جُسْمُورِي، شَوْرَبِي. Morphologique (F). Morphological (E).

ما كان له صلة بالاعسام والشوزبة اي درس الاشكال الخارجية والباطنية في الكائنات الحية.

٦٦٩٧ - جُسْمُورِيَة. Physiologie (F). Physiology (E).

الجسمورية علم يبحث في تركيب المخلوقات الحية وفي وظائف اعضائها.

٦٦٩٨ - جَسْمِي. Hysope officinale (F). Common hyssop (E). اطلب زوفا.

٦٦٩٩ - جُسْنَة. Mora (S).

سمكة بحرية وحيدة الجنس والنوع من الملساوات وفصيلة الغادسيات. اعطانها المتوسط. جسمها مردني الشكل يطول نحو ٦٥ سم. لها ذبانيان في مقدم الحطم. ثوبها الى السمرة الرصاصية الفضية الموج. لحمها مستحب الطعم. تعيش ضمن المياه الاقليمية في المناطق الصخرية الوعرة.

٦٧٠٠ - جُسْنَةُ الْمُتَوَسِّط، مُورَة. Mora mediterranea (S). Mora de la Méditerranée (F). Mora mediterranea (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة الغادسيات. اعطانها بعض اقاليم البحر الابيض المتوسط واخصها الشرقية والجنوبية. تعتبر من اسماك النفاق. مسرحها المواقع التي تكثر فيها الحشاف. قوتها القشريات والرخويات والاسماك الصغيرة || جسمها مردني الشكل، يطول من ٥٠ الى ٦٥ سم. ثوبها الى السمرة الرصاصية الفضية الموج يعلوها تمشيج بنفسجي في الظهر. بطنها الى الغبرة الفضية. زعانفها الظهرية والشرجية الى السمرة الموشحة بالازرق. زعانفها الصدرية والحوضية الى السمرة الموشحة بالاحمر. زعنفتها الذيلية موشحة بالازرق والاحمر || رأسها مخروطي الشكل، مستدير الحطم. شذقها معتدل الانفراج. فكاهما متعادلان والسفلي يحمل في مقدمه عذبتان دقيقتان. اسنانها ثلاثية الصفوف في الفكين. ثنائياها مستطيلة، ذربة. عينها كبيرتان، مستديرتان، ناشرتان || ترتيب زعانفها يشذ عن المألوف: الظهرية اثنتان، والشرجية اثنتان والحوضية وداجية الارتكاز. زعنفتها الذيلية فارقة || لحمها جيد الصنف، مرغوب فيه.

٦٧٠١ - جِسْنِيرَة. Gesnera (S).

جنس نباتات عشبية جذمورية من فصيلة الجسنيريات. انواعها نحو ٣٠ معظمها بري وبعضها تزييني. سوقها قصيرة اوراقها متقابلة خلية النصل. ازهارها جميلة الشكل عديدة الالوان.

٦٧٠٢ - جِسْنِيرِيَّات. Gesneraceae (S).

Gesneracées, Gesnériacées (F). Gesneraceae (E). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وحيدات القعالة. انواعها نحو ١٠٠٠ تنتمي الى ١٠٠ جنس. منبها البلاد الحارة



جسنة



جسنة المتوسط



جش



جشار



جسنة الحقل



جُشْنَةُ الغَاب



جُشْنَةُ المَاء



جُشْنَةُ المَرْوَج



جُغْرَان

١٧٢١ - جُغْرَان (F). Hyène (E).
هو الضبع وفي المثل اعيث من جمار.

١٧٢٢ - جُغَام
داء يعرض للابل وغيرها من رعي النضر.

١٧٢٣ - جُغَائِس (F).
Coleoptera (E).
رتبة حشرات تعرف بغمديات الاجنحة او مغمديات الاجنحة ، اطلبها .

١٧٢٤ - جُغْبُوبَة * (S).
Ormyrus (F). Ormyrus (E).
جنس حشرات من فصيلة الطرميديات ورتبة غشائيات الاجنحة المخصوصة . انواعها المعروفة نحو سبعة اعطانها بعض مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . جميعها تتطفل على الآبراث || اجسامها صغيرة مستغلظة تطول من ٢ الى ٥ سم . رؤوسها صغيرة . جواشها ضخمة . بطونها مخروطية الشكل . مرزاتها ذلقة قصيرة . اناؤها الى الخضار الاليس . ترتجأتها مزينة بخطوط من النقط الصفرة .

١٧٢٥ - جُغْبِي (F). Red ant (E).
Fourmi rouge (F).
نوع من النمل . وقال اليت هو نمل احمر . ج جعبيات .

١٧٢٦ - جُجَة ، بَسْرَا ، مِزْر (F). Beer (E).
Bière (F).
مشروب صحي شائع الاستعمال قليل المادة الكحولية يستخرج من الشعير مع الجنجل .

١٧٢٧ - جُجْشَنَة (F). Stump, Stem (E).
Souche (F).
ارومة كل شجرة تبقى على الشتاء من عظام الشجر وصفارها . وقال ابو زياد الجعنة اصل كل شجرة قد ذهبت سوى الغصاء . (اللسان) ج جعش وجعشات وجعاش .

١٧٢٨ - جُجْدُبَة ، كُجْدُبَة (F).
Pollum (E).
هي بيت العنكبوت .

١٧٢٩ - جُجْدَة (F).
الجعدة عشبة برية طيبة تعرف بحشيشة الريح ومسك الجن والطوريون البلد . قيل في وصفها ما يلي : « حشيشة تنبت على شاطئ الانهار وتجعد » || « شجرة خضراء تنبت في شعاب الجبال بنجد وفي القيعان » || « عشبة خضراء وغبراء تنبت في الجبال ، لها رعدة مثل رعدة الديك طيبة الريح تنبت في الربيع وتيبس في الشتاء وهي من البقول » عن ابي حنيفة || « بقلة برية لا تنبت على شطوط الانهار وليس لها رعدة » الازهري || « شجرة طيبة الريح خضراء لها قصب في اطرافها ثمر ابيض تحشى بها الوسائد لطيب ريحها . وهي جهيدة يصلح عليها المال » (النضر بن شميل) .

١٧٣٠ - جُجْدَة (F). Leaf-curl (E).
Cloque (F).
الجمدة او مرض الجعد وصف فطري مجهري يعمرى اوراق وعسالج الاشجار المشمرة وقد يصيب ثمارها . سببه فطر من المجددات يدعى تفريته ، اطلبها .

١٧٣١ - جُجْر (F).
الجعر : نجو كل ذي برن من السباع .

١٧٣٢ - جُجْرَان (F). Scarabaeus (E).
هو الجعل ، اطلبه .

مكحلتان بالاسود . عنقه وصدره الى البياض الاخير الموشم بالاسمر . بطنه الى الصهبة الرملية المواج . ذنبه مستطيل القد مقطوم الطرف . منقاره ورغاه واصابعه الى السمرة الخنطية العابقة || الشقان لا يختلفان قدماً وثوباً واليافع يتحل بشوب البالغ || يدثن عشه في افحوص يختفونه بين الدغل والاعشاب الكثيفة . اثناء تضع من ٤ الى ٥ بيضات على مرتين في الحول . الحضان يستمر من ١٤ الى ١٥ يوماً تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء .

١٧١٤ - جُشْنَةُ الغَاب * (S).
Anthus arboreus (S).
Pipit des arbres, P. des bois, Cujelier (F). Tree Pipit (E).

نوع من الجشنة طوله نحو ١٦ سم . ثوبه متراكب الالوان رأسه وظهره بلون الرماد يعلوه موج زيتوني ورقشة سمراء . صدره وبطنه الى الصهبة الصفراء يعلوها توشيم اسمر . حاجب العين اصهب اللون والمنقار اسمر || قوته الحشرات والحوام . يألف الاحراج . يدثن عشه في الخللج وبين الادغال . اناثه تبيض من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها نحو اسبوعين .

١٧١٥ - جُشْنَةُ المَاء * (S).
Anthus spinoletta (S).
Pipit spinolette, P. aquatique (F). Rock pipit (E).

نوع من الجشنة طوله نحو ١٨ سم . ثوبه الى الصهبة العابقة يعلوه موج ازرق ورقشة سوداء . بطنه وصدره الى الصهبة المؤذرة بالرودة الغبراء . اطراف قوادمه واباهره الى الرودة الطحلاء . حاجب العين ابيض اللون والمنقار اسمر || قوته الحشرات والحوام اخصها الذباب والاراق والديدان والعناكب . يألف الغابات الرطبة وضفاف الانهر ومجاري الماء . يدثن افحوصه في التراب بين الخصى او جذور الاشجار . اناثه تبيض من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها نحو اسبوعين .

١٧١٦ - جُشْنَةُ المَرْوَج * (S).
Anthus pratensis (S).
Pipit des prés (F). Meadow pipit (E).

نوع من الجشنة طوله نحو ١٥ سم . ثوبه متراكب الالوان . رأسه وظهره الى السمرة الزيتونية يعلوها توشيم اسود . زوره وصدره وبطنه الى الصفار الاخير الموشم بالاسمر . اطراف قوادمه واباهره الى البياض . حاجب العين اصفر اللون ، والمنقار اسمر || يألف المروج والمراعي الرطبة قوته الحشرات والحوام . يدثن افحوصه في الارض بين المشب والاسل والفزار . اناثه تبيض من ٥ الى ٦ بيضات تحضنها وحدها نحو اسبوعين .

١٧١٧ - جِص (F).
Calcaire (F).
Calcareous, Lime-stone (E).

اسم شامل يطلق على المعادن التي يدخل في تركيبها كربونات الكلس || وهو ايضاً صفة ما كانت طبيعته الكلس او الذي حوى مقداراً من الكلس .

١٧١٨ - جِص (F). Plaster (E).
Platre (F).
هو الجص الطبيعي ازيل ماؤه .

١٧١٩ - جِصَّاص ، اِثْف الكِلْس (F).
Calicole (F).
نمت يطلق على النبات الذي لا ينمو جيداً الا في الاتربة الجصية (الكلسية) .

١٧٢٠ - جِصَّص ، كِلْس (F).
Calcifier (F).
حوّل الى كربونات الكلس .

كثيفة التجميع لونها الى البياض الاصفر الموجح || يركب الصمتر والندغ .

٦٧٤٢ - جَعْفِيل دَمَوِي

Orobancha cruenta (S). Orobancha sanglante (F).
جنته غليظ الدرنة . ساقه وحيدة عفية حمراء اللون . ازهاره كبيرة القد ، زياء الاسدية ، صفر السيات ، حر التويج || يركب بعض النباتات القرنية والكرمة .

٦٧٤٣ - جَعْفِيل سَاطِع

Orobancha speciosa (S). Orobancha specieuse (F).
ساقه وحيدة ، غليظة الجنت الدرني ، عفية ، تعلو نحو ٧٠ سم . ازهاره عطرية العرف ، بيضاء اللون مشيرة بخطوط بنفسجية || مهد حوض البحر المتوسط . يركب بعض القرنيات اخصها الفول والبزيلة والحمص .

٦٧٤٤ - جَعْفِيل فَلْسِي

Lathraea squamaria (S). Orobancha squameuse (F).
ساقه وحيدة ، عفية ، درماء ، فلسية الحراشف ، تعلو نحو ٦٠ سم . ازهاره كبيرة القد متدللة لونها الى البياض الوردي || يعيش في المواقع الظليلة الرطبة . يركب جذور بعض الاشجار منها الكرمة .

Orobancha major (S). Orobancha majeure (F).
ساقه وحيدة ، كبيرة القد ، عفية ، تعلو نحو ٧٠ سم . حراشفها مدبية متقابلة متباعدة . ازهاره كبيرة الحجم لونها الى الابيض الوردي تعلو تشويح جزوي || يركب بعض النباتات البرية والتزيينية اخصها السكايبوزا .

٦٧٤٦ - جَعْفِيل مُتَشَعَّب

Orobancha racemosa, Phelipaea ramosa (S). Orobancha rameuse, Phéllpéo (F).
جنته درني مستدير عديد السوق النحيلة الضمية ، لونها الى الزرقة الباهتة تعلوها موج ابيض واصفر . ازهاره سنبلية ، رهلة ، صغيرة القد ، صفراء اللون تعلوها عند اطرافها موج بنفسجي || يركب عدة نباتات اخصها التبغ والكتان والذرة والبندورة والباقية والكرمة .

٦٧٤٧ - جَعْفِيل مَيْشُور ، جَعْفِيل صَغِير

Orobancha minor (S). Orobancha mineure (F).
جنته غليظ الدرنة الضمية السوق او الوحيدة الساق . ازهاره غبراء اللون تعلوها موج متفاوت الالوان يراوح بين الابيض والاصفر والبنفسجي || يركب عدة نباتات من القرنيات والخبيات اخصها النفل على اختلاف انواعه .

Orobanchaceae (S). Orobanchacées (F). Orobanchaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وحيدات القعالة . تشمل نحو ١٥٠ نوعاً ثلثها من نباتات اقليم حوض البحر المتوسط . نباتاتها عديمة الخضيب ، طفيلية تنشب في جذور غيرها وتعيش مما تمتصه من نسغ . سوقها درماء تكسوها حراشف لسة او مدبية تقوم مقام الاوراق . ازهارها سنبلية او عنقودي التجميع . ازهارها عديدة الالوان .

٦٧٤٩ - جُعَل ، جَعِيلَة . Salaire (F). Salary (E).
الأجر الذي يأخذه العامل على فعل الشيء .

٦٧٥٠ - جُعَل ، جُعْرَان . Scarabée (F). Scarabaeus, Scarab beetle (E).
جلس خنافس من فصيلة الجعلليات . انواعه كثيرة العدد

Escourgeon (F). Winter-barley (E).

شعير غليظ القصب عريض عظيم طويل الحب ابيض ضخم السنابل كأن سنابله جراء الخشخاش ولسنبله حروف عدة اربعة او ستة وهو رقيق خفيف المؤنة في الدياتس . والآفة اليه سريعة وهو كثير الريع طيب الخبز .

٦٧٣٤ - جُعْرُور * Gerrhosaurus (S).

Gerrhosaura (F).
جنس عطاء من فصيلة الجروريات . انواعه المعروفة ١٠ طولها يراوح من ٣٠ الى ٤٠ سم . اثوابها الى السمرة تعلوها تديج ابيض وخطوط سود يكتنفها حثار اخضر . موطنها البلاد الحارة . تألف الفياقي والواحات .

٦٧٣٥ - جُعْرُورِيَّات * Gerrhosauridae (S).

Gerrhosauridés (F). Gerrhosauridae (E).
فصيلة من العظائيات الرباعيات الارجل . اجناسها وانواعها عديدة جميعها صغيرة القد او متوسطة . اثوابها الى السمرة تعلوها نمشة بيضاء وتجذيع او تخطيط مختلف الالوان يغلب فيه الاسود والاصفر والاصفر .

٦٧٣٦ - جَعْفِيض . Laiteron des marais (F).
راجع تفاف المنافع . Fen thistle (E).

٦٧٣٧ - جَعْف . Extirpation
راجع انجاء .

٦٧٣٨ - جَعْف ، قَعَر . Déraciner (F).
To root up (E).
جحف الشجرة : قلعها . واجتف الشجرة : اقتلعها .

٦٧٣٩ - جَعْفِيل ، سَبْع ، حَامُول ، هَالُوك

Orobancha (S). Orobancha (F). Clove scented, Broom-rape (E). Nelken sommerwurz (D). Orobanché, Erba scalogna (I).

جنس نباتات طفيلية ضارة عديمة الخضيب من فصيلة الجعفيليات . انواعه عديدة نحو المئة . تنشب في جذور عائلها من النبات فتلتصق به وتنمو عليه وتعيش من نسغه . سوقها درماء ، لوانها عديدة منها الاخر والاصفر والبنفسجي والوردي والافبر ... اوراقها حرشية مدبية تحمل لون الساق . ازهارها سنبلية التجميع يتمركز في الزام الاعلى من الساق . ازهارها خشوية خاسية . ثمارها كمار صغيرة تغلف العديد من البزور . بزورها مستدقة مستديرة تعيش في التربة من ثمانية الى عشرة اعوام لا يفلقها وينتشها سوى افراز جذور النباتات الحاضنة لها || نقيعه مر المذاق مدر للصفراء ويقال ان مسحوقه يستعمل في علاج السرطان وقروحه || اعرف واشهر انواعه الضارة ماييلي .

٦٧٤٠ - جَعْفِيل أَزْغَب

Orobancha pubescens (S). Orobancha pubescente (F).

ساقه زياء فردية ، عفية ، متوسطة القد ، تعلو نحو ٤٠ سم . حراشفها صغيرة لسة ، زغبية . ازهاره خلية لونها الى الصفار الوردي تعلوها مشحة بنفسجية || يركب بعض النباتات البرية والتزيينية . اضراره قليلة .

٦٧٤١ - جَعْفِيل الصَعْتَر

Orobancha epithymum (S). Orobancha du thym (F).

ساقه وحيدة عفية متوسطة القد تعلو نحو ٣٠ سم . ازهاره



جعرة



جرور



جعفيل ساطع



جعفيل متشعب



جعفيل مينور

جَعَلْ أَخْبَلْ جَعَلْ مُقَدَّسْ



جعل البساتين



جعل اخبل

الزنجاري . تعيش على ورق الصفصاف ولا تعف عن خلب الكرم . يرقها نمة تقرض كل ما وصلت اليه من جذور النبات .

٦٧٥٩ - جَعَلْ الْوَرْدُ هو السيتوان المذهبة ، اطلبها .

٦٧٦٠ - جَعَلْ خَلِي * Tropinata squalida (S). خنفساء من الجعليات تطول نحو ١٢ مم . ثوبها الى السواد اللامع تعلوه بكامله مع غمدتها خلة صفراء تشوبها خضرة زاهية . قوتها مفرز الازهار وبثلاثها . وهي تسطو على نباتات كثيرة اخصها الورد .

٦٧٦١ - جَعَلْ زَاهِر * Anoxia villosa (S). Hanneton velu (F).

خنفساء من الجعليات ، متوسطة القد تطول نحو ٢٥ مم . ثوبها الى البني تعلوه بكامله زغبة كثيفة صفراء اللون والمواج . يرقته تركب جذور الكرم والنجيليات البرية والزراعية فتعطبها .

٦٧٦٢ - جَعَلْ زُرْدِي * Potosia cuprea (S). Potosie métallique (F).

خنفساء من الجعليات متوسطة القد تطول نحو ٢٠ مم . ثوبها الى الاخضر الاسفع يعلوه مواج زمردية || يلتهم الثمار الناضجة من اي نوع كانت ويركب ازهار البلسان والورد فيتلفها . يرقته تعيش على المواد العضوية .

٦٧٦٣ - جَعَلْ شَائِع * ، هَنْشُونْ ، أَقْبَحْ

Melolontha melolontha, M. vulgaris (S). Hanneton H. commun (F). May beetle, White grub cockchafer (E). Feldmaikäfer, Engerling (D).

خنفساء من الجعليات . طولها يراوح من ٢٥ الى ٣٠ مم . رأسها اسود ترجها الصدرية سمراء اللون ، نحاسية المواج . ظهراتها الى السمرة الخنطية تعلوه خلة دقيقة . تركب وتلتهم اوراق جميع الاشجار اخصها المشمرة . مكثها اغبر اللون مستدير الشكل ترزه الانثى ، في التربة ، على عمق ٥ سم . ينقف بعد مشحه بنحو ٥٠٠ ساعة عن يرقات مقوسة الجسم ، غليظة الطرف ، لونها الى ابيضاض الاغبر تعرف بالدودة البيضاء تعيش طوال حياتها البرقية وقد تدوم من ٣ الى ٤ سنوات على جذور معظم النباتات فتقرضها وتوقع بها اشد الاذى . اطلب دودة بيضاء .

٦٧٦٤ - جَعَلْ صَبْفِي * ، رِيْزُوتْرُوكْ

Rhizotrogus aestivus, R. solstitialis (S). Hanneton d'été, Petit hanneton de la St. Jean (F). Summer chafer (E). Junikäfer, Brachkäfer (D).

خنفساء من الجعليات تطول نحو ١٦ مم . ثوبها خنطي اللون تعلوه ماجة بنية . زبانها عشارية الفواصل . اضرارها كحشرة كاملة لا قيمة لها . اما البرقة فهي كاللودة البيضاء لكنها اصغر حجماً واقصر عمراً تعيش في الحقول والمراعي والكروم تلتهم ما استطاعت من جذور .

٦٧٦٥ - جَعَلْ مُقَدَّسْ * ، أَبُو جَعْرَانْ ، أَمْ جَعْرَانْ

Atenichus sacer (S). Scarabée sacrée (F). Sacred beetle (E). خنفساء من الجعليات تطول نحو ٣٠ مم . ثوبها اسود اللون لامع المواج . يكثر وجودها مع يرقاتها في المزابل . مأواها

والالوان الزاهية . تتميز بجشها الربعة ، المفلطحة ، المحدبة الظهر . قرونها الاستشعارية ورقية الشكل . تعيش على المواد النباتية والعضوية . يرقاتها مؤذية || اشهر انواعها ما يتبع .

٦٧٥١ - جَعَلْ أَخْبَلْ * Potosia morio (S).

Potosie folle (F). خنفساء من الجعليات متوسطة القد تطول نحو ١٦ مم . ثوبها اسمر اللون او بني يعلوه مواج اسود || يركب الاشواك والثمار الناضجة والاشجار الجديدة التشذيب لامتصاص نفسها || يرقته تعيش على المواد العضوية .

٦٧٥٢ - جَعَلْ الْبَسَاتِيْن * Phyllopertha horticola (S). Hanneton horticole, H. des jardins (F). Garden chafer (E). Gartenlaubkäfer (D).

خنفساء من الجعليات صغيرة . القد تطول نحو ١٠ مم . رأسها وترجتها الصدرية الى الخضار العابق . غمدتها الى الصفار الخنطي تعلوه ماجة سمراء || يركب ازهار الاشجار المشمرة ولا يعف عن الاوراق الفتية النضرة . يرقته تركب جذور الزروع وبعض النباتات المروية .

٦٧٥٣ - جَعَلْ الدَّرَاقِيْن * ، جَعَلْ مَقْمَطْ ، بَكْنُودَه

Pachnoda foscata (S). Pachnode bandée (F). خنفساء من الجعليات تطول نحو ٣٠ مم . ثوبها الى السواد اللامع تحمل على جانبي ترجة الحلقة الصدرية خط اصفر يمتد الى الغمدتين فيقضيهما عند انتصافيهما || يركب ثمار الدراق فيعطبها ولا يعف عن ازهار الورد . يرقته تعيش في التربة على المواد العضوية .

٦٧٥٤ - جَعَلْ الشُّوكْ * Polyphylla fullo (S).

Hanneton foulon, H. du pin (F). Scarred melolontha (E). Müller, Walker (D).

خنفساء من الجعليات تطول نحو ٣٥ مم . ثوبها كستني اللون تعلوه ماجة سوداء . ظهراتها مرقوش بالايض . زبانها عظيمة الوريقات في الذكور || يركب الشوك واوراق الصنوبر فيؤذيها . يرقته تركب جذور الكرم والصنوبريات والنجيليات .

٦٧٥٥ - جَعَلْ الصَّنَوْبَر * Hanneton du pin (F).

خنفساء من غمديات الاجنحة تدعى جعل الشوك ، اطلبها .

٦٧٥٦ - جَعَلْ الْقَصَبْ * ، رُبِيَّة الْقَصَبْ

Peutodon dispar (S). خنفساء من الجعليات تطول نحو ٢٠ مم . ثوبها بني اللون تشوبه ماجة سوداء . تأثيرها قوية ، ارجلها مهازية الاطراف ، حافرة . تعيش مع يرقتها في التربة . تركب سوق القصب مسح الارض فتتغذى من عصيرها وقد تسبب في بعض الظروف القضاء على الاقلاب .

٦٧٥٧ - جَعَلْ الْكُثْبَانْ Hanneton foulon (F).

هو جعل الشوك ، اطلبه .

٦٧٥٨ - جَعَلْ الْكَرْمَةِ الْاَخْضَر * ، اَنُومَالْ الْكَرْمَةِ

Anomala vitis (S). Anomale de la vigne, Hanneton vert de la vigne (F). Anomala vitis (E). Anomala vitis (D). خنفساء من الجعليات تطول نحو ١٦ مم . ثوبها الى الخضار



(الانثى)



جعل الشوك (الذكر)



جعل خلي



جعل الكرم



جعل زيردي



جعل زابر



جعل صيفي



جعل شائع

٦٧٧٣ - جَغْرَافِي
Géographique (F).
Geographical (E).
مختص بعلم الجغرافية .

٦٧٧٤ - جَغْلَاس
Gagate (F).
هو الجنفل ، سمكة نهريّة ، اطلبه .

٦٧٧٥ - جَغْوَارٌ *
Felis onça (S). Jaguar (F).
نوع من الفهد وهو حيوان مفترس شرس الطباع ، شديد البطش ، كبير الجثة ، أنمر الثوب المرقط . اعطانه تشمل امريكه الجنوبيه وبعض مقاطعات امريكة الشماليه . يألف الاحراج والغابات القريبة من مجاري الماء . يسرح في الليل ويتسلق الاشجار بحفّة .

٦٧٧٦ - جَغْوَرُنْدِي *
Fells jaguarundi (S).
Jaguarundi (F). Jaguarundi (E).
حيوان لاسم مفترس من فصيلة السنوريات . موطنه معظم مناطق امريكة الاستوائية . يألف الاحراج التي تجاور مجاري الماء . ملجئه الحياتي زوجي . الاثني لا تضع اكثر من جروين . يحملها يدوم نحو ٧٠ يوماً || جسمه اهيف القوام رشيقه ، يطول نحو ١٤٠ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٦٢ سم . رأسه صغير الجرم . اذناه صغيرتان مستديرتان . عيناه كبيرتان مكحلّتان . ثوبه الى الشقعة السوية يسر في الرأس والظهر ويغير في الصدر والبطن . الاثني افصح ثوباً من الذكر || مسرحه دجوي . يتسلق الاشجار بحفّة ويمدو على الارض بسرعة . قوته الطير وكل ما يستطيع اليه من الحيوان .

٦٧٧٧ - جَفْ
Spatha (F). Spathe (E).
الجف غلاف طلع النخل ويدعى الجباب .

٦٧٧٨ - جَغْفَاخَة
Mourine glorieuse (F).
الجفاخة ، المورينة المبلولة ، سمكة بحرية من الاشلاق ، اطلبها .

٦٧٧٩ - جَغْفَار
Trypanosomiasis vivax (S).
Surra (F).
مرض يصيب بعض الحيوانات سببه وجود نقيبيات كرباجية في الدم .

٦٧٨٠ - جَغْفَاة
Sécheuse (F). Dryer (E).
كل آلة تستعمل في تجفيف المواد النباتية .

٦٧٨١ - جَغْفَال
هو رغوّة اللبن .

٦٧٨٢ - جَغْفَانَة *
Ampelographie (F).
Ampelography (E).
الجفانة علم يبحث في تحلية الكروم وفي ماهيتها النباتية الشاملة مع وصف الانواع والضروب .

٦٧٨٣ - جَفِثَتِ الزَّيْت
Grignon (F). Olive cake (E).
هو الثفل الناتج عن عصر الزيتون وذلك بعد رض الزيتون وعصره لاستخراج زيت .

٦٧٨٤ - جَفِثَتِ الشَّعِير
Tourallion (F).
Malt-Kilm (E).
هو ثفل الشعير الناتج عن صناعة الجعة (البيرا) بعد تجفيفه او تحميمه .

الذي تحفره في التربة يدعى كبرتل وهو مؤلف من نفقين وسردابين وحجرة فسيحة مستديرة . الاثني تمتح مكثها دانخل الكبرتل ترزه في كرة من الطين والمواد العضوية وتحافظ عليه لا تفارقه طوال مدة الارحام .

٦٧٦٦ - جَعَلٌ مُكْرَدَمٌ
Scarabée à large dôme (F).
هو القبتور ، حشرة نائلة ، اطلبها .

٦٧٦٧ - جَعَلٌ يَابَانِي *
Popillia japonica (S). Hanneton japonais (F).
Japanese beetle (E). Japankäfer (D).
خنفساء من الجعليات صغيرة القد تطول نحو ٨ مم . وهي تشبه جعل البساتين الا ان مواجها اخف سمرة واكثر خضرة وحرمة . الحشرة الكاملة تتركب جميع انواع الاشجار الشجرة تقرض الازهار والثمار والارواق .

٦٧٦٨ - جَعَلِيَّات
Scarabaeidae (S).
Scarabéidés (F). Scarabaeidae, May beetles, June beetles, Grubs (E). Skarabäen, Blatthornkäfer, Fächerhornkäfer (D).
فصيلة خنافس من رتبة غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها بضعة آلاف . معظمها متوسط القد ، مفلطح الشكل ، محدوب الظهر . رؤوسها قصيرة تحمل بعض التتواتر الشكلية المميزة . قرونها الاستشعارية ورقية التركيب شفعية التجميع مؤلفة من ٨ او ١٠ فواصل . اغمارها لا تلحف كامل البطن . الوانها زاهية . جرامها جاسة . ارساغها خماسية العقول وقد تخلو من الامامية في بعض الانواع . قوتها الازهار والثمار ويختلف الاجزاء النباتية الاخرى || يرقاتها غليظة الجسم والطرف . مثنية الشكل . قصيرة القوائم . قوية الفكوك . يغلب فيها اللون الاغبر . قوتها المواد العضوية وجذور النباتات وسوقها قرب سطح التربة .

٦٧٦٩ - جَعُولِي
Astruchon (F). Young ostrich (E).
صغير النعام قبل بلوغه الحول .

٦٧٧٠ - جَعِيلَة *
Ringicula (S).
Ringicule (F). Ringicula (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الجعديات . انواعها المماصرة المعروفة عديدة منتشرة في بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة معظمها يعيش على رمال الشواطئ || اصداؤها يرمية الشكل ضيقة قواعد الفوهة المفرّضة . اعقابها لولبية ثلاثية الدورة الحلزونية . الوانها عديدة تختلف مع الانواع يكثر فيها اللون الكستني والجقوي .

٦٧٧١ - جَعِيلَات *
Ringiculidae (S).
Ringiculidés (F). Ringiculidae (E).
فصيلة من الرخويات معديات الارجل خلفيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المماصرة المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصداؤها شبه يرمية الشكل ، مزومة الفوهات المحمّدة المعتدلة الانفراج ، لولبية القسم العلوي الدقيق الاعقاب || اعرف اجناسها واشهرها الجعيدة والولانة .

٦٧٧٢ - جَعِيْفَة *
Zoolite, Zoolithe (F).
Zoolite (E).
الجعيفة ج جمائف البقايا المطبورة المتحجرة من كل حيوان . ومنهم من غربها بكلمة « زوليت » .



جعل مقدس



جعل ياباني



جعيدة



جنوار



جغورندي

٦٧٨٥ - جَفَر

جفر الفحل : انقطع عن الضراب وقل ماؤه وذلك اذا اكثر الضراب حتى حسر وانقطع وعدل عنه . ويقال في الكيش ربحض . (اللسان) || ويقال ايضاً جفر واجتفر .

٦٧٨٦ - جَفَر . Herbe puante (F). Stinking herb (E). القبيح الرائحة من النبات .

٦٧٨٧ - جَفَرَة . Cavitè des côtes (F). جوف الصدر القائم بين القص ومنحني الضلوع .

٦٧٨٨ - جَفَرَة . هي خرق الدعيمة التي تحفر لها في الارض . ج جفر .

٦٧٨٩ - جَفَرُ سُونِيَا* ، جَفَرُ صُونِيَة . Jeffersonia (S). Jeffersonie (F). Twin-leaf (E). Jeffersonia (D). Jeffersonia (I).

نبات عشبي نجمي تزيني معمر من فصيلة البرباريسيات . اوراقه فلقتان متقابلتان يجمعها زناد قرصي الانتشاب . والورقة ملغاة خضراء نافرة العروق والشرابين . ازهاره فردية يحملها شمراخ مستطيل وهي تساعية البتلات والاسدية وحيدة الميسم الغليظ القلم . انواعه المعروفة اثنان واحد امريكي المنبت والاخر منشوري .

٦٧٩٠ - جَفَرِيَّات . Géphyriens (F).

فئة من الثدييات البحرية تعيش في الاسمال . البعض يعتبرها من الديدان والبعض الآخر من اشباه الديدان . دوبياتها تبدو كأنها لاسكية في حين ان الاعضاء قابلة التسكيم . جهازها العصبي يتألف من طوق بلعومي ومن شلّة بطنية كما هي الحال عند الحلفيات . القناة الهضمية مستطيلة ومتعرجة . الشقان منفصلان .

٦٧٩١ - جَفَصِين . Gypse (F). Gypsum (E). هو الجبصين ، اطلبه .

٦٧٩٢ - جَقْل . Crotte d'éléphant (F). Dung of elephant (E). الجفل هو روث الفيل .

٦٧٩٣ - جَقْلَة . الحفلة هي النملة . والجفلة من الشجر : الكثيرة الورق . والجفلة من الصوف : الحزة .

٦٧٩٤ - جَقْن . Cépage (F). Vine-plant (E). هي النبتة الواحدة من الكرم ويقال لها كرمه .

٦٧٩٥ - جَقْنَة ، حَبْلَة . Cep (F). Vine-stock (E). هي اصل الكرم وساقها .

٦٧٩٦ - جَقْنَة عُلَاء . Vigne-vierge (F). Wild-grape (E). جنس نباتات برية مدادة ، عارشة ، من فصيلة الكرنبات انواعه عديدة تجمعها عترتان : العنيب والهاذ اطلبهما .

٦٧٩٧ - جَقُور . Anaphrodisia (F). Anaphrodisy (E).

الجفور انعدام الشهوة الجنسية عند الانسان والحيوان ان ذكراً او انثى .

٦٧٩٨ - جَقُوف . Siccatif (F). Siccative (E). نمت يطلق على الادهان والزيت الحادة السريعة الجفاف

٦٧٩٩ - جَفِيل

الجفيل ما يقطع من الزرع اذا طال تخفيفاً له . راجع تجفيل وجفيل الغنم صوفها .

٦٨٠٠ - جَفِيل الحِيل

Lymphangite épizootique (F). Epizootic lymphangitis (E). هو ذنان الحيل .

٦٨٠١ - جَقْل . Chacal aboyeur (F). Prairie wolf, Caygotta of Mexico (E). Prairiewolf (D). نوع من ابن آوى يعرف بابن آوى الجقل ، اطلبه .

٦٨٠٢ - جَقَمَار . Galbula (S). Jacamar (F). Jacamar (E).

جنس طير من فصيلة الغلبوليات ورتبة الجواثم واهنات المناقير . انواعه المعروفة عديدة جميعها من طيور البلاد الامريكية الحارة والاستوائية || اجسامها صغيرة رشيقة تطول من ٢٠ الى ٢٣ سم . تتميز باستطالة المناقير المردنية الشكل . اجنحتها قصيرة . اذناها مستطيلة . اناؤها جميلة الالوان السفماء الموج || تألف الاحراج الرطبة . قوتها الحشرات . اعرف انواع هذا الجنس واشهرها الجقمار الاخضر والجقمار الاحمر الذنب .

٦٨٠٣ - جَقَمَار أحمر الذنب

Galbula ruficauda (S). Jacamar à queue rouge (F). طائر من الجقمار . موطنه بعض مناطق امريكة الحارة والاستوائية . يألف الاحراج الكثيفة الرطبة وضفاف البحيرات ومجاري الماء || جسده رشيق انقوام يطول نحو ٢٠ سم . ثوبه العلوي الى الخضار الاليس الزيتي الموج . ذنبه اهليلجي الشكل ، احمر اللون . زوره الى البياض التبي . صدره الى الشقحة يطولها تمشيع اخضر وصنابي . بطنه وزيكاه الى الشبهة . ساقه قصيرة سمراء اللون . حذقة عينه حمراء قرمزية || قوته الحشرات اخصها الفراش يلتقطها طائرة وقلما يطاردها على الارض لانه اخرق لا يجيد الانتقال عليها || يدثن عشه في افحوص يخلده في الجرف || الانثى تبيض من ٤ الى ٦ بيضات تحضنها وحدها من ١٥ الى ١٦ يوماً . الذكر يؤمن لها الغذاء وتنظيف الافحوص ومدخله من الاوغام .

٦٨٠٤ - جَقَمَار أخضر . Galbula viridis (S). Jamacar vert (F).

طائر من الجقمار . موطنه امريكة الاستوائية . يألف الرياض وضفاف مجاري الماء || جسده رشيق القوام يطول نحو ٢٢ سم . ثوبه العلوي الى الخضار الذهبي الموج . صدره وبطنه الى الشقحة . زوره الى البياض العاجي . مناقده مردني الشكل ، مستطيل الجرم . قائمتاه قصيرتان . حذقة عينه ذهبية اللون || قوته الحشرات اخصها الفراش يلتقطها طائرة وجائمة || يدثن عشه في افحوص يخلده عند ضفاف الانهر وفي جرفها . الانثى تبيض من ٤ الى ٦ بيضات تحضنها وحدها نحو اسبوعين بينما الذكر يؤمن لها الغذاء وتنظيف الافحوص ومدخله من الوخم .

٦٨٠٥ - جَكَرْسِين . Gecarcinus (S). Gécarcin (F). Gecarcinus (E).

جنس حيوانات برية - بحرية من القشريات عشاريات الارجل وفصيلة الجكرسينيات . انواعه المعروفة قليلة العدد



جفسونيا



جقمار احمر الذنب




جكرسين



جِلَاخ رَتِيّ



جِلَاخ عَفْرِيّ



جِلَاخ مِيدُول



جُلَاهِب

جسمه كبير القد يطول نحو ١٤٠ سم. بما فيه الذنب ويعمل نحو ٦٥ سم. رأسه مستضخم الجرم. شططه زلقوي الشكل مقطوم. أذناه وعيناه صغيرتان. عفرته كثيفة، مستطيلة الشعر، تمتد إلى الرأس والعنق والصدر والظهر. الانثى عادمة العفرة. قوائمه معتدلة الطول، غليظة وقوية. ذنبه بالغ الطول، اسطوانى الشكل، جشل الكشّة || ثوبه إلى السمرة القاتمة. منكباؤه وظهريه والمنطقة الخلفية وساعدها وكشّة ذنبه إلى السواد الاحمر. رأسه وعنقه وإبطاه إلى الشهية السمراء || الانثى تضع جرواً واحداً ترصده نحو ستة شهور.

Galeus (S).

Milandre (F). Tope (E).

جنس اسماك بحرية، ولودة، مفترسة، من فصيلة البنيكيات انواعه المعروفة خمسة. جميعها شرسة، بطاشة، مفامرة || اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها وشعية الشكل، قليلة الضخامة تطول من ١٥٠ إلى ٣٥٠ سم. اثوابها إلى الطحلة السمراء تعبق في الظهر وتغير وتبيض في البطن || اشهر انواعه الجلاذ المبدول والجلاذ الكلبي.

Galeus canis (S).

Milandre d'Europe (F). European Tope (E).

نوع من الجلاذ الشرس البطاش. اعطانه بعض مناطق البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي قرب البلاد الاوربية والافريقية || يعتبر من الاسماك اليمية ويقترب من المجادح حيث تكثر القشريات والرخويات || جسمه وشعي الشكل يطول نحو ٢٠٠ سم. رأسه مقطوم الخطم كما في الكلب. فة سفلي الارتكاز واسع الشدق. اسنانه محرمة، حادة الاطراف || لحمه كاعن الصنف قل من يرغب فيه.

Eugaleus galeus (S).

Milandre commun (F). Common Tope (E).

نوع من الجلاذ. اعطانه جميع اقاليم البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي || يعتبر من الاسماك اليمية الشرسة البطاشة المغامرة. لا يعبر المياه الاقليمية الا عند تعقبه اسراب السردين والبوري || جسمه وشعي الشكل يطول نحو ٣٠٠ سم. رأسه ذلق الخطم. فة سفلي الارتكاز، واسع الشدق. اسنانه محرمة حادة الاطراف كالخناجر || لحمه كاعن الصنف قل من يرغب فيه.

Exhibitionisme (F). جِلَاخَة، مُجَالَعَة (E).

Exhibitionism (E).

الجلاعة الميل المفرط لعرض الحاسر والشوار أو مشاهدة عرضها. جنون المجال.

٦٨٢٧ - جِلَام هي النيويس المجلومة الشعر.

Tonte (F). Clipping (E).

٦٨٢٨ - جِلَامَة : ما جز من الصوف. وجلم الصوف : جزه.

Pterocera (S).

Pterocère (F). Scorpion shell (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الدلاعيات. انواعه المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة || اصداؤها متسامكة، شبه

٦٨١٩ - جِلَاخ رَتِيّ *، أَشْتَرُبْ أَخْمَر،

رَسْكَاس أَخْمَر (S). Scorpène truite, Rascasse rouge (F). Red scorpion-fish (E).

نوع من الجلاخ. سمكة بحرية بيوض. اعطانها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط. تعتبر من اسماك المجادح. تعيش عند قواعد الثقاف بين المشريات وفي الاسمال. قوتها القشريات والرخويات... || جسمها اهليلجي الشكل، يطول من ٢٥ إلى ٤٠ سم. ثوبها إلى الحمرة المغراء يعلوها توشيح اسمر واصفر يعبق في الجانبين وفي الظهر. زعانفها إلى الزرقة يعلوها تمشيع حنطي. رأسها غليظ الجرم، مستهجن الشكل، مراكب الطنوف العظمية والمزق الجلدية والشول. خطمها مقطوم الطرف. فكها الاسفل يتقدم الاعلى. اسنانه متراسة حادة وصغيرة. شدقها معتدل الانفراج. عينها كبيرتان، ماحتان، رفيعة الارتكاز. زعانفها متباينة الاشكال، الظهرية واحدة مستطيلة، الذيلية محدودة الطرف || لحمها كاعن الصنف، قل من يرغب فيه.

٦٨٢٠ - جِلَاخ عَفْرِيّ *، أَشْتَرُبْ أَسْمَر،

رَسْكَاس أَسْمَر (S). Scorpène porc, Rascasse brune (F). Brown scorpion-fish (E).

نوع آخر من الجلاخ. اعطانها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط. تعتبر من اسماك الشطوط والمجادح الصخرية. تتميز بمناسخها الظهرية الحادة الاطراف السامة || جسمها اهليلجي الشكل يطول من ٢٠ إلى ٤٠ سم. ثوبها إلى الكلمة يسر وينحرف نحو الكستني من الخط الجانبى إلى الظهر، ويغير ويبيض من الخط الجانبى إلى البطن. رأسها مستهجن الشكل، كثير التتواتر البسيطة والمركبة، مراكب الطنوف والتجاويف العظمية. فكها غليظان، متباين الاسنان الصغيرة. شدقها معتدل الانفراج. عينها كبيرتان، رفيعة الارتكاز، قليلتا البروز. زعنفتها الظهرية واحدة، قاطبة. زعنفتها الذيلية مضلعة الصفحة، مستديرة الطرف السرح || لحمها كاعن الصنف، قل من يرغب فيه.

٦٨٢١ - جِلَاخِيَّات (S).

Scorpaenidae (F). Scorpaenidés (E).

فصيلة اسماك بحرية من رتبة شائكات الزعانف. اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٧٠ منتشرة في معظم بحار العالم || جميع انواعها معتدلة القد أو صغيرة. تتميز باشكالها المستهجنة وبرؤوسها الغليظة، المزبئة، الشائكة. وبحاسرها المدرعة المتراكبة الاطراف. زعانفها حادة المناخس السامة || اشهر اجناسها واعرفها الجلاخ والجلاخادة والسبوجة.

٦٨٢٢ - جِلَاخَة، عَوْفَر.

Theropithecus gelada (S).

Théropithèque gélada (F). Gelada (E).

قرد وحيد الجنس والنوع من فصيلة الهجسيات. موطنه بعض جبال الحبشة من ارتفاع ٢٥٠٠ إلى ٤٠٠٠ متر عن سطح البحر. ملجئه الحياتي جماعي. جماعته كثيرة العدد الذي يراوح من ١٠٠ إلى ٥٠٠ || قوته الحبوب والثمار على اختلافها ويصل الزنايق والسحليات وبعض الاشباب والحشرات والديدان والحلزون والبزاق والغذاء... ||

ende platterbse, Woh, Wicke (D). Cicerchia odorosa, Pisello odoroso, P. flore (I).

نبات عشبي حولي عارش عديد الضروب والاصرام . يعلو من متر الى مترين . ساقه مضلعة مجنحة . اوراقه ثنائية قليلة الزغب . وريقاته بيضية مستطيلة . ازهاره فواحة العرف العطري المستحب . وهي كبيرة القد ، طويلة الزناد . ثماره سنفية ليفية خشنة . حبه كروي الشكل ، ملس القشرة || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

٦٨٤٠ - جلبان كبير الزهر

Lathyrus grandiflorus (S). Gesse à grandes fleurs (F). نبات عشبي عارش معمر يعلو نحو ١٥٠ سم . ساقه مضلعة مجنحة . وريقاته بيضية الشكل نافرة العروق . ازهاره متوسطة القد وردية اللون ، طويلة المعاليق || ازهاره يستمر من نيسان الى حزيران .

٦٨٤١ - جلبان مجلان

Lathyrus magellanicus (S). Gesse de Magellan (F). نبات عشبي عارش معمر يعلو من ٢٠٠ الى ٣٥٠ سم . ساقه مضلعة . وريقاته مستعرضة النصل الامرد . ازهاره عنقودية بنفسجية عادمة العرف || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

٦٨٤٢ - جلبان مزروع* ، خلر

Lathyrus sativus (S). Gesse cultivée, Lentille d'Espagne, Pois de brebis, Jarosse, Jarousse (F). Bitter vetch, chickling vetch (E). Saatplatterbse (D). Cicerchia coltivata, Pisello cicerchia (I). نبات عشبي زراعي حولي تعتلفه الماشية فيشعلها ويسنها . حبه غني بالمواد الغذائية اخصها الازوت والعنصر النشوي .

٦٨٤٣ - جلبان مستدير الورق

Lathyrus rotundifolius (S). Gesse à feuilles rondes (F). نبات عشبي عارش معمر يعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . ساقه مضلعة مجنحة . وريقاته شبه مستديرة ، بارزة العروق . ازهاره وردية اللون طويلة المعاليق || ازهاره يستمر من تموز الى آب .

٦٨٤٤ - جلبان مفصلي* ، دُحْرَج

Lathyrus articulatus (S). Gesse articulée (F). Jointed pea (E). Platterbse (D). Cicerchia articulata (I). نبات عشبي بري حولي يكثر بين الزروع وفي الارض البور ساقه مفصلية كثيرة العقد . وريقاته ضيقة مستطيلة . ازهاره صغيرة حمراء اللون . بذوره مستديرة شديدة الصلابة .

٦٨٤٥ - جلبالين ، لايرين

Lathyrine (F). مادة شبه ثلوية موجودة في حبوب الجلبان .

٦٨٤٦ - جلبهر

Rhinothèque (F). الجلبهر بشرة المنقاد عند الطائر .

٦٨٤٧ - جلبتهنك

Réséda blanc (F). هو الخزام الابيض ، اطلبه .

٦٨٤٨ - جلبوط

Oiselet, Oisillon (F). Small bird, fledgling (E).

الجلبوط فرخ العصفور من حين نقفه الى حين طيرانه واستقلاله . ج جلابيط .

اهليلجية الشكل ، متباينة الحجم ، منها الصغيرة والكبيرة التي تطول نحو ٣٢ سم . || تتميز بزوائدها الحثارية الصدقية المادة ، المهدبة ، المقرنة الشكل المحدد ، منها خمس جانبية النسي . وواحدة رأسية تقابلها العقبية .

٦٨٣٠ - جلب

Duramen (F). Heart-wood (E). خشب قلب ساق الشجرة وهو اصلب جزء من الخشب .

٦٨٣١ - جلب

Nuage sans pluie (F). Cloud without rain (E). هو السحاب لا ماء فيه .

٦٨٣٢ - جلب

هو الجلاب ، اطلبه .

٦٨٣٣ - جلبان

Lathyrus (S). Gesse (F). Vetch (E). جنس نباتات عشبية برية وزراعية من سبط الكرسيات وفصيلة القطانيات الفراشية . انواعه عديدة تقارب المئة معظمها بري ومنها زراعي علني وبعضها تزييني . اشهرها ما يتبع .

٦٨٣٤ - جلبان أزرق

Lathyrus cyanens (S). Gesse bleue (F). نبات عشبي عارش معمر يعلو نحو ٣٠ سم . اوراقه مركبة شفعية . وريقاته من ٤ الى ٨ ضيقة مستطيلة مدببة . ازهاره ثنائية او ثلاثية التجميع متوسطة القد زرقاء اللون . ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

٦٨٣٥ - جلبان أزغب

Lathyrus pubescens (S). Gesse pubescente (F). نبات عشبي عارش معمر يعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . سوقه واوراقه زباء . ازهاره عنقودية كبيرة القد لونها الى الازرق البنفسجي يعلو توشيح ابيض || ازهاره صيفي .

٦٨٣٦ - جلبان أفاق* ، شوارب القط

Lathyrus aphaca (S). Gesse sans feuillés, Poigreau, Pois de serpent (F). Yellow vetchling (E). Ranken-platterbse (D). Cicerchia senza foglie, Pitine, Vecchia bastarda (I).

نبات عشبي بري حولي . ساقه مستقيمة ملساء غبراء اللون . وريقاته صغيرة شبه خيطية اذيناتها طرية الشكل . ازهاره فردية طويلة الزناد . يكثر في الاراضي الجبلية .

٦٨٣٧ - جلبان طنجة

Lathyrus tingitanus (S). Gesse de Tanger (F).

نبات عشبي حولي عارش . يعلو نحو المتر . وريقاته سنائية النصل الامرد . ازهاره عديمة العرف لونها الى الحمرة المابقة || ازهاره يستمر من حزيران الى آب .

٦٨٣٨ - جلبان عريض الورق*

Lathyrus latifolius (S). Gesse à larges feuilles, G. à bouquets (F). Everlasting pea (E). Grosse platterbse, Wicke (D). Pisello a mazzetti (I).

نبات عشبي عارش معمر عديد الضروب يعلو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . ساقه مضلعة رباعية الاجنحة . وريقاته مستعرضة لسنة النصل البارز العروق . ازهاره كبيرة مستطيلة المعاليق . الزائنها مختلفة يكثر فيها الاحمر . ازهاره يستمر من حزيران الى آب .

٦٨٣٩ - جلبان عطر* ، خلر المسك ، خلر عطر

Lathyrus odoratus (S). Pois de senteur, Gesse odorante, Pois musqué (F). Sweet-pea (E). Wohlriech-



جلبان أفاق



جلبان عريض الورق



جلبان عطر



جلبان مزروع



جلبان مفصلي

انقرضت ولا نأقي على ذكرها . والثانية ، حالية ، تعرف
بجلدية الاجنحة . اشهر انواعها واعرفها البهيك .

٦٨٦٣ - **جلدية الاجنحة** (S).
Dermaptera (F). Dermaptera, Earwigs (E).
Ohrwürmer (U).

رتبة حشرات من جلديات الجناح بعضها عديم الاجنحة
وبعضها الآخر يحمل اجنحة جلدية قصيرة . ارساغها
ثلاثية العقل . مركها على شكل الجلم اللاقط تستعمله
الحشرة في الدفاع والهجوم || فصائلها واجناسها وانواعها
نحو ٥٠٠٠ . جميعها من الحشرات الدالسة تعيش تحت
الاشجار والاحجار . قوتها المواد النباتية والحيوانية .
اناثها تضع المكن وتحضنه حتى النقف .

٦٨٦٤ - **جلدية التنفس** (S).
Dermobranche (F). Dermobranchiate (E).

نعت تعريفي يطلق على الرخويات وغيرها من الدويبات
البحرية التي تقوم جلودها مقام الخياشيم في التنفس .

٦٨٦٥ - **جلد** (F). Mole (E).

هو الخلد ، اطلبه . ج مناجذ .

٦٨٦٦ - **جلدية**

شجرة صغيرة . ج جلادي . قال ابو حنيفة الجلادي
صغار الطلح .

٦٨٦٧ - **جلينين** ، **جيلينين** (S).
Gélasine (F). Gelasine (E).

نبات عشبي درفسي سبروتي وحيد الجنس وأنوع من فصيلة
السوسنيات . منبته بعض مناطق الاروغواي . ساقه شراخية
تنتهي بشراخف تطوقه الازهار . اثمارها جرسية الشكل ،
قصيرة الانبوب ، زرقاء اللون مرقوشة بالابيض والاسود .
اوراقه مغضنة صغيرة الجرم ، باهتة الخضار البحري
المواج || تزرع للتزيين ضمن البيوت وفي الحدائق ||
تنويرها يستمر طوال شهر ايار .

٦٨٦٨ - **جلسان** * ، **أزالية**

Rhodora, Rhododendron azalea (S). Azalée (F).
Azalea (E). Azalie (D). Azalea (I).

جنس نباتات شجرية وجنبية من فصيلة الخلنجيات .
انواعه عديدة بعضها زراعي تزييني . اوراقه خلية ، عابلة
بمعظمها . ازهاره لاقاسية ، تويجها خماسية التفصيص ،
تلاتها جميلة الشكل مختلفة الالوان الزاهية . اسديتها من
٥ الى ١٠ ، مآبرها بارزة || يزرع للتزيين في الحدائق
والمراكن وداخل البيوت . يتكاثر بالعقل ، يرغب في
الاثربة الخوارة المعتدلة التركيب . يحثي الرطوبة
المستحكمة وكثرة المواد الازوتية || اشهر انواعه
الترينينية ما يتبع .

٦٨٦٩ - **جلسان ابيض**

Rhododendron albiflorum (S). Azalée blanche (F).
نوع من الجلسان مهدء امريكة الشمالية . لا يخشى البرد ،
يملو من ٥٠ الى ١٥٠ سم . اوراقه مستطيلة قليلة الزغب .
ازهاره نورية ورية التجميع لونها الى البياض الثلجي ،
قطرها نحو ٤ سم . || ازهاره يستمر من ايار الى تموز .

٦٨٧٠ - **جلسان القرم**

Rhododendron luteum (S). Azalée pontique (F).
نوع من الجلسان مهدء القرم والفوقاز . ضرابه عديدة

٦٨٤٩ - **جلجان** (F).
Sésame, Jugeoline (F).
Sesame, Gingelly (E).
راجع سمسم .

٦٨٥٠ - **جلجل** (F).
Chanvre du Deccan (F).
Deccan hemp (E).
راجع تيل .

٦٨٥١ - **جلجليات** (F).
Campanulaires (F).
رتبة من الهدريات وهي من الحيوانات الدنيا المائية .

٦٨٥٢ - **جلج** (F).
Abroutissement (F).
Damage done (E).
الجلج هو رعي الماشية للاطراف الخضر من الشجر .
يقال جلجت الماعز الشجر واشجار مجلوجة . ويقال
ايضا جلج الماعز الشجر : رعي اعاله وقشره (الاساس) .

٦٨٥٣ - **جلحاب** (F).
Pollinisateur (F).
الجلحاب : فعال النخل (اللسان) .

٦٨٥٤ - **جلد** (F). Skin (E).
هو غشاء جسد الحيوان .

٦٨٥٥ - **جلد** (F). Frost (E).
هو جمود الماء اي تماسك اجزائه من هبوط الحرارة الى
ما دون الصفر .

٦٨٥٦ - **جلد اسود** (F).
Gelée noire, G. de groseille (F). Red-currant
jelly (E).

جلد يحصل في فصل اشتهاء يحس البراعم والافنان فتسود .

٦٨٥٧ - **جلد الربيع** ، **ملاح** ، **صبارة** ، **صبر** ،
جهد الندي

Gelée blanche, G. printanière (F). White frost,
Hoar-frost (E).

جلد يحصل في الربيع يجهد الندي على الورق فيبدو كجلج
ابيض ناعم نثرته الطبيعة فوق الارض وما عليها .

٦٨٥٨ - **جلدوم** * (S).
Gélide, Gélidie (F). Gelidium (E).

جنس نباتات بحرية من الخفيات الحمر . انواعه المعروفة
كثيرة العدد منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة
الحرارة || كلاليتها صغيرة . سوقها فرقة . اوراقها ريشية ،
متشعبة ، هلامية التركيب . خلاياها ثلاثية الطبقات ،
ضمية التلك . لوانها تراوح من الاحمر الباهت الى الارجواني
العابق || جميعها مأكولة وتعد من التوابل الفاخرة .

٦٨٥٩ - **جلدي** ، **فضائي** (F).
Spatial
نعت تعريفي يطلق على ما يختص بالجلد او بالفضاء .

٦٨٦٠ - **جلدي** (F).
Coriace (F).
Tough, Leathery (E).
نعت تعريفي توصف به الاشياء الصلبة كالجلد .

٦٨٦١ - **جلدي التنفس** (F).
Dermatopnonte (F).
Dermatopnonte (E).

نعت تعريفي يطلق على كل حيوان يتنفس اي يتنفس من
جلده .

٦٨٦٢ - **جلديات الجناح** (F).
Dermatéroïdes
طبقة حشرات من شعبة البرقانيات تشمل رتبتي الاولى



جلدوم



جلسان

تعلو من متر الى مترين . اوراقها معينة الشكل ، نصلها خفي الصفحة السفلى الصفراء البشرة . ازهارها عشارية الاسدية وتريه او شفعية التجميع لونها الى الوردي ، قطرها نحو ٤ سم . ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

٦٨٧٧ - جُلَسَانُ مُكَبَّس

Rhododendron rosmarinifolium (S). Azalée à feuilles de romarin (F).

نوع من الجلسان مهدد الصين . ضرابه عديدة جميعها بجلات تعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . اوراقها عروية مستطيلة ، نصلها جامد التركيب ، قليل الزغب ، يطول نحو ٦ سم . ويعرض ٤ . ازهارها مكبسة فواحة العرف المستحب . ألوانها متعددة يكثر فيها الاحمر والابيض والوردي || ازهارها يستمر نحو ستة اسابيع ابتداء من اواسط نيسان .

٦٨٧٨ - جُلَسَانُ هِنْدِي

Rhododendron indicum (S). Azalée de l'Inde (F).

نوع من الجلسان مهدد الهند ضرابه كثيرة العدد جميعها بجلات صغيرة القد تعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم . سوقها وفروعها مهدبة . اوراقها عروية ، اهليلجية ، نصلها لامع البشرة يطول نحو ٥ سم . ازهارها فردية كبيرة القد قطرها نحو ٨ سم . بتلاتها مختلفة الالوان ، مآبرها حر . ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٦٨٧٩ - جُلَسَانُ يَابَانِي

Rhododendron japonicum (S). Azalée du Japon (F).

نوع من الجلسان الياباني المنبت يعلو نحو ٢٠٠ سم . اوراقه سنانية الشكل طولها نحو ٨ سم . عرضها ٣ ، نصلها امرط الصفحة العليا ازغب السفلى . ازهاره نورية التجميع متوسطة القد ، قطرها نحو ٥ سم . || ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

٦٨٨٠ - جُلَسْدَة ٥

Concrescence (F).

Concrescence (E).

الجلدة ، في علم النبات ، اثتلاف او التحام اجزاء متلاصقة . وهي من الاسباب الرئيسية في التنوع الشكلي المفرط الملحوظ في الهيكلية النباتية .

٦٨٨١ - جُلَسُيَّة ٥*

Hermannia denudata (S).

Hermannie dénudée (F).

تبات جنبي معمر من فصيلة الخيازيات . موطنها بعض مناطق افريقية الشمالية والجنوبية . تزور للتزيين || ساقها منتصبه قليلة الفروع تعلو نحو ١٧٠ سم . اوراقها متعاقبة ، معنقة ، بيضية النصل البحري الخضار . ازهارها توأمية ، محورية وطرفية الارتكاز ، متدلية ، شبه جرسية الشكل ، مستطيلة المالحق ، لونها الى الصفار الكبريتي ، عرفها عذب الازيح . ثمارها حقية صغيرة الحجم || تنويرها يستمر من نيسان الى تشرين .

٦٨٨٢ - جُلَسِيم ٥*

Gelasimus (S).

Gélasime (F). *Gelasimus* (E).

جنس حيوانات قازبة من القشريات عشاريات الارجل قصيرات الذيل وفصيلة الدوبريات . انواعه المعروفة خمسة اعطائها بعض المناطق الاستوائية والحارة . تعيش في مناطق الشواطئ البحرية وفي اوسال الشوار . ارجارها انفاق مستطيلة افقية الامتداد تحتفها في التربة وتنتهي برءاء فسيحة || اجسامها صغيرة تزاوية الشكل . تتميز بالفارق

جميعها جنبات متوسطة وصغيرة القد تعلو من ١٠٠ الى ١٧٠ سم . اوراقها اهليلجية طولها من ٩ الى ١٤ سم . عرضها من ٣ الى ٤ سم . نصلها امرط الصفحة العليا خفي السفلى . ازهارها فواحة العرف المستحب ، كبيرة القد قطرها نحو ٧ سم || ازهارها يدوم شهراً واحداً من اواخر نيسان الى اواخر ايار .

٦٨٧١ - جُلَسَانُ خُمَاسِيّ الْوَرَق

Rhododendron quinquefolium (S). Azalée à 5 feuilles (F).

نوع من الجلسان مهدد اليابان . بجلاته صغيرة القد تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم . اوراقها طرفية الارتكاز ضمية خماسية . نصلها ضيق الصفحة ، مهدب البشرة . ازهارها فردية كبيرة ، قطرها نحو ٧ سم . ازهارها يستمر من شباط الى نيسان .

٦٨٧٢ - جُلَسَانُ شَجَرِي

Rhododendron arborescens (S). Azalée arborescente (F).

نوع من الجلسان مهدد امريكا الشمالية يعلو من ثلاثة الى ستة امتار . اوراقه مستطيلة ، نصلها مهدب البشرة اللامعة ، يطول نحو ٧ سم . ويعرض ٣ ، ازهاره فواحة العرف المستحب ، قطرها نحو ٥ سم . لونها الى الابيض يعلوه موج ورددي || ازهاره يستمر من نيسان الى حزيران .

٦٨٧٣ - جُلَسَانُ صِينِي

Rhododendron sinense (S). Azalée de Chine (F).

نوع من الجلسان . ضرابه وهجنه عديدة جميعها جنبات متوسطة القد تعلو من متر الى مترين . اوراقها سنانية مستطيلة ، طولها نحو ١٠ سم . وعرضها ٣ نصلها خفي البشرة المهدبة . ازهارها نورية التجميع ، كبيرة الفصلات . انبوبية التويجات ، خلية البتلات ، خماسية الاسدية . ازهارها يستمر من نيسان الى ايار .

٦٨٧٤ - جُلَسَانُ كَنَدِي

Rhododendron canadense (S). Azalée du Canada (F).

نوع من الجلسان مهدد كندا . ضرابه عديدة جميعها بجلات صغيرة القد تعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . اوراقها اهليلجية ، نصلها بحري اللون ، ازغب الصفحة السفلى . ازهارها نورية التجميع تويحية الارتكاز قطرها يراوح من ٣ الى ٤ سم . ألوانها مختلفة منها الابيض والوردي والاحمر || ازهارها يدوم من اذار الى ايار .

٦٨٧٥ - جُلَسَانُ كُورِيَّة

Rhododendron Coreanum (S). Azalée de Corée (F).

نوع من الجلسان مهدد بلاد كورية . ضرابه خمسة جميعها بجلات تعلو من ٣٠ الى ٩٠ سم . اوراقها سنانية . نصلها جامد التركيب ، خفي البشرة ، يطول من ٥ الى ٧ سم . ازهارها نورية وتريه التجميع ، مكبسة ، ليلكية اللون ، ارجوانية الرقشة ، عشارية الاسدية ، صغيرة القد قطرها نحو ٣ سم . || ازهارها يستمر شهراً واحداً من نيسان الى ايار .

٦٨٧٦ - جُلَسَانُ مَعِين

Rhododendron rhombicum (S). Azalée à feuilles en losange (F).

نوع من الجلسان مهدد اليابان وهو جنبه متوسطة القد



جُلَسِيَّة



جُلَسِيم

٦٨٩٣ - جَلْمِيَّات الماء
Puffinidés (F).
Puffinidae (E).
عمارة وحيدة الجنس ، خماسية الانواع ، من فصيلة الرغائيات كفيات القدم .
اشهر انواعها :

جلم الماء الانكليزي Puffin des anglais
جلم الماء الروماني Puffin cendré
جلم الماء الكبير Puffin majeur

٦٨٩٤ - جُلْنَار
Fleurs de grenadier (F).
Blossoms of pomegranate tree (E).
زهر الريان . واحدته جلنارة .

٦٨٩٥ - جَلْنَجِيَّين
Miel rosat (F).
عصير يستحلب من بتلات الورد الجافة الحمراء اللون بعد نقعها بالماء الساخن .

٦٨٩٦ - جُلْنِسْرِين
Eglantier (F). Dog-rose (E).
اطلب نسرين .

٦٨٩٧ - جَلْنَهَبِيَّي
Ripicole (F).
نعت تعريفي يطلق على كل حيوان يعيش على ضفاف الانهر والبحيرات .

٦٨٩٨ - جَلْهَمَة
Glabelle (F). Glabella (E).
الجلهه التواء الافقي الحاصل في عظم الجبين بين حجاجي حواجب العين .

٦٨٩٩ - جَلْهَم
Bourdaïne (F). Black alder (E).
اطلب نبق اسود .

٦٩٠٠ - جُلْهَم
Xérus (F). Xerus (E).
جنس حيوانات لبونة قاضمة من فصيلة السنجابيات . انواعه نحو ٢٠ جميعها افريقية سريعة الحركة والانتقال . رؤوسها مستديرة ، جباهها ضيقة ، اذانها صغيرة ، اذنانها طويلة اسطوانية ، قوائمها قصيرة ، اطرافها قليلة الانمكاف ، صوفها خشن شائك || تتسلق الاشجار برشاقة . قوتها النبات والحشرات وصغار الطير والعطاء . جحورها انفاق وسرايب مستطيلة تحفرها في الارض . اناثها تضع من ٢ الى ٤ ادراص تبصر بعد وضعها بأسبوع . اشهر انواعه ما يلي :

٦٩٠١ - جُلْهَم أَصْهَب
Xerus flavus (S).
Xérus blond (F).
نوع من الجلهم صغير القد طوله نحو ٢٠ سم . وذنبه ١٨ ثوبه الى الصهبة الشقراء || موطنه الصومال ، يعيش قرب الدساكر والحقول المزروعة .

٦٩٠٢ - جُلْهَم الأَطْلَس
Xerus getulus (S).
Xérus barbaresque (F).
نوع من الجلهم صغير القد طوله نحو ١٨ سم . وذنبه ١٤ ثوبه الى الصهبة الطحلاء . يعيش مع اقترابه من ثبج الظهر . راسه وظهوره موشحان بخطين اخضرين يفصلهما خط عريض اسمر || موطنه جبال الاطلس يألف الاحراج والادغال والمواقع الصخرية .

الشاسع بين ملقطيها ، الواحد بحجم القائمة اي الرجل والثاني اربعة اصعاف الاول ان لم يكن أكثر . اثنائها الى الحمرة البنفسجية يملوها موج وردي .

٦٨٨٣ - جَلْفِيَّات
Embioptères (F).
Embioptera (E).
رتبة حشرات من طبقة مستقييات الجناح . اجناسها نحو ٧٠ جميعها صغيرة القد غليظة الرأس مستطيلة الجسم . ذكورها مجنحة ، اناثها معاري . قرونها الاستشعارية خيطية . عيونها قاشرة بسيطة . تحمل في طرف كل عقلة من ارساخ ارجلها الامامية غدة صغيرة تفرز خيوطاً حريرية .

٦٨٨٤ - جُلْكَآ* ، جَلْكَى
Petromyzon (S).
Lamprole (F). Lamprey (E).
جنس اسماك غضروفية ماصة من الاشلاق وفصيلة الجللكيات . انواعها ثلاثة تعيش في البحار وتسرع في المياه العذبة حيث تقيم من ٣ الى ٥ شهور . اجسامها مستطيلة كاجسام الحنكليس وهي عريانة دبقة خالية من الحراشف . قوتها ما تمتصه من دماء الحيوانات والجيف البحرية .

٦٨٨٥ - جَلْكَيَّات
Pétromyzonidés (F).
Petromyzonidae (E).
فصيلة اسماك من الاشلاق الماصات .

٦٨٨٦ - جَلْكَيَّة
Catastrophisme (F).
Catastrophism (E).
نظرية حصلية تقول بان التغييرات التي طرأت على سطح الكرة الارضية كان سببها انفجارات مفاجئة وانقلابات عظيمة الوقع بدلت المعالم الاصلية . وهذه النظرية تعاكس التناقية والركانة والارتقاء .

٦٨٨٧ - جَلَم
Nouvelle lune (F).
New moon (E).
الجلم الهلال ليلة يهل .

٦٨٨٨ - جَلَم ، جَلَمَان ، مَقْرَاض ، مَجَز
Forces (F). Shears (E).
مقص كبير يستعمل لجز الصوف .

٦٨٨٩ - جَلَم
Pincement (F). Nipping off (E).
الجلم والقرط والقرص تعني قطع رؤوس الاغصان او الاذنات الطرية .

٦٨٩٠ - جَلَم
Emerillon (F). Merlin (E).
طائر من الكونج يعرف باليويو ، اطلبه .

٦٨٩١ - جَلَم الماء*
Puffinus (S).
Puffin (F). Shearwater (E).
جنس طيور بحرية من كفيات القدم تطير على الماء فتبدو كأنها تقصها في طيرانها . وهي كبيرة الجثة بسطتها نحو المتر . مناقيرها حجن الاطراف . سواقطها وظهورها سود . اعناقها وصدرها وربطونها بيض . موطنها البحار الباردة . يكثر وجودها على شواطئ اوروبا الشمالية .

٦٨٩٢ - جَلْمُودِي
Lithophile (F).
Lithophile (E).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات يستطيع الانتاش فالنمو على الصخور .



جلكا



جلم الماء

٦٩١١ - جُلِّيَّات *
Rosées (F).
سبط من فصيلة الورديات .

٦٩١٢ - جَلِيد
Gel (F). Frost (E).
هو الماء الذي جمد من كثرة الصقيع الناتج عن هبوط درجة الحرارة .

٦٩١٣ - جَلِيف
الجليف : نبت سهلي سنه كالبوط يملوء حباً مسنة للآل (اللسان) .

٦٩١٤ - جَلِيل
Courvite (F).
الجليل طائر من الزقازقيات يدعى ايضاً زغزغ ، اطلبه .

٦٩١٥ - جَلِيل أَغْبَس
Courvite Isabelle (F).
هو الزغزغ الاغبس ، اطلبه .

٦٩١٦ - جَلْبَهَة *
Paratome (F).
الجلية القسم الجانبي من الافك الاعلى في متقاد الطائر .
وما جليبتان يمين ويسرى .

٦٩١٧ - جَلِيو كَلَادِيوم *
Gliocladium (S).
جنس فطور مجهرية من عمارة الهبويات وفصيلة الوقسيات يتميز بشكله المكنسي الاطراف . انواعه عديدة منها واحد لا غير له علاقة بالزراعة يدعى جليوكلاديوم ارمد (G. cinereum) يركب ثمار الاجاص ويقتحم ثمار التفاح على اثر الكربوكبس . مظهره الخارجي نواس دقيق ارمد اللون يغشي البشرة والنسج فيتلفها .

٦٩١٨ - جُم
Anomie (F). Anomia (E).
جنس حيوانات بحرية من ذوات الصدفتين .

٦٩١٩ - جُجَار ، جُجَارَة ، جَامُورَة
Palmitte (F). Palm-marrow (E).
هو قلب النخلة اي برعمها الانتهائي يتكون من مادة بيضاء لينة لذيدة الطعم مأكولة طعمها كالحليب المتجمد . والكافور يخرج من الجمارة بين مشق السعفتين || وجمر النخلة : قطع جمارها او جامورها .

٦٩٢٠ - جُجَانَة
Perle (F). Pearl (E).
هي اللؤلؤة ج جان . قال لبيد :
وتضيء في وجد الظلام منيرة
كجنانة البحري سل نظامها .

٦٩٢١ - جَمَاهِيرِيَّة
Autarchie (F).
نظام شبه اشتراكي يتركز على سلطة الجماهير الشعبية التي يمثلها زمرة من الباهلة او عهبل فرد .

٦٩٢٢ - جُمَّة *
Opis (S).
Opis (F). Opis (E).
ويقال جُم . جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة القنقنيات . انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد ، اعطانها تمتد من البحر الاحمر الى الخليج فبحار الهند || اصداها شبه قلبية الشوزن ، متباينة الحجم ، يكثر فيها الاعتدال . وهي ثنائية المصارع المتساوية ، شفرية السطوح الخارجية ، فريجية الداخلية ||

٦٩٠٣ - جُلْهُم الحَبَشَة *
Xerus rutilus (S). Xerus rutilant, Schiler (F).
نوع من الجلم طولهُ نحو ٢٧ سم . وذنبه ٢٣ ثوبه الى الصهبة الصفراء يعقب مع اقترابه من الظهر ، مواجه ابيض لامع . بطنه ينحرف الى البياض . ذنبه صنابي اللون ابيض الجانبين || موطنه الحبشة ومعظم مناطق افريقية الشرقية . قوته انبثات والحشرات والعطاء وصغار الطير .

٦٩٠٤ - جُلْهُم مَخْطَط *
Xerus erythropus (S). Xerus à pieds rouges, Sabéra (F).
نوع من الجلم طولهُ نحو ٥٠ سم . وذنبه ٤٠ ثوبه الى الصهبة الغبراء يعلوه خطان مستطيلان من نقرة الرأس الى طرف الذنب . اذناه صديرتان . قوائمه الى الجؤوة . موطنه فسيح الارحاء يمتد من افريقية الشرقية والحبشة وزنبار الى السنغال .

٦٩٠٥ - جَلْوَة النَحْل
Enfumage (F). Smoked (E).
هو طرد النحل او تخدير اعصابه بالدخان .

٦٩٠٦ - جَلُود *
Julodis (S).
Julodis (F). Julodis (E).
جنس خنافس من غمديات الاجنحة وفصيلة الزقنبوطيات انواعه المعروفة نحو ١٠٠ اعطانها معظم المناطق الحارة من العالم القديم واخصها الصحراوية || اجسامها شبه مجنية الشوزن طول من ٢٠ الى ٢٧ مم . رؤوسها قصيرة . قرونها الاستشعارية منشارية التركيب تتألف من ١١ فصلة . ارساها خماسية العقول . اغمادها لاحفة ومحددة . اثوابها تراوح من الخنطي الاسمر الاسفع الى الاخضر المذهب يعلوها في تخايد الاغماد خضاب احمر او اصفر او اطلعل او تبني || جميعها تسرح في النهار . قوتها المواد النباتية . يرقاتها خاضعة تعيش على جذور النبات وسوقه واوراقه .

٦٩٠٧ - جَلُوز
Noisetier, Avelinier (F).
Hazel-nut tree (E).
هو البندق ، اطلبه .

٦٩٠٨ - جَلُوزَة
Aveline (F). Hazel-nut (E).
ثمرة الجلوز الكبيرة .

٦٩٠٩ - جِلُوزِيَّة
Corylopse (F). Corylus (E).
نمت تعريفي يطلق على الثمار الشبيهة بالجلوز .

٦٩١٠ - جُلِّيَّات *
Goliathus (S).
Goliath (F). Goliathus (E).
جنس حشرات قانصة وأثمة من غمديات الاجنحة صفيحيات القرون وفصيلة الجمليات . انواعها المعروفة نحو ١٢ اعطانها بعض المناطق الحارة من القارة الافريقية . تسرح في الليل . طيراتها بطيئة الحركة متوسط الشوط || تعتبر من جابرة الجمليات . اجسامها كبيرة القد طول من ١٠ الى ١٢ سم . رؤوسها شبه مربعة ناشزة المقدم الاقرن . قرونها الاستشعارية صغيرة دقيقة صفيحية التركيب . كواسلها مكورة ، مستطيلة التخديد اغمادها لاحفة مجنية الشكل . اثوابها متباينة الالوان يكثر فيها الاسود والجؤوي والاسمر الموشح بالاغبر والاسمر الصنابي الموج والاسود الارجواني الموج .



جلهم الحبشة



جلود



جليات



جُمَّة

Améthyste (F). ٦٩٣٥ - جَمَسْت ، جَمَشْت
Amethyst (E).
حجر كريم وهو ضرب من المرو بنفسجي اللون كانوا
يدعون انه يدفع النشوة .



جمزة

Swertia (S). ٦٩٣٦ - جَمَض *
Swertia (F). Swertia (E).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الكوشاديات . انواعه
المعروفة نحو ٥٠ منتشرة في معظم اقطار العالم القديم .
ترغب في المواقع الرطبة || سوقها لانياسية الشكل والارتفاع
تعلو من ١٥ الى ٨٠ سم . اوراقها السفلى متعاقبة اما
الجذعية فتقابلة . نصالها معنقة ، سنانية الشكل ، متسامكة .
ازهارها عشقودي التجميع ، هامي الارتكاز . ازهارها
متباينة الالوان يكثر فيها الالبيض ثم الاصفر فالوردي
فالاحمر فالليلكي || تنويرها يستمر من تموز الى ايلول .



جَمَض

Marne argileuse (F). ٦٩٣٧ - جَمْعَر
Clayish marl (E).

تراب اصفر اللون كثرت فيه نسبة العناصر الصلصالية .

Marnage (F). Marling (E). ٦٩٣٨ - جَمْعَرَة
توزيع الجمر على التربة وقد يكون ذلك في الحريف .

Phymatodes (S). ٦٩٣٩ - جُمُود *
Phymatode (F). Phymatodes (E).

جنس حشرات من فصيلة القرنبيات ورتبة غديات الاجنحة
انواعه المعروفة نحو ١٢ اعطانها مناطق البكرة والكستناء
والحور . اجسامها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل . اثنائها
مختلفة الالوان . تسرح في النهار . قوتها رحيق الازهار .
يرقاتها خاشبة تعيش تحت لحاء الاشجار فتسردب الشكير
وتعطبه .

اشهر انواعه الثلاثة التالية :

٦٩٤٠ - جُمُود الحور ، جُمُود مُحَوَّف *
Phymatodes fasciatus (S).

Phymatode bandé, P. fascié, P. du peuplier (F).

حشرة من الجُمود صغيرة القد طولها نحو ٧ مم . ثوبها الى
الجودة يعبق مع ابتعاده عن الرأس باتجاه الاطراف . غداها
مجذعان بالابيض || تظهر في نيسان وتبقى حتى حزيران .
مرتمها الازهار || يرقاتها خاشبة تعيش تحت لحاء الحور
واخصها الحور الابيض فتسردب الشكير وتؤذيه اشد الاذى

Phymatodes alni (S). ٦٩٤١ - جُمُود المَغْث *
Phymatode de l'aune (F).

حشرة من الجُمود ، صغيرة القد ، طولها نحو ٥ مم . رأسها
وكوسلها وجرازمها سود . غداها منتظما التبلق الاحمر
والاغير والاسود تعلوها زغبنة شهباء || تظهر في اوائل
الربيع وتبقى حتى اواخر حزيران . مرتمها الازهار
الحرجية || يرقاتها خاشبة تركب اغصان المغث وافناده
فتسردب شكيرها وتسبب يباسها وقد تفعل كذلك في الكستناء
والبندي .

٦٩٤٢ - جُمُود قَرْمِيدِي ، جُمُود مُصَدَّف *
Phymatodes testaceus (S).

Phymatode rouge briqué, Phymatode testacé (F).
حشرة من الجُمود . طولها نحو ١٠ مم . اثنائها اكبر قدأ
من ذكورها . ثوبها الى الحمرة القرميدية الشهباء الموج ||



جُمُود قَرْمِيدِي

جميعها دجوية المرح ، تعيش قرب المجاح والشطوط
المتوسطة الغور .

Terre entassée (F). ٦٩٣٣ - جُمُورَة
Heaped soil (E).

الجمثورة : التراب المجمع .

Crâne (F). ٦٩٢٤ - جُمُومَة ، قِخْف
Cranium, Skull (E).

صندوق عظمي يشمل الرأس ويتكون عند معظم الحيوانات
الفقرية من قسمين القسم المقدمي والقسم الفقري .
والجمجمة تغلف الدماغ بجميع اجزائه وتشمل عدة تجاويف
تستقر بها مراكز الحس والشم والبصر وهي تتصل اتصالاً
مفصلياً بمظام العنق التي ترتكز بدورها على القفص
الصدري .

Gruge (F). Crunch (E). ٦٩٢٥ - جُمُحَل
الجمل : كل ما في جوف الصدف من شيء مأكول .

Glace (F). Ice (E). ٦٩٢٦ - جَمَد ، تَلَج
هو الماء الذي جمد .

Geler (F). ٦٩٢٧ - جَمَد ، جَلَد
To freeze, To frost-bite (E).

هو الماء تماسكت اجزائه .

Glossanthrax ٦٩٢٨ - جَمَرَة السَّانِ الْخَبِيثَة
مرض معد قتال يصيب المجترات . ندر وجوده في ايامنا
هذه .

Anthrax ٦٩٢٩ - جَمَرَة خَبِيثَة
هي الحمى الجمرأوية : مرض معد قتال يصيب المواشي .

٦٩٣٠ - جَمَرَة عَرَضِيَّة
Charbon symptomatique, C. emphysemateux (F).
Symptomatic anthrax, Black-leg and quarter
evil (E).

من اسمائها اوش وابو دراع . مرض ميكروبي معد يصيب
البقر والغنم .

Douane (E). ٦٩٣١ - جَمْرُك ، مَكْس
Customs, Custom-house (E).

قسم الادارة المنوط به تحصيل الرسوم المفروضة على البضائع
الواردة والصادرة . وهو ايضاً مكان استلام وتسليم البضاعة
الى اربابها بعد دفع ما يتوجب من رسوم معينة .

Crevette (F). Prawn, Shrimp (E). ٦٩٣٢ - جَمْرِي
راجع اربيان .

Courson, Coursonne (F). ٦٩٣٣ - جَمْرَة *
Branch or shoot left (E).

الجمزة هي فتن او قضيب الحمل الذي تترك عليه البراعم
الثبرية او بعضها .

Repos des plantes (F). ٦٩٣٤ - جَمَس
Repose of plants (E).

هي فترة الاستراحة الحولية عند النباتات المعمرة ، تدوم
من الاعبال الى الرعل لذلك فزمنها ومدتها يختلفان اولاً
بالنسبة الى النبات ان نقيض او ايده وبالتالي الى العوامل
الجنسية والاقليمية .

٦٩٣٥ - جَمَس
Repos des plantes (F).

Repose of plants (E).

هي فترة الاستراحة الحولية عند النباتات المعمرة ، تدوم
من الاعبال الى الرعل لذلك فزمنها ومدتها يختلفان اولاً
بالنسبة الى النبات ان نقيض او ايده وبالتالي الى العوامل
الجنسية والاقليمية .

٦٩٥٤ - **جُمْلَةٌ ، جَمْمُوعٌ** Total

٦٩٥٥ - **جَمْلَجٌ * ، جَمْلُوجٌ ، جَمْلَاجٌ ، رَأْسُ الْهَرِّ**
Galeopsis (S). Galéopse, Galéopside (F). Galeopsis (E). Daun, Katzengesicht (D). Canapino, Ortica (I).

جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الشفويات. أنواعه نحو ١٢ أوراقها متقابلة، مدبقة، كاملة. نصلها زغبى البشرة، مسنن الحافة. أزهارها نوري التجميع، محوري الارتكاز. أزهارها صغيرة القدر لونها أبيض أو وردي || أشهر أنواعه الثلاثة التالية.

٦٩٥٦ - **جَمْلَجٌ أَحْمَرٌ**
Galeopsis ladanum (S).
Galéopse rouge, Ortie rouge (F).

٦٩٥٧ - **جَمْلَجٌ خَلْبِيٌّ**
Galeopsis tetrahit (S).
Galéopse volouté, Ortie jaune (F).

٦٩٥٨ - **جَمْلَجٌ مُصْحِيٌّ**
Galeopsis ochroleuca (S).
Chanvre batard (F).

يستعمل استعمال الشاي في أكثر بلاد أروبة الوسطى خاصة في ألمانيا حيث يدعى «شاي بلنكنهم».

٦٩٥٩ - **جَمْلَجِيَّاتٌ ٥** Cnidaire (F).

اسم يطلق على فئة من اللاحشويات أي المحفقات مجهزة بخلايا مشرقة. وهي تشمل العديد من العذارات والمصاصات والمدموسيات - القراصيات والرجانيات.

٦٩٦٠ - **جَمْلُونِيَّاتٌ الْأَجْنِحَةُ** Trichoptères (F).
Trichoptera (E).

رتبة حشرات من طبقة سدنيات الجناح. فصائلها مع اجناسها وأنواعها زهاء ٢٠٠٠ جميعها لاعقة. قرونها الاستشعارية عديدة الفواصل. أرساغها خماسية العقول. اجنحتها تنطبق على شكل جملون. دعاميصها مائية لا مفترسة.

٦٩٦١ - **جَمْلِيَّاتٌ** Camélidés (F). Camelidae (E).
هي فصيلة الإبلات، أطلبها.

٦٩٦٢ - **جَمُنُوتٌ رَعَّاشٌ ٥***

Gymnotus electricus (S).
Gymnote électrique, Anguille électrique (F).
Electric-eel, Gymnotus electricus (E).

سمكة نهريّة بيوض من فصيلة الجمنوتيات. أعطانها معظم أنهر وبحيرات أمريكا الجنوبية. عمجها تموّجي الحركة || تتميز بعمدتها الكهربائية المؤلفة من جهازين مركزهما عند مؤخر البطن من جانبي قاعدة الذنب || جسمها مستطيل الشكل، قريب الشبه بجسم الانقليس، يطول من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. حراشفها رقيقة، شديدة الصغر يتخللها غدد دقيقة ماسحة. ثوبها الى الخضار الاغبر. مقدم عنقها أصفر واحمر. ايطلاها مبقجان بالاصفر. غدها تفرز اخلاط فروية تنشط الايصالية الكهربائية التي تنج من الذنب نحو العنق. اما التفريغ الكهربائي فانه اختياري تقوم به السمكة عندما يطيب لها || زهانفها لانظامية الترتيب. تتميز بخلوها من الزعانف الظهرية والحوضية والذيلية. زعنفتها الشرجية خارقة الطول تمتد من الحوض الى قاعدة الذنب || لحمها متوسط الصنف مأكول.

تظهر في أوائل حزيران وتبقى حتى أواخر تموز. مرتعها الأزهار الحرجية || يرقتها خاشبة تعيش تحت لحاء الأشجار الضعيفة فتسردب شكيرها وتمجّل في القضاء عليها. تركب السنديان والزبان والكسثناء ومختلف اشجار فصيلة القدييات.

٦٩٦٣ - **جَمُودٌ مُحَوِّفٌ**

Phymatode bandé (F).

هو جمود الحور، أطلبه.

٦٩٦٤ - **جَمُودٌ مُصَدِّقٌ**

Phymatode testacé (F).

هو الجمود القرميدي، أطلبه.

٦٩٦٥ - **جَمْعِيَّةٌ تَعَاوُنِيَّةٌ**

Association de secours mutuel (F). Friendly benefit society (E).

هي الجمعية التي تقوم على مبدأ التعاون والتأزر في سبيل قصد معين.

٦٩٦٦ - **جَمَلٌ** Camelus (S).

Chameau (F). Camel (E).

جنس حيوانات داجنة مخرجة من ذوات الحف مزدوجات الاصابع تنتمي الى فصيلة الإبلات. وهي كبيرة الاجسام صغيرة الرؤوس، مشقوقة المشافر تتميز باستطالة اعناقها وقوائمها وبقدورها على الانقطاع عن المأمة طويلة. مهدا الصحاري الاسيوية وقد انتشرت في معظم البلاد الاسيوية وبضف الافريقية. والجمل نوهان وحيد السنم والفالج، أطلبها.

٦٩٦٧ - **جَمَلُ الْبَحْرِ** Mégaptère (F).

Megaptera (E).

هو الكعب، أطلبه.

٦٩٦٨ - **جَمَلُ الْمَاءِ** Pélican (F). Pelican (E).

هو البجع، أطلبه.

٦٩٦٩ - **جَمَلُ الْيَهُودِ** Caméléon (F). Chameleon (E).

هو الحرباء، أطلبها.

٦٩٥٠ - **جَمَلٌ أَمْرِيكِيٌّ** Lama

هو اللامة، أطلبها.

٦٩٥١ - **جَمَلٌ وَحِيدُ السَّنَامِ***

Camelus dromedarius (S). Dromadaire, Chameau à une bosse (F). Dromedary (E).

هو الجمل المعروف في جميع البلاد العربية وهو حيوان داجن كبير الجثة رفيع القوائم طويل العنق وحيد السنم. كنيته أبو ايوب وأبو صنوان وسفينة البر. الاثنى تدعى ناقة وكلاهما يعبر للذكر والاثنى. والنجيب الجمل الكريم. والهجين الجمل النجيب السريع. والذلول النجيب المدرب للركوب. والرحول والراحلة الجمل الصالح للرحل || سلالاته وعروقه عديدة أشهرها المهرية والبجاة والبخت.

٦٩٥٢ - **جَمَلَاءٌ ٥ ، جَمَلَانَةٌ ٥** Imago (F).

Imago (E).

نعت تعريفية توصف به الحشرة الكاملة التطور، المتمتعة بميزات الشق أن ذكر أو انثى.

٦٩٥٣ - **جَمَلَانَةٌ** Fauvette grise (F).

White throat (E).

طائر من الدخاخيل يعرف بالدخلة الشائمة، أطلبها.



جمل وحيد السنم



جملج



جمنوت رعّاش

في بعض المناطق أخارة وهي شجرة كبيرة الحجم ، دائمة ، ضخمة الساق ، منبسطة الأغصان الكبيرة . أوراقها كثيفة ، قليلة الشكل ، نصلها أخضر اللون العابق . ثمارها مأكولة تشبه التين ، مستحبة العرف ، قرميدية اللون ، مليئة ، مسهلة . حلقها متتابع ، مواسمها السنوية من ٥ إلى ٦ . خشبها خفيف الوزن شديد الصلابة قوي على الفساد .

٦٩٧١ - **جَمِيمِيَّة** * Jamesia (S). Jamesie (F).
جنبة تريينية من فصيلة القليبات وحيدة الجنس والنوع . منبها أمريكية الجنوبية . ساقها فرعاء ليفية اللحاء المتناثرة . أوراقها متقابلة ، نصلها أزغب الصفحة السفلى ، مسنن الحافة . أزهارها عشكولية التجميع ، بيضاء اللون ، عطرية العرف . تنحش الأتربة الرطبة والمعارض الشالية .

٦٩٧٢ - **جَمِيمِيَّة** * Corylophus (S). Corylophe (F). Corylophus (E).
جنس حشرات من فصيلة الجميشيات ورقبة غدييات الاجنحة . أنواعها المعروفة قليلة العدد لا تتجاوز الخمسة اعطائها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة من الشرق الأدنى وأروبة || أجسامها شديدة الصغر ، شبه بيضية الشكل ، تطول من ١ إلى ٢ مم . رؤوسها صغيرة ، مخروطية الشكل . عيونها بارزة . تأشيرها وفكوكها نظامية . قرونها الاستشعارية دبوسية الاطراف ، تساعية الفصل . كواسلها نصف دائرية الشكل ، تلحف الرؤوس . اغنادها لاحفة ، نحيلة التخديد القاطب . اثوابها وحيدة اللون منها الاسود والاسدف والاشقح والاصح || تألف ضفاف المنافع ومجاري الماء . تعيش على الفطور والدردي النباتي .

٦٩٧٣ - **جَمِيمِيَّات** ° Corylophidae (S). Corylophidés (F). Corylophidae (E).
فصيلة حشرات من غدييات الاجنحة . اجناسها وأنواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || أجسامها شديدة الصغر ، شبه بيضية الشوزن ، تطول من ١ إلى ٣ مم . رؤوسها مخروطية . عيونها بارزة . تأشيرها وفكوكها نظامية . قرونها الاستشعارية خيطية أو دبوسية ، لاقياسية الطول وعدد الفصل الذي يراوح من ٩ إلى ١١ . كواسلها نصف دائرية الشكل . اغنادها لاحفة . ارساغها رباعية العقول . اثوابها ملونة وحيدة اللون || تعيش على الفطور والدردي النباتي والجثالة والجذام . أشهر اجناسها الجميشة .

٦٩٧٤ - **جَمِيمِيَّة** * ، **غَامَة** Gamete (F). Gamete (E).
هي الخلية التناسلية . وقد رسمناها في مختلف مراحل ادوارها الحياتية التي تمثل التكوين والانعتاق والتزاوج والاندماج .

٦٩٧٥ - **جَمِيمِل** ، **جَمِيمِل** Pycnonote, Bulbul (F). Pycnonotus, Bulbul (E).
راجع بلبل . ج . جملان .

٦٩٧٦ - **جَمِيمِل** Fuchsia
راجع فوشيا .

٦٩٧٧ - **جَمِيم**
الجميم : ما غطى الارض من النبات . يقال رعت الماشية الجميم .

٦٩٦٣ - **جَمُونُ قَدِّي** ° Gymnotus acus (S). Gymnote lanière (F). Gymnotus acus (E).
سمكة بحرية بيوض من الجمنوت . ربما كانت الوحيدة من نوعها وفصيلتها تألف المياه البحرية . اعطائها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط . مسرحها معاشب النشاف المتوسطة الغور || جسمها مبسط الجرم ، قدي الشكل ، قريب الشبه بجسم الانقليس ، يطول من ٦٠ إلى ٨٠ سم . ثوبها الى البياض الاغبر يعلوه تقيج احمر واسمر . بطنها الى البياض الازرق الموج . رأسها معتدل الجرم ، مخروطي الخطم الذلق . فكها الاعلى يتقدم الاسفل بعض الشيء . عيناها صغيرتان بارزتان || تتميز بخلوها من الزعانف الظهرية وأخوضية والذيلية . زعنفتها الشرجية تمتد من الخوض الى قاعدة الذنب || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٦٩٦٤ - **جَمُونِيَّات** ° Gymnotidae (S). Gymnotidés (F). Gymnotidae (E).
فصيلة اسماك بحرية ونهرية من مفتوحات المثانة . اجناسها وأنواعها قليلة العدد معظمها من اسماك المياه الامريكية النهرية والبحرية || اجسامها مستطيلة قريبة الشبه بالانقليس . أشهر اجناسها الجمنوت وأعرف أنواعها الجمنوت الرعاش .

٦٩٦٥ - **جَمِينِيد** Géminides (F).
الجمينيد والجمانيد اسم يطلق على الرجوم والنبازك المنبثقة من كوكبة التوأمن .

٦٩٦٦ - **جَمِينُورِي** * Philetoerus socius (S). Républiquein social (F).
عصفور من فصيلة التنوطيات . موطنه بعض مناطق اريقية الجنوبية . يألف الاحراج المبعثرة الاشجار والقرية من الماء . نظامه الحياتي جماعي . اسرابه وافرة العدد غير انها تتفرق في زمن التطريق الى مجموعات تعد من ٢٠٠ الى ٤٠٠ جسمه صغير القد ربعة يطول نحو ١٥ سم . ثوبه الى الربعة يعلوها تمشيع اسود . محسراه وعنقه الى السواد الاحم . منقاده مخروطي الشكل ، شديد السمرة . حذقة عينه سوداء اللون رسغاه الى الجؤوة . || قوته الحشرات والبزور والثمار العنبية || وهو من الطيور الضرية اي ان اناثها تسافد عدة ذكور || يدثن عشه في السولج وقد يوجد على سولمة واحدة من ٢٠٠ الى ٣٠٠ عش متراكبة فوق بعضها تطوق الشجرة كبرج الحمام ويغلفها سطح شاحط كما في البرج . الانثى تحضن وحدها من ٢ الى ٤ بيضات نحو ١٢ يوماً .

٦٩٦٧ - **جَمِينُورِي** Vin ayant 3 ans d'âge
الجمهوري : نبيذ العنب اتت عليه ثلاث سنين .

٦٩٦٨ - **جَمُوح** ، **شَمُوس** Ramingua (F). Not spur-wise, Restive (E).
نعت وصني يطلق على الخيل الجابحة والبغال الشامسة .

٦٩٦٩ - **جَمِي** Fève (F). Bean (E).
راجع فول .

٦٩٧٠ - **جَمِيَز** * ، **تِين لِرْعُون** Ficus sycomorus (S). Figuier sycomore, F. d'Egypte (F). Sycamore fig, Mulberry fig, Pharaoh's fig (E). Agyptische sycamore, Pharaofeige (D). Sicomoro, Seccomoro, Fico d'Egitto (I).
شجرة مشرة من التوتيات . مهدا بلاد النوبة ومنها انتشرت



جمهوري وعش



جميز



جميشة



جميشة



جميطة

٦٩٩٠ - جِنَّادَة *
Gennada (S).

Gennada (F). Gennada (E).

جنس حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الارجل طوال الذيل وفصيلة الذلافيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد الحارة || اجسامها مستطيلة الشكل ، متوسطة القد تطول نحو ١٠ سم . تتميز بقصر متراكها المقطومة ، باستطالة اذيالها وباستحالة الزوج الثالث من ملاسها الفككية الى مساوط || لحومها مأكولة جيدة الصنف .

٦٩٩١ - جُنَّار
Platane d'Orient (F).
هو الدلب الشرقي ، اطلبه .
Oriental plane tree (E).

٦٩٩٢ - جُنَّارَة
Artichaut (F).
الجنارة نبات زراعي يعرف بالارضي شوكي ، اطلبه .

٦٩٩٣ - جِنَّاسَة ، عَكَّافَة *
Homogamie (F).
Homogamy (E).

هي الانخصاب بين عناصر وراثية من اصل واحد . وهي عذافياً تجانس الازهار في النوع الواحد فتكون اما ذكرية او انثوية او خنثوية . وهي شوزيباً ادراك اسدية الزهرة ومدقها او مدقاتها في آن واحد .

٦٩٩٤ - جَنَّا فَة رَدْغَة ، جَنَّا فَة حَمْرَاء
Kinosternum subrubrum (S).

Cinosterne rougeâtre, C. bourbeux (F).

نوع من الجنافة ، سلحفاة من فصيلة الجنافيات . موطنها فسيح الارجاء ، يمتد من امريكا الجنوبية الى الشمالية || جسمها متوسط القد ، يطول من ٣٥ الى ٤٠ سم . ذبلها بيضي الشوزن ، معتدل الاحديداب ، يطول من ٢٠ الى ٢٥ سم . لونه الى الحمرة الجذوية . زعنفا مفصلي المقدم والمؤخر ، يتألف من ١١ صفيحة . رأسها معتدل الهرم ، شارف الفك الاعلى . عنقها معتدل الطول والغلاظة . ذنها قصير قوائمها نشيطة || مرتعها المناقع والاغوار وبحاري الماء . قوتها الضفادع والنمطاء والثعابين والسماك وجميع انواع الجيف اخصها الرخويات والقشريات والاسماك .

٦٩٩٥ - جَنَّا فَيَّات *
Kinosternidae (S).
Kinosternidés (F). Kinosternidae (E).

فصيلة حيوانات بيوضة من رتبة السلاحف . اجناسها وانواعها المعاصرة متوسطة العدد . اعطائها بعض مناطق ومياه امريكا الجنوبية والشمالية || اجسامها صغيرة القد . ذبالها بيضية الشوزن ، معتدلة الاحديداب . زعانفها منبسطة عند الاناث ، مقعرة عند الذكور ، مفصلية المقدم والمؤخر عند الشقين مما يسمح بايصادها وإخفاء الرأس والذنب || وتتميز ذكور هذه الفصيلة بقوائمها الخلفية المجهزة بكتل من السنف المدبب تمكنها من التشبث بالاناث عند الكرم || اشهر انواعها واكثرها انتشاراً الجنافة الردغة .

٦٩٩٦ - جَنَّا كَة مُزَيَّنَة *
Scopula ornata (S).
Scopule ornée (F). Scopula ornata (E).

حشرة من فصيلة الارفيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها بعض اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط والمناطق الداخلية المتاخمة . فراشتها بجاسة قوتها رحيق الازهار . سرقها تعيش على اوراق الصعتر والنمغ والطوقريون ... || جسمها صغير ابيض يطول نحو ١٠ مم . بسطتها تراوح من ٢٨ الى ٣٢ مم . رأسها معتدل الهرم . عيناها صغيرتان .

٦٩٧٨ - جُمَيْمَة *
Acera (S).

Acère (F). Acera (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الطاييات . انواعها المعاصرة المعروفة ثلاثة . اعطائها بعض مجادح البحر الابيض المتوسط || اصداؤها صغيرة ، رقيقة ، شفافة ، ملحوفة ، مما يجعلها تبدو كعرياطة . اجسامها مفصصة ، عديدة الفلق . فلقها الجانبية جناحية الانتشار . رؤوسها قليلة الوضوح مطوقة باطر حلقة الشكل ، صغيرة القد . خياشيمها ظهرية ، يمينية ، ملحوفة بالاردية .

٦٩٧٩ - جِن
Inflorescence et fleurs (F).
Inflorescence and flowers (E).

جن النبات : نوره وزهره .

٦٩٨٠ - جِنَاء أَحْمَر
Arbousier commun (F).
Common arbuté (E).

اطلب قطلب شائع .

٦٩٨١ - جِنَاح *

Aile (F). Wing, Pinion (E).
عضو من اعضاء جسم الطير والحشرات يصلح للطيران . وهو في النبات امتداد بعض الاعضاء كما في البذور والسوق المجنحة || ومن اسمائه التخصيصية السقط للطير والروشن للحشرات .

٦٩٨٢ - جِنَاح ، جَدَّادَة
Ptérois (F).

جنس اسماء بحرية سامة من الجلائخ الشائكات الزعانف . انواعه المعروفة قليلة . اجسامها غريبة الاشكال المستهجنة . اثوابها متراكبة الالوان الزاهية . زعانفها الصدرية مستطيلة تمكنها من الطيران فوق سطح الماء . مدة تحليقها تراوح من دقيقة الى ثلاث دقائق ، اطلب جدادة .

٦٩٨٣ - جِنَاح الْغُرَاب

جناح الغراب او جناح الغراب الايمن نجم من كوكبة الغراب .

٦٩٨٤ - جِنَاح الْفَرَس

جناح الفرس نجم نير من كوكبة نجوم الفرس الاعظم . ويدعى الجنب ، اطلبه .

٦٩٨٥ - جِنَاح الْيَمَن

الجناح الايمن نجم نير من كوكبة نجوم الدجاجة .

٦٩٨٦ - جِنَاح رُومِيّ
Aunée, Inule (F).
Elecampane (E).

هو الراسن ، اطلبه .

٦٩٨٧ - جِنَاح غَمْدِي


Elytre (F). Elytron (E).
هو مجداث الحشرة الغمدية الجناح ويدعى الغمد والظهران والروشن الغمدي .

٦٩٨٨ - جِنَاحِي الشَّكْل
Aliforme (F).
Aliform, Wing-shaped (E).

نعت تعريفي يطلق على ما كان شكله كالجناح .

٦٩٨٩ - جِنَاحِيَّة *

Samare (F). Samara (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ثمرة يابسة وحيدة البزرة اخذ غلافها الذي لا يتفتح شكل جناح رقيق مستطيل .



جُمَيْمَة



جِنَاح



جِنَاحِيَّة



جَنَّا دَة



جَنَّا كَة مُزَيَّنَة

٧٠٠٧ - جَنْبَدَة البرجاء Métanotum (F).

Metanotum (E).

هي في الحشرات حلقة البرجاء العلوية .

٧٠٠٨ - جَنْبَدَة البرجاء Mésonotum (F).

Mesonotum (E).

هي في الحشرات حلقة البرجاء العلوية .

٧٠٠٩ - جَنْبَر ، جَنْبَار ، حَبْرُور ، حَبْرِير

Outardeau (F). Young bustard (E).

هو فرخ الحباري ج جنابر وحبارير .

٧٠١٠ - جَنْبُورَة Jamboisier (F). Rose apple (E).

هي تفاح الورد ، اطلبه .

٧٠١١ - جَنْبُوط Prosopis littoralis (S).

Prosopis des côtes (F).

نوع من الغاف . نبات نجمي معمر من فصيلة القرنيات الفراشية . اعطانه المعروفة تمتد من الميريش الى انطاكية ، ينبت في المواقع الصخرية المشرفة على البحر || ساقه فرعاء ، اوراقه متعاقبة ، مركبة ، ريشية ، وريقاتها شفعية ، يراوح عددها من ٥ ازاواج الى ١٢ زوجاً . نصالها خلية الصفحات السفلى . ازهاره سنبلية التجميع ، محوري الارتكاز . ازهاره صغيرة ، وردية اللون . ثماره قرون مستطيلة رباعية البزور المبطلطة || تنويره ربيعي .

٧٠١٢ - جَنْثُ * Pivot (F). Tap-root (E).

الجنت من ساق الشجرة ما كان في الارض فوق العروق . وقيل هو العرق المستقيم اي الجذر الوتدي الذي يكون امتداد الساق في التربة . وقيل ايضاً هو اصل الشجرة .

٧٠١٣ - جَنْشُورَة * Dendrophilus (S).

Dendrophile (F). Dendrophilus (E).

جنس طير من الجواثم المتسلقات الرقيقات المناقير . انواعه المعروفة ثلاثة جميعها اسيوية المهد تتميز بقصر اذنانها المقطومة . اجنحتها لاحقة ذلقة . اثوابها بلقاء . اعناقها وصورها بيض || قوتها الحشرات والبزور البرية . تدثن في الاشجار الفرعاء القليلة الارتفاع . حصنتها من ٥ الى ٦ بيضات ترخها بمنابرة الذكر نحو ١٤ يوماً .

٧٠١٤ - جَنْشُورَة Remblai (F).

Filling up, Embanking (E).

التراب المد للردم .

٧٠١٥ - جَنْشِيَانَة Gentiane (F). Gentian (E).

هي الجنطيانه ، اطلبها .

٧٠١٦ - جَنْشِيَانِيَّات Gentianacées (F).

Gentianaceae (E).

هي فصيلة الجنطيانيات راجعها .

٧٠١٧ - جَنْجَالَة Houblonnière (F). Hop-field (E).

هي زريعة الجنجل اي الارض المزروعة جنجلاً .

٧٠١٨ - جَنْجُر Centinode (F). Armstrong (E).

هو البطباط ، اطلبه .

٧٠١٩ - جَنْجُل Humulus (S).

Houblon (F). Hop (E).

جنس نباتات عشبية عارشة وحيدة المسكن من سبط القتيبيات وفصيلة القراصيات . له نوعان الجنجل الشائع والجنجل الياباني .

زبانها خيطيان . جوشنها كثيف اللبدة ، ابيض اللون ، عاجي الموج . بطنها كثيف الحمل والحراشف ، تبني اللون ، كستني الحيد || رواشنها ، عند الشقين ، الى البياض الساطع تعلوه ثلاثة خطوط من الزراكش الغبراء . اهدابها الى البياض الثلجي || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في اواسط ايار وتبقى حتى اواسط تموز . نمرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتد الممكن لطخاً مستطيلة على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة عند بلوغها الكمال الجسموري تطول نحو ٢٢ مم . جسمها شبه اسطواني الشكل . ثوبها الى الريدة الغبراء تعلوها رقشة صفراء وبعض النقط السرد . رأسها الى الجؤرة . حيدها وشرجها الى السمرة || طور الاكعال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي بين الفروع التي تلامس التربة ضمن صلجة مبطلطة معتدلة الحبيك .

٦٩٩٧ - جَنَانَة Scutellum

هي الخجفة ، اطلبها .

٦٩٩٨ - جَنْب Algenib (F).

الجنب ، ويدعى جناح الفرس ، نجم نير من كوكبة نجوم الفرس الاعظم .

٦٩٩٩ - جَنْبَار Maquignon (F).

Horse-dealer, Jobber (E).

هو تاجر الخيل او وسيط بينها .

٧٠٠٠ - جَنْبَايَة * Genipa (S).

Génipayer (F).

جنس اشجار حرجية من فصيلة الفويات . انواعها المعروفة خمسة ، اعطانها تمتد من الهند الى امريكا الوسطى والجنوبية . سوقها منتصبه فرعاء تعلو من ٧ الى ١٢ م . اوراقها متعاقبة ، قصيرة الاعناق ، نصالها اهليلجية او سنانية الشكل . ازهارها محوري او طرفي الارتكاز ، فردي او ضمي التجميع . ازهارها خماسية القعالات بيضاء اللون او صفراء . ثمارها عنبية ، لحمية السودق ، كبيرة الحجم البرتقالية الصغيرة . سودقها ابيض اللون ، حامز الطعم .

٧٠٠١ - جَنْبَة Arbrisseau (F). Shrubby tree (E).

هي من النبات ما كان اكبر من البجلة واصغر من الشجيرة .

٧٠٠٢ - جَنْبَة الدُرّ Symphorina (F).

Snowberry (E).

هي السفورين ، اطلبها .

٧٠٠٣ - جَنْبَة الرباط Viorne (F).

Wayfaring tree (E).

هي الافلوس ، اطلبه .

٧٠٠٤ - جَنْبَة عطيرة Diosme (F). Diosma (E).

هي الديوسمه ، اطلبها .

٧٠٠٥ - جَنْبُخ


الجنبخ : القمل الضخام الواحدة جنبخة .

٧٠٠٦ - جَنْبُد

الجنبد هو زهر الرمان وهو ايضاً الورد الاحمر .



جَنَابَة



جَنْثُ



جَنْجُر

٧٠٢٩ - جُنْدُخٌ *
Decticus (S).
Dectique (F). Decticus (E).
جنس جنادب من القبوطيات . أنواعه عديدة واللونه كذلك يغلب فيها الاسمر الموشم بالبني او المجذع بالحنطي او الموشح بالاخضر . جميعها كبيرة القد طولها يراوح من ٣٢ الى ٤٤ مم . افخاذها من ٣٥ الى ٤٣ مم . اغدادها من ٤٢ الى ٥٥ مم . اسراكها مسننة . مرزاتها مستطيلة منعقفة الى العلواء . تألف المراعي والبور . يكثر وجودها في اواخر الصيف .

٧٠٣٠ - جُنْدُخٌ
نوع من القراد يركب الفسب وغيره ... ج جنادع . وقال بعضهم : « جنذب اسود له قرنان طويلان وهو اثنان الجنادب » .

٧٠٣١ - جُنْدُفَةُ الْكَرْمَةِ ، بَزَّةُ الْكَرْمَةِ *
Procris ampelophaga, Zygaena ampelophaga (S).
Procris de la vigne, Zygène de la vigne (F).
Procris ampelophaga, Zygaena ampelophaga (E).
حشرة من فصيلة البزيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها اقليم الكرمة من حوض البحر الابيض المتوسط . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرقتها تعيش على خلب الكرمة || جسمها صغير القد يطول نحو ١٠ مم . بسطتها نحو ٣١ مم . رأسها معتدل الجرم . عيناها صغيرتان . زباناها مشطيان . جوشنها كثيف اللبدة ، اطحل اللون ، ازرق الموج . بطنها كثيف الحراشف والخمل ، اطحل اللون ، اخضر الموج || روشناها الاماميان الى الطحلة الزرقاء الموج . روشناها الخلفيان الى الطحلة الخضراء يعلوها تمشيع زيتي يزيدنها سطوعاً || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في تموز وتبقى حتى ايلول . تسرح في النهار . تعاظم بعد ظهورها بنحو خمسة اسابيع . تمتع الممكن مباحداً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة عند بلوغها الادراك الجسموري تطول نحو ١٩ مم . جسمها اهليلجي الشكل ، اسمر اللون تعلوه رقشة صفراء تتوسطها فقط جروية تمتد من الصدر الى الشرج . قشازها كثيف الحلب القصير ، مبعر الحلب الطويل . رأسها مستعرض الشكل اسود اللون || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي ضمن صلجة متماسكة النسيج تحببها السرفة تحت القشور او بين شقوق اللحاء .

٧٠٣٢ - جَنْدَلُ
الجندل والجندال : الحجارة الصماء .

٧٠٣٣ - جَنْدَمٌ ، كَنْدَمٌ ، غَرْبِيْنِيَّةُ
Garcinia (S). Garcinie (F).
جنس اشجار برية وزراعية من الكلوزيات انواعه نحو ١٥٠ جميعها من اشجار المناطق الاستوائية الاسيوية والافريقية . لحاء سوقها غنية بالمصارة الصمغية الصفراء اللون || اوراقها منعقة ، متقابلة ، نصلها اهليلجي الشكل ، لسن الزام الاخير ، مدبب الطرف || ازهارها خشوية ، رباعية او خماسية الفصل المتصالبة ، رباعية او خماسية البتلات المتعاطلة . مبايضها عديدة الغريفات . ثمارها مأكولة عديدة الاشكال والالوان || اشهر واعرف انواعه الزراعية ما يتبع .

٧٠٣٤ - جَنْدَمٌ أَصَامٌ
Garcinia atroviridis (S).
Garcinie de l'Assam (F).
نوع من الجندم . ثمرته كبيرة القد تعلو نحو ١٢ م .

٧٠٢٠ - جُنْجُلٌ شَائِعٌ * ، حَشِيْشَةُ الدِّيْنَارِ
Humulus lupulus (S). Houbion commun (F). Common hop, Bine (E). Echter hopfen (D). Luppulo, Maschio, Volticella (I).
نوع من الجنجل المعمر ، عديد الضروب ، ساقه ليفية مضلعة مدادة عارشة تطول نحو ٨ امتار . اوراقه متقابلة منعقة مفصصة نصلها جامد النسيج مسنن الخافة . وهو من النباتات الزراعية الصناعية . محاريط ازهاره تستعمل في تعطير البيرا .

٧٠٢١ - جُنْجُلٌ يَابَانِي
Humulus japonicus (S).
Houbion du japon (F). Japanese hop (E).
نوع من الجنجل الزراعي التزييني الحولي . ضروبه عديدة سوقها زبائ نجيلية عارشة تطول نحو ٦ امتار . اوراقها متقابلة ، منعقة ، خماسية او سباعية التفصيص . نصلها لسن الشكل مدبب الزام الاخير . محاريطها الزهرية صغيرة القد .

٧٠٢٢ - جَنْجَنٌ ، جُنْجُنٌ ، جِنْجِنٌ ، جِنْجِنَةٌ
واحد الجنانجن وهي عظام الصدر .

٧٠٢٣ - جُنْحَةٌ
Délit (F). Misdemeanour (E).
فعل غير مشروع توفرت فيه نية الاجرام وتقرر له عقوبة قانونية .

٧٠٢٤ - جَنْدَاحٌ *
Solandre (F).
جنس نباتات جنبيه معمرة من فصيلة الباذنجانيات . انواعه المعروفة قليلة العدد ، مهدا البلاد الحارة || جميعها جنبات سريعة الفروع . اوراقها متعاقبة ، متقاربة ، منعقة ، اهليلجية . نصلها سمكة الصفحة ، كثيفة الزغب ، لزجة || ازهارها قمية الشكل ، كبيرة ، مستطيلة الانبوب ، متمعجة البتلات الملحومة . ثمارها جراء تغلف بعض البزور || عصارة اوراقها جعالية المادة ، شديدة الوقع .

٧٠٢٥ - جَنْدَاعَةٌ ، أَبُو مَقْطَمٍ
Onychoteuthis gigantea (S). Calmar géant, Calmar à griffes (F). Sleeve-fish (E).
نوع من الطردوس . حيوان بحري من فصيلة الطردوسيات . موطنه بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || جسمه كبير القد يطول نحو ١٢ متراً . ثمانية من جرامزه معتدلة الطول متساوية القد واثنان مستطيلتان . جميعها مسلحة بالحاجم والمقاطم الحادة . قوتها الاسماك والقشريات ولا تعف ، عند الاستطاعة ، عن صيادي اللؤلؤ .

٧٠٢٦ - جَنْدُوبٌ
Sauterelle, Locuste (F).
Locust (E).
اسم شامل . يطلق على مختلف انواع القبايط والجراد .

٧٠٢٧ - جُنْدَبَادَسْتَرٌ ، بِيْدَسْتَرٌ ، سَكَلَاتِي ، فَاحِشَةٌ ، قَسْطُورَةٌ ، قَسْطُورِيَوْمٌ
Castoreum (F).
Castoreum (E).
مادة شمعية دسمة عرقية مرة الطعم صفراء اللون مغراء الموج طيبة تستخرج من الحارود اي البادستر الذي يفرزها ويجمعها في جرابين صغيرين مركزهما بين الفخذين تحت الخصيتين في الذكر وتحت الثغر في الانثى .


٧٠٢٨ - جَنْدَحٌ
Ajonc nain (F). Dwarf furze (E).
هو الوزال ، اطلبه .



جنجل شائع



جنداح



جندخ



جندقة الكرمة



جندم منفستان



جنزارة



جنسن



جنصينة



جنطاس

التبسيط ، يطول نحو ٢٥ سم. رأسها خدروني الشكل ، قصير الحطم ، صغير الشدق ، عيناها صغيرتان ، ماصحتان . زعنفتها الظهرية مستطيلة ناشرة المؤخر . زعنفتها الذيلية فارقة هلالية الشكل . ظهرها والقسم الاعلى من جانبيها الى الحمرة الارجوانية ، القسم الاسفل من جانبيها وبطنها الى البرتقالي || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

٧٠٤١ - جنس Genre (F). Genus (E).
هو في التصنيف مجموعة انواع حيوانية او نباتية تتصف بصفات مماثلة او مشتركة . والجنس يأتي تحت الفصيلة وفوق النوع.

٧٠٤٢ - جنسن * Panax ginseng (S).
Ginseng, Panax (F). Asiatic ginseng (E). Gensang (D). Ginseng (I).
نبات زراعي طبي معمر من الفصيلة البلايية . منبت المناطق الحارة . اوراقه متعاقبة مركبة . ازهاره عشكولية التجميع جميلة الشكل . جذوره طبية جزيلة النفع تشفي من جميع العلل على حد قول الصينيين .

٧٠٤٣ - جنسي G n rique (F). Generic (E).
ما هو تابع للجنس .

٧٠٤٤ - جنصينة * Janthina (S).
Janthine (F). Janthina (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الجنصينيات . انواعها المعروفة نحو ٢٥ جميعها يمنية مفترسة . تجوب بحار البلاد المعتدلة الحارة || اصداؤها رقيقة بنفسجية اللون زرقاء المواجه تعوم على سطح الماء وتستقر ما طاب لها من الوقت بواسطة طوافات اهليجية الشكل رقيقة يفرزها الجسم ويفصلها عند الحاجة || اعرف انواعها الجنصينة الثنائية اللون (J. bicolor) المنتشرة في البحر الابيض المتوسط .

٧٠٤٥ - جنصينيئات Janthinidae (S).
Janthinid s (F). Janthinidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل اماميات الحياشيم المشطية . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها يمنية مفترسة اعطائها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة . ملجئها الحياتي جماعي ، اسرابها وافرة العدد الذي يناهز الملايين || اصداؤها رقيقة بنفسجية اللون او زرقاء ، حلونية القسم المحلزن ، مستديرة التجويف الفموي . اجسامها صغيرة . رؤوسها ضخمة خطمية الشكل ، ثنائية اللوامس المستطيلة المعبونة || اعرف اجناسها واشهرها الجنصينة والركلوزة .

٧٠٤٦ - جنطاس * Janthoenas (S).
Janthoenas (F).

جنس طير من فصيلة الحماميات . انواعه المعروفة سبعة ، اعطائها تمتد من جزر الزابج الى سائر جزر المحيط الهادي || اجسامها تشبه الحيدران . طولها يراوح من ٣٣ الى ٣٧ سم . اثارها الى الخططي الاسنح يعلوه مواج من الاخضر الى الارجواني . رؤوسها طحلاء اللون او سمراء . صدورها الى البياض التبي . اذناها كبيرة ، مقطوعة الاطراف || ملجئها الحياتي جماعي . سرها يمد من ٤٠ الى ٨٠ زوجاً . قوتها البزور والحبوب والثمار الناضجة || تدثن في تجاويف الاشجار . تحضن اربع مرات في الحول . حضنتها بيضتان . الترخيم تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء .

ثمرته مستديرة صفراء اللون . حصوصها شفافة ، حامزة الطعم ، ذكية العرف تربب || يستخرج من بزورها دهن الجندم .

٧٠٣٥ - جندم بنطامي Garcinia benthami (S).
Garcinie bentham (F).

نوع من الجندم . شجرته متوسطة القد . ثمرته اجاصية الشكل قطر قاعدتها نحو ٤ سم . لونها الى الصفار البرتقالي . حصوصها ضخمة قليلة العدد بيضاء اللون مستحبة الطعم والعرف .

٧٠٣٦ - جندم حلو Garcinia dulcis (S).
Garcinie doux (F).

نوع من الجندم . شجرته متوسطة القد . ثمرته تنفاحية الشكل والحجم ، ذهبية اللون . حصوصها كثيرة العدد ، مأكولة ، حلوة المذاق ، فواحة العرف الذكي .

٧٠٣٧ - جندم سنغفورا Garcinia hombroniana (S).
Garcinie de Singa-pour (F).

نوع من الجندم . شجرته متوسطة القد ترغب في الاثرية الرملية الساحلية القريبة من البحر . ثمرته حمراء اللون كروية الشكل بحجم التفاحة . حصوصها تقارب حصوص المنستان شكلاً ولوناً وطعماً وعرفاً .

٧٠٣٨ - جندم منغستان * ، جوز جندم ، كوز كندم ، زهرة الحجر Garcinia mangostana (S).
Garcinie mangostan, Mangoustanier (F). Mangosteen tree (E). Mangostan-baum (D). Mangostana, Lauro di giava (I).

نوع من الجندم . شجرته تعلو من ٥ الى ١٢ م . ساقها منتصب . اغصانها فارشة ، قنبا فضفاضة . اوراقها جلدية النصل عابقة الخضار . ازهارها رباعية الفصل والبتلات . ثمارها كروية الشكل بحجم البرتقالة المتوسطة . والثمرة مكونة من بعض البزور تحيط بها خمسة او ستة حصوص جامدة الب لايض اللون المأكول ، تغلفها قشرة جلدية سمكة لمساء البشرة لوناً احمر خمرى . لها لذيذ الطعم ، ذكي العرف ، فاخر الصنف . يستخرج من بزور ثمارها دهن الجندم الذي يستعمل استعمال الزيت .

٧٠٣٩ - جندم هندي ، فرقران Garcinia indica, G. morella (S).
Garcinie de l'Inde, Brindonnier, Guttier, Moreiller (F). Gamboge tree (E). Guttabaum, Malergarcinie (D). Garcinia morella, Mangostana morella (I).

نوع من الجندم . شجرته متوسطة القد تعلو نحو ٧ امتار ساقها غليظة يستخرج منها بالحز عصارة صمغية شفافة ، تصفر بعد جفافها ، تستعمل في عدة صناعات || ثمارها كروية ، كبيرة الحجم ، حمراء اللون ، مأكولة الباب وتررب . بزورها لوزية ، دهنية المادة يستخرج منها زيت صناعي شائع الاستعمال .

٧٠٤٠ - جنزارة * Clepticus genizarra (S).
Cleptique rouge tre (F).

سمكة بحرية بيوض من شائكات الزعانف وفصيلة الكيدييات موطنها شاسع الاطراف يمتد من المحيط الهندي الى الهادي . تألف الاغوار القريبة من المجادح . ملجئها الحياتي جماعي . جماعاتها قليلة العدد || جسها اهليجي الشكل ، معتدل

الزغطة التي تنشأ من اتحاد غامتين تحمل كل منها عاملاً خاصاً بالصفة فإن كانا عاملاً الزغطة لصفة خاصة متماثلين دعي الفرد الناشئ جنساً اي متماثلاً أو أسيراً وأن اختلفا فهو هجين أو أشيب .

٧٠٦١ - جنيس مشاكس *Synanceia verrucosa* (S).
Synanceia verrucosa, *Synanceia verrucosa* (F).
 سمكة بحرية من الجلائخ . اعطانها البحر الاحمر وبعض مناطق المحيط الهندي . جسمها مستهجن الشكل كثير النتوءات والشعول . رأسها افطس المقدم . عيناها صغيرتان ، رفيعة الارتكاز . زعنفتها الظهرية كبيرة قاطبة ، حادة المناخس الصلبة السامة . سمها شديد الفعالية يقضي على الانسان ان اصابه باقل من ساعتين .

٧٠٦٢ - جنيس مرعس *Synanceia horrida* (S).
Synanceia horrida, *Synanceia horrida* (F).
 سمكة بحرية من الجلائخ . اعطانها تمتد من البحر الاحمر الى المحيط الهندي . جسمها غريب الشكل . رأسها افطس عديم السهف . عيناها تحتلان قبة الرأس الناشزة . ظهرها جالس الخط تملوه زعنفة قاطبة مركبة من ١٨ متخساً صدفية المادة . بطنها جراحي الشكل يلحفه من اليمين واليسار صدفتان كبيرتان || لحمها سام في بعض فصول السنة . ذلك عندما يكون مرتعها نومي المرجان .

٧٠٦٣ - جنيسية *Genêt* (F).
 جنبة معمرة من فصيلة القرنيات الفراشية مشهورة باسم شيزاء ، اطلبها .

٧٠٦٤ - جنيسك * *Harpa* (S).
Harpe (F). *Harpa* (E).
 جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الجنيكيات . انواعها المعاصرة عديدة منتشرة في بعض مناطق المحيط الهندي والمحيط الهادي || اصداقها مطلية جميلة الياكل والالوان الزاهية . اجسامها كبيرة مستطيلة . رؤوسها صغيرة مبطلعة ثنائية اللواس المعبونة المخروطية الشكل الدقيقة الاطراف . اعظامها انبوية مستطيلة ، ملونة ، مجذعة كاللوامس . اريدتها فضفاضة كبيرة وارجلها كذلك || اشهر انواعه واندرها الجنيك النبيل « *Harpe noble* » .

٧٠٦٥ - جنيكيات * *Harpidae* (S).
Harpidés (F). *Harpidae* (E).
 فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل . اجناسها وانواعها المعاصرة المعروفة عديدة اعطانها بعض مناطق المحيط الهندي والهادي || اصداقها شبه اهليلجية الشكل ، بطنية ، مضلعة ، ناشزة الضلوع القاطبة المنتهية بقبة محزنة ، محززة ، مدببة الطرف || اعرف اجناسها واشهرها الجنيك .

٧٠٦٦ - جنين *Fœtus*
 الولد ما دام في رحم امه .

٧٠٦٧ - جنينة *Jardin fruitier, Verger* (F).
Fruit-garden (E).
 هي كل جنة صغيرة خصصت للاشجار المثمرة .

٧٠٤٧ - جنطيانه *Gentiane* (F). *Gentian* (E).
 هي الكوشاد ، اطلبه .

٧٠٤٨ - جنطيانيات *Gentianaceae* (S).
Gentianacées (F). *Gentianaceae* (E).
 الجنطيانيات والجنشانيات والكوشاديات اسماء ثلاثة لفصيلة نباتية واحدة من ذوات الفلقتين . اطلب كوشاديات .

٧٠٤٩ - جنغل * ، جفلاس *Gagata* (S).
Gagate (F). *Gagata* (E).
 جنغل هو الاسم الهندي وجفلاس الاسم الهندوسي . سمكة نهريّة من مفتوحات المثانة وفصيلة السلوريات . موطنها جميع انهر الهند || جسمها سناني الشكل ، معتدل التبطيط ، يطول نحو ٣٣ سم . ثوبها الى الشبهة المتواجبة بالطحلة . زعانفها الى السمرة القاتمة . خطمها افطس الشكل يحمل ثمان عذبات . زعنفتها الظهرية الاولى شرعية الشكل ، مستطيلة . زعنفتها الذيلية فارقة || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٧٠٥٠ - جنف * *Taluter* (F). *To slope* (E).
 جعل الحافة منحدره .

٧٠٥١ - جنقلة *Cincle plongeur* (F). *Dipper* (E).
 طائر صغير القد يألف المياه يعرف بالدنقلة ، اطلبها .

٧٠٥٢ - جنهي *Bambou* (F). *Bamboo* (E).
 هو الخيزران ، اطلبه .

٧٠٥٣ - جنوب ، قبليّة *Vent du sud* (F).
 الجنوب او القبليّة : ربح مهبها القبلة . *South wind* (E).

٧٠٥٤ - جنوبي ، قبلي *Méridional* (F).
 Meridional, Southern (E).
 تمت تعريفي يطلق على ما هو تابع او مختص بالجنوب .

٧٠٥٥ - جنوبي *Austral* (F). *Austral* (E).
 تمت تعريفي يطلق على ما هو خاص بالجنوب القطبي .

٧٠٥٦ - جنور *Aire* (F). *Area* (E).
 الجنور : مداس الخططة والشعير (القاموس) .

٧٠٥٧ - جنى *Cueillir* (F). *To gather* (E).
 جنى وتجنى الثمرة : تناولها من الشجرة . وأجنى الشجر : أدرك . وأجنى : ما يجنى من الشجر ما دام غضاً . وأجنى : ثمر جنى من ساعته . وأجنى : ما يجنى من الثمار .

٧٠٥٨ - جنسية *Sous-arbrisseau* (F).
 Herbaceous plant (E).
 هو كل نبات يكون بين البجلة والجنبة .

٧٠٥٩ - جنسبي *Sous-frutescent*,
 Suffrutescent (F). *Suffrutescent* (E).
 تمت تعريفي يطلق على كل نبات كيانه كيان الجنبية او شكله شكلها . م . جنبيّة .

٧٠٦٠ - جنيس ، جنيس الرغطة ، أسيل *Homozygote*
 الجنيس حيوانياً او نباتياً هو المتماثل العوامل الوراثية وذلك لان عامل الصفة الوراثية يوجد دائماً مزدوجاً في



جنغل



جنيس مرعس



جنيك

٧٠٦٨ - جَنِينِي

Embryonnaire (F).

Embryonic (E).

نعت تعريفي يطلق على ما هو مختص بالجنين ، راجع مضني .

٧٠٦٩ - جَنِينُوس * ، بُولَة ٥

Johnius (S).

Johnius (F), Johnius (E).

بولة هو الاسم الهندي . جنس اسماك نهريّة من شائكات الزعانف وفصيلة البهاريات . انواعه المعروفة عديدة ، جميعها من اسماك مياه البلاد الحارة الاسيوية والافريقية . تألف الانهر ومصباتها || اجسامها معتدلة القد ، تغول من ٢٧ الى ٤٢ سم . تتميز باخطامها الفطسة وبعيونها الكبيرة الجاحظة . جميعها ثنائية الزعانف الظهرية ، مستديرة الذيلية . اثوابها متداخلة الشبهة والخضار ، تعبق في الظهور وتغبر في البطن ومنها المنمشة بالاسمر والفضية البطن || لحومها متفاوتة التصنيف والجودة ، جميعها مأكولة .

٧٠٧٠ - جَهَارَة ٥ ، اَعْصَام ٥

Morphologie externe, Phytographie (F). External morphology, Phytography (E).

هي تعريف وتحلية الشكل الخارجي الواقعي في الحيوان والنبات . اما درس التركيب الداخلي فيسمى شوزبة وقائفة .

٧٠٧١ - جِهَاز التَّنَفُّس

Appareil respiratoire (F). Respiratory system (E).

الجهاز التنفسي هو مجموعة الاعضاء المختصة بعملية التنفس القائمة على اخذ الاكسجين اللازم للجسم من افواه واخراج ثاني اكسيد الكربون وبخار الماء . الغاية منها احراق المواد السكرية للحصول على الطاقة العملية . فاذا نفذت المواد السكرية من الجسم اتحد الاكسجين مع المواد الدهنية وعند نفاذها يتحد مع المواد الزلالية فيبتدئ بالمدخنة وينتهي الى المكوّنة للخلايا || اما اعضاء جهاز التنفس فهي : الانف والبلعوم والحنجرة والقصبة الهوائية والرئتان . والجهاز التنفسي قد يكون على اربعة اشكال ، تحديدها ما يلي : ١ - التنفس الرئوي الذي تتميز به الحيوانات الثديية والطيور والزواحف . ٢ - التنفس الفلصمي الذي تتميز به الحيوانات المائية كالاسماك وغيرها . ٣ - التنفس القصبي الذي تتميز به الحشرات . ٤ - التنفس الجلدي الذي تتميز به الشعاعيات وما شاكلها .

٧٠٧٢ - جِهَاز الهَضْم

Appareil digestif (F).

Digestive organs (E).

الجهاز الهضمي هو الجهاز المختص بتقطيع الطعام ومضغه وبلعه ومزجه بمختلف العصارات التي تذيب منه ما يتمكن الجسم من امتصاصه . اما ما تبقى وهو الجزء الغير مهضوم فيخرج من الشرج ويعرف بالبراز || يقسم الجهاز الهضمي تبعاً لوظائف اجزائه الى قسمين : الاول يشمل القناة الهضمية التي تبتدئ بالفم وتنتهي بالاسم . وهي مؤلفة من الفم والبلعوم والمريء والمعدة والامعاء الدقيقة والامعاء الغليظة والشرج . اما الثاني فيتألف من ملحقات القناة الهضمية وهي الاعضاء التي تفرز السوائل الهاضمة كالغدد اللعابية والكبد والمقعد (البشكرياس) .

٧٠٧٣ - جِهَاز جِذْرِي

Système racinaire (F).

Radicular system (E).

الجهاز الجذري هو نوع وشكل الجذور التي تميز النباتات عن بعضها بمض .

٧٠٧٤ - جِهَاز دَوْرِي

Appareil circulaire (F).

Circulatory system (E).

الجهاز الدوري هو الجهاز المختص بتوزيع الدم على سائر اجزاء الجسم لذلك فهو جهاز وعائي مقفل ينقل الدم من القلب ويعيده اليه . يتألف من القلب والاوردة الدموية .

٧٠٧٥ - جِهَاز عَصْبِي

Système nerveux (F).

Nervous system (E).

الجهاز العصبي هو الذي يتحكم بتصرفات الجسم ويتسلط على الادراك والاحساس والحركة || يتألف الجهاز العصبي من قسمين : الجهاز العصبي المركزي الذي يشمل المخ والنخاع الشوكي . والجهاز العصبي الطرفي الذي يشمل الاعصاب للدماغية والشوكية .

٧٠٧٦ - جِهَاز قَفْزِي

Appareil saltatoire (F).

Saltatory apparatus (E).

الجهاز القفزي عند الحشرات هو العضو او الاعضاء المختصة بهذه الحركة .

٧٠٧٧ - جِهَاض

Arac, Méruak (F).

Tooth-brush tree (E).

الجهاض هو شجر الاراك وقيل ثمره ما دام اخضر .

٧٠٧٨ - جِهَام

Arac, Méruak (F).

Tooth-brush tree (E).

الجهاض هو شجر الاراك وقيل ثمره ما دام اخضر .

٧٠٧٩ - جَهَبَر

Arac, Méruak (F).

Tooth-brush tree (E).

الجهاض هو شجر الاراك وقيل ثمره ما دام اخضر .

٧٠٨٠ - جَهَبَل *

Arac, Méruak (F).

Tooth-brush tree (E).

الجهاض هو شجر الاراك وقيل ثمره ما دام اخضر .

٧٠٨١ - جِهَة ، طَرَّة

Arac, Méruak (F).

Tooth-brush tree (E).

الجهاض هو شجر الاراك وقيل ثمره ما دام اخضر .

٧٠٨٢ - جِهْدِيَّة ٥

Arac, Méruak (F).

Tooth-brush tree (E).

الجهاض هو شجر الاراك وقيل ثمره ما دام اخضر .

٧٠٨٣ - جِهْرَاء ، جِهْرَاء

Arac, Méruak (F).

Tooth-brush tree (E).

الجهاض هو شجر الاراك وقيل ثمره ما دام اخضر .

٧٠٨٤ - جِهْرَل *

Arac, Méruak (F).

Tooth-brush tree (E).

الجهاض هو شجر الاراك وقيل ثمره ما دام اخضر .

٧٠٨٥ - جِهْرَل *

Arac, Méruak (F).

Tooth-brush tree (E).

الجهاض هو شجر الاراك وقيل ثمره ما دام اخضر .

٧٠٨٦ - جِهْرَل *

Arac, Méruak (F).

Tooth-brush tree (E).

الجهاض هو شجر الاراك وقيل ثمره ما دام اخضر .

٧٠٨٧ - جِهْرَل *

Arac, Méruak (F).

Tooth-brush tree (E).

الجهاض هو شجر الاراك وقيل ثمره ما دام اخضر .

٧٠٨٨ - جِهْرَل *

Arac, Méruak (F).

Tooth-brush tree (E).

الجهاض هو شجر الاراك وقيل ثمره ما دام اخضر .

٧٠٨٩ - جِهْرَل *

Arac, Méruak (F).

Tooth-brush tree (E).

الجهاض هو شجر الاراك وقيل ثمره ما دام اخضر .

٧٠٩٠ - جِهْرَل *

Arac, Méruak (F).

Tooth-brush tree (E).

الجهاض هو شجر الاراك وقيل ثمره ما دام اخضر .



جَنِينُوس



جِهَبَل



جِهْرَل

٧٠٩٣ - **جَهْلُولُ الرَّمَالِ** * Tringa arenaria (S).

Bécasseau sanderling, Sanderling des sables (F).

نوع من الجهلول طولهُ من ١٥ إلى ١٦ سم. ثوبه الصيفي أسود منق بالابيض والاصهب يكثُر البياض في بطنه. ثوبه الشتوي أرمَد الظهر، ابيض البطن والصدر || يعيش اسراباً كبيرة العدد. يألف الشواطئ الرملية البحرية. قوته القشريات والرخويات يلتقطها بين مد الامواج وجزرها.

٧٠٩٤ - **جَهْلُولُ الشَّرْقِ** Bécasseau cocorli (F).

طائر من الهساس مشهور باسم هساس جبلي، اطلبه.

٧٠٩٥ - **جَهْلُولُ الشَّوْاطِي** * Tringa maritima (S).

Bécasseau cincle, B. maritime, Brunette (F).

نوع من الجهلول متوسط القد طولهُ نحو ٢٠ سم. ثوبه متراكب الالوان المنمقة المرقطة يعبق في الصيف ويفتح في الشتاء || اسرابه قليلة العدد. يعيش قرب الشواطئ والمناقع والامهار والبحيرات. قوته الديدان والرخويات والقشريات.

٧٠٩٦ - **جَهْلُولُ الْقُطْبِ** * Tringa canutus (S).

Bécasseau canut, Maubèche (F).

اكبر انواع الجهلول واضخمها جثة طولهُ نحو ٢٥ سم. ثوبه الصيفي ابلق الظهر يعلوه توشيم اصهب. ثوبه الشتوي رمادي اللون تعلوه رقشة خفيفة اما بطنه في كلا الشويين فالى البياض الاغبر || يعيش اسراباً متوسطة العدد. يألف المناقع وضفاف الانهر والبحيرات. قوته الخلزون والديدان والرخويات.

٧٠٩٧ - **جَهْلُولُ صَغِير** * Tringa minula (S).

Bécasseau minule (F).

نوع من الجهلول صغير القد طولهُ نحو ١٣ سم. ثوبه الصيفي الى السواد المنق والمرقط بالابيض والاصهب. صدره وبطنه الى البياض الزاهي. اباهره وقوامه ببيض الحنار. ثوبه الشتوي لا سواد فيه. منقاره وارجله سود. اسرابه متوسطة العدد. يألف مجاري الماء والشواطئ. قوته الديدان والحشرات على اختلافها.

٧٠٩٨ - **جَهْلُولُ مَنَجَلِي** * Tringa platyrhynchus (S).

Bécasseau platyrhynque (F).

نوع من الجهلول متوسط القد طولهُ نحو ١٧ سم. منقاره مشوي الشكل يحوب امريكه الشمالية واروبه. اسرابه متوسطة العدد. يألف المناقع ومجاري الماء. قوته الديدان والرخويات والحشرات والفراش.

٧٠٩٩ - **جَهْنَمِيَّة** Bougainvillier (F).

Bougainvillia (E).

هي البوغنيلية، اطلبها.

٧١٠٠ - **جَهْيَرَّة** Hypécoum (F).

Horned cumin (E).

اطلب هيقون.

٧١٠١ - **جَهْيَرَّة** Ourson (F).

Bear's cub (E).

جرو الدب والجبس أثناء.

٧١٠٢ - **جَوَّ** Atmosphère (F).

Atmosphere (E).

هو الطبقة الهوائية التي تغلف سطح الكرة الارضية.

الى ١٠٠ سم. قرونها مصمتة، مخددة، حيداء تطول من ٣٠ الى ٣٨ سم. اذناها تطول من ٦ الى ٨ سم. رؤوسها مستطيلة. اعناقها وصدرها ومناكبها وافرة الشعر المستطيل. اثوابها الى السرة الخنطية يعلوها موج جؤوي. رؤوسها واثباح ظهورها اشد سمرة من سائر الاقسام || اناثها اصغر قدماً من ذكورها واقصر قرناً وضروعها رباعية الاختلاف. محبلها يستمر نحو ١٧٥ يوماً تضع في تمامه جدياً واحداً تقطعه بعمر اربعة اشهر. اما انواعه الثلاثة فهي:

٧٠٨٥ - **جَهْرَلُ الْجَزِيرَةِ، تَعَار**

Hemitragus jakarki (S).

Hémitrague de l'Arabie (F).

٧٠٨٦ - **جَهْرَلُ جَنُوبِي الْهِنْدِ**

Hemitragus hylocrius (S).

Hémitrague du Sud de l'Inde (F).

٧٠٨٧ - **جَهْرَلُ حَمَلَايَا**

Hemitragus jemlaicus (S).

Hémitrague de l'Himalaya (F).

٧٠٨٨ - **جَهْرُنْ** Johrenia (S).

Johrénie (F).

جنس نباتات عشبية برية محولة أو معمرة من فصيلة الخيميات. انواعه المعروفة ثلاثة منبتها جرود لبنان والمناطق السورية المجاورة || سوقها منتصبه فرعاء مألسة اللحاء. اوراقها جذعية ريشية التركيب. ازهارها صيواني التجميع، طرفي الارتكاز. ازهارها صغيرة، صفراء اللون.

٧٠٨٩ - **جَهْرُنْ أَثْلِي** Johrenia juncea (S).

Johrénie joncée (F).

نوع من الجهرن المعمر. ساقه منتصبه رفيعة فرعاء. ازهاره صيواني ثنائي الاشعة اللامتساوية. تنويره صيفي. منبته يمتد من منطقة بعلبك الى جبل الشيخ.

٧٠٩٠ - **جَهْرُنْ فُطْرِي** Johrenia fungosa (S).

Johrénie longueuse (F).

نوع من الجهرن المحول. ساقه اسطوانية منتصبه قليلة الفروع. ازهاره صيواني سباعي الاشعة اللامتساوية. ثماره بيضية الشكل، فطرية الحافة. تنويره صيفي. منبته الجرود والبقاع.

٧٠٩١ - **جَهْرُنْ مُنَشَقَّب**

Johrenia dichotoma (S).

Johrénie divariquée (F).

نوع من الجهرن المحول. ساقه منتصبه فرعاء. ازهاره صيواني خماسي او سباعي الاشعة المتساوية. تنويره صيفي. يكثر وجوده في الجبل الشرقي وجبل الشيخ.

٧٠٩٢ - **جَهْلُول** Tringa (S).

Limicole, Bécasseau (F).

Sandpiper (E).


جنس طير من عمارة الكنسيات. انواعه ١٢ جميعها من القواطع التي تجوب البلاد الباردة والمعتدلة. اثوابها مرقطة تتبدل صيفاً وشتاء. قوته الخلزون والرخويات والقشريات والديدان. يعيش قرب الماء. يدن عشه في الرمل. افموصه بيضي الشكل متوسط العمق. الانثى تبيض من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها وحدها من ١٥ الى ١٧ يوماً. اعرف واشهر انواعه ما يلي.



جهلول الرمال



جهلول الشواطئ



جهلول القطب



جهلول صغير



جهلول منجلي

اما فئة جوارح الليل فتشمل قسماً واحداً يتألف من فصيلة واحدة وهو البوميات .

٧١١٠ - جَوَارِحُ اللَّيْلِ ، كَوَاسِرُ اللَّيْلِ

Rapaces nocturnes (F). Nocturnal rapacious (E).
فئة من رتبة الجوارح تشمل قسم البوم وفصيلته الوحيدة
العديدة الانواع .

٧١١١ - جَوَارِحُ الْمَالِ

الاناث التي تلد فتكثر المال كالفرس والناقة واللاتان
والبقرة ... (اللسان) .

٧١١٢ - جَوَارِحُ النَّهَارِ ، كَوَاسِرُ النَّهَارِ

Rapaces diurnes (F). Diurnal rapacious (E).
فئة من رتبة الجوارح تشمل كل من قسمي الصقور والنسور
مع ما يتبعها من فصائل وسمات واجناس وانواع .

٧١١٣ - جَوَاسُ * (S).

Cyclommate (F). Cyclommatus (E).
الذكر جواس والانثى جواسة . جنس خنافس من فصيلة
المنظوبيات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعه المعروفة
متوسطة العدد اعطائها بعض مناطق الاقاليم الحارة الممتدة
من العراق الى الهند والهند الصينية || خنافسها ويرقاتها
دائمة تعيش على المواد النباتية المنحلة || اجسامها متباينة
القَد والشكل بين الذكر والانثى . اطوال ذكورها تراوح
من ٢٤ الى ٣٢ سم . اما اناثها فن ١٨ الى ٢٢ سم . ذكورها
مستلظة الرؤوس الكبيرة . عظيمة التأثير مستطيلة الزباني
المرفقية . الدرقية الاطراف . اناثها مفلطحة الكواهل والبطون
صغيرة التأثير والزباني . عيونها كبيرة ، جاحظة ، عند
الشقين . اغمارها صلبة . قوائمها نشيطة . فئابيبي اناثها
مسنة شائكة .

اشهر انواعه جواس الهند المعروف ايضاً بجواس ألبرسي
Cyclommatus Albersi (S).

٧١١٤ - جَوَافُ

ضرب من السمك وليس من جيده (القاموس) .

٧١١٥ - جَوَافَةُ

الجوافة ضرب من السمك وليس من جيده . ج جواف
وجوي . (اللسان) .

٧١١٦ - جَوَانَّة * ، خَوَيَّ

Rostratula (S). Rhynchée, Râle-bécasse (F). Painted snipe (E).
جنس طير من دجاجيات الارض ، يدعى في مصر بكاشينة
مزوقة . انواعه المعروفة اربعة . اعطائها البلاد الحارة
الاسيوية والافريقية تجوبها صيفاً وشتاء في طلب الرزق .
جميعها صغيرة القَد ، طويلة الساق ، مستطيلة المناقير
الجالسة ، قصيرة الاذنان الذلقة . اناثها جميلة الالوان
الزاهية المنسجمة بين الاصهب والاطحل والاصفر والاخضر
والابيض . عيونها مطوقة ومكحلة بالاصفر || اناثها اكبر
قداً من ذكورها وازهى خضاباً . ومن ميزات ان الاناث
تقاتل لامتلاك الذكور || تألف المناقع وزراعات الارز .
تدئن في الادغال البدة القريبة من الماء . الانثى تضع من
٥ الى ٦ بيضات يحضنها الذكر || تعتبر من الطرائد
الفاخرة اللحم .

٧١١٧ - جَوَائِي

Météorologique (F).

Meteorological (E).

مختص بعلم الحوادث الجوية اي الجويات .

Aérométrie (F).

Aerometry (E).

الجواء علم يبحث في خواص الهواء الفيزيائية وفي نتائجها
الميكانيكية .

٧١٠٤ - جَوَّاب * (S).

Cetorhinus maximus (S). Pèlerin, Requin-Pèlerin (F). Basking-shark (E).

حيوان بحري ولود من فصيلة الجوايات . اعطانه معظم
بحار العالم يجوبها من الشرق الى الغرب ومن الشمال الى
الجنوب . مسرجه يمي كثير البعد عن المياه الاقليمية .
قوته الاسماك الصغيرة والقشريات والرخويات . ملجئه
الحياتي جماعي || جسمه كبير القَد ، وشعي الشكل ،
يطول نحو ١٤ متراً ، ويزن عدة اطنان . ثوبه الى الكهبة
تشدد سمرته عند الظهر ويغير عند البطن . رأسه شبه مخروطي
الشكل . عظمه ذلق شارف . له لاطي * . شدقه كبير
وعريض . اسنانه متراسة ، صغيرة ، مخروطية الشكل لا
تصلح للاقتراس . يتميز باستطالة فلولجه الخيشومية وبكبر
زعنفته الظهرية الخلفية || الانثى قليلة النثر ، تضع في
فصل الصيف نحو ٢٥ مجراً .

٧١٠٥ - جَوَّابِيَّات * (S).

Cetorhinidae (F). Cetorhinidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية ولودة من رتبة الاشلاق . اجناسها
وانواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها معظم بحار العالم
اخصها البحار القطبية || اجسامها وشعية ، كبيرة ،
ضخمة ، تطول من ١٢ الى ١٥ متراً . اناثها الى الكهبة
تشدد سمرتها عند الظهر وتخف عند البطن . رؤوسها شبه
مخروطية . اعظامها ذلقة ، شارفة . اشدقها كبيرة ، رجة .
اسنانها كثيرة ، صغيرة متراسة || تتميز باستطالة فلولجها
الخيشومية التي تطوق علاط العنق حتى النحر ، وبطول
اهداب الاقواس الخيشومية الداخلية || اناثها اكبر جرماً
من ذكورها . نتائجها محول وقد يراوح عدده من ٢٣ الى
٢٥ مجراً .
اشهر انواعها الجَوَّاب .

٧١٠٦ - جَوَّالِم (F).

Passereaux (F). Sparrow, Passeres (E).

رتبة من الطير تشمل بعض الرتيبات والعديد من الفصائل .
اشهر فصائلها : الدخليات والزرزوريات والسبديات
والشمرووريات والغرايات والقبريات .

٧١٠٧ - جَوَّاد (F).

Cheval de selle (F). Saddle-horse (E).

هو فرس الركوب . ج جياد واجياد .

٧١٠٨ - جَوَّار (F).

Jardinier (F). Gardener (E).

هو البستاني المختص بالاعمال الزراعية .

٧١٠٩ - جَوَّارِح ، كَوَاسِرُ ، سِبَاعُ الطَّيْرِ

Rapaces, Oiseaux de proie (F). Rapacious, R. birds (E).

رتبة من الطير عديدة الفصائل والانواع . مختلفة الاحجام
والاشكال والاثواب . جميعها من اللواحم || تقسم
الجوارح الى فئتين فئة جوارح النهار وفئة جوارح الليل .
وجوارح النهار تقسم الى قسمين قسم الصقور وقسم
النسور . قسم الصقور يشمل ثلاث فصائل : الصقريات
والاشبوريات والقمقييات . وقسم النسور يشمل ايضاً
ثلاث فصائل : النسريات والبلحيات والزماحيات .



جَوَّاب



جَوَّاس (ذكر)



جَوَّاسَة (انثى)



جَوَّانَة

٧١٢٧ - جَوْنَلْ أَصْفَر

Epidendrum vitellinum (S).
Epidendre jaune d'oeuf (F).

نوع من الجونل. نبات تزييني ثارب. مهدد المكسيك. ساقه شبه دوفسية. أوراقه سنائية النصال، متعاقبة متراكبة لونها الى الخضار البحري، تطول نحو ٢٠ سم. شراخه يعلو من ٨٠ الى ١٢٠ سم. ازهاره سنبل التجميع. ازهاره ارجوانية اللون تعلوها مشحة برتقالية. شفيفاتها الى الصفار العابق || تنويره خريفي.

٧١٢٨ - جَوْنَلْ الضَّفَادِع

Epidendrum raniferum (S).
Epidendre porte-grenouilles (F).

نوع من الجونل. نبات تزييني ثارب. مهدد المكسيك. ساقه دوفسية. أوراقه سنائية النصل، مزدوجة التصفيف، تطول نحو ٢٠ سم. شراخه يعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. ازهاره عنقودي التجميع، مستطيل الشكل. ازهاره الى الخضار الالعس تعلوه رقشة جؤوية || تنويره خريفي.

٧١٢٩ - جَوْنَمَة

Rachée (F).
الجؤمة الارومة الفرعاء اي جذع الشجرة المقطوعة مسح التربة وقد انتش فساتل جديدة.

٧١٣٠ - جَوْنَن * ، جَاسَكْت ، يَاسْفَتُوس

Hyacinthus (S). *Jacinthe*, *Hyacinthe* (F). *Hyacinth* (E). *Hyazinthe*, *Märzblume* (D). *Giacinto* (I).
جنس نباتات عشبية بصلية من فصيلة الزنبقيات. ازهارها ذكية العرف، عنقودية التجميع، قعية او جرسية الشكل، هامة الارتكاز تقوم على شراخ غليظ امرط. أوراقها قرصية الانتشاب ضيقة مستطيلة || انواعه قليلة اعرفها الاربعة التالية اما ضروبه واصرامه فكثيرة.

٧١٣١ - جَوْنَن المَرُوج

Endymion (F).
هو العنصول، اطلبه.

٧١٣٢ - جَوْنَن جَمْسِي

Hyacinthus amethystinus (S). *Jacinthe amethyste* (F).
نوع من الجونن البري يكثر في الاتربة الكلسية لانه من نباتاتها الطوعية. أوراقه ضيقة مستطيلة طولها من ١٠ الى ٢٠ سم. عرضها من ٤ الى ٧ سم. عددها من ٦ الى ٨. شراخه الزهري يعلو من ١٠ الى ٢٠ سم. ازهاره زرقاء اللون متدلية عددها يراوح من ٤ الى ١٢.

٧١٣٣ - جَوْنَن رُومَانِي

Hyacinthus romanus (S). *Jacinthe de Belleval* (F).
نوع من الجونن البري. أوراقه اربع او خمس شديدة الخضار طولها من ٤٠ الى ٥٠ سم، عرضها من ٨ الى ١٨ سم. شراخه الزهري يعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم. ازهاره عادمة العرف كثيرة العدد لونها الى الابيض يعلوه توشم اخضر ومشحة بنفسجية داخلية.

٧١٣٤ - جَوْنَن شَرْقِي ، قَسْطَلْ الارض ، مَكْحَلَة

Hyacinthus orientalis (S).
Jacinthe orientale, *J. commune* (F). *Common Hyacinth* (E).
اعرف واشهر انواع الجونن واذكاهها عيبراً. ضروبه اربعة اما اصرامه فكثيرة العدد || أوراقه جميلة الخضار

٧١١٨ - جَوْبَة

Interligne (F).
Space-line, *Interlining* (E).
هي المسافة القائمة بين خطين من الزرع او من الاشجار ج جوبات وجوب.

٧١١٩ - جَوْبَة

Trou de plantation (F).
الحفرة استغرت وجهزت لاقتبال الغرة. ولا يقال جياب او جوائب الا للحفر المتتابعة المتساوية الخطوط.

٧١٢٠ - جَوْبِيَة * ، قَارَجِيل شِلِي

Jubaea spectabilis (S). *Jubée*, *Cocotier du Chili*, *Lilla* (F). *Coquito-palm* (E). *Coquitopalme* (D). *Palma del miele* (I).
شجرة من النخلينات وحيدة الجنس والنوع. مهدا بلاد الشيلي. ساقها منتصبة، مستقيمة، تعلو نحو ١٥ م. جذعها مستدق السنج والطرف، غليظ الوسط حيث يبلغ قطره نحو المتر. سعفها كسعف النخيل. جريدتها تطول نحو اربعة امتار. ازهارها عشكولي التجميع. ثمارها جوزية الشكل. كبيرة القد، لها آحي التركيب مأكول. ويستخرج من ساقها عند حزها عصارة سكرية دسمة تدعى عسل الجوبية.

٧١٢١ - جُوت * ، جُوْتَه ، قَنْب كُلْكُوْتَه

Corchorus capsularis (S). *Jute*, *Corette textile*, *Chanvre de Calcutta* (F). *Jute plant*, *Gunny-bag* (E). *Jutepflanze*, *Indischer flacks* (D). *Corcoro siliquaso* (I).
نبات عشبي زراعي صناعي حولي من فصيلة الزنبقيات. ساقه ليفية. منتصبة. أوراقه معنقة، متعاقبة، بيضية القاعدة، سنائية الطرف، خشنة النصل المسنن الحافة. تكثر زراعته في الهند حيث يستعملون لحاء سوقه في صناعة الاكياس والحبال.

٧١٢٢ - جُوت مَنَشُورِيَه

هو ابو تيلون ابن سينا، اطلبه.

٧١٢٣ - جُوَّة

Rouille (F). *Rust* (E).
الجوة: صدأ الحديد.

٧١٢٤ - جُوْت

Caillette (F). *Rennet* (E).
الجوت والجوتاء: القبة اي كرش الشاة. (القاموس).

٧١٢٥ - جَوْنَلْ *

Epidendrum (S).
Epidendre (F). *Epidendrum* (E).
جنس نباتات برية وتزيينية أمعية او قاربة من فصيلة السحليات. انواعه المعروفة نحو ٣٠٠ معظمها من نبات امريكة الوسطى || سوقها جذمورية او دوفسية. أوراقها متراكبة، لحمية مستطيلة. ازهارها فواحة العرف المستحب سنبلية التجميع او عنقودية، ترتكز على شراخ دقيقة جامدة الالياف. اعرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية.

٧١٢٦ - جَوْنَلْ أَدَهَس

Epidendrum erubescens (S).
Epidendre rougissant (F).
نوع من الجونل. نبات تزييني ثارب. مهدد المكسيك. ساقه جذمورية أوراقه سنائية، متعاقبة، متراكبة تطول نحو ٢٥ سم. شراخه يعلو من ٥٠ الى ٨٠ سم. ازهاره عشكولي التجميع. ازهاره متوسطة القد لونها الى البنفسجي. شفيفاتها صفراء القواعد، حر الاطراف || تنويره خريفي.



جوبية



جوت



جونن



جونن

عديدة تألف المناطق المعتدلة . تسرح على وجه الماء .
اجسامها سوداء اللون ، نحيلة . أرجلها دقيقة مستطيلة .

٧١٤٦ - جَوَزْسُ الْمَنَاقِيعِ (S). *Gerris paludum* (S).
(F). *Gerris des mares* (F).

حشرة قانصة من فصيلة شابران الماء ورتبة مختلفات
الاجنحة . جسمها متوسط الحجم يطول نحو ١٥ مم . رأسها
شبه مخروطي الشوزن . خطمها صغير وقصير . عيناها
كبيرتان ، ناشزتان . زباناها مستطيلان ، اسمران .
كوسلها مكظف الاطراف . حجفتها صغيرة . ظهرها لا
يلحف كامل الجسم . سكتها البطنية السادسة مجهزة
بمنخسین يشرفان على الجهاز التناسلي . قوائمها مستطيلة
باستثناء الزوج الامامي || ثوبها الى السمرة السوداء . بطنها
مطوق بخنجر قبي اللون ، اسود الفواصل السكية . قوائمها
الى السمرة يشوبها خضاب اصفر || تعيش من قنصها على
سطح الماء . تلقي الانثى جراب مكنها على سطح الماء بين
الاعشاب فيلصق باسحداها ويستقر حتى التقف .

٧١٤٧ - جَوَزْسُ فِضِّي (S). *Gerris argentata* (S).
(F). *Gerris argenté* (F).

حشرة قانصة من فصيلة شابران الماء ورتبة مختلفات
الاجنحة . جسمها صغير يطول من ٧ الى ٩ مم . رأسها
شبه انبوي الشوزن . خطمها صغير . عيناها جانبيتان
كبيرتان ، ناشزتان . زباناها مستطيلان اسمران . كوسلها
مجنى الشكل . ظهرها لاحف . قوائمها مستطيلة باستثناء
الزوج الامامي || ثوبها العلوي الى السمرة المتماوجة .
بطنها فضي اللون || تعيش من قنصها على سطح الماء .

٧١٤٨ - جَوَزْق (F). *Autruche mâle* (F).
(E). *Ostrich male* (E). هو الظليم ، الذكر من النعام .

٧١٤٩ - جَوَزِي (F). *Rose bifère* (F). *Damask rose* (E).
هو الورد الجوري ، اطلبه .

٧١٥٠ - جَوَزِي (F). *Jurassique* (F). *Jurassic* (E).

نمت تعريفي يطلق على الحقبة الثانية من الاباج الاوسط .
فيقال العصر الجوري والاراضي الجورية || تتميز هذه
الحقبة ببدء استتباب المناطق المناخية ، وبازدهار بعض
الفقاريات كالاسماك والضفادع والزحافات ، وبوجود اول
طائر معروف حتى الآن ويدعى « اريخيس » ، وبظهور
بعض الصنوبريات والسيكاسيات واول نباتات من
مزدوجات الفلقة .

٧١٥١ - جَوَز (S). *Juglans* (S). *Noyer* (F).
(E). *Walnut-tree* (E).

جلس اشجار كبيرة القد دائمة مشرة من فصيلة الجوزيات .
مهدا الشرق الادنى والهند . انواعها محدودة اما ضروبها
فعديدة . اوراقها مركبة عابلة . ازهارها قدية . ثمارها
جوزية الشكل ، قرفية الغلاف الخارجي ، خشبية
القشرة الداخلية ، مأكولة اللباب . اخشابها فاخرة
الصنف . قشورها صباغية . اوراقها طيبة تستعمل في
بعض العلاجات || اشهر انواعه الجوز العادي
والاربد ثم جوز الصخور والاسود وسبيولك ومنشوريه .

٧١٥٢ - جَوَزْ أَرْقَم (F). *Conopode à tiga nue* (F).
(E). *Arnut* (E). هو الاكثار الاجرد ، اطلبه .

الزاهي يراوح عددها من ٤ الى ٨ طولها من ٢٠ الى
٣٥ سم . عرضها من ١٠ الى ١٥ مم . شراخه الزهري
يعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم . ازهاره مختلفة الالوان يراوح
عددها من ٥ الى ١٥ || اما ضروبه الاربعة فهي :

الجوْنَن البَارِيْزِي *Jacinthe parisienne*
الجوْنَن الروماني *Jacinthe romaine*
الجوْنَن المبكر *Jacinthe précoce*
الجوْنَن الهولندي *Jacinthe de Hollande*

٧١٣٥ - جَوْنَن لَزُورْدِي (S). *Hyacinthus azureus* (S).
(F). *Jacinthe azurée* (F).

نوع من الجوْنَن البري مهدد الشرق الادنى . اوراقه بحرية
الخضار طولها من ٨ الى ١٥ سم . عرضها من ١٠
الى ١٦ مم . عددها من ٥ الى ٦ . شراخه الزهري
يعلو من ١٠ الى ٢٠ سم . ازهاره متدية كثيفة التجميع
عابقة الازرقاق .

٧١٣٦ - جَوْجُوْ ، قَصْ (S). *Sternum*
عظام قفص صدر الطائر .

٧١٣٧ - جَوْجُشِيَّات (F). *Carinata* (E). *Carinates* (F).
شعبة من الطير تشمل اكثر من ٢٠ رتبة اشهرها الجوارح
والجوائم والدجاجيات والحماميات والوزيات .

٧١٣٨ - جَوَّح (S).
نوع من البطيخ وقيل البطيخ الشامي . الواحدة جوحة .

٧١٣٩ - جَوَّحَل (F). *Chimère* (F). *Chimera* (E).
الجوحل خيال او وهم باطل لا يمت الى الواقع او الحقيقة
بشيء .

٧١٤٠ - جَوَّحَلِي (F). *Chimérique* (F).
(E). *Visionary, Fanciful* (E).
نمت تعريفي يطلق على الاسترسال في الجوحة .

٧١٤١ - جَوْد (F). *Pluie abondante* (F).
(E). *Abundant rain* (E).
هو المطر الغزير . والتجاويد : الامطار الجيدة النافعة .

٧١٤٢ - جَوْدَار (F). *Seigle* (F). *Rye* (E).
هو الشيلم ، اطلبه .

٧١٤٣ - جَوْدَر (F). *Veau sauvage* (F). *Savage calf* (E).
الجودر والجودور : ولد البقرة الوحشية . ج جوادر وجآذر
قال علي بن اسحق الزاهي :

ويبيض بألحظ العيون كأنما
هززن سيفاً واستلن خناجرا
تصدين لي يوماً بمنعرج اللوى
فنادرن قلبي بالتصبر غادرا
سفرن بدوراً وانتقبن اهله
وسن غصوناً والتفتنا جآذرا

٧١٤٤ - جَوْر (F). *Gaur, Boeuf gaur* (F). *Indian urus* (E).
هو الغور نوع من ابقار الوحش .

٧١٤٥ - جَوَزْسُ * (S). *Gerris*
جنس حشرات مفترسة من فصيلة شابران الماء انواعه



جورس

أريتها. ولبابها من التوابل العطرية المستحبة. دهنها منه شديد الفاعلية ومهاضم وطارد للرياح || ومنهم من أكل الباب لأغراض جنسية لأنه ينشط البهائم غير أن أدمان استعماله يؤدي إلى اضطرابات عصبية خطيرة العواقب.

٧١٦١ - جوز القمي*
Vomiquier (F).
هو السريكنوس، أطلبه. Nux vomica tree (E).

٧١٦٢ - جوز الهند
Cocotier commun (F).
هو النارجيل المعروف، أطلبه. Cocoa-nut palm (E).

٧١٦٣ - جوز بوا*
Muscadier (F).
هو جوز الطيب. Nutmeg tree (E).

٧١٦٤ - جوز جندم
Mangoustaniér (F).
Mangosteen tree (E).
شجرة مشمرة من الكلوزيات، أطلبه جندم منغستان.

٧١٦٥ - جوز سيبولد
Juglans sieboldiana (S).
Noyer de Siebold (F).
نوع من الجوز مهدد اليابان. شجرته تعلو من ٢٥ إلى ٣٠ سم. أوراقه مركبة وريقاتها زباء النصل على صفحتها السفلى. ثماره كروية الشكل زغبية القرفة عتقودية التجميع.

٧١٦٦ - جوز عادي*
Juglans regia (S).
Noyer commun (F). Walnut tree (E). Echte wallnuss, Wallnusse (D). Noce (I).
هو أشهر أنواع الجوز وأهمها زراعة. فروبه عديدة جميعها مأكولة الثمار. أشجاره تعلو من ١٢ إلى ٢٤ م. أوراقه مركبة سياعية أو تساعية الوريقات البيضية الشكل المديبة الطرف. نصلها جلدي أبرد البشرة تفوح منه رائحة خاصة تأخذ بالآلاف دون أن ينفر منها. ثماره اللينة الباب المستحب الطعم. قشورها الخشبية غليظة مخددة. قرفها الخارجية سميكة، ملساء البشرة، سريعة التفكك || أخشابها جوزية اللون فاخرة الصنف.

٧١٦٧ - جوز كندم
Mangouste (F).
Mangosteen (E).
هو ثمرة جندم منغستان ويدعى الجندم والكندم.

٧١٦٨ - جوز لرتة
Chicote (F). Nicker tree (E).
هو الهندق الهندي، أطلبه.

٧١٦٩ - جوز مائل* ، بقم
Datura metel (S).
Stramoine métal, Métel, Datura métal (F). Metel, Downy thorn-apple (E). Weichhaarige stechapfel (D). Metel, Mela spinosa, Noce metella (I).
نوع من الداتورة وفصيلة الباذنجانيات. وهو نبات جنيني، طبي، سام معمر. ساقه زباء منتصب، مخشوشة، تعلو نحو المتر. أوراقه معنقة، متقابلة، مفصصة، مفرضة، زغبية النصل. أزهاره كبيرة القد بيضاء اللون فواحة العرف. ثماره جواء متدلية هدية البشرة || أوراقه وثماره سامة يستخرج منها بعض العناصر الطبية النافعة.

٧١٧٠ - جوز مرآني، جوز مجنح
هو العرتون، أطلبه. Pterocarya (E). Ptérocaryer (F).

٧١٧١ - جوز منشورية
Juglans mandschurica (S).
Noyer de Mandchourie (F).
نوع من الجوز مهدد منشورية وآسية الشرقية. شجرته تعلو

٧١٥٢ - جوز أرمانيوس
Linnaire commune (F).
هو الليناريه العادية، أطلبها. Toad-flax (E).

٧١٥٤ - جوز أرمند*
Juglans cinerea (S).
Noyer cendré, N. à beurre (F). Butter-nut (E). Butter wallnuss (D). Noce cenerino (I).
نوع من الجوز مهدد البلاد الأمريكية. شجرته تعلو من ١٨ إلى ٣٥ م. أوراقه مركبة وريقاته من ١١ إلى ١٥ نصلها أزغب البشرة على صفحيه. ثماره مأكولة الباب المستحب الطعم، بيضية الشكل، زباء القرفة، دقيقة القشرة الخشبية.

٧١٥٥ - جوز أسود
Juglans nigra (S).
Noyer noir (F). Black-nut (E).
نوع من الجوز مهدد البلاد الأمريكية. شجرته كبيرة القند تعلو من ٣٠ إلى ٥٠ م. أوراقه مركبة، وريقاتها من ١٥ إلى ١٧، نصلها أبرد الصفحة العليا، أزغب السفلى مسنن الحافة، ضعيف الرائحة الخاصة. ثماره مأكولة، شبه مستديرة، قرفها لاصقة تنفكك بعد يباسها التام، قشرتها الخشبية جامدة. لبابها لذيق الطعم. خشبه شديد السمرة فاخر الصنف.

٧١٥٦ - جوز الأفمي
Noix de serpent (F).
جوز الأفمي نبات طبي يدعى فقيلة، أطلبها.

٧١٥٧ - جوز البر
Orpin paniculé (F).
Purslane leaved stonecrop (E).
هو حي العالم العشكولي، أطلبه.

٧١٥٨ - جوز الصخور
Juglans rupestris (S).
Noyer des rochers (F).
نوع من الجوز مهدد البلاد الأمريكية. شجرته تعلو من ٧ إلى ١٥ م. أوراقه مركبة، وريقاتها من ١٥ إلى ٢٥، نصلها لسن الشكل، أزغب الصفحة السفلى || ثماره صغيرة القد بيضية الشكل.

٧١٥٩ - جوز الشراك
Amome graines de paradis (F).
هو الحال الجوزي، أطلبه. Black-amomum (E).

٧١٦٠ - جوز الطيب* ، جوز بوا* ، تسباسة
الطيب، صبر
Myristica fragrans (S).
Muscadier commun (F). Nutmeg tree (E). Muskatnussbaum (D). Miristica, Noce moscata (I).
نوع من السباسة مهدد البلاد الاستوائية. أشجاره هرمية الشكل تعلو نحو ١٠ أمتار. أوراقها عروية، بسيطة، كاملة، متعاقبة، معنقة، أهليلجية، نصلها بارز العروق المشطية الارتكاز. أزهارها عادية ثنائية المسكن. ثمارها شبه كروية الشكل لحمية القشور الصفرة اللون كالشمش، قطرها نحو ٥ سم. || قشرة الشرة تنفلق عند الإدراك عن جوزة خشبية الغلاف سمراء اللون يلحمها أريال مفرض لونه إلى الحمرة البرتقالية غني بالمواد العطرية يحوي نحو ٨٪ من الإدهان العطرية و ٢٤٪ من الراتنج الجامد و ٣٪ من السكر والمصارة اللابية. أما لباب الجوزة الموجود ضمن الغلاف الخشبي وهو إلى القهوة المضلعة بعروق جزوية. يحوي نحو ٢٥٪ من المواد الدهنية المعروفة بدهن جوز الطيب و ٣٪ من الإدهان الطيارة و ٥٪ من النشا والحمض السباسي.



جوز أرمند



جوز الطيب



جوز عادي



جوز مائل



جوزة



جوزة هندية



جوزق



جوزيت الشيلي



جوساني



جوسيا

البثلات المقعرة || يزرع للتزيين اذهراره يستمر من تموز الى تشرين .

٧١٨٢ - جَوْشَن Thorax

الجوشن هو صدر الحشرة وفيه توجد الاغداد والرواشن والارجل الامامية والوسطى والخلفية .

٧١٨٣ - جَوْشَوْش Bréchet (F). Breast-bone (E).

هو صدر الطائر .

٧١٨٤ - جَوْف بُنِّي Cœur brun (F).

Core flush (E).

عارض يصيب ثمار التفاح المحفوظة في البراد . مظهره خضاب بني يركب جوف الثمرة قرب محيط بزورها فيعطب الداخل دون ان يمتد الى الطبقة السطحية والخارج . يقال ان اسبابه الرئيسية تعود الى ارتفاع نسبة الغاز الكربوني في غرفة التبريد والى حفظ الثمار في درجة منخفضة تقارب الصفر .

٧١٨٥ - جَوْف مَائِي Water core (E).

عارض يصيب ثمار التفاح قرب ادراكها فيفسدها ببقع فسيحة لاقياسية الشكل والقذ تعلو البشرة من جهة معرض الشمس يقابلها من الداخل ، خاصة قرب وسط الثمرة ، جيوب قاسية صلبة لا لون لها تبدو كالماء || اسبابه المقدرة وطأة اشعة الشمس والحرارة ثم انفلاق بعض الخلايا التي تصبح كالجيوب .

٧١٨٦ - جَوْفِي Phréatique (F).

Underground water level (E).

نمت تعريفي يطلق ، في علم الجيولوجية ، على كل جيب مائي ديماسي الموقع .

٧١٨٧ - جَوْقَلَة Aéroportage (F).

الجوقلة النقل بطريق الجو .

٧١٨٨ - جَوْقَلِي ، مَجَوْقَل Aéroporté (F).

Airborne (E).

نمت تعريفي يطلق على ما ينقل بطريق الجو . بريد جوقلي . جيوش مجوقلة .

٧١٨٩ - جَوْكِي ، قَبَّاس ، مَقَّاس Jockey

هر الذي يركب الفرس ويرسله في حلبه اسباق .

٧١٩٠ - جُوم Paroi, Cloison (F).

Coat, Dissepiment (E).

الجل والجلال ج أحوال . هو الحاجز الحجروي او الخليوي .

٧١٩١ - جُوتُق Landier (F). Furzè (E).

هو الوزال ، اطلبه .

٧١٩٢ - جُولِيَانَا Hesperis (S). Julienne (F).

جنس نباتات عشبية زهرية من فصيلة الصليبيات اوراقها متعاقبة . ازهارها عنقودي . ازهارها لاقنابية ، عطرية العرف || اشهر انواعه وأعرفها ما يتبع .

من ١٥ الى ٢٥ م . اوراقه مركبة وريقاتها من ٩ الى ١٩ نصلها مستطيل الشكل ، مدبب الطرف المسن ، ازغب الضلع . ثماره مأكولة اللباب .

٧١٧٢ - جُوزَاء Orion (F).

الجوزاء كوكبة نجوم جنوبية الموقع تسمى ايضاً الجبار ، اطلبه .

٧١٧٣ - جُوزَات liôts de liber (F).

غدد في اللحم فوق الشكير .

٧١٧٤ - جُوزَة * Noix (F). Walnut, Nut (E).

هي ثمرة الجوز وتطلق على كل ثمرة تشبه الجوز .

٧١٧٥ - جُوزَة هِنْدِيَّة * Noix de Coco (F).

Cocoa-nut (E).

الجوزة الهندية وجوزة الهند جمعها جوز هندي هي ثمار النارجيل .

٧١٧٦ - جُوزَق * Noix de coton (F).

جوزق القطن : جوزة (القاموس) . Nut of cotton (E).

٧١٧٧ - جُوزَل Pigeonneau (F).

Young pigeon, Squab (E).

فرخ الحمام قبل وبعد نبات ريشه .

٧١٧٨ - جُوزِيَّات Juglandaceae (S).

Juglandacées (F). Juglandaceae (E).

هي الفصيلة الجوزية من ذوات الفلقتين عديدة الفعالات . اجناسها خمسة . ازهارها بحبيحة ، الذكورية منها قدية الشكل متدلية والانثوية سنابل منتصبه محاح .

٧١٧٩ - جُوزِيَّت الشيلي * Geositta cunicularia (S). Géositte du Chili (F).

طائر من فصيلة الفرنايات . موطنه بلاد الشيلي . يألف الغابات ولا يخشى الاقتراب من حدائق الاماكن الآهلة || جسمه قريب الشبه بالفرنار . طوله نحو ١٤ سم . ثوبه الى الصحرة الموشحة بالاسمر . زوره عاجي اللون . صدره وبعطه الى الشقحة المرقوشة بالاسمر . حدقة عينه عسلية اللون || قوته الحشرات الصغيرة والنمل والبزور || وكنته افصوص يحلده في التربة قرب جذوع الاشجار . الانثى تضع من بيضتين الى اربع بيضات تحضنها بمنوبة الذكر نحو اسبوعين .

٧١٨٠ - جُوسَانِي * Bovista (S). Boviste (F).

جنس فطور كروية الشكل من فصيلة الفقعيات . انواعه عديدة تعيش على المواد المضوية المنحلة في التربة . اشهرها واعمها الجوساني الرصاصي وهو من الفطور المأكولة . والجوساني الجبار الذي يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم . وهو مأكول ايضاً شرط ان يجنى قبل تمام ادراكه .

٧١٨١ - جُوسِيَّاء * ، طَبِيحَا Jussiaea (S). Jussiee (F). Primrose-willow (E).

Jusslene (D). Jussiea (I).

نبات عشبي لبي معمر وحيد الجنس والنوع ، قليل الضروب من فصيلة الاخدریات . يعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم . ساقه زباء اللحم . اوراقه مترادفة ، اهليلجية ، لسنة . ازهاره صفراء اللون ، كبيرة القذ ، خسانية

٧٢٠٠ - جُونِسَة
Banaste (F).
سل متوسط القد مضفور بالقصب او بالقصبان الدقيقة
يستعمل في نقل الثمار وبعض الخضار وما اشبه .

٧٢٠١ - جُونِي
Syrhapte (F). Black-bellied (E).
هو النصف ، اطلبه .

٧٢٠٢ - جُونِيَّات ، غَضَفِيَّات
Pteroclidæ (S). Pteroclidæ (E).
فصيلة طير من رتبة الدجاجيات تتميز بجمال خلقها
وزخرفة ألوانها وانسجام شكلها وصغر رأسها وقصر منقارها
واستطالة قوائم سقطها . وهي شديدة الطيران تقيم في
الفيافي والاحراج || انواعها عديدة تجتمع الى جنسين
النصف والقطا .

٧٢٠٣ - جُونِيَّة
Ganga oriental (F).
Imperial sandgrouse (E).
طائر من القطا يعرف بالقطة الشرقية .

٧٢٠٤ - جَوْهَر خَام
Principe brut (F).
Rough principle (E).
هو الجوهر المميز الموجود في مادة معينة .

٧٢٠٥ - جَوْهَر فَعَال
Principe actif (F).
Energetic principle, Active principle (E).
هو الجوهر العنصري المميز الموجود في الجوهر الخام .

٧٢٠٦ - جَوْهَر مُنَهَضِم
Principe digestible (F).
Digestible principle (E).
هو الجوهر القابل الانهضام من اصل الجوهر الخام .

٧٢٠٧ - جَوْهَرَة
Perle (F). Perla (E).
هي اللؤلؤة . ج جواهر .

٧٢٠٨ - جَوْهَرِيّ ، خَاصّ ، ذَاثِي
Intrinsèque (F). Intrinsic (E).

٧٢٠٩ - جَوْهَل ٥ ، عَدَاء الشَط ٥
Actodroma (S). Actodrome (F). Actodroma (E).
جنس طير من طوال الساق وفصيلة الكنتسيات . انواعه
المعروفة قليلة العدد جميعها من القواطع تجوب البلاد في طلب
الرزق والمصيف والمشي || اجسامها صغيرة تطول من ١٥
الى ٢٢ سم . رؤوسها صغيرة . مناقبها مستطيلة ، دقيقة ،
جالة . قوائمها نحيلة . اذنانها قصيرة . اجنحتها لاحفة ||
يكثّر وجودها على الشواطئ حيث تتمتع بالحشرات وما يلفظه
البحر من رخويات وقشريات || أشهر انواعه الجوهرل
القرمز او عداء الشط القرمز (Octodroma minuta)
الذي يطول نحو ١٥ سم . والذي يمضي فصل الشتاء على
شواطئ البحر الاحمر .

٧٢١٠ - جَوِيَّات
Météorologie (F).
Meteorology (E).
هي الاحداث الجوية .

٧٢١١ - جَوِيْسَة ، أُسْبِرُولَة
Asperula (S).
Aspérule (F). Woodruff (E).
جنس نباتات عشبية برية وزراعية من سبط الجويسيات
وفصيلة الفوييات . انواعه عديدة معظمها اعشاب معمرة
قرعاه السوق المفصلة . اوراقها صغيرة ، متقابلة ، مدببة
الطرف ، جامدة النصل . ازهارها هامي الارتكاز ،

٧١٩٣ - جُولِيَّانَا حَزِينَة
Hesperis tristis (S).
Julienne triste (F).
نوع من الجوليانا وهي عشبة زراعية تزيينية محولة او
معمرة نسبة الى موقع زراعتها . تعلو من ٣٥ الى ٦٠ سم .
اوراقها الجذعية السفلى معنقة اما العليا فحاضنة وبسنة
الحافة || ازهارها متدلية ، ضيقة البتلات ، فستقية اللون
يعلموها تخديج بنفسجي || ازهارها يستمر من ايار
الى حزيران .

٧١٩٤ - جُولِيَّانَا شَرْقِيَّة
Hesperis violacea (S).
Julienne d'Orient (F).
نوع من الجوليانا وهي عشبة زراعية تزيينية حولية ومحولة
تعلو من ٢٠ الى ٣٠ سم . ساقها زغية . اوراقها حاضنة ،
مسنة ، خلية النصل . ازهارها كبيرة القد ، كثيرة
العدد لونها الى البنفسجي الزاهي يعلموها تخديج احمر .
ازهارها ربيعي .

٧١٩٥ - جُولِيَّانَا نِسَائِيَّة * ، زَهْرَة الْمَسَاء الجميلة
Hesperis matronalis (S). Julienne des dames, J. des
jardins, Girarde, Cassolette (F). Queen's gilliflower,
Sweet rocket (E). Matronenviole, Nachtviole (D).
Esperide del giardino, Giuliana, Girarda (I).
نوع من الجوليانا وهو نبات عشبي زراعي تزييني معمر
يعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . اوراقه معنقة مستطيلة ، سنائية
النصل ، مسنة الحافة . ازهاره كبيرة القد ، زرقاء او بنفسجية
اللون ، يتضرع اريجها العطر الاخاذ عند المساء || ضروبه
عديدة ، منها المكبس والابيض والاحمر والليلكي ...
ازهاره يستمر من ايار الى ايلول .

٧١٩٦ - جُومِيْس ٥
Geomys (S). Géomys,
Gauphre à poches (F). Pocket gopher, Pouched
rat (E). Taschenratte, Gopher (D).
جنس حيوانات لبونة قاضمة جاسة من فصيلة الجوميسيات .
انواعه نحو ٣٠ جميعها صغيرة القد تطول من ١٨ الى
٢٢ سم . اذنانها من ٦ الى ٨ سم . رؤوسها غليظة .
مقاضمها مقطوعة . عيونها خرزوية . اذنانها لا قوفية .
جرانزها قصيرة . اصابعها طويلة . اظافيرها كبيرة
مقوسة حادة || اناثها تحمل ستة اطفال وتضع من ٤
الى ٦ ادراص . اجحارها فسيحة الجوانب تقيمها
في الحوم تحت جذور الاشجار على اعماق تراوح بين
١٢٠ و ١٧٠ سم . انفاقها طويلة متعرجة . قوتها
المواد النباتية على اختلافها .

٧١٩٧ - جُومِيْسِيَّات ٥
Geomyidae (S).
Géomyidés (F). Geomyidae (E).
فصيلة حيوانات لبونة قاضمة جاسة من رتبة قرقدنيات
الشوزب ورتبة القواضم . اجناسها سبعة . انواعها
٨٢ تتميز بمحبوبها الحديدية التي تجمع فيها القوت . اجسامها
اسطوانية الشكل صغيرة القد . موطنها البلاد الامريكية
قوتها الجذور والاعشاب وجميع المواد النباتية .

٧١٩٨ - جُون
الجون : النبات يضرب الى السواد من خضرته .

٧١٩٩ - جُونَة
Disque du soleil couchant (F).
قرص الشمس عند المغيب .



جوليانا نسائية



جومييس



جَوْهَل



جويسة الصباغين



جويسة برية



جويسة عطرة



جيترة متوجة



جيترة معبونة

٧٢٢٢ - جَيْتَب الرُّكْمَةِ ° Poche copulatrice (F).
Copulatory saccus (E).

٧٢٢٣ - جَيْبُون Gibbon
هو الجبون ، راجعه .

٧٢٢٤ - جِيَّة Eau stagnante (F).
Stagnant-water (E).

هو الماء الآسن . ومن ثعلب : « الماء المستنقع في
الموضع » .

٧٢٢٥ - جَيْتَرَة Blennius (S).
Blennie (F). Blenny (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الجيتريّات . انواعها المعروفة
نحو ٢٠ اعطائها معظم بحار العالم اخصها المحيط الاطلسي
والهادي والبحر الابيض المتوسط . تألف معاشب الجراح
والثغاف || اجسامها شبه اهليلجية الشكل تطول من ٢٠
الى ٦٠ سم . رؤوسها مستفظة ، مقطوعة الخاطم ، محدبة
الاطراف ، يعلوها في جباهها او فوق عيونها لوامس متفاوتة
الاشكال والاحجام || اثنائها ملونة . ذكورها اكثر
خضاباً من اناثها . حراشفها شديدة الصغر يعلوها مادة
لزجة || زعانفها الظهرية كبيرة ، شبه شراعية الشكل ،
مستطيلة الشع الغضروفية اللينة || اناثها تلصق السرة في
سقوف انفاق الخورم وتحميه بمنابرة ذكورها حتى التفك ||
اشهر انواعها الجيترة المتوجة والمعبونة والهلولة .

٧٢٢٦ - جَيْتَرَة مُتَوَجَّة * Blennius gattorugine (S).
Blennie gattorugine (F). Gattorugine (E).

نوع من الجيترة . اعطائها ثغاف ومجادح البحر الابيض
المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي || جسمها شبه
اهليلجي الشكل يطول من ٢٠ الى ٢٥ سم . رأسها صغير
الجرم ، قصير الخطم . عيناها كبيرتان رفيعتان الارتكاز .
لوامسها كبيرة متشعبة منها اثنتان فوق الحاجبين واثنان
على القف || ثوبها الى السرة يعلوها تجلج جؤوي يمتد
من الظهر الى الاطليين . زعانفها صفراء اللون . الذكر
ازهى ثوباً من الانثى واميز قدماً منها || زعنفتها الظهرية
وحيدة مستطيلة مجذعة بالجؤوي . زعنفتها الذيلية مستديرة
الطرف || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٧٢٢٧ - جَيْتَرَة مَعْبُونَة * Blennius ocellaris (S).
Blennie ocellée (F). Ocellate blenny (E).

نوع من الجيترة . اعطائها ثغاف ومجادح البحر الابيض
المتوسط || جسمها شبه اهليلجي الشكل يطول نحو ٢٢ سم .
رأسها مستضخم الجرم مقطوم الخطم . عيناها كبيرتان ،
جاحظتان ، رفيعتان الارتكاز . لامستها منشعبتان الاطراف ،
منتصبتان فوق العينين . ثوبها الى الخفصار الزيتي يعلوه
تبقيع لاقياسي التدوير ازرق اللون عند الذكر ، اخضره
عند الانثى || زعانفها ملونة . الظهرية الاولى كبيرة القد
شراعية الشكل مستطيلة اسلاك الشع ، يعلوها زئمة كبيرة
شديدة الزرقة مطوقة بالابيض . زعنفتها الصدرية مروحية
الشكل منحنية الشع . زعنفتها الذيلية مستديرة الطرف .
لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٧٢٢٨ - جَيْتَرِيَّات Blennidae (S).
Blenniidae (F). Blenniidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من رتبة شائكات الزعانف . اجناسها

عنقودي التجميع . ازهارها تويحية البتلات ، رباعية
الاسدية ، ثنائية الميس || اشهر انواعها ما يتبع .

٧٢١٢ - جُوَيْسَةُ الصَّبَاغِينَ * ، أُسْبُرُولَة صِبَاغِيَّة Asperula tinctoria (S). Aspérule tinctoriale, Petite
garance, Rougeole (F). Three lobed woodruff (E).
Färbermeier, Weiss meyerkraut (D). Asprella dei
tintori, Stellina dei tintori (I).

نبات عشبي بري معمر يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم .
اوراقه خيطية مرطاة النصل . ازهاره وردية . جعثنته
صفراء اللون صباغية || ازهاره يستمر من حزيران الى
تموز .

٧٢١٣ - جُوَيْسَة بَرِيَّة * ، أُسْبُرُولَة بَرِيَّة Asperula arvensis (S). Aspérule des champs (F).
Field woodruff, Quinsy wort (E). Ackermeir, Bräun-
wurzel (D). Asperula dei campi, Stellina ruvida (I).
نبات عشبي بري حولي يكثر في الاراضي البور . ترعاه
الماشية . يعلو من ٢٠ الى ٣٠ سم . اوراقه مسنة الحافة .
ازهاره عطرية لونها الى الزرقة الجميلة .

٧٢١٤ - جُوَيْسَة عَطِرَة * ، أُسْبُرُولَة عِطْرِيَّة Asperula odorata (S). Aspérule odorante, Reine
des bois, Petit Muguet (F). Sweet woodruff, Sweet
grass, Muguet (E). Mariengrass, Meierkraut, Wald-
meir (D). Asperula odorosa, Raspello odoroso, Pic-
colo mughetto (I).

نبات عشبي معمر يعلو من ١٠ الى ٣٠ سم . اوراقه
مستطيلة سنانية الزام الاخير . ازهاره بيض عطرية . يكثر
في المراعي وفي الاراضي البور . ترعاه الماشية بشهية ويكسب
الحليب بعض عرقه المستحب . جعثنته وسوقه تحتفظ ،
بعد تجفيفها ، بعرفها العطري || ازهاره يستمر من
ايار الى تموز .

٧٢١٥ - جُوَيْسِيَّات Asperulées (F). Asperula (E).
سبط من فصيلة الفويات .

٧٢١٦ - جَوِيل الجويل ما سفرته الريح من حطام النبات وسواقط ورق
الشجر .

٧٢١٧ - جِيَاد ، خَيْل الرُّكُوب Chevaux de selle (F). Saddle-horses (E).

هي الخيل المعدة لحمل ونقل فرسانها بسرعة . لذلك يجب
ان تكون خفيفة ، نشيطة ، قوية العضلات لتتمكن من
السير السريع المستمر .

٧٢١٨ - جِيَاد الرِّهَان ، خَيْل الرِّهَان Chevaux de course (F). Race-horses (E).

هي الخيل التي صار تحضيرها وتضهيرها للمباراة في ميدان
السباق .

٧٢١٩ - جِيَال Hyène (F). Hyena (E).
هو الفص . يقال انبش من جيال .

٧٢٢٠ - جِيَال ° Ambulatoire (F).
Ambulatory (E).

نعت ترميضي يطلق على ما هو متعلق بالمشي كقولك جرامز
جياالة اي انها معدة للمشي .

٧٢٢١ - جَيْب التَّام Cosinus (F). Cosine (E).

٧٢٢٣ - جَيْتُحَلِيٌّ ° Mégalithique (F).

Megalithic (E).

نعت تعريفي يطلق على كل بناء شيد بالحجارة الضخمة في زمن ما قبل التاريخ .

٧٢٢٤ - جَيْدٌ ، رَقَبَةٌ ، عُنُقٌ Cou (F). Neck (E).

٧٢٣٥ - جَيْدٌ آر

الجيدار : نبات ورقه كورق السنديان له حب احمر يسمى بالقرمز .

٧٢٣٦ - جَيْدَلٌ Pénis des cétacés (F).

Penis of Cetacean (E).

الجيدل قضيب ذكور الحوتيات .

٧٢٣٧ - جَيْدَرَةٌ ° Hexanchus griseus (S).

Hexanche gris. Griset (F). Hexanchus griseus (E).

سمكة بحرية ولود مفترسة من فصيلة الجيذريات ورتبة الاشلاق . اعطانها بعض بحار البلاد الحارة والبحر الابيض المتوسط . مرتما يمي . اخلاقها شرسة لا تعف عن سمكة تستطيع اليها سبيلاً || جسمها وشعي الشكل يطول نحو ستة امتار . رأسها شبه مخروطي الشوزن . اعكامها الخيشومية فلولج سداسية الازواج . زعنفتها الظهرية قريبة من الرأس . زعنفتها الذيلية مستطيلة ومقطوعة الطرف || ثوبها الى الكهبة يسمر عند الظهر ويغير عند البطن . تتميز بكثرة النثار . الانثى تضع مرة في العام نحو ٧٠ مجراً طول المجر نحو ٦٠ سم .

٧٢٣٨ - جَيْدَرِيَّاتٌ ° Notidanidae (S).

Notidanidés (F). Notidanidae (E).

فصيلة اسماك ولودة من رتبة الاشلاق . اعطانها بعض بحار العالم اخصها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من الاسماك اليمية التي تهتم عن المجاذع والشطوط || اجسامها مستطيلة وشعية الشكل وحيدة الزعنفة الظهرية . افواهها سفلية الارتكاز . فلولجها الخيشومية سداسية او سباعية الازواج . شوار ذكورها ثنائي الجيدل يحتل مركز الزعنفة الخوضية || اعرف اجناسها واشهرها الجيذرة والرساع .

٧٢٣٩ - جَيْوٌ Chaux (F). Lime (E).

هو الكلس ، اطلبه .

٧٢٤٠ - جَيْوَارْدِيَّةٌ جَيْوَرْدِيَّةٌ

Gerardia (S). Gerardie (F). Gerardia, False foxglove (E). Gerardie (D). Gerardia (I).

جنس نباتات عشبية زيبية من فصيلة الخنازريات . انواعها قليلة مهددا البلاد الامريكية . جميعها اعشاب صغيرة القد، فرعاء السوق، متقابلة الاوراق الرحيمة الصغيرة . ازهارها جميلة الشكل ، تاجية الارتكاز، حراء اللون او صفراء || ازهارها يستمر في فصلي الربيع والصيف .

٧٢٤١ - جَيْوَانِيُومٌ Geranium

هو الغرنوق نبات عشبي عطر .

٧٢٤٢ - جَيْوَرَةٌ ° Jaera (S). Jaera (F). Jaera (E).

جنس دويبات مائية من القشريات العليا متساويات الارجل وفصيلة الدبريات . انواعها المعروفة قليلة العدد منشرة في بعض اسقاع البلاد الباردة . تعيش في المياه العذبة القليلة الغور . ملجئها الحيائي جماعي || اجسامها،

وانواعها المعروفة نحو ٧٠ . اعطانها معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة . مسرحها مجاذع النقا حيث تكثر النباتات البحرية والحيات || اجسامها لاقبسية الحجم منها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ومنها الفلساء والعريضة والقليلة السنف . رؤوسها كبيرة مستغلة . زعانفها الظهرية والشرجية مستطيلة . زعانفها الذيلية مستديرة الاطراف . اسنانها حادة قوية || اشهر اجناسها الجيتره والطربوب والناشة وفراشة البحر والعريك ...

٧٢٢٩ - جَيْتُومٌ بَشِيرٌ °

Geotomus punctulatus (S).

Géotome ponctué (F).

حشرة من السدنوس وفصيلة الفاسياتيات . مرتما السواحل والشطوط البحرية || جسمها مفلطح ، شبه بيضي الشوزن ، صغير القد ، يطول من ٤ الى ٥ سم . ثوبها الى الجوزة يعمق في الرأس والصدر والحجفة ويهت في حنجب الظهران . بطنها الى الحنطي . رأسها شبه مكور الشكل ، قليل النتوء . عينها صغيرتان ، بارزتان . زبانها اسمران . كوسلها بشير الجانين ، مالمس الوسط وحجفتها كذلك . قشرانها شفاف . ظنايبها الامامية سوطية الاطراف ، شائكة الهلب . الافخاذ الخلفية عند الذكور عادة الهلب || رائحتها كريهة .

٧٢٢٠ - جَيْشَلٌ شَرِيدٌ °

Formicivora domicella (S).

Fourmiller domicelle (F).

طائر من فصيلة الجيشتيات لاقفات النمل الجواثم . موطنه البرازيل والبلاد المجاورة . يألف الادغال والغابات || جسمه معتدل القد يطول عند الذكر نحو ٢٠ سم . ويطول عند الانثى نحو ١٧ سم . ثوب الذكر الى السواد الاحم اللامع باستثناء لوحاف الاجنحة ولحاظ القوادم فانها بيضاء اللون . حدقة العين الى الحمرة الياقوتية . المنقاد متوسط الحجم ، مستدق الطرف . الرسغان والاصابع الى السرة . ثوب الانثى الى الطحلة السمره يعلوها في صدرها بعض التوشيم الاسود || طيرانه قصير الشوط . يتنقل على الارض بخفة ويعدر بسرعة . قوته النمل قبل كل شيء ثم الحشرات الصغيرة والديدان وبعض البذور || يدثن عشه في الدغل على ارتفاع متر او مترين عن سطح الارض . الانثى تبيض لمترين في الحول وتضع في كل مرة من ٤ الى ٦ بيضات تحضنها بمنابرة الذكر نحو ١٣ يوماً .

٧٢٢١ - جَيْشَلِيَّاتٌ ° Formicariidae (S).

Formicaridés, Myothéridés (F). Formicariidae (E).

فصيلة طير من لاقفات النمل الجواثم . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة موطنها بعض مناطق امريكا الجنوبية . تألف الغابات الكثيفة الاشجار حيث تكثر الرطوبة وترتفع الحرارة . ملجئها الحيائي جماعي . جماعتها متفاوتة العدد . قوتها الحشرات واخصها النمل || تنقل على الارض بخفة اما طيرانها فقليل وبطيء || اعرف اجناسها واشهرها الجيثل والمواقي .

٧٢٢٢ - جَيْتُحَلٌ ° Mégalithe (F). Megallith (E).

حجر ضخيم كبير قائم او ممدد يعود الى عصور ما قبل التاريخ .



جيشل شريد



جيذرة




حاصود



حاضن



ورقة حاضنة



حاضنة آلية



حاقول سمّان

٧٣٣٧ - حَافِرِيَّة Calceolatre (F). Calceolaria (E).
اطلب مرموزة .

٧٣٣٨ - حَافِر Mobile, Motif (F).
راجع باعث . Mobile, Moving (E).

٧٣٣٩ - حَافِظَة نَبَاتِيَّة Herbiar (F).
Herbarium (E).
اضبارة خاصة تحفظ فيها الاعشاب بعد تجفيفها .

٧٣٤٠ - حَاقِل باع الزرع في سنبله . حاقله : باعه الزرع في سنبله
والحاقلة : بيع الزرع قبل بدو صلاحه .

٧٣٤١ - حَاقُول الحاقول : سمك اخضر طويل (اللسان) .

٧٣٤٢ - حَاقُول سَمَّان * ، سَمَّان ٥ Pomacentrus symmanus (S). Pomacentre
symman (F). Pomacentrus symmanus (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة الفرغيات ورتبة شائكات
الزعانف . اعطائها بعض اقاليم البحر الابيض المتوسط
اخصها المناطق الشرقية . تعتبر من اسماك النشاف || جسمها
بيضي الشكل ، معتدل التبسيط ، يطول من ٢٠ الى ٢٥ سم
نوبها الى الريدة الزرقاء الموج تعلوها مشحة سمراء في الرأس
والظهر . ويعملوها بقيق فحيمي عند الذكر ، اصفر عند
الانثى . زعانفها الى الريدة البحرية السمراء . رأسها يرمي
الشكل ، قصير الخطم ، صغير الشدق . فكها الاسفل
يتقدم الاعلى . اسنانها صغيرة ، ذرية ، متحركة . عينها
صغيرتان ، مائحتان . زعنفتها الظهرية واحدة ، مستطيلة .
زعنفتها الذيلية مستضخمة ، فارقة || لحمها متوسط الصنف
مأكول .

٧٣٤٣ - حَاكِف Désactif (F). Disactive (E).
الحاكف من استرخى في عمله .

٧٣٤٤ - حَاكِيل Exotique (F).
Exotic (E). دافيه ٥
نعت تعريفي يطلق على كل غريب من الحيوان والطيور .
ج حواكل وحكل . والحواكل والحكل العجم من البهائم
والطيور .

٧٣٤٥ - حَال Traineau de battage (F).
Drag-net (E). هو النورج .

٧٣٤٦ - حَالِب Urètre (F). Urethra (E).
هو قناة بين المثانة وفتحة الاحليل يخرج منها البول لذلك
يدعى مجرى البول .

٧٣٤٧ - حَالِب الشلخ Canal déférent (F).
Canal deferent, Vas deferens (E).

هو قناة نقل الوداف تخصيصه ما يلي : حالب الشلخ
في الحيوان عامة والصوك في الخيل والعب في الابل والذين
في الابقار والذفر في النعم والماعز والكراض في الطير
والركبة في الحشرات . وهما حالبان او اسهران .

٧٣٤٨ - حَالَة ، بَيَّان Etat (F). Case (E).
هي جماع الصفات القانونية العالقة بالانسان والتي يقيم
القانون المدني لها وزناً .

٧٣٣٣ - حَاصِد، حَصَاد Faucheur (F). Mower (E).
من حصد الزرع او من كانت مهنته الحصاد .

٧٣٣٤ - حَاصِل ، حَصِيلَة ، نَتِيجَة Résultat (F). Result (E).

٧٣٣٥ - حَاصِل ، نَائِج Produit (F). Produce (E).
هو كل ما تنتجه الارض من مختلف الزراعات وهو ايضاً
ما تنتجه الصناعات .

٧٣٣٦ - حَاصِلَة Résultante (F). Resulting (E).
الحاصلة هي القوة الصادرة عن فعل قوى شتى .

٧٣٣٧ - حَاصُود * ، مِقْصَب ، مَحْش Faux (F). Scythe (E).
آداة اكبر من المنجل تستعمل لحصد الزرع وحش الكلا .

٧٣٣٨ - حَاصِن * ، رَاحِم Poule couveuse (F).
Brooding-hen (E).
هي الدجاجة الرقواء التي تحضن بيضها .

٧٣٣٩ - حَاصِنَة * Auriculée (F). Auriculate (E).
نعت تعريفي يطلق على الورقة اللاطئة التي تحضن اذيناتها
الساق .

٧٣٣٠ - حَاصِنَة * Couveuse, Incubateur (F).
Incubator (E).

هي آلة حضن البيض الصناعية . اشكالها واحجامها
عديدة أما المطلوب منها ثابت لا يتبدل وهو تأمين الحرارة
اللازمة في مختلف مواقع و مراحل حضنها بمعدل يراوح
من ٣٩ الى ٤١ درجة سغ . ثم تأمين الرطوبة اللازمة
وتمكنين انقلاب البيض . وكل هذا في بيئة لا
يعتورها فساد الهواء .

٧٣٣١ - حَالَة البَلُورَة Epipteur (F).
Epipteuron (E).

هي في الحشرات الغمدية الجناح حافة الغمد الخارجية
المنحرفة الى اسفل .

٧٣٣٢ - حَافِر Sabot (F). Hoof (E).
هو ظفر الخيليات الذي يغطي آخر سلامى الاصابع .

٧٣٣٣ - حَافِر المَهْر Hermodactyle (F).
Finger of hermes (E). هو الشليل ، اطلبه .

٧٣٣٤ - حَافِرَات ، مُنْجَحِرَات Orycteropidae (S). Oryctéropidés (F). Oryctero-
pidae (E).

فصيلة حيوانات من رتبة الدرد اشهر اجناسها الحفار او
خنزير الارض .

٧٣٣٥ - حَافِرِي ، ذُو حَافِر Solipède (F).
Soliped (E).
هو كل حيوان له لمصبع واحدة تدعى الحافر . كالفرس .

٧٣٣٦ - حَافِرِيَّات Ongulés (F).
Hoofed, Ungulate (E).

الحافريات شعبة تشمل رتب مفردات الاصابع ومزدوجات
الاصابع والخرطوميات . اي انها تشمل ما نسميه ذوات
الحف وذوات الغلف .

٧٣٦٠ - حَامُض آزُونِي ، حَامُض آزُونِيك ،
حَامُض نَيْتْرِيكِي

Acide azotique, A. nitrique (F). Azotic acid, Nitric acid (E).

سائل حامضي كثير الاستعمال الصناعي يحصل من مزجه بالصودا أو البوتاس نترات الصودا أو نترات البوتاس وهما سادان كياويان شهيران .

٧٣٦١ - حَامُض أُسْكُرْبِيك ، حَامُض
أُسْكُرْبُوطِي ، حَامُض نَيْتْرِينِي

Acide ascorbique (F). Acid ascorbic (E).

من الفيتامين « ث » مضاد للحفر . يوجد في بعض الثمار اخصها النسرين والكشمش والليمون والبرتقال والفراز (الفراوله) الخ .

٧٣٦٢ - حَامُض إَشْنِي ،
Orsellic acid (E).

بلورات ابرية عادمة اللون والرائحة ، مرة الطعم توجد في الاشنة وفي معظم الشحميات .

٧٣٦٣ - حَامُض أَفْحُوَانِي (F) Anthemic acid (E).

حامض يستخرج من زهر الاقحوان الشريف اي البابونج .

٧٣٦٤ - حَامُض الْبُورِيك ، حَامُض بُورِيك
Acide borique (F). Acid boric (E).

جسم متبلور يستخرج من البورق .

٧٣٦٥ - حَامُض الْفِينِيك ، حَامُض فِينِيك
Acide phénique (F). Carbollic acid (E).

جسم متبلور ابري التركيب حريف قوي الرائحة يستعمل كطهر ومضاد للطفيليات .

٧٣٦٦ - حَامُض الْفُسْفُور ، حَامُض فُسْفُورِي
حَامُض فُسْفُورِيك

Acide phosphorique (F). Acid phosphoric (E).

من اغذية النبات الرئيسية .

٧٣٦٧ - حَامُض الْكِبْرِيْت ، حَامُض السُلْفُور
Acide sulfureux (F). Sulphur acid (E).

من الغازات الخافقة . يستعمل في مكافحة بعض الامراض الفطرية وفي بعض الصناعات .

٧٣٦٨ - حَامُض أَنْجِدَانِي Ferulic acid (E).

بلوراته ابرية عادمة اللون والطعم والرائحة . يستخرج من الانجذان . تأكسده أو اكسدته تعطي الحامض الويني .

٧٣٦٩ - حَامُض أَنْجِيلِيك
Acide anigélique, A. tigilique (F). Acid angelic (E).

بلوراته ابرية عادمة اللون والرائحة . يوجد في جنود حشيشة الملاك والسنبيل .

٧٣٧٠ - حَامُض إَهْلِيلِجِي ، حَامُض كَابِلِي
Acide chebulinique (F). Acid chebulic (E).

بلورات صميقة متناهية الدقة عادمة اللون . جزءها ينوب في ١٥٠٠ جزء من الماء البارد وفي ١١٠ جزء من الاثير || يوجد في الاهليلج .

٧٣٤٩ - حَالِق * ، عَطْفَه Vrille (F). Tendril (E).

ورقة تحول نصلها الى ضلع ليفي التركيب اسطواناني الشكل مستطيل يمكن النبات من التسلق والتعلق كما في الكرمة .

٧٣٥٠ - حَالِق الشَّعْر Bryone blanche (F).
White bryony (E).

اطلب فاشرا بيضاء .

٧٣٥١ - حَالُوش * ، مَالُوش ، حَرَّائَة ، كَلْب
الْمِي Gryllotalpa vulgaris (S).

Courtilière, Taupe-grillon (F). Mole cricket (E). Maulwurfsgrille (D).

حشرة مؤذية من فصيلة الجدديات تحفر في التراب الرطب دهاليز سطحية افقية وتقتضي على كل نبات فتي او لين يتعرض طريقها كما لا تعف عن بعض البذور اخصها البقلة والقرعية . تكافح باستعمال فليوسيليكات الباريوم وغيره من الحواشير الفعالة .

٧٣٥٢ - حَالُوط Pourridié (F).

Root-rot, Honeyagaric (E). Hallimasch (D).

وصم فطري شديد الاذى يعترى ارومة وجذور الاشجار . سببه فطور مجهرية مختلفة اخصها الطريم والروزليك (اطلها) .

٧٣٥٣ - حَالُوم Grémil officinal (F).

هو الشنجار المخزني ، اطلبه . Common gromwell (E).

٧٣٥٤ - حَالِيَة * Aepysurus (S).

Aepysure (F). Aepysurus (E).

جنس حيات سامة ، خبيثة من اماميات الاخايد وفصيلة الهيدروفيات . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة || اجسامها شبه اسطوانية الشكل . رؤوسها صغيرة ، ذمية . اذناها مبطة . اثوابها الى الخضار البحري المتفاوت الماحات يملوه تجذيع متعرض متباين الزخرفة والالوان ، يكثر فيه الاسود والاخضر الاليس .

٧٣٥٥ - حَالِيَة

يقال لحيمة حالية اي وارقة مشمرة واذا تنأثر ورقها قيل تعطلت (اللسان) .

٧٣٥٦ - حَام ، وَاقي Prophylactique (F).

Prophylactic (E).

نعت تعريفي يطلق على التدابير ووسائل الخطة الواجب اتخاذها للوقاية من الآفة المحتملة او لمعالجتها في حال وجودها .

٧٣٥٧ - حَام Voltiger (F).

راجع حات .

٧٣٥٨ - حَامِيَت Sucré (F). Sugared, Sugary (E).

الحامات هو الثمر الشديد الحلاوة وقد عم استعمالها على جميع الثمار الشديدة الحلاوة .

٧٣٥٩ - حَامُض ، حَامِض Acide (F). Acid (E).

الحوامض اجسام مركبة تقع على ثلاثة اشكال . الشكل الاول هو الحوامض المركبة من جسمين بسيطين احدهما الهيدروجين . والشكل الثاني هو الحوامض المركبة من ثلاثة اجسام اثنان منها الاكسيجن والهيدروجين . والشكل الثالث هو الحوامض العضوية المركبة من الكربون والاكسيجن والهيدروجين .



حَالِق



حَالُوش



حَالِيَة

٧٣٨٤ - حامض خَشْخَاشِي

Acide méconique (F). Acid meconic (E).
بلورات صفيحية عديمة اللون والرائحة توجد في حبوب الخشخاش.

٧٣٨٥ - حامض خَلَنْجَرِي ، حامض صَقْصَقَانِي

Acide salicylique (F). Acid salicylic (E).
بلورات إبرية الشكل عديمة اللون براقة توجد في عصارة الخلع والصفصاف وفي جذور البنفسج وازهار العراوة.

٧٣٨٦ - حامض خَلْتِي ، حامض خَلْتِيك

Acide acétique (F). Acid acetic (E).
هو عنصر الحل الاساسي.

٧٣٨٧ - حامض خَيْلِي ، حامض هَيْبُورِيك

Acide hippurique (F). Acid hippuric, Hippuric acid (E).
حامض عضوي يكثر في بول الخيل ويوجد في بول أكثر الحيوانات من آكلات العشب.

٧٣٨٨ - حامض دُبَالِي ، حامض هُومِيك

Acide humique (F). Acid humic (E).
حامض عضوي ومعدني له شأن كبير في اخصاب التربة.

٧٣٨٩ - حامض دَبْغِي ، حامض عَطْنِي ، حامض عَقْصِي ، حامض تَنِيك

Acide tannique (F). Acid tannic (E).
حامض عضوي يستخرج من لحاء العفص وورق الساق وغيرهما. يستعمل في الدباغة.

٧٣٩٠ - حامض دَرِّيْسِي

Acide derrique (F). Acid derric (E).
واحد من عصري ذرة الروتينون.

٧٣٩١ - حامض دُهْنِي ، حامض دُهْنِيك

Acide oléique, A. élaique (F). Acid oleic (E).
حامض عديم اللون يوجد في المواد الدهنية الزيتية.

٧٣٩٢ - حامض رُمَّانِي

Acide ellagique (F). Acid ellagic (E).
بلورات دقيقة صفراء اللون عديمة الرائحة والطعم قليلة الذوبان في الماء. يستخرج من جذور الرمان وعرق الانجبار. ومن العفص ومن ثمار الاهليلج والفوفل.

٧٣٩٣ - حامض زَهْرِي

Acide primulique (F). Acid primulic (E).
بلورات إبرية الشكل توجد في جذور وجذامير زهر الربيع.

٧٣٩٤ - حامض تَمْنِي ، حامض تَمْنِيك ، حامض زَبْدِيك

Acide butyrique (F). Acid butyric (E).
حامض لا لون له يوجد في السمن وفي بعض المواد الدهنية.

٧٣٩٥ - حامض سيانيدريك

Acide cyanhydrique (F). Cyanhydric acid (E).
سائل عديم اللون ، كثير الميوعة ، رائحته رائحة اللوز المر. يذوب في الماء والكحول. يوجد في أكثر من مئتي نوع نبات تنتمي الى ٥٠ فصيلة أشهرها الورديات والقرنيات. يكثر في اللوز المر. وفي معظم بذور الباز

٧٣٧١ - حامض بَسْبَاسِي

Acide myristique (F). Acid myristic (E).
حامض يستخرج من نبات البسباس.

٧٣٧٢ - حامض بَنْزُويك

Acide benzoïque (F). Acid benzoic (E).
بلورات إبرية او صفيحية عديمة اللون. يوجد في الجويرة والتجبل العطر ودم الاخوين والمليحة. وفي جذامير عود الوج وفي بذور المضاخ.

٧٣٧٣ - حامض بُنِّي

Acide caféique (F). Acid caffeic (E).
بلورات صفيحية صفراء اللون براقة عديمة الرائحة قليلة الذوبان في الماء. يستخرج من البن.

٧٣٧٤ - حامض بُولِي ، حامض بُولِيك

Acide urique (F). Acid uric (E).
حامض أزوتي يوجد في البول.

٧٣٧٥ - حامض بِيْشِي ، حامض أَكُونِيْتِيك

Acide aconitique (F). Acid aconitic (E).
بلورات عديمة اللون والرائحة. تركيبه الحامض الليثوني ينقصه ذرة ماء. يوجد في سوق وأوراق الاكونيت والادونيس والمائق والذرة والسلق وقصب السكر.

٧٣٧٦ - حامض بِيكْرِيك

Acide plorique (F). Acid ploric (E).
من الحوامض المطهرة المستعملة في معالجة الحروق وفي الصباغات الصفراء اللون.

٧٣٧٧ - حامض تَرْتَرِي ، حامض طَرُطَرِيك

Acide tartrique (F). Acid tartaric (E).
حامض عضوي ينشأ في الثمار لاسيما العنب.

٧٣٧٨ - حامض تَفَّاحِي ، حامض تَفَّاحِيك

Acide malique (F). Acid malic (E).
من الحوامض العضوية الموجودة في أكثر الثمار اخصها التفاح.

٧٣٧٩ - حامض تَنْبُوي

Acide abiétique (F). Abietic acid (E).
يستخرج من التنوب ويكثر وجوده في صمغ البطم.

٧٣٨٠ - حامض خَاصِي ، حامض أَفْصَلِيك

Acide oxalique (F). Acid oxalic (E).
من الحوامض العضوية الموجودة في الحماض وغيره من النباتات البقلية.

٧٣٨١ - حامض حَنْدَقُوي

Acide méliotique (F). Acid melilotic (E).
حامض عطري بلوري التركيب يوجد في الحندقوق.

٧٣٨٢ - حامض خَرْبُيْقِي

Acide vératrique (F). Acid veratric (E).
حامض يستخرج من الخربق حيث يوجد بشكل املاح.

٧٣٨٣ - حامض خَرْدَلِي

Acide érucique (F). Acid erucic (E).
بلورات متراصة توجد في ادهان بعض البذور اخصها بذور الخردل والسليجيم واللفت والبنج.

٧٤٠٧ - حامض فوليكسي
Acide folique (F). Folic acid (E).

الحامض الفوليكي فيتامين من فئة ب يوجد في الاوراق الخضراء اخصها البقول وفي النسخ الحيوانية . يعتبر مفيداً لانه يحث على تكوين الكريات الحمر واليحمور وينشط نوبة الخلايا والبكتيريا .

٧٤٠٨ - حامض فوقحائي

Acide chrysanthémique (F). Acid chrysanthemic (E). بلورات مشوشة متناهية الدقة توجد في روئسات القوقحان الزهرية .

٧٤٠٩ - حامض كبريتي ، حامض سلفوري
حامض سلفوريك ، حامض كبريتيك

Acide sulfurique, Huile de vitriol (F). Sulphuric acid (E). سائل زيتي الانبعاث عديم اللون والرائحة يستعمل في صناعة سلفات الامونيالك والسورفسفات .

٧٤١٠ - حامض كتاني
Acide linique (F). Linic acid (E).

حامض يستخرج من زيت الكتان .

٧٤١١ - حامض كربوني ، حامض الكربون ،
حامض فحمي ، حامض كربونيك ،
غاز كربونيك ، غاز الكربون

Acide carbonique, Anhydride carbonique (F). Carbonic Acid (E). الحامض الكربوني غاز يوجد في الهواء يأتيه من تنفس الاحياء والاختبارات وغيرها ويعود من الهواء الى النبات بفعل الخشب .

٧٤١٢ - حامض كلوريديك ، حامض
هيدروكلوريك
Acide chlorhydrique (F). Acid hydrochloric (E).

حامض حريف محرق كويه الرائحة يستعمل في عدة صناعات .

٧٤١٣ - حامض كوميريك

Acide coumarique (F). Acid coumaric (E). بلورات ابرية عديمة اللون . يستخرج من الخندقوق المخزني ومن الجويصة العطرة والنجيل العطر .

٧٤١٤ - حامض لبني ، حامض لبنيك .
Acide lactique (F). Acid lactic (E).

من الحوامض المطهرة يحصل من تخمر اللبن .

٧٤١٥ - حامض ليموني ، حامض الليمون ،
حامض ليمونيك ، حامض ستريك

Acide citrique (F). Acid citric (E). حامض عضوي يكثر وجوده في ثمار الحمضيات كالبرتقال والليمون الحامض ، الخ ...

٧٤١٦ - حامض ملتوني
Acide maltonique, A. gluconique (F). Acid maltonic (E). حامض خماسي التركيب الكربوني يحصل من اكسدة السكاكر بالفطور الهبوية .

اللوذية وفي ورق الدراق والكرز الغاري وفي سوق وحبوب الفاصوليا ، الخ .

٧٣٩٦ - حامض سيانيك
Acide cyanique (F). Cyanic acid (E).

سائل عديم اللون ، نافع ، زرق الرائحة المثيرة ، يستحيل بسرعة في الهواء الطلق الى مسحوق ابيض عديم الفاعلية والذوبان .

٧٣٩٧ - حامض شاهترجي

Acide fumarique (F). Acid fumaric (E). تركيب الحامض التفاحي ينقصه ذرة ماء . يستخرج من الشاهترج المخزني ومن القبرية والماميا الصفراء وخرز الصخور ويختلف الفطور .

٧٣٩٨ - حامض شقاري
Acide anémone (F). Acid anemone (E).

حامض عضوي يكثر في نبات الشقار .

٧٣٩٩ - حامض شمعي
Acide cérotique (F). Cerotic acid (E).

الحامض الشمعي يستخرج من الشمع العسل .

٧٤٠٠ - حامض طقسوي

Acide propionique (F). Acid propionic (E). سائل عديم اللون نافذ الرائحة الخاصة . يوجد في ازهار الطقسوس والكالية وفي ثمار الجينكو وفي النيدمان والسولوس .

٧٤٠١ - حامض عفص ، حامض عفصيك
Acide gallique (F). Acid gallic (E).

حامض عضوي يوجد في لحاء واوراق بعض النباتات اخصها العفص .

٧٤٠٢ - حامض عنبري
Acide succinique (F). Succinic acid (E).

يوجد في المنبر وفي بعض انواع اللينيت وفي راتنج الصنوبر وفي عصارة بعض النباتات اخصها خض السم والابست . يستحضر من تقطير المنبر ومن تخمير الحامض التفاحي .

٧٤٠٣ - حامض غاريقوني ، حامض اغارييسيك
Acide agaricique (F). Agaricic acid (E).

بلورات صفحية فضية اللون . يوجد في الغاريقون الابيض .

٧٤٠٤ - حامض غبيري ، حامض صربي
Acide sorbique (F). Sorbic acid (E).

بلورات لرجية متشربة الرطوبة توجد في ثمار النيراء اي الصريرة .

٧٤٠٥ - حامض غلوتاميك

Acide glutamique (F). Glutamic acid (E). بلورات شعاعية توجد في ارشام القرع والبقية وفي دبس الشولدر . تذوب في الماء الساخن ولا تذوب في الكحول .

٧٤٠٦ - حامض غليكولي
Acide glycolique (F). Glycolic acid (E).

بلورات عديمة اللون توجد في الحصرم واوراق الكرمة وفي البندورة وقصب السكر .

٧٤٢١ - حاميات القوائم ° Notopodes (F).

Notopodea (E).

فئة من القشريات عشاريات الارجل قصيرات الذيل . فصائلها واجناسها وانواعها عديدة ، جميعها صغيرة القد . اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || تتميز بكثافة هلب ظهورها وبقوامها الخلفية الظهرية الارتكاز حيث تبدو كأنها محمولة .

٧٤٢٢ - حاملة Frugifère (F).

Frugiferous, Fruit-bearing (E).

نمت تعريفي يطلق على كل شجرة مثمرة تملؤها الثمار .

٧٤٢٣ - حامول Orobanche (F). Broom-rape (E).

هو الجعفل ، اطلبه .

٧٤٢٤ - حامول الماء* ، بشت القرد

Ceratophyllum submersum (S). Ceratophylle, Cornifle (F). Horn-weed, Morass-weed (E). Glatte igellock, Hornblatt (D). Coda di cavallo, Coda di volpe, Pertro (I).

نبات عشبي مائي معمر من فصيلة الفلقليات . ازهاره صغيرة خضراء اللون . ثمرته كروية جلدية مخبجة تحمل من جهة استطالها شوكة حادة قوية .

٧٤٢٥ - حامية Mamelie (F).

ها حاميان يتركب منها حافر الحيليات .

٧٤٢٦ - حاووز Bassin couvert (F).

Covered basin (E).

هو الخوض المسقوف تجمع فيه المياه وتوزع .

٧٤٢٧ - حاليه Unilatéral (F). Unilateral (E).

نمت تعريفي يطلق على كل جزء من النبات يقع في طرف واحد . المحميات تحمل ازهاراً حائدة .

٧٤٢٨ - حاش Rabatteur (F). Beater (E).

مطارد الصيد الى مكان معين .

٧٤٢٩ - حاشيش ، حائط Jardin (F). Garden (E).

الحاشيش والحائط : المجتمع من الشجر نخلاً كان او غيره .

٧٤٤٠ - حائط ، جدار ، سور Mur (F). Wall (E).

الجدار المبني وهو :

حائط خاص Mur privatif (F). Privative wall (E).

او حائط مشترك Mur mitoyen (F). Partition wall (E).

٧٤٤١ - حايوت ° ، حانوش ° Ophiophage (F).

Ophiophagous (E).

آكل الحيات .

٧٤٤٢ - حب البلاذر Noix de cajou (F).

هو الكاجو ، اطلبه .

٧٤٤٣ - حب الزلم* ، حب العزيز ، زلم ،

سعد مأكول Cyperus esculentus (S).

Souchet comestible, Amande de terre (F). Earth almond, Edible cyperus (E). Erdmandel, Erdmandelcypergras (D). Clpero comestibile (I).

نوع من السعد وهو نبات عشقولي عشبي زراعي . ساقه تملو من ٢٠ الى ٦٠ سم . اوراقه سنانية مستطيلة .

٧٤١٧ - حامض ميمراني Acide chélidonique (F).

Acid celandic (E).

بلورات عادمة اللون والطعم والرائحة . يستخرج من الممران وعروق الصباغين ومن جذامير الخربوق الابيض .

٧٤١٨ - حامض قنني ، حامض سينميك

Acide cinnamique (F). Acid cinnamic (E).

بلورات موشورة معينة او ابرية دقيقة . يستخرج من اوراق العيون والقلوته .

٧٤١٩ - حامض قنلي Acide palmitique (F).

Acid palmitic, Palmic acid (E).

بلورات ابرية الشكل توجد في ثمار نخل الدهن .

٧٤٢٠ - حامض قنلي ، حامض فرميك

Acide formique (F). Formic acid (E).

حامض عضوي يكثر وجوده في النمل .

٧٤٢١ - حامض نووييني ، حامض نوكلايك

Acide nucléique (F). Nucleic acid (E).

حامض مركب من اربعة اجزاء او اضعاف الاربعة يشتمل على عدة عناصر اشهرها الحامض الفسفوري مع السكر والبروتين .

٧٤٢٢ - حامض نيتريكي Acide nitrique (F).

Acid nitric (E).

هو الحامض الازوتي ، اطلبه .

٧٤٢٣ - حامض نيكوتيني ، حامض نيكوثياني

Acide nicotinique, A. nicotianique (F). Acid nicotinic, A. nicotianic (E).

بلورات ابرية او موشورة توجد في اوراق التبوغ . تذوب في الكحول والماء الساخن .

٧٤٢٤ - حامض هليوني

Acide aspartique (F). Aspartic acid (E).

حامض اميني يوجد في نوامي الهليون وفي لساس القرع واللوبياء والفاصوليا .

٧٤٢٥ - حامضي Acidifère (F).

Acidiferous (E).

نمت تعريفي يطلق على كل ما احتوى على حوامض .

٧٤٢٦ - حاميكة ° Entomophage (F).

Entomophagous (E).

الحامكات هي الدويبات والحشرات النافعة التي تفتس الحوام والحشرات الضارة .

٧٤٢٧ - حاميل Fécondée, Pleine (F).

نمت تعريفي يطلق على انثى الحيوان البينة القاح .

٧٤٢٨ - حاميل Porteur, Au porteur (F).

Bearer (E).

هو من حرر السند التجاري لصالحه او نقل اليه عن طريق التظهير ويقال الى الحامل اي الى من بيده سند لحامله .

٧٤٢٩ - حاميل السمكة Style

هو قلم السمكة جزء من المدقة مستقيم اجوف يصل المبيض بالسمكة .

٧٤٣٠ - حاميل السند Obligatoire (F).

Bond-holder (E).

هو الذي يملك حقاً ناشئاً من سند قابل للتحويل .



حامول الماء



حب الزلم

٧٤٥٩ - حَبّاجَة ٥
Exochorda (S).
Exochorde (F). Exochorda (E).
جنس شجيرات برية وزراعية تزيينية من فصيلة الورديات .
موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى الصين . سوقها ترتفع
من مترين الى اربعة امتار . اوراقها متعاقبة معنقة اهليلجية
النصل . ازهارها عنقودية التجميع ، كبيرة القد ، خماسية
الاشعيرة الجناحية الشكل ، مستديرة البتلات ، كثيرة
الاسدية التي يراوح عددها من ١٥ الى ٢٥ || انواعها
المعروفة سبعة ، أشهرها التالية :

٧٤٦٠ - حَبّاجَة جِيرَالْد ٥
Exochorda giraldi (S).
Exochorde de Giralde (F).
نوع الحباجة التزيينية . ساقها تعلو من مترين الى ثلاثة
امتار . اوراقها معنقة . اعناق الاوراق الى الحمراء . نصالها
ارجوانية اللون في اول عهدها ثم خضراء . ازهارها كبيرة
القد ، عطرية العرف . عدد اسديتها ٢٥ || تنويرها يستمر
من نيسان الى ايار .

٧٤٦١ - حَبّاجَة عُنُقُودِيَّة ٥
Exochorda racemosa (S).
Exochorde en grappes (F).
نوع من الحباجة . ساقها تعلو من مترين الى ثلاثة امتار .
اوراقها كاملة ، منشارية الزام الاخير ، تطول نحو ٥ سم .
وتعرض نحو ٢ سم . ازهارها كبيرة القد ، قطرها نحو ٥ سم .
عدد البديتها ١٥ || تنويرها يستمر من نيسان الى ايار .

٧٤٦٢ - حَبّاجَة كُرُورَاكُوف ٥
Exochorda korolkowii (S).
Exochorde de Korolkow (F).
نوع من الحباجة التزيينية . ساقها تعلو نحو اربعة امتار .
اوراقها مدببة اذينية . اذيناتها مستديرة الاطراف . نصالها
تطول نحو ٩ سم . وتعرض نحو ٣ سم . لونها الى الخضراء
العابق . ازهارها معتدلة الحجم ، عديمة العرف ، قطرها
نحو ٣ سم . عدد اسديتها ٢٠ || تنويرها يستمر طوال
شهر ايار .

٧٤٦٣ - حَبّاجَة مِنْشَارِيَّة الْوَرَق ٥
Exochorda serratifolia (S).
Exochorde à feuilles serrulées (F).
نوع من الحباجة التزيينية . ساقها تعلو من متر الى مترين .
اوراقها معنقة . نصالها منشارية الختار لونها الى الخضراء
الزيتي الموج . ازهارها كبيرة القد ، عديمة العرف ، قطرها
نحو ٦ سم . عدد اسديتها ٣٠ || تنويرها يستمر من ايار
الى حزيران .

٧٤٦٤ - حَبّاجِير ٥
Outarde mâle (F). He-bustard (E).
الحباجير والحبارج والحبيجر والحبرج جميعها تدل على
ذكر الحباجير .

٧٤٦٥ - حَبّاح *
Isopyrum (S).
Isopyre (F). Isopyrum (E).
جنس نباتات عشبية حولية ومحولة من فصيلة الشقيقيات .
انواعها المعروفة قليلة العدد منتبتة معظم مناطق البلاد المعتدلة
الحراة من العالم القديم || سوقها نخيلة تعلو من ٩٠ الى
١٢٠ سم . اوراقها معنقة ، مستطيلة الزناد ، مفروضة
النصال الثلاثية الفلق . ازهارها فردي ، ابطي الارتكاز
وهامي . ازهارها صغيرة خماسية البتلات ، بيضاء اللون ||
تنويرها ربيعي .

نصلها جميل اللون الزاهي . جذورها مدادة . عساقله صغيرة
القد بيضية الشكل ، مفلطة ، مأكولة ، دسمة ،
مستحبة الطعم || يرغب في المواقع الحارة والاثربة الرطبة .

٧٤٤٤ - حَبّ السَّلَاطِين
Croton cathartique (F).
هو كروتون الزيت ، اطلبه .
Croton-oil plant (E).

٧٤٤٥ - حَبّ السَّنْبُل
Guilmauve jaune (F).
راجع أبو تيلون أسرح .
Lantern flower (E).

٧٤٤٦ - حَبّ الْعَرُوس
Poivrier cubàbe (F).
هو فلفل كبابه ، اطلبه .
Cubeb pepper (E).

٧٤٤٧ - حَبّ الْعَزِيْز
هو حب الزلم .

٧٤٤٨ - حَبّ الْعَصَافِير
Alpiste (F).
هو الفلاريس نبات عشبي علي من النجيليات .
Canary grass (E).

٧٤٤٩ - حَبّ الْفَقْد
Agneau chaste (F).
هو الارثد ، اطلبه .
Agnus castus (E).

٧٤٥٠ - حَبّ الْقَلْب
Grémil officinal (F).
هو الشنجار الحزني ، اطلبه .
Common gromwell (E).

٧٤٥١ - حَبّ الْمَسْك * عَنَبْرُبُول ، حَيْطَمِي مِسْكِي
Abelmoschus moschatus, Hibiscus abelmoschus,
Bamia abelmoschus (S). Abelmosch, Ambrette,
Graine musquée, Ketmie musquée (F). Abelmusk,
Musk okra, Musk mallow (E). Abelmusk, Bismelbisch,
Bisamstrauch (D). Abelmusco, Ambretta,
Ibisco muschiato (I).
نبات زراعي صناعي حولي ومحول من فصيلة الحباقيات .
مهدد البلاد الاسيوية والافريقية الحارة . ساقه منتصبه
عفية زباه اللحاء تعلو من ٦٠ الى ١٨٠ سم . اوراقه
متعاقبة ، كبيرة القد ، عريضة ، خماسية او سباعية
الفصوص . ازهاره كبيرة فارشة ، لونها الى الصفار
الكبريتي . ثماره قرون اسطوانية مضطعة ، ذلقة الزام
الاخير ، تحضن حبوب كروية الشكل ، عرفها عرف
المسك تستعمل في الصناعات العطرية .

٧٤٥٢ - حَبّ الْمَلُولُ
Médiciner cathartique (F).
هو دند الملوك ، اطلبه .
Spurge nettle (E).

٧٤٥٣ - حَبّ الْمَلُولُ
Catapuce (F).
هو قريبون لسيرس ، اطلبه .
Caper-spurge (E).

٧٤٥٤ - حَبّ النَّيْل
Ipomée du Nil (F).
هو جلاب النيل ، اطلبه .
Nil ipomoea (E).

٧٤٥٥ - حَبّ الْهَال
Amome (F).
هو ثمر الهال حب اسود اللون عطري العرف مستحب
الطعم شائع الاستعمال .

٧٤٥٦ - حَبّ الْهَال
Ménisperme (F).
هو القمرية ، اطلبها .
Moonseed (E).

٧٤٥٧ - حَبّاب
Grainier (F). Seedsman (E).
من يبيع الحنطة .

٧٤٥٨ - حَبَابَة
الحباجة : دويبة سوداء مائية . ج حباب .



حب المسك



حَبّاح

الشرقية والشمالية . مصيفها الشرق الأدنى وأروبه || تنفر من الاحراج والغابات . قوتها الحشرات والديدان والحبوب ونوامي النبات || الانثى تبيض ٤ بيضات تحضنها وحدها نحو ٤ اسابيع في افحوص تدثنه في التربة بين الاعشاب .

٧٤٧٧ - حَبَّارَى مُتَوَجَّجَة ، حَبَّرُج ، حَبَّرَب

Otis houbara, Chlamydotis undulata (S). Outarde houbara, Houbara ondulée (F). Houbara bustard (E).

نوع من الحبارى المتوجة الآبدة في العراق والجزيرة . يكثر وجودها في الشرق الأدنى وفي افريقية الشمالية . جثها متوسطة القد طولها نحو ٦٠ سم . تتميز باستطالة عنقها ومنقارها الذي يعادل طول رأسها . ثوبها متراكب الالوان يغلب فيه الابيض الرمادي المشق بالاسود . زمكها ابيض يعلوه حباك اسود ثلاثي الخطوط || قال الجاحظ : « لها خزانة في دبرها لها ابدأ فيها سلاح رقيق فتي ألح عليها الصقر سلحت عليه فينتف ريشه كله وفي ذلك هلاكه وقد جعل الله تعالى سلاحها سلاحاً لها . قال الشاعر :
«وهم تركوك اسلح من حبارى رأيت صفراً وأشرد من نعام»



حَبَّارَى

٧٤٧٨ - حَبَّارَى مُلْتَحِيَّة ، حَبَّارَى كَبِيرَة ، رَعَاد

Otis tarda (S). Outarde barbut, Grande outarde (F). Great bustard (E).

أكبر انواع الحبارى ، طولها نحو ١٠٠ سم . رأسها أطول اللون تعلوه مشحة صهباء . عنقها الى البياض البلوري تكتنفه زرقاء بنفسجية . ظهرها الى الصفرة الصهباء يعلوها حباك اسود . سواقطها بيض ، قوادمها الى الريدة السمر . زمكها ابيض تعترضه خطوط سود . بطنها الى البياض الاغبر || موطنها الشرق الأدنى وأروبه وافريقية الشمالية . تألف السهول والفيافي . تبتعد عن الاحراج والاماكن الآهلة . قوتها النوامي النباتية والحبوب والحشرات . الانثى تبيض ٣ بيضات تحضنها نحو ٤ اسابيع في افحوص تدثنه في التربة بين الاعشاب الكثيفة .



حَبَّارَى

٧٤٧٩ - حَبَّارَى نُوبِيَّة

Lissotis (S). Outarde de Nubie (F). Nubian bustard (E).

نوع من الحبارى المتوسطة القد موطنها افريقية الشرقية اخصها النوبة والسودان . ثوبها رمادي اللون يعلوه توشيح وتمشيق وحباك معترض .

٧٤٨٠ - حَبَّارَى هِنْدِيَّة

Sypheotis Indica (S). Outarde indienne (F). Indian bustard (E).

نوع من الحبارى الصغيرة القد موطنها الهند والتبت . ثوبها الى البياض الموشم بالاصهب والاسمر .

٧٤٨١ - حَبَّارِيَّات

Otididae (S). Otididés (F). Otididae (E).

فصيلة طير من رتبة طوال الساق تشمل الحبارى وغيرها .

٧٤٨٢ - حَبَّاسَة

Tontinage (F).

هي استعمال الحباسة لتغليف جذور الغراس المقلوعة والمعدة للنقل .

٧٤٨٣ - حَبَّاسَة *

Tontine

حباك من القش او الاسل او القصبان الدقيقة تحضن به جذور الفرس وما عليها من تراب او خز ثأميناً على حياتها في اثناء نقلها من مكان الى آخر . ج حباسات .



حَبَّاسَة

٧٤٦٦ - حَبَّاسَة

Lampyre (F).

Glow-worm, Firefly (E).

ويقال له أبو حباب . هو اليراعة ، اطلبها . وفي المثل : اضعف من نار الحباب .

٧٤٦٧ - حَبَّاسَة

Linaire (F). Toad-flax (E).

هو الليناريه ، اطلبها .

٧٤٦٨ - حَبَّاسَة أَحْرَش

Linaire élatine (F).

هو الليناريه الحرشاء ، اطلبها .

٧٤٦٩ - حَبَّاسَة الشَّقُوق

Linaire cymbalaire (F).

هو الليناريه الصناجية ، اطلبها .

٧٤٧٠ - حَبَّاسَة دُجْوِي

Ver-luisant (F).

حشرة تدعى يراعة دجوية ، اطلبها .

٧٤٧١ - حَبَّاسَة شَرْقِيَّة

Luciole oriental (F).

حشرة تدعى يراعة شرقية ، اطلبها .

٧٤٧٢ - حَبَّاسَة مَبْدُول

Linaire commune (F).

هو الليناريه العادية ، اطلبها .

٧٤٧٣ - حَبَّار * ، سَبَّيْدَج ، صَبَّيْدَج

Sepia (S). Selche, Sèche (F). Cuttle-fish, Squid (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات الرأسيات الارجل المزدوجات الخيشوم . انواعه نحو ٣٠ منتشرة في جميع بحار العالم تتميز بذوائبها الرأسية المخجمة الاطراف وبلاقطها المنقبضين المستطيلين المنتهين بكتلتين من الحاجم المرصوفة . اجسامها مفلطحة . زعانفها جانبية . عظمها ظهري اهليلجي الشكل ، كلسي التركيب ، ابيض اللون ، يغلفه جلد الظهر . وهو من الحيوانات المفترسة قوته الاسماك الصغيرة والقشريات . يألف الشطوط الصخرية وينفر من الاعماق واذا شعر بخطر مداها قذف بسائله الاسود اللون فيعكر الماء حوله ويتمكن من الهرب اشهر انواعه الخذاق ، اطلبه .

٧٤٧٤ - حَبَّارَى * ، حَبَّرَايَة

Otis (S). Outarde (F). Bustard (E).

جنس طير من فصيلة الحباريات ورتبة طوال الساق . انواعه عديدة معظمها من طيور مناطق البلاد الحارة والمعتدلة . منها الآبدة تعيش جماعات صغيرة ومنها القواطع سرها نحو ١٠٠ زوج . الذكر منها يقود عدة اناث . فرخها يقال له نهار .

٧٤٧٥ - حَبَّارَى سَيِّبَرِيَّة

Otis Dybowski (S). Outarde de Sibérie (F). Dybowski bustard (E).

نوع من الحبارى القواطع المتوسطة القد . مشتاه الصين الوسطى ، مصيفها من سيبيريا الى الاورال فاليابان .

٧٤٧٦ - حَبَّارَى صَغِيرَة ، حَبَّرُور ، صُر

Otis tetrax (S). Outarde canepetière, Petite outarde, Poule de Carthage (F). Little bustard (E).

نوع من الحبارى القواطع ، صغيرة القد ، طولها نحو ٥٤ سم . ثوبها اصفر اللون مشق بالاسود . محارمها وزورها الى السمرة الرمادية . عنقها مطوق بالابيض . قوادمها الى السمرة العاقية . افيكها ابيض يعلوه حباك اسود . موطنها شاسع الاطراف . مشتاه الهند والجزيرة وافريقية

لها وريقة تعلوها صفرة وتعلو صفرتها غبرة دون ورق الحبازي، (اللسان).

٧٤٩٨ - حَبَجَة Plant de vigne (F).
هي جرزونة الكرمة زرعت فشرشت. ج حباج .

٧٤٩٩ - حَبَحَب Adansonie (F). Baobab (E).
راجع بوباب .

٧٥٠٠ - حَبَرَبَر، حَبَرَقَش Chamelon, Chamelet (F). Young camel (E).
هو الجمل الصغير والانثى حبربرة وحبرقشة .

٧٥٠١ - حُبْرَة Noeud de tige (F).
الحبرة هي العقدة في جذع الشجرة . ج حبر .

٧٥٠٢ - حُبْرُج Outarde houbara (F).
هي الحباري المتوجه، راجعها . Houbara bustard (E).

٧٥٠٣ - حَبْرُور Canepetière (F).
Little bustard (E).
هي الحباري الصغيرة، اطلبها . ج حبارير .

٧٥٠٤ - حَبْس Fascinage (F). Fascine-work (E).
حجز يثق الماء واقامة صناعات في وجهه لتحويل مجراه او لغرض آخر .

٧٥٠٥ - حَبَشَقَة ، حَبَشُوقَة ، بَنِيُول Baniulus (S). Baniule (F).
جنس حشرات من كثرات الارجل الشفويات الاحناك . انواعه عديدة اعرافها واضرها الحبشة الرقطاء .

٧٥٠٦ - حَبَشَقَة رَقْطَاء * ، بَنِيُول أَرْقَط Baniulus guttulatus (S). Baniule moucheté, lule des fraises (F). Spotted millipede, Spotted snake-millipede (E). Getüpfelter Tausendfüß, Getupfter Schnurfüssler (D).
حشرة طويلة مستدقة لوها الى البني الاسمر تعلوه نقط حمر . ارجلها كثيرة العدد || اضرارها قد تكون جسيمة لانها تلثم البلور عند انتاشها وتقرض الثمار اخصها شمول الشيلك (الفريز) .

٧٥٠٧ - حَبَشِيَّات Meleagridae (S).
Dindons, Méléagridés (F). Meleagridae (E).
فصيلة طير من رتبة الدجاجيات . وحيدة الجنس طيورها كبيرة الجثة ، مستطيلة الساق ، ملطاء العنق الشعولي الملون . تحمل لحصة تتدلى من قاعدة فكها الاعلى ويتوسط جوشن ذكورها لمة من الهلب الفليظ كما انها ترفع ذيلها وتنشر كالتاووس .

٧٥٠٨ - حَبَشِيَّة ، حَبَش Meleagris (S).
Dindon (F). Turkey-cock (E).
جنس طير من فصيلة الحبشيات . كبير الجثة ، صغير الرأس ، قصير المنقار القوي . مستطيل الرسغ والمخالب ، مستدير الجناح والذيل ، غزير الريش الصلب || مهدد الاصلي امريكة الشمالية والجنوبية . انواعه المشهورة اربعة .

٧٤٨٤ - حَبَاط Météorisation (F).

Wind. Flatulence (E).
عارض مظهره انتفاخ في كرش المجترات فيعظم منه ويرم . سبه تجمع غازات تحصل من اختار الكلاء في الكرش .

٧٤٨٥ - حَبَاك ، وَشِيْع Pallssade (F).
Patisade, Paling (E).
هو سياج من نصب او قضبان متشابكة .

٧٤٨٦ - حَبَاك أَدَمِي Pallssade épidermique (F).
Epidermic paling (E).

٧٤٨٧ - حَبَب Grainer (F). To seed (E).
حبب الزرع وأحب الزرع : صار ذا حب .

٧٤٨٨ - حَبَب الثِمَار Prune (F). Bloom (E).
هو الطيسل-مادة عضوية لزجة كذر الفبار تكثف بشرة الثمرة .

٧٤٨٩ - حُبَة ، حُبَة Pépín de raisin (F).
Grape-stone (E).
هي عجم العنب .

٧٤٩٠ - حُبَة ، بَزْرَة Grain, Graine (F). Seed (E).
هي الكائن الناتج عن انخصاب مبيض الزهرة . تركيبها وأشكالها واحجامها والوانها عديدة جميعها تهدف الى غاية واحدة هي استمرار النسل .

٧٤٩١ - حُبَة Grain (Poids) (F).
Grain, Minute pill (E).
هي مقدار وزن شعيرتين . والحبة ايضاً سدس عشر الدينار .

٧٤٩٢ - حُبَة الحبة اسم يقع على بزور العشب والبقول البرية وما تنثر من ورقها فاختلط بها .

٧٤٩٣ - حُبَة البَرْكَة Graine noire (F).
Black cumin (E).
بزرة الشونيز الزراعي وهي صغيرة مستطيلة سوداء اللون مستحبة الطعم والعرف .

٧٤٩٤ - حُبَة حلوة Anis (F). Anise (E).
راجع أنيسون .

٧٤٩٥ - حَبَبَر * Epomophorus (S).
Epomophore (F).


جنس حيوان من فصيلة الوطواطيات . انواعه ١٢ جميعها افريقية المهد . بشرة الشكل ، متوسطة القد ، براء او ثعلبية الذنب ، مستعرضة الرأس ، مستطيلة الفرطوسة ، غليظة الشفاه المتعرجة المنمنمة . تحمل في صدورهم تحت ثديها جيتين صغيرتين تكثفها خصلتان من الشعر الاصفر . كما انها مجهزة بضرفين جانبيين لحزن الهواء يمتدان من البلعوم حتى قاعدة الفخذ || تعيش جماعات قليلة العدد . تألف الاشجار الحرجية الظليلة . قوتها جميع انواع التين والثمار الغزيرة العصير .

٧٤٩٦ - حَبَث Vipère à queue tronquée (F).
حية براء ذات سم قاتل .

٧٤٩٧ - حَبَج الحنج : شجرة سمياء تعمل منها القداح وهي عتيقة المود



حَبَر



حبشة رقطاء



حبشية المكسيك



حبشية داجنة



حبشية مبذولة



حبض



حبق برّي



حبق صغير

٧٥١٤ - حبشيات

Pittosporaceae (S).
Pittosporacées (F). Pittosporaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين. انواعها المعروفة زهاء ٩٠ تنتمي الى تسعة اجناس. مهدها البلاد الحارة. نباتاتها اشجار وجنبات معمرة عطرية. اوراقها كاملة متعاقبة. ازهارها لاقياسية التجميع والارتكاز.

٧٥١٥ - حبط

Dystéléologie (F).

Dysteleology (E).

الحبط علم يبحث في اسباب الاجهاض عند الكائنات الحية مرتكزا على الاعضاء السقيطة.

٧٥١٦ - حبق

Ocimum (S). Basilic (F).
جنس نباتات عشبية عطرية من فصيلة الشفويات مهدها الهند وقد عمت زراعتها العالم || انواعها عديدة جميعها صغيرة القد فروعها. اوراقها متعاقبة، كاملة، منقطة، لينة جميلة الخضار. ازهارها سنبلية التجميع، ناجية الارتكاز. ازهارها بيضاء او وردية اللون || اوراقها وازهارها فواحة العرف العطر || اشهر انواعها الاربعة التالية: الحبق الرهباني، الحبق الصغير، الحبق المعروف والحبق الورب (اطلها في مواضعها).

٧٥١٧ - حبق الراعي

Armoisa commune (F).

Mugwort (E).

هو الشويلاء، اطلها.

٧٥١٨ - حبق الرهبان، ريجان سليمان

Ocimum filamentosum (S). Basilic filamenteux, Basilic des moines (F). Holy basil, Monk's basil (E). Heiliges basilienkraut, Mönchsbasilien (D). Basilico filamentosum (I).

نوع من الحبق المعمر يعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. فروعه وانفاته كثيفة. اوراقه لينة، مدببة، زاوية الخضار، ذكية العرف || منافعها الصحية معروفة ويقال ان عصارتها تقطع الرعاف ويزرع يفيد عسر البول واذا سحق ووضع على كسرة الزنبور والعقرب أبرأها.

٧٥١٩ - حبق الشيوخ

Amaraque (F).

Amaracus (E).

هو المرور، اطله.

٧٥٢٠ - حبق الماء

Menthe aquatique (F).

Water mint (E).

هو ننع الماء، اطله.

٧٥٢١ - حبق برّي

Calamintha clinopodium (S). Clinopode, Grand basilic sauvage, Roulette (F). Field wild-basil, Horse thyme (E). Gemeiner wirbeldost, Wilde basilic (D). Basilico salvatico grande (I).

عشبة برية معمرة من فصيلة الشفويات. اوراقها بيضية مدببة القمة، زهاء النسل الخشن الملمس. ازهارها ابطية وهامية الارتكاز، وردية اللون.

٧٥٢٢ - حبق ترنجاني

Melisse officinale (F).

Lemon-balm (E).

هو الترجمان، اطله.

٧٥٢٣ - حبق صغير، حبق كرماني، شاهسفرم

Ocimum minimum (S). Basilic fin, Petit basilic (F). Bush basil, Small leaved basil (E). Kleines basilienkraut (D). Basilico a foglie piccole (I).

نوع من الحبق وهو نبات عشبي حولي صغير القد

٧٥٠٩ - حبشية المكسيك*

Meleagris mexicana (S). Dindon du Mexique (F).

نوع من الحبش موطنه بلاد المكسيك. كبير الجثة بسطته نحو ٢٠٠ سم. ثوبه الى السمرة السفعاء يعلوه تأذير وتوشيم. ذيله منقط بالابيض. اباهره مؤذرة بالاسود والابيض. عنقه املط، جثري اللون، رعته خرية، رسفه الى الاحمر الاصفر الموج || مجثمه الاشجار القليلة الارتفاع. انثاء تبيض نحو ١٨ بيضة تحضنها وحدها في افصوص ترصعه بالورق اليابس.

٧٥١٠ - حبشية داجنة*، ديك حبشي

Meleagris domestica (S).

Dindon domestique (F).

نوع من الحبش يقال انه تحدر من حبشية المكسيك. ضرابه وسلالاته عديدة. فوارقها سرعة النمو والقذ والثوب ولون الرعشة والعنق والرسغ. وهي اليفة انيسة تعيش طعاما كبيرة تسرح كالغنم. جميعها كبيرة الجثة وزنها يراوح من ٦ الى ١٢ كيلو. بسطتها من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. لحمها لذيق الطعم مرغوب فيه || الانثى تبيض من ٢٠ الى ٣٦ بيضة تحضنها نحو اربعة اسابيع.

٧٥١١ - حبشية فلساء

Meleagris ocellata (S).

Dindon ocellé (F).

نوع من الحبش موطنه غواتيمالا وهندورس ويوقطان. بسطته نحو ١٥٠ سم. ثوبه الى السمرة يعلوه خضار مذهب. ذيله اقلوسي التوشيم الاسود المذهب. عنقه املط اصفر اللون. رعته الى الصفار الخطي. رسفه ومخالبه صفر || مجثمه الاشجار القليلة الارتفاع.

٧٥١٢ - حبشية مبذولة*

Meleagris gallopavo (S). Dindon vulgaire, D. sauvage d'Amérique (F).

نوع من الحبش موطنه امريكا الشمالية من كندا الى المكساس وفلوريدا. يالغ الاحراج والفياض والمنافع ومحاري الماء. قوته الحبوب والثمار والبلوط والكستنا والحشرات || وهو كبير الجثة بسطته نحو ١٥٠ سم. ثوبه الى السمرة السفعاء يعلوه تأذير وتوشيم. عنقه املط ازرق اللون. رعته ورسفه ومخالبه الى الحمرة || مجثمه الاشجار المنبسطة الاغصان القليلة الارتفاع || انثاء تدن في الارض، ترصع افصوصها بالورق اليابس. تبيض نحو ٢٠ بيضة تحضنها وحدها نحو اربعة اسابيع.

٧٥١٣ - حبض، علاك

Pittosporum (S).

Pittosporum (F). Pittosporum, Cheese weed (E).

Telesaholz (D). Pittosporo (I).

جنس شجيرات وجنبات برية وزراعية تزيينية من فصيلة الحبشيات. انواعها نحو ٥٠ بعضها عروية وبعضها عابل الاوراق. اوراقها كاملة متعاقبة، اهليلجية النصل، بارزة المروق والشرابين. ازهارها فردي او عشكولي التجميع، محوري الارتكاز. ازهارها جميلة الشكل متعددة الالوان، عطرية العرف || اشهر انواعها الزراعية التزيينية:

Pittosporum fulvum (S).

Pittosporum rous (F).

Pittosporum chinensis (S).

Pittosporum de Chine (E).

Pittosporum coriolum (S).

Pittosporum coriace (F).

Pittosporum undulatum (S).

Pittosporum undulé (F).

حبض صيني

حبض قاس

حبض متموج

٧٥٣٢ - حَبَلَة Cépage (F). Vine-plant (E). هي النبتة الواحدة من الكرمة . راجع جفنة .

٧٥٣٣ - حَبَلَة * ، سَنَفَة ، قَرْن Gousse (F). Pod (E). ثمرة نباتات الفصيلة القطانية .

٧٥٣٤ - حَبَلَق الغنم الصغار القد والمعر القصار .

٧٥٣٥ - حَبَلِي Restiforme (F). Restiform (E). نمت وصفي يطلق على ما هو حبل الشكل .

٧٥٣٦ - حَبَلِي * Cordon (F). Row (E). نمت تعريفي يطلق على طريقة تشكيل خاصة متبعة في القيادة الشجرية . قوامها تربية الاينات الثمرية على اغصان افقية الارتكاز يراوح عددها من اثنين الى اربعة او ستة كما يبدو في الرسم .

٧٥٣٧ - حَبَلِيل Lombric (F). Earth-worm (E). هو الخراطون ، اطلبه .

٧٥٣٨ - حَبَن Hydropisie (F). Dropsy (E). عارض سببه ارتشاح مصلي في بعض النسيج او الاعضاء فيعظم منه المكان المصاب ويرمى العلاج : سهل وعلف رطب مدر للبول لينما يحضر الطبيب البيطري .

٧٥٣٩ - حَبَن Laurier-rose d'Europe (F). European rose-bay (E). هي الدفلى المبدولة ، اطلبها .

٧٥٤٠ - حَبَن هِنْدِي Laurier-rosa d'Inde (F). Indian rose-bay (E). هي الدفلى العطرية ، اطلبها .

٧٥٤١ - حَبُوب ، زَرَع ، زُرُوع Céréales (F). Cereal, Corn crops (E). تعريف شامل يطلق على معظم النباتات الزراعية من فصيلة النجيليات كالحنطة والشعير والخربال والذره .

٧٥٤٢ - حَبُولِي Grainetier, Grainier (F). Seedsman (E). هو بائع الحبوب من حنطة وشعير وما اشبه .

٧٥٤٣ - حَبُولِيْن ، زُرْعِيْن Céréaline (F). هو عنصر الخمير الموجود في النخالة .

٧٥٤٤ - حَبْوَة Physalis (S). Coqueret (F). جنس نباتات عشبية من الفصيلة الباذنجانية . انواعه عديدة اروبائها مدادة . اوراقها بسيطة كاملة متعاقبة او متقابلة . ثمارها لويية مأكولة || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

٧٥٤٥ - حَبْوَة البِيرُو * ، حَشِيْش سَكْرَان Physalis peruviana, Ph. edulis (S). Coqueret du Pérou, Poc-poc (F). Goose berry (E). Peruanische schlutte (D). Vesicaria (I).

نبات عشبي حولي او معمر . ساقه منتصبه تعلو من ٤٥ الى ٩٠ سم . اوراقه متعاقبة معنقة قلبية القاعدة سنائية الزام الاخير . ازهاره فردية ابطية . ثماره لويية حمراء اللون حامضة المذاق رطبة مدرة للبول || يزرع لثماره المأكولة .

٧٥٤٦ - حَبْوَة المكسيك ، حَبْوَة تُوْمَاتِيل Physalis ixocarpa (S). Coqueret tomatille (F). نبات عشبي زراعي معمر تعلو من ٩٠ الى ١٢٠ سم .

يعلو من ١٥ الى ٢٥ سم . فروعه وافئاله دقيقة . اوراقه لسنة جميلة الخضار العادي ، ذكية العرف المستحب . ازهاره سنابل مستطيلة . ازهاره وردية اللون .

٧٥٢٤ - حَبَق مَعْرُوف * ، حَبَق هِنْدِي ، حَبَق لَبَطِي ، حَوَك ، بَادَرُوج Ocimum Basilicum (S). Basilic commun, Herba royale, Oranger des sayetiers (F). Basil, Sweet basil (E). Echtes basilienkraut, Basilikum (D). Basilico comune (I).

اشهر انواع الحبق واعمها زراعة . وهو عشبة حولية او بحولة تعلو من ٢٥ الى ٤٥ سم . اوراقها لسنة سنائية فواحة العرف العابق المستحب . ازهارها بيض او وردية . ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

٧٥٢٥ - حَبَق وَبِر ، حَبَق قَرْنَفَلِي ، قَرْنَجَمَشَك حَاجِم Ocimum pilosum (S). Basilic velu (F). Soft haired basil (E). Feldwürze (D). Basilico piloso (I).

نوع من الحبق وهو نبات عشبي حولي او محول يعلو من ١٥ الى ٤٠ سم . اوراقه لسنة ، سنائية ، مذبية ، زبام النصل ، باهتة الخضار ، فواحة العرف . ازهاره ليلكية او وردية اللون || ازهاره يستمر من حزيران الى ايلول .

٧٥٢٦ - حَبَقَبَق ، زُرُّ الْوَرْد Sphaeranthus indicus (S). Sphaeranthus odorant (F). Indian sphaeranthus (E). Ballblume, Duftende (D). Sfaeranto (I).

نبات عشبي زراعي تزييني من فصيلة المركبات . مهدد البلاد الحارة . ضروريه عديدة جميعها عطرية الزهر والاوراق . رؤيساته الزهرية حمر اللسينات .

٧٥٢٧ - حَبَل Ligne (F). Line (E). هو خط طبقات النسب المتتابعة . والقراءة تقع على اربعة اشكال :

٧٥٢٨ - حَبَل الْقَرَابَة ، حَبَل النَّسَب Ligne paternelle (F). Paternal line (E). قرابة الأبوة

٧٥٢٩ - حَبَل مِسْكِي Clématite toujours verte (F). Evergreen clematis (E). هو المللي المنسي ، اطلبه .

٧٥٣٠ - حَبَلَس Myrte (F). Myrtle (E). هو الآس الجوي ، اطلبه .


٧٥٣١ - حَبَلَة الحيلة : بقلة لها ثمرة كأنها فقر المقر تسمى شجرة المقر ياخذها النساء يتداوين بها (اللسان) .



حبّ معروف



حبله



حبلي



حبّوة البيرو

الى الريدة الصهباء المختلفة الموج رؤوسها صغيرة قصيرة، فراطيسها ذلقة مقطوعة || موطنها الشرق وبعض جزر المحيط الهادي. تألف الاشجار الظليلة الفارشة. تعيش جماعات قليلة العدد. مسرحها من الغسق الى الفجر. قوتها الثمار على اختلاف انواعها.

٧٥٥٢ - حبوش أشرّف ، أشرف أبتر

Nesonycteris truncatus (S).

Nesonycteris tronqué (F).

حيوان ليون ثامر ضار من فصيلة الطوطيات. جسمه صغير القد، عادم الذنب، يطول نحو ٧٠ سم. وبسطته ٢٤٠ سم. ثوبه الى الريدة الصهباء الخطية الموج. رأسه صغير الجرم، مستعرض القفن، ذلق الفرطوسة المقطوعة الطرف. اذناه صغيرتان، مستعرضتا القاعدة، مديبتا الطرف. عيناه صغيرتان. فقه واسع الشدق يحمل ٣٤ سنًا. لسانه مطاط || يألف في الصيف الاشجار الظليلة والكهوف الجنوبية المعرض ويألف في الشتاء المغاور والكهوف الشمالية المعرض || يعيش جماعات قليلة العدد. يحبل الانثى يستمر نحو ٣٨ يوماً تقصع عند تمامه جرواً واحداً يبصر ويسمع ويكتسي بعد الوضع بعشرة ايام ويتعلق بصدر أمه بدون انقطاع حتى الفطام، اي نحو سبعة اسابيع || يباهه الشتوي يستمر من ١٢ الى ١٤ اسبوعاً. مسرحه دجوي قوته الثمار اليانعة || يعتبر من الحيوانات الضارة.



حبوة كاكنجية

٧٥٥٣ - حبوط ، سُقُوط الحَقِّ

Déchéance (F).

Forfeiture (E).

هو ان يضيق رب الحق حقه لانه لم ينفذ الشروط المفروضة قانوناً.

٧٥٥٤ - حَبِينَة

Granule (F).

هي الحبة الصغيرة القد.

٧٥٥٥ - حَبِينَة

Enclave (F).

الحبسة او المكتنفة كل ارض لا طريق لها. والقانون يعطي صاحبها حق المرور.

٧٥٥٦ - حَبَيْش

Pintade (F). Guinea-fowl (E).

هو الفرغر، اطلبه.

٧٥٥٧ - حَبِيلَة

Chorda (S).

Chorde (F). Chorda (E).

جنس نباتات بحرية من الخشيات السمر. انواعه المعروفة خمسة. اعطانها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي || كلايلها منشعبة. سوقها خيطية ضمية التجميع تطول بعض الامتار.

٧٥٥٨ - حَبِين

Oléandre (F). Oleander (E).

الحين هو الدفلى المبذولة.

٧٥٥٩ - حَبِينَة* ، أم حَبِين

Agama stellio (S). Stellion (F). Stellion (E).

حيوان بيوض من العظاء وفصيلة الحرذونيات شارفات الاسنان، مكتسيات اللسة، رباعيات القوائم، خماسيات الاصابع || جسمها مستقيح الهيئة يطول نحو ٣٥ سم. رأسها شبه بيضي الشكل. عيناه جانبيتان تلحفها اجفان شفافة ثابتة. اذناها خافتا الغشاء الصيواني. تسليها يشتمل على قواطع وانياب واضراس. طيات عنقها مسننة

اوراقه مستطيلة سنانية مديبة. ازهاره صفر تتوسطها خمس بقع سمر. مآبرها حر. تويجاتها مسننة، ازنادها قصيرة. ثماره كروية الشكل حمراء اللون مأكولة. يزرع لثماره.

٧٥٤٧ - حَبُونَة زَبَّاء ، كاكنج أصفر

Physalis pubescens, Ph. barbadensis (S) Coqueret pubescent, C. comestible, Alkékenge jaune (F).

نبات عشبي حولي ازغب، سوقه مسطحة تعلو نحو ٣٠ سم. اوراقه بيضيه ذلقة الزام الاخير المديب. ازهاره صفر، ثماره برتقالية اللون || يزرع لثماره المأكولة.

٧٥٤٨ - حَبُونَة فيلادلفية

Physalis philadelphica (F). Coqueret de Philadelphie (F).

نبات عشبي معمر يعلو من ٧٠ الى ١٥٠ سم. ازهاره صغيرة الحجم، ازنادها متوسطة القد تطول نحو ٢ سم. تويجاتها مسننة ضيقة الزوايا. بتلاتها الى البياض الاخير. مآبرها الى الزرقة البنفسجية || تزرع لثمارها المأكولة.

٧٥٤٩ - حَبُونَة كاكنجية* ، كاكنج

كُرَز القُدُس ، شاش القاضي

Physalis alkekengi (S). Coqueret alkekengi, Cerise des Juifs, Alkekengi (F). Alkekeng, Bladder herb, Wintercherry (E). Deutsche schlutte, Lampionpflanze (D). Alcachengi, Chichingero, Palloncini (I).

نبات عشبي بري معمر من فصيلة الباذنجانيات يعلو من ٢٥ الى ٦٠ سم. اوراقه معنقة متعاقبة. ازهاره صغيرة ابطية بيضاء اللون ملطخة. ثماره لوية ارجوانية مأكولة حامزه رطبة مدرة للبول || ازهاره يستمر من ايار الى تشرين.

٧٥٥٠ - حَبُونَة*

Labrus julis, Coris julis (S). Labre girelle (F). Coris julis (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة الكيديات ورتبة شائكات الزعانف. اعطانها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط. تعتبر من اسماك حشاش المجادح والنقاف. قوتها البلاعيط والرخويات والنبوت البحرية || جسمها اهليلجي الشكل معتدل التبطيط، يطول من ١٧ الى ٢٥ سم. ثوبها جميل الالوان الزاهية يتميز بالوكاب المتباين التخضب بين الشقين. ظهرها الى الخضار الالس. القسم العلوي من جانبيها الى الوردي يطوقه حثار منشاري الخط. ازرق اللون. القسم السفلي من جانبيها الى الخضار البحري الفاتح يعلوه تجذيع معترض حنطي. بطنها الى البياض الاخير الاطملح الموج. الانثى افتح ثوباً من الذكر والاخضر الالس في الظهر يتحول الى اخضر زيتي، والاازرق يتحول الى اسمر والاسمر الى اصفر. رأسها مخروطي الشكل. فكها متعادلان. شدقها قليل الانفراج. اسنانها صغيرة وحيدة الصف. عينها مستديرتان، معتدلتا النشوز. زعانفها ملونة. الظهرية واحدة مستطيلة. الذيلية محدبة الطرف، خضراء اللون، صفراء الموج، يطوقها حثار ازرق عند الذكر واسمر عند الانثى || لحمها متوسط الصنف مأكول.

٧٥٥١ - حَبُونَة* : أشرف

Nesonycteris (S).

Nesonycteris (F).

جنس حيوان من فصيلة الطوطيات. انواعه المعروفة اربعة جميعها براء، صغيرة القد، طولها يراوح من ٧ الى ٩ سم. وبسطتها من ٢٤ الى ٢٨ سم، اثنائها



حَبُونَة



حَبِينَة

٧٥٧١ - حَتْنُ الْأَرْجَاعِ

Coefficient de restitution (F). Restitution coefficient (E).

٧٥٧٢ - حُثَّ الحث هو الرمل اليابس الخشن (مقاييس اللغة).

٧٥٧٣ - حُثَاة Epicarpe (F). Epicarp (E). الحثاة هي قشرة الثمرة الخارجية تلحفها البشرة وتلحف السوّدق. ج حث.

٧٥٧٤ - حُثَالَة Déchet (F). Waste (E). الرديء الذي لا يصلح للاستعمال من كل شيء وهو النفاية والنفل وما أشبه.

٧٥٧٥ - حُثْر الحثر هو حب العنقود اذا تبين وهو ثمر الاراك. والحثر من العنب: ما لم يوقع وهو حامض صلب.

٧٥٧٦ - حُثْرَب الحثرب: بقلة كالايهقان صفراء غبراء تنبسط على الارض. تعجب المال. (اللسان). والحثرب: الماء الكدر.

٧٥٧٧ - حُثْرَة حثرة الكرم هي زمرته بعد الاكاخ.

٧٥٧٨ - حُثْمَة Clairière (F). Clearing, Glade (E). الحثمة البقعة الجرداء في غابة. ج حثام.

٧٥٧٩ - حُثْوَاء الحثواء: الارض الكثيرة التراب.

٧٥٨٠ - حُثْيَلَة Osteomeles (S). Ostéomèle (F). Osteomeles (E). شجيرة برية وتزيينية من فصيلة الورديات. مهدا يمتد من الشرق الادنى الى الاقصى. ساقها فضاء تعلو من متر الى مترين. اوراقها ابيدة، متعاقبة، مركبة، وقرية العدد الذي يراوح من ١٣ الى ١٩، وريقاتها سنائية النصل تطول من ١ الى ٢ سم. وتعرض من ٤ الى ٨ مم. ازهارها بيضاء اللون، عذقية التجميع، محورية الارتكاز. تزور في الحداثق. تنويرها ربيعي.

٧٥٨١ - حُجَّاج Ogive (F). Ogive, Ogee (E). الحجاج قوس متوتر التركيب يسند القبة ويؤمن تشييدها ويقوي متانتها.

٧٥٨٢ - حُجَّاج الْعَيْن Orbite (F). Orbit, Socket (E). هي نفرة العين وتدعى وقب، اطلبه.

٧٥٨٣ - حُجَّاجِيّ Ogival (F). Ogival (E). نعت تعريفي يطلق على ما كان شكله كالحجاج. يقال هندسة حجاجية وتزويق حجاجي.

٧٥٨٤ - حُجَّارَة ٥ ، رِقَاجَة ٥ Lithologie (F). Lithology (E). علم الحجارة وتركيبها.

الحراشف الشائكة. ظهرها ناشف الجلد الخشن. ثوبها الى الطحلة الرمادية تعلوها نمشة غبراء. تتميز بالشوذة اي انها تمانن البيئة التي تعيش فيها || تألف الوعر والبراري والمواقع الكثيرة الحجارة. تعيش ذكراً وانثى من اواسط الربيع الى اواخر الخريف حيث يفترقان || بياتها الشتوي يستمر نحو اربعة اشهر. تخرج في النهار نشاطها يزداد مع نشاط اشعة الشمس || قوتها الحشرات والجنس ادب والمقارب والمناكب || تعتبر من الزحافات المفيدة النافعة.

٧٥٦٠ - حُتَّ Erosion الحت والانحسار هو تفكيك ذرات التربة وانجرافها بفعل الامطار او الماء.

٧٥٦١ - حُتَات الحتات: من امراض الابل ان يأخذ البعير هلس فيتغير لحمه وطرفه ولونه ويتمط شعره.

٧٥٦٢ - حُتَار Bord (F). Margin (E). الحتار من كل شيء حرقه وكفاه.

٧٥٦٣ - حُتَارِي ، هَامِشِيّ Marginal (F).

٧٥٦٤ - حُتْرَة Tétée (F). Suck (E). ما يمتص الرضيع من حليب على دفعة واحدة.

٧٥٦٥ - حُتْرَشَة الحترشة: صوت اكل الجراد ودود القز.

٧٥٦٦ - حُتْرَشَة ٥ Odontostomus balbo (S). Odontostome (F). Odontostomus (E).

سمكة بحرية بيوض وحيدة الجنس والنوع من فصيلة الدوسميات ورتبة مفتوحات المشاة. اعطائها معظم مناطق البحر الابيض المتوسط || جسمها شبه وشعي الشوزن يطول من ١٢ الى ١٨ سم. حراشفها دقيقة، شديدة الصغر. ثوبها الى الطحلة الصفراء المواج تسمر عند الظهر. ويملؤها في جالبيها نكت دقيقة سوداء اللون || رأسها مستضخم الجرم، قصير الخطم المستدير، كبير الشدق الفاجر الرحب. فكها السفلي يتقدم العلوي نحو ٢ مم. اسنانها مستطيلة، محجنة، متباينة الاحجام. زعانفها لينة. زعنفتها الظهرية الثانية جدعة منحنية الشكل. زعنفتها الذيلية مقعرة || لحمها متوسط الصنف، مأكول.

٧٥٦٧ - حُتَّك Autruchons (F). الحتلك صغار النعام اي رئالها. Young ostrich (E).

٧٥٦٨ - حُتْمِيَّة Déterminisme (F). Determinism (E).

الحتمية مجموعة العوامل اللازمة لظاهرة ما. وهي ايضاً مذهب يدين بالمقدر اذ يقول ان كل ما يحصل في العالم بما فيه الاعمال البشرية والحيوانية. هي النتيجة المحتومة لمنشع سالف.

٧٥٦٩ - حُتْن Coefficient ويدعى المعامل او المسمى هو العدد الذي تضرب به المعادلات واشباهها.

٧٥٧٠ - حُتْنُ الْأَحْثَكَاك حُتْنُ Coefficient de friction (F). Friction coefficient (E).



حترشة

٧٥٩٤ - حَجَر آيْمَان Calcedoine (F).

يشب ابيض تملوه ماجة زرقاء . Chalcedony (E).

٧٥٩٥ - حَجَرُون

دوية طويلة القوائم اعظم من النمل (اللسان) .

٧٥٩٦ - حَجَرَوِيّ، سَيْتُولُوجِي Cytologique (F).

Cytologic (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما له علاقة بالحجيرات .

٧٥٩٧ - حَجَرِيّ الشَّكْل Lichoïde (F).

نعت تعريفي يطلق على ما كان شكله كالحجر .

٧٥٩٨ - حَجَز Saisie (F).

Seizure, Attachement (E).

الحجز هو ان يوضع حث يد السلطة من اي نوع كانت قضائية ، ادارية ، خاصة او عامة ، مال منقول او ثابت وذلك لمنع مالكة او الحائز عليه من التصرف او الانتفاع به || والحجز قد يكون ارباني او تنفيذي وعقاري واستردادي الخ .

٧٥٩٩ - حَجَز الثَّمَار

Saisie de fruits pendants (F). Distress of fruits (E).

هو حجز الثمار العالقة بأشجارها وهو حجز لا يجوز توقيعه الا في الاسابيع الستة التي يتم فيها الادراك والنضج حتى يمكن بيعها بالمزاد فور جنيها .

٧٦٠٠ - حَجَز المَزْرُوعَات Saisie brandon (F).

Execution on growing crops (E).

هو حجز الزروع القائمة على سوقها ولا يجوز توقيع هذا الحجز الا في الاسابيع الستة التي يتم فيها النضج .

٧٦٠١ - حَجَفَة ، جِنَانَة

Ecusson, Scutellum (F). Scutellum (E).

الجزء المثلث الزوايا الظاهر من جنبة البرجد عند انتشاب الغمدين في وسط الكوسل .

٧٦٠٢ - حَجَقِيّ Scutellé (F). Scutellate (E).

نعت يطلق على ما كان شكله كالحجفة .

٧٦٠٣ - حَجَقِيَّات الخِيَاشِيم

Aspidobranches, Scutibranches (F).

Aspidobranchial, Scutibranchial (E).

فئة من الرخويات . معديات الارجل تتميز بخياشيمها الثنائية الصفائح المتراكبة الحجفية الشكل كأنها مدرعة || اشهر فصائل هذه الفئة الصديعيات وآذان البحر

٧٦٠٤ - حَجَل Perdrix (F). Partridge (E).

جنس طير أبدة من عمارة الحجليات وفصيلة الطيوريات اسم جمعه حجلي وحجلان . انشاء تدعى حجلة وسلكة وسركة والفرخ سلكاً || انواعه ثمانية منتشرة من الشرق حتى اوروبا وافريقية . جميعها ربة الجثة ، صغيرة الرأس والمنقار ، مستديرة السقط والافنيك . تعيش اسراب صغيرة يراوح عددها من ٦ الى ١٢ زوجاً || قوتها الاعشاب والحبوب والثمار والحشرات || تدثر عشها على الارض فتخفيه بين الاعشاب او في ظل الصخور والشارفة . انشاء تبيض من ١٢ الى ١٦ بيضة تحضنها وحدها نحو ١٨ يوماً . اما الذكر فيبقى قرب انشاء لا يتركها الا في طلب القوت || اعرف واشهر انواعه ما يتبع .

٧٥٨٥ - حَجَافَة مَآوِي

Dermatemys mawy (S). Dermatémys mawy (F).

سلحفاة وحيدة الجنس والنوع من فصيلة الحجافيات . اعطائها بحيرات ومناقع واغوار امريكة الجنوبية والوسطى || جسمها كبير القد . ذبلها بيضي الشوزن ، قليل الاحديداب . يطول نحو ٦٠ سم . زعفها كبير ، فضفاض ، منبسط الصفحة ، مقوس المقدم ، محوف المؤخر . رأسها معتدل الجرم . عنقها متوسط الطول . ذنبها قصير . قوائمها نشيطة || قوتها النباتات المائية . لحمها مأكول .

٧٥٨٦ - حَجَافِيَّات Dermatemydidae (S).

Dermatemydidae (F). Dermatemydidae (E).

فصيلة حيوانات بيوضة من رتبة السلاحف . اجناسها المعاصرة ثلاثة ، اما انواعها فخمسة . اعطائها بحيرات ومناقع امريكة الجنوبية والوسطى || اجسامها متباينة الحجم . اذبالها بيضية الشوزن قليلة الاحديداب ، عادمة الاكطار . مستديرة الجوانب . زعافها منبسطة ، مقوسة المقدم ، محوفة المؤخر || اشهر انواعها حجافة مآوي وضواجة شرسة وكلوديوس منكمشة .

٧٥٨٧ - حَجَبَة

الحجبة : حرف الورك المشرف على الخاصرة .

٧٥٨٨ - حَجَر Jument poulinière (F).

Brood-mare (E).

الانثى من الخيل تتخذ للنسل . ج احجار وحجور .

٧٥٨٩ - حَجَر Pierre (F). Stone (E).

جسم جامد طبيعي مختلف التركيب والصلابة والنقل النوعي . اعم ضروره واشيعها الحجر الجيري الذي يستعمل في البناء وهو على اشكال ثم الرمي والرخام والاميل الى آخره .

٧٥٩٠ - حَجَر التُّوتِيَا ، حَجَر سَلِيمَانِي

Calamine

هو سيليكات الزنك الطبيعية . مادة معدنية حجرية الشكل تحوي نحو ٢٥,٥٠٪ من السيليس و ٦٧٪ من اكسيد الزنك و ٧,٥٠٪ من الماء || بلوراته قطبية التخديد ، لامعة الصلابة . ثقله النوعي ٣,٥ وصلابته ٥ .

٧٥٩١ - حَجَر الدَّم ، شَادَنَج ، هَمَتِيْت

Hématite (F). Haematite (E).

هو الهمتيت معدن حديدي ادبس اللون ، اطلبه . وقد دعي حجر الدم او الشادنج لانه كان يستعمل في الطب القديم لحبس الدم . وقد قال فيه الانطاكى : « اجوده الرزين الاحمر المعرق الشبيه بالعدس . تبقى قوته الى خمسة وعشرين سنة وهو يابس في الثانية والثالثة حار في الاولى ان لم يغسل فان غسل فبارد . يذهب خشونة الاجفان ويحد البصر ويدمل القروح والجراحات المزمنة ويحبس الدم من اي موضع كان » .

٧٥٩٢ - حَجَر عَقْد Vousseau, Voussoir (F).

Wedge-shaped, Arch-stone (E).

كل حجر من حجارة المقد .

٧٥٩٣ - حَجَر مَقْصُوب Pierre de taille (F).

Freestone (E).

٧٦٠٥ - حَجَلْ أَخْمَر *

Perdix rubra, Alectoris rufa (S). *Perdrix rouge* (F). *Red-legged partridge* (E).

طائر من الحجل كبير القد طوله من ٣٠ إلى ٣٢ سم. ثوبه إلى الجؤوة الربداء يعلوه موج أصفر وتأذير جانبي. حلقه وعنقه تفرهما قلادة من الدر الأسود. منقاره ورجلاه إلى الجؤوة الصهباء || موطنه الشرق الأوسط وأروبه وأفريقية الشمالية.



حجل أحمر

٧٦٠٦ - حَجَلْ أُرْبَد

Perdrix grise (F).

Common partridge (E).

هو القبيج ، اطلبه .

٧٦٠٧ - حَجَلْ الْمَغْرِب

Perdix petrosa, Alectoris barbara (S). *Perdrix de roche, Gamba* (F). *Barbary partridge* (E).

طائر من الحجل طوله نحو ٣٠ سم. ثوبه إلى الجؤوة المؤذرة والموشة والموشة. أحمر المنقار والرجلين ، أسمر العنق والحلق || موطنه أفريقية الشمالية وجزر المتوسط. ضروبه أربعة أو خمسة منها المراكشي والمغربي والتونسي والكناري .



حجل تهامي

٧٦٠٨ - حَجَلْ مُتَهَامِي * ، قُهْنِي ، قُهْنِيَة

Perdix robusta, Caccabis robusta (S). *Perdrix robuste* (F). *Sand partridge* (E).

طائر من الحجل متوسط القد طوله نحو ٢٦ سم. ثوبه إلى الربداء الغبراء يعلوه تأذير وتوشيم. أصفر المنقار والرجلين || موطنه الجزيرة العربية وفلسطين وحوض البحر الأحمر.

٧٦٠٩ - حَجَلْ رُؤْمِي * ، مُشَار ، يَعْقُوب

Perdix graeca, Alectoris graeca saxatilis (S). *Perdrix grecque, Bartavelle* (F). *Greater red legs* (E).

طائر من الحجل كبير القد طوله من ٣٢ إلى ٣٥ سم. ثوبه إلى الربداء الرصاصية يعلوه موج أحمر وتأذير جانبي مستعرض. عنقه أبيض اللون ، أسود الاطار ، منقاره أحمر ورجلاه كذلك || موطنه الشرق الأوسط من إيران حتى أروبه .



حجل رومي

٧٦١٠ - حَجَلْ شُقْر * ، قُصَيْطَة

Perdix chukar (S). *Perdrix chukar* (F). *Chukar partridge* (E).

طائر من الحجل متوسط القد . طوله نحو ٢٧ سم. ثوبه إلى الربداء الخضراء يعلوه موج أصفر وتأذير وتوشيم. أسمر المنقار والرجلين . مستطيل القلادة الحمراء || موطنه الشرق الأوسط من المجر حتى اليونان .



حجل شقر

٧٦١١ - حَجَلْ عِرَاقِي


Starne (F).

هو القبيج أي الحجل الأربد ، اطلبه .

٧٦١٢ - حَجَلِيَّات

Perdicians (F).

جماعة طير من فصيلة الطيهوجيات تتميز بامتداد المنطقة الريشية على كامل رأسها حيث تكسوه حتى المنقار ويخلو أرساغها ويخالها من الريش || أجناسها سبعة الحجلان والداريج والزلوك والساني والقبيج والقوئل والكولان .



حجبار

٧٦١٣ - حُجْبَار *

Greenovia aurea (S).

Greenovle dorée (F).

بجلة صغيرة معمرة من فصيلة المخلدات . منبتها بعض أقاليم البحر الأبيض المتوسط ، أخصها الجزر . ساقها منتصب ،

جرداء ، تعلو نحو ٤٠ سم . أوراقها تطول نحو ٧ سم . وتعرض نحو ٣ سم . نصالها معتدلة الشخانة ، بحرية الخضار يطوقها حنار أبيض غصروفي المادة . شراخها الزهري ينتهي بعشكول خلي اللحاء قطره نحو ٢٠ سم . أزهارها صغيرة صفراء اللون || تنويرها يستمر من نيسان إلى أيار .

٧٦١٤ - حَجْنَة

Pampre (F). *Vine-branch* (E).

القضييب القصير الذي يحمل عنقود العنب . ج حجج .

٧٦١٥ - حُجْنَة ٥

Réserve (F). *Reserve* (E).

هي ما تحتزنه الأشجار من مواد غذائية تنفقها عند الانطلاق الحولي والأثمار .

٧٦١٦ - حُجْبِيَجَة

Hirondelle (F). *Swallow* (E).

هي الخطاف ، اطلبه .

٧٦١٧ - حُجْبِيْرَة

Cellule animale (F).

Animal cell (E).

اطلب خلية .

٧٦١٨ - حُجْبِيْرِي ، حَلِيْوِي

Cellulaire (F). *Cellular* (E).

كل ما يمت بالحجيرة أو الخلية .

٧٦١٩ - حُجْبِيْفَة ٥

Dipelta (S).

Dipelte (F). *Dipelta* (E).

الاسم العلمي من اليوناني بمعنى « الترس الصغير المزدوج » جنس نباتات شجرية يرية وتزيينية من فصيلة الخنانيات . مهدها يمتد من الشرق الأدنى إلى أقصى . سوقها تعلو من متر إلى خمسة أمتار . أوراقها متقابلة ، عابلة . أزهارها محورية الارتكاز ، كبيرة القد ، فردية أو ثنائية || أنواعها المعروفة قليلة العدد ، أشهرها التالية :

٧٦٢٠ - حُجْبِيْفَة بَطْنِيَة ٥

Dipelta ventricosa (S). *Dipelte ventrue* (F).

نوع من الحجيفة التزيينية . ساقها تعلو من متر إلى أربعة أمتار . أوراقها شبه قلبية الشكل ، مستديرة القواعد . نصالها مسننة الختار . أزهارها كبيرة ، فردية ، تتميز بتوحيجاتها الرافعة القواعد وبقناباتها الترسية الشكل . لونها إلى البياض الليلكي الموج || تنويرها يستمر من حزيران إلى تموز .

٧٦٢١ - حُجْبِيْفَة مُزْهَرَة ٥ *

Dipelta floribonda (S). *Dipelte florifère* (F).

نوع من الحجيفة التزيينية . ساقها تعلو من مترين إلى خمسة أمتار . أوراقها شبه سنائية الشكل تطول من ٨ إلى ١٢ سم . وتعرض من ٣ إلى ٥ سم . نصالها خلية الصفحات السفلى . أزهارها ثنائية كثيرة العدد ، كبيرة القد ، ليلكية اللون مبقعة بالأصفر || تنويرها يستمر من نيسان إلى أيار

٧٦٢٢ - حُجْبِيْلَاء

الحجيلاء : الماء الذي لا تصيبه الشمس .

٧٦٢٣ - حُجْبِيْنَة ٥

Cyrtanthus (S).

Cyrtanthe (F). *Cyrtanthus* (E).

جنس نباتات عشبية دوفسية من فصيلة النرجسيات . مهدها بعض مناطق أفريقية الجنوبية . شراخها جوفاء . أوراقها ضيقة النصال القدية الشكل . أزهارها ملونة ،

Cyrtanthus (S).

Cyrtanthe (F). *Cyrtanthus* (E).

جنس نباتات عشبية دوفسية من فصيلة النرجسيات .

مهدها بعض مناطق أفريقية الجنوبية . شراخها جوفاء .

أوراقها ضيقة النصال القدية الشكل . أزهارها ملونة ،

جميعية التركيب ، محضونة بزواج أو بزواجين من الشراعيين
الخضر || تزرع للزينة ضمن البيوت وفي الحدائق .
تزرع في الأتربة المتوسطة الاندماج الوافرة المواد الغذائية ||
أنواعها المعروفة عديدة ، أشهرها التالية :

٧٦٢٤ - حُجَيْتَةُ حَمْرَاء * Cyrtanthus

sanguineus (S). Cyrtanthe rouge-sang (F).

نوع من الحجيئة . عشبة دوفضية سبروتية . أوراقها قليلة
العدد ، من ٣ إلى ٤ ، لونها إلى الخضار الاليس ، نصلها
قدي الشكل ، يطول من ٢٠ إلى ٣٠ سم . ويعرض من
١٥ إلى ٢٠ سم . شراخها يرتفع نحو ٣٠ سم . أزهارها
حمراء اللون سفعية الموج || تنويرها يستمر طوال شهر آب .

٧٦٢٥ - حُجَيْتَةُ ضَيْقَةُ الْوَرَق Cyrtanthus

angustifolia (S).

Cyrtanthe à feuilles étroites (F).

نوع من الحجيئة . عشبة دوفضية سبروتية . أوراقها خيطية
قليلة العدد الذي يراوح من ٢ إلى ٣ . لونها إلى الخضار
الجميل . تظهر مع الأزهار وتطول من ١٥ إلى ٣٥ سم .
شراخها يرتفع من ٣٠ إلى ٤٠ سم . أزهارها عادية العرف ،
حمراء اللون ، كبيرة القد ، قطرها نحو ٥ سم . أماتها ٤ سم .
تنويرها خريف .

٧٦٢٦ - حُجَيْتَةُ عَطْرَة Cyrtanthus

odorus (S). Cyrtanthe odorant (F).

نوع من الحجيئة . عشبة دوفضية خادحة . أوراقها ضيقة
النصال ، قدية الشكل تطول نحو ٣٠ سم . لونها إلى الخضار
الزاهي . شراخها يرتفع نحو ٢٥ سم . أزهارها فواحة العرف
المستحب ، مستطيلة الشكل ، صغيرة البتلات الضيقة ||
تنويرها يستمر من تموز إلى آب .

٧٦٢٧ - حُجَيْتَةُ عَوْجَاء Cyrtanthus

obliquus (S). Cyrtanthe oblique (F).

نوع من الحجيئة . عشبة دوفضية سبروتية . أوراقها سنائية
الشكل تطول من ٥٠ إلى ٦٠ سم . وتعرض من ٣ إلى ٤ سم .
نصلها صلبة ، محددة انسطوح المعوجة ، لونها إلى الخضار
الاطحل . تظهر بعد الأزهار . شراخها يرتفع من ٣٠
إلى ٦٠ سم . أزهارها كبيرة القد ، تطول من ٥ إلى ٨ سم .
لونها إلى الخضار الموشح بالبرتقالي . شراعيها أربعة
منطقة نحو الخارج || تنويرها يستمر من أيار إلى حزيران

٧٦٢٨ - حُجَيْتَةُ وَحِيدَةُ الزَهْرَة Cyrtanthus

uniflorus (S). Cyrtanthe uniflore (F).

نوع من الحجيئة . عشبة دوفضية سبروتية . أوراقها قليلة
العدد ، من ٢ إلى ٣ ، بحرية الخضار ، قدية الشكل ،
تطول نحو ١٥ سم . شراخها يعلو من ١٠ إلى ١٥ سم .
زهرتها بيضاء اللون ، كبيرة القد ، قطرها نحو ٥ سم . ||
تنويرها في كانون الأول .

٧٦٢٩ - حَدّ Limite (F). Limit (E).

هو الحاجز بين الشيئين وهو منتهى الشيء

٧٦٣٠ - حَدّ أدنى Minimum

٧٦٣١ - حَدّ أعلى Maximum

٧٦٣٢ - حَدّ Milans, Milviens (F). Milvus (E).

عمارة طير من فصيلة الصقريات تشمل ستة اجناس .

الحداة والزرق والحنكران والصدصع والنضفة والقطامي .
جميعها متوسطة الجثة الهيفاء . سواقطها كبيرة مستطيلة .
أذناها فارقة . مناسرها محجنة شديدة الانعقاد ، حادة
البرة . أرساغها قصيرة وغليلة || أعطانها العالم . تطير
بحفة ولباقة ، تخلق وتحوم بقليل من التصفيق || قوتها
القواضم والزواحف والعصافير والاسماك والخشرات .
تعيش أزواجاً . تدن في صدوع الصخور وفي الخرائب
الدائرة والأشجار الباسقة وعلى الحضيض . تنبي وكناتها
بالقضبان وتحببها وتغلفها بالافان والاعشاب . أناتها
تبيض من رفنة إلى خمس رفنات تحضنها بمنابرة الذكور .

٧٦٣٣ - حَدّ أبنة * ، بِرَكِيل Xenopeltis

unicolor (S).

Xénopelte, Xénopeltis (F). Xenopeltis (E).

حية بيوض وحيدة الجنس والنوع من فصيلة الحدايات
عادات السموم . جسمها نحين الجرم يطول نحو ١٢٠ سم .
ثوبها إلى الصلبة الخنطية يعلوها موج جزوي وشبه تقبيج
جانبي يمتد من الشدين إلى طرفي الذنب . مدنها إلى
السرة . رأسها اسفني الشكل . عينها صغيرتان جاسفتان .
شدقها مستعرض الملاق . عدد أسنانها ٦٨ منها ٣٤ سنأ
في كل فك || تألف المواقع التي تكثر فيها الأتربة القليلة
الاندماج لأنها تغور فيها . بياتها الشتوي يستمر نحو
خمس أشهر || تبلغ كامل نموها بعمر ١٤ أو ١٥ سنة
وتعيش من ١١٠ إلى ١٢٠ سنة . تساقد بعمر ٦ سنوات .
تسرح في النهار وفي الليل . قوتها الجرذ والفأران والعطاء
والعكاير والثعابين والضفادع ... || اخلاقتها سلسة .
تنحاشي الانسان وإذا ضربه تضرره بذنبها . ضربتها
مؤذية لأنها تقرص المكان الذي تصيبه وقد تفعل فيه فعل
السوط || تعتبر من الحيات النافعة .

٧٦٣٤ - حَدّ أبيات Xenopeltidae (S).

Xénopeltidés (F). Xenopeltidae (E).

فصيلة حيات بيوضة من عادات السموم . اجناسها وأنواعها
المعروفة قليلة العدد . أعطانها تمتد من الشرق الأدنى إلى
الهند وماليزية . تألف المناطق الحارة . تسرح في الليل وفي
النهار . قوتها الفأر والجرذ والعطاء والضفادع والثعابين ||
اجسامها نحينة مستغلظة تطول من ٨٠ إلى ١٢٠ سم .
رؤوسها اسفنية الشكل . عينها صغيرة . اشداقها مستعرضة
الملاق . فكوكها مسننة . حراشفيها معينة ، قزاحية .
دعابلها كبيرة . ذيابلها صغيرة . || أشهر أنواعها الحداة .

٧٦٣٥ - حَدّ آلة Hache (F). Axe, Hachet (E).


الحداة : الفأس ذات الرأسين ج حذاء .

٧٦٣٦ - حَدّ آلة Milvus (S). Milan (F). Kite (E).

كنيتها أبو الخطاف وأبو الصلت . جنس طير من عمارة
الحداة وفصيلة الصقريات . أنواعه سبعة جميعها من كواسر
المناطق الحارة والمعتدلة . اخلاقتها شرسة . اجسامها
رشيقة ، سواقطها مستطيلة ، أذناها فارقة ، أرساغها
قصيرة || وعلى سبيل الفكاهة نورد ما جاء في الدميري
عن ابن وحشية وابن زهر وبعض رواة الاخبار . قال :
« الحداة كانت من جوارح سليمان . والسبب في صياحها
عند سفادها ان زوجها قد جحد ولدها منه فقالت يا لبي
الله قد سفدني حتى اذا حضت يضي وخرج منه ولدي
جمدني فقال سليمان للذكر ما تقول فقال يا نبي الله
انها تحوم البراري ولا تمتنع من الطير فلا ادري اهو



حُجَيْتَةُ مزهرة



حجيئة حمراء



حدابة

نحو ٢٠ جميعها افريقية المهد. تألف الفياقي والبراري والقيمان. قوتها الحشرات ويرقاتها تسمى اليها قفراً وتنقب التراب والرمال في طلبها || اجسامها صغيرة. تتميز باستطالة جوامعها الخلفية وبقصير الامامية. رؤوسها غليظة انوفها خنابية مستطيلة. عيونها جاحظة. اذانها ملعقية، منتصبة. اعناقها قصيرة. اذانها مستطيلة. اثوابها تمتاز بالمواقع التي تعيش فيها || جنسها الحداد والدواك.

٧٦٤٦ - حُدَّالٌ * Malvastrum (S).

Malvastre, Mauve bâtarde (F). False mallow (E). Scheinmalve (D). Malvastra, Falsa malva (I).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الجبازيات. انواعه عديدة واسعة الانتشار، معظمها بري وبعضها زراعي زينة. اوراقها معنقة، متعاقبة، مفصصة النصل. ازهارها لاقياسي التجميع والارتكاز. ازهارها مختلفة الالوان مستعرضة البتلات || اشهر انواعه الخمسة التالية.

٧٦٤٧ - حُدَّالٌ افريقي

Malvastrum hypomadarum (S). Malvastre calvescent (F).

جنبه معمرة تعلو نحو ٣ امتار. ساقها ليفية فرعاء متشعبة. اوراقها لاقياسية الشكل يغلب فيها التفصيص الثلاثي فصلها ازغب البشرة مسنن الحافة. ازهارها ابطية الارتكاز. قطرها نحو ٤ سم. بتلاتها مستعرضة لونها الى الالبيض يملوها في وسطها مشعة وردية || ازهاره يستمر طوال فصل الحريف.

٧٦٤٨ - حُدَّالٌ الرأس Malvastrum capensis (S).

Malvastre du Cap (F).

جنبه معمرة ليفية الساق الخنطية اللون تعلو من مترين الى ثلاثة امتار. مهدا رأس الرجاء الصالح. اوراقها ثلاثية او خماسية التفصيص. ازهارها ابطية الارتكاز لونها الى الاحمر العقيقي || ازهاره يستمر من ايار الى آب.

٧٦٤٩ - حُدَّالٌ جَرَسِي

Malvastrum campanulatum (S). Malvastre campanulé (F).

عشبة معمرة تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقها كبيرة القد، لاقياسية التفصيص، ملساء البشرة. ازهارها بحيلة الشكل الجرسى، ارجوانية اللون || ازهاره يستمر طوال فصل الحريف.

٧٦٥٠ - حُدَّالٌ جَوْرِي

Malvastrum lateritium (S). Malvastre rouge brique (F).

عشبة معمرة تعلو نحو ١٥ سم. ساقها منبسطة متشعبة زباء اللحاء. اوراقها ثلاثية او خماسية التفصيص الخروطي الشكل، زباء النصل الخليلي الملمس، الغضي الموج. ازهارها فردية مستطيلة الزناد جوورية اللون || ازهاره يستمر طوال الحريف.

٧٦٥١ - حُدَّالٌ خَمْرِي

Malvastrum coccineum (S). Malvastre carmin (F).

عشبة معمرة تعلو نحو ٢٥ سم. ساقها منبسطة متشعبة. اوراقها مستعرضة ثلاثية او خماسية التفصيص، فصلها مسنن الحافة ازغب البشرة الحولية الفضية الموج. ازهارها خمرية اللون، سفعاء الموج، سفلية التجميع، تاجية الارتكاز || ازهاره يستمر من ايار الى آب.

مني او من غيري قال فامر سليمان باحضار الولد فوجده شبه والده فالخقه به ثم قال لها لا تمكيني ابداً حتى تشهدني عليه ذلك الطير لئلا يبعد بعدها فصارت اذا سفلها صاحت وقالت يا طيور اشهدوا فانه سفدني. || اعرف واشهر انواعها ما يلي.

٧٦٣٧ - حِدَاةٌ حَمْرَاءُ * حِدَاةٌ شَالِغَةٌ، آصِي

Milvus milvus, M. icinus (S). Milan royal (F). Red kite, Glede (E).

احتشها واكبرها جثة وجناحاً. طولها نحو ٦٥ سم. وبسطها نحو ١٧٥. ثوبها الى الريدة السفعاء يعلوه توشيم وتمشيق وجهاك. رأسها وعنقها الى البياض الاغبر تعلوه نمشة سمراء. منقارها اسمر، عينها ورجلاها ومخالبها صفر || وهي من ارباب الشرق الادنى وقواطع اروبها.

٧٦٣٨ - حِدَاةٌ سَوْدَاءُ *

Milvus niger, M. migrans (S). Milan noir (F). Black kite (E).

نوع من الحدأة وهي اصغر قدماً من الحمراء واعبق ثوباً وابهم توشيماً وتمشيقاً. منقارها وعينها وجهاك زمكها سود. رجليها ومخالبها صفر. موطنها الشرق الادنى والمناطق الاروبية الدافئة وشمال افريقية.

٧٦٣٩ - حِدَاةٌ شَرْقِيَّةٌ *، اِبْنُ آصِي

Milvus korschun (S). Milan d'Orient (F). Korschun kite (E).

نوع من الحدأة متوسطة القد، هيفاء الجسم ثوبها الى الريدة المشقة العابقة الظهر الباهتة البطن || موطنها الشرق وهي من طيور القواطع.

٧٦٤٠ - حِدَاةٌ مِصْرِيَّةٌ * Milvus aegyptius (S).

Milan égyptien, M. parasite (F). Egyptian kite (E). قريبة الشبه من الحدأة السوداء. ثوبها يرتكز على الصهبة الرمضاء. منقارها اصفر اللون. زمكها فاروق منفرج الانشعاب || موطنها مصر والصومال والحبشة والجزيرة.

٧٦٤١ - حُدَّادٌ * Macroscelides (S).

Macroscélide (F). Macroscelides (E).

جنس حيوانات لبونة حاشرة جاسة من فصيلة الحداديات. انواعه المعروفة نحو ١٢ منتشرة في معظم المناطق الافريقية. تألف الفياقي والبراري القاحلة. قوتها الحشرات واساريها. عدوها قفز مستمر || اجسامها صغيرة تطول من ١٢ الى ١٤ سم. يضاف اليها طول الخنابة من ١ الى ٢ سم. وطول الذنب من ١٠ الى ١٢ سم. اثوابها تراوح من الصهبة الى الشقحة والشقحة السمراء. بطونها وصدورها تبنية اللون او عاجية دنسة || انثاها عشارية الاطباء.

اعرف انواعها واشهرها :

٧٦٤٢ - حُدَّادٌ اشْفَحٌ * Macroscelides

rufescens (S). Macroscélide roussâtre (F).

٧٦٤٣ - حُدَّادٌ الجَزَالِرُ * Macroscelides

rozeti (S). Macroscélide d'Algérie (F).

٧٦٤٤ - حُدَّادٌ الكَفَرُ * Macroscelides typus (S).

Macroscélide de la Cafrerie (F).

٧٦٤٥ - حُدَّادٌ بَيَّاتٌ * Macroscelidæ

Macroscélidæ (F). Macroscelidæ (E).

فصيلة حيوانات لبونة حاشرة جاسة. اجناسها وانواعها



حِدَاةٌ حَمْرَاءُ



حِدَاةٌ سَوْدَاءُ



حِدَاةٌ شَرْقِيَّةٌ



حِدَاةٌ مِصْرِيَّةٌ



حُدَّادٌ



حُدَّالٌ

٧٦٥٢ - حَدَب ، مُحَدَّب ، أَحَدَب

Convexe (F). Convex (E).

٧٦٥٣ - حَدَابَة ، تَحَدَّب ، إِحْدِيدَاب

Convexité (F). Convexity (E).

٧٦٥٤ - حَدَث

Evénement (F).

اطلب حادث .

٧٦٥٥ - حَدَث

Phénomène (F). Phenomenon (E).

اطلب ظاهرة ومذم .

٧٦٥٦ - حَدَج

Coloquinte officinale (F).

Colocynth (E). هو الحنظل ، الواحدة حدجة .

٧٦٥٧ - حَدَجَة

الحدجة : طائر يشبه القطا (القاموس) .

٧٦٥٨ - حُدُودُه

Nannosciurus (S).

Nannosciure (F).

جنس حيوانات لبونة قاضمة من فصيلة السنجاييات . أنواعه ستة موطنها البلاد الآسيوية والأفريقية . أجسامها صغيرة نحيلة مستطيلة طولها من ٦ إلى ١٠ سم . وأذنانها من ٥ إلى ٨ سم . أنوارها إلى الصبهة الزيتونية البيضاء الموج || يألف الغابات . يسرح في النهار . يتسلق بحفلة . قوته الثمار والبزور والقشور . بجمه وكن يربيه في صدع الشجرة . انشاء تضع من ٣ إلى ٤ ادراص تبصر وتكتسي بعد وضعها بأسبوع .

٧٦٥٩ - حَدَد

حدد الزرع وكل نبات اذا تأخر خروجه من قلة المطر أو الري ثم خرج سقيماً ناشفاً ولم يشعب .

٧٦٦٠ - حَدَد

Serran (F).

الحدد سمكة بحرية تدعى صرّان ، اطلبها .

٧٦٦١ - حَدَد مُسَبَّج

Serran maculé (F).

هو الصرّان المسبّج ، سمكة بحرية ، اطلبه .

٧٦٦٢ - حَدَد مُزَخَرَف

Serran écriture (F).

هو الصرّان الكاتب ، سمكة بحرية ، اطلبه .

٧٦٦٣ - حَدَس

Pronostic (F). Prognostic (E).

تقدير ما يجوز حدوثه في المستقبل .

٧٦٦٤ - حَدَق *

Mélongène, Morelle inerme (F).

فئة من الباذنجان . أنواعه عديدة تتميز بخلوها من الشوك وبانتصاب سوقها للاعارضة || اعرف أنواعه ما يتبع .

٧٦٦٥ - حَدَقِ الْأَرَجَنْثِين

Solanium rantonneti (S). Morelle de Rantonnet (F).

نوع من الحدق البري والتزييني مهده الأرجنتين . والبراغوي . ضروبه قليلة جميعها معمرة تعلو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم . أوراقها سنانية النصل مسنة الحافة أزهارها بنفسجية أو زرق . ثمارها عنبية الشكل ، حمراء اللون .

٧٦٦٦ - حَدَقِ الْبَرَازِيل

Solanium capsicastrum (S). Morelle piment bâ-tard (F).

نوع من الحدق البري والتزييني . مهده البرازيل . ضروبه المشهورة أربعة جميعها معمرة صغيرة القد تعلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم . أوراقها بيضبة أهليلجية زباه النصل . أزهارها بيض . ثمارها عنبية كروية برتقالية أو أرجوانية اللون .

٧٦٦٧ - حَدَقِ سَلَقِي الْوَرَق

Solanium betaceum, Cyphomandra betacea (S). Morelle à feuilles de bette (F).

نوع من الحدق الزراعي . يعلو نحو ٥ أمتار . أوراقه كبيرة القد تبدو خيرية ثم تنحرف إلى الجؤوة وتنتهي بالأخضر الاطحل . أزهاره عناقيد متدلية . أزهاره حمر . ثماره عنبية كبيرة الحجم حمراء اللون مأكولة ، طعمها كطعم البندورة .

٧٦٦٨ - حَدَقِ قَطِي

Solanium crispum (S).

Morelle crépus (F).

نوع من الحدق البري والزراعي التزييني . مهده بلاد الشيلي يعلو نحو أربعة أمتار . أوراقه قليلة القاعدة . بيضبة الزام الثاني والثالث ، ذلقة الزام الأخير . متموجة النصل القطي الحافة . أزهاره صغيرة باعنة اللون ، بتلاتها إلى البياض الأخير يقطبها خط بنفسجي . ثماره صفراء اللون ، عنبية الشكل بحجم الحمص .

٧٦٦٩ - حَدَقِ مَادِيرَا

Solanium pseudocapsicum (S). Morelle faux-piment, Orange de savetier (F).

نوع من الحدق البري والتزييني . يعلو من ١٠٠ إلى ١٥٠ سم . أوراقه سنانية مسنة . أزهاره بيض . ثماره أرجوانية اللون ، كروية الشكل ، كروية القد . لها اسفنجي ناشف ، بزورها سود صغيرة وكثيرة العدد . يمكن استعمالها كطعم للضروب العادية المأكولة الثمار لكنها تختفي المواقع الباردة .

٧٦٧٠ - حَدَقَة

Iris

الحدقة هي قزحية العين أي غشاء العين الملون .

٧٦٧١ - حَدَل

Roulage (F). Rolling (E).

راجع تحديل .

٧٦٧٢ - حَدَوَاء

Vent du Nord (F).

North-wind (E).

هي ريح الشمال لأنها تحمل السحاب أي تسوقه .

٧٦٧٣ - حَدَوَائِيَّة هـ

Holarctique (F).

Holarctic (E).

نعت تعريفي يطلق حل كامل المنطقة الشمالية بما فيها القطبية من العالمين القديم والجديد .

٧٦٧٤ - حَدَوُر

Plan Incliné (F). Inclined plane (E).

٧٦٧٥ - حَدِيد

Fer (F). Iron (E).

عنصر كثير الانتشار في باطن الأرض وظاهرها . يندر وجوده منفرداً في الطبيعة . خاماته أكاسيد وكربونات . رمزه (ح) . وزنه الذري ٥٥,٨٤ تكافؤه ٢ أو ٣ وهو بوجه عام رمادي اللون ، فني الموج قابل للطرق



حدق

٧٦٨٦ - حَذَف

غمّ سود صغار مهدا الحجاز. الواحدة حذفة.

Sarcelle (F). Teal (E).

جنس طيور مائية من فصيلة البطيات. أنواعه خمسة جميعها من القواطع، صغيرة القد، رشيقة القوام، سريعة الحركة. أسرابها كثيرة العدد. طيرانها خال من كل نظام وترتيب. قوتها الاعشاب المائية والحشرات. والرخويات. تتألف المناقع وشواطئ الأنهر والبحيرات. أشهرها ما يلي.

٧٦٨٨ - حَذَف جَمِيل *، صَنِيعَة

Anas angustirostris (S). Sarcelle marbrée (F). Mar-bel teal (E).

نوع من الحذف كبير الجثة طوله نحو ٤٠ سم. ثوبه الى الرعدة الصهباء. سواقطه مشقة بالابيض. حياك قوادمها اسمر. صدره عابق الصهبة. بطنه ينحرف نحو الالبيض. رقشة صدره وتوشم بطنه الى السمرة الخطية. حنار عينه اسود. منقاره ازرق رصاصي.

٧٦٨٩ - حَذَف شَتَوِي *، شَرَشِير شَتَوِي

Anas crecca, Querquedula crecca (S). Sarcelle sar-celline, S. d'hiver (F).

نوع من الحذف متوسط القد طوله نحو ٣٢ سم. رأسه وعنقه الى الصهبة الكستنية. يمتد من عينه الى قفنه خط اخضر الشج ابيض الجوانب. ظهره مشق ومؤذر. صدره الى البياض الجذوي يعلوه توشم اسود. بطنه الى البياض الاصفر. جوانحه الى السمرة الرمضاء يعلوها توشم اخضر وتمشيق اسود ورقشة بيضاء. منقاره اسود. ارجله رمادية. الانثى اقل تدويقا من الذكر. يدشن عشه في المناقع بين الاعشاب الكثيفة. انثاه تبيض نحو ١٢ بيضة تحضنها وحدها اربعة اسابيع.

٧٦٩٠ - حَذَف صَيْفِي *، شَرَشِير صَيْفِي، كَرَكَج

Anas querquedula, Querquedula ciria (S). Sar-celle commune, S. d'été (F). Garganey (E).

نوع من الحذف كبير الجثة طوله نحو ٣٨ سم. ثوبه متراكب الالوان الزاهية. رأسه الى الصهبة الاسمر. محاسره ببيض. بياضها ينتهي عند القفن. ظهره وجوانبه الى الصهبة الجذوية المرقشة بالابيض. عنقه وصدره وبطنه موشحة بالاسود. حياك قوادمه ببيض، منقارة اسود. ارجله رمادية. انثاه اقل تدويقا من ذكوره. يدشن عشه على ضفاف الأنهر والبحيرات بين الاعشاب الكثيفة القريبة من الماء.

Prosternum

٧٦٩١ - حَذَف قَارِ

هو في الحشرات الجزء الوسطي الجانبي من مقدم الجوشن.

Limbe (F). Limb (E).

٧٦٩٢ - حَذَفَة

حذف الزرع: ورقه.

Méasternum (F).

Metasternum (E).

هو في الحشرات الجزء الوسطي من حلقة البرجد السفلى.

Mésosternum (F).

Mesosternum (E).

هو في الحشرات الجزء الوسطي من حلقة البرجد السفلى.

والسحب. ينصهر في ١٥٣٠° سغ. ويغلي في ٢٤٥٠° سغ. ينجذب نحو المغناطيس ويصدأ في الهواء الرطب. أشهر أنواعه الصناعية المستخدمة: الحديد الزهر والحديد اللين والحديد النقي والحديد الصلب (الفولاذ).

Jardin d'agrément (F).

Pleasure-garden (E).

الحديقة، بوجه عام، هي كل ارض صار ترتيبها وغرس نباتاتها بعناية وذوق فجاءت محطاً يبهج النظر ويشرح القلب. والحديقة، بوجه خاص، تستعمل للتعبير عن الغاية التي وضعت من اجلها. لذلك فقد تكون:

Jardin de fleurs (F).

Flowers-garden (E).

كل حديقة. رتبت خصيصاً لزراعة الازهار وتربيتها.

Jardin d'acclimatation (F). Acclimatization-gar-

den (E).

كل حديقة خصصت للاعتناء بحياة الحيوانات والنباتات خارج اقاليمها الطوعية.

Jardin d'essais (F).

Experiment-garden (E).

كل حديقة تجري فيها التجارب والاختبارات الزراعية المختلفة الاهداف.

Jardin zoologique (F).

Zoologic-garden (E).

هي التي تجمع وتربي ضمن اقسامها ومزاربها واقفاصها مختلف انواع الحيوانات.

Fougerale (F).

Fern-patch, Fernery (E).

هي التي خصصت لزراعة وتربية السراخس.

Jardin botanique (F).

Botanical-garden (E).

هي التي خصصت بتربية النبات وتأصيله والحفاظ على سلامة اصنامه وضروبه.

٧٦٨٣ - حَذَال *، نَمَلَة فِرْعَوْن

Monomorium pharaonis (S).

Fourmi de Pharaon, F. des pharaons (F).

Pharaoh's ant (E). Pharaohmeise (D).

نملة عكاظية صغيرة القد، دقيقة الجسم، تطول نحو ٢ مم. ثوبها الى الشبهة الصنابية. رأسها وبطنها اعقب خضاباً من صدرها وجرامزها. المهتجة منها تطول نحو ٥ مم. أشهرها البلاد الحارة وقد انتشرت في معظم اصقاع العالم باستثناء المناطق الباردة. وهي تقيم زبائها في اي صدع كان، ان داخل المنازل أو خارجها وفي تخاريب الاخشاب المصنوعة وغير المصنوعة. قوتها جميع المواد الغذائية.

٧٦٨٤ - حَذَال عَصَاة الثمرة اذا كانت حمراء اللون.

Estimation des récoltes (F).

Estimation of crops (E).

الحذر هو تقدير غلات الزروع.



حَذَال



حَذَف جَمِيل



حَذَف شَتَوِي



حَذَف صَيْفِي

٧٦٩٥ - حَذَل

الحذل والحذالة : صمغ احمر تفرزه بعض الاشجار عقب
وصم يصيبها .

٧٦٩٦ - حَذَلُوم*

Damaliscus (S).

Damalisque (F). Hartebeest (E).

جنس ابقار وحشية قريبة الشبه من الثيتل لكنها اصغر
جثة واقصر رأساً وارفع حاركاً واخفض كفلاً . قرونها
كثيرة الحيد قليلة الاحديداد . اثوابها الى الصهبة يعلوها
قَم وتوشيح || انواعه اربعة تلي .

٧٦٩٧ - حَذَلُومُ أُغَرَّ

Damaliscus albifrons (S).

Damalisque à front blanc, Blesbok (F). Blesbok (E).

نوع من الحذلولوم صغير القد يعلو نحو ٩٧ سم . ثوبه
الى الصهبة المغراء . جبهته غراء ، قرونها قصيرة || اجله
من ١٠٠ الى ٣٠٠ . يألف الغابات المشبة والمراعي
الحصبة يكثر في بلاد الترنسفال واورنج .

٧٦٩٨ - حَذَلُومُ البُحَيْرَةِ ، حَذَلُومُ تَسَّابِي

Damaliscus sassaby, D. lunatus (S). Damalisque sas-

saby (F). Sassaby hartebeest (E).

اسرع انواع الحذلولوم واقتحها لوناً واكبرها قدماً ، يعلو
نحو ١٢٥ سم . موطنه افريقية الجنوبية . يألف الخضاب
والسهول المشبة ينثر من الغابات الكثيفة . اجله من
٨ الى ١٥ زوجاً .

٧٦٩٩ - حَذَلُومُ السِّنْغَال

Damaliscus senegalensis, D. korrigum (S). Damas-

lique du Sénégal, Korrigum (F). Senegal har-

tebeest (E).

نوع من الحذلولوم متوسط القد يعلو نحو ١٠٥ سم . ثوبه
اصهب حنطي وهو قصير الرأس ، مستطيل القرن الاخير
المستقيم ، ابيض السيلة . موطنه السنغال ومغربي . اجله
يرواح من ٥٠ الى ١٥٠ نفر .

٧٧٠٠ - حَذَلُومُ قَانَا

Damaliscus hunteri (S). Damalisque de Hunter,

Herota (F). Hunter hartebeest, Herota (E).

نوع من الحذلولوم . موطنه ضفاف نهر قانا . يعلو نحو
١٢٠ سم . ثوبه الى الصهبة الخطية يعلوها قَم عند الساعد
والحارك والكفل . جبهته غراء ، قرناه مستطيلان احيدان .
اجله يراوح من ١٥ الى ٢٥ زوجاً ، يألف الاسراج المبعثرة
الاشجار الكثيرة المشب .

٧٧٠١ - حَذَلَةٌ

Oreille d'insecte (F).

Ear of insect (E).

الحذلة هي اذن الحشرة . وهما حذنتان مركزهما في الحشرات ،
عند وجودهما ، لاقياسي وقد يختلف الشكل والحجم والتركيب
مع الفصائل والاجناس . فالجرادة مثلاً تحملها كطبلتين
على جانبي حلقها البطنية الاولى في حين ان البعوض
يستغنى عن الحذنة بالقرن الاستشعاري اي الزبان
الذي يمكنه من كل ذبذبة .

٧٧٠٢ - حَذَلُوم

Ferrure (F). Shoeing (E).

راجع لانعال .

٧٧٠٣ - حَرَّ

Falco lanarius (S).

Faucon lanier, Laneret (F). Lanner (E).

طائر من الصقور . وهو اصغر جثة من الشاهين والشرق ،

انمر الريش ، اصقع الرأس ، اسفع الظهر ، اغبر
البطن ، عظيم المنكين || يكثر في الشرق الادنى .

٧٧٠٤ - حَرَّاء

Pondoir de la tourterelle (F).

هو موضع بيض اليامة .

Celastracées (F).

Celastraceae (E).

٧٧٠٥ - حَرَائِيَّات

هي القاتيات فصيلة نباتية من ذوات انفلتين .

٧٧٠٦ - حَرَائِيَّةٌ* ، سِلَاسْتَرُومُس

Celastrus (S). Célastre (F). Celastrus, Waxwork

shrub (E). Echter baumwürger (D). Celastro (I).

جنس شجيرات وجنبات برية وزراعية تزيينية من فصيلة
القاتيات . انواعه نحو ١٣٠ . جميعها من نباتات المناطق
الحارة والمعتدلة . سوقها منتصب او عارشة . اوراقها
متعاقبة . ازهارها خضر . ثمارها حمر . اخشابها صلبة
كانوا يستعملونها في صناعة الخراب || اعرفها واشهرها يلي .

٧٧٠٧ - حَرَائِيَّةٌ أُورِيْكَسَا

Celastrus orixa,

Othra orixa (S). Célastre orixa (F).

شجيرة منتصب الساق تعلو نحو ٢٥٠ سم . اوراقها
اهليلجية . نصلها املس الصفحة العليا ، ازغب السفلى ،
بشرته مرقوشة بالغدد . ازهارها رباعية التركيب ، خضراء
اللون . خشبها ناعم الرقة شديد الصلابة || ازهارها
يستمر من نيسان الى ايار .

٧٧٠٨ - حَرَائِيَّةٌ خَانِئَةٌ

Celastrus scandens (S).

Célastre bourreau des arbres (F).

جنية عارشة ملتفة تطول من ١٠ الى ١٥ م . فروعها
عديدة مستطيلة وكثيرة الالتفاف . اوراقها اهليلجية
مدببة طولها نحو ١٠ سم . وعرضها ٥ . ازهارها تاجي
ومحوري . ازهارها الى الخضار الاصفر . بتلاتها مسنة
الحافة . ثمارها حقبة ثلاثية الفلق ، برتقالية اللون .

٧٧٠٩ - حَرَائِيَّةٌ مُلْتَفَةٌ

Celastrus orbiculata (S). Célastre orbiculaire (F).

جنية عارشة ملتفة تعلو نحو ٥ امتار . اوراقها عروية بيضية
مسنة الحافة ، طولها من ٨ الى ١١ سم . وعرضها من
٦ الى ٨ . ازهارها خماسية التركيب ، محورية الارتكاز .
مهدها الصين واليابان . ازهارها يستمر من آب الى
تشرين الثاني .

٧٧١٠ - حَرَائِيث

هو الحريط العربي ، اطلبه .

Laboureur (F).

Husbandman, Ploughman (E).

٧٧١١ - حَرَائِث

هو الذي يحرق التربة .

Courtillière (F). Mole-cricket (E).

٧٧١٢ - حَرَائِيَّة

هي الخالوش ، اطلبه .

Labourage (F).

Tillage, Ploughing (E).

٧٧١٣ - حَرَائِيَّةٌ ، حَرَائِيَّةٌ

هي العمل في التربة كزراً او غرساً .

Ranchage (F).

٧٧١٤ - حَرَائِيَّةٌ شَقِيَّةٌ

Sylviculture (F).

Sylviculture, Forestry (E).

علم من علوم الزراعة يبحث في كل ما له صلة بالاحراج

والتحريج والاستثمار والعناية .

٧٧١٥ - حَرَائِيَّةٌ

Sylviculture, Forestry (E).

علم من علوم الزراعة يبحث في كل ما له صلة بالاحراج

والتحريج والاستثمار والعناية .



حذلولوم



حَرَّ



حَرَائِيَّة

٧٧٣٠ - حُرْبَاء مَدْعَسُكْر
Caméléon bifide (F). Bifid chameleon (E).

٧٧٣١ - حُرْبَاوِيَّات ، حُرْبَايَّات
Chamaeleonidae (S). Caméléonidés, Chamaeléo-
nidés (F). Chamaeleonidae (E).

فصيلة حيوانات زحافة من رتبة العقلايات اللدويات
اللسنة. اجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها متوسطة
القد او صغيرة. رؤوسها هرمية الشكل. السنن مستطيلة
اختاذة. قوتها الحشرات والهوم.

٧٧٣٢ - حُرْبَة
Spadice (F). Spadix (E).
الحربة : الطلعة اذا كانت بقشرها ويقال لقشرها اذا
نزع القيقاء. ج حرب || ويقال احرب النخل اذا
بدت حربه. وحربه اذا اطعمه الحرب.

٧٧٣٣ - حُرْبَة هي دافع الصاعقة ، اطلبه .

٧٧٣٤ - حُرْبُث
Astragale annulaire
الحربث نبت مبسوط له ورق طوال رفاق طيب الرائحة
يزيل بخر الفم وينفع من القولنج وسوء الهضم . واذا
اكلته الغنم طاب لحمها ولبنها || راجع اسطراغالوس حلقى .

٧٧٣٥ - حُرْبِص
Irriguer (F). To irrigate (E).
حربص الارض : ارسل فيها الماء .

٧٧٣٦ - حُرْبُط* ، حَشِيْشَة الدَّاحِيس
Paronichia (S). Paronique, Paronyque (F). Paroni-
chia (E). Paronychie, Nagelkraut (D). Paronichia (I).
جنس نباتات عشبية برية طيبة من فصيلة القرنفليات .
مهدا حوض البحر المتوسط . انواعها تسعة منها الحولية
والمعمرة . جميعها صغيرة القد . اوراقها متقابلة لسنة
حرفية النصل . حراشفها فضية اللون . ازهارها صغيرة ،
خامسة التركيب ، مختلفة الالوان || يقال انها من
انفع علاجات الداحوس . اشهر انواعها التالية .

٧٧٣٧ - حُرْبُط البَادِيَّة ، رُحَيْمَة
P. desertorum (S). Paronique du désert (F). De-
sert paronichia (E).

٧٧٣٨ - حُرْبُط سَيْنَا
P. sinai (S).
Paronique de Sinaï (F). Sinaica paronichia (E).

٧٧٣٩ - حُرْبُط صَعْتَرِي
P. serpyllifoliata (S).
Paronique à feuilles de serpolet (F). Thyme leaved
nailwort (E).

٧٧٤٠ - حُرْبُط عَرَبِي ، حَرَابِيْث
P. arabica (S). Paronique de l'Arabie (F). Arabica
paronichia (E).

٧٧٤١ - حُرْبُط فَضِي
P. argentea (S).
Paronique argenté (F).

٧٧٤٢ - حُرْبُط كُرْدِي
P. kurdica (S).
Paronique kurde (F).

٧٧٤٣ - حُرْبُط مُتْرَاكَب
P. imbricata (S).
Paronique imbriqué (F).

٧٧٤٤ - حُرْبِيْق
Mercuriale (F). French mercury (E).
هو الحبوب نبات طبي ، اطلبه .

٧٧١٦ - حَرَارَة
Température (F).
Temperature (E).
هي درجة حرارة الهواء .

٧٧١٧ - حَرَارَة دُنْيَا
Température minima (F).
هي نهاية الحرارة الدنيا .

٧٧١٨ - حَرَارَة دُنْيَا مُطْلَقَة
Température minima absolue (F).
هي نهاية الحرارة الدنيا المطلقة .

٧٧١٩ - حَرَارَة قُصْوَى
Température maxima (F).
هي نهاية الحرارة القصوى .

٧٧٢٠ - حَرَارَة قُصْوَى مُطْلَقَة
Température maxima absolue (F).
هي نهاية الحرارة القصوى المطلقة .

٧٧٢١ - حَرَارَة وَسْطَى
Température moyenne (F).
هي متوسط النهايتين الدنيا والقصوى .

٧٧٢٢ - حَرَارِي ، مِسْعَرِي
Calorique, Thermique (F). Caloric, Thermic (E).

٧٧٢٣ - حِرَاق حِرَاق ، حِرْوَق
Spadice (F). Spadix (E).
الكش الذي يجب به النخل والمعني به الشمراخ الزهري الذي
يؤخذ من النخلة الفحل فيدس في طلمة النخلة الاثني .

٧٧٢٤ - حَرَّاقَة
Fumeron (F).
Smoky charcoal (E).
الحرقاة كل فحمة لم يكتمل تفحمها فتتمنع الانسجام
المفروض بلهيبها ودخانها .

٧٧٢٥ - حَرَّالْ
اسم تعريفي يطلق على شح صيد البحر . وقولك ايام الحراك
اي ايام قلة صيد البحر (التاج) .

٧٧٢٦ - حِرْبَاء
Caméléon, chaméléon (F).
Chameleon (E).

الحرباء كوكبة نجوم جنوبية الموقع . كواكبها متباينة
الالوان بما دعا الى تسميتها بالحرباء || عدد نجومها سبعة
جميعها من المرتبة الخامسة .

٧٧٢٧ - حِرْبَاء* ، حِرْبَايَة ، بَرَبْحَتِي
Chamaeleo (S). Caméléon (F). Chameleon (E).

جنس عطاء من فصيلة الحرباويات انواعه نحو ٣٠ تكثر
في المناطق الحارة والمعتدلة من العالم القديم || وهو حيوان
بطيء النهضة عجيب الخلقة ، راسه مصلع الزوايا ، ظهره
مستطيل السنام . عيناه تدوران من كل جهة . يتلون
بلون الشجرة التي يكون عليها . يصطاد الذباب والهوم
بلسانه الدقيق المستطيل . وهو من العطاء التي تستقبل
الشمس وتدرر معها || كنيته ابو جفادب ، ابو الزنديق
ابو الشقيق ، ابو قادم وجل اليهود . انشاء تدعى
حرباءة || اشهر انواعه واعها التابعة .

٧٧٢٨ - حِرْبَاء السِّنْغَال
Caméléon du Sénégal (F). Sénégal chameleon (E).

٧٧٢٩ - حِرْبَاء مُبْتَدَلَة
Caméléon vulgaire (F). Common chameleon (E).



حرباء



حربط

عشكولي التجميع ، ابطي الارتكاز. ازهارها صغيرة
القد مستطيلة البتلات زباء النصل || اوراقها طيبة
وتستعمل في غش السنى الحجازي .

٧٧٥٦ - حَرْبِيشَة Nuée de sauterelles (F).

الحرجلة القطعة من الجراد سربها يغشي السماء .

٧٧٥٧ - حَرْبِيشَان ضرب من الجراد .

٧٧٥٨ - حَرْبِيشِي ، غَابِيِي Sylvicole (F).
Sylvan, woodland (E).

نعت تعريفي يستعمل للدلالة على الاشياء والاعمال الخاصة
بالاحراج والتحريج .

٧٧٥٩ - حَرْبِيشِيل * Pucrasle (F).

طائر من التندرجيات اعطانه جبال آسية الوسطى . طوله
نحو ٨٠ سم . ثوبه يرتكز على الصهوة المابقة تعلوها نمشة
سواء ورقشة وتسنيج يتراكب فيها الابيض والاسود والاحمر .
رأسه وزوره وقفنه الى السواد اللامع . يتميز الذكر بثلاث
زوائد ريشية قرنية الشكل تعلو الرأس عند صدغيه وقفنه ||
قوته البزور والحبوب والاعشاب والنواصي النباتية وبمض
الحشرات والديدان || يألف الحراج والغابات القريبة من
مجارى الماء . مجثمه الاغصان الافقية الارتكاز || يدثن
في التربة . افعمومه صاجي الشكل . انشاء تحضن نحو ١٦
بيضة قرغيمها يستمر نحو اربعة اسابيع .

٧٧٦٠ - حَرْبِيش Graines de cirée (F).
Seed of circaea (E).

الحردب : حب المشرق .

٧٧٦١ - حَرْبِيشَة

الحردة : مبر الخيل والابل والتم .

٧٧٦٢ - حَرْبِيشِي ، هَرْبِيشِي Toiture en roseaux (F).
الحراشي ما يلقي على غشب السقف من اطنان القصب
للوقاية من حر الشمس . اطلب هردي .

٧٧٦٣ - حَرْبِيشُون * ، حَرْبِيشُون ، حَرْبِيشُون ،
أم حَبِين ، حَبِينَة ، قاضي الجبَل

Agama (S). Agame (F). Agama, judge of the
desert (E).

جنس عطاء من فصيلة الحردونيات . انواعه عديدة تتميز
بقباجة اشكالها . موطنها البلاد الحارة والاستوائية .
قوتها الحشرات والخرام .

٧٧٦٤ - حَرْبِيشُونِيَّات ، بَنَات حَبِين

Agamidae (S). Agamidae (F). Agamidae (E).

فصيلة حيوانات زحانة من رتبة النظائيات اللحيات
الالسة . اجناسها ٣٠ وانواعها ٣٠٠ . اعرفها واكثرها
انتشاراً الحردون والضب والعصفوط .

٧٧٦٥ - حَرْبِيشَان ، حَرْبِيشَان ضرب من الجراد .

٧٧٦٦ - حَرْبِيشَان Angle (F). Angle (E).

الحرم الزاوية .

٧٧٦٧ - حَرْبِيشَان Angulaire (F). Angular (E).

ذو زاوية . ويقال محرم .

٧٧٤٥ - حَرْبِيش Céraste (F).

Ceraste, Horned viper (E).
هي القرعاء حية كالافعى ذات قرنين .

٧٧٤٦ - حَرْبِيش ، حَرْبِيشَة ، كَرْبِيش ، كَرْبِيش

Labour, Labourage (F). Ploughing, Tillage (E).

هو شق التربة وقلبها لتفكيك ذراتها المتاسكة . وقد يتم
اما آلياً بواسطة التراكاتور او حيوانياً بواسطة الفدان .
وهو يأتي على اشكال مختلفة توجبها حالة التربة وما عليها
من نبات او ما سيقوم عليها من زراعات . لذلك فالحرثة
قد تكون سطحية او عميقة او متصالبة الخ .

٧٧٤٧ - حَرْبِيشَان * ، أَوْزْ مُسْتَح

Plectropterus (S). Plectroptère, Oie à
épérons (F). Plectropterus (E).

جنس طير من كفيات القدم وفصيلة الوزيات . انواعه
المعروفة ستة جميعها كبيرة القد . اجسامها تطول من ٨٠
الى ١٠٥ سم . اجنحتها كبيرة تنبسط نحو ٢٠٠ سم . وهي
مجهزة التسوع بمناخس حادة . اعناقها مستطيلة . مناتيدها
كبيرة وقوية تجلج قواعدها لخاص زفدية المادة . اذناها
قصيرة قوائمها رفيعة . اذناها مبلقة يكثر فيها الاسود
الاخضر الموج والابيض || جميعها من الضوارب . تألف
الاهوار ومجارى الانهار . قوتها الاعشاب .

اشهر انواعها الاربعة التالية :

٧٧٤٨ - حَرْبِيشَان غَابِيِي

P. de Gambie, Oie de Guinée (F).

٧٧٤٩ - حَرْبِيشَان سِيَام

P. de Siam, Oie de Siam (F).

٧٧٥٠ - حَرْبِيشَان الصِين

P. de Chine, Oie de Chine (F).

٧٧٥١ - حَرْبِيشَان مَدَغَسْكَر

P. de Madagascar, Oie de Madagascar

٧٧٥٢ - حَرْبِيش ، حَرْبِيشَة Forêt, Bols (F).

Forest, Wood (E).
هي كل ارض نمت وكثرت فيها الاشجار البرية اكانت
من صنع الطبيعة او الانسان || وفي التخصيص يقال :
حرجة من شجر ونوطة من طلع وعيص من سدر وأيكة
من اثل وفرش من عرفت ووهط من عثر وغال من سلم
وسليل من سمر وقصيحة من رمث وسحرمة من غضا .

٧٧٥٣ - حَرْبِيش Boiser (F). To afforest (E).

اقام حرجة في موقع خال من الاشجار او كانت فيه
حرجة طبيعية زالت معالمها منذ امد بعيد .

٧٧٥٤ - حَرْبِيش Vent (violent et froid) (F).

Wind (violent and cold) (E).
هي الريح الباردة الشديدة المهبوب .

٧٧٥٥ - حَرْبِيش SOLÉNOSTEMMA argel (S).

Solénostemme argel, Argel, Argélie, Arguel (F).
Arghel, Argel (E). Arghelsenna (D). Solenostemma (I).

جنبة معمرة من فصيلة الصقلابيات وحيدة الجنس والنوع .
موطنها التوبة ومصر العليا وجزيرة العرب . تعلو من ٥٠
الى ١٠٠ سم . اوراقها منقطة بيضية متقابلة . ازهارها



حَرْبِيشَان



حَرْبِيش



حَرْبِيش



حَرْبِيش

والمنجوليات والقوبيات والكرنبيات والبشوريات
والحرمديات والهوليات والفسيقيات واللقينيات .

٧٧٨٠ - حَرْشُون

الحرشون : ضرب من السمك . ج حراشين (اللسان) .

٧٧٨١ - حَرْشُونَة °

Phycis (S).

Phycis, Merlus (F). Phycis, Merlus (E).

جنس اسماك بحرية بيوضة من فصيلة الغادسيات . انواعه
المعروفة سبعة جميعها من اسماك بحار البلاد المعتدلة الحرارة ||
اجسامها سنانية الشكل ، متوسطة القد . زعانفها الظهرية
والشرجية مستطيلة . زعانفها الخوضية وداجية الارتكاز ،
خيطية الشكل ، مستطيلة . عذباتها فكية الارتكاز متفاوتة
الجرم والعدد الذي يراوح من ١ الى ٦ وذلك بالنسبة الى
النوع || اثوابها تختلف مع الانواع وتراوح من الرتبة
الفاتحة الى الطحلة الرصاصية يعلوها موج امغر || اشهر
انواعها حرشونة المتوسط .

٧٧٨٢ - حَرْشُونَة الْمُتَوَسِّط °

Phycis mediterraneus (S).

Phycis de la Méditerranée, Merlus barbu,

Mustelle, (F). Lesser hake (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة الغادسيات . اعطانها بعض
بحار البلاد المعتدلة الحرارة واخصها البحر الابيض المتوسط .
تعتبر من اسماك الاغواط || جسمها شبه سناني الشكل يطول
من ٤٥ الى ٦٠ سم . ثوبها الى الرتبة تعلوه ماجة تختلف
مع فصول السنة . اذكاها خضاب الربيع . رأسها امغر
اللون . ثبج ظهرها شديد السمرة . القسم العلوي من جانبها
كستني الموج . بطنها عادم السمرة . زعانفها الصدرية الى
الحمرة القرمزية . زعنفتها الذيلية مطوقة بحزام اسود . رأسها
مستطيل الشكل ، قصير الخطم . شدتها معتدل الانفراج .
فكها العلوي يتقدم السفلي . اسنانها صغيرة ، متراسة .
عذباتها صغيرة ، فكية الارتكاز . عيناها صغيرتان ،
مستديرتان ، ناشرتان . زعانفها الظهرية اثنتان . الذيلية
مقطوعة الطرف || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

٧٧٨٣ - حَرْض * ، قَلْنِي ، شَوْك أَهْر ، أَشْنَان

Salsola kali (S). Soude, Kali (F).

Saltwort, Kali (E). Sodapflanze, Kalisalzkrut (D).
Soda, Erba cali, Cali (I).

نبات عشبي بري من فصيلة السرمقيات يكثر وجوده
قرب الشواطىء البحرية والمناطق المالحة . اوراقه متعاقبة ،
ازهاره فردية محورية . كانوا يزرعونه ويستخرجون منه
الصودا بعد الحريق والتميد .

٧٧٨٤ - حَرْضُون

Agama stellio

نوع من الحراذين يدعى حردون الصخر لانه يعيش بين
الصخور ويكثر من الاقامة عليها مستلقياً اشعة الشمس .

٧٧٨٥ - حَرْضِي ، قَلْوِي

Alcalin (F).

Alkaline (E).

نعت تعريفي يطلق على المواد التي تتحلل بخواص القلي .

٧٧٨٦ - حَرْطَاب °

Hygrothermographe (F).

Hygrothermograph (E).

جهاز يسجل تلقائياً وباستمرار درجة الحرارة الموقعية
والرطوبة النسبية في خط بياني واحد .

٧٧٨٧ - حَرْف

هو الرشاد ، اطلبه .

٧٧٦٨ - حَرْشَاء

Moutarde des champs (F).

Charlock (E). هي الحردل البري ، اطلبه .

٧٧٦٩ - حَرْشَافِي °

Squamiforme (F).

ما كان شكله كالحرشف .

٧٧٧٠ - حَرْشَة ، حَشُونَة

Rugosité (F).

Rugosity (E).

٧٧٧١ - حَرْشَف

Ecaille (F). Scale (E).

هو كل ورقة بسيطة الوثل والشكل ، صغيرة القد ، متراكبة
الارتكاز كما في الجعفل . ج حراشف . ويقال ورقة
حرفية .

٧٧٧٢ - حَرْشَف

Ecaille de poisson (F).

Scale of a fish (E). الحرشف : قلوب السمك .

٧٧٧٣ - حَرْشَف ، هَيْشَر ، قَرْدُون

Cynara (S). Cardon (F). Cardoon (E).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المركبات الانبوبية
الزهر . انواعه عديدة جميعها كبيرة الاوراق المفترضة القليلة
الشوك . ازهارها مركبة قرصية حرفية مدبية العقصة
الشائكة ، بنفسجية او زرقاء اللون ، تحتها لحمي مأكول .
قيل انه ينفع من داء الثعلب طلاء وماؤه يقتل القمل اذ
غسل به الرأس ويذهب الحدار .

٧٧٧٤ - حَرْشَف بَرِّي

Chardon Marie (F).

Milk thistle (E). هو الكميبي ، اطلبه .

٧٧٧٥ - حَرْشَف سُورِي * ، هَيْشَر سُورِي

Cynara syriaca (S). Cardon de Syrie (F). Syrian car-

doon (E). نوع من الحرشف المحول يعلو من ٣٠ الى ٩٠ سم . ساقه
غليظة مضلعة . اوراقه شائكة الحافة ، نصلها املس
الصفحة العليا ، ازغب السفلي ، زغبه اطحل اللون .
رؤيساته كبيرة القد لونها الى الحمرة . حراشفها مستطيلة
مدبية شائكة .

٧٧٧٦ - حَرْشَف مَبْدُول * ، هَيْشَر مَبْدُول

Cynara cardunculus (S). Cardon commun, Arti-

chaut carde (F). Cardoon, Prickly artichoke (E).

Kardon, Spanische artischoke (D). Cardone, Cardo

spinosa (I). نوع من الحرشف وهو نبات عشبي معمّر عديد الضروب

منظمها بري وبعضها زراعي كالارضي شوكي . ساقه
تعلو من ٥٠ الى ١٥٠ سم . اوراقه مفترضة عسامة
الشوك او قليته . حراشف رؤيساته مدبية شائكة .

٧٧٧٧ - حَرْشَقَة

Ecaille (F). Scaling (E).

انزع الحراشف .

٧٧٧٨ - حَرْشُفِي ، سَهْفِي ، قَلْسِي

Ecailleux, Squameux (F). Scaly, Squamous (E).

نعت تعريفي وصفي يطلق على كل عضو تكسوه الحراشف .

٧٧٧٩ - حَرْشُفِيَّاتُ الْأَجْنَحَة

Lepidoptera (S). Lépidoptères (F). Lépidoptera (E).

رتبة حشرات من طبقة سدنيات الجناح فصائلها واجناسها
وانواعها زهاء ١٠٠٠٠٠ || اشهر فصائلها الفراشيات
والارفيات والقزيات والقتميات والناريات والقائلات



حَرْشَف سُورِي



حَرْشَف مَبْدُول



حَرْشُونَة الْمُتَوَسِّط



حَرْض



حرف الحقل



حرف السطوح



حرف الماء



حرف بري



حرف



حرفس

الزهري يعلو من ٥٠ الى ٦٠ سم. ازهاره بيض، عرفها غسقي مستحب الرائحة || ازهاره يستمر من حزيران الى تشرين الثاني.

٧٧٩٥ - حَرْق غَيْثِيَّة ، دَنْق السُّودَان

Sansevieria guineensis (S). Sansevière de Guinée (F). نوع من الحرق. اوراقه عصفية انشاكل منبسطة، طولها من ٣٠ الى ٨٠ سم. نصلها باهت الخضار معصب، عصائبه عابقة لامعة || شراخه الزهري يعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم. ازهاره ارجوانية اللون || ازهاره يستمر من حزيران الى تشرين الثاني.

٧٧٩٦ - حَرْقِيْد الحَرْقِد : اصل اللسان . ج حراقِد .

Pomme d'Adam (F). Adam's apple (E).

الحرقدة هي عقدة الخنجر وتدعى جوزة العنق وخزرة الرقبة.

٧٧٩٨ - حَرْقُس * CEdipoda (S). CEdipode (F).

جنس جنادب من القبوطيات. انواعه عديدة معظمها صغير القد وبعضها متوسط. ذكورها اصغر حجماً من اناثها طولها يراوح من ١٤ الى ٢٢ سم. اما الاناث فتطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. اثوابها الى الصهبه الخنطية يعلوها تمشيق عابق وتوشيح اسمر. رواشها السفلى جليلة الالوان الزاهية اللامعة || وهو يألف البور والزرورع على السواء. قوته الاعشاب على اختلافها. يكثر وجوده من حزيران الى ايلول.

٧٧٩٩ - حَرْقُفَة Hanche (F). Hip (F).

هي رأس الورك. ج حراقف.

٧٨٠٠ - حَرْقُفِي Coxal (F). Coxal, Iliac (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما له علاقة بالحرقف.

٧٨٠١ - حَرْقُوس

الحرقوس والحرقص «دويبة كالبرغوث صغير ارقط بحمرة او صفرة ولونه الغالب عليه السواد. وقال الزمخشري انها دويبة اكبر من البرغوث وعضها اشد من عضه وقال ابن سيده الحرقوس دويبة لها حمة كحمة الزنبور تلدغ بها» (الملاحظ).

٧٨٠٢ - حَرْقُوفَة Coxopodite (F).

Coxopodit (E). الفصلة الاولى من الزائدة المتصلة بالتجويف الصدري او البطنى عند القشريات.

٧٨٠٣ - حَرْكَة Mouvement (F). Movement (E).

علم يبحث في نظم انتقال الاجسام وهو يشمل درس القوى المسببة والعلاقات الزمنية والمكانية.

٧٨٠٤ - حَرْكَة مَقْلَاعِيَّة Circumduction

هي حركة الدورة المحورية او الحركة الاستدارية حول المركز.

٧٨٠٥ - حَرْفَة Rut

هي شهوة البضاع عند اناث الدواجن الببونة. والاثني بهذه الحالة تدعى حرمى. ج حرام وحرامى.

٧٧٨٨ - حُرْف الحَقْل * ، صِنَاب المَاء

Cardamina pratensis (S). Cardamine des prés, Cresson des prés (F). Cuckoo flower, Meadow bittercress (E). Kukucksblume, Weisenschaukraut (D). Cardamina, Billeri, Crescione dei prati (I).

نبات عشبي بري معمر من الصناب وفصيلة الصليبيات. ينبت قرب الماء وفي الاماكن الرطبة. اوراقه متعاقبة مركبة. ازهاره هامية بيض. اوراقه وبزوره حريفة نافطة تستعمل في بعض المستحضرات الطبية.

٧٧٨٩ - حُرْف السُّطُوح * ، حَرْدَل فِارِسِي ، صِنَاب بَرِّي

Lepidium campestre, Thlaspi campestre (S). Cresson des champs, Bourse de Judas (F). Field cress, Wild bastard cress (E). Feldkresse, Wildknow-lauch (D). Lepidlo salvatico, Erba storna, Mostarda salvatica (I).

نبات عشبي بري من فصيلة الصليبيات. يكثر بين الزروع وفي الاراضي البور. اوراقه مركبة حريفة الطعم ازهاره هامية بيضاء اللون، بزوره نافطة.

٧٧٩٠ - حُرْف المَاء * ، رَشَاد بَرِّي

Senebiera coronopus, Cochlearia coronopus (S). Senebière, Cresson de rivière, Corne de cerf (F). Buck's horn, Swine's cress, Wart-cress (E). Echter krähennuss, Schweinekress (D). Ambrosia salvatica, Lappolne, Corno di cervo (I).

نبات عشبي بري من فصيلة الصليبيات يكثر في الاماكن الرطبة وعلى ضفاف الانهر.

٧٧٩١ - حُرْف بَرِّي * Chamaelina silvestris (S).

Roquette sauvage (F). Wild rocket (E). Wilder roquette (D). Ruc salvatica (I).

نوع من الجرجير البري وهو نبات عشبي حولي ضيق الاوراق المتعاقبة المستطيلة المفروضة الحادة الطعم الحريف. ازهاره بيض.

٧٧٩٢ - حَرْق * ، دَنْق Sansevieria (S).

Sansevière (F). African hemp, Bowstring hemp (E). Afrikanischer hanf (D). Sanseverina (I).

جنس نباتات نجمية معمرة من فصيلة الزنبقيات. انواعه ١٠ جميعها من نباتات المناطق الحارة. سوقها جذمورية مدادة. اوراقها سميكة، صلبة، مستطيلة، متراكبة كالوراق الباهرة. ازهارها عنقودي، هامي، متراص الزهر يرتكز على شراخ قرصي الاصل. ازهارها بحيلة مختلفة الالوان || اشهر انواعه التريينية ما يلي.

٧٧٩٣ - حَرْق أُسْطُوَانِي ، دَنْق أُسْطُوَانِي

Sansevieria cylindrica (S). Sansevière cylindrique (F). نوع من الحرق. اوراقه اسطوانية الشكل طولها نحو المتر مدببة العقصة، نصلها الى الخضار البحري يعلوه توشيح مائج || شراخه الزهري يعلو نحو ٣٠ سم. ازهاره وردية اللون. الياف اوراقه متينة تستعمل في صناعة الخصر والحبال || ازهاره يستمر من حزيران الى تشرين الثاني.

٧٧٩٤ - حَرْق سَرْكَدِيْب ، دَنْق سَرْكَدِيْب

Sansevieria zeylanica (S). Sansavière de Ceylan (F). نوع من الحرق. اوراقه عصفية الشكل مرتفعة الجوانب طولها من ٣٠ الى ٩٠ سم. نصلها الى الخضار البحري يعلوه تمصيب عريض بحيل الخضار الزاهي || شراخه

٧٨١٤ - حُرْمَلَة - *Sarcostemma viminale* (S).
Sarcostemma (F). *Sarcostemma* (E). *Fleische kranz* (D). *Sarcostemma* (I).
 جنبه طيبة برية معمرة صغيرة القدر فرعاء دقيقة الافنان من فصيلة الصقلابيات . منبها البلاد الحارة . يستخرج من ساقها عصارة لينة لزجة كانت تستعمل لتسهيل المعدة ولتطهير الامعاء .

٧٨١٥ - حُرْمُوس ، بُوطُس - *Bothus* (S).
Bothe (F). *Brill* (E).
 جنس اسماك بحرية بيوضة من فصيلة الحرموسيات . اعطانها بعض بحار البلاد المعتدلة الحرارة || انواعها المعروفة ثلاثة . اجسامها بيضية الشكل ، مبطلة الجرم ، ماسة القشار . صفحاتها اليمنى غبراء اللون ، سمراء النقط المتساوية التوزيع صفحاتها اليسرى سمراء اللون ، متباينة الرقشة || عيونها متقاربة ناشزة . زعانفها الظهرية والشرجية تمتد حتى قاعدة الذيل || لحونها جيدة الصنف مرغوب فيها .
 اشهر انواعها ، حرموسة المتوسط .

٧٨١٦ - حُرْمُوسَة الْمُتَوَسِّط * ، بُوطُس الْمُتَوَسِّط
Bothus rhombus, *Scophthalmus rhombus* (S).
Bothe de la Méditerranée, *Barbue* (F). *Peart*, *Lug-aleaf* (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة الحرموسيات ورتبة الملساوات . اعطانها بعض اقاليم البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي وبحر الشمال || مسرحها اساطم النفاق . قوتها الاسماك الصغيرة والديدان || جسمها شبه بيضي الشكل ، مبطط الجرم ، يطول نحو ٨٠ سم . ويعرض نحو ٥٥ سم . تتميز بالاستلقاء على الجانب الايمن مما يجعل عينيها في الصفحة اليسرى من الرأس اي عكس ما تتحلل به اسماك فصيلة جانبيات العموم . ثوبها في الصفحة اليسرى الى الغبرة تملوها رقشة يتراكب فيها الاسمر والاصفر والاحمر تمتد الى الرأس والزعانف . صفحتها اليمنى بيضاء اللون ، سمراء النقط المتجانسة المتساوية التوزيع || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

٧٨١٧ - حُرْمُوسِيَّات - *Bothidae* (S).
Bothidés (F). *Bothidae* (E).
 فصيلة اسماك بحرية من الملساوات . اجناسها وانواعها قليلة العدد . اعطانها بعض بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . مسرحها الاساطم البحرية || اسماكها تتميز بالاستلقاء على الجانب الايمن مما يجعل عيونها في الصفحة اليسرى من الرأس اي عكس ما تتحلل به اسماك فصيلة جانبيات العموم .
 اشهر اجناسها الحرموس وسمك الترس .

٧٨١٨ - حَرَّة * - *Diploaxis harra* (S). *Diploaxis* (F).
Stink-weed (E). *Rampe*, *Stinkrampe* (D). *Diploaxis* (I).
 عشبة برية حولية طيبة من فصيلة الصليبيات . اعطانها مختلف مناطق حوض البحر المتوسط . اوراقها حريفة ، ازهارها صفراء اللون .

٧٨١٩ - حَرُور - *Vent chaud de la nuit*
 الريح الحارة بالليل .

٧٨٠٦ - حُرْمَةُ الْمَنْزِل (F). *Inviolabilité du domicile* (F). *Inviolability of domicile* (E).
 حق مكتسب لكل فرد يمكنه من وصد باب منزله في وجه اي شخص كان الا بامر خاص من النيابة العامة .

٧٨٠٧ - حُرْمِدَة أَكَّارَة * - *Arctia villica* (S).
Arctia fermière, *Ecaïlle fermière* (F).
 حشرة من فصيلة الحرمديات فراشها متوسطة القد سمراء الرأس والصدر ، حنطية البطن . مبقجة الرواشن تظهر من حزيران الى تموز . يرقها مستندقة الشكل ، سمراء اللون . كثيفة اللمب الحنطي . تركب النباتات العشبية من اي نوع كانت . قوتها الاوراق الفتية . خادرتها تبث ضمن صلجة جوزية اللون ، خاوية الجباك .

٧٨٠٨ - حُرْمِدَة سَمُورِيَّة * - *Arctia caja* (S).
Arctie caja, *Ecaïlle martre* (F). *Arctia caja* (E). *Brauner Bär* (D).
 حشرة من فصيلة الحرمديات فراشها متوسطة القد ، حنطية الرأس والصدر ، برتقالية الجسم ، مجزعة الرواشن الامامية مبقجة الخلفية . يرقها كثيفة اللمب ، ثوبها الى السمرة الزيتونية . قوتها الاوراق الفتية . اخصها خلب الكرم . جيلها الحولي واحد . خادرتها تبث ضمن صلجة خاوية الجباك ، غبراء اللون .

٧٨٠٩ - حُرْمِدِيَّات - *Arctiidae* (S).
Arctidés (F). *Tiger moths* (E). *Bärenspinner* (D).
 فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة . انواعها المعروفة زهاء ٥٠٠٠ منتشرة في جميع اصقاع العالم . فراشاتها قصيرة القد ملونة الرواشن . يرقها هلبية الجسم . خادراتها صلجية البيات . جميعها وحيدة الجيل الحولي .

٧٨١٠ - حُرْمَسَة - *Ecobuage* (F). *Burning* (E).
 هي حرق اعشاب الحقل لتسهيل زراعته .

٧٨١١ - حَرْمَل * ، غَلَقَة الذئب
Peganum harmala (S). *Pégane*, *Harmale* (F). *Harmal Wild rue*, *Syrian rue* (E). *Gemine syrischer aute*, *Wild raute* (D). *Ruta della Siria*, *Ruta salvatica* (I).
 جنس نباتات عشبية طيبة برية مدادة من فصيلة السذابيات . انواعه المعروفة قليلة جميعها من نباتات المناطق الحارة الرملية القاحلة || اوراقه معنقة متعاقبة نصلها مفروض الصفحة المزجة ، مستطيل الزناد . ازهاره فردية التجميع يكثر فيها اللون الابيض . وهو نبات كرية الرائحة بزوره طيبة مرة الطعم طامئة وطاردة للدود تحوي عنصرين شبه قلويين : الحرملين والحرمين *Harmaline et Harmine* .

٧٨١٢ - حَرْمَل أَيْض * ، ثُوم ذَهَبِي
Allium moly (S). *Ail doré*, *Moly* (F). *Moly*, *Yellow garlic* (E). *Goldlauch*, *Gelbes moly* (D). *Molio*, *Aglio dorato* (I).
 نوع من الثوم البري والزييني . اوراقه دقيقة مستطيلة . نوره مظلية القلب ترتكز على شمراخ اجوف مستدق . ازهاره ذهبية اللون جميلة الشكل يراوح عددها من ٣٠ الى ٤٠ زهرة .

٧٨١٣ - حَرْمَل الْجَبَل - *Rue de montagne* (F).
Mountain rue (E).
 هو سذاب البر ، اطلبه .



حرمدة اكارة



حرمدة سمورية



حرمل



حرمل ابيض



حرموسة المتوسط



حرة



حريت



حريش البحر



حريشة (زهرة وورقة)



حزاز الصخر

البلابيات . مهدا بعض المناطق الاستوائية الافريقية والاسيوية || ساقها مشوكة فرعاء تطول من ٥ الى ٦ امتار . اشواكها كبيرة محجنة كاشواك الورد . اوراقها معنقة ، كبيرة ، قلبية الشكل . نصالها ملسة ، لماعة ، شديدة الخضار الاليس . ازهارها كبيرة ، انبوية التويج الذي يطول نحو ١٥ سم . قطرها من ١٢ الى ١٥ سم . تنفجر في الليل وتنطبق في النهار . لونها الى البياض العاجي || عرفها فواح مستحب || تنويرها يستمر طوال شهري تموز وآب .

٧٨٣٤ - حَرِيْفُ الْأُمُونِيَاك ، حَرِيْفُ النَّشَادِر ،
كروء أمونياك
Crud Ammoniac

مسحوق اسود اللون مصدرة رواسب صناعة غاز الانارة . وهو سماد ازوتي يحوي من ٢ الى ١٢ ٪ من الازوت الامونيائي . غير انه كثير السموم التي تقضي على النبات لذلك يحسن نثره على التربة قبل زراعتها بثانية او عشرة اسابيع || استعمله ينظف التربة من جميع الاعشاب .

٧٨٣٥ - حَرِيْقِي ،
Ortie (F). Stinging nettle (E).
هو القراص ، اطلبه .

٧٨٣٦ - حُرْمَلَّة
« شجرة مثل الرمان الصغيرة تنشق عن الين قطن فتحشى به الخاد فتكون ناعمة جداً وخفيفة (اللسان) .

٧٨٣٧ - حَزَّ
Entaille (F). Notch (E).
الحز هو الجرح المصطنع في لحاء الشجر وقد يكون تحت الفصن او فوقه وقبل البرعمة او بعدها وذلك للحد من نشاط العضو اذا استبقه ولزيادة نموه اذا لحقه .

٧٨٣٨ - حَزَّآ
Aneth (F). Dill (E).
هو الشبث ، اطلبه .

٧٨٣٩ - حَزَّآة
نبت بالبادية يشبه الكرفس الا انه اعرض ورقاً منه . (اللسان) .

٧٨٤٠ - حَزَّآر ،
Serin des Canaries (F). Canary (E).
اطلب كنار .

٧٨٤١ - حَزَّاز ، كَشَّةُ الْعَجُوز
Muscus (S).
Lichen (F).
جنس نباتات دنيا من الاشنيات تعيش في الاماكن الرطبة الظليلة على الصخور والحجارة وقشور الشجر...

٧٨٤٢ - حَزَّازُ الصَّخْرِ* ، شَيْبَةُ الْعَجُوز
Usnea barbata (S). Lichen fleuri, Usnée barbu (F).
Flowering moss, Necklace moss, Tree hair (E). Gemeine bartflechte, Baumbart (D). Lichen fiorito (I).
نوع من الحزاز ينمو على الصخور والاشجار .

٧٨٤٣ - حَزَّآة
Dartre (F). Scurf (E).
هي القوبة مرض جلدي يسقط الشعر .

٧٨٤٤ - حَزَّآزِي
Lichéneux (F). Lichenous (E).
نعت وصفي يطلق على ما هو شبيه بالحزاز .

٧٨٤٥ - حَزَّآزِيَّات
Ulvaceae (S).
Ulvacées (F). Ulvaceae (E).
فصيلة نباتية من مرتبة الخفيات الخضراء ورتبة الالغ

٧٨٢٠ - حَرِيْت* ، حَرِيْد

Scarus harid (S). Scare harid, Girelle (F). Scarus harid, Parrot-fish (E).

سمكة بحرية من بنات مصقار طولها يراوح من ٢٥ الى ٤٠ سم . اعطانها بحار البلاد المعتدلة . يكثر وجودها في البحر المتوسط . ثوبها متراكب الالوان الزاهية . يقال ان لحمها سام في بعض فصول السنة وذلك عندما ترعى نواصي المرجان .

٧٨٢١ - حُرِّيَّةُ التَّبَادُل
Libre échange (F).
Free trade (E).

اسلوب او نظام اقتصادي مؤداه ازالة المكوس الجمركية واطلاق حرية التجارة .

٧٨٢٢ - حَرِير ، إِسْرِيْسَم
Soie (F). Silk (E).
هو الخيط الذي ينسجه دود القز .

٧٨٢٣ - حَرِير خَتَام
Soie grège (F). Raw of silk (E).
هو الحرير المحلول من الصلجة .

٧٨٢٤ - حَرِير صِنَاعِي
Soie artificielle (F).
Artificial silk (E).
هو الحرير المستخرج من الالياف والخشب .

٧٨٢٥ - حَرِير طَبِيعِي
Soie naturelle (F).
Natural silk (E).
هو الحرير الناجم عن فيالج دود القز ويسمى حرير القز .

٧٨٢٦ - حَرِير نَبَاتِي
Soie végétale (F).
Vegetable silk (E).
هو الحرير المصنوع من تيل بعض النباتات .

٧٨٢٧ - حُرْبَرَة
Calorie
الحربة او السعرة هي الوحدة الحرارية .

٧٨٢٨ - حَرِيْرِيَّة
Séricigène (F). Sericigenous (E).
هي كل فراشة يفرز اسروعا حريراً كدود القز .

٧٨٢٩ - حَرِيْسَة ، زَرْيَبَة الطَيْر
Parquet d'élevage (F). Stock-still (E).
مكان موشع عليه تربي فيه الطيور الداجنة كالدجاج والبط .. ج حرائس . راجع مدجنة .

٧٨٣٠ - حَرِيْش
Scolopendre (F). Scolopendra (E).
دويبة مبدولة مشهورة بام اربع واربعين .

٧٨٣١ - حَرِيْش
من اسماء الكركدن .

٧٨٣٢ - حَرِيْشُ الْبَحْرِ* ، كَرْكَدَنُ الْبَحْرِ،
قُوقِي
Monodon monoceros (S).
Narval, Licorne de mer (F). Narwhal (E).

حيوان بحري لبون وحيد الجنس والنوع من رتبة الحيتان كبير الجثة طوله نحو اربعة امتار . ظهره عاظم الزعانف . رأسه مستدير افطس . نبيه العلوي الايسر مستطيل الشكل كالقرن المستقيم ، طوله نحو ٢٠٠ سم . وقطر انتشابه ٢٠ || موطنه البحار القطبية الشمالية .

٧٨٣٣ - حُرْيَشَة*
Calonyction aculeatum (S).
Calonyction épineux (F).
جنبه عارشة معمرة وحيدة الجنس والنوع من فصيلة

٧٨٥٥ - حُزْنَبَلِيَّات Achnaceae (S).
Achnacées (F). Achnaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين العديدة القعالات انواعها
المعروفة ١٤٠ مهددا البلاد الحارة . جميعها اشجار
وشجيرات مرطاة . اوراقها بسيطة جلدية متعاقبة . ازهارها
مختلف الارتكاز والتجميع . ازهارها خماسية التركيب
زاهية الالوان .

٧٨٥٦ - حُزُونَة Asperités du sol (F).
Asperity, Roughness (E).
الحزونة غلاظة الارض وشدة خشونتها .

٧٨٥٧ - حُزَيْرَان Jun (F). June (E).
يعرف أيضاً بيونيو . الشهر السادس من السنة الشمسية .
وهو من شهور الربيع . مدته ثلاثون يوماً . في اواخر
العقد الثاني منه يحصل الامتلاء الاكبر فيبلغ النهار
اقصى طوله والليل غاية قصره . وفي العقد الثالث تبتدى
السمائم بالهبوب وهي احد وخسون يوماً .

تقويمه الزراعي : اعماله الزراعيه عديدة ، اخصها :
١ - في الزراعات العامة الموسمية : العناية بمزق القطن
وريه ومكافحة حشرات . عزق التبغ وكه وتخليبه .
متابعة اسقاء التبغ الفيرجيني والتنيك . متابعة سصاد
الخططة وتكديسها ودراسة قشها للتبن .

٢ - في الاشجار المثمرة : المداومة على مكافحة دودة
الشمر وجميع الحشرات الاخرى التي تتركب الاشجار .
يستحسن مد الاشجار الكثيرة الحمل ببعض الاسمدة
الكماوية السريعة التمثيل . المباشرة بوضع المساند حيث
تدعو الحاجة خوفاً من انمراق الاغصان والافئاد الكثيرة
الحمل . متابعة الاسقاء بدون تحفظ لانساه من الزم
ضروريات ثمار التفاح في هذا الوقت . المباشرة بالتطعيم
الرقمي في اللوزيات .

٣ - في الحمضيات : بدء مكافحة جرب الليمون . العناية
الكلية بالري . تفقد حالة الاشجار لمعرفة حاجتها .
الاوراق الملتفة تتطلب المزيد من البوتاس . والافئان
اليابسة تتطلب السورفسفات . اما الاعبال فيستوجب
المزيد من عنصري البوتاس والسورفسفات . وربما
كانت التربة بحاجة الى بعض الكلس .

٤ - في الموز : المباشرة بتوزيع الاسمدة الكماوية
الكاملة التركيب الغنية بعنصر البوتاس . عزق التربة
وتعشيبها وريها .

٥ - في الكرمة : متابعة استمال الفواطير الفعالة للقضاء
على الارمداد والميلديو حيث تدعو الحاجة .

٦ - في البقول والزهور : متابعة الاعتناء بجميع البقول
والزرايع الخضريه مع مكافحة آفاتهما . تسميد الزهور
وعزقها وريها ومكافحة اوصامها وحشراتهما .

٧٨٥٨ - حَسَّ ، حَصَّ Champelure (F).
Frost-bite (E).

هو استراق الافئان الفتية في الاشجار المثمرة والكرمة
بتأثير الجلد . يقال حس او حص الجليد النبات . احرقه .

٧٨٥٩ - حِسَاب Compte (F). Reckoning (E).
هو البيان التفصيلي بالارقام .

اجناسها وانواعها عديدة تعيش في المياه العذبة والبحرية
وعلى الصخور الرطبة وجذوع الاشجار . مشرتها سوية
الساكة في جميع اجزائها . تكاثرها بوغي . بوغها رباعي
الاهداب الاهزازية .

٧٨٤٦ - حِزَام مُشْتَعِل Pyrosphère (F).
Pyrosphere (E).

الحزام المشتعل او الغلاف الارضي المائع ، طبقة من الكرة
الارضية تفصل بين النواة المركزية الثقيلة المعروفة بنواة
الثقل والغلاف السطحي اليابس . راجع سيمه وسيل .

٧٨٤٧ - حَزَّة Quarre
جرح يصطنع في لحاء جذوع الاشجار الصنوبرية لاستحلاب
المادة الراتنجية .

٧٨٤٨ - حَزَم ، رَزَم Engerber (F). To sheaf (E).
جمع الشيء وشده برباط .

٧٨٤٩ - حُزَم خَشَبِيَّة Faisceaux ligneux, F. du bois (F).
Woody bundles (E).

مجموعة انابيب دقيقة مستطيلة مخصصة لنقل النسغ الباهل
الى الاوراق عبر الجذع والاغصان والافئان .

٧٨٥٠ - حُزَم لَحَائِيَّة Faisceaux du liber (F).
Phloem bundles (E).

مجموعة انابيب دقيقة مستطيلة مخصصة لنقل النسغ الكامل .
٧٨٥١ - حُزَم وَعَائِيَّة Faisceaux vasculaires (F).
Vascular bundles (E).

مجموعة انابيب دقيقة مخصصة لنقل النسغ بين اللحاء
والشكير .
٧٨٥٢ - حُزْمِي ، حُزْمِي Fasciculé (F).
Fasciculate (E).

٧٨٥٣ - حُزْنَبَل * ، عُبُون التمر Ochna (S). Ochna, Ochne (F). Ochna (E). Ockna (D).
Ochna (I).

جنس نباتات برية وزينية من فصيلة الحزنيليات .
انواعها عديدة جميعها اشجار وشجيرات مرطاة اللحاء . اوراقها
متعاقبة ، كاملة ، اذنية ، لمساء النصل المنشاري الحافة .
ازهارها عتقودي التجميع اعطي وتاجي الارتكاز . ازهارها
زرق او بيض . ثمارها عنبة غير مأكولة .

٧٨٥٤ - حُزْنَبَل المَاء * ، حُزْنَبَل الثغري Myriophyllum spicatum (S). Myriophylle à épi, Vo-
lant d'eau (F). Spiked myriophyllum, Water milfoil
(E). Ahriges tausendblau (D). Millefillo, Millefoglio
spigato (I).

جنس نباتات عشبية مائية من فصيلة شبه الريشيات .
اوراقها ريشية متعاقبة ، ازهارها سنبل التجميع .
ازهارها صغيرة القد بحيلة الشكل . ثمارها رباعية الفلق
الصلبة القشور || انواعه المعروفة ١٥ منتشرة في جميع
الاصقاع العالمية جميعها من النباتات المائية التي تكثر
في المناطق وتعيش في الاحواض والاكواريوم وتستعمل
في الطب كفضادة للالتهابات والاورام .



حزنبيل



حزنبيل الماء



حسارة



حساس



حساسة



حساسكة



حسب



حُسْرَم

٧٨٦٩ - حَسَاكَة *

Polyacanthus (S).

Polyacanthé (F).

جنس اسماك مثقبة من فصيلة الحساكيات. انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها تمتد من الهند الى ماليزيا تعيش في المناطق والبحيرات || اجسامها شبه اهليلجية الشكل تطول من ٣٠ الى ٦٠ سم. رؤوسها كبيرة، مدببة الاخطام صغيرة الاشداق. عيونها ماسحة. تتميز بزعانفها الظهرية والذيلية المجهزة بمناخس ذرية. زعانفها الشرجية تمتد من الخوض الى الذيل. الخوضية صغيرة، تنشب في طرف كل منها حسكة لينة مستطيلة. اثوابها الى الشقفة الفضية المواج تملوها جدد سمراء خضراء متفاوتة الطول والعرض || لحومها متوسطة الصنف، كثيرة الحسك.

٧٨٧٠ - حَسَاكِيَّات *

Polyacanthidae (S).

Polyacanthidés (F). Polyacanthidae (E).

فصيلة اسماك من شائكات الزعانف البلعوميات التبية. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد، اعطائها تمتد من الهند الى جزر الزايج. تألف المناطق والبحيرات والانهر الراكدة المياه || اجسامها متباينة الاشكال والحجوم. تتميز بزعانفها المجهزة بمناخس مستطيلة. اثوابها تهريق السرة في مواضع معينة بين الاعشاب المائية حيث تقوم الذكور على حراستها الى ان يتم النقف، اي نحو ١٢ يوماً || اشهر اجناسها الحساكة والغورامي.

٧٨٧١ - حَسَب *

Panicum verticillatum, Setaria verticillata (S). Panicum verticillatum, Setaria verticillata (F). Burr-grass, Panic grass (E). Wirtelhirse (D). Panico aspro, Panizzo, Fieno stellino (I).

نبات عشبي بري كلالتي من فصيلة النجيليات يعلو من ٤٠ الى ٧٠ سم. اشطاؤه من ٢ الى ٥. سوقه نحيلة، عصفه مستقيم النصل الضيق السناني الشكل. ازهاره سنبل التجميع، سبلته مستدقة مستطيلة.

٧٨٧٢ - حَسَدَلِيَّات *

Oligoneopteres (F).

Oligoneoptera (E).

شعبة حشرات من طائفة الحنجات اصلاً. تشمل خمس طبقات واحدى عشرة رتبة ونحو ٤٠٠ فصيلة وما لا يقل عن ٥٥٠٠٠٠ جنس ونوع || اما طبقاتها الخمس فهي غديات الجناح وعصبيات الجناح وسدنيات الجناح وعديمات الجناح وغشائيات الجناح || ورتبها تعرف بنمذية الاجنحة وسادات الاجنحة وشبكيات الاجنحة وشارفات الاجنحة وسادات الاجنحة وجلونيات الاجنحة وحرشغية الاجنحة وغشائية الاجنحة وغشائية الاجنحة المحصورة وذات الجناحين والقذانيات.

٧٨٧٣ - حُسْرَم *

Muar (F). To moult (E).

حسرت الطير: سقط ريشها. وتحسر الطير: اسقط ريشه. وانحسرت الطير: خرجت من الريش العتيق الى الحديث.

٧٨٧٤ - حُسْرَم *, حُرُور, أَبُوعَيْن, أَبُور

Priacanthus (S). Priacanthé (F).

Catalufa, Bigeye (E).

جنس اسماك من فصيلة الفريخيات. انواعه عديدة جميعها متوسطة القد، مفلطحة الجسم، بارزة العين، كبيرة الزعنفة الظهرية، مستديرة الفم، سوية الثوب، زاهية اللون || اعطائها بحار البلاد الحارة والاستوائية.

٧٨٦٠ - حِسَاب

Calcul (F). Calculation (E).

هو الطريقة المثبتة لمعرفة العدد الناتج عن العمل المطلوب. وهو اساس جميع العلوم الرياضية. دراسته ترتكز على القواعد الاربع الاصلية المعروفة بالجمع والطرح والضرب والقسمة.

٧٨٦١ - حِسَاب الاحتمالات

Calcul des probabilités (F). Probability calculus (E).

٧٨٦٢ - حِسَاب التفاضل, حِسَاب التفاضل

Calcul différentiel, Calcul infinitésimal (F). Differential calculus (E).

٧٨٦٣ - حِسَاب المثلثات

Trigonométrie (F).

Trigonometry (E).

٧٨٦٤ - حَسَارَة *, قُرْدُمَانَا

Cardamina amara (S). Cresson amer, Cardamine amère (F). Bitter-cress, Large bitter-cress (E). Bitteres schaumkraut, Bittere kresse (D). Crescione amare, Cardamina amara (I).

نبات عشبي بري من الصناب وفصيلة الصليبيات. يستعمل في بعض المستحضرات الطبية ومن الناس من استلذقه وطبا. ج. حَسَار || بزوره طيبة وهي دقيقة مستطيلة صفراء اللون مرة الطعم حريفة تنقي الصدر وتقيد الربو والسعال.

٧٨٦٥ - حُسَّاس *, هِف, هَاكِبَا, قَشَقُوش

Atherina (S). Athérine (F). Silverside, Sand smelt (E).

جنس اسماك صغيرة القد من فصيلة البوريات ورتبة العظميات الشائكات الزعانف. انواعها عديدة جميعها دقيقة رقيقة، فضية اللون، مستحبة الطعم. تألف البحار والانهار تعيش قرب الشطوط || واحدتها حساسة وهفة وهازبابة وقشقوشة.

٧٨٦٦ - حُسَّاس المَتَوَسِّط

Athérine de la Méditerranée (F).

سمكة بحرية صغيرة الجرم تدعى القشقوش، احلها.

٧٨٦٧ - حَسَّاسَة *, مُسْتَحَبَّة, مُخْتَشِمَة,

مُخْتَشِمَة, خَجُولَة

Mimosa pudica (S). Sensitiva pudique, Mimose pudique (F). Sensitiva plant, Humble plant (E). Schamhafte sinnpflanze, Sinnpflanze (D). Erba mimosa, Sensitiva (I).

عشبة معمرة برية وزينية من فصيلة القرنيات. ساقها نحيلة، فروعهما دقيقة لونها الى البهوية. تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم. اوراقها مركبة ريشية. ازهارها رؤسية وردية أو حمراء اللون || تزرع لغرابتها وفوط حساسيتها. وريقاتها ينطبق بعضها على بعض من اللمس.

٧٨٦٨ - حُسَّاسِيَّات *

Atherinidae (S).

Atherinidés (F). Atherinidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من العظميات شائكات الزعانف. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد. معظمها من الاسماك اليمية التي لا تقترب من الشطوط الا في بعض فصول السنة || اجسامها صغيرة وشمية الشكل تطول من ١٠ الى ٢٠ سم. تتميز باثوابها الفضية المواج ويعد انتظام زعانفها الظهرية الاولى التي يراوح عدد شعاعها من ٦ الى ٩ || اشهر اجناسها الحساس، القشقوش.

٧٨٨٢ - حُسْل
Nerprun vert (F).
Common buckthorn (E). هو النبق المسهل ، اطلبه .

٧٨٨٣ - حُسْلَكَة
Drupe (F).
Drupe, Stone-fruit (E).
كل ثمرة لحمية ذات نواة كالمشمشة يكون فيها السوذي لحمي التركيب ويكون الغلاف الداخلي الذي يمتلئ بالبزة قاسياً صلباً كما في عجمة المشمش والخوخ والزيتون . والحسلة تدعى أيضاً نووية ، اطلبها .

٧٨٨٤ - حُسْم
Mamelles des carnassiers (F).
Udders of carnivora (E).
الحسْم هي اطاء السباع (ابن الاعرابي، التاج) .

٧٨٨٥ - حُسُون * ، حُسُونِي ، نَقَّار الشوك
Fringilla carduelis (S). Chardonneret (F). Gold-finch siskin (E). Erlenzsig (D).
عصفور غريد من فصيلة الشرشوريات . صغير القد ، طوله نحو ١٥ سم . جميل الالوان الزاهية المتراكبة فيه الاحمر والاصفر والابيض والاسود والازرق والرمادي والاخضر || قوته يزور النباتات البرية اخصها الشوك . يدين عشه في الاشجار الكثيفة الافنان والورق . انثاه تحضن ٥ بيضات من ١٣ الى ١٤ يوماً || يمكن تنغبله مع التففيجي والكعتر والنغر .

٧٨٨٦ - حُسِيَّة
Testicule des oiseaux (F).
Testicle of birds (E).
الغدة التناسلية في ذكور الطير وهما حسيطان تفرزان الكراض .

٧٨٨٧ - حُسِيَّة
Sensualisme (F).
Sensualism (E).
الحسية مذهب فلسفي يقول بان الحس اصل المعرفة .

٧٨٨٨ - حُسَيْف
Bruckenthalia (S).
Bruckenthalie (F).
جنبه معمرة شائكة من فصيلة الخلدنجيات معقودة التعريف العلمي على اسم العلامة « بروكنثال » . مهدا يمتد من الشرق الادنى الى البلقان . ساقها قصيرة فرعاء تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . اوراقها متعاقبة دقيقة تطول نحو ٥ سم . نصالها مدببة شائكة وبين الورقة والتي تليها يوجد اربع اشواك متتابعة ، غليظة ، ذربة الحمة . ازهارها سنبلية التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهارها رباعية التركيب ، وردية اللون ، صغيرة القد ، متدلية || تنويرها يستمر من تموز الى ايلول .

٧٨٨٩ - حُسَيْكَة
Hérisson (F).
Urchin, Hedgehog (E).
هو القنفذ ، اطلبه .

٧٨٩٠ - حُسَيْكَة
Arlata (F).
الحسكة زائدة قرنية التركيب ، صغيرة ، دقيقة ، ذربة ، منفسية الشكل ، تكتنف بعض اعضاء الحشرات .

٧٨٩١ - حُسَيْكَة *
Bidens (S). Bident, Sornet (F).
Black-fellows (E). Nadelkraut (D). Bidente (I).
جنس نباتات جنية برية وتزيينية من فصيلة المركبات . اوراقها متعاقبة مسننة . يزورها حسكية طيبة تستعمل في بعض المستحضرات كحلبة ومعطسة || اشهر انواعه يتبع .

٧٨٧٥ - حُسْرُم شائع * ، حُسْرُور مَبْدُول
Priacanthus hamrur (S). Priacanthus hamrur (F).
Priacanthus hamrur (E).

نوع من الحسرم . سمكة بحرية بيوض . اعطانها تشمل معظم مناطق البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر والخليج العربي . تعتبر من اسماك النقاف المتوسطة الغور . ملجئها الحياتي شرمي حتى الادراك ثم جماعي || جسمها اهليجي الشكل ، مبطط الجرم ، يطول من ١٥ الى ٢٥ سم . ثوبها الى الحمرة السوية يعلوها موج نحاسي اسفع . زعانفها الى الخنطي الاسفع باستثناء الصدريتين فانها الى الحمرة القائمة . رأسها يرمي الشكل ، قصير الخطم الذلق . شدقها قليل الانفراج . فكها متعادلان . اسنانها صغيرة ، ذربة تمتد حتى مؤخر الخنك . عيناها مستديرتان . بارزتان . زعنفتها الظهرية واحدة ، مستطيلة الشكل . زعنفتها الذيلية مقطوعة الطرف || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٧٨٧٦ - حُسَف
حسف الزرع : حصده . وحسف التمر : نقاء من الحسافة . والحسافة هي ما تنثر من التمر القاسد وبقيته قشوره واقاعه . والحسف هو الشوك وقد خصص بشوك الورق .

٧٨٧٧ - حُسْفَلَة *
Acanthurus (S).
Acanthure (F). Acanthurus (E).
سمكة بحرية بيوض من شائكات الزعانف . موطنها يشمل معظم بحار المناطق الحارة || جسمها شبه بيضي الشكل ، مبطط الجرم ، يطول من ١٧ الى ٢٠ سم . رأسها معتدل الحجم ، خطمها محجبي الشكل شدقها شديد الصفر . زعنفتها الظهرية مستطيلة قاطبة ، تقابلها الشرجية وتمائلها طولاً . زعنفتها الذيلية معتدلة الحجم ، قليلة التقعر تتميز بمنحسها العلوي والسفلي || ثوبها الى الربعة الفضية يعقب في الظهر ويزهو في البطن || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٧٨٧٨ - حُسَق
Priva (S). Priva (F).
Velvet Bur (E). Sonderähre (D). Priva (I).
جنس نباتات جذمورية عشبية معمرة برية وتزيينية من سبط الليليات وفصيلة رعي الحمام . جذاميرها مدادة ، سوقها مربعة التضليع تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم . اوراقها متعاقبة ، معنقة ، بيضية ، نصلها اغبر الصفحة العليا اطحل السفلي . ازهارها سنبلية التجميع ، حمراء اللون . منبها البلاد الحارة . اشهر انواعه :

حسق الشيلي Priva laevis (S). Priva lisse (F).
حسق مسنن Priva dentata (S). Priva dentée (F).

٧٨٧٩ - حُسَك * ، حُسْرُس العَجُوز
Tribulus terrestris (S). Tribule terrestre, Croix de Malte (F). Caltrop, Land caltrop (E). Echter bürzel (D). Tribolo, Caccarello (I).
نبات حشبي بري شائك من فصيلة الفرقديات . اوراقه مركبة متعاقبة . ازهاره فردية ابطية عطرية مستحبة العرف . ثماره قابضة مدرة للبول ومطهرة للمجاري البولية .

٧٨٨٠ - حُسَل
Hysope officinale (F).
Common hyssop (E).
هو الزوفا ، اطلبها .

٧٨٨١ - حُسَل
هو واد الضب حين يخرج من البيضة . ج أحسال وحسول .



حسرم شائع



حُسْفَلَة



حسك



حسون



حسكة

٧٩٠١ - حَشَر Son (F). Bran (E).

هو النخالة المتأثية عن اي دقيق كان .

٧٩٠٢ - حَشَرَة Insecte (F). Insect (E).

الحشرات صف حيوانات صغيرة القد من المفصليات القصصيات التنفس . طوائفها وشعبها وطبقاتها ورتبها وفصائلها واجناسها وانواعها تعد بعض مئات الالوف . منها المجنحة ومنها فاقدات الجناح فالمجنحة تحمل زوجاً او زوجين من الاجنحة . ولها ثلاثة ازواج من القوائم . دورتها الحياتية تجتاز عدة مراحل تدعى انسلخات . معظمها يعيش على المواد النباتية وبعضها مفترس او لاحم . وقد وضعنا في الجدول التصنيفي التابع ، وعلى سبيل المعلومات العامة ، جميع طوائف الحشرات المنقرضة والمعاصرة مع شعبها وطبقاتها ورتبها .

٧٩٠٣ - حَشَرَة التَّيْنِ التَّنَجَّانِيَّة Cochenille du figuier (F).

هي قمية التين ، اطلبها .
٧٩٠٤ - حَشَرَة قَشْرِيَّة Céropaste (F).
Ceroplastes (E).

٧٩٠٥ - حَشَرَة قَشْرِيَّة سَوْدَاء Cochenille noire de l'oranger (F).

هي قرمزية البرتقال السوداء ، اطلبها .
٧٩٠٦ - حَشَرَج Cocotier (F). Coco-tree (E).

الحشرج والحشرج هو النارجيل . الواحدة حشرجة .
٧٩٠٧ - حَشَرِيَّات Insectivores (F).

Insectivora (E).

رتبة من الثدييات . اجناسها وانواعها متوسطة العدد تجمعها عشر فصائل تنضم الى ثلاث مراتب ، مرتبة جلديات القوائم ومرتبة الممرغيات ومرتبة عديمات المعرفة || اشهر فصائلها القنفذيات والذبابيات والعلوبينيات والمذليات واليابيات والكوبنويات || جميعها حشرة لاحمة . والمائي منها يقتنص الاسماك الصغيرة والغشريات والدعاصيص .

٧٩٠٨ - حَشَرِيَّات الصَّدَف Entomostracées (F).
Entomostraceae (E).

طائفة حيوانات من القشريات الدنيا .
٧٩٠٩ - حَشَرِيَّة التَّابِير Entomophile (F).

Entomophilous (E).

هي البنته التي لا يتم تأبير زهرها الا بواسطة الحشرات التي تنقل الطلع وتوصله الى المياسم .

٧٩١٠ - حَشَف Tarir (F). To drain, To dry up (E).

حشف واحشف وتحشف الصرع : ارتفع منه اللبن .

٧٩١١ - حَشَف Exosporium

جنس فطور مجهرية من عمارة اللطحانيات وفصيلة الككتنيات . وليسته سطحية الارتكاز شاربة . جربه الكنديية جذمورية قصيرة . كنانده مؤثرة ، عديدة الخلايا ، مخززية الشكل ، مستدقة الطرف || انواعه قليلة اعرفها حشف النخل .

٧٨٩٢ - حُسْبَكَة دَرْيَة Bidens dahlioides (S).

Bident-dahlia (F).

جنية معمرة دغلة . جذورها درنية ، ساقها زياء تعلو من ١٢٠ الى ١٧٠ سم . لسيناتها وردية اللون او بيض . ازهارها فردية التجميع مستطيلة الزناد الشراخي . ازهارها يستمر طوال الحريف .

٧٨٩٣ - حُسْبَكَة كَبِيرَة الزَّهَر Bidens grandiflora (S).

Bident à grandes fleurs (F).

جنية معمرة . ساقها اسطوانية مرطاء تعلو من ١٠٠ الى ١٣٠ سم . اوراقها فردية الانقسام . اقسامها كراوح من ٧ الى ١١ . نصلها مسنن الحافة . ازهارها كبيرة . يزورها ثنائية او رباعية الحسك || ازهارها يستمر من تموز الى آب .

٧٨٩٤ - حُسْبَكَة كَلْخِيَّة الْوَرَق Bidens ferulaefolia (S).

Bident à feuilles de férule (F).

جنية معمرة . ساقها اسطوانية مرطاء تعلو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقها ثنائية الانقسام . لسيناتها صفراء . يزورها ثنائية الحسك || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

٧٨٩٥ - حَسِيلَة Veau (F). Veal (E).

واحدة الحسيل . الحسيل هي اولاد البقر وقيل اولاد البقر الاولي .

٧٨٩٦ - حَش Faucher (F).

راجع احش .
٧٨٩٧ - حَشَاد Poudingue

طبقة من الطوم لاقياسية السمك والانتساع مركبة من مختلف انواع الحصى المتلاصقة المتاسكة الصغيرة الاجرام التي تبدو كأنها رصفت بلياط .

٧٨٩٨ - حَشَافَة Neritopsis (S).

Néritopside (F). Neritopsis (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الحشافيات . انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق المحيط الهندي || اصداقها صغيرة شبه حقبة الشكل ، دقيقة الاعقاب البلوطية ، بيضاء اللون ، مسنجة او موشمة بالاغبر || اجسامها صغيرة ، افواها هلالية الشكل ، ثنائية اللوامس المميونة . اسقاطها كلسية المادة توحد قووة التجويف .

٧٨٩٩ - حَشَافِيَّات Neritopsidae (S).

Néritopsidés (F). Neritopsidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل . اجناسها وانواعها المعروفة المعاصرة قليلة العدد . اعطائها تمتد من المحيط الهندي الى بحار اقيانية وجزر الزابج || اصداقها صغيرة متباينة الاشكال يئلب فيها الشكل الحقي . جميعها بيضاء اللون مسنجة او موشمة او محززة || اعرف اجناسها الحشافة .

٧٩٠٠ - حَشَّاشِي Herbaliste (F).

Herbalist, Dealer in medicinal herbs (E).

الحشاشي هو العارف بالحشائش ومن تعاطى جمعها وتصنيفها ويبيع الطبية منها .



حَشَافَة

طائفة	Sous-Classe	شعبة	Section	طبقة	Super-Ordre	رتبة	Ordre
فائدت الأجنحة	Aptérygotes	كهدليات	Collemboles			كهدليات	1 Collemboles
		خيفانديات	Protoures			خيفانديات	2 Protoures
		هدليات الأذنان	Thysanoures			لاطئات المتك	3 Entotrophes
						ظاهرات المتك	4 Ectotrophes
مجنحات أصلاً	Ptérygotes	سرنجيات	Paléoptères	عفانديات	Paléodictyoptères	لؤلئيات	5 Eupaléodictyoptères
						زوهميات	6 Protohémiptères
						سرماطيات	7 Mégasecoptères
						بافوريات	8 Protéphémères
						جررجيات	9 Plectoptères
						جفانديات	10 Méganisoptères
						رعاشات	11 Odonates
		برقانديات	Polynéoptères	وردانديات	Blattoptéroïdes	سرنانديات	12 Dictyoptères
						صونديات	13 Protoblattoptères
						عففانديات	14 Isoptères
						سلجوجيات	15 Zoraptères
						رنجوسيات	16 Protarthoptères
						لؤلئيات	17 Plécoptères
						إشيانديات	18 Notoptères
						فصديات	19 Phasmoptères
						مستقيمة الأجنحة	20 Orthoptères
						جفانديات	21 Embioptères
						سرعانديات	22 Protélytroptères
						جلدية الأجنحة	23 Dermaptères
						غمدية الأجنحة	24 Coleoptères
						سادلات الأجنحة	25 Mégaloptères
						شبكة الأجنحة	26 Rhaphidioptères
						شارقات الأجنحة	27 Planipennes
						سادنات الأجنحة	28 Mécoptères
						جملونيات الأجنحة	29 Trichoptères
						حوشفيات الأجنحة	30 Lépidoptères
						ذوات الجناحين	31 Diptères
						قدانديات	32 Aphaniptères
						غشائيات الأجنحة	33 Hyménoptères
						ملقونيات الأجنحة	34 Strepsiptères

طائفة	Sous-Classe	شعبة	Section	طبقة	Super-Ordre	رتبة	Ordre
35 Psocoptères	عُكَّيات	Paranéoptères	قُمَلِيَّات	Psocoptéroïdes	قَهَلِيَّات		
36 Mallophages					قَلْدِيَّات		
37 Anoploures					قَمَقَامِيَّات		
38 Thysanoptères	هَدْيِيَّات الجَنَاح	Thysanoptéroïdes	هَدْيِيَّات الأَجْنَحَة				
39 Homoptères	إِصْفِيَّات الجَنَاح	Hémiptéroïdes	مُتَجَانِسَات الأَجْنَحَة				
40 Hétéroptères	مُخْتَلِفَات الأَجْنَحَة						

٧٩١٢ - حَشَف النخل *

Exosporium palmivorum

فطر مجهرى يركب سعوف بعض انواع النخل التزييني فيشومها ويؤذيها || مظهره الخارجي فقط سود تعلو نصل السنعة على صفحتها . تبدو صغيرة مبعثرة ثم تتسع وتنتشر فيبلغ قطرها من ١٠ الى ١٥ مم . وينحرف لونها الى الخنطى تتوسطه نقطة محورية سوداء وتمتلكه حالة عريضة ، حثارها الداخلى اغبر اللون والخارجى أغمق . يكافح باستعمال سائل بورديو او بعض السوائل النحاسية .

٧٩١٣ - حَشَفَة Récif (F). Reef (E).

الصخرة الكبيرة الراكزة في البحر - او في النهر - ج حشاف .

٧٩١٤ - حَشَفَة Chaume (F). Stubble (E).

اصلة الزرع تبقى بعد الحصاد : ج حشاف .

٧٩١٥ - حَشَفَة ، كَمَارَة ، مُلْتَوِيَة

Lantana, Camara (S). Lantane, Lantanier, Camara (F). Lantana (E). Wandelblüte (D). Lantana (I).

جنس نباتات برية وزيينية من فصيلة رعي الحمام . انواعه نحو ٤٠ معظمها جنبات وشجيرات صغيرة القد . اوراقها متقابلة كاملة بسيطة فستقية اللون خشنة الملمس . ازهارها محوري او هامى الارتكاز ، عشكولي التجميع . ازهارها جميلة الشكل عديدة الالوان فيها الابيض والاصفر والليلكي والاحمر والبرتقالي والبنفسجي والازرق || اكثر انواعه برية وزيينية وبعضها طبى يستعمل ضد الحيات والامراض الرئوية || اشهر انواعه الزينية ما يلي .

٧٩١٦ - حَشَفَة الدَمِيك ، كَمَارَة الدَمِيك

Lantana nivea (S). Lantane à fleurs blanches, Camara neigeux (F).

جنبه معمرة تعلو من مترين الى اربعة امتار . ساقها وفروعها رباعية التضلع شائكة . اوراقها جميلة الخضار الزاهي ، بيضيه الشكل ، ذلقة الزام الاخير . ازهارها رؤسية كروية ، لونها بياض الثلج || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

٧٩١٧ - حَشَفَة ثَلَالِيَّة الْوَرَق ، كَمَارَة

Lantana trifolia (S). ثَلَالِيَّة الْوَرَق

Lantane trifolié, Camara trifolié (F).

جنبه معمرة تعلو نحو المتر . فروعها سداسية التضلع ، محاليق ازهارها رباعية . اوراقها بيضيه لسنة مدية غبراء الصلحة السفل . ازهارها سبلية التجميع ليلكية اللون . ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

٧٩١٨ - حَشَفَة سِلْو ، كَمَارَة سِلْو

Lantana sellowiana (S). Lantane de Sellow, Camara de Sellow (F).

جنبه حولية تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم . ساقها اسطوانية . فروعها نحيلة متدلية . اوراقها بيضيه . ازهارها بنفسجية رؤسية نصف كروية || ازهارها صبي .

٧٩١٩ - حَشَفَة عَطْرَة ، كَمَارَة شَائِعَة

Lantana camara (S). Lantane odorant, Camara commun (F).

جنبه معمرة تعلو من متر الى مترين . اوراقها مستطيلة ازهارها سنابل هرمية الشكل تبدو ذهبية اللون ثم برتقالية وتنتهي بالارجواني || ازهارها يستمر من نيسان الى ايلول .

٧٩٢٠ - حَشَفَة قِنَابِيَّة ، كَمَارَة قِنَابِيَّة

Lantana involucrata (S). Lantane involucré, Camara involucré, Lantane à collerette (F).

جنبه معمرة تعلو نحو المتر . ساقها وفروعها مضلعة . اوراقها شبه بيضيه طولها نحو ٣ سم . ازهارها عطرية ، صفراء اللون ، رؤسية التجميع الكروي الشكل يحيط بها قناب ليلكي || ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

٧٩٢١ - حَشَك

حشك البقرة والنعجة والناقة : ترك حلها حتى يجتمع لبنها .

٧٩٢٢ - حَشَلْبَة Culture de fausses perles (F).

الحشلبة تربية اللؤلؤ الصناعية .

٧٩٢٣ - حَشِيب * Pertusaire (F).


جنس حزاز يعيش على الصخور وعلى لحاء سوق الاشجار واغصانها فيجلبها بغشاء رمادي اللون تعلوه بشور عديمة الشكل قائمة .

٧٩٢٤ - حَشِيش Herbes (F). Herbs (E).

جاء في المختص ان الحشيش هو العشب الاخضر واليابس . ومنهم من قال ان الحشيش هو العشب اليابس . ولما كان في المرف الحالى هو العشب الاخضر او الكلاء الاخضر لذلك فانا نعتد الكلمة الشائعة بمعناها الحالى كالدلالة على العشب الاخضر .

٧٩٢٥ - حَشِيش الْفُرس Sorgho d'Alap (F).

هو الدرة الحلبية ، اطلها . Aleppo millet grass (E).



حشَف النخل



حشِيب

٧٩٣٨ - حشيشة البساط
Mollugne (F).
Mollugo (E). هي المغيرة ، اطلبها .

٧٩٣٩ - حشيشة البلور
Ficoïde cristalline (F).
Diamond ficoïdes (E). هي الظهيرة البلورية ، اطلبها .

٧٩٤٠ - حشيشة التين
Draconitium (S).
Draconte (F). Dragon's-wort (E). Drackenwurz (D). Dragonzia (I).

جنس نباتات جذمورية عشوية معمرة من فصيلة الفلقاسيات . انواعه ثلاثة . اوراقها معتقة ، غدية المعاليق المستطيلة ، كبيرة النصل المفصص ، المخرم ، الزاهي الخضار || ضبته مفلقة بكافور ذرب القمة المدببة ، لونه الى الزرقة البنفسجية . انواعه ثلاثة تزرع للتزيين وتكاثر بالبدور والمساقل .

٧٩٤١ - حشيشة الثوم* ، ألياريا

Alliaria officinalis, Sisymbrium alliaria (S). Alliaire, A. officinale, Herbe à l'ail, H. aux jullenne (F). Garlic-wort, Sauce-alone (E). Gemeines knoblauchkraut (D). Alliaria, Erba alliaria (I).

نبات عشبي طبي بري من فصيلة الصليبيات . اوراقه تحمل رائحة الثوم . يكثر في الاماكن الصخرية الظليلة . اوراقه متعاقبة معتقة رحيمة النصل مفردة الحافة . ازهاره عشقودي التجميع تاجي الارتكاز . ازهاره بيض . بزوره صغيرة طعمها لاذع كالحردل كانت تستعمل كضادة للربو . عصارة النبات حامزة وتفيد القروح الخبيثة . اوراقه مضادة للحفر ومنقية للدم ومدرية للبول .

٧٩٤٢ - حشيشة الجاهوس

Buchloë dactyloides (S). Herbe aux bisons (F). Buffalo grass (E). Buffalo gras (D). Erba di bisonte (I). عشبة حولية برية مرعوية من فصيلة النجيليات تكثر في المناطق وعلى ضفاف الانهر .

٧٩٤٣ - حشيشة الجرح

Anthyllide vulnérable (F). Kidney-vetch (E). هي اللوتيا النافعة ، اطلبها .

٧٩٤٤ - حشيشة الجميل
Calochorte (F).
Hair-bell (E). هي الكارفة ، اطلبها .

٧٩٤٥ - حشيشة الحجل
Fritillaire (F).
Fritillary (E). هي العرار من النباتات الزنبقية ، اطلبها .

٧٩٤٦ - حشيشة الحصف* ، ملاح دودي

Reaumuria vermiculata (S). Réaumurie vermiculée, Réaumure vermiculé (F). نوع من الملاح . مجلة معمرة مخشوشة برية طيبة . منبتها بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط || ساقها دقيقة فرعاء تملو نحو ١٦٠ سم . اوراقها متعاقبة ، متقاربة ، غطية النصال الصغيرة القند البحرية اللون . ازهارها خاسية التركيب ، بيضاء اللون || اوراقها وازهارها وثمارها طيبة تقضي على الحصف .

٧٩٤٧ - حشيشة الحفر* ، أريسيموم طبي ، نجبة

Erysimum barbarea, E. cheiranthoides (S). Vélar officinal, Herbe aux chantres, Barbarée, Tor-

٧٩٢٦ - حشيش سكران
Coqueret du Pérou (F).
Cape gooseberry (E). هو حبة البيرو ، اطلبها .

٧٩٢٧ - حشيشة الابرة
Erodion cleutin (F).
Pick-needle (E). هي ابرة العجوز ، اطلبها .

٧٩٢٨ - حشيشة الأسنان
Dentelaire (F).
Toothwort (E). هي الرصاصية ، اطلبها .

٧٩٢٩ - حشيشة آلاغ ، حشيشة النجم ، نجم لامع

Aletris (S). Alétris (F).
Calic-root, Star grass, Ague grass (E). Fieberwurz, Mehlblume (D). Aletris (I).

جنس نباتات عشوية معمرة من فصيلة الزنبقيات . جذورها جذمورية . اوراقها قرصية مستطيلة ثلاثية العروق . ازهارها عشقودي يرتكز على شراخ منتصب مورق . ازهارها انبوية الشكل || مسحوق جذاميرها مر المذاق ينفع الاستسقاء ويدخل في تركيب عدة عقاقير مفيدة || اشهر انواعه ما يتبع .

٧٩٣٠ - حشيشة آلاغ الرمداء

Aletris farinosa (S). Alétris farineuse, A. vrale (F). عشبة معمرة تعلو من ٤٥ الى ٦٠ سم . ازهارها كبيرة القند خلية النصل ، لونها الى الابيض الرمادي . ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

٧٩٣١ - حشيشة آلاغ المذهب

Aletris aurea (S). Alétris dorée (F). عشبة معمرة تعلو من ٤٠ الى ٧٥ سم . ازهارها صغيرة القند خلية النصل لونها الى الذهبي اللامع || ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

٧٩٣٢ - حشيشة الأفاعي
Aparine (F).
Cleavers (E). هي الفاليون الابيض ، اطلبها .

٧٩٣٣ - حشيشة الأفعى
Vipérine commune (F).
Viper's bugloss (E). هي الاخيون المعروف ، اطلبها .

٧٩٣٤ - حشيشة الأوجاع
Verveine officinale (F).
Holy-herb (E). اطلب رعي الحمام المخزفي .

٧٩٣٥ - حشيشة البراغيت
Herbe aux puces (F).
Flea-wort (E). اطلب بز قطلونا .

٧٩٣٦ - حشيشة البروص
Cérinthe petite (F).
Small honey-wort (E). هي لسان العصفور الصغير ، اطلبها .

٧٩٣٧ - حشيشة البركة*

Asprella (S). Asprèle, Asprelle (F). Marsh grass (E). Reisquecke (D). Asprella (I).

جنس نباتات عشوية معمرة من فصيلة النجيليات . انواعه قليلة قريبة الشبه من الشعير . منها البرية والزراعية . تملو من ٦٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها كثيفة التجميع ، عصفية الشكل ، مقوسة . ازهارها سنابل متصببة . سبيلاتها ثنائية الحسك ، ازهارها خفيفة مبهمة .



حشيشة البركة



حشيشة التين



حشيشة الثوم



حشيشة الحصف



حشيشة الحفر



حشيشة الحليب



حشيشة الخفاف



حشيشة الدهن



حشيشة اللود



حشيشة الدُّبَاب



حشيشة الرمد

يكثر في الاماكن الرطبة . اوراقه مركبة متعاقبة . ازهاره هامة صفراء اللون || اوراقه مرة لا تخلو من المنافع الصحية . نقيعه مر المذاق طارد للديدان .

٧٩٥٧ - حَشِيشَةُ الدُّبَابِ *
Houblon (F).
Common hop (E).
هي الجنجل ، اطلبه .

٧٩٥٨ - حَشِيشَةُ الدُّبَابِ * ، سِيلَانِ نَجْمِي ،
عَلْوَكٌ عَدِيمُ السَّاقِ

Silene acaulis (S). Silène acaule (F). Dwarf catchfly, Moss-campion (E). Moosleimkraut (D). Silene spumante, S. intaccata (I).

نبات عشبي نجمي معمر من فصيلة القرنفلية . ينبت برياً في اكثر الاراضي القاحلة . يعلو نحو ١٠ سم . اوراقه جميلة الخضار الزاهي ، مستطيلة الشكل ، طولها من ١ الى ٢ سم . ازهاره وردية او حمراء اللون || يعتبر من النباتات اليخضورية غير انه يخشى تكرار الحش .

٧٩٥٩ - حَشِيشَةُ الدَّهَبِ
Cétérac (F).
Scaly spleenwort (E).
هي الشراق الحرفي نبات من السرخس .

٧٩٦٠ - حَشِيشَةُ الرَّمَالِ
Ammophila (S).
Ammophile, Gourbet, Roseau des sables (F). Bent grass, Marram grass, Mat weed (E). Echter sandhalm (D). Sparto pungente (I).

جنس نباتات برية معمرة من فصيلة النجيليات . انواعه عديدة جميعها جذمورية الجذور المدادة . سوقها قصية منتصبة . اوراقها عصفية الشكل . ازهارها عنقودي هامي . تنبت في الاتربة الرملية وقد يحسن غرسها في كتبان الرمال لانها تثبتها .

٧٩٦١ - حَشِيشَةُ الرَّمَدِ *
Sauvagesia erecta (S). Sauvagesie dressée (F).

نبات جنبي بري طبي معمر من فصيلة البنفسجيات منبته بعض اصقاع افريقية الشالية || ساقها منتصبة زباء اللحم . اوراقها ابيدة ، متعاقبة ، معنقة ، سنانية النصل الكثيف العروق ، الجميل الخضار الزيتي . ازهارها فردية التجميع ، ابطية الارتكاز ، مستطيلة الزناد ، خسية البتلات المفروسة ، فواحة العرف المستعب . ثمارها كعابر تغلف العديد من البزور الصغيرة || اوراقها وازهارها وبزورها تقضي على الرمد وتفيد الصدر .

٧٩٦٢ - حَشِيشَةُ الرَّمَلِ
Arenaria serpyllifolia (S). Arenaire, Sabline serpyllifolia (F). Chickweed, Sandweed, Thyme leaved sandwort (E). Quendel-sandkraut (D). Erba pondina, Renalioia del muri (I).

نوع من الارناريه وهو نبات عشبي بري معمر من القرنفلية . يعيش في الاتربة الرملية . يعلو من ٥ الى ١٥ سم . اوراقه صغيرة متعاقبة جلدية النصل اللسن المدبب . ازهاره صغيرة حمراء اللون .

٧٩٦٣ - حَشِيشَةُ الرِّقَّةِ
Pulmonaria (S).
Pulmonaire (F). Lung-wort (E). Lungenkraut (D). Pulmonaria (I).

جنس اعشاب معمرة من فصيلة/الحشيميات . انواعه نحو ١٥ منها البرية الطبية والزراعية التزيينية . جميعها اعشاب ليفية الجذور ، لحمية السوق الغليظة الزباء . اوراقها متعاقبة حاشية . نصلها رمحي الشكل ، ازغب

telle (F). Treacle mustard, Treacle worm-seed (E). Acker schöterich, Hederich (D). Erisimo (I).
نوع من الاريسيموم وهو نبات عشبي بري طبي معمر من فصيلة الصليبيات . يعلو من ٢٠ الى ٦٠ سم . اوراقه كاملة . ازهاره قليلة العرف لونها الى الصفار المذهب . يستعمل كضاد لداء الحفر .

٧٩٤٨ - حَشِيشَةُ الْحَلْمَةِ
Mouron des champs (F).
Poorman's weather-glass (E).
هي الزغليلية ، اطلبها .

٧٩٤٩ - حَشِيشَةُ الْحَلِيبِ *
Pedilanthus tithymaloides (S). Pédilanthé tithymaloïde (F). Red bird-cactus, Slipper flower (E). Pantoffelstrauch (D). Pedilacchiosa (I).

جنية برية من فصيلة الخنازيريات . اوراقها معنقة متعاقبة نصلها اهليلجي الشكل لحمي الصفحة . ازهارها تاجية الارتكاز ، نورية التجميع ، حمراء اللون . يستخرج منها عصارة لبية لزجة كاوية تدمل البثرة من اللس . تستعمل في بعض المستحضرات الطبية اعصها المسهلة .

٧٩٥٠ - حَشِيشَةُ الْحَمِيِّ
Pyrèthre (F).
Pyrethrum (E).
هي الغريب ، اطلبه .

٧٩٥١ - حَشِيشَةُ الْخُطَّافِ * ، عَشْبَةُ الْبَوَاسِيرِ
Ficaria ranunculoïdes (S). Ficaire, Herbe aux hémorroïdes, Petite éclaire, Petite chélidoine (F). Ficary, Pile-wort (E). Scharbockshahenfuss (D). Ficaria, Erba delle emorroidi (I).

عشبة برية صغيرة القد معمرة من فصيلة الشقيقيات يكثر وجودها في الاماكن الظليلة الرطبة . اوراقها كفية ، شبه مفصصة ، طويلة الزناد . ازهارها فردية صفراء اللون . جذورها غليظة قصيرة نقيعها مضاد للبواسير . اوراقها تفيد السلعة .

٧٩٥٢ - حَشِيشَةُ الْخَنَازِيرِ
Scrofulaire aquatique (F). Water betony (E).
هي خنازيرية المنافع ، اطلبها .

٧٩٥٣ - حَشِيشَةُ الدَّاحِيسِ
Paronique (F).
Paronichia (E).
هي الحربط ، اطلبه .

٧٩٥٤ - حَشِيشَةُ الدُّبِ *
Anthyllide vulnérinaire (F).
Wound-wort (E).
اطلب لوتيا نافعة .

٧٩٥٥ - حَشِيشَةُ الدُّهْنِ * ، حَشِيشَةُ النَّجَّارِينَ
Pinguicula vulgaris (S). Grassette (F). Butter plant, B. wort (E). Butterkraut, Blauesfettkraut (D). Pinguicula, Erba da taglio (I).

عشبة نجمية معمرة من فصيلة الدهنيات . منبها المنافع . اوراقها قرصية لحمية متراكبة . ازهارها جميلة الشكل ، مهازية التويج ، فردية التجميع ، متتابعة الرصف ، مركزة على شمراخ منتصب دقيق || ازهارها واوراقها داملة للجروح ويستخرج منها صباغ اصفر ذو شأن وقيمة .

٧٩٥٦ - حَشِيشَةُ الدُّودِ * ، حَشِيشَةُ الشَّفَاءِ ،
حَشِيشَةُ الْمُلُوكِ

Tanacetum vulgare (S). Tanaisie vulgaire, Barbotine Herbe amère (F). Common tansy, Buttons (E). Rainfarnwucherbflume, Reinföhren (D). Tanaisia comune, Tanacetum, Aniceto (I).

نبات عشبي بري من فصيلة المركبات الشعاعية الزهر .



حشيشة القرعان



حشيشة القزاز



حشيشة القصر الحولية



حشيشة القمر المعمرة



حشيشة القمل الحرجية



حشيشة القنفذ

٧٩٩٩ - حشيشة القمل

Pedicularis (S). Pediculaire (F), Lousewort (E).

جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الخنازيريات. أنواعه نحو ١٠٠. أوراقها مركبة متعاقبة. أزهارها عنقودي. التجميع هامي الارتكاز. أزهارها كبيرة القد. واسم حشيشة القمل يطلق على نباتات مختلفة انحصارها السفيل، اطلبه.

٧٩٩٥ - حشيشة القمل الحرجية*

Pedicularis sylvestris (S). Pediculaire des bois (F). Red-rattle (E).

نوع من حشيشة القمل يكثر وجوده في الاحراج والغابات الظليلة الرطبة. يعلو نحو ٤٠ سم. أزهاره بيضاء اللون.

٧٩٩٦ - حشيشة القمل المنقعية

Pedicularis sylvatica (S). Pediculaire des marais, Herbe aux poux (F), Lousewort, Red rattle, Wood-batony (E), Waldläusekraut (D), Pediculaire, Pidochiosa (I).

نبات طبي قابض يكثر وجوده في المناطق والمراعي والاراضي الرطبة. يعلو نحو ٦٠ سم. أزهاره وردية اللون. تجتنب الماشية لانه يؤذيها.

٧٩٩٧ - حشيشة القناويل

Gnaveille (F). Annual knawel (E).

هي السليرنوس، اطلبه.

٧٩٩٨ - حشيشة القنفذ*

Erinacea pungens (S). Erinacée piquante (F). Hedgehog plant (E). Igelwollblume (D). Erinacea (I).

جنية برية من فصيلة القرنيات الفراشية تتميز بكثرة شوكها اللين المستطيل الاطحل اللون.

٧٩٩٩ - حشيشة القنفذ

Lunaria annua (S). Lunaire annuelle, Médaille... (F).

نبات عشبي بري من فصيلة الصليبيات، يدعى ايضاً حشيشة القمر الحولية، اطلبها.

٦٥٩٩ - حشيشة الكتب

Marrube blanc (F). Common white horehound (E).

هي الفراسيون الابيض، اطلبه.

٨٠٠١ - حشيشة الكيف

Chanvre indien (F). Indian hemp (E).

هي القنب الهندي، اطلبه.

٨٠٠٢ - حشيشة اللبن

Herbe à lait (F). Milk-wort (E).

هي البرلوغان، اطلبه.

٨٠٠٣ - حشيشة اللجأة

Alysse blanche (F). Hoary madwort (E).

هي الاليسم الحقيقي، اطلبه.

٨٠٠٤ - حشيشة الليمون

Andropogon citratus (S). Herba citron (F). Lemon grass (E). Citrongrass (D). Erba di limone (I).

نبات عشبي بري معمر من فصيلة النجيليات. أوراقه عسفية النصل، ليمونية الرائحة، ذكية العرف، تستعمل استعمال الشاي.

٨٠٠٥ - حشيشة المعزى

Podagraire (F). Goat-weed (E).

هي رجل المعزى، اطلبها.

٧٩٨٥ - حشيشة الفتق

Herniaire (F).

Turk's herb (E).

هي النومان، اطلبه.

٧٩٨٦ - حشيشة الفقراء

Herbe au pauvre homme (F). Poor-man's herb (E).

هي الفراسيولة المخزنية، عشبة طيبة.

٧٩٨٧ - حشيشة القرعان*، قبة مخزنية

Petasites officinalis (S). Pétasite officinal, Herbe aux teigneux (F). Bog rhubarb, Butter-bur (E). Echte pestwurz (D). Erba del tignosi (I).

نبات عشبي طبي بري معمر كريحه الرائحة من فصيلة المركبات. جذوره جذمورية مدادة. أوراقه جلدية كبيرة فارشة طولها نحو المتر وعرضها ٦٠ سم. أزهاره مبكارة تظهر قبل الاوراق وهي حمراء اللون يجمعها شراخ غليظ منتصب يعلو نحو المتر.

٧٩٨٨ - حشيشة القط

Herbe aux chats (F). Cat's valerian (E).

هي الناردن المخزني، اطلبه.

٧٩٨٩ - حشيشة القزاق*

Stellaria media (S). Stellaire, Morgeline, Mouron des oiseaux (F). Common chickweed (E). Vogelmiere (D). Stellaria, Paperina, Gallinella (I).

عشبة برية غضة كثيرة الانتشار من فصيلة القرنفليات وسط القلقليات. ساقها فرعاء زغبية منتصب. أوراقها معنقة، زوائد طويلة معنقة. نصلها ازغب يضي الشكل لسن الزام الاخير. أزهارها خماسية التركيب، صغيرة القد، بيضاء اللون. سبالتها عفاية مستطيلة، بتلاتها ثنائية الشعبة، قصيرة. اسديتها مندعمة تحت المبيض. اقلامها ثلاثية. رغب في المواقع المعتدلة الرطوبة تكثر على جوانب الطرقات وبين حجارة الجلول.

٧٩٩٠ - حشيشة القلب

Millepertuis perforé (F). Perfoliate St. John's wort (E).

هي الهيوفايتون المعروف، اطلبه.

٧٩٩١ - حشيشة القمر، قمرية

Lunaria (S). Lunaire (F).

جنس نباتات عشبية حولية او معمرة من فصيلة الصليبيات. أنواعه عديدة منها البرية والزرينية. أزهارها عنقودي التجميع. أزهارها كبيرة القد. أشهر انواعه الزراعية يتبع.

٧٩٩٢ - حشيشة القمر الحولية*، قمرية حولية

Lunaria annua (S). Lunaire annuelle, Monnoyère, Monnaie du pape, Herbe aux écus, Médaille (F). Honesty, Moonwort (E). Mondviole, Stumpfes, Silberblatt (D). Lunaria, Argentina, Monete del Papa (I).

عشبة زينة حولية وحولية تملو من ٣٠ الى ١٠٠ سم. أوراقها بسيطة كبيرة القد قلبية الشكل مسننة الخافة. أزهارها بنفسجية او بيضاء اللون. عرفها ليلي الارجح العطري.

٧٩٩٣ - حشيشة القمر المعمرة*، قمرية

Lunaria rediviva (S).

معمرة

Lunaria vivace (F).

عشبة معمرة تملو من ٥٠ الى ١٣٠ سم. أوراقها معنقة متعاقبة، نصلها زاهي الخضار الاصفر. أزهارها فواحة العرف العطري المستحب، لوها الى الزرقة الموشحة بالابيض.

٨٠١٦ - حَشِيشَةُ الْوَحْلِ *

Limosella (S). Limoselle (F). Mud-wort (E). Sumpfkraut, Winziger schlammiling (D). Limosella (I).
جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الخنازيريات يكثر وجودها في المناطق. أوراقها دوارة الارتكاز مستطيلة. أزهارها صغيرة القد، فردية التجميع، بيضاء اللون أو وردية.

٨٠١٧ - حَشِيشَةُ ذَاتِ الْجَنْبِ

Asclépiade tubéreuse (F). Butterfly weed (E).
هي الصقلاب العسقولي، اطلبه.

٨٠١٨ - حَشِيشَةُ مُبَارَكَةٍ

Benoîte (F).
Herb-bennet (E).
هي الجيوم المبارك، اطلبه.

٨٠١٩ - حَشِيشَةُ مَهْبُولَةٍ

Liseron à feuilles de guimauve (F). Mallow bindweed (E).
هي البلاب الخيزري الورقي، اطلبه.

٨٠٢٠ - حَشِيشِيَّةٌ، عَشْبِيَّةٌ

Herbacé (F).
Herbaceous (E).
نعت تعريفي وصفي يطلق على كل نبات لين النسج، ساقه دون الليفية صلابة.

٨٠٢١ - حَشِيفٌ

Culmigène (F).
Culmigenous (E).
نعت تعريفي يطلق على الفطور والجراثيم التي تعيش وتنمو على الجذام.

٨٠٢٢ - حَشِيفَةٌ

Clitellum (F). Clitellum (E).
الحشيفة حزام غدي الشكل يطوق بعض فتوح الحراطين في زمن التعاقل.

٨٠٢٣ - حَشِينٌ

Brume sèche (F).
Dry fog (E).
الحشين الضباب الناشف.

٨٠٢٤ - حَشِينَةٌ

Stylops (F). Stylops (E).
حشرة من الحشنيات تمتع مكنها في بطون هدييات الاذنان فينقف المكن عن يرقات تعيش طفيلية الى ان تم انسلخاتها وتتحول الى حشرة كاملة.

٨٠٢٥ - حَشِينِيَّاتٌ

Stylopidés (F).
Stylopidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة ملتويات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد اشهرها الحشينة.

٨٠٢٦ - حَصَا الْبَانِ

Romarin (F).
Common rosemary (E).
هو اكليل الجبل نبات عطري من الشفويات.

٨٠٢٧ - حَصَاةٌ، حَصْبَةٌ

Caillou, Galet (F).
Pebble, Small stone, Flint (E).
الحصى صفار الحجارة. يقال ارض محصاة وحصىة وحصىة اي كثيرة الحصى.

٨٠٢٨ - حِصَادٌ، حِزَاكٌ، حَصِيدٌ، حَصِيدَةٌ

Moisson (F). Harvest (E).
هو قطع الزرع الذي استحصد وهو ايضاً اوان قطعه.

٨٠٠٦ - حَشِيشَةُ الْمَلَاعِقِ *، مِلْعَقِيَّةٌ

Cochlearia officinalis (S). Cochléaria officinal, Herbe aux cuillers (F). Scurvy-grass, Spoon-wort (E). Echte löffelkraut (D). Coclearia, Erba a cucchlaino (I).

عشبة طيبة حولية من فصيلة الصليبيات تنبت برية في الاماكن الرطبة وتزرع لفوائدها الطبية العديدة. أوراقها ملعقية الشكل متعاقبة. أزهارها هامة الارتكاز، عنقودية التجميع، بيضاء اللون. أوراقها حاملة الطعم، لاسعة، تعتبر من ارفع الادوية المضادة للحفر وتستعمل ايضاً كمحرضة ومنشطة ومنظفة للدم ومدررة للبول.

٨٠٠٧ - حَشِيشَةُ الْمَلَاكِ *

Archangelica officinalis, Angelica officinalis, Angelica archangelica, Selinum angelica (S). Archangélique, Angélique, A. officinale, Herbe aux anges (F). Archangel, Angelica (E). Angelika, Echte engelwurz (D). Angelica, Archangelica, Angelica domestica (I).

نبات بقلي بري وذراعي من فصيلة الخيميات يعد من الافاوية ومن النباتات الطبية. منه ضروب برية تكثر في الاراضي الجبلية. يستخرج من جذورها مواد طبية مضادة لمسر الهضم. ومنه ضروب زراعية عطرية، وأوراقها مأكولة ويستحضر منها بعض المشروبات النافعة المقيمة.

٨٠٠٨ - حَشِيشَةُ الْمَلَكَةِ

Tanaisie balsamite (F).
Tansy (E).
هي إهلال قسطاً، اطلبه.

٨٠٠٩ - حَشِيشَةُ الْمُلُوكِ

Tanaisie vulgaire (F).
Common tansy (E).
هي حشيشة اللود، اطلبها.

٨٠١٠ - حَشِيشَةُ الْمِنْشَارِ *

Biserrula pelecinus (S). Biserrule, Bisserrule, Pélé-cine, Double scie (F). Hatchet vetch (E). Sägekraut (D). Pelecino (I).

نبات عشبي بري مرعوي صغير القد نحيل الساق من فصيلة القرنيات الفراشية يكثر في المراعي الطبيعية وفي الارض البور. أوراقه منشارية الحافة ثنائية التسنين.

٨٠١١ - حَشِيشَةُ النَّسَاقِ *

Spilanthus oleracea (S). Spilanthus oleracé, Cresson de Para (F). Spilanthus, Para cress (E). Parakesse, Husarenknopf (D). Spilanto, Crescione di Para, Salivaria (I).

عشبة برية طيبة من فصيلة المركبات منبتها البلاد الحارة. يستخرج منها دهن عصري قوي الرائحة حريف الطعم يستعمل في طب الاسنان لتسكين الألم.

٨٠١٢ - حَشِيشَةُ النَّجَّارِينَ

Grassette (F).
Butter-wort (E).
هي حشيشة الدهن، اطلبها.

٨٠١٣ - حَشِيشَةُ النَّحْلِ

Méliste officinale (F).
Lemon-balm (E).
راجع زنجبان.

٨٠١٤ - حَشِيشَةُ النَّزَفِ

Aspilula latifolia (S).
Aspilula, Plante à l'hémorragie (F).

نبات عشبي بري من فصيلة المركبات. منبته جميع الاصقاع الحارة. أوراقه متعاقبة لها بعض المنافع الطبية اخصها نزف الدم الذي تقضي عليه.

٨٠١٥ - حَشِيشَةُ الْمَهْرِ

Népète cataire (F).
Catmint (E).
هي قرطم الهر، اطلبه.



حشيشة الملاعق



حشيشة الملوك



حشيشة المنشار



حشيشة النفاق



حشيشة الوحل

٨٠٤٢ - حصّاب Paver (F). To pave (E).
حصب المكان : رصفه بالحصباء .

٨٠٤٣ - حصّاب Macadamiser (F).
To macadamize (E).
طريقة خاصة لتعبيد الطرقات ترتكز على رصف الحصى .
الحادة الزوايا وحدها لتخديم انكماشها واندماجها .




حصادة

٨٠٤٤ - حصّبة الخنزير، حمرة الخنزير
Rouget, Rougeole du porc, Erysipèle charbon-
neux (F). Measles (E).
مرض جرثومي يصيب الخنازير . مظهره الخارجي يقع
حمر تبدو على الاذن فالصدر فالبطن .

٨٠٤٥ - حصّة Cote, Part (F). Quota, Share (E).
هي النصيب العائد من ذمة مالية .

٨٠٤٦ - حصّة ، سهم ، نصيب ، عصة
Lot (F). Lot, Portion (E).

٨٠٤٧ - حصّة الربح Dividende (F). Dividend (E).
هي الربحة ، اطلبها .



حصادة دارسة

٨٠٤٨ - حصّة الشراكة Mise sociale (F).
Share of capital (E).
هي ما يتوجب على الشريك تقديمه الى الشركة من نقود
او اموال معينة بالذات او معنوية .

٨٠٤٩ - حصّة المشاركة Apport en société
هي المال الذي يقدمه الشريك الى الشركة .

٨٠٥٠ - حصّر Monopole (F). Monopoly (E).
راجع احتكار .

٨٠٥١ - حصّر الأجور Blocage des salaires (F).
Wage freeze (E).

٨٠٥٢ - حصّر الأسعار Blocage des prix (F).
Price freeze (E).

٨٠٥٣ - حصّر الرأسمال Blocage des capitaux (F).
Capital freeze (E).

٨٠٥٤ - حصّرة الحصرية والحصرية : الشح . يقال في الماشية اصابها
الحصرية اذا شح نتاجها . وفي الزروع اذا شحت
محاصيلها .

٨٠٥٥ - حصّرم Verjus (F). Verjuice (E).
الحصرم : أول العنب ما دام اخضر حامضاً .

٨٠٥٦ - حصّفة Pelte (F). Pelt (E).
تريس هلاي الشكل ليني او خشبي التركيب يعلو بعض
الاعضاء النباتية او يؤلف جزءاً منها كما هو الحال في
بعض اجناس الصنوبريات .



حصان البحر

٨٠٥٧ - حصّفي Pelté (F). Peltate (E).
صفة او نمط كل ما هو شبيه بالحصف .

٨٠٥٨ - حصّلاب Géologue (F). Geologist (E).
عالم بالارض وبركبتها .

٨٠٢٩ - حصّاد Faucheur (F). Mower, Reaper (E).
هو الذي يحصد الزرع .

٨٠٣٠ - حصّادة * ، محصد ، محصدّة
Moissonneuse (F). Reaping-machine (E).
آلة تحصد الزرع انواعها عديدة منها البسيطة التي تحصد
الزرع وتلقيه ومنها الرابطة (Moissonneuse-lieuse) التي
تربط الزرع بعد حصده وجمعه غبوطاً .

٨٠٣١ - حصّادة دارسة * ، محصد دارس
Moissonneuse-batteuse (F). Reaper and threshing-
machine (E).

آلة تحصد الزرع وتدرسه فتفصل الحب عن القش وتدفع
به الى الاكياس وتلقي القش على الارض .

٨٠٣٢ - حصّاصة الحصاصية : ما يبقى في الكرم بعد قطفه .

٨٠٣٣ - حصّاف Phrénologiste.
Phrénologue (F). Phrenologist (E).
الخصاف من كان اختصاصه الحصاصية .

٨٠٣٤ - حصّافة Phrénologie (F).
Phrenology (E).
الحصافة علم فراسة سليقة الانسان وقواه العقلية استناداً
الى حقه .

٨٠٣٥ - حصّافي Phrénologique (F).
Phrenological (E).
نعت تعريفني يطلق على كل ما له علاقة بالحصافة اي
بفراسة الدماغ .

٨٠٣٦ - حصّان Etalon (F). Stallion (E).
الذكر من الخيول العراب البالغ الصالح للنزوة .

٨٠٣٧ - حصّان إبليس ، حصّان العباس
Mante religieuse (F). Praying mantis (E).
هو السرعوفة ، اطلبها .

٨٠٣٨ - حصّان البحر * Hippocampus (S).
Hippocampe, Cheval marin (F). Hippocamp,
Sea-horse (E).

جنس اسماك عجيبة الشكل من فصيلة زمارات البحر .
انواعه المعروفة نحو ٣٠ جميعها صغيرة القد تعيش على
الاعشاب البحرية في بحار المناطق الاستوائية والمعتدلة .

٨٠٣٩ - حصّان الجرّ Cheval de trait (F).
Carriage-horse (E).
هو من الخيل الصالح لجر العربات والاثقال .

٨٠٤٠ - حصّان بخاري Cheval-vapeur (F).
Horse-power (E).
وحدة اصطلاحية متفق عليها لتقدير قوة المحركات وهي
القوة اللازمة لرفع ٧٥ كيلو على علو متر واحد في
ثانية واحدة .

٨٠٤١ - حصّافة ، مناعة Immunité (F).
Immunity (E).
قوة في الجسم تدفع عنه الامراض . وقد تكون طبيعية
وتدعى مناعة او تكون اصطناعية بواسطة التلقيح وتدعى
حصانة .

٨٠٧٢ - حَضَار ، نَيْر قِنْطُورُس

Rigel Kentaurus

الحضار ، ويدعى نير قنطورس ورجل قنطورس ، نجم من كوكبة قنطورس مركزه على حافر اليد اليمنى . يعتبر اقرب نجم من الارض اذ يبعد عنها نحو ٤٠٠ ٣٣ مليار كيلومتر .

٨٠٧٣ - حَضَال * Loranthus (S), Loranthe (F).

Loranthus (E), Riemenblume (D), Loranto (I).

جنس نباتات طفيلية معمرة من فصيلة العنبيات . انواعه المعروفة زهاء ١٠٠ معظمها يألف البلاد الحارة . منها نوع يركب الاشجار المشرفة في البلاد المعتدلة الحرارة يدعى بنتومه . ومنها الشيقر والعنم والخزطان والعصار . وكان القدماء يقدسون الحضال ويعتبرونه رمزاً للخلود لانه دائم الخضرة وكانوا يجنونه في مهرجانات يحيونها كل عام . وكان يستعمل في علاج الصرع والسفلس وهو يستعمل الآن ضد ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين . ويستخرج من ثماره مادة رائحة مفيده .

٨٠٧٤ - حَضَالِيَّات Loranthees, Viscées (F).

Loranthaceae (E).

سبط من فصيلة العنبيات (الدبقيات) . انواعه نحو ٣٠٠ جميعها نباتات طفيلية تلتصق قوتها بواسطة براشيتها للماصة التي تثبت في فروع واغصان الاشجار العائلة . اوراقها بسيطة جلدية متقابلة . ازهارها قياسية خشوية .

٨٠٧٥ - حَضْب ، حَضْبُ Serpent mâle (F).

He snake (E).

كل ذكر من الحيات حضب . وقيل هو الذكر الضخم وقيل حارب من الحيات .

٨٠٧٦ - حَضْبِيَّات Ilysiidae (S).

Ilysiidés (F), Ilysiidae (E).

فصيلة حيات سرلودة عديدة الاذى . اجناسها المعروفة ثلاثة وانواعها نحو ١٧ منتشرة في معظم البلاد الحارة والاستوائية . اجسامها شبه اسطوانية الشكل ، تطول من ٨٠ الى ١٠٠ سم . رؤوسها صغيرة ، عديمة الاعناق ، مستديرة الاخطام . عيونها ماسحة . فكوكها مسننة . اذنانها قصيرة ، مستدقة الاطراف . اثوابها لماعة يكثر فيها الاسود والاسود المطوق بالاحمر . قوتها الحشرات والديدان والعظام والفأر .

٨٠٧٧ - حَضْحَضُ Sherardia (S).

Shérardie (F), Sherardia (E).

جنس نباتات عشبية حولية معروية من فصيلة الفويات . انواعه المعروفة قليلة العدد . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا . يكثر وجودها في الاراضي المهملية والمذحاة . سوقها متشعبة فرعاء . اوراقها ضيقة صغيرة . ازهارها صيوانية التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهارها زرقاء اللون .

٨٠٧٨ - حَضْض ، حُطْط ، حُطْط

Suc amer des arbres (F), Bitter juice of trees (E).

الحضض والحطط : عصارة الشجر المرة .

٨٠٧٩ - حُضْض ، عُرْقَد ، أَطَد

Lycium (S), Lyciet (F), Boxthorn (E), Bocksdorn (D), Liclo, Agnatoli (I).

جنس نباتات معمرة من الفصيلة الباذنجانية . انواعه نحو

٨٠٥٩ - حَصَلَة Géologie (F), Geology (E).

هي الجيولوجية علم الارض وتركباتها .

٨٠٦٠ - حَصَلَبِي ، جِيُولُوجِي Géologique (F).

Geological (E).

مختص بعلم الارض وتركباتها .

٨٠٦١ - حَصَلَمَة Pédologie (F), Pedology (E).

هي درس الآتربة الارضية وهي تقسم الى شقين الشق العلمي البحث الذي يبحث في تكوين الآتربة وتطوراتها مع الزمن تحت تأثير العوامل الخارجية . والشق العملي الذي يبحث في ما وصلت اليه هذه التطورات وكيفية استثمارها الزراعي .

٨٠٦٢ - حَصَى المَثَانَة Gravelle (F), Gravel (E).

هي رمل المثانة ، اطلبه .

٨٠٦٣ - حُصْبَة Géode (F).

Geode, Druse (E).

قطعة من الصوان كلوية الشكل ، صغيرة الحجم ، مجوفة مرصوفة الداخل بالبلور الصخري .

٨٠٦٤ - حُصْبَة Cystolithe (F), Cystolith (E).

الحصبة ركيمة من كربونات الكلسيوم تتكون في بعض خلايا الانسجة النباتية احصها في اوراق الانجريات والاقنشيات .

٨٠٦٥ - حَصِيد ، حَصِيدَة Moisson (F).

Harvest (E).

هو الحصاد ، اطلبه .

٨٠٦٦ - حُصَيْصَة

الحصيصة من الفرس ما فوق الاشعر بما اطاف بالخافر .

٨٠٦٧ - حَصِيْفَة Crémaster (F).

Cremaster (E).

الحصيفة العضلة المنوط بها رفع الحصية او التليسة .

٨٠٦٨ - حَصِيل * Pacourinapxis (S).

Pacourine (F).

جنس نباتات عشبية مائية من فصيلة المركبات . انواعه المعروفة قليلة العدد موطنها البلاد الحارة . تعيش على ضفاف مجاري الماء . سوقها اسطوانية منتصبة . اوراقها متعاقبة ، معتقة ، سنانية النصال . ازهارها رؤسي التجميع ، محوري الارتكاز . ازهارها ارجوانية اللون صغيرة القد ، مستطيلة الشكل .

٨٠٦٩ - حَصِيلَة Produit net (F), Clear product (E).

الحصيلة هي الدخل الصافي . ج حصائل .

٨٠٧٠ - حَصِيم Petit cailloux (F), Flint-stones (E).

الحصيم : صغار الحصى .

٨٠٧١ - حَصِيمَة Tubercule (F), Tubercle (E).

هي الدرة البصلية المخلية الشكل وكل بصلة فصية او درنية القرص كسا في بعض انواع التريجن والثوم وما أشبه . ج حصام .



حَصِيل



حَضَال



حُضْض



حُضَضُ أُرُوبِي



حُضَضُ أَفْرِيقِي



حُضَضُ شَاحِب



حُضَضِيَّة

٨٠٨٧ - حُضَضُ صِينِي ، عُرْقُدُ صِينِي

Lycium chinense (S). Lyciet de Chine (F).
جنبه من الحُضَضُ تعلو من متر إلى ثلاثة أمتار ساقها وفروعها قليلة الشوك . أوراقها بيضيه مستطيلة . أزهارها بنفسجية زاهية . أزهارها يستمر من نيسان إلى تشرين .

٨٠٨٨ - حُضَضُ

Couver (F). To incubate (E).
٨٠٨٩ - حُضَضُ ، حُضَضَانَةٌ ، تَرْحِيمُ
Incubation
هو نمو جنين البيض بالحرارة وقد يكون طبيعياً أو صناعياً .

٨٠٩٠ - حُضَضُ صِنَاعِي
Incubation artificielle (F). Artificial incubation (E).
يدعى هكذا عندما تكون الحضنة آلية بواسطة محضنة .

٨٠٩١ - حُضَضُ طَبِيعِي
Incubation naturelle (F). Natural incubation (E).
يدعى هكذا عندما تكون الانثى هي الحاضن كما في الدجاج أو الانثى والذكر كما في معظم الطير أو حرارة الطبيعة كما في الزحافات والحشرات .

٨٠٩٢ - حُضَضَةٌ
Couvain (F). Eggs of bees (F).
هي جماع عُمى ورصع النحل في القرص الواحد أو في جميع أقراص القفير .

٨٠٩٣ - حُضَضَةٌ
Couvée (F). Nest of eggs, Brood covey (E).
جماع البيض الحُضَضُ في آن واحد . وتطلق أيضاً على جميع الميصان المتأتية عن حضنة واحدة .

٨٠٩٤ - حُضَضِيضُ
Sol (F). Ground, Soil (E).
هو التربة الموطوءة بها كان نوعها .

٨٠٩٥ - حُضَضِيَّةٌ ٥
Auricula (S). Auricule (F). Auricula (E).
جنس حيوانات برية من الرخويات معديات الأرجل وفصيلة الحُضَضِيَّاتِ . أنواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض أصقاع البلاد الحارة وأخصها الهند . تسرح بين الأعشاب وتحت الطحالب في المواقع الرطبة || أصدافها أهليلجية مستطيلة قليلة اللوحة الطرية مدببة الاعقاب .

٨٠٩٦ - حُضَضِيَّاتٌ ٥
Auriculidae (S). Auriculidés (F). Auriculidae (E).
فصيلة من الرخويات معديات الأرجل رؤوية . أجناسها وأنواعها المعاصرة قليلة العدد منتشرة في معظم البلاد الحارة والاستوائية . بعضها بحري وبعضها قاذب وبعضها بري . اعراف أجناسها وأشهرها الحُضَضِيَّةُ والملمبوس والكسدولة والكريكة .

٨٠٩٧ - حُطَّابُ
Rabattage (F). Cutting down (E).
هو قطع أغصان وفروع الأشجار الهرمة لتجديد نشاط طاقتها الحيوية .

٨٠٩٨ - حُطَّابُ
Bois (F). Wood (E).
ما اعد من الشجر شرباً للنار .

٨٠٩٩ - حُطَّابُ أَتَمَرُ
Tamaris à manne (F). Manna tree (E).
هو أثل المن ، اطلبه .

٨١٠٠ - حُطَمُ : داء في قوائم الدابة .

٦٠ . جميعها شجيرات وجنيات برية وتزيينية منبها البلاد الحارة . أوراقها كاملة متعاقبة صغيرة القد . أزهارها ابطية الارتكاز ، فردية التجميع فيها البنفسجي والاحمر والاصفر والابيض . ثمارها عنبية || اشهر انواعه التزيينية ما يتبع .

٨٠٨٠ - حُضَضُ أُرُوبِي* ، عُرْقُدُ أُرُوبِي

Lycium europaeum (S). Lyciet d'Europe, Ollnet, Jasmin bâlard, Couronne du Christ (F).
جنبه من الحُضَضُ تعلو من ١٠٠ إلى ٣٠٠ سم . ساقها شائكة . أوراقها ملوئية مستطيلة ، نصلها ناعم البشرة قليل الزغب . أزهارها بنفسجية اللون صغيرة القد . ثمارها الى الحمرة العابقة || أزهارها يستمر من نيسان الى ايلول .

٨٠٨١ - حُضَضُ أَفْرِيقِي* ، عُرْقُدُ أَفْرِيقِي

Lycium afrum (S). Lyciet d'Afrique, Jasmin d'Afrique (F).
جنبه من الحُضَضُ تعلو من ١٠٠ إلى ٢٥٠ سم . أوراقها طحلاء النصل الضيق . أزهارها بنفسجية زاهية عطرية العرف . مذاقاتها زباء الاقلام . ثمارها كرزوية الشكل لوئها الى البنفسجي العابق || أزهارها يستمر من نيسان الى حزيران .

٨٠٨٢ - حُضَضُ الْجَزِيرَةِ ، عُرْقُدُ الْجَزِيرَةِ ، خَوْلَانُ

Lycium arabicum (S). Lyciet d'Arable (F).
جنبه من الحُضَضُ تعلو نحو المتر . ساقها منتصبه قليلة الشوك . فروعها متدلية الاطراف . أوراقها ملوئية جامدة النصل . أزهارها صغيرة القد لوئها الى البياض الوردي يعلو تشويح اصفر . أزهارها يستمر من ايار الى آب .

٨٠٨٣ - حُضَضُ بَرْبَرِي ، عُرْقُدُ بَرْبَرِي

Lycium barbarum (S). Lyciet de Barbarie (E).
شجيرة من الحُضَضُ تعلو من ٣ الى ٤ أمتار . ساقها مرطاء . أوراقها بحرية اللون مستطيلة النصل . أزهارها وردية موشحة بالبنفسجي . ثمارها صفر كرزوية القد . أزهارها يستمر من ايار الى آب .

٨٠٨٤ - حُضَضُ رُوسِي ، عُرْقُدُ رُوسِي

Lycium ruthenicum (S). Lyciet de Russie (F).
جنبه من الحُضَضُ تعلو نحو ٢٠٠ سم . أوراقها مستطيلة ، ضيقة ، شبه خيطية . أزهارها وردية كرزوية القد . ثمارها سود بحجم الحمص || أزهارها يستمر من ايار الى تموز .

٨٠٨٥ - حُضَضُ شَاحِب* ، عُرْقُدُ شَاحِب

Lycium pallidum (S). Lyciet pâle (F).
جنبه من الحُضَضُ تعلو نحو المتر . ساقها مرطاء . أوراقها ملوئية جامدة النصل . أزهارها متوسطة القد لوئها الى البياض الاخضر يعلو تشويح وردي اصفر || أزهارها يستمر من ٣٠ الى ٤٠ يوماً ابتداء من اوائل حزيران .

٨٠٨٦ - حُضَضُ شِيلِي ، عُرْقُدُ شِيلِي

Lycium chilense (S). Lyciet de Chile (F).
جنبه من الحُضَضُ تعلو نحو ٢٠٠ سم . ساقها وفروعها منتصبه . مبهمة الشوك القليل . أوراقها ملوئية زباء النصل . أزهارها صفر من الخارج ببيض من الداخل . ثمارها كالحمص ذعبية اللون || أزهارها يستمر طوال الصيف .

الخططي . مدبها الى الزرقاء الكدراء . ثوبها في زمن فتوتها يميل الى الجؤوة . حراشفها معينة ، عادمة الحزونة ، ملساء السطح ، مما دعى الى تسميتها بصفته الميزة : ملساء || رأسها متوسط الحجم . عيناها بلون النار . شدقاها الى الزرقاء العابقة . عدد اسنانها ٥٠ منها ٢٦ في الفك الاسفل و ٢٤ في الاعلى || تألف اطراف الغابات وتفضل الاراضي الرملية . قوتها الحشرات والخراطين والعقارب والضفادع والعظاء ... || تسرح في النهار وفي اوائل الليل || تعتبر من الحيات النافعة .

٨١١١ - حَفَّات مَطْرَق * ، مَطْرَقَة

Coluber torquatus, Natrix natrix (S).
Couleuvre à collier, Serpent à collier, S. nageur (F).
Common snake, Grass snake (E).

حية بيوض من الاحناش عادات الاغاييد محتبسات السموم . جسمها متوسط الشخانة يطول من ١٤٠ الى ٢٠٠ سم . ثوبها قبل الخمس سنوات الى الطحلة الرمداء تعلوها رقشة صفراء غبراء . وبعد ٥ سنوات الى الطحلة الرمداء العابقة يعلوها تبقيع اسمر منسوب الشكل والحجم ، وتحزير اسود معترض . مدبها مزيج من الابيض والازرق والاسود . تتميز بقلادة حنطية اللون صفراء الموج نصفية الطوق تكتنف القفن والعنق || رأسها متوسط القد ، مبسط كراس الارقم . شدقها رحب . عدد اسنانها ٥٠ ، منها ٢٦ في الفك الاسفل و ٢٤ في الاعلى || تألف الغابات والحدائق والمناقع وضفاف مجاري الماء . قوتها الحشرات والضفادع والاسماك والعظاء ... وتتميز بميلها الى الخليب الذي ترتشفه بشراة || تسرح في النهار وفي القسم الاول من الليل || تعتبر من الحيات النافعة .

٨١١٢ - حَفَّاد - Néoténique (F). Neotenic (E).

نعت تعريفي يطلق على البرقة الكاملة الشوار الشقي . وهي حالة بعض ذكور واثان الارضة والعقيفان . الغاية منها تأمين استمرار النسل في حال موت الملك او الملكة قبل زمن الافراق او بعده .

٨١١٣ - حَفَّار الرز الشريقي ، حَفَّار القصب

Chilo des roseaux (F).
فراشة من الناريات يرقها تحفر سوق الرز والقصب . اطلب شيلو القصب .

٨١١٤ - حَفَّار الساق - Cossus gâte-bois (F).

Goat-moth (E). Weidenbohrer (D).
هو قتع الساق ، حشرة من حرشفيات الاجنحة ، اطلبه .

٨١١٥ - حَفَّارَة - Paléozoologie (F).

Paleozoology (E).
الحفارة علم التاريخ الطبيعي العائد الى الاحافير الحيوانية ومتحجراتها .

٨١١٦ - حَفَّارَة * - Sparus haffara, Sargus

vetula (S). Sargue vieille, Spare haffara (F).
Sar, Sargus, Haffara (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة الاسبوريات شائكات الزعانف . اعطائها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي . تعتبر من اسماك المياه الاقليمية . مسرحها معاشب النخاف والجراح . || جسمها اهليلجي للشوزن ، مفلطح الجرم ، يطول من ٢٠ الى

٨١٠١ - حُطَّاب ، حُطَّيْبَة ، شُنْشُرَة - Palmure (F).

الحطاب والحطية غشاء جلدي يحيط بكامل اصابع الطير او بجزء منها وقد يوصلها ببعضها كما في كفيات القدم .

٨١٠٢ - حَفَّاة - قملة كبيرة القد ، ج حنطى .

٨١٠٣ - حَفَّار - Parage (F). Folding, Penning (E).

هو حجز المواشي في الحظائر وقد تحظر الماعز والضأن في الاراضي الزراعية لتسمها .

٨١٠٤ - حَفَّظ - هو الخفض عصارة الشجر المرة .

٨١٠٥ - حَفَّيْبَة ، زَرْيْبَة ، صَيْبَة - Bercall (F). Fold, Sheepfold (E).

موضع يحاط عليه لتأوي اليه الغنم والماعز وسائر الماشية .

٨١٠٦ - حَفَّ * - Agriopus (S).

Agriope (F). Agriopus (E).

سمكة بحرية بيوض من شائكات الزعانف وفصيلة الطريخيات موطنها يتأخم القارة الافريقية من جميع جهاتها || جسمها شبه مخروطي الشكل ، معتدل التبطيط ، يطول من ٤٥ الى ٥٥ سم . ثوبها الى الخضار البحري الاسمر يعلوه تبقيع احمر . رأسها معتدل الجرم ، مقعر الحطم ، صغير الشدق عيناها كبيرتان ، ناشزتان . تتميز بزعنفتها الظهرية الكبيرة ، الرفيعة ، القاطبة ، التي تمتد من قة الرأس الى قاعدة الذيل . مقدمها رفيع المناخس الحادة || لحمها كاعن الصنف غير مرغوب فيه .

٨١٠٧ - حَفَّاء - Typhace (F). Reed-mace (E).

هو البوط ، اطلبه .

٨١٠٨ - حَفَّات ، حَفَّث ، حَنَفَش ، حَنَش - Coluber (S). Couleuvre (F). Coluber (E).

جنس حيات من فصيلة الثعابين يشمل بعض الانواع غير السامة جميعها اكبر قدماً من الارقم . ج حفايث وحفايث . اطلب حنش .

٨١٠٩ - حَفَّات اَمْعَر * - Coronella girondica (S).

Couleuvre girondine (F).

حية بيوض من الاحناش عادات الاغاييد محتبسات السموم . جسمها متوسط الشخانة يطول نحو ٦٠ سم . ثوبها الى الخططي الامر الاسمر الموج يعلوه ترقين متواتر اسود اللون يمتد من العنق الى طرف الذنب . مدبها الى المغرة الزاهرة يحوقها خطان جانبيين من الترقين الاسود || رأسها لوزي الشكل ، صغير القد . شدقها متوسط الانفراج . عدد اسنانها ٥٠ ، منها ٢٦ في الفك الاسفل و ٢٤ في الاعلى . عتقها شديدة القصر || تسرح في الليل وفي النهار . تألف البراري . قوتها العظاء والوزغ والفار والحشرات || تعتبر من الحيات النافعة .

٨١١٠ - حَفَّات اَمْلَس * ، مَلْسَاء - Coronella austriaca (S).

Couleuvre lisse, Lisse (F).

حية بيوض من الاحناش عادات الاغاييد محتبسات السموم . جسمها يطول نحو ٧٠ سم . ثوبها عند اكتمال نموها اي بعمر ١٥ سنة يكون الى الزرقاء الصهباء الموج وتزداد صهته ويخف ازرقاقه مع اقترابه من البطن . ويعلو ثوبها من العنق الى الذنب خطان قاطبان من التتميش



حفّ



حفّات امغر



حفّات املس



حفّات مطوق



حفّارة


٨١٢٤ - حَفْت أَشْقَر* ، أَلَف مُشَرَّط ،

Elaphe scalaris (S).

مُشَرَّطَة

Couleuvre à échelons (F).

اسمها العلمي من الفيليني أو العربي لأنها تنتصب كالآلف.
حية بيوض من الاحناش عادات الاخايد محبسات السموم . جسمها معتدل الشخانة ، مزواني المقطع ، ثلاثي الاضلع ، يطول نحو ١٢٠ سم. ثوبها الى الشقرة الصنابية الموج يعلوها من القفن الى طرف الذنب ثلاثة خطوط متقاربة جزئية . رأسها لوزي الشكل . شدقها متوسط الانفراج . عدد اسنانها ٥٠ منها ٢٦ في الفك الاسفل و ٢٤ في الاعلى . تحسر قشارها من مرتين الى ثلاث مرات في العام . تبلغ كامل حجمها بعمر ١٤ سنة وتعيش نحو ١١٠ سنوات || تألف المروج والادغال والبراري . تسرح في النهار وفي اوائل الليل . قوتها الحشرات والدويبات والوزغ والعظام والفئران . بياتها الشتوي يستمر نحو اربعة اشهر || اخلاقها شرسة كاخلاق الافاعي . سريعة الغيظ تنتصب انتصاب الاملج وتعض كل شيء تتوقع منه الاساءة || الانثى تسافد بعمر خمس سنوات وتبيض من ١٦ الى ٢٤ بيضة مجموعة في سبختين تخفيها في جمر مهجور او في نفق تخلده في الجثالة || تعتبر من الحيات النافعة .



حفت اشقر

٨١٢٥ - حَفْت طَوِيل* ، حَفْت حَنْطِي* ،

Elaphe longissima (S).

أَلَف المُرُوج

Couleuvre d'Esculape (F).

حية بيوض من الاحناش عادات الاخايد محبسات السموم . جسمها معتدل الشخانة يطول من ١٥٠ الى ١٦٠ سم. ثوبها الى الصهبة الخطية العنابية الموج يعلوها ترقين متواتر اسمر يمتد من العنق الى طرف الذنب . رأسها مستنقظ ، شدقها معتدل الانفراج . عدد اسنانها ٥٠ . عينها صغيرتان حنقها معتدلة الطول || تبلغ كامل حجمها بعمر ١٦ سنة وتعيش نحو ١٢٥ سنة . الانثى تسافد بعمر خمس سنوات وتبيض من ٢٠ الى ٣٠ بيضة مجموعة في سبختين تخفيها في نفق تخلده في الجثالة || تألف المروج والحدائق وتدخل البيوت الارضية بطعامية تسرح في النهار وفي الليل . قوتها الحشرات والعظام والذئبان والفئران والجُرذان والصفادع والمصافير ... || بياتها الشتوي يستمر نحو خمسة اشهر . اخلاقها هنية ، رضية || تعتبر من الحيات النافعة .



حفت طويل

٨١٢٦ - حَفَرَة

الحفرة : نبات سرعوي . ج حفرى .

Cratoxyle, Cratoxylon (F).

٨١٢٧ - حَفَرَة

جنس نباتات برية معمرة من فصيلة الداذيات انواعه نحو ١٢ منبتها المناطق الاستوائية .

Chétopodes (F).

٨١٢٨ - حَفَرَات

Chetopoda (E).

طائفة من الديدان الحلقيات عديدة الفصائل والاجناس والانواع .

Déblais (F). Clearings (E).

٨١٢٩ - حَفَرَات

هي البوثر ، اطلبه .

٢٠ سم. ثوبها الى الصهبة الفضية يعبق في الظهر ويبيض في البطن ويعلوها في جانبيها تسنج قاطب اصفر اللون ، اسمر الموج . رأسها مخروطي الشكل ، قصير الخطم المستدير الطرف . شدقها معتدل الانفراج . فكها متعادلان اسنانها نظامية الترتيب فيها الثنايا والاضراس والطواحين . عينها مستديرتان ، ناشرتان . زعنفتها الظهرية واحدة ، مستطيلة الشكل . زعنفتها الذيلية فارقة || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

Pelomedusa (S).

٨١١٧ - حَفَاصَة

Péroméduse (F). Pelomedusa (E).

جنس سلاحف مائية من فصيلة الحفاسيات . انواعها المعروفة ثلاثة . اعطانها المناطق الاستوائية والحارة من البلاد الافريقية ومدغسقر والهند والهند الصينية . تألف الانهر والبحيرات والمناقع || اجسامها متوسطة القد تطول من ٤٥ الى ٧٠ سم. ذباها قليلة الاحديداب ، بيضية الشوزن . زعافها منبسطة ، ملحوفة بحتر الذيل . رؤوسها مكردمة . اعناقها معتدلة الطول والغلاظة . اذنانها قصيرة . قوائمها شديدة النشاط .

Pelomedusidae (S).

٨١١٨ - حَفَاصِيَّات

Péromédusidés (F). Pelomedusidae (E).

فصيلة حيوانات بيوضة من رتبة السلاحف . اجناسها المعروفة ثلاثة ، اما انواعها فنحو ١٦ . اعطانها مياه معظم المناطق الاستوائية والحارة . تألف الانهار والبحيرات والندران والمناقع . قوتها كل ما تستطيع افتراسه من اسماك وعظام وصفادع ورغويات وثعابين وجيف مغمورة بالماء ونباتات مائية || اجسامها متباينة الحجم ، منها الصغيرة والوسطى والكبيرة . ذباها قليلة الاحديداب ، بيضية الشوزن . زعافها منبسطة ، مفصلية الاطراف الامامية . رؤوسها مكردمة . اعناقها فاسحة تنقبض تحت الذبال . اذنانها قصيرة . قوائمها خماسية الاصابع والمخالب الذرية || اما اجناسها الثلاثة فهي الحفاصة والفهر والطفاشة .

Appertisation (F).

٨١١٩ - حَفَاطَة

Appertising (E).

فن حفظ الاطعمة بتعليبها وتعقيمها . وهي من اختراع ابرت (Appert) الفرنسي الذي توفي عام ١٨٤١ بعد ان وهب البشرية فن حفظ المواد الحيوانية والنباتية .

٨١٢٠ - حَفَالَة

الحفالة ما يسقط من قشر الشعر والارز والتمر وكل ذي قشارة اذا نقي . وفي الحديث : « وتبقى حفالة كحفالة التمر . »

Plumes d'autruche (F).

٨١٢١ - حَفَّان

Feathers of ostrich (E).

هو ريش النعام الناعم الرهل .

Couleuvre (F).

٨١٢٢ - حَفْت ، حَفَّات

Coluber (E).

الحفت حية من الثعابين غير السامة راجع حفات .

Feuillet (F).

٨١٢٣ - حَفْت ، حَفْتَة

Third stomach of ruminants (E).

هنة ذات اطباق توجد في اسفل كرش البقر والشاء والايل ونحوها . وتعرف ايضاً بذات الطرائق . ج احفات .

٨١٤٢ - حَقُّ حَفِيْضَةٍ *
Ruche (F). Bee-hive (E).

خلية تعمل فيها النحل .

٨١٤٣ - حَقُّ
Capsule (F). Capsule, Pod (E).

هو الجرو ، اطلبه .

٨١٤٤ - حَقُّ
Droit (F). Right (E).

الحق بمعناه الموضوعي يدل على جماع القواعد الملزمة للانسان في حياته الاجتماعية . والحق بمعناه الذاتي صفة تعتبر ميزة يملكها المرء ويلزم بها غيره على العمل او عدم العمل .

٨١٤٥ - حَقُّ اِحْتِيَالِي
Droit éventuel (F).

هو حق متوقع يتم عند ابرام العقد . كالايجاب في البيع فانه لا يتم الا بالقبول .

٨١٤٦ - حَقُّ اِرْتِفَاقِ السَّلْمِ
Servitude d'échelage (F).

ويقال له ايضاً حق مرتفق السلم وهو حق ارتفاق عيني يتحول صاحبه وضع سلم على ملك الغير لاجل البناء او لاجل اصلاح جدار او ارتفاق السلم غير مرتفقها لان الاول هو الحق والثاني هو قطعة الارض التي توضع عليها لاستعمال هذا الحق .

٨١٤٧ - حَقُّ اِرْتِفَاقِ المَتَاعِ
Servitude d'égoût (F).

حق ارتفاق المتاعب او الميازيب او المزاريب هو حق ارتفاق اتفاقي يقبل به صاحب عقار ان تسيل مياه المطر من سطوح بجاره الى عقاره .

٨١٤٨ - حَقُّ اِرْتِفَاقِ المَتَطْلِ
Servitude de vue (F).

حق قانوني يلتزم به صاحب عقار ان لا يفتح على عقار جاره مطات او كوى مباشرة او منحرفة الا اذا راعى الابدان التي تقرضها القانون . وهو حق اتفاقي اذا تراضيا على ان تكون الابعاد اقصر من التي حددها القانون .

٨١٤٩ - حَقُّ الارْتِكَازِ
Servitude d'appui (F).

هو حق ارتفاق قانوني فحواه ان من يملك ارضاً بجوار نهر لا يصلح للملاحة يجب عليه ان يسمح لمن يملك ارضاً على الضفة المواجهة لارضه ان يقيم خزاناً على النهر يرتكز جداره على ارضه لتجري منه المياه في اقنية الري وذلك مقابل مبلغ يتفقان عليه .

٨١٥٠ - حَقُّ الارْهَاءِ
Servitude de vaine pâture (F).

هو في بعض البلاد حق لاهل القرى او احدى القرى مؤداة ان يرسلوا قطعانهم لترعى في اراضي قرية اخرى بعد حصاد الزرع وقبل الزراعة الجديدة . ولا يسرى هذا الحق على الاراضي المسورة ولا على المروج الاصطناعية .

٨١٥١ - حَقُّ الاستعمَالِ
Droit d'usage (F).

حق استعمال الاشياء التي يملكها الغير كاختطاف الثمار الضرورية وهو حق لا يقبل الحوالة ولا الجز .

٨١٥٢ - حَقُّ الاغْتِرَافِ
Servitude de passage (F).

هو الذي يباح به لصاحب عقار ان يفتقر المياه من يثر جاره لاجل لوازم منزله وحديقته وبزهرته .

٨١٣٠ - حَقُّ حَفَشِ
Acipenser (S).

Esturgeon (F). Sturgeon (E).

جنس اسماك بحرية ونهرية من فصيلة الحفشيات انواعه المعروفة ٢٠ جميعها غضروفية كبيرة القد ، مردنية الشكل ، مخروطية الخطم لها ذبائبان عند منتصف الفك الاسفل . وهي عادمة الاسنان . مجنحة الحراشف الظهرية العظمية التركيب . لحمها مأكول ويستخرج منها الخبياري اي الصعتر وغراء السمك || اشهر انواعه ما يلي .

٨١٣١ - حَقُّ حَفَشِ المَتَالِي
Acipenser ruthenus (S).

Sterlet (F).

نوع من الحفش يكثر في المياه الالمانية وهو اصغر جثة من حفش المتوسط . يستخرج منه الصعتر والغراء .

٨١٣٢ - حَقُّ حَفَشِ المَتَوَسِّطِ *
Acipenser sturio (S).

Esturgeon commun (F). Common sturgeon (E).

نوع من الحفش اعطاه البحر المتوسط والانهار التي تصب فيه . جثته تطول من ٥ الى ٦ امتار سروته يعرف بالخبياري الاحمر ويستخرج من مثانته غراء السمك المشهور .

٨١٣٣ - حَقُّ حَفَشِ رُوسِي *
Acipenser ichtyocolla (S).

Belouga

نوع من الحفش اعطاه تشمل بحر ازوف وبحر قزوين والبحر الاسود والدانوب وهو اصغر جثة من حفش المتوسط طوله يراوح من ٤ الى ٥ امتار . سروته يعرف بالخبياري الاسود وهو افخر اصناف الخبيار .

٨١٣٤ - حَفَشِيَّات
Acipenseridae (S).

Acipenseridées (F). Acipenseridae (E).

فصيلة اسماك بحرية ونهرية تنتمي الى اللامعات . اجناسها وانواعها عديدة اشهرها واعرفها الحفش .

٨١٣٥ - حَقُّ حَفَصِ

الحفص : عجم النبق والزعرور ونحوهما .

٨١٣٦ - حَقُّ حَفَصِ
Aigrin, Egrain (F).

الاحفاس كالشري هي النصب الناجمة عن العجم والنوى .

٨١٣٧ - حَقُّ حَفَلِ

حفل البقرة والعزرة والشاة : ترك حلبها اياماً ليجتمع اللبن في ضرعها فيفتر المشتري .

٨١٣٨ - حَقُّ حَفُولِ

شجر مثل تيجر الزمان في القدر ثمره كاجاصة صغيرة فيه مرارة يؤكل وله عجمة غير صلبة (اللسان) .

٨١٣٩ - حَقُّ حَفِي
Arrachage (F). Pulling up (E).

الحفي والاحتفاء هو استخراج النبات من التراب .

٨١٤٠ - حَقُّ حَفِيرَةٍ
Fossile (F). Fossil (E).

هي البقايا العضوية المتحجرة ، في مختلف الطبقات الارضية ، المائدة الى اي مخلوق كان عاش في الاسحقاب النابرة . ج احافير .

٨١٤١ - حَقُّ حَفِيرِي
Paléozoïque (F). Palaeozoic (E).


نعت تعريفي يطلق على اقدم الاحقاب الجيولوجية التي عثر فيها على احافير او متحجرات حيوانية .



حَفَشِ المَتَوَسِّطِ



حَفَشِ رُوسِي



حَفِيْضَةٍ

الساف الاول من سلم الرصف الارضي الطبيعي وهي تأتي تحت الحقبة الثانوية. راجع اياج أولي.

٨١٦٦ - حقبة ثالثة (F). Ere tertiaire (F).

Tertiary era (E). من الاحقاب الحصلية مركزها فوق الثانوية وتحت الرابعة. راجع اياج ثاني.

٨١٦٧ - حقبة ثانوية (F). Ere secondaire (F).

Secondary era (E). من الاحقاب الحصلية مركزها بين الحقبة الاولى والثالثة. تتميز بظهور اللبونات والطيور والنباتات الزخافات. راجع اياج ثانوي.

٨١٦٨ - حقبة رابعة (F). Ere quaternaire, Pléistocène (F).

Quaternary era, Pleistocene (E). من الاحقاب الحصلية مركزها الساف الاخير من سلم الرصف الارضي لذلك فهي تأتي فوق الحقبة الثالثة. راجع اياج رابعي.

٨١٦٩ - حقبة (F). Scrobe

هما نقرتان في مقدم رأس الحشرة ترتكز عليهما الزباني.

٨١٧٠ - حقبة (F). Sterne de Bergi (F).

Swift tern (E). هو الحشرة السريعة، اطلبها.

٨١٧١ - حقبة (F). Cri du pterniste (F).

اخقطة: صياح الخيوطان.

٨١٧٢ - حقبة، حقبة، غبط (F). Champ (F).

Ground (E). الحقول كلمة شائعة الاستعمال تعني التربة المزروعة. ج حقول. اما الغبط المصرية. ج غيطان || والحقبة تستعمل للتخصيص فتقول حقبة بندورة وحقبة بطيخ. الخ

٨١٧٣ - حقبة اختبارات (F). Champ d'expériences (F).

Ground of experiments (E). ارض خصصت لاجراء الاختبارات الزراعية على اختلاف انواعها.

٨١٧٤ - حقبة تجارب (F). Champ d'essais (F).

Ground of essays (E). ارض خصصت لاجراء التجارب الزراعية المختلفة.

٨١٧٥ - حقبة ريفي (F). Champêtre (F).

Rural, Sylvan (E). نعت تعريف يطلق على كل ما له علاقة بالريف والحقول.

٨١٧٦ - حقبة (F). Attagis

جلس طير من فصيلة النبقيات. انواعه ثلاثة. شكله بين الحمام والحجل والباري. جميعها صغيرة القد طولها يراوح من ١٨ الى ٢٢ سم. ثوبها الى الصبغة الموشمة والموشمة بالاصفر والاسمر || قوتها الاعشاب والثمار والحبوب والحشرات. تألف الهضاب والسهول البرية. انها تدث في الارض بين الادغال والاعشاب، تبيض من ٨ الى ١٢ بيضة تحضنها وحدها نحو ثلاثة اسابيع.

٨١٧٧ - حقبة (F). Injection

هو ادخال سائل بالضغط في بعض نسيج الجسم.

٨١٥٣ - حق الانتفاع (F). Usufruit (F).

حق يبيح لصاحبه الانتفاع بملك الغير دون ان يغير من وضعه او يمس جوهره.

٨١٥٤ - حق التشذيب (F). Servitude d'élagage (F).

هو حق ارتفاع فحواه ان يكون على صاحب عقار مجاور ان يقطع اغصان الشجر التي تمتد من عقاره الى عقار جاره.

٨١٥٥ - حق الرفض، فيتو (F). Veto

نظام يبيح لاحدى السلطات المختصة رفض الموافقة او المعارضة في قيام عمل ما || وحق الرفض يستعمل في الصيغ التالية: الرفض المطلق والرفض التشريعي والرفض الشعبي والرفض المحدود.

٨١٥٦ - حق الشفة (F). Servitude d'abreuvement (F).

هو ارتفاع الشفة، اطلبه.

٨١٥٧ - حق الشفعة (F). Droit de préemption (F).

هو الحق في تملك العقار المبيع على المشتري بالثمن الذي دفعه والرسوم والمصاريف. غرض الشفعة منع الضرر وهي لا تجوز الا في العقار. والذين لم هذا الحق اربعة: مالك الرقة والشريك بالمشاع وصاحب حق الانتفاع والجار المالك.

٨١٥٨ - حق المرعى (F). Servitude de pacage, Servitude de pâturage (F).

هو ان يترك صاحب ارض مواشي غيره رعى في ارضه.

٨١٥٩ - حق المرور (F). Servitude de passage (F).

هو ان يسمح صاحب الارض لجاره بالمرور في ارضه ماشياً او راكباً او مع بهائم الخ... وهو حق ارتفاع قانوني اذا كان الجار محصوراً او اتفاقي فيما عدا ذلك.

٨١٦٠ - حق المسيل (F). Servitude d'écoulement des eaux (F).

هو حق يلزم صاحب عقار منخفض ان يسمح لصاحب عقار مرتفع ان يسيل منه الماء في عقاره || وهو حق ارتفاع طبيعي لمياه المطر ولكنه قانوني يقتضي تعويضاً لصاحب العقار المرتفع به اذا كانت المياه السائلة مياه صرف او تجفيف.

٨١٦١ - حق بوغي* (F). Zoosporange (F).

هو وعاء البوغ المهدب المتحرك. Zoosporangium (E).

٨١٦٢ - حق مرور المياه (F). Servitude d'aqueduc

هو حق ارتفاع يلزم صاحب عقار ان يحتمل مرور المياه في عقاره الى عقار آخر بواسطة مجرى او قناة الا انه يقتضي تعويضاً لصاحب العقار المرتفع به.

٨١٦٣ - حقبة (F). Période (F).

Period (E). مدة من الدهر طويلة الامد.

٨١٦٤ - حقبة التجلد، حقبة السقيط،

حقبة الداميك (F). Glaciale (F).

Ice age (E). جزء من الاباج الحديث يتميز بفسارة الجليد وكثرة انتشاره.

٨١٦٥ - حقبة أولية (F). Ere primaire (F).

Primary era (E). من الاحقاب الحصلية وهي الارضين الاصلية مركزها



حق بوغي



حق

٨١٨٧ - حَكْ* ، بُوصلة ، حَكَّة

Boussole (F). Compass (E).

يقال ان الصينيين هم اول من استخدم الحك البحري . والحك او البوصلة او الابرة المغنطيسية جهاز يستخدم لتعيين الجهات الاصلية . وهو مركب من ابرة يشير طرفها الممغنط الى الشمال المغنطيسي وهذه الابرة ترتكز على حائق وتتحرك في مستوى افقي حول محور رأسي مثبت في وسط قرص شصدي الانقسام يحوي ٣٢ اتجاهًا .

٨١٨٨ - حُكَاء الحُكَاء : ذكر الحنافس .

٨١٨٩ - حُكَاة* ، حُكَاة ، حُكَاة

Mabouya, Mabuia

جنس عفاء من فصيلة السقنقوريات . انواعه المعروفة نحو ٤٠ . اعطانها البلاد الحارة والاستوائية جميعها صغيرة القند مستطيلة الذنب . اثوابها متباينة الالوان يكثر فيها الاخضر الاسفع الموج . ظهورها خماسية او ثلاثية الخطوط السود القاطبة وبعضها مزقوش بالاسود والاصفر .

٨١٩٠ - حُكَاة مُنَمَّشَة* ، مَبُوءَة مُنَقَطَة

Mabuya punctata (S). Mabouya ponctué, Mabuia ponctué (F). Stopped mabuya (E).

حيوان بيوض من العفاء وفصيلة السقنقوريات قابعات الاسنان مكنتيات اللسان ، رباعيات القوائم ، لحاسيات الاصابع . ذكورها اصفر قدأ من اناثها || جسمها متوسط القند يطول من ٢٧ الى ٣٠ سم . رأسها مخروطي الشوزن . عينها لوزيتان صغيرتان تلحفها اجفان شفافة متحركة . اذناها غافقتا الغشاء الصيواني . لسانها جزل الطرف ، مشعل الصفحة . عنقها قصيرة وثخينة . ظهرها متتابع الثعالب الدقيقة . بطنها مائل المدب . ذنبها مستطيل ، مستدق الطرف . ثوبها الى الخضار الاغبر الاسفع الموج تملوه خسة خطوط قاطبة منمشة بالاسود والاصفر || بيائها الشتوي يستمر نحو اربعة اشهر . الانثى تبيض من ٦ الى ١٢ بيضة تطمرها في التربة على عمق ٤ او ٥ سم . || تألف الاماكن البعيدة عن العمران . تسرح في النهار . جحرها نفق مستطيل تخله بين جذور النبات او تحت الحجارة || قونها الحشرات والديدان والمقارب والعناكب والذباب || تعتبر من الزحافات المفيدة .

٨١٩١ - حِكَاة* ، حِكَاة (E). Progenèse (F). Progenesis (E).

الحكادة مجموعة المناشح التي تحضر نمو الكائن الحي .

٨١٩٢ - حَكَاشة* ، حَكَاشة (S). Scombreox (S).

Scombreoce (F). Saury (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الحكاشيات . انواعها المعروفة خمسة . اعطانها بحار ورزان البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها سنانية الشكل تطول من ٤٠ الى ١٤٠ سم . وهي قريبة الشبه بالحرمان . رؤوسها اسفينية . مقاطعها ذلقة مستدقة الاطراف الطويلة . اثوابها الى الخضار الاسمر يعبق وتشتد سمرة في القسم الاعلى من الجانبين والظهر || لحومها مأكولة ، متوسطة الصنف . أشهر انواعها حكاشة المتوسط .

٨١٩٣ - حَكَاشة المُتَوَسِّط* ، حَكَاشة (S). Scombreox (S).

Rondeletti (S). Scombreoce de Rondelet, S. de la Méditerranée (F). Mediterranean Saury (E).

نوع من الحكاش ، سمكة بحرية بيوض . اعطانها معظم

Rein (F). Kidney (E).

٨١٧٨ - حَقْو

اطلب كلوة .

٨١٧٩ - حَقْو مُتَاحَة الطريق العام

Aisances de volie (F). Easiness of roads (E).

حقوق يكتسبها كل من كانت املاكه قائمة على الطريق العام كحق المرور وتصريف المياه . الخ

٨١٨٠ - حَقِيلَة* ، حَقِيلَة (S). Rosularia (S).

Rosulaire (F). Rosularia (E).

جنس نباتات لحمية معمرة من فصيلة الخلدات . منبتها بعض اقاليم الشرق الادنى . انواعها عديدة جميعها صغيرة القند . اوراقها ضمية التجميع . اوراقها منبسطة ، مسوطة النصل الخلمي الصفحة العليا المشعلة . شماريخها الزهرية نحيلة . ازهارها عنقودي التجميع . ازهارها مختلفة الالوان . اعرف انواعها واشهرها التالية .

٨١٨١ - حَقِيلَة باهية* ، حَقِيلَة (S). Rosularia pallida (S).

Rosulaire pâle (F).

نوع من الحويلة . منبتها الشرق الادنى . شماريخها يعلو من ١٠ الى ٢٠ سم . اوراقها منبسطة ، مقطوعة الاطراف ، تطول من ١٥ الى ٣٠ سم . وتعرض نحو ٨ سم . ازهارها عنقودي التجميع . ازهارها صغيرة القند ، بيضاء اللون الباهت ، مسنة البتلات المندغمة في زاميا الاول والثاني . تنويرها يستمر من حزيران الى تموز .

٨١٨٢ - حَقِيلَة حُندُوقِيَة* ، حَقِيلَة (S). Rosularia alzoon (S).

Rosulaire alzoon (F).

نوع من الحويلة . منبتها بعض اصقاع الشرق الادنى . شماريخها شديد القصر يعلو نحو ٥ سم . اوراقها منبسطة تطول نحو ١٠ سم . وتعرض نحو ٥ سم . ازهارها عنقودي التجميع . ازهارها صغيرة القند ، صفراء اللون . بتلاتها مندغمة في ثلثها الاول ، مهذبة الاكطار || تنويرها يستمر طوال شهر تموز .

٨١٨٣ - حَقِيلَة لُبْنَانِيَة* ، حَقِيلَة (S). Rosularia libanotica (S).

Rosulaire libanaise (F).

نوع من الحويلة . منبتها جبال لبنان وسورية وفلسطين . شماريخها يعلو من ١٠ الى ٢٠ سم . اوراقها شبه قلبية الشكل ، تطول نحو ٣ سم . وتعرض من ١٠ الى ١٢ سم . ازهارها عنقودي التجميع . ازهارها حمراء اللون ، كثيرة العدد ، صغيرة القند || تنويرها يستمر من حزيران الى تموز .

٨١٨٤ - حَقِيلَة مُسَنَّكَ* ، حَقِيلَة (S). Rosularia serrata (S).

Rosulaire dentelee (F).


نوع من الحويلة . منبتها بعض اقاليم الشرق الادنى . شماريخها يعلو من ١٠ الى ١٥ سم . اوراقها صغيرة مسنة الختار ، تسنيها غصروفي المادة . ازهارها عنقودي التجميع . ازهارها حمراء اللون || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

٨١٨٥ - حَقِيم

مؤخر العين مما يلي الصدغ وهما حقبان .

٨١٨٦ - حَكْ* ، حَكْ (F). Boussole (F).

الحك كوكبة نجوم جنوبية الموقع مركزها فوق السفينة بالقرب من برج الجدي || عدد نجومها ١٤ .



حك



حُكَاة



حَكَاة مُنَمَّشَة

٨٢٠٣ - حَكَمِي، فِيزِي Physique (F).
Physical (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما هو مختص بالمادة ..

٨٢٠٤ - حَكُوف Désactivation (F).
Disactivation (E).
الاسترخاء في العمل .

٨٢٠٥ - حَلّ Solution
الحل هو نهاية معضلة علمية او الجواب على مشكلة رياضية او مسألة حسابية ...

٨٢٠٦ - حَلّ Huile de sésame (F). Sesame-oil (E).
الحل هو سليلب السمسم اي دهنه او زيتته ويسمى السرج والشيرج .

٨٢٠٧ - حَلَق Eréthisme charnel (F).
Sensual arethlism (E).
الحلاق علة تصيب الانثى فتجعلها لا تشبع من المباشمة .

٨٢٠٨ - حَلَال، حَلَال Scirpus (S). Scirpe (F).
Buirush (E). Simse, Binse (D). Scirpo (I).
جنس نباتات حولية وبحولة ومعصرة من فصيلة السعديات .
انواعه نحو ١٠٠ جميعها من نباتات المواعع الرطبة او المنقعية . اوراقها ليفية متينة تستعمل في عدة صناعات .
اشهر انواعها حلال الحصر .

٨٢٠٩ - حَلَال الحَصْر، دَيْس الحَصْر Scirpus lacustris, Scirpus acutus (S). Scirpe des lacs,
Jonc des chaisiers, Jonc des tonneliers (F). Pool-rush
Lake club-rush (E). Teichsimes (D). Scirpo degli
stagni, Gincco di padule, Nocco (I).

اشهر انواع الحلال وهو من النباتات المنقعية المعصرة .
اوراقه تستعمل في حياكة وحبك وجدل عدة صناعات قشية .
وهو ايضا من النباتات الطيبة الحامزة والمذرة للبول .

٨٢١٠ - حَلَالَة، مِرْدَن Dévidoir (F).
Reel, Skein-winder (E).
جهاز خاص بتوضيب الخيوط وجمعها .

٨٢١١ - حَلَام، حُلَان
الجدي الذي يؤخذ من بطن امه حيا فيذبح لفروته .

٨٢١٢ - حَلَب Traite (F). Milking (E).
هو الاحتلاب ، راجعه .

٨٢١٣ - حَلَب الحلب نبت ينبت في القبط بالقيمان وشطآن الاودية ويلزق بالارض حتى يكاد يسوخ وانما يأكله الشاء والظباء ويدبغ به (عن ابي حنيفة) .

٨٢١٤ - حَلَبَاب Latex
عصارة لبنة لزجة تفرزها قني بعض النباتات .

٨٢١٥ - حَلَبَاب الحَس Lactucarium
عصارة لبنة تستخرج من الحس . اخصها الحس الجبار .
وهي كثيرة الاستعمال تعتبر من المسكنات وتدر البول .

٨٢١٦ - حَلْبَابِي Laiteux (F). Lacteous (E).
ما كانت ميوعته شبيهة باللبن .

اقاليم البحر الابيض المتوسط . مسرحها المجادح والرزان .
قوتها النباتات البحرية والرخويات تجناس الاسمال والاورحال
في طلبها || جسمها مستطيل الشكل يطول من ٤٠ الى ٦٠ سم .
حراشغها معتدلة الحجم . ثوبها الى الخضار البحري يعلوه موج فضي وشحة حنطية متفاوتة الماحات
بين الظهر والايطلين والبطن . رأسها مستدق الخطم الطويل .
فكها مستطيلان ، العلوي اقصر من السفلي واضيق منه .
اسنانها شديدة الصغر . منبها ثنائيا الثقوب . عيناها
كبيرتان ناشرتان || زعانفها متباينة الاشكال . الظهرية
متأخرة الارتكاز . الشرجية تقابل الظهرية ، الذيلية
فارقة || وتتميز بمجموعة من الزعنفيات المزوانية الشكل
تقوم على الذنب ، ست منها تتمركز بين الظهرية والذيلية
وسبع منها تتمركز بين الشرجية والذيلية || تصاد في الليل
على ضوء الفانوس . لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٨١٩٤ - حَكَاشِيَّات Scombrsocioide (S).
Scombrsocioidés (F). Scombrsocioide (E).

فصيلة اسماك بحرية من مفتوحات المثانات . اجناسها قليلة
العدد اشهرها الحكاش والحمران والقنبرور . مسرحها
الاغواط والمجادح والشطوط || اسمائها تتميز باستطالة
الاخطام والاشداق التي تبدو كالمناقيد . جميعها لاحمة وعاشبة
وتجتناس الوحول في طلب الرخويات || سرها مفشي بالياف
دايقة تمكنه من الالتصاق بالنباتات البحرية ، اخصها
الحث ، حق النقف .

٨١٩٥ - حَكَاك، حَكَّة، هَلَم Acariasis (S). Acariose (F). Acariasis, Acarus (E).
مرض جلدي سببه بعض القراد .

٨١٩٦ - حَكْر Hekr
الحكر هو آجار الى امد طويل يبيع للمستأجر الانتفاع
بالعقار مقابل اجرة سنوية او بالمقاسطة .

٨١٩٧ - حَكْر حَكَمِي Emphyccéose (F).
Long lease conferring right of mortgage (E).
هو عقد ايجار لمدة لا تقل عن ثمانى عشرة سنة ولا تزيد
على تسع وتسعين لقاء اجرة سنوية ثابتة . وهذا العقد
يحول المستأجر حق الانتفاع العمي المقدور التحويل
والحجز والرهن .

٨١٩٨ - حَكْل الهوام لا صوت لها من اي نوع كانت .

٨١٩٩ - حَكَم Arbitre (F). Arbitrator (E).
هو من تسوى المنازعة على يده .

٨٢٠٠ - حَكَم Jugement (F). Judgement (E).
هو المحرر الذي يشتمل على ما تقرره المحكمة مع ذكر
هيتها .

٨٢٠١ - حَكَم استثنائي Arrêt (F). Arrest (E).
هو الحكم الصادر عن محكمة استئناف .

٨٢٠٢ - حَكَمَة Anneau nasal (F).
الحكمة حديدة مستديرة يخطم بها أنف الحصان والثور
والبعير وتدعى برة وخطام .



حَكَاشَة المتوسِّط



حَكَمَة



حَلَال الحَصْر

٨٢٢٤ - حَلَبْلَابٌ مُخَشَّوْشِبٌ ، أَذُنُ الْأَرْتَبِ

Bupleurum fruticosum (S). Buplèvre ligneux, Oreille de lièvre (F).

جنية ترينية تعلو من متر الى مترين . فروصها حمر . أوراقها مستطيلة شبه لاطئة طولها نحو ٨ سم . وعرضها ٢ . نصلها اخضر الصفحة العليلة ، بحري السفلى . عديد المروق والشرايين . ازهارها متتابعة الرصف كثيرة الصفوف || ازهارها يستمر من نيسان الى ايلول .

٨٢٢٥ - حَلَبْلَابٌ مُسْتَدِيرُ الْوَرَقِ ، ثاقِبُ الْوَرَقِ

Bupleurum rotundifolium (S). Buplèvre à feuilles rondes, Perce-feuille (F). Thorow-wax (E). Hofenohrchen (D). Bupleuro (I).

نبات طبي بري معمر يعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . أوراقه مستديرة الشكل شبه حاضنة . قابضة للامعاء . يقال انه يفيد الصدر والسعال وانه من اجل المشروبات اذا مزج بالعسل .

٨٢٢٦ - حَلَبُوبٌ* ، عَصَا هِرْمِسَ ، حَرَبِقُ ، حَشِيشَةُ الزَنْبَقِ

Mercurialis (S). Mercuriale (F). Mercury (E). Merkurkraut (D). Mercarella, Mercuriale (I).

جنس نباتات عشبية طبية برية من فصيلة السوسيات . انواعه خمسة أشهرها الحلوب الحولي الذي يكثر في الاراضي المزروعة والحلوب المعمر الذي يوجد في الوعر والجبال . كانا يستعملان في الطب القديم مدرين للبول والطمث . اما الانواع الاخرى فسامية ومهم من وصفها كطاردة للديدان .

٨٢٢٧ - حَلَبِيشَا

Esule ronde (F). Purple spurge (E).

هي الفرج نبات من الفربيون ، اطلبه .

٨٢٢٨ - حَلَّةٌ

Indigotier (F). Indigo plant (E).

عشبة تعرف بالنيل وهي شاكه تنبت برياً في غلط الارض . قال بعضهم :

٨٢٢٩ - حَلِثِيَّتٌ ، حَلِثِيَّتٌ

Asa foetida (F). Asafoetida (E).

الحلثيت هو صمغ الانجذان لونه الى الجفوة ، كريحه الرائحة والطعم ، مر المذاق حامز لاسع . يستعمل لتسكين التشنجات ومنهم من استعمله استعمال البهارات لانه هاضم ويولد الكثير من الحرارة التي تنفي الجسم عن احتراق هيدرات الكربون . كما يمنع الانتفاخ ويطرد الدود ويدبر الطمث . وهو شائع الاستعمال في الطب البيطري .

٨٢٣٠ - حَلِثِيَّتٌ

Férule (F). Ferula (E).

نبات بري طبي يعرف بالانجذان ، اطلبه .

٨٢٣١ - حَلَجٌ

حلج الديك : نشر جناحيه وسمى الى انشاء يسفدها .

٨٢٣٢ - حَلَجٌ

Egrainer, Egraner (F). To unstring (E).

حلج القطن : نذنه حتى يخلص الحب منه فهو حلج والقطن حلج ومخلوج .

٨٢٣٣ - حَلَجٌ

Egrainage (F). Picking off (E).

هو ندف القطن لاستخلاص حبه .

Rhynchospora (F).

Rhynchospora (E).

جنس نباتات عشبية برية حولية ومعمرة من فصيلة السعديات انواعه المعروفة نحو ١٥٠ منتشرة في جميع المناطق الحارة والمعتدلة الحرارة || سوقها فرعاء يغلب فيها الامتداد الافقي . أوراقها متعاقبة ، عسقية ، ميزابية النصل . ازهارها سنبلية التجميع || يكثر وجودها في المواقع الرطبة . وهي من النباتات الضارة العديمة النفع .

٨٢١٨ - حَلْبَةٌ ، أَعْثُونٌ ، غَارِيْقًا

Trigonella (S). Trigonelle (F). Trigonella (E).

جنس نباتات عشبية برية وزراعية علفية من فصيلة القرنيات الفرشية . انواعها كثيرة العدد معظمها بري وبعضها زراعي ، جميعها قريب الشبه من النفل والهندقوق . والحلبة مقوية للمعدة وللأعصاب تفيد الزلات الصدرية كالسعال وضيق التنفس والربو . اما زيتها فيستعمل بشكل خلاصة طبية لنمو الثديين وتقوية غددهما . حبا يحوي نحو ٣٠٪ من المواد الزلالية و ٧٪ من المواد الزيتية مما يجعلها تفيد الدرع عند المرضع || ورقها وحبا يحويان ايضاً ، على نسب متفاوتة ، فيتامين ا و ب و ث و د . ومادتين قلويتين الكولين (Choline) والخلين (Trigonelline) . أشهر انواعها الحلبة الرومية والزرقاء والقرنية .

٨٢١٩ - حَلْبَةٌ رُومِيَّةٌ* ، حَلْبَةٌ مَزْرُوعَةٌ ، فَرِيقَةٌ

Trigonella foenum-graecum (S). Fénugrec, Sene-grain (F). Fenugreek (E). Griechisches bockshorn (D). Trigonella, Fieno greco (I).

نوع من الحلبة الزراعية التي تمتلئها المواشي وتسمن عليها . منافعها الصحية عديدة . أوراقها متعاقبة معنقة مركبة . ازهارها ابطية فردية . ثمارها قرون اسطوانية الشكل مستطيلة تحضن من ٨ الى ١٠ حبات .

٨٢٢٠ - حَلْبَةٌ زَرْقَاءُ*

Trigonella caerulea (S). Trigonelle bleue, Lotier odorant (F). Sweet trefoil (E). Blauer klee, Käse-teinklee (D). Trifoglio muschiato, Loto odoroso (I).

نوع من الحلبة الزراعية الترينية . ازهارها فواحة العبير المستحب يستخرج منها بالتقطير دهن ذكي الورد يستعمل في اكثر المستحضرات العطرية .

٨٢٢١ - حَلْبَةٌ قَرْنِيَّةٌ* ، ذُرْقٌ

Trigonella corniculata (S). Trigonelle cornue, Lotier sauvage, Trèfle sauvage (F). Wild trefoil (E). Wilder klee (D). Trifoglio salvatico (I).

نوع من الحلبة البرية يكثر في المراعي وفي الارض البور تمتلئها الماشية فيسمها ويحسن درها .

٨٢٢٢ - حَلَبْلَابٌ* ، صِلْعُ الْبَقَرَةِ


Bupleurum (S). Buplèvre (F). Hare's-ear (E).

جنس نباتات عشبية وجنية برية وترينية من فصيلة الخيميات . سوقها مرطاء . أوراقها عروية متعاقبة : ازهارها صفر . ازهارها صيواني مركب . أشهر انواعها ما يتبع :

٨٢٢٣ - حَلَبْلَابٌ لَيْفِيٌّ

Bupleurum fruticosum (S). Buplèvre sous-ligneux (F).

جنية ليفية ترينية تعلو من ٤٠ الى ١٠٠ سم . فروصها مضلعة الزوايا . أوراقها مخزلية جامدة النصل ، خماسية او سباعية المروق . ازهارها متتابعة الرصف || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .





حلبوب



حلحل أزب



حلحل جميل



حلحل عنقودي



حلزة

٨٢٤٠ - **حلحلة** Percolation
مقدار الماء الذي يتسرب الى جوف الارض في مساحة معينة .

٨٢٤١ - **حلزة* ، زنبق عنكبوتي، نرجس عنكبوتي**
Pancratium (S).

Pancratier, Pancratie, Pancrace (F). Spider lily, Pancratium, Daffodil (E). Schwefelblume, Machtblume (D). Scilla bianca, Pancrazio (I).

جنس نباتات بصلية من فصيلة النرجسيات . انواعه المعروفة ١٢ معظمها بري ، منبتها البلاد الحارة والمعتدلة . اوراقها لاطلة ، قوية النصل . ازهارها كبيرة القند ، بوقية الشكل ، بيضاء اللون ، عطرية العرف . بتلاتها ضيقة ، مستطيلة ، منتصبه ، ترتكز على الاطار التاجي حامل الاسدية || اشهر انواعه الزينية ما يلي .

٨٢٤٢ - **حلزة بحرية**
Pancratium maritimum (S). Pancratier maritime (F).

نوع من الحلزة . اوراقها بحرية النصل تطول من ٤٠ الى ٦٠ سم . وتعرض من ١٠ الى ٢٠ سم . || شراخها يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم . يحمل من ٣ الى ١٥ زهرة تطول من ١٠ الى ١٥ سم . بتلاتها خيطية مدببة . اطارها التاجي مسنن الحافة || ترغب في الشواطئ البحرية والمواقع القليلة الارتفاع || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

٨٢٤٣ - **حلزة تجنية**
Pancratium illyricum (S). Pancratier étoilé (F).

نوع من الحلزة . اوراقها بحرية النصل تطول من ٣٠ الى ٦٠ سم . وتعرض من ١٥ الى ٣٠ سم . || شراخها يعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم . يحمل من ٦ الى ١٥ زهرة تطول من ٦ الى ٨ سم . بتلاتها مدببة . اطارها التاجي سداسي الانقسام ثنائي التفريض المهرزي || ازهارها يستمر من نيسان الى حزيران .

٨٢٤٤ - **حلزون** Helix (S).
Escargot, Colimaçon, Limaçon (F). Helix, Snail (E). Schnecke (D).

ومنهم من دعاه القوقع . جنس حيوانات من الرخويات المهديات التي تعيش في صدفة . انواعه عديدة جميعها مؤذية قوتها مختلف المواد النباتية . منها انواع مأكولة تجمع وترعى في هذا السبيل || والحلزون يعيش نحو ٢٠ سنة وهو حيوان خنثوي يحمل الاعضاء الذكرية والانثوية لذلك فهو تارة ذكراً ويفعل فعله في كوم الانثى وتارة انثى ويفعل فعلها فيبيض بعد الكوم بأسبوعين نحو ٥٠ بيضة . لونها الى البياض الخزي ، يجعلها بين الصخور وتحت الحجارة وفي التربة فتنتفخ بعد وضعها بنحو ٢٥ يوماً || اشهر انواعه المأكولة والصالحة للتربية ما يتبع .

٨٢٤٥ - **حلزون أسود الفم**
Helix menalostoma (S). Escargot à bouche noire (F).

نوع من الحلزون متوسط القند مبتدل يكثر في المناطق الحارة . لونه امغر عابق يعلو ناذير حنطي منتظم . صفه من حيث الجودة والطعم يأتي في المرتبة الثالثة .

٨٢٣٤ - **حلحل ، بلبوس** Muscari
جنس نباتات بصلية عشية برية وزراعية من فصيلة الزنبقيات . انواعه نحو ٤٠ جميعها صغيرة القند . اوراقها قرصية ، عصفية الشكل ، لحمية النصل . ازهارها إيجانية او جلجلية الشكل يحملها شراخ اجوف || اشهرها واعرفها الحلحل الازب والجميل والصيني والعنقودي والمسكي والاناضولي .

٨٢٣٥ - **حلحل أزب* ، بلبوس الكلب ، بصبل الدثب**

Muscari comosum (S). Muscari chevelu, M. à toupet, Vaclet (F). Fair-haired hyacinth, Tassel hyacinth (E). Schopfmusk (D). Muscari, Cipolla canina, Giasinto mostruoso (I).

نوع من الحلحل يعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم . اوراقه عصفية طويلا يراوح من ٣٠ الى ٤٠ سم . عرضها ٢ سم . نصلها قدي الشكل مسنن الحافة ازهاره عنقود مستطيلة يراوح طويلا من ١٥ الى ٣٠ سم . يعلوها ضمة من الازهار العقيمة البفسجية اللون || ازهاره يستمر من نيسان الى تموز .

٨٢٣٦ - **حلحل اناضولي** Muscari aucheri (S).
Muscari d'Aucher, M. d'Anatolie (F).

نوع من الحلحل يعلو نحو ١٢ سم . اوراقه عصفية طويلا من ٥ الى ٨ سم . وعرضها من ٦ الى ٨ سم . ازهاره صغيرة القند عنقودية التجميع لا عرف لها . زرقاء اللون او بيضاء || ازهاره يستمر من اذار الى نيسان .

٨٢٣٧ - **حلحل جليل* ، بصبل الزيز ، قيسامة**
Muscari botryoïdes (S). Muscari botryoïde (F). Grape hyacinth (E). Kleiner musk (D). Muschini, Pentolini (I).

نوع من الحلحل يعلو من ١٠ الى ٣٠ سم . اوراقه عصفية ، منتصبه ، مخددة ، جامدة النصل البحري اللون . ازهاره كثيفة ، عنقودية التجميع ، هرمية الشكل . ضرابه عديدة منها الازرق والليلكي والايض || ازهاره يستمر من اذار الى ايار .

٨٢٣٨ - **حلحل عنقودي* ، بلبوس أزرق**
Muscari racemosum (S). Muscari à grappe (F). Clustered grape hyacinth, Strach hyacinth (E). Grosser musk (D). Muschino, Cipolla di serpe (I).

نوع من الحلحل يعلو من ١٥ الى ٢٥ سم . اوراقه عصفية أفقية الانتشاب ، مثالية الاطراف ، ضيقة النصل عرضه يراوح من ٢ الى ٣ سم . || ازهاره كبيرة القند زرقاء اللون العابق ، رائحتها رائحة الخوخ الناضج || ازهاره يستمر من اذار الى ايار .

٨٢٣٩ - **حلحل مسكي ، بلبوس مسكي ، بصبل المسك**

Muscari muscarini, M. moschatum M. macrocarpum (S). Muscari musqué, Jacinthe musquée (F).
نوع من الحلحل يعلو من ٢٠ الى ٣٠ سم . اوراقه عصفية مستطيلة ضيقة النصل الجميل الخضار الزاهي . ازهاره عنقودي التجميع يفيض الشكل . ازهاره ارجوانية ثم تنحرف الى الصفار الاخضر . عرفها عطري فواح . رائحتها رائحة المسك .

اسلية الشكل . زياہ النصل ، متصية الزغب الجامد .
عشكوله الزهري باهت اللون الاخضر .

٨٢٥٨ - حَلَفَاء رِيَشِيَّة Stypa pennata (S).
Stype mediterranéenne, Plumet, Herbe aux plu-
mets (F). Feather grass, Stipa (E). Federpfriemgras,
Pfriemengras (D). Sparto pennato, Pennine
paradise (I).

نوع من الحلفاء يعلو من ٦٠ الى ١٥٠ سم. اوراقه
مستطيلة الزغب الناعم الكثيف الذي يبدو كالريش .
عشكوله الزهري جميل الشكل سنبلاته تطول من ٤ الى
١٠ سم .

٨٢٥٩ - حَلَفَاء شَعْرَاء Stypa capillata (S).
Stype chevelue (F).

نوع من الحلفاء يعلو من ٤٠ الى ٨٠ سم. اوراقه تطول
من ٨ الى ٣٠ سم. لونها الى الاخضر العابق يعلو موج
ازرق || عشكوله الزهري اشعر السنبلات الحنطية
اللون . ينمو في جميع المناطق المعتدلة المناخ يرغب في
الارربة الفقيرة .

٨٢٦٠ - حَلَفَاء فِضِيَّة Stypa calamagrostis (S).
Stype argentée, Faux calamagrostis (F).
نوع من الحلفاء . يعلو من ٥٠ الى ٩٠ سم. اوراقه زياہ
النصل دقيقة وقصيرة التسنين . عشكوله الزهري فضي
اللون ينمو في الجبال والارربة الجصية .

٨٢٦١ - حَلَفَاء لَازِبَة Stypa tenacissima (S).
Alfa, Sparte, Stype tenace (F). Alfa grass, Esparto
grass (E). Espartopfriemengras, Spartogras (D).
Stipa, Sparto, Giunco di Spagna (I).
نوع من الحلفاء . يعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه
ملساء البشرة . عشكوله الزهري اصفر اللون كثيف
التجميع والرصف يبدو كالسنبل طوله من ١٨ الى ٣٠ سم.
ينمو في الاراضي القاحلة يكثر وجوده في شمالي افريقية
وفي اسبانيا .

٨٢٦٢ - حَلَفَاء مَكَرَدَة Stypa gigantea (S).
Stype géante (F).
نوع من الحلفاء يعلو من ٧٠ الى ١٢٠ سم. اوراقه
تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. عشكوله الزهري بيضي
الشكل يطول من ٣٠ الى ٦٠ سم. سنبلاته زياہ
البشرة لونها الى الاخضر الزاهي .

٨٢٦٣ - حَلَق ، حُلُقُوم ، حَنْجُرَة Gorge, Gosler (F). Throat, Gullet (E).
هو مساع الطعام والشراب في المريء . ج أحلاق وحلوق
وحلاقيم وحناجر .

٨٢٦٤ - حَلَق الحلق : شجر الكرم يجعل ماؤه في المصفر فيكون
اجود من ماء الرمان (اقرب الموارد) .

٨٢٦٥ - حَلَق ، بَجَل ، دُورِين Dourine
داء معد يصيب الخيل والحصير سببه دودة ثعبانية من
النقيمات تعيش في الدم قوتها الكرويات الحمر .

٨٢٦٦ - حُلُقُوم هو الحلق ، اطلبه .

٨٢٤٦ - حَلَزُونُ أَشْهَب * Helix aspersa (S).
Escargot chagriné, Cagouille, Huma, Tapada, Petit
gris (F). Common snail, Speckled snail (E). Kel-
lerschnecke (D).

نوع من الحلزون لونه الى الريدة ، متوسط القد ، سريع
النمو يأتي بعد الحلزون الكرمي من حيث جودة الصنف .
يكثر وجوده في الاراضي البور .

٨٢٤٧ - حَلَزُونُ أَطْحَل Helix aperta (S).
Escargot naticoide (F).
حلزون كبير القد ، اطحل اللون يكثر في الاراضي الجبلية
الصخرية . يعتبر من الاصناف الجيدة التي تعادل
الحلزون الكرمي . تربيته سهلة لكنه قليل النتاج .

٨٢٤٨ - حَلَزُونُ بُسْتَانِي Helix hortensis (S).
Escargot des jardins (F). Garden snail (E).
Hainschnecke (D).
نوع من الحلزون متوسط القد ، لونه الى الاصفر الليموني
المؤذر بالاسود . يأتي في المرتبة الثالثة من حيث جودة
الصنف لكنه سهل التربية وكثير النتاج .

٨٢٤٩ - حَلَزُونُ كَرْمِي * Helix pomatia (S).
Escargot vigneron, E. de vigne (F). Grapvine
snail (E). Weinbergschnecke (D).
اجود انواع الحلزون والذها طعماً واكبرها قدماً . لونه الى
الصهبة الصفراء تنحرف مع العمر الى البياض . يكثر
في الكروم والمراعي والغابات .

٨٢٥٠ - حَلَزُونُ بَحْرِي Hallotide (F).
Sea-ear, Ear-shell (E).
راجع اذن البحر .

٨٢٥١ - حَلَزُونِي ، لَوْتِسِي Spiral
لمت تعريفي يطلق على ما هو حلزوني الشكل .

٨٢٥٢ - حَلَزُونِيَّات Helicidae (S).
Hélicidés (F). Helicidae (E).
فصيلة حيوانية من الرخويات المعدية الرئوية . اجناسها
وانواعها عديدة تتميز بخشواتها الطليقة وبدروعها الصدفية
المختلفة الاشكال والاحجام والالوان .

٨٢٥٣ - حَلَزُونِيَّاتُ الْبَحْرِ Hallotidés (F).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مشهورة باسم آذان
البحر ، اطلبها .

٨٢٥٤ - حَلَزُونِيَّة Spirille (F). Spirillum (E).
هي المتسجعة ، اطلبها .

٨٢٥٥ - حَلَس Brun-rouge (F). Red brown (E).
الحلس : ما كان لونه بين السرة والحمرة .

٨٢٥٦ - حَلَفَاء * ، حَلَقَة ، حَلَفَة Stypa (S). Stype, Stipe (F). Stypa (E).
الحلفاء جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة
النجيليات . انواعها عديدة . اوراقها مستطيلة خيطية او
اسلية النصل يلتف بعضها على بعض تصلح لصناعة
الحصر والقنف والحبال . أشهر انواعها ما يلي :

٨٢٥٧ - حَلَفَاء أُسْكِيَّة Stypa juncea (S).
Stype jonciforme (F).
نوع من الحلفاء يعلو من ٤٠ الى ٨٠ سم. اوراقه



حلزون أشهب



حلزون اطحل



حلزون كرمي



حلفاء

٨٢٨٢ - حُلُوس * ، حَوَلَس

Cyclanthera edulis (S).

Cyclanthere comestible (F).

نبات عشبي حولي عارض من فصيلة القرعيات. مهدد بعض مناطق أمريكا الجنوبية. ساقه تطول نحو خمسة أمتار. حوائقها لامشعبة. أوراقها معتقة، خماسية أو سباعية الفصوص السنانية الشكل. نصالها مسنة الختار، مبعثرة الزغب. أزهارها صغيرة القد صفراء اللون خضراء المواجه. ثماره مستطيلة، شبه بيضية الشكل لونها إلى الخضار البحري، طعمها كالخيار تؤكل طازجة وتخلل.



حلقة

٨٢٨٣ - حُلُوسِيَا

Adragant (F).

Gum-tragacanth plant (E).

Potamochoerus, Chœropotamus (S).

Potamochère, Chœropotame (F).

River hog (E).

جنس حيوان من فصيلة الخنزيريات أنواعه خمسة موطنها البلاد الإفريقية ومدغشكر. رؤوسها مخروطية تتميز بمجموعة من التآليل تعلو فئاطيسها المستطيلة. أذناها منتصبة ذلقة، جلودها كثيفة الهلب القصير. عفارها تبنية اللون طويلة الهلب تمتد من القف من آخر ثنيج الظهر. أنثاها أصغر حجماً من ذكورها وهي تحمل أربعة أطياء بدلاً من ١٤ كما هو في الخنزير. حملها يدوم أربعة أشهر وتضع أربعة خنايص || أعرف أنواعه الثلاثة التالية.



حلوس

٨٢٨٥ - حُلُوف إفريقي

Potamochoerus africanus, Chœropotamus larvatus (S).

Potamochère africain (F).

نوع من الحُلُوف موطنه إفريقية الشرقية والغربية. جسمه كبير القد طوله نحو ١٦٠ سم. علوه ١٠٠ وذنبه ٤٠ سم. ثوبه إلى السمرة. عفرته وخصله حنكه تبنيتان || يألف المناطق والمقاصب والأراضي المزروعة. قوته الجذور والثمار والحبوب. يعيش جماعات كبيرة يراوح عددها من ٤٠ إلى ١٠٠.

٨٢٨٦ - حُلُوف غينية

Potamochoerus penicillatus (S).

Potamochère de la Guinée, Potamochère à pinceaux (F).

نوع من الحُلُوف موطنه غينية والسنغال والكنغو... جسمه كبير القد طوله نحو ١٨٠ سم. علوه ١٢٠ وذنبه ٤٠. ثوبه إلى الصهبة عفرته وخصل حنكه وأذناه وذنبه إلى البياض || يألف المناطق وضياف الأنهر والأحراج الرطبة. قوته الجذور والثمار والحبوب. يعيش جماعات كبيرة يراوح عددها من ٤٠ إلى ٢٠٠.



حلوف غينية

٨٢٨٧ - حُلُوف مدغشكر

Potamochoerus Edwardsii (S).

Potamochère d'Edwards (F).

نوع من الحُلُوف موطنه مدغشكر. جسمه متوسط القد طوله نحو ١٢٠ سم. علوه ٨٠ وذنبه ٣٠. ثوبه مختلف الألوان، ظهره قرني، عفرته بيضاء. بطنه أسمر. محسراه وقوائمه سود، أذناه خالية من الخصل || يعيش جماعات متوسطة العدد قوته الجذور والثمار والحبوب.

Cisse (F).

Sorrel-vine (E).

هو السلق نبات عارض من الكرميات.

Dialyse (F).

Dialysis (E).

هو الميز تعبیر كباوي قوامه تقريق المواد البلورية



حلوف مدغشكر

٨٢٩٧ - حُلُقُومِي ، بُلُقُومِي

Pharynglen (F).

Pharyngeal (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالحلقوم.

٨٢٩٨ - حُلُقُومِي القَم

Cricostome (F).

نعت تعريفي يطلق على كل حيوان مستدير القم.

٨٢٩٩ - حُلُقُومِيَات

Annélidés (F).

Annelida (E).

صف من الديدان عديد الفصائل والاجناس والانواع تجمعها بعض الرتب إلى طائفتين الحفرديات والعلقيات.

٨٢٧٠ - حُلُقُومِيَات الأفواه ، ماصات

Cyclostome (F).

Cyclostomata (E).

رتبة من الاسماك الغضروفية وهي أذناها وأليها تنسب الجلكيات والحماطيات.

٨٢٧١ - حُلُقُومِيَة

Annelide (F).

Annelid (E).

مرتبة من رتبة العظائيات فصائلها واجناسها عديدة معظمها يعيش في التربة كالحراطين وما أشبه.

٨٢٧٢ - حُلُكَة * ، حُلُكَاء ، حُلُكِي ، حُلُكَاء

Chalcide

دوبية شبيهة بالعظاية زرقاء اللون تترك وليس لها ذنب طويل وقوائمها خفيفة تنعوص في الرمل. وهي من فصيلة السقشوريات.

٨٢٧٣ - حُلُل

Décomposer (F).

To decompose (E).

الحلم هي القردان الصغيرة وقيل الضخمه. واحدتها حلقة.

٨٢٧٤ - حُلُم

Tiques (F).

Ticks (E).

الحلم هي القردان الصغيرة وقيل الضخمه. واحدتها حلقة.

٨٢٧٥ - حُلُمَة

Trayon (F).

Dug, Teat (E).

الثلول في وسط الثدي يمتص منه الحليب وهما حلستان في الحيل والغنم والماعز. وأربع حللات في البقر وثمان حللات فاكتر في السنوريات.

٨٢٧٦ - حُلُمَة

Lithosperme (F).

Corn-gromwell (E).

هي شجار الحقل، اطلبه.

٨٢٧٧ - حُلُمُوش

Myrte (F).

Myrtle (E).

هو الآس، اطلبه.

٨٢٧٨ - حُلُمِي

Mamillaire (F).

Mamillary (E).

ما كان شكله كالحلقة.

٨٢٧٩ - حُلُمِيَّات

Acarlens (F).

Acarina (E).

هي القراديات رتبة حشرات من صف العنكبوتيات.

٨٢٨٠ - حُلُوبَة ، حُلُوب

Laitière (F).

Milch, Milker (E).

البقرة الحلوبة هي الغزيرة الحليب. يقال بقرة حلوبة وبقر حلوب وحلوبة || ويقال للبقرة الحلوبة: حوارة درور، غزيرة، ثرة، لبنة، لبون || ويقال للبقرة القليلة الحليب: بكثة، جداء، سهول، الخ.

٨٢٨١ - حُلُوءَة ، معقَد ، بَنَكِرِيَّاس

Pancréas (F).

Pancréas, Sweetbread (E).

غدة كبيرة بجذاء المعدة تفرز في الاسماء عصارة دبقه خاصة ضرورية للهضم.

Lait en poudre (F).
Powder milk (E).

هو الحليب الجاف المسحوق الذي فصل عنه كل ما يحوي من ماء ومنهم من سماه حليباً مسحوقاً .

Assa foetida (F).
Asafoetida (E).

هو صمغ الأنجذان ، اطلب حلتيت .

Spirula (S).

Spirule (F). Spirula (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الأرجل وفصيلة الحلزريات || أنواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة . بعض أنواعه يعيش على الشواطئ الرملية المغشوة والبعض الآخر يعيش في الأعماق || اصداؤها صغيرة ، أنبوية الشكل ، داخلية الارتكاز ، وحيده القلب ، يغلفها الجسم . رؤوسها شبه مستديرة عيونها جاحظة . جرامزها متفاوتة الطول ، مجهزة بمحاجم دقيقة .

Spirulidae (S).

Spirulidés (F). Spirulidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الأرجل ، مزدوجات الخياشيم ، عشاريات الجرامز || اجناسها وأنواعها المعروفة قليلة العدد ، معظمها من متحجرات الازمنة الغابرة || اعرف اجناسها المعاصرة وأكثرها انتشاراً يدعى حلز .

Halme, Pourpier de mer (F).
Sea-orache (E).

هو المريق البحري ، اطلبه .

Papille (F). Papilla (E).

حلمة صغيرة .

Papilliforme (F). Papilliform (E).

ما كان شكله شكل الحليمية .

٨٣٠٦ - حَمَّ* ، حَمِيمَة ، خَصِيَّانَ الجَمَلِ ، كَرْنَبَ الجَمَلِ ، موريكنديا

Moricandia (S). Moricandle (F). Moricandia (E). Feld moricandle (D). Moricandia (I).

جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الصليبيات . أنواعه المعروفة ستة جميعها برية ملساء متعاقبة الاوراق الكاملة التركيب . ازهارها صغيرة القد ، عريضة ، بنفسجية اللون .

Vase (F). Slime (E).

مزيج من التراب والمواد العضوية والنباتية يرسب في المناطق وبحاري الماء . وهو غني بالازوت .

Basilic velu (F).

هو الحبق الورب ، اطلبه .

٨٣٠٩ - حِمَار* Equus asinus (S). Ane (F). Ass (E).

حيوان داجن من فصيلة الخيليات . ج حير وحر وأحمره . الانثى حمارة واثان . كنيته كما جاء في الجاحظ : ابو صابر وابو زياد ويقال للحمارة ام محمود وام تولب وام جمش وام نافع وام وهب || وهو حيوان قنوع نافع يحمل ويحمر . هادئ ، صبور وبطيء في سيره . جهان في خلقه وحروك

من التروية او عزلها بواسطة مصفاة دقيقة المسام تسمح بمرور المواد البلورية الى الماء .

٨٢٩٠ - حُلُولُ الْأَجَل ، إِسْتَحْقَاق

Echéance (F). Falling due (E).

هو التاريخ الذي يصبح فيه الالتزام واجب التنفيذ .

٨٢٩١ - حُلُو مُرّ Douce amère (F). Felon-wort (E).

حلور مر ويدعى حلوه مره هو الثلثان ، اطلبه .

٨٢٩٢ - حُلُون ، تريبسين Trypsine (F).

خيرة تفرزها الحلوة تحلل المواد البروتينية . Trypsin (E).

٨٢٩٣ - حُلِيَاء* Lallémantia (S).

Lallémantie (F).

جنس نباتات عشبية حولية ومحولة من فصيلة الشفويات . انواعها المعروفة قليلة العدد مهدا الشرق الاوسط حيث تنبت طويلاً في معظم المناطق الجبلية || سوقها زباء تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقها متعاقبة خلية النصال المنقطة الضيقة الصغيرة . ازهارها سنبل التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهارها صغيرة ، زرقاء اللون او بيضاء || الفارق بين الانواع يقوم على شكل النصال وتسنيها وعلى لون الازهار . اعرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية :

٨٢٩٤ - حُلِيَاء إيبيرية L. iberica (S). L. d'Ibérie (F).

٨٢٩٥ - حُلِيَاء بَيْضَاء L. canesens (S). L. blanchâtre (F).

٨٢٩٦ - حُلِيَاء هِلَالِيَّة L. peltata (S). L. peltée (F).

٨٢٩٧ - حَلِيب ، دَرّ ، لَبَن ، رَسَل ، شِخَاب

Lait (F). Milk (E).

سائل كثيف ابيض اللون جليل القيمة الغذائية تفرزه اثناء وضروع اناث الحيوانات البوثة || يستعمل على حاله الطبيعية كغذاء كامل التركيب كما يستعمل في صناعة الالبان والاجبان ولاستخراج السن والزبدة . والجدول التالي يوجز ملخص تركيبه مع المقارنة بين مختلف مصادره .

المادة	الحجر	الناقة	الاثان	البقرة	العزرة	النمجة
ماء	٨٩,٠٠	٨٩,٢٠	٨٩,٣٠	٨٧,٥٠	٨٧,٠٠	٧٩,٩٧
عناصر ازوتية	٢,٦٠	١,٩٢	١,٢٣	٣,٦٥	٣,٩٠	٦,١٨
عناصر دهنية	٢,٤٠	٢,٢٥	٢,١٠	٣,٥٠	٤,٠٠	٧,٤٦
لكتوز (سكر الحليب)	٥,٥٠	٦,٢١	٦,٩٢	٤,٦٠	٤,٣٠	٥,٣٧
املاح معدنية	٠,٥٠	٠,٤٨	٠,٤٥	٠,٧٥	٠,٨٠	١,٠٢
الخلاصة الجافة	١١,٢٠	١١,٤٥	١١,٧٠	١٢,٥٠	١٣,٠٠	١٩,٩٧
الثقل النوعي	١٠٣١	١٠٣٢	١٠٣٢	١٠٣٢	١٠٣٠	١٠٣٨

٨٢٩٨ - حَلِيب مُكثَّف ، حَلِيب مُجَرَّد

Lait condensé, Lait concentré (F). Condensed milk, Concentrated milk (E).

هو الحليب الذي فصل عنه ، بطريقة ما ، جزء من مائه .



طوله نحو ٢٠٠ سم. وارتفاعه ١٣٠. يتميز بثوبه القليل التأذير. لونه الى الصهبة يزداد عبقاً مع اقترابه من الصدر والرأس ويقل عند البطن والكفل. بطنه وذيله وداخل قوائمه الى البياض الاربد.



حمار

٨٣١٨ - حِمَار الشَّبِي (Baudet (F), Donkey (E).
هو العير، الحمار الفحل المنتخب الذي يصلح للزور.

٨٣١٩ - حِمَار النُوبَةِ (Equus asinus africanus (S),
Ane de Nubie (F).
ضرب من الحمار تنسب اليه سلالات حمار الصومال والحبشة ومصر || اعطاه بوادي النيل الشرقية من مصوع الى كسالة وشلال النيل الخامس.

٨٣٢٠ - حِمَار الوَحْشِ* ، حِمَار وَحْشِي، أَخْدَر،
قَرَاء (Equus onager (S), Onagre (F),
Onager, Wild ass (E).

جنس حيوانات برية من فصيلة الخيليات. موطنه بلاد ايران والافغان وتركستان وجوارها. يشبه الحمار ولكن في هيئة منسوبة ومنسجمة يقر النوق امتيازها وتفوقها. يعيش جماعات ويوصف بشدة الغيرة وكثرة الحرس والحذر. قال الجاحظ: «الوان حمار الوحش مختلفة. والاشدية اطولها عمراً واحسنها شكلاً وهي منسوبة الى اخدر فحل كان لكسرى فتوحش واجتمع بعانات فضرب فيها فالتولد منها يقال له اخدري.»

٨٣٢١ - حِمَار جَنُوبِي (Ascellus australis
الحمار الجنوبي نجم نير من كوكبة برج السرطان. ويدعى بها السرطان.

٨٣٢٢ - حِمَار شَمَالِي (Ascellus borealis
الحمار الشمالي نجم نير من كوكبة برج السرطان. ويدعى دلتا السرطان.

٨٣٢٣ - حِمَار قَبَان* ، حِمَار البَيْت، عَيْبَر قَبَان،
هَدَبَة (Oniscus asellus (S),
Cloporte commun (F), Woodlouse, Sow bug (E),
Mauerasel, Gemeine Mauerasel (D).
حشرة من القشريات صغيرة القد مبدولة تعيش في الاماكن الظليلة الرطبة. يكثر وجودها في المنازل الارضية.

٨٣٢٤ - حِمَارَة ، عَانَة ، أَتَان (Anesse (F),
She-ass (E).
انثى الحمار. ح ح حائر وعانات وأن. ردتها يعاود كل ٢٥ يوماً. محبلها يستقيم ٣٦٠ يوماً. يجوز الزور عليها بعد وضعها بعشرة ايام.

٨٣٢٥ - حِمَارَة (Astringence (F), Astringency (E).
حموضة لاذعة فيها حدة رقبض

٨٣٢٦ - حِمَامَس (Stenocarpus (S),
Sténocarpe (F), Stenocarpus (E).
جنس نباتات شجرية وجنبية معمرة من فصيلة الفصيات. انواعه المروفة قليلة العدد. موطنها البلاد الحارة || جميعها برية وتزرع للزينة. اوراقها ابيدة. ازهارها ملونة جميلة. ثمارها حنابل صغيرة || اعرف انواعها الزينية الحامس الصفصافي الورق والحامس المقور الورق.

اذا اشتد به الازى. قامته متوسطة، شكله مستطيل. ظهره قوي، رأسه متناسب مع جسمه، اذناه كبيرتان مستطيلتان، عنقه عريض، جلده سميك، وبره خشن وقصير، قوائمه قوية تنتهي بخوافر ضيقة الصحن صلبة. ضروبه عديدة اشهرها: حمار الثبت. او حمار العجم وحمار الجزيرة وحمار النوبة وحمار توسكانا وحمار صقلية.

٨٣١٠ - حِمَار أُرُوبِي (Equus asinus europæus (S),
Ane d'Europe (F).

سلالة من الحمار يقال انها متحدرة من حمار النوبة وحمار ما بين النهرين. يكثر وجودها في بعض بلاد اوروبا كفرنسة واسبانية وإيطالية.

٨٣١١ - حِمَار البَحْرِ (Latès du Nil
هو لاطس النيل، اطلبه.

٨٣١٢ - حِمَار البَيْت (Cloporte commun (F),
Woodlouse (E).
هو حمار قبان، اطلبه.

٨٣١٣ - حِمَار الزَرْدَة* ، زَرْدَة ، عَتَّافِي (Equus zebra; Hippotigris (S), Zèbre (F), Zebra (E).
جنس حيوانات برية من فصيلة الخيليات. تعتبر من اجمل حيوانات فصيلتها بعد الخيل وهي اعنفها قوة واشدها مرأساً واسرعها عدواً || جلودها ناعمة طحلاء اللون مؤذرة بخطوط سود من الجحفة حتى الاطراف || موطنها افريقية الشرقية من الصومال الى القطب. تعيش قطعان قليلة او متوسطة العدد ولكل قطيع رئيس يسهر عليه هو نعله الصائد. قوتها الاعشاب. انثاها تحمل ٣٦ يوماً. انواعها اربعة اما ضروبها وسلالاتها فعديدة.

٨٣١٤ - حِمَار الزَرْد البُرْشَلِي ، بِيْشَة (Hippotigris burchelli (S), Zèbre de Burchell, Pitsché,
Bonte quagga (F).

موطنه الاصقاع الافريقية القائمة جنوبي خط الاستواء. ضروبه وسلالاته عديدة. طوله نحو ١٨٥ سم. وارتفاعه ١٢٠. يتميز بشكله القريب من شكل الخيل. ثوبه الى الصهبة الصفراء يعلوه تأذير عريض الخطوط اسود اللون. رأسه يشبه رأس الحصان. اذناه صغيرتان. عرقه كثيف الور المتوسط الطول. بطنه الى البياض التبي يتوسطه خط عابق.

٨٣١٥ - حِمَار الزَرْد الجَبَلِي ، ضُو (Hippotigris montanus (S), Zèbre de montagne,
Daw (F).

موطنه يمتد من صحراء كارو الى حدود القطب. ثوبه الى البياض التبي يعلوه تأذير اسود لامع. قامته ربة، اذناه كبيرتان، عرقه كثيف الشعر القصير. ذيله ذيل الابل.

٨٣١٦ - حِمَار الزَرْد الصُومَالِي (Hippotigris grevyi (S),
Zèbre de Grévy, Z. des Somalis (F).

موطنه الصومال وبلاد شوا. طوله نحو ٢٠٠ سم. وارتفاعه ١٢٥. ثوبه الى البياض الاربد يعلوه تأذير جزوي اللون اسود الموج.

٨٣١٧ - حِمَار الزَرْد الهُوْطَنْشِي (Hippotigris quagga (S), Zèbre couagga (F).
موطنه البلاد الواقعة بين حوض الغال وسلسلة جبال القطب.



حمار الزرد



حمار الوحش



حمار قبان

الوريقات زباء النصل. ازهاره مظلية التجميع زرقاء اللون زباء الصفحة الخارجية يحملها شراخ اجوف منتصب يعلو من ١٠ الى ٣٠ سم. || ازهاره يستمر طوال فصل الربيع.

٨٣٣٤ - حماس إسبانيحي Oseille épinard (F).
Spinach-dock (E). هو حمض الحقل، اطلبه.

٨٣٣٥ - حماس أصفر* ، حماس قرني، حمضض Oxalis corniculata (S). Surelle corniculée, S. jaune, Oxalide corniculée (F) Procumbent oxalis, Yellow wood-sorrel (E). Gehörnter sauerklee, Gelber sauerklee (D). Ossalide corniculata, Erba Iujula (I). نوع من الحمض الحولي والحول. ضروبه عديدة. يكثر في الاماكن الرطبة ويعتبر من النباتات الضارة. يعلو من ٢٥ الى ٣٠ سم. جلوره دقيقة. ساقه مورقة. اوراقه ثلاثية الوريقات القلبية الشكل. ازهاره صفراء اللون || ازهاره يستمر من نيسان الى تشرين.

٨٣٣٦ - حماس الحقل هو حمض الحقل، اطلبه.

٨٣٣٧ - حماس السواقي هو حمض السواقي، اطلبه.

٨٣٣٨ - حماس العيد* ، بقلة حمامضة ، أقصليس صغير

Oxalis acetosella (S). Surelle petite-oseille, Alleluia, Pain-coucou, Oseille des bois (F). Wood-sorrel, Alleluia, Cuckoo bread (E). Echter sauerklee, Alleluja (D). Ossalide acetosella, Alleluia, Pan cucco (I). نوع من الحمض المعمر المبدول والمتبقل. يستخرج من عصارة اوراقه وضلوعه الحمض الحامضي || يعلو من ٥ الى ١٠ سم. جذاميره حشفية مدادة. اوراقه ثلاثية الوريقات القلبية الشكل. ازهاره بيض يعلوها تمشيق وردي او بنفسجي او احمر او ازرق || ازهاره يستمر من نيسان الى ايار.

٨٣٣٩ - حماس الماء هو البث، اطلبه.

٨٣٤٠ - حماس أنيق Oxalis elegans (S).

Surelle élégante (F). نوع من الحمض المعمر. يعلو نحو ١٥ سم. اوراقه ثلاثية الوريقات. نصلها بنفسجي الصفحة السفلى تعلو غديلات صغيرة مبعثرة. ازهاره كبيرة القد، أرجوانية اللون غدية السبلات || ازهاره يستمر طوال شهر تموز.

٨٣٤١ - حماس بنفسجي Oxalis violacea (S).

Surelle violette (F). نوع من الحمض المعمر. يعلو نحو ١٠ سم. اوراقه ثلاثية الوريقات المستعرضة. ازهاره بنفسجية اللون عشكولية التجميع يحملها شراخ اجوف يعلو من ١٠ الى ١٨ سم. ازهاره يستمر من ايار الى حزيران.

٨٣٤٢ - حماس تساعي الوريقات Oxalis enneaphylla (S). Surelle à 9 folioles (F).

نوع من الحمض المعمر. يعلو نحو ١٠ سم. اوراقه تساعية الوريقات المحروطية الشكل، البحرية اللون. ازهاره زباء، فردية، بيضاء او وردية اللون يعلوها تمشيق احمر. ازهاره يستمر طوال الصيف.

٨٣٢٧ - حماس صفصافي الورق Stenocarpus salignus (S). Sténocarpe à feuilles de saule (F). نوع من الحماس. ساقه فرعاء رفيعة تعلو من مترين الى ثلاثة امتار. اوراقه ابيدة، سنائية النصل كاوراق الصفصاف، تطول من ٥ الى ١٠ سم. ازهاره صيواني التجميع. ازهاره الى الخضار المشوب بالاصفر.

٨٣٢٨ - حماس مقور الورق* Stenocarpus sinuatus (S). Sténocarpe sinué (F).

نوع من الحماس. ساقه فرعاء رفيعة تعلو من ٢٠ الى ٣٠ متراً. اوراقه معتقة كبيرة النصل الثانية او الثلاثية او الرباعية الفلق. ازهاره صيواني التجميع، محوري الارتكاز. ازهاره الى الحمرة الارجوانية تطول نحو ٣ سم. تنويره يستمر من حزيران الى تموز.

٨٣٢٩ - حماسة ، بياح أسود Lutjanus atra (S). Lutjan noir, Tétragonure, Muge noir (F). Black Mullet (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة السرانيات شائكات الزعانف. اعطانها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط. يكثر وجودها في الخلجان وقرب مصبات الأنهر || جسمها شبه وشي الشكل يطول نحو ٣٥ سم. ثوبها الى السمرة الجزوية يميل ويسود مع اقترابه من ثيج الظهر. رأسها معتدل الحجم، مخروطي الشكل، معتدل الخطم. فكها كبيران، متساويان. شدقها واسع الانفراج. اسنانها صغيرة، ذوبة. عيناها معتدلتا الحجم والنشوز || زعانفها متباينة الاشكال والاحجام، الظهرية والشرجية لامتساوية التدرج والمناخس زعنفتها الذيلية فارقة || لحمها اسمر اللون، متوسط الصنف، مأكول.

٨٣٣٠ - حماس Oxalis (S). Oxalide, Surelle (F). Oxalis (E).

جنس نباتات عشبية برية وزراعية من فصيلة الحماسيات انواعه المعروفة لا تقل عن ٢٠٠ منتشرة في جميع الاصقاع العالمية. اوراقها معتقة مركبة متعاقبة منها ثلاثية الوريقات ومنها عديدةتها. ازهارها فردي او عشكولي او مظلي التجميع. ازهارها مختلفة الالوان منها الاصفر والابيض والارجواني || اعرف انواعه واشهرها ما يلي.

٨٣٣١ - حماس أجنح Oxalis cernua (S).

Surelle penchée (F). نوع من الحمض المعمر. اوراقه ثلاثية الوريقات. وريقاته ثنائية التفصيص. ازهاره مكبسة، مظلية التجميع صفراء اللون يجمعها شراخ اجوف يعلو من ١٠ الى ٣٠ سم. || ازهاره يستمر من تشرين الثاني الى ايار.

٨٣٣٢ - حماس أرجواني* Oxalis purpurata, Oxalis anthelmintica (S). Surelle pourpre (F).

نوع من الحمض المعمر. جثته غليظ متشعب. اوراقه رجيية الشكل. نصلها ازغب الصفحة السفلى. ازهاره عشكولية التجميع، أرجوانية او بيضاء اللون، يحملها شراخ يعلو نحو ٢٥ سم. || ازهاره يستمر شهراً واحداً بين تموز وآب.

٨٣٣٣ - حماس أزغب ، حماس زهري Oxalis lasiopetala, O. floribunda (S). Surelle value (F).

نوع من الحمض المعمر. جثته لين غليظ. اوراقه ثلاثية



حماس مقور الورق



حماس ارجواني



حماس اصفر



حماس العيد



حماض عسقلولي



حماض مفصص



حماط الاجاص



حماط التفاح

٨٣٥١ - حُمَاضِيَّاتُ Oxalidae (S).

Oxalidées (F). Oxalidae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين. نباتاتها عشبية صغيرة القد. أوراقها مركبة. أزهارها مجموعة أو فردية، خماسية البتلات، عشارية الاسدية. اجناسها قليلة اما انواعها وضروبها فكثيرة العدد. مهددا جميع الاصقاع العالمية.

٨٣٥٢ - حِمَاطُ، حُطُوطُ Psylla (S). Psylla (F).

Snake-charmer (E).

جنس حشرات مضرة من فصيلة الحماطيات ورتبة متجانسات الاجنحة. انواعه عديدة جميعها صغيرة القد مستطيلة الاجنحة قوية المنك الثاقب. برقاتها مفلطحة مستعرضة قليلة الحركة بعضها يفرز مواد زيتية تشبه ندف القطن الابيض وبعضها يفرز عصارة عسلية لزجة. جميعها تعيش على اوراق النبات وزعماته ونواحيه فتؤذيه اشد الاذى || اناثها اكبر قدماً من ذكورها. تمتح مكنتها في شقوق اللحاء. اجيالها الحولية تختلف مع الانواع وقد تراوح من الجيل الواحد الى ستة اجيال. اشهر واضر انواعه ما يتبع.

٨٣٥٣ - حِمَاطُ الإِجَاصِ* Psylla pyricola (S).

Psylle du poirier (F). Pear psylla (E). Birnblattfloh, Birnblattsauger (D).

يركب الاجاص فيؤذيه في زعماته ونواحيه واوراقه. يراوح طول الحشرة الكاملة من ٢ مم. ويخط واحد الى ٢ مم. وثمانية خطوط. ثوبها برتقالي اللون يملوه نقط سمر. رأسها عريض. زباناها دقيقة طويلة. سوقها الخلفية لا هليية || اجيالها الحولية تراوح من اربعة الى خمسة. الانثى تعيش نحو ٨٥ يوماً وتبيض نحو ٤٨٠ مكنة. ينقف المكن بعد متعه باسبوع في زمن الصيف وبعد ثلاثة اسابيع في تشرين وبعد اربعة اسابيع في اذار. البرقة تمر باربعة السلاخات. الجيل الكامل من المكنة الى المكنة يستمر من ٣٠ الى ٤٦ يوماً.

٨٣٥٤ - حِمَاطُ الإِجَاصِ الغليظ Psylla pyrisuga (S).

Gros psylle du poirier (F).

يركب الاجاص فيؤذيه. موطنه فسيح الارعاء يمتد من شمالي اوروبه الى اليابان || الحشرة الكاملة صغيرة القد، طولها يراوح من ٢ مم. وخمسة خطوط الى ٤ مم. || البرقة خضراء اللون وخزها يسبب التلف الاوراق.

٨٣٥٥ - حِمَاطُ الإِجَاصِ المُدَخِّن Psylla pyri (S).

Psylle enfumée du poirier (F).

يركب الاجاص فيؤذيه. موطنه البلاد الباردة. يكثر في روسيا وفنلنده والسويد والناروج. وهو صغير القد طولها نحو ٢ مم. وخمسة خطوط. ثوبه الى البرتقالي الزاهي. اجنحته شفافة يملوها وشاح غبش كالدخان.

٨٣٥٦ - حِمَاطُ البَقَسِ Psylla buxi (S).

Psylle du buis (F).

نوع من الحماط يركب البراعم والزعمات الطرفية فيسبب اتملاصها بعد ان ينطقها بندفه القطني الابيض اللون.

٨٣٥٧ - حِمَاطُ التُّفَاحِ* Psylla mali, P. dubia, P. crataegicola, P. viridissima (S).

Psylle du pommier (F). Apple sucker (E). Apfelblattfloh, Apfelblattsauger (D).

يركب زعمات وبراعم ونواحي واوراق التفاح ولا يعف

٨٣٤٣ - حُمَاضُ حَشِينِ Oxalis hirta (S).

Surelle rude (F).

نوع من الحماض المعمر. يملو من ٨ الى ١٠ سم. عساقله بيضية صغيرة القد، قشورها حرشفية حراشفها سود. اوراقه ثلاثية الوريقات الحيطية الشكل الضمية التجميع. ازهاره فردية محورية ليلكية او بنفسجية اللون صفر القاعدة || ازهاره يستمر من شباط الى اذار.

٨٣٤٤ - حُمَاضُ رُبَاعِيَّ الُورِيَقَاتِ Oxalis tetraphylla (S).

Surelle à 4 folioles (F).

نوع من الحماض المعمر يزرع لعساقله المأكولة. يملو من ١٥ الى ٣٥ سم. اوراقه رباعية الوريقات الكبيرة القد العريضة. نصلها ازغب الصفحة السفلى، بحري اللون موشح بخطوط أرجوانية. ازهاره مظلية التجميع متدلية لوها الى البنفسجي الزاهي او الاحمر النحاسي. عساقله كبيرة القد، بيضاء اللون، مأكولة || ازهاره يكون في حزيران.

٨٣٤٥ - حُمَاضُ عُسْقُولِي*، أَقْصَالِيْسُ عُسْقُولِي Oxalis tuberosa, O. crenata (S).

Surelle oca, S. tubéreuse, Oxalide crénelée (F). Oxalis, Oca of Peru (E). Sauerklee (D). Ossalide crenata, Acetosella (I).

نوع من الحماض المعمر الامريكي الاصل يزرع لعساقله المأكولة واوراقه المتبقلة. يملو من ٢٠ الى ٤٠ سم. جذوره عسقلوية. عساقله بيضية الشكل تطول نحو ٤ سم. وتعرض نحو ٣. ساقه منتصب. اوراقه ثلاثية الوريقات القلبية الشكل، الزباء النصل. ازهاره عشكولية التجميع مشقة بالاحمر || ازهاره يستمر من ايار الى ايلول.

٨٣٤٦ - حُمَاضُ مُتَكَوِّن Oxalis variabilis (S).

Surelle variable (F).

نوع من الحماض المعمر. يملو من ٨ الى ١٠ سم. اوراقه ثلاثية الوريقات المحروطية الشكل. ازهاره كبيرة القد ارجوانية او وردية او بيضاء اللون جميعها صفراء المحور والقاعدة || ازهاره يستمر طوال الصيف.

٨٣٤٧ - حُمَاضُ مُفَصَّصِ* Oxalis lobata (S).

Surelle lobée (F).

نوع من الحماض وهو نبات نجمي معمر. جنثه لحمي غليظ، اوراقه قرصية الانتشاب ثلاثية الوريقات المفصصة. ازهاره صفراء اللون فردية طويلة الزناد. ازهاره يستمر من تشرين الى اذار.

٨٣٤٨ - حُمَاضُ مِلْوَانِ Oxalis versicolor (S).

Surelle versicolore (F).

نوع من الحماض المعمر يملو من ٨ الى ١٠ سم. اوراقه ثلاثية الوريقات المحروطية الشكل، الضمية التجميع، الثنائية القد الحمر. ازهاره فردية محورية. لوها الى البياض يحوق اطراف احمر || ازهاره يستمر من شباط الى ايار.

٨٣٤٩ - حُمَاضُ وَرْدِيّ Oxalis rosea (S).

Surelle rose (F).

نوع من الحماض الحولي يملو من ١٥ الى ٣٠ سم. جذوره دقيقة متشعبة. اوراقه ثلاثية الوريقات، وريقاتها قليلة الشكل. ازهاره وردية اللون يملوها تبيج اخضر. ازهاره يستمر طوال فصل الربيع.

٨٣٥٠ - حُمَاضَاتُ Oxalate

ملح الحماض الحماضي.

٨٣٦٤ - حِطَّاط المُرَّان °
Psyllopsis fraxini (S).

Psylle du frêne (F).

يركب اوراق المران فيحصد نصلها ويمسح حواشها التي تبدو صفراء اللون ، جراء العروق || يرقاته تفرز عصارة عسلية حلوة تسبب القضاء على النسيج .

٨٣٦٥ - حِطَّاط المَغْث °
Psylla alni (S).

Psylle de l'aune (F).

يركب زمعات المغث واوراقه الندية فيؤذيها بعد ان يحصد النصل ويمسح .

٨٣٦٦ - حِطَّاط النَبَق °
Trioza kiefferi (S).

Psylle du nerprun (F).

يركب اوراق النبق وقد يعطها بكاملها بعد ان يمتط نصلها بغدده المنتصبة المدببة التي يبلغ ارتفاعها عن سطح النصل نحو ١٠ مم . وتجويها على الصفحة السفلى نحو ٥ مم .

٨٣٦٧ - حِطَّاط رُوسِي °
Psylla albiceps (S).

Psylle de Russie (F).

موطنه البلاد الروسية يركب الاشجار المشرة على اختلاف اجناسها وانواعها .

٨٣٦٨ - حِطَّاطَة
Figulier de Sumatra (F).

الحطاطة هي التين الجبلي . ج حطاط وحائط . والحطاطة هي تين الذرة خاصة .

٨٣٦٩ - حِطَّاطِيَّات ° ، حِطَّاطِيَّات °
Psyllidae, Chermidae (S). Psyllidés, Chermidés (F).

Psyllidae, Jumping plant lice (E). Blattflöhe, Springläuse (D).

فصيلة حشرات من رتبة متجانسات الاجنحة قريبة الشبه بالارقيات والفطريات . اجناسها وانواعها عديدة جميعها صغيرة القد طولها يراوح من ٢ الى ٤ مم . رأسها مستعرض ، عينها كبيرتان مركبتان . زبانها مستدقة مؤلفة من ١٠ فواصل . متكها قوي صلب يشبه تلك القرمزيات . جوشنها كروي الشكل بارز . اجنحتها الامامية اطول من الخلفية . ارجلها قوية اخصها الزوج الاخير الذي يمكنها من القفز . سوقها مستطيلة هليية . ارساغها ثنائية المفاصل .

٨٣٧٠ - حِطَّاق °
Variole (F). Smallpox, Variola (E).

هو جدري البقر ، اطلبه .

٨٣٧١ - حَمَام °
Colombes, Pigeons (F).

Doves, Pigeons (E).

جنس طير من الحماميات . انواعه خمسة اما ضروبه وسلالاته فكثيرة العدد || انواعه الخمسة هي الحمام الداجن واليام والدلم والحيدوان والورشان .

٨٣٧٢ - حَمَام دَاجِن °
Pigeons domestiques (F).

Domestic pigeons (E).

هو الحمام الاهلي على اختلاف ضروبه وسلالاته . يقال انه تحدر من الحيدوان واليام . اشكاله واثوابه عديدة تختلف باختلاف الضروب والسلالات . اشهر ضروبه واعما :

البشوق °
Pigeon nonnain (F). Capuchin (E).

الرومي °
Pigeon romain (F). Runt (E).

عن السفرجل والبندق والاجاص لكنه لا يمتح مكنه الا على التفاح . اما الحشرة الكاملة فوحيدة الجيل الحولي . لونها الى الجؤوة . رأسها مستعرض الشكل مكور المحسر البارز . الذكر يطول نحو ٢ و ٦ مم . اما الانثى فتبلغ ٣ مم . وتمتص مكنها الذي لا يقل عدده عن المئة في شقوق اللحاء ومكنها هذا يبدر عاجي اللون ثم ينحرف الى الوردي ويستقر على الاحمر . يتقف المكن في اوائل الربيع عن يرقات صغيرة مفلطحة . لونها الى الصفرة يملوها تخطيط اسمر ، تصبه نحو الزمعات والبراعم الزهرية والورقية فتقتضي عليها .

٨٣٥٨ - حِطَّاط التَّيْن °
Homotoma ficus (S).

Psylle du figulier (F).

موطنه حوض البحر المتوسط . يركب براعم وزمعات واوراق جميع انواع وضروب التين || الحشرة الكاملة طولها نحو ٥ مم . ثوبها اخضر او حنطي . رأسها عريض الشكل ، عينها كرويتان بارزتان . زبانها مستدقان تكتنفها زغبة هليية . اجنحتها شفافة نافرة الاعصاب . جيلها الحولي واحد . اناثها تبيض في اواخر الصيف فتنتج مكنها في شقوق اللحاء . مكنها بيضي الشكل برتقالي اللون . يتقف في اوائل الربيع عن يرقات صغيرة مفلطحة لونها الى الاخضر الزاهي . تعيش على العصارة التي تمتصها من الزمعات وعروق الاوراق .

٨٣٥٩ - حِطَّاط الخَضَار ° ، حِطَّاط الجَزَر °
Trioza viridula (S). Psylle des légumes, P. de la carotte (F).

يركب البقول على اختلافها واخصها الجزر فيوقع بها اشد الاذى . وقد يمتري بعض النباتات التزيينية فيعطب اوراقها ويسمي الى نموها .

٨٣٦٠ - حِطَّاط الخَوْر °
Psylla trimaculata (S).

Psylle du prunier (F).

حشرة امريكية المهد تتركب الخوخ فتؤذيها .

٨٣٦١ - حِطَّاط الزُعْرُور °
Psylla crataegi (S).

Psylle de l'aubépine (F).

يركب الزعرور ولا يعف عن التفاح .

٨٣٦٢ - حِطَّاط الزَيْتُون °
Psylla olivina, Euphyllura olivina (S). Psylle de l'olivier (F).

حشرة مضرّة تتركب الزيتون . موطنها حوض البحر المتوسط . طولها يراوح من ٢ مم . الى ٢ مم . وخمسة خطوط . رأسها مستعرض غليظ . اجنحتها عريضة مستطيلة بارزة العروق . لونها الى الرمادي العابق او الحنطي الزاهي || اناثها تبيض في اوائل الربيع فتنتج مكنها في الاوراق الفتية على صفحة النصل السفلى بجذاء الضلع || يرقاتها تغزو العناقيد الزهرية وتمتطق الازهار بندقها القطني ثم توخرها وتمتص عصارتها .

٨٣٦٣ - حِطَّاط الغَار °
Trioza alacris (S).

Psylle du laurier (F).


يركب جميع اشجار الفصيلة الغارية واخصها الرند . ونخره نصل الاوراق بسبب حصدتها والتفاحها وفقدان لونها الذي ينحرف الى الاصفر ويستقر على الالبيض التبي .



حِطَّاط التَّيْن



حِطَّاط الخَضَار



حِطَّاط الزَيْتُون



حَمَام رُوسِي

٨٣٧٨ - **حماية ، وقاية** Prophylaxie (F).
Prophylaxis (E).
ناحية من الطبابة تبحث في طرق الحيلة الواجبة لفنان
الاحتراز من المرض .

٨٣٧٩ - **حماية** Défends, Défens (F).
Prohibition of cutting (E).
هي منع الماشية من دخول الحرج أو كل أرض مشجرة
وذلك لصيانة الاشجار رحايتها من عبث الحيوان .

٨٣٨٠ - **حماية جمركية** Protectionnisme (F).
Protectionism (E).
مذهب اقتصادي سياسي مؤداه حماية السوق القومية من
المنافسة الاجنبية .

٨٣٨١ - **حبالاس** Myrte (F). Myrtle (E).
هو الآس الجوي ، اطلبه .

٨٣٨٢ - **حمة ، حمة ، منخس** Aiguillon, Dard (F). Sting, Goad (E).
رأس ابرة أو ذنب بعض الحشرات كالنحلة والزنبور
والمعقرب .

٨٣٨٣ - **حمة المعقرب**
حمة المعقرب منزل من منازل القمر البانية ، وتدعى الشولة ،
اطلبها .

٨٣٨٤ - **حنجم** Borrage (S). Bourrache (F).
Borage (E).
جنس نباتات عشبية خولية ومعمرة من فصيلة الحمحميات .
تتميز بنحشونة اوراقها الهلبية النصل || انواعه قليلة
اعرفها واشهرها الخنزري والبنفسجي .

٨٣٨٥ - **حنجم بنفسجي ، حنظمة بنفسجية** Borrage laxiflora (S). Bourrache à grappes
lâches (F).
نوع من الحمحم وهو نبات عشبي بري مغمر . ساقه
دقيقة متسدة تطول نحو ٦٠ سم . اوراقه متعاقبة . ازهاره
جرسية الشكل بنفسجية اللون زباء البشرة || ازهاره
يستمر من اذار الى تشرين .

٨٣٨٦ - **حنجم خنزري ، حنظمة خنزرية** Borrage officinalis (S). Bourrache officinale (F).
Common borage, Tale-wort (E). Boretsch, Gurken-
boretsch (D). Borrano, Borragine, Buglossa
vera (I).
نوع من الحمحم وهو نبات عشبي بري طيب حولي .
يعلو من ٢٠ الى ٦٠ سم . ساقه غليظة هلبية . اوراقه
متعاقبة . ازهاره فارشة كالنجوم . قطرها نحو ٢٥ مم .
لونها الى الازرق الزاهي || ازهاره يستمر من نيسان الى
ايلول || اوراقه وازهاره غروية ، مرققة ، مدرة للبول .
نقيعه يفيد نزلات البرد الخفيفة ويطفع الحميات عند
ظهوره .

٨٣٨٧ - **حنمة ، حنجم** Oena capensis (S).
Oena (F). Cape dove (E).
ومن اسمائه يحسوم وأم بليمة . طائر من الحماميات وحيد
الجنس والنوع قريب الشبه بالدبسي الا انه اصغر منه .

Pigeon messenger, الواجل * ، الهادي ، الورق
P. voyageur (F). Carrier pigeon, Homer (E).
السداد ، الهزاز ، المراعيش
P. paon, P. trembleur (F). Fantail (E).
الطائي
Pigeon boulant (F). Pouter (E).
العداد
Pigeon spicifer (F). Spicifer pigeon (E).
القلاب ، القلوب ، المضرب
Pigeon culbutant (F). Tumbler, Roller pigeon (E).
الكوسي
Pigeon tambour (F). Tambourine (E).
المتوج
Pigeon huppé (F). Jacobin (E).
المطوق
Pigeon cravaté (F). Turbit (E).

٨٣٧٣ - **حماما** Amome cardamome (F).
Cardamom (E).
اطلب مال حماما .

٨٣٧٤ - **حمامة** Pigeonne (F). She-pigeon (E).
هي انثى الحمام . قال حميد بن ثور الهلالي :
وما حاج هذا الشوق الا حمامة
دعت ساق حر نزهة وترنما
مطوقة غرام تسجع كلما
دنا الصيف والخال الربيع فأنجما
تفتت على غصن عشاء فلم تدع
لنساءحة من نوحها مثلاً
اذا حركته الريح او مال ميلاً
تفتت عليه مائلاً ومقوما
صجبت لها أنى يكون غناؤها
فصيحاً ولم تفر بمنطقها فا
فلم أر مثلي شاقه صوت مثلها
ولا عريباً حاجه صوت أعجا

٨٣٧٥ - **حمامة** la Colombe (F). Columba (E).
الحمامة كوكبة نجوم جنوبية الموقع قليلة العدد منها نجم
مزدوج ، يحمل الرقم ٣٨٢٣ من جدول هرسكل ، يدعى
« الفاختة » أو « نير الحمامة » .

٨٣٧٦ - **حمامي ، طفح وزدي** Erythème (F).
Erythema (E).
مرض جلدي اسبابه عديدة منها حرارة الشمس واحتكاك
الرحل والنفث والنيار .

٨٣٧٧ - **حماميات** Colombidae (S).
Colombidés, Colombins (F) Colombidae (E).
هي فصيلة الحمام انواعها وضروبها وسلالاتها عديدة تنتمي
الى ١١ جنس وهي الحمام والصلاصل والقبارى والترغل
والقواخت والوردانيات والطورانيات والدباسي والفقمي
والشفالين والقلقانيات || تتميز بانسجام وجمال تكوينها ،
بصغر رأسها ، بضعف منقارها وبقصص عنقها وأرجلها .
اجنحتها متوسطة القد ذلقة . افنيكها مستدير الشكل
مؤلف من ١٢ او ١٤ او ١٦ ريشة . ارساغها قصيرة
اصابعها اربعة ، ثلاثة منها امامية والرابع خلفي .
موطنها العالم . معظمها من الطيور القواطع . قوتها الحبوب
والمواد النباتية . تعيش اسراباً كبيرة وكل ذكر مع انثاه
لا يفرقها غير الموت . الانثى تبيض بيضتين تحضنها
بمناوبة الذكر نحو ١٥ يوماً .



حمام زاجل



حنجم



حنمة

٨٣٩٧ - حُمُرُور Priacanth (F). Catalufa (E).
هو الحُسرَم جنس اسماك بحرية تعيش في بحار المناطق الاستوائية.

٨٣٩٨ - حُمُرُور مَبْدُول Priacanth hamrour (F).
هو الحُسرَم الشائع، سمكة بحرية. اطلبه.

٨٣٩٩ - حُمُرُوش * Platysoma oblongum (S).
Platysome oblong (F). Platysoma oblongum (E).

حشرة نائلة وأتجة جاسة من فصيلة الهستيريات ورقبة غمديات الاجنحة. تألف الاجراج واخصها اجراج الصنوبر خنافسها ويرقاتها تعيش في التيرب وتحت جذوع الاشجار المقطوعة وتحت لحاء الاشجار اليابسة || جسمه صغير القد يطول من ٤ الى ٥ سم. ثوبه الى السواد اللامع. رأسه صغير الجرم. فكاه ضليمان. زبانه مرفقيان، دبوسيا الاطراف. عيناه صغيرتان، ماسحتان. ظهرانه يلحف نحو ثلاثة ارباع البطن. غدها رباعيتا الحدود القاطية. ارساغه خماسية العقل || الاثنى اصفر قدأ من الذكر واهت ثوباً منه || له جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في اواسط الربيع وتعيش حتى اواخر الصيف. تسرح في النهار. تساقط في آب || اليرقة عند كمال نموها تطول من ١٠ الى ١٢ سم. جسمها مردني الشكل، اسمر اللون، اسود الرأس والشرح، مشعل الجانبين الايمن والايسر، نشيط الرواجب السود || الطور الاكفالي يستمر نحو ستة اسابيع وينقضي حيث كانت اليرقة.

٨٤٠٠ - حَمْسَة * Emyd (F). Emyd (S).
Marsh-tortoise, Terrapin (E).
جنس سلاحف من فصيلة الحُسيات. انواعه عديدة متوسطة القد طولها يراوح من ٢٥ الى ٤٠ سم. ذيلها بيضي الشكل قليل الاحديداد. ثوبها الى السمرة الزيتونية. قوتها الاسماك والضفادع || اشهر انواعه حمنة قزوين وحمنة المناقع.

٨٤٠١ - حَمْسَة المَنَاقِع، بِنْت طَبَق Emyd orbicularis (S). Emyde bourbeuse, Tortue bourbeuse, Tortue émyde (F).
نوع من الحمنة موطنها انهر ومناقع الشرق الاوسط واروبه. طولها يراوح من ٢٠ الى ٣٠ سم. ذيلها بيضي الشكل قليل الاحديداد. ثوبها الى الخنطي الاسمر يعلوه موج اسفع.

٨٤٠٢ - حَمْسَة قَزْوِين Emyd caspica (S).
Emyde caspienne (F).
نوع من الحمنة موطنها بحيرات الشرق الاوسط واروبه تكثر في بحر قزوين. طولها نحو ٣٠ سم. ذيلها بيضي الشكل بارز القتر المستطيلة. ثوبها الى السمرة الزيتونية السوية اللون.

٨٤٠٣ - حَمْسِيَّات Emydidae (S).
Emydés, Emydids (F). Emydidae, Terrapins (E).
فصيلة حيوانات زاحفة بيوضة من رتبة السلاحف. اجناسها وانواعها عديدة تعيش في المياه العذبة مهددا البلاد المعتدلة. جميعها مفترسة قوتها الاسماك والضفادع وبعض الحشريات || اشهر اجناسها الحمنة.

٨٤٠٤ - حُمُشِد * Ruellia (S). Ruellie (F).
Spirit weed (E). Rodel (D). Ruellia (I).
جنس نباتات عشبية وجنبية معمرة برية وتزيينية من

قدأ وهو اسود الرأس والعنق والصدر والبطن الى طرف الذناب. اغبر الظهر. اريد الجناح الاثمن. اصفر المنقار والرجلين || موطنه الحبشة وجزيرة العرب. يثن في الادغال والشجيرات القليلة الارتفاع. انشاء تضع بيضتين تحضنها وحدها.

٨٣٨٨ - حُمُجِيَّات Boraginaceae (S).
Boraginacées (F). Boraginaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين تعرف ايضاً بلسان الثور اجناسها وانواعها عديدة معظمها بري وبعضها زراعي وطبي.

٨٣٨٩ - حَمْد Ptéroclidon (F).
هو فرخ القطاة.

٨٣٩٠ - حَمَر Tamarinier (F). Tamarind tree (E).
هو التمر الهندي، اطلبه.

٨٣٩١ - حَمَر Bitume (F). Bitumen (E).
اسم شامل يستعمل للدلالة على بعض المواد الطبيعية القابلة للاحتراق الغنية بالكربون والهيدروجين. اشتعالها لاهب كثيف الدخان وقوي الرائحة المستهجنة || والحمر من الوجهة المعدنية جسم مركب من مختلف المسواد الهيدروكربونية. ثقله النوعي يراوح بين ٠.٧ و ١.٢ ويكون اما مائعا او رخواً او جامداً || ومن الوجهة الكيماوية فالحمر يقسم الى اربعة اقسام: الحمر النفطية او النفط، الحمر الغروي او الكفر، الحمر المطاط او القفز والحمر الاسفلتي او الزفت || اما اختلاف هذه الاقسام فيعود الى نسبة غناها بعنصر كربور الهيدروجين.

٨٣٩٢ - حُمُرُويَّات Tremellaceae (S).
Trémellacées (F). Tremellaceae (E).
فصيلة فطور من رتبة الدعاميات عديدة الاجناس والانواع المختلفة الاشكال والاحجام. تتميز بدعاماتها الوشجية الملوثة || منها جنس وحيد النوع يدعى «حرية» يتطفل على الكرمة فيركب الجذور عند انتشائها وينطقها بوشاحه الحلي الاحمر اللون ثم يمتد شيئاً فشيئاً الى ان يعطب الجردة. وقد يصيب السروع القرية من التربة فيركبها من الجهة السفلى. يكافح بمركبات النحاس.

٨٣٩٣ - حُمُرَة الحُمرة : طائر من العصافير. وفي الصحاح : الحُمرة ضرب من الطير كالعصافير. ج حُمَر.

٨٣٩٤ - حُمُرَة الحِنْزِير Rouget (F). Reddish (E).
هي حصبة الحنزير مرض جرثومي.

٨٣٩٥ - حُمُرَة الشَّجَر اسم شائع يطلق على عدة اوصام مختلفة الاسباب اعما فطور مجهرية من الرحيات تسبب احمرار الوراق.

٨٣٩٦ - حُمُرَة الوراق Rougeot, Rougeaud, Rougin (F). Red-faced, Ruddy (E).
وصم فيزيولوجي يصيب اوراق الكرمة فتحمّر ثم تجف وتسقط.



حُمُرُوش



حَمَة

٨٤١٢ - **جَمِصِيض** (F).
Oxalide corniculée (F).
Procumbent oxalis (E). هو الجامض القرني، اطلبه .
٨٤١٣ - **جَمَط** (F).
Couvrier, Ombrager (F).
To cover, To shade (E).
جَط الحتر : ستره بالنباتات العارشة . وجَط كرجه : جعل عليه شجراً يستره من الشمس .

٨٤١٤ - **جَمَطُوط** (F).
Psylla (F). Psylla (E).
هو الجاط راجعه .

٨٤١٥ - **جَمَطُوطُ الاسل** (S).
Livia juncorum (S).
Lilie des jons (F).
حشرة من فصيلة الجاطيات ورثة متجانسات الاجنحة . جسمها شديد الصغر يطول نحو ٣ مم . الاثنى اميز قدماً من الذكر . رأسها متوج بفلقتين تتقدمان الجبهة . عينها كبيرتان . زباناها مستفلطان الفصل الاول والثانية . كوسلها مستطيل الشكل يعلوه تخديد معترض . حجفتها صغيرة . اجنحتها مستطيلة ، ضيقة . بطنها ينتهي بأشرة ذرية . قوائمها نشيطة ، معتدلة الطول || ثوبها إلى الحنطي الاسمر المتباين الماجات || تألف المواقع التي يكثر فيها الاسل لانها تعيش على نسج عصفه وأزهاره .



جَمَطُوطُ

٨٤١٦ - **جَمَطُوطِيَّات** (F).
Psyllidés (F). Psyllidae (E).
هي الجاطيات فصيلة حشرات ، اطلبها .

٨٤١٧ - **جَمَلَك** (F).
Agneau (F). Lamb (E).
نجاج النعجة الى ان يبلغ ستة اشهر .

٨٤١٨ - **جَمَلَك** (F).
Agneau (F). Lamb (E).
نجاج النعجة الى ان يبلغ ستة اشهر .

٨٤١٩ - **جَمَل** (F).
Ventrée (F). Litter (E).
ما في البطن الواحد من ولد . ج جمال وأجمال .

٨٤٢٠ - **جَمَلَج** (F).
Chalumeau (F).
Stalk of corn, Straw-pipe (E).

٨٤٢١ - **جَمَلَج** (F).
Chiche de montagne (F).
Mountain chickpea (E).
هو الاسطرغالوس الجبلي ، اطلبه .

٨٤٢٢ - **جَمَلِيَّات** (S).
Plantaginaceae (S).
Plantaginacées (F). Plantaginaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين الوحيدات القعانة العاليات المبيض . تعرف ايضاً بفصيلة لسان الحمل . انواعها نحو ١٠٠ تجمعها ثلاثة اجناس . موطنها جميع الاصقاع المعتدلة . جميعها نباتات عشبية اوراقها متقابلة أو متعاقبة . أزهارها سنبل كثيف التجميع ، أزهارها خنثوية رباعية الاسدية . ثمارها عليية .

٨٤٢٣ - **جَمِيل** (S).
Restio (S).
Restie (F). Restio (E).

جنس نباتات جلمورية معمرة برية وتزيينية من فصيلة الجملييات . انواعه المعروفة نحو ١٠٠ متبها المناطق الحارة الافريقية والاسترالية ومدغسكر || جذاميرها مدادة سوقها متباينة الارتفاع . اوراقها القرصية ضمية أما الجذمية فتعاقبة . أزهارها سنبل التجميع ، كثير الأزهار الصغيرة المتباينة الالوان .

فصيلة الاقشيات . انواعها عديدة مهدها البلاد الحارة . سوقها منتصبه زياء . اوراقها كاملة ، متقابلة ، بيضية الشكل ، زغبية النصل . أزهارها ابطة بحيلة منها البيضاء كالحليب والزرقاء والبيضاء والخمر والارجوانية .

٨٤٠٥ - **جَمِص ، جَمِصِي** (S).
Cicer arietinum (S).
Pois chiche, Cicérole, Gairance (F). Chick-pea, Gram (E). Echte kicher (D). Cece, Pisello cece, P. cornuto (I).

واحدته حصة نباتات عشبي زراعي حولي من فصيلة القطنيات الفراشية . يزرع لخبه المأكول || مهده الشرق الاوسط وقيل بلاد فارس . جذوره حزمة سطحية . ساقه فروع قاسية وبرة تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم . اوراقه مركبة ، وريقاته بيضية مسننة زياء النصل . أزهاره صغيرة محورية الارتكاز لونها الى الالبيض والاحمر . ثماره قرون صغيرة بيضية الشكل معقوفة الطرف تغلف حبة الى حبتين كرويتين || وهو من الزراعات العذية التي ترطب في التربة العميقة المتوسطة الانتماج المحافظة على رطوبتها || يأتي في الدورة الزراعية بعد الحنطة أو الشعير . زراعته لا تستوجب الكثير من العناية . بذره يتم بين منتصف فصل الشتاء وأواخره اذ انه منوط بالاقليم وبالعوامل الجوية . لزوم الدسم من البذار يراوح من ٤ الى ٦ كيلو . اما متوسط انتاج الدسم فنحو ٨٠ كيلو . والحمص من الوجهة الغذائية ، غني بمختلف المواد اخصها الدهنية التي تقود الى السن . المثة جزء من الحب تحوى :

ماء	١٤,٢٤ %
مواد ازوتية	٢٤,٠٠ %
سليوز	٤,١٨ %
مواد دهنية	٩,٥٩ %
دكسترين	٥,٣٨ %
مواد نشوية	٤٢,٦١ %

اما تبته فن القبيب الجيد الذي يفيد الابقار والاغنام .

٨٤٠٦ - **جَمِص بَمْبَارَه** (F).
Pois bambara (F).
نبات زراعي يدعى فسق ملغاشي ، اطلبه .

٨٤٠٧ - **جَمِص جبَلِي** (F).
Chiche de montagne (F).
Mountain chickpea (E).
هو الاسطرغالوس الجبلي ، اطلبه .

٨٤٠٨ - **جَمِص سُكْرِي** (F).
Lotier cultivé (F).
Garden winged pea (E).
هو اللوطس الارجواني ، اطلبه .


٨٤٠٩ - **جَمِص** (F).
Lotier cultivé (F).
Garden winged pea (E).
هو اللوطس الارجواني ، اطلبه .
الحمص ما ملح وامر من النبات . الواحدة حصة وهو كفاكهة الابل تأكله عند سآمتها من الحلة وهي ما حلا من النبات . وهي متى شبت من الحلة مالت الى الحمص فكأنها تهضم به . ج حموض .

٨٤١٠ - **جَمِص مَائِي ، جَمِص هيدروجيني** (F).
Hydracide (F). Hydracid (E).

هو الحامض الذي يتكون من اتحاد الهيدروجين بعنصر حمضي خلافاً للاوكسجين .

٨٤١١ - **جَمِصِيَّات** (F).
Agrumes, Hesperidées (F).
Hesperidae (E).

لمة نباتية تشمل البرتقال والليمون والارج والايكل الخ :



جَمِص

Hispid (F). Hispid, Setaceous (E). ٨٤٣٧ - حُمَيْضٌ
نعت وصفي يطلق على الاعضاء النباتية المكسوة بالهلب
الدقيق الشائك .

Diète (F). Diet (E). ٨٤٣٨ - حُمَيْضٌ
هي الامتناع عن الطعام مدة من الوقت .

Anes, Asiniens (F). ٨٤٣٩ - حُمَيْضٌ، حُمَيْرٌ، حُمَارِيَّةٌ
Asse's, Asinines (E).
جنس حيوانات وحشية وداجنة من فصيلة الحلييات .

Baobab ٨٤٤٠ - حُمَيْضٌ
راجع بوباب .

Rumex (S). ٨٤٤١ - حُمَيْضٌ
Oseille, Patience (F). Patience (E).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة البطاطيات .
انواعه عديدة منها البرية التي تنبت في البور والمروج
والمواقع الرملية الرطبة ومنها الزراعية المأكولة || سوقها
فرعاء . اوراقها متعاقبة ، معنقة ، رحيمة النصل . ازهارها
عنقودي || تنبت من النباتات الطبية النافعة المضادة
للحفر وامساك المعدة . عصارتها مرطبة مفيدة تستخرج
من سحق اوراقها . ويستخلص منها الحامض الحماضي
واكسالات البوتاس || اعرف واشهر انواعه ما يقع .

٨٤٤٢ - حُمَيْضُ الْحَقْلِ* ، حُمَاضُ الْحَقْلِ ،
حُمَاضُ إِسْبَانَاخِي

Rumex patientia (S). Patience des jardins, Oseille
épinard (F). Patience, Herb of patience, Spinach-
dock (E). Gemüsepfeffer, Winterspinat (D). Pa-
zienza, Romice, Romice domestica (I).
نوع من الحميض المعمر البري والمزروع . ساقه فرعاء
تعلو من متر الى مترين . اوراقه معنقة ، كبيرة القد ،
مستطيلة . نصلها داكن الخضار متمتع الجوانب .
يكثُر في الارربة الرملية الرطبة . يستخرج من اوراقه
حامض الحماض .

٨٤٤٣ - حُمَيْضُ السَّوَاتِي ، حُمَيْضُ الْمَاءِ ، حُمَاضُ
السَّوَاتِي ، لَبَثٌ

Rumex aquaticus, R. longifolius (S). Patience aqua-
tique, P. d'eau (F). Grainless dock, Smooth fruited
dock (E). Wasserampfer (D). Romice aquatica,
R. palustre (I).
نوع من الحميض البري المعمر . يكثُر قرب المياه الجارية
وعلى ضفاف الأنهر . ساقه متشعبة . اوراقه مستطيلة
داكنة الخضار . عصارة اوراقه متوسطة الصنف .

Oseille des brebis (F). ٨٤٤٤ - حُمَيْضُ الْغَنَمِ
Sheep's sorrel (E).
هو الحميض الصغير الورق ، اطلبه .

٨٤٤٥ - حُمَيْضُ الْمَنَاقِعِ* ، سَلَقُ بَرِّي
Rumex hydrolapathum (S). Oseille aquatique, Grande
patience (F). Water dock, Horse sorrel (E). Flussam-
pfer (D). Lapazio (I).
نوع من الحميض البري المعمر . يكثُر في المناقع والاراضي
القليلة الاندماج الرطبة . ساقه متشعبة تعلو من ٦٠ الى
١٢٠ سم . اوراقه سلقية الشكل . نصلها قائم الخضار
متمتع الجوانب .

Restiaceae (S). ٨٤٢٤ - حُمَيْلِيَّات
Restiacée (F). Restiaceae (E).
فصيلة نباتية من وحيدات الفلقة . اجناسها المعروفة ٢٠
تجمع نباتات الانواع . منبتها العلوي بعض مناطق افريقية
واستراليا ومدغسكر || جميع اجناسها معمرة عشبية او
مخشوشة . جذاميرها مدادة يرتفع منها بعض السوق .
سوقها عقدية فرعاء او سرحة . اوراقها القرصية متراكبة
اما الجذعية فتعاقبة . ازهارها سنبل التجميع . ازهارها
صغيرة وحيدة الشق . ثمارها جراء كثيرة البزور .

Tiques (F). Ticks (E). ٨٤٢٥ - حُمَيْلَان
صغار القراد واحده حنافة وحمة وهي فوق القمناة
ودون القرادة .

Faon (F). Fawn (E). ٨٤٢٦ - حُمُوج
الحموج : الصغير من ولد الظبي ونحوه ، ويدعى رشا
وشادن وطلا .

Acidité (F). Acidity (E). ٨٤٢٧ - حُمُوضَةٌ
إبتعاد مقدار الدالف ، في محلول ما ، عن رقم الاعتدال
المعين وقدره سبعة الى ما هو دون ذلك الرقم . راجع دالف .

Porte-aiguillons ٨٤٢٨ - حُمُورِيَّات ، مَنَحَسِيَّات
مرتبة حشرات من غشائيات الجناح عديدة الفصائل
والاجناس تتميز بجهاثها او مناخسها الدرية السامة .
منها النحل والذبابير والائق ، الخ .

٨٤٢٩ - حُمَيُّ التَّكْسَاسِ ، حُمَيُّ مُخْرِقَةٍ
Fièvre du Texas, Babesiellase, Piroplasmose (F).
مرض سار يصيب البقر سببه بوع خبيث .

٨٤٣٠ - حُمَيُّ الدَّرِّ ، حُمَيُّ الْوَضْعِ
Fièvre du lait, F. vitulaire (F). Milk fever (E).
هو عارض الحسى الذي يصيب البقرة عقب الوضع .

٨٤٣١ - حُمَيُّ بَحْرَاوِيَّةٍ
Fièvre charbonneuse (F). Charbon fever, Pustula maligna (E).
هي الحسى الفحمية .

Theileriasis parva (S). ٨٤٣٢ - حُمَيُّ سَاحِلِيَّةٍ
Theileriose (F).

٨٤٣٣ - حُمَيُّ قَحْمِيَّةٍ ، حُمَيُّ بَحْرَاوِيَّةٍ ، بَحْرَةٌ
خبيثة
Febris carbunculosa (S).
Fièvre charbonneuse, Charbon bactérien, Anth-
rax, Sang de rate (F). Anthrax, Malignant A.,
Splenic fever (E).
مرض خبيث فتاك سار يصيب الخيل والبقر وغيرها .

٨٤٣٤ - حُمَيُّ قَلَاعِيَّةٍ ، جَلَاخ
Aphthae epizooticae (S). Fièvre aphteuse (F). Aph-
thae, Thrush (E).
ومن اسمائها ابو لسين ، ابوريالة ، شقاق ، طوياق .
مرض معد يصيب البقر . مظهره الخارجي بثور وقلاع في
الفم وبين الاظلاف .

Brucellosis mellitensis (S). ٨٤٣٥ - حُمَيُّ مَائِطِيَّةٍ

Theileriasis annulata (S). ٨٤٣٦ - حُمَيُّ مِصْرِيَّةٍ



حميض الحقول



حميض المناقع



حميض زراعي



حميض الغنم



حميض



حمينة



حناء



حناطيل

٨٤٥٦ - حِنَاءٌ* ، قَطَبٌ ، قَاغِيَّة

Lawsonia (S). Henné, Hénah, Hinné (F). Henna plant, Alcanna, Camphire (E). Hennastrauch (D). Enné, Alcanna-cipro (I).

شجيرة زراعية صباغية وزينية وحيدة الجنس والنوع من فصيلة الحنائيات. مهدا الجزيرة العربية. جذورها حمراء ساقها وأغصانها زغبية اللحاء بيض. أوراقها متقابلة، صغيرة، معنقة، اهليلجية الشكل، سنائية الزمان الأخير. تصلها الى الخضار الزاهي يحسف مع العمر. أزهارها عتقودي متصب. أزهارها صغيرة، بيضاء اللون، فواحة العرف المستحب || أوراقها غنية بالمادة الدبغية يستحضر منها بعد تجفيفها وصحها صباغ الى الحمر الصفراء او السوداء شائع الاستعمال تخضب به الايدي والاقدام لانه يفيد التقشقات. وقد يصلح في تلوين الخشب والصوف والحبر || عرف قدام المصريين هذا النبات واستعملوه في التحنيط وهو لا يزال يزرع في مصر حتى الآن. يرغب في الاتربة الدبالية الغنية المروية.

٨٤٥٧ - حِنَاءٌ أَحْمَرُ Arbuster (F). Arbuta (E).

هو القطلب، اطلبه.

٨٤٥٨ - حِنَاءٌ الْغُولُ ، حِنَاءُ الْغُولِ

هو الشنجار، اطلبه. Orcanette (F). Alkanet (E).

٨٤٥٩ - حِنَاءٌ قَرِيْشَ Lichen fleuri (F).

هو حزاز الصخر، اطلبه. Flowering moss (E).

٨٤٦٠ - حِنَائِيَّات Lythraceae (S).

Lythrées, Lythariées (F). Lythraceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة الثعلالات. اجناسها ٢٥ اما انواعها فكثيرة العدد منها البرية والعلبية والصناعية والتزينية.

٨٤٦١ - حِنَاجَةٌ Organogenèse (F).

Organogenesis (E).

قسم من النمازة، علم الاجنة، يبحث في تكوين الاعضاء ونوعها.

٨٤٦٢ - حِنَازٌ ، تكافؤ Equivalence

هو المساواة. هذا حنز هذا اي مساو له.

٨٤٦٣ - حَنَاطُ Grainier, Marchand de blé (F).

هو بائع الحنطة. Seedsman (E).

٨٤٦٤ - حَنَاطِيْب Teignes des céréales (F).

Clothes moth (E).

اسم شائع يطلق على بعض الفراشات الصغيرة القد من حشرغيات الاجنحة وفصيلة السغيات || اشهر الحنابط حنطب الجوب وحنطب الحنطة.

٨٤٦٥ - حَنَاطِيلُ* Trienops (S). Trienops (F).

جنس حيوان من فصيلة العاشيات. انواعه ٢ تتميز برؤسها المنخرية، الورقية، النضوية الشكل، المنتصبة، المنقسمة الى ثلاثة اقسام. اذانها بوقية لا وتدية. ثنائياها العليا فارقة || اجسامها صغيرة القد تقول نحو ٨ سم. بسطها نحو ٣٢ سم. واذناتها ٢ سم. ألوانها الى الرعدة الصهباء، قائمة في الذكور زاهرة في الاناث || موطنها الشرق الادنى من العجم الى

٨٤٤٦ - حُمَيْضٌ أَمْرِيكِي ، حَنَبِيْطٌ ، حَنَبِيْطُ

Rumex vesicarius (S). Oseille d'Amérique, Canaigre (F). Bladder-dock, Sorrel (E). Amerikanischer sauerampfer (D). Acetosa d'America, Romice d'America (I).

نوع من الحميض الزراعي الامريكي المنبت. أوراقه كثيرة النصل قليلة الحموضة مأكولة.

٨٤٤٧ - حُمَيْضٌ زِرَاعِي* ، حُمَيْضَةٌ

Rumex acetosa (S). Patience commune, Oseille commune, Aigrette, Paralle, Surette (F). Garden sorrel, Sour grass, Sourdock (E). Sauerampfer (D). Acetosa, A. commune, Orecchio dei prati (I).

نوع من الحميض البري والزراعي. يرغب في الاتربة الرملية. أوراقه لسنة، مدبية العقصة، قائمة الخضار، حامضة، حامزة، مأكولة.

٨٤٤٨ - حُمَيْضٌ صَغِيرُ الْوَرَقِ ، حُمَيْضُ الْغَنَمِ*

Rumex acetosella (S). Oseille des brebis, Petite patience, Vinette (F). Sheep's sorrel, Small sorrel (E). Kleiner ampfer (D). Romice dei campi, Acetosella piccola (I).

نوع من الحميض البري المعمر. ساقه دقيقة نحيلة متشعبة. أوراقه صغيرة القد، مستدقة، قليلة الحموضة، شديدة الحمازة. يقال انها قابضة تصلح المعدة الفاسدة.

٨٤٤٩ - حُمَيْضَةٌ هي الحميض الزراعي.

٨٤٥٠ - حَنَبِطُ Tragla (S). Tragie (F).

Stinging nettle (E). Tragla (D). Ortica rampicante (I). جنس نباتات عشبية ليفية عارضة معمرة من فصيلة البتوميات مهدا البلاد الحارة. تزرع للتزين. أزهارها جميلة الشكل ملونة.

٨٤٥١ - حَمِيلٌ Allogène (F). Allogeneous (E).

ثمت تعريفه يطلق على كل دخیل او تزيل لا ينتمي بنسبه او عنصره الى الانساب والعناصر المستوطنة.

٨٤٥٢ - حَمِيْمَةٌ Moricandla (F). Moricandia (E).

راجع سم، نبات عشبي بري من الصليبيات.

٨٤٥٣ - حَمِيْمَقٌ* Buteo buteo (S).

Busa variable (F). Long-legged buzzard (E).

نوع من السقاوة ربع الجشة اسمر الثوب المرقط والمنق، مجزع الذيل، خفيف الطيران، سريع الانقضاض. يصيد القطا والجنادب وجميع انواع الحشرات.

٨٤٥٤ - حَمِيْمَةٌ* Beloptera (S).

Béloptère (F). Beloptera (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الارجل وفصيلة الحمينيات. انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من احافير الحقبة الايسانية، اقدم عصور الاباج الثالثي.

٨٤٥٥ - حَمِيْمِيَّاتٌ* Belopteridae (S).

Béloptéridés (F). Belopteridae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الارجل مزدوجات الحياشيم || اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من متحجرات الاباج الثالثي || اعرف اجناسها الحمينية.

Oselle d'Amérique (F). **حُنْبِيْط** ٨٤٧٥ -
Bladder-dock (E). راجع حَيْضٌ أَمْرِيْكَي .

Orcanette vipérine (F). **حِنَّةُ الْغُول** ٨٤٧٦ -
Dyer's bugloss (E). هي الشَّجَارُ الصَّبَاغِي ، اطلُبها .

Onychium **حُنْثُل** ٨٤٧٧ -
هو في الحشرات الفصلة الأخيرة من الرسغ تحمل مخالبين منعقلين .

٨٤٧٨ - **حَنْتَم** هو الخندقوق الحقلِي ، اطلُبها .

٨٤٧٩ - **حَنْثِيْت** هو الانجذَان ، اطلُبها .

٨٤٨٠ - **حَنْج** ٥ Prototype (F). Prototype (E).
هو في الحيوان ، الفرد الذي يتحل بجميع الصفات المثالية المطلوبة . ويدعى العصب في النبات .

٨٤٨١ - **حَنْج** ٥ Organogène (F).
Organogenetic (E).
اسم يطلق على كل من العناصر الاربعة ، الاوكسيجن والهيدروجن والكربون والازوت ، بصفتها اصول المادة العضوية .

٨٤٨٢ - **حَنْجَبَة** ٥ Corie (F).
الحنجب أو الحنجبة الجزء الصلب من ظهر الحشرات التابعة لطبقة نصفيات الاجنحة .

٨٤٨٣ - **حَنْجُف** ، **حَنْجُفَة** Tête du fémur
الحنجف والحنجفة: رأس الورك مما يلي الحجة . ج حناجف .
٨٤٨٤ - **حَنْجُل** ضرب من السباع (اللسان) .

٨٤٨٥ - **حَنْجُوف** ٥* Ophisaurus (S). Ophisaur (F).
جنس حيوانات زحافة عادمة الارجل من فصيلة الحنجوفيات
انواعه عديدة موطنها البلاد الحارة قريبة الشبه بالبدغ .
اجسامها اسطوانية مستطيلة ، حراشفها معينة . اذنانها
دقيقة . قوتها الحشرات . تفيد الزراعة .

٨٤٨٦ - **حَنْجُوفِيَّات** ٥ Anguidae (S).
Anguidés (F). Anguidae (E).
فصيلة حيوانات زحافة من العظائيات . اجناسها وانواعها
عديدة اعطانها البلاد الحارة . تتميز باجسامها الاسطوانية
المستطيلة العادمة القوائم .

٨٤٨٧ - **حَنْجُولَة** * ، **مَانُورِي**

Sparus oblada, Oblada melanura (S). Sparus
oblade, Oblade, Blade (F). Sparus melanurus (E).
سمكة بحرية بيوض من فصيلة الاسبوريات شائكات
الزعانف . اعطانها معظم مناطق البحر الابيض المتوسط ||
ملجنها الحياتي كرسوبي || جسمها اهليلجي الشكل ،
معتدل التبعيط ، يطول نحو ٢٥ سم . ثوبها الى الطحلة
الفضية يعلوها تشيز قاطب اسمر ربة سوداء عند
قاعدة الذنب || زعانفها الظهرية والشرجية مستطيلة .
زعنفها الذيلية فارقة || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٨٤٨٨ - **حُنْدُجِيَّات** ٥ Protrachéates (F).
صف من الدويبات كثيرات الارجل القصيرة ، مركزها
الجسموري يأتي بين المفصليات والحلقيات . معظم انواعها
يعيش في الاماكن المظلمة كالكهوف والاقبية .

البحر الاحمر والاسود . تألف الكهوف والمغاور . تعيش
جماعات كثيرة العدد . مسرحها من الفسق حتى فحمة
الليل . قوتها الحشرات على اختلاف انواعها .

٨٤٦٦ - **حُنَّاك** Stomatite (F). Stomatitis (E).
هو التهاب غشاء الفم .

٨٤٦٧ - **حَنْبَاج أَمْرَط** ٥*

Xantholinus glabratus (S). Xantholin glabre (F).
Xantholinus glabratus (E).
حشرة جاسة واثجة وقانصة من فصيلة الدنيات ورتبة غديات
الاجنحة . تألف الحقول والبراري والاحراج قوتها الحشرات
الدنيا والمكن والديدان والمواد العضوية || جسمها متوسط
القد يطول من ١٢ الى ١٤ مم . ثوبها اسود اللون ، احمر
الظهران . رأسها مستغلف الجرم ، ضليع الفكين . زباناها
خطيان اصفران . عينها صغيرتان . ظهرها يلحف نحو
ثلث البطن . بطنها مخروطي المؤخر . جرامزها حراء اللون .
ارساغها خماسية العقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر
الحشرة الجمالانة في اواسط الربيع وتعيش حتى اواسط
الخريف . تسافد في اواخر آب . تمنح المكن تحت الجشالة
والاوراق الساقطة || اليرقة عند بلوغها الادراك التام تطول
من ٢٥ الى ٣٠ مم . جسمها شبه اسطواني الشكل ، اطحل
اللون ، مستغلف الرأس الامفر ، اسمر المدب والرواجب ||
طور الاكمال الذي يستمر نحو ستة اسابيع ينقضي في
التربة على عمق ٢ او ٣ سم .

٨٤٦٨ - **حَنْبَاج** ضرب من القمل .

٨٤٦٩ - **حَنْبُل** Haricot (F). Kidney-bean (E).
هو الفاصولياء ، اطلُبها .

٨٤٧٠ - **حَنْبُولَة** Gousse (F). Husk, Pod (E).
هي السنفة .

٨٤٧١ - **حَنْبُولَة** ٥* Vermetus (S).
Vermet (F). Vermetus (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل
وفصيلة الحنبوليات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في
جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . ملجنها الحياتي
بحامي تعيش بالقرب من بعضها البعض || اصداقها حنبلية
الشكل . مستطيلة ، ملولبة ، محلزنة الاطراف الزلقة
الدقيقة || اعرف انواعها من عظم البحر الابيض المتوسط .

٨٤٧٢ - **حَنْبُولَة الرِّمال** Vermetus arenarius (S).
يكثر وجودها على رمال الشواطئ المغشورة .

٨٤٧٣ - **حَنْبُولَة مُشَلَّطَة الزوايا**

Vermetus triquetrus (S).
يكثر وجودها قرب مصور المجاح .

٨٤٧٤ - **حَنْبُولِيَّات** ٥ Vermetidae (S).
Vermetidés (F). Vermetidae (E).

فصيلة من الرخويات معديات الارجل اماميات الخياشيم .
اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في جميع
بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصداقها حنبلية
الشكل او عنمية ، مستطيلة ، ملولبة محلزنة الاطراف
الدقيقة || اعرف اجناسها واشهرها الحنبلية والكوكمية .



حنباج امرط



حنبلية



حنجوف



حنجولة



حندوق كنارية



حندوق أزرق



حندوق حقل



حشّ مبدول

٨٤٩٩ - حُنْدُر - Similaire (F). Similar (E).
من ذات المادة أو الطبيعة أو الكنه .

٨٥٠٠ - حِنْزَاب ، حِنْزَابَة ، حِنْزُوب
Pastenado (F). Wild carrot (E).
هو الجزر البري . والحِنْزَاب هو ذكر القطا وقيل
جماعة القطا .

٨٥٠١ - حَنْش
Colubra (S).
Couleuvre (F). Coluber (E).
جنس حيات غير سامة من خلفيات الاخاديد . أنواعها
عديدة وأثوابها كذلك تغلب فيها السرة الداكنة السوداء
المواج وبعض التخطيط المستطيل المختلف الألوان . أما
قدها فيراوح من ٧٠ إلى ٢٠٠ سم . قوتها الوزغ والسماك
والضفادع والمصافير والحشرات .

٨٥٠٢ - حَنْش مَبْدُول * ، أَرْقَم ، أَيْم ، أَيْن
Colubra atro-virens, Zamenis gemonensis (S).
Couleuvre commune, Zamenis commun (F).
Snake, Zamenis (E).

حية بيوض من الاحناش عادات الاخاديد محتبسات
السوم . جسمها مستدق الجرم يطول نحو ١٥٠ سم .
ثوبها الى الخضار الاربيد الاسمر المواج تعلو من الخطم
الى طرف الذنب رقشة حنطية تستدق عند الظهر وتحول
الى بقع مرقطة مع اقترابها من البطن . مدنها الى البياض
الاكدر يحوقه من جانبيه تجذيع اسود . رأسها مبسط القمة .
عينها مطوقتان بخراشف صفراء اللون . شدتها ضيق الزاوية
الخارجية . عدد اسنانها ٥٠ منها ٢٦ في الفك الاسفل
و ٢٤ في الاعلى . عنقها قصيرة || تألف المروج والسياجات
والمواقع الرطبة والمستنقعات . قوتها كل ما دب وطار .
تتسلق الاشجار في طلب الوزغ والمصافير وتخوض الماء في
طلب البلاءعيط والاسماك || تسرح في النهار وحتى اوائل
الليل . اخلاقها هنية ، تتحاشى الانسان . حسيها فحيح
خافت متقطع || بياتها الشتوي يستمر من اواخر الخريف
الى اوائل الربيع . تبلغ كامل نموها بعمر ١٥ سنة وتعيش
نحو ١٢٠ سنة || الانثى تسافد بعمر خمس سنوات وتبيض
من ١٦ الى ٣٢ بيضة مجموعة في سبتين تطمرها في الجثالة
المخمرة أو في الرمل || تعتبر من الحيات النافعة .

٨٥٠٣ - حَنْشَات
Albuque (F). Albuca (E).
هي البوقة ، اطلبها .

٨٥٠٤ - حَنْشِيَّات
Colubridae (S).
Colubridés (F). Colubridae (E).
فصيلة من الحيات العديمات الاخاديد منها الخنش والحفاث
وغيرهما .

٨٥٠٥ - حَنْطُوب الحَبُوب
Taigne des grains (F).
هو قوبة الحبوب ، اطلبها .

٨٥٠٦ - حَنْطُوب الحِنْطَة
هو عنجول الحبوب ، اطلبه .

٨٥٠٧ - حِنْطَة
Blé, Froment (F). Wheat (E).
هي القمح الزراعي المعروف . اطلب قح . ثمارها حبوب
يابسة نشوية التركيب تدعى برأ واحدة برة .
لمحة تاريخية عن اصل الحِنْطَة : يقال ان تاريخها يعاصر
المجموعة النباتية الكبرى لذلك فوجودها على الارض كان

٨٤٨٩ - حُنْدُر ، حُنْدُرَة ، حُنْدُور
Prunelle de l'oeil (F). Eyeball (E).
هو بؤبؤ العين .

٨٤٩٠ - حُنْدُوق
Aizoon
جنس نباتات عشبية لحمية برية ويزينية من فصيلة
الظهريات . انواعه المعروفة ثمانية جميعها من نباتات
حوض البحر المتوسط . اوراقها لحمية مختلفة الاشكال .
ازهارها كبيرة القد جميلة الشكل برتقالية اللون أو حمراء .
يستخرج من رمادها البوتاس .

٨٤٩١ - حُنْدُوق كَنْتَارِيَّة *
Aizoón canariensis (S). Aizoon de Canarias, Mésembryanthème de Canaries (F). Purslane leaved aizoon (E). Immergün (D). Aizona canariense (I).
نوع من الحندوق وهو نبات عشبي لحمي حولي تزييني .
اوراقه لحمية . ازهاره جميلة كبيرة برتقالية اللون .

٨٤٩٢ - حُنْدُوقُوق
Mellilotus (S). Méllilot (F).
Mellilot, Sweet-Clover (E).
جنس نباتات عشبية برية وزراعية من فصيلة القطانيات
الفراشية . اوراقها معنقة ثقلية مركبة من ثلاث وريقات .
ازهارها عنقودية التجميع منها الببيض والصفير والزرق .
انواعه عديدة اعرفها ما يلي :

٨٤٩٣ - حُنْدُوقُوق أَيْض
Mellilotus alba (S).
Mellilot blanc, M. de Sibérie (F). White mellilot (E).
نبات مرعوي عشبي معمر يعلو نحو ٢٠٠ سم . وريقاته
السفل بيضة مقلوبة والعليا مستطيلة . ازهاره بيض .
يعتبر من اجود الاعلاف .

٨٤٩٤ - حُنْدُوقُوق أَرْق * ، حُنْدُوقُوق بُسْتَانِي ،
كَرْكَمَان
Mellilotus Indica (S).
Mellilot-bleu, M. musqué (F). Scented trefoil (E).
Trifoglio muschiato (I).
نبات عشبي تزييني معمر . وريقاته بيضية الشكل مقلوبة .
ازهاره زرق . عرفها فواح الرائحة المسكية المستحبة .

٨٤٩٥ - حُنْدُوقُوق حَقْلِي * ، حَنْتَم
Mellilotus officinalis, M. arvensis, Corona regia (S).
Méliot officinal, Mirlilot, Couronne royale, Trèfle de cheval (F). Mellilot, Honey lotus, King's clover (E).
Echter steinklee, Mellilotenklee (D). Mellilot, Corona reale, Trifoglio cavallino (I).

نبات عشبي بري طبي مرعوي يعتبر من الاعشاب الصارة
فيها لو كثر وجوده بين الزرع . وريقاته بيضية مقلوبة .
ازهاره صفراء اللون كثيرة العدد || يقال انه يسكن
المغص والقولنج ويفيد اليرقان والاستسقاء .

٨٤٩٦ - حُنْدُوقُوق صَغِير الزَّهْر ، قُرْط ، حَيْلَبَة
Mollilotus parviflora (S). Méllilot à petites fleurs (F).
نبات عشبي بري واسع الانتشار يوجد في معظم المواقع
والأترية الرطبة . وريقاته السفلى بيضية مقلوبة والعليا
مستطيلة اسطوانية . ازهاره صغيرة القد صفراء اللون .

٨٤٩٧ - حَنْدَم
Arbousier (F). Arbuté (E).
شجر احمر العروق واحده حندمة . يعرف بالقطلب ،
اطلبه .

٨٤٩٨ - حُنْدُورَة ، حُنْدِيرَة
الحندورة والحنديرة : حنْدَقَة العين .

Bitterapfel, Bitterzitrulle (D). Coloquinda, Popone amaro (I).

نبات حولي مداد من فصيلة القرعيات . ضروبه عديدة منها البرية والزراعية . سوقها نحيلة منبسطة . ازهارها صفر . ثمارها صغيرة القد مختلفة الاشكال فيها البطيخي والقرعي والبرتقالي والاجاصي . قشرها رقيقة جامدة . لها اسفنجي التركيب ، ابيض اللون ، شديد المارارة ، كان ولا يزال يستعمل في الطب . يدخل في تركيب عدة مستحضرات ويعتبر من المسهلات القوية المفعول .

٨٥١٦ - حَنْفَاء * Thalassochelys (S).

Caouane, Caouanne (F). Logger-head, Large sea turtle (E).

جنس سلاحف بحرية من اللعجيات انواعه قليلة تعيش في المتوسط وفي مياه بحار المناطق الحارة . جشها كبيرة القد تطول نحو ١٥٠ سم . ذيلها قليل الاحديداب ، قلبي الشكل ، ذلق الطرف ، قتره منبسط السطح ، لونه الى السمرة الخطية || وهي من السلاحف المأكولة اللحم . قوتها الاعشاب البحرية .

٨٥١٧ - حَنْفِيش * Natrix viperina (S).

Couleuvre vipérine (F).

حية بيوض من الاحناش عادات الاتحاديد محتسبات السوم || جسمها معتدل الشخانة ، يطول من ٩٠ الى ١٠٠ سم . ثوبها قريب الشبه بثوب الافسي المبذولة وهو الى الكهبة الخطية الموج يعلوها صف من الزراكش والتجاذيع المعترضة اللاقياسية الترتيب ، يمتد من الرأس الى طرف الذنب ، وصفان ايمن وايسر من البقع الخطية الصفراء الموج المطوقة والمذنية بالاسود || رأسها صغير الجرم ، لوزي الشكل . عينها صغيرتان . شديقها متوسط الانفراج . عدد اسنانها ٥٠ ، منها ٢٦ في الفك الاسفل و ٢٤ في الاعلى . عنقها شديدة القصر || تبلغ كامل نموها بعمر ١٦ سنة وتعيش نحو ١٢٥ سنة . تسرح في النهار وفي اوائل الليل . تألف الغابات والرياض والمناقع . قوتها الحشرات والضفادع والبلاغيط والاسماك والعظاء || الانثى تسافد بعمر خمس سنوات وتبيض نحو ٢٠ بيضة مجموع في شلتين تخفيها في التربة على عمق ٥ او ٦ سم . تعتبر من الحيات النافعة .

٨٥١٨ - حَنْقُ - Eplage (F). Earing (E).

هو الاسبال . وحقق واحقق الزرع : انتشر سنا سنبه بعد ما يقنع .

٨٥١٩ - حَنْقِط * ، حِنْقُطَان Lophophore (F). Lophophorus (E).

جنس طير من فصيلة التدرجيات . كبير الجثة ، ملون الكشوب ، قنبري الرأس . قوي المنقار مستطيله ، مستدير السقط ، طويل الذيل ، املط الرسغ ، ذرب الصيصه العفية . ج حناظ . انواعه ثلاثة مهدها الشرق .

٨٥٢٠ - حِنْقِطُ بَهِيَّة ، حَنْقُط * Lophophorus impeyanus (S). Lophophore resplendissant, Monaul (F).

طائر من الحنقطة كبير الجثة طوله نحو ٧٠ سم . قترته قليلة الريش المستطيل الاخضر الاسفع . ثوبه متراكب الالوان البهية من الاخضر المذهب الى الابيض والاسود والاصهب والاحمر الياقوتي والبنفسجي || موطنه جبال الهند . قوته الاعشاب والثمار والحبوب والجذور والعسافل

قبل التاريخ الذي يعود بنا الى عدة عقود من القرون الخالية . هذا وقد اثبت التاريخ انها كانت مبذولة في مصر قبل المسيح بثلاثة وثلاثين قرناً وانها كانت تزرع في الصين قبل المسيح بالفين وسبعمائة سنة وانها كانت مأكولة من الهنود والتتر والاشوريين واليونانيين والبرانيين والرومانيين والعرب والفرس || يقال ان مهدها الاصلي هو الشرق الاوسط وذلك لان القمح البري لا يزال حتى يومنا هذا من النباتات الطوعية في بعض مناطق لبنان وسورية وفلسطين والعراق والاناضول .

٨٥٠٨ - حِنْطَة تَرْتِيَّة Blé de Tartarie (F).

هي النظم الترتي ، اطلبه . Tatarian buckwheat (E).

٨٥٠٩ - حِنْطَة سَوْدَاء Sarrasin menager (F).

هي النظم المعروف ، اطلبه . Sarrasin corn (E).

٨٥١٠ - حِنْطُوف * Crinigerus (S).

Crinigère (F). Crinigerus (E).

جنس طير من الجواثم سنيات المناقير وفصيلة الكعيتيات . انواعه المعروفة نحو ٥٠ موطنها المناطق الحارة والاستوائية من العالم القديم . تألف الغابات ولا تبتعد عن مجاري الماء . قوتها الحشرات اخصها الفراش وبعض البزور البرية || اجسامها متوسطة القد تطول من ٢٣ الى ٢٧ سم . رؤوسها معتدلة الجرم . مناقيدها مخروطية الشكل . سبالها كثيفة اطلبه الدقيق . اجنحتها كبيرة ذلقة . اذناها مستديرة الاطراف . اثوابها متباينة الالوان يكثر فيها الاخضر الالمن في الصفحات العليا والاصفر الاغبر في الصفحات السفلى || تدثن في الاشجار الرفيعة وتركز اعشاشها عند اطراف الاغصان . اناثها تحضن بمناوبة الذكور من ٣ الى ٥ بيضات على ثلاث مراحل في الحول .

٨٥١١ - حِنْطُوب * Trox

الحنطوب ج حناظب جنس حشرات من فصيلة الحنطليات . انواعه عديدة جميعها صغيرة القد تعيش على الصوف والريش والشعر || اشهرها واعها حنطوب الطير والحنطوب اللؤلؤي .

٨٥١٢ - حِنْطُوب الطير * Trox perrisi (S).

نوع من الحناظب صغير القد طوله نحو ٦ مم . ثوبه الى السمرة يعلوها موج اسفع لامع . يعيش في الحممة وعلى الاشجار التي يدثن فيها الطير . قوته الريش .

٨٥١٣ - حِنْطُوب لُؤْلُؤِي * Trox perlatus (S).

نوع من الحناظب طوله يراوح من ٨ الى ١٢ مم . ثوبه الى السواد الداكن ، غمداء لؤلؤية الرقشة . يكثر وجوده من نيسان الى تشرين . يعيش على مختلف المواد العضوية اخصها الصوف واللباد .

٨٥١٤ - حِنْطُوبِيَّات * Trogidæ (S).

Trogidés (F). Trogidæ (E).

فصيلة الحناظب وهي حشرات من مغمذات الاجنحة صفيحيات القرون . اجناسها وانواعها عديدة جميعها صغيرة القد محدودة . قوتها المواد العضوية اخصها الريش والصوف والوبر والشعر واللحوم الجافة .

٨٥١٥ - حَنْظَل * ، حَدْج ، مَرَارَة الصَحَارَى Citrullus colocynthis, Cucumis colocynthis (S). Co-

loquinte, Chicotin (F). Colocynth, Bitter apple (E).



حِنْطُوف



حنظب الطير



حنظب لؤلؤي



حنظل



حنفاء




حنفش



حنقط



حنكران



حنكله الاجاص



حنكله الارطنسيا



حنكله القطن

٨٥٢٨ - حِنْكَلةُ الأَغْرُوَانِ ٥ أُسْكُوشِيَتَا الأَغْرُوَانِ ٥
Ascochyta syringae (S).

فطر مجهري يتكاثر في الخريف فيركب اوراق الاغروان. مظهره الخارجي بقع مبعثرة لاقياسية الشكل والحجم توهم النصل على صفحته العليا. تبدو حنطية اللون موشحة ثم تنحرف الى السمرة. يكافح باستعمال احد الفواطير الخفيفة الوقع .

٨٥٢٩ - حِنْكَلةُ البُرْتُقَالِ ٥ ، أُسْكُوشِيَتَا البُرْتُقَالِ ٥
Ascochyta corticola (S).

Bark blotch of citrus (E).

وصم يصيب ليمون الحامض والبرتقال سببه فطر مجهري يعترى السوق والاغصان. مظهره الخارجي لطخ موشحة مستطيلة سمراء اللون تركب اللحاء فتصدعها وتلويها. يكافح بانزعاج اللحاء الموبوءة وبتطهير الجروح المستحدثة باحد المحاليل النحاسية ثم طليها بالمستيك .

٨٥٣٠ - حِنْكَلةُ التبغ ٥ ، أُسْكُوشِيَتَا التبغ ٥
Ascochyta Ducometi, A. nicotianae (S).

فطر مجهري يصيب التبغ في سوقه واوراقه. مظهره الخارجي على الاوراق بقع لاقياسية الشكل والحجم لوها الى الصهبة الحنطية. إطارها اسمر. وهو على السوق لطخ قرحية مستطيلة تعطب الانسجة والالياف حتى المكالك. بكنيداتا شبه كروية، قياسها نحو ١٢٥×١٤٠ مي. بويغاتها شفافة بيضية، متوسط قياسها ٣×٧ مي. وهي وحيدة الخلية بمعدل ٧٥٪. ثنائيتها بمعدل ٢٠٪ وثلاثية الخلية بمعدل ٥٪. يكافح بتطهير البذار وتنعير التربة باحد الفواطير الفعالة غير المرتكزة على الكبريت النحاس .

٨٥٣١ - حِنْكَلةُ التيرَمِسِ ٥ ، أُسْكُوشِيَتَا التيرَمِسِ ٥
Ascochyta caulicola (S).

فطر مجهري يركب سوق الترمس. مظهره الخارجي بقع صغيرة، كثيفة التجميع، مستديرة، غبراء اللون أو فضية. يحرقها اطار اسمر. توهم الساق ربما فتشوها وتقتضي على الاوراق. يكافح بتطهير البذار وباجتناب الارربة الموبوءة .

٨٥٣٢ - حِنْكَلةُ التين ٥ ، أُسْكُوشِيَتَا التين ٥
Ascochyta caricae (S).

فطر مجهري يعترى اوراق التين. مظهره الخارجي بقع لا قياسية الشكل والحجم لوها الى الجزء الغبراء يكتشفها اطار اسمر. تركب النصل بموازة العروق والاعصاب فتسبب يباس النسيج المنحارة. يكافح باستعمال الزيت الشتوي بعد اقبال الورق .

٨٥٣٣ - حِنْكَلةُ الجوز ٥ ، أُسْكُوشِيَتَا الجوز ٥
Ascochyta juglandis (S).

فطر مجهري يصيب اوراق الجوز. مظهره الخارجي بقع صغيرة مستديرة كثيفة التجميع سمراء اللون تركب النصل على صفحته العليا فتسبب يباس النسيج المنحارة. لا يستوجب المكافحة نظراً لضآلة اضراره .

٨٥٣٤ - حِنْكَلةُ القُطن ٥ ، أُسْكُوشِيَتَا القُطن ٥
Ascochyta gossypii (S).

فطر مجهري يصيب القطن في فروعه واوراقه وعفازاته. مظهره الخارجي بقع مستديرة حنطية اللون زيتية المواج تركب الاوراق فتعرقل سير النسخ وتركب العروق والبيلم

والحشرات والديدان. انشاء تبيض من ١٢ الى ١٦ بيضة تحضنها وحدها في عش تدثه في الجنبات والشجيرات الدغلة .

٨٥٢١ - حِنْقِطٌ صِينِي (S). Lophophorus lhuysii (S).
Lophophore de Lhuys (F).

طائر من الحنقط كبير الجثة طوله نحو ٨٥ سم. قنزته كثيفة الريش القصير. ثوبه متراكب الالوان يكثر فيه الازرق الاسفع المواج. موطنه جبال الصين. مجثمه الاشجار الافقية الاغصان .

٨٥٢٢ - حِنْقِطٌ مَلَقَّة (S). Lophophorus sclateri (S).
Lophophore de Sclater (F).

طائر من الحنقط كبير الجثة. طوله نحو ٧٠ سم. قنزته صغيرة، قصيرة، قليلة انريش. ثوبه متراكب الالوان يكثر فيه الاصهب والاخضر المذهب. موطنه ملقة والهند الصينية .

٨٥٢٣ - حَنْكَثٌ ضرب من النبات (اللسان) .

٨٥٢٤ - حَنْكُرَانٌ * (F). Helotarsus (S). Hélotarse (F).

طائر وحيد الجنس والنوع من عمارة الحداء وفصيلة الصقريات يتميز باستطالة سقطيه وبقصر عنقه وذنبه. ثوبه متراكب الالوان. رأسه وعنقه وصدره وبطنه الى السواد. ظهره الى الصهبة الحنطية المابقة، ظاهر سقطة ينحرف من الصهبة الشقراء الى الرصاصية، باطنه الى الابيض القضي. منسره اصفر اللون، احمر الانتشاب، ازرق البهرة. موطنه البلاد الافريقية، يعيش ازواجا ذكراً وأنثى. يألف الجبال والفيافي. قوته الافاعي على اختلاف اجناسها واحجامها. يقتنص الطباء الصغيرة والرتال والحملان. يدرن عشه في الاشجار. انشاء تبيض من ٢ الى ٤ رفئات تحضنها وحدها نحو ٤ اسابيع .

٨٥٢٥ - حِنْكَلةُ ٥ ، أُسْكُوشِيَتَا ٥ Ascochyta

جنس فطور مجهرية من فصيلة الصمغيات. بكنيداتا محضونة، كروية أو بيضية الشكل، جوها مسودي التركيب. بويغتها بيضية، شفافة، وحيدة الخلية في اول عهدها ثم ثنائيتها. انواعه عديدة بعضها يركب الاوراق والبذر فيقرحها ويؤذيها. أشهرها ما يلي .

٨٥٢٦ - حِنْكَلةُ الإِجَاصِ * ٥ ، أُسْكُوشِيَتَا الإِجَاصِ ٥
Ascochyta piricola (S).

فطر مجهري يصيب اوراق الاجاص فيؤذيها. مظهره الخارجي بقع مبعثرة تبدو صغيرة فضية اللون ثم تتسع وتمتد بدون قياس فيبلغ قطرها نحو ٤ مم. ويصبح لوها الى الغبرة الصفراء الزاهية يتوسطها محور فضي ويجرقها اطار ضيق الاتساع قرمزي اللون. يركب الاوراق في خلال شهر آب فيدفعها الى الاعمال الباكر. يكافح، اذا دعت الحاجة، باستعمال احد الفواطير المتوسطة الوقع .

٨٥٢٧ - حِنْكَلةُ الأَرطَنْسِيَا * ٥ ، أُسْكُوشِيَتَا الأَرطَنْسِيَا ٥
Ascochyta hydrangeae (S).
Maladie des hortensias (F).

فطر مجهري يعترى فروع واوراق الارطنسيا. مظهره الخارجي بقع لا قياسية الشكل والحجم تبدو عابرة اللون الاخضر ثم تنحرف نحو السمرة. يكافح باستعمال اوكسيكلوريد النحاس المركز ١٪ .

منها البرية والزراعية . جميعها صغيرة القد . سوقها فرعاء .
أوراقها كاملة متعاقبة سنانية النصل الضيق . أزهارها
لا تذبل وهي طويلة الزناد ، فارشة البتلات ، كثيفة الرؤوس
الحشني الشذور . اعرف أنواعه وأشهرها الحنوة الحولية .

٨٥٤٣ - حَنُورَة حَوْلِيَّة *

Xeranthemum annuum (S). Xéranthème annuel,
Immortelle de Belleville, Œillet de Belleville (F).
Dry flower, Immortelle flower (E). Papierblume (D).
Xerantemo, Perpetuini (I).

نوع من الحنوة وهو نبات عشبي حولي . أزهاره
لا تذبل . ضروبه عديدة . ساقه فرعاء تعلو من ٥٠ إلى
٦٠ سم . أوراقه لسنة ، سنانية . أزهاره طويلة كثيرة
العدد ، مختلفة الألوان التي تتغير مع الضروب . أزهاره
يستمر من حزيران إلى آب .

٨٥٤٤ - حَنُور ٥ ، عَصْفُور فَارِي (S). Colius (S). Coliou, Oiseau-souris (F). Colius (E).

جنس طير من فصيلة الحنوريات . أنواعه المعروفة سبعة
جميعها من طيور المناطق الأفريقية الحارة . تعيش جماعات
متفاوتة العدد . تألف الادغال وتقتسلق الاشجار بخفة وتعدو
بين الاعشاب كالفرثان ما دعا إلى نعتها بالمصافير الفأرية .
اثوابها إلى الرمدة . ريش ظهورها وبطنها وأفانيكها دقيق ،
قصير ، ناعم ، حريري الملمس || قوتها الثمار والبذور
والزمرعات والنوامي || تدثن اعشاشها في الاشجار والادغال
الشائكة . تحبها بالاليف والحشائش وكثيراً ما تقيها
الواحد قرب الآخر فتبدو كالصفوف المتتابعة || أشهر
أنواعه الحنور الابيض المحاسر .

٨٥٤٥ - حَنُور أبيض المحاسر ٥ ، تَهِيْط

Colius leucotis (S). Collou à joues blanches (F).
Collus leucotis (E).

نوع من الحنور . اعطانه تمتد من تهام حوض البحر الاحمر
إلى الحبشة والسودان والكنزو . طوله نحو ٣٧ سم . ثوبه إلى
الريدة ، ظهره عايق اللون . بطنه إلى الريدة الحنطية الشهباء
المواج . جبهته إلى السمرة . محسراه إلى الصفرة التنبية .
زوره إلى الريدة الرمادية . منقاده أزرق المخطم الأعلى ،
احمر الاسفل . رسفاه إلى الحمرة المرجانية || يعيش جماعات
قليلة العدد . سر به يعد من زوجين إلى خمسة أزواج . يألف
العيس والاجام والاحراج الوعرة || طيرانه قصير الشوط
ولا يستطيع إليه سبيلاً إلا من على أرفع الاغصان أو قن
الاشجار حيث يرمي بنفسه ليتمكن من التحليق قليلاً ||
قوته ثمار النباتات البرية وأن تعذرت عليه فلا يعف عن
ثمار النباتات المزروعة ويطلبها حيث تكون ان في المزارع
أو قرب المساكن || ومن عاداته المألوفة انه يمضي الليل
في مجاثم معينة تجتمع فيها جميع اسراب المنطقة مها كان
عندها أن مئة أو ألف . وهو يمضي الليل معلقاً برجليه
كالخفاش لا جاثماً فوق الفصن كسائر الطير || الاثني
تضع من ٦ إلى ٧ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو
١٥ يوماً .

٨٥٤٦ - حَنُورِيَّات ٥ Collidae (S). Collidés (F). Collidae (E).

فصيلة طير من رتبة الجواثم سنيات المناقير . أنواعها
المعروفة سبعة يجمعها جنس واحد . موطنها يمتد من أفريقية
الجنوبية إلى الوسطى والشرقية || اجسامها ربعة . مناقيدها
قصيرة . مخاطمها العليا محدبة تنتهي بهرة محبنة . اجنحتها

فتبدو عليها أشد سمرة وأوضح أطواراً || يكافح بتعفير
القطن بأحد الفواطير غير المركزة على النحاس .

٨٥٣٥ - حَنَكَلَة هورتوروم ٥ ، أَسْكُوشِيَّتَا

Ascochyta hortorum (S). هورتوروم ٥

فطر مجهرى يصيب عدة نباتات من الفصيلة الباذنجانية
اخصها الباذنجان والبنندوره كما يصيب الارضي شوكي .
مظهره الخارجي على الباذنجان قروح عفنية تمتدق سوق
الشتول الفتية عند انتشارها من التربة فتقضي عليها . ويكون
في الشتول البالغة والمثمرة قروح لا قياسية الشكل والحجم
لونها إلى السمرة تركب السوق والفروع والأوراق والثمار
فتعطيها وتلويها || يتكاثر ويفتك في المواقع الحارة
الرطبة || وهو على البنندوره قروح فسيحة مستطيلة حنطية
اللون أو غبراء تركب العروق فتسبب يباس البشرة
الذي يعقبه يباس وانفجار النسيج الحليوية . وقد يكون
على الأوراق بثوراً مختلفة الاحجام تبدو حنطية ثم تيبس
فتسبب نخر النسيج . وهو في الثمار قروح حنطية ثم
سمرأ اللون ترفع النسيج المنحارة إلى ان يتم تطورها ثم
تخسفها وتصلبها وتقودها إلى العفن || يكافح باستعمال
أحد الفواطير الفعالة المركزة على النحاس .

٨٥٣٦ - حَنَكَلِيْس Anguille commune (F). Eel (E).

هو الانقليس ، اطلبه .

٨٥٣٧ - حَنَكَلِيْسِيَّات Anguillidés (F).

Anguillidae, Eels (E). هي فصيلة الانقليسيات ، اطلبها .

٨٥٣٨ - حَنُكُور Dromas ardeola (S).

Dromas (F). Crab plover (E).

طائر من طوائف الساق وطيور الماء مركزه الخلقي بين دجاج
الارض والشنطلي وهو وحيد الجنس والنوع . ابيض الرأس .
اسود الظهر والمنقار الكبير ، اسمر البطن والرجلين .
موطنه حوض البحر الاحمر والهند وسيشل ومدغسكر .

٨٥٣٩ - حَنَكِيَّات Gnathobdellidés (F).

Gnathobdellides (E).

رتبة العلق الحنكيات من صف العلقيات .

٨٥٤٠ - حَنَمَة *

Carine passerina, Glaucidium passerinum (S). Che-
vêchette, C. naine (F).

طائر من البوميات وعارة الفداديات . وهو اصغر أنواع
الفصيلة قدماً واكلها انسجماً . طول الذكر نحو ١٨ سم .
وبسطة سقطيه ٤٢ . الانثى طولها نحو ٢٠ سم . وبسطة
سقطيها ٤٧ وثوبها اعبق لوناً من ثوب الذكر || موطنه
جميع البلاد المعتدلة الحرارة . يألف الاحراج ويمضي
الصيف في الجبال العالية ثم يقترب من الاماكن الآهلة
مع ضيق الشتاء وزمهريره || يدثن عشه في صدوع
وتجاويف الاشجار . اثناء تضع اربع بيضات صغيرة
مستترة غبراء اللون تحضنها وحدها || يلتبس قوته عند
الغروب وفي الصباح الباكر . يصيد الفار وجميع أنواع
الحشرات .

٨٥٤١ - حَنَن الحن هو الجمل ، اطلبه .

٨٥٤٢ - حَنُورَة Xeranthemum (S). Xéranthème (F).

جنس نباتات عشبية من فصيلة المركبات . أنواعه قليلة



حنكلة هورتوروم



حنكور



حنمة



حنوة حولية



حنور ابيض المحاسر

٨٥٥٨ - حَوَّافِيَّات * Trochozoaires (F).
اسم يطلق على جميع دويبات الحلقيات والرخويات المميزة بالحوافة.

٨٥٥٩ - حَوَّام Pernis (S). Bondrée (F).
جنس طير من عمارة السقاوات ونصيفة الصقريات. أنواعه أربعة جميعها مستطيلة الشكل، هيفاء القد، طويلة الجناح والذنب، قصيرة الارباع المسرولة. انوثتها تختلف باختلاف النوع والعمر وبين الذكر والانثى وهي متراكبة الالوان الموشحة والموشمة. مناسرها سود. عيونها صفراء أرجلها حنطية || قوتها العطاء والضفادع والزناير والحشرات لذلك فهي من الطيور النافعة التي يجب ان تسلم من اذى الانسان.



حَنِيَّت

٨٥٦٠ - حَوَّام إفريقي Pernis tachardus (S).
Bondrée africaine (F).
طائر من الحوام موطنه افريقية الشرقية ومدغشكر. طوله نحو ٦٠ سم. ظهره اسمر الريش الموشح. بطنه يميل الى الزرقا يعلوه وشم ابيض. قوته العطاء وجميع انواع الدويبات والحشرات.

٨٥٦١ - حَوَّام النَّحْل * Pernis apivorus (S).
Bondrée apivore (F). Honey buzzard (E).
طائر من الحوام طوله نحو ٦٠ سم. وبسطته ١٣٠. وهو من الطيور القواطع التي تجوب المناطق الحارة والمعتدلة. رأسه أطحل ازرق. ظهره وسقطاه الى السفرة الموشمة. بطنه الى الرمادي الازرق يعلوه توشيم ابيض. ذنبه اسمر اللون تعلوه ثلاثة خطوط سود معترضة || قوته الزناير والعطاء والضفادع والحشرات.



حوام النحل

٨٥٦٢ - حَوَّام مُتَوَجَّج Pernis cristatus (S).
Bondrée huppée (F).
طائر من الحوام يتميز بقنبرة صغيرة تعلو مقدم الرأس. موطنه الهند وجوارها. ريشه متراكب الالوان المتداخلة، براق الموج. قوته الدويبات والحشرات.

٨٥٦٣ - حَوَّام مُدَوَّكَب Pernis longicauda (S).
Bondrée à longue queue (F).
طائر من الحوام يتميز بطول ذنبه وبضارة الوان ريشه. موطنه البلاد الحارة. يكثر قرب المياه الجارية: قوته الحشرات والضفادع والدويبات.

٨٥٦٤ - حَوَّابَة، حَيَّابَة Parenté du côté maternel
القرابة التناسلية الانثوية.

٨٥٦٥ - حَوَّتُ الْجَنِّ، حَوَّتُ الْحَيْضُ Gobie (F). Goby (E).
هو القويون جنس اسماك بحرية ونهرية.

٨٥٦٦ - حَوَّتُ جَنُوبِي Poisson austral (F).
Piscis australis (E).
الحوت الجنوبي كوكبة نجوم جنوبية الموقع مركزها جنوبي برج الدلو. رأس الحوت الى المشرق وذنبه الى المغرب || عدد نجومها ١٤ والعرب تسمي النير الذي على فمه « فم الحوت ».

٨٥٦٧ - حَوَّاء Louvet (F). Wolf-coloured, Grey (E).
من اثواب الخيل. وهي شقرة الى سواد. يقال للذكر أحوى وللانثى حواء.

قصيرة. اذناها مستطيلة. ومن ميزاتها انها تحرك اصابعها كيفما تشاء فتجعل الاربع في صف واحد || قوتها الثمار والبذور والزمعات والنوامي.

٨٥٤٧ - حَوْنُ الْبَزَّاز Adonide automnale (F).
هو الادونيس الخريفي، اطله. Autumn adonis (E).

٨٥٤٨ - حَنِيَّت * Hinnites (S).
Hinnite (F). Hinnites (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة المشاقيات. انواعها المعروفة عديدة بعضها من متحجرات الاراضي الثالثية والبعض الآخر منتشر في معظم بحار العالم || اصداقها شبه مخروطية الشكل، لامتناهية المصاريع الشعاعية التخديد طولاً والمخرزة عرضاً. تتميز بغزارة ليغنها في عهد النشوء وبقلته في عهدي الكمال والاستقرار || تعيش لاصقة بالصخور المتوسطة الغور.

٨٥٤٩ - حَنِيِير Voûte (F). Arch, Vault (E).

٨٥٥٠ - حَنِيِيرَة Clé de voûte (F). Keystone (E).

٨٥٥١ - حَوَّ، نَمَلٌ سَلِيمَان Fourmi de Salomon (F).

نوع من النمل الاخر صغير القد واسع الانتشار يكثر وجوده في معظم مناطق الشرق الاوسط.

٨٥٥٢ - حَوَّاءَة * Carpoceras (S). Carpoçère (F).
جنس نباتات عشبية حولية ومحولة من فصيلة الخنازيريات. انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم الاصقاع الحارة والاستوائية || ازهارها بيضاء اللون او وردية. اعرف انواعها واشهرها الحواة المقرنة.

٨٥٥٣ - حَوَّاءَة مُقَرَّنَة * Carpoceras oxyceras (S). Carpoçère cornu (F).

نوع من الحواة. منبتها بعض اصقاع الشرق الاوسط. ساقها قليلة الفروع، منتصبة تعلو من ٦٠ الى ٨٠ سم. اوراقها السفلى سنانية النصال المستطيلة. اوراقها الساقية والعليا ضيقة النصال الطويلة. ازهارها وردية اللون. تنويرها صيفي. ثمارها غرنوبية مقرنة حادة القرون، ثلاثيتها. بزورها صغيرة مفلطحة منقطة.

٨٥٥٤ - حَوَّار Chamelet (F). Young camel (E).
ولد الناقة من حين يرضع الى ان يفطم ويفصل عن امه فهو اذ ذاك فصيل. ج أحورة وحيران وقالوا ايضاً حوران.

٨٥٥٥ - حَوَّارَة Marne gypseuse (F).
Gypseous marly (E).
تراب كثر فيه نسبة المواد الصلصالية اللزجة بعد الجصية ومزجت مع القليل من الرمل الناعم وبعض المواد الاخرى.

٨٥٥٦ - حَوَّار هو الجمعان الكبير.

٨٥٥٧ - حَوَّافَة Trochosphère (F).

اسم يطلق على كل دموعية من الحلقيات والرخويات تتميز بجسمها الشبه ابجاسي الشكل يطوقه حزام من الهلب المزاز. حركتها اندفاعية كالندودة.

٨٥٧٧ - حَوْذَانِ اسْبَوِي * ، شَقَائِقِ النَعْمَانِ ، كَبَيْكَج ، كَف السَّبْع ، كَف الضَّبْع ، لَالَة

Ranunculus asiaticus (S). Renoncule d'Orient, R. des fleuristes, R. des jardins, R. asiatique, Rouma, Hasard (F). Asiatic crowfoot, Persian buttercup, Turban (E). Ranunkel, Asiatischer hahnenfuss (D). Ranuncolo, R. di Persia, R. scempio (I).

نوع من الحوذان الزراعي التزييني المعمر. ضروبه عديدة. يعلو من ١٥ إلى ٣٠ سم. أوراقه داكنة الخضار مسننة النصل. ازهاره فردي التجميع تاجي الارتكاز. ازهاره خاسية التركيب ومنها مكبسة. ألوانها عديدة تختلف مع الضروب. فيها الابيض والاصفر والاحمر والبرتقالي والموشح.

٨٥٧٨ - حَوْذَانِ تَيْنِي * ، شَقِيقِ الْجَبَلِ ،

Ranunculus ficaria (S). مَامِيَزَانِ صَفِير Renoncule ficarioïde, Eclairette, Petite chéridoine (F). Celandine, Lesser celandine, Marsh pilewort (E). Scharbocks hahnenfuss (D). Ranuncolo ficario, Celidonia minore (I).

نوع من الحوذان المعمر البري الجبلي المنبت. يعلو من ٥ إلى ٢٠ سم. ساقه منتصبه وحيدة الزهرة الناجية البيضاء اللون. أوراقه مستعرضة الشكل مفرصة النصل البحري الخضار، تشبه ورق التين.

٨٥٧٩ - حَوْذَانِ حَرِيف * ، شَقِيقِ السُّفُوطِ ،

Ranunculus acer (S). زِرْ ذَهَبِي Renoncule acre, Bassin d'or, Bouton d'or (F). Buttercup, Blister plant, Crowfoot (E). Butterblöme, Scharfer hahnenfuss (D). Ranuncolo acre, Batrachio, Bottone d'oro (I).

نوع من الحوذان الزراعي التزييني المعمر. يعلو من ٣٠ إلى ١٠٠ سم. ساقه منتصبه زباء. أوراقه كثيرة التفريش والتشريح، مسننة الحافة، زغبية النصل. ازهاره ذهبية اللون. ازهاره يستمر من ايار الى حزيران.

٨٥٨٠ - حَوْذَانِ حَقْلِي * ، شَقِيقِ حَقْلِي ، كَف المَرْ

Ranunculus arvensis (S). Renoncule des champs, Bassinet des champs (F). Corn buttercup, Corn crowfoot (E). Acker hahnenfuss (D). Ranuncolo del campi, Bella pulcella (I).

نوع من الحوذان البري الحولي يعلو من ١٠ إلى ٢٥ سم. ساقه قليلة الزغب. أوراقه السفلى بيضية اسفينية مسننة، أما العليا فمفرصة عيقة التشريح الرمحى الشكل. ازهاره بيض مستعرضة البتلات. ازهاره ربيعي.

٨٥٨١ - حَوْذَانِ شَرِير ، حَوْذَانِ شَقِيقِ ،

Ranunculus sceleratus (S). Renoncule scélérat (F). Celery leaved crowfoot, Water celery (E). Giftahnenfuss (D). Ranuncolo scellerato, R. di padule (I).

نوع من الحوذان البري الحولي يعلو من ٢٠ إلى ٦٠ سم. ساقه منتصبه فرعاء. أوراقه السفلى والعليا ثلاثية التفريش. خرقية التشريح. ازهاره بيض. ازهاره ربيعي. يكثر في الأتربة الرطبة المبللة || يعتبر من النباتات السامة الخبيثة.

٨٥٦٨ - حَوْتَنَة ٥ Cétographie (F).

Cetography (E).

الحوتنة علم يبحث في تحلية الحيتان وملاجلها الحياتية.

٨٥٦٩ - حَوْتِيَّات Cétacés (F).

Cetacea, Whales (E).

الحوتيات أو الحيتان رتبة حيوانات مائية من الثدييات. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة تجمعها سبع فصائل تنضم الى مرتبتين كما هو مبين في الجدول التابع || اجسامها متفاوتة القد، شبه وشمية الشكل، تكثر فيها الضخامة والاستطالة. جميعها ثنائية المحاصج الحوضية الارتكاز والتي تقوم مقام الزعانف. محاصجها رباعية الاصابع المغلوقة، مستطيلة الشكل، قليلة العرض، ذلقة الطرف. زعانفها الذيلية مغلوقة، افقية الانتشاب وليست عمودية كما في الاسماك. ضروعها بطنية الارتكاز، ثنائية الاخلاف || ملجئها الحياتي جماعي عند معظم الانواع. جميعها لاحمة، قوتها الاسماك والرخويات والقشريات.

٨٥٧٠ - حَوْت Veine du foie (F). Liver vein (E).

الحوت: عرق الحوثة.

٨٥٧١ - حَوْتَاء Foie (F). Liver (E).

الحوثة هي الكبد.

٨٥٧٢ - حَوْتَمَة * ، سَوَسَنِ أَنْمَرِ

Pardanthus (S). Pardante, Iris tigré (F).

Pardanthus (E).

نبات عشبي جذموري معمر وحيد الجنس والنوع من فصيلة السوسنيات. مهد الشرق الأقصى وقد انتشرت زراعته التريينية في معظم بلاد العالم || أوراقه شبه عصفية الشكل، ميزابية النصال. شماريخه ربيعة تنتهي بأعناق متشعبة. ازهاره صفراء اللون منمشة بالارجواني || زراعته لا تتطلب عناية خاصة لانه نبات سبروتي يحود في جميع الاقربة الزراعية وفي معظم الاقاليم.

٨٥٧٣ - حَوْتَجَة ، حَوْتَجَنَة Rosier rouge (F).

Red rose-tree (E).

الحوتجة والحوتجة هي الوردة الحمراء. ج حورم وحورين.

٨٥٧٤ - حَوْدَل * ، مَنَجَبِي Cercocibus (S).

Mangabey, Cercocèbe (F).

جنس قروذ ذبالة من فصيلة الخجريات. انواعه ٦ موطنها بعض مناطق افريقية الشالية اخصها ليبريه. اجسامها صغيرة القد ربعة تطول نحو ٥٠ سم. اذنانها مستطيلة اثوابها الى الصهبة الغبراء. حثار وجوهها ابيض. اخلاقها رضية رغم شدة نزقها ومرحها.

٨٥٧٥ - حَوْدَلَة Petit bois (F). Grove (E).

هي الاكة.

٨٥٧٦ - حَوْذَانِ Ranunculus (S). Renoncule (F).

جنس نباتات عشبية من سبط الحوذانيات وفصيلة الشقيقيات. انواعه نحو ١٥٠ معظمها معمر وبعضها حولي. منها البرية والزراعية والتزيينية والمنقعية والمائية والسامة والطبية || ازهارها مختلفة الالوان يكثر فيها الابيض. اشهرها ما يتبع.



حَوْتَمَة



حَوْدَل



حَوْذَانِ اسْبَوِي



حَوْذَانِ تَيْنِي



حَوْذَانِ حَرِيف



حَوْذَانِ حَقْلِي

رتبة الحوتيات

الموتبة	الفصيلة	أشهر الأجناس
ريشيات الأذنالك	Mysticètes	
	Balaenidés	<p>Baleine franche بال الشمال</p> <p>Baleine australe بال الجنوب</p> <p>Baleine de Biscaye بال المحيط</p> <p>Baleine du Japon وال</p> <p>Baleine pygmée بال أزعب</p> <p>Mégaptère Boops كبة القطب، جمل البحر</p> <p>Mégaptère Lalaudi كبة الجنوب</p> <p>Mégaptère indienne كبة الخليج</p>
	Balaenopteridés	<p>Rorqual bleu هر كوال أزرق</p> <p>Rorqual commun هر كوال معروف، منارة</p> <p>Rorqual boréal هر كوال القطب</p> <p>Rorqual rostré هر كوال حنزيومي</p> <p>Rorqual à bosse هر كوال سيم</p>
		<p>Baleine grise فال</p>
متمائلات الأسنان	Denticètes	
	Delphinaptéridés	<p>Narval قوقي، حريش البحر، كركدن البحر</p> <p>Béluga بالوغه، حفش روسي</p>
	Physétéridés	<p>Cachalot عنبر</p> <p>Ziphius زيفيوس</p> <p>Hyperoodon دحاس</p> <p>Mésoplodon جناف</p>
	Delphinidés	<p>Dauphin دلفين، نخس</p> <p>Lagénorhynque لجاد</p> <p>Tursiops ترسوب</p> <p>Delphinorhynque, Steno دحاس</p> <p>Marsouin نخس، خنزير البحر</p> <p>Orque أركة</p> <p>Pseudorque دخنشم</p> <p>Grampus جرش</p> <p>Globicéphale جرافة</p> <p>Marsouin noir نخس أسود</p>
	Platanistidés	<p>Plataniste جبحل</p> <p>Inia اينيا، بوتو الأمازون</p> <p>Poutoporia بوتوبوريا، جبحل الرويو</p> <p>Lipotes لبوت، جبحل الصين</p>

اوراقه معنقة طويلة الزناد بيضية الشكل قلبية القاعدة طولها نحو ١٢ سم. نصلها مالم الصفحة العليا العابقة الخضار، خلي السفلى البيضاء الموج || زمعته غليظة دبكة بلسية العرف .

٨٥٩٠ - حَوْر رَجْرَاج *

Populus tremula (S). *Peuplier tremble, Tremble* (F). *Aspen, Asp tree, Trembling poplar* (E). *Aspenbaum, Espe, Zitterpappel* (D). *Ploppo tremolo, P. libico, P. pendulo, Tremula* (I).

نوع من الحور يعلو من ١٥ الى ٣٠ م. اوراقه الفتية قلبية الشكل خلية النصل على صفحتيه . اوراقه البالغة معنقة مستديرة نصلها مالم الصفحة العليا البحرية الخضار، ازغب السفلى، منشاري الحافة، طويل الزناد القاتم الخضار .

٨٥٩١ - حَوْر عَطِير

Populus suaveolens (S). *Peuplier odoriférant* (F). نوع من الحور الشرقي المنبت يعلو من ١٠ الى ١٥ م. اوراقه معنقة قصيرة الزناد بيضية الشكل طولها نحو ٨ سم. وعرضها ٤، نصلها اخضر الصفحة العليا الملساء البشرة، ابيض السفلى الخلية || ازهاره وزمعاته عطرة .

٨٥٩٢ - حَوْر غَارِي

Populus laurifolia (S). *Peuplier à feuilles de laurier* (F). نوع من الحور الشرقي المنبت . يعلو من ٢٥ الى ٣٠ م. افئانه زغبية البشرة لونها الى الكهبة الصفراء . اوراقه معنقة، قصيرة الزناد، غارية الشكل واللون، مدبية الزام الاخير تطول نحو ٩ سم. نصلها مالم البشرة مسنن الحافة .

٨٥٩٣ - حَوْر فُرَاتِي * ، حَرَب ، مَرَسِيَس

Populus euphratica (S). *Peuplier de l'Euphrate, P. de Mésopotamie* (F). *Willow* (E). *Weiden* (D). *Ploppo* (I).

نوع من الحور. اقليمه شاسع الحدود يمتد من الصين الى افريقية الشمالية . يكثر وجوده على ضفاف الفرات . يعلو من ١٥ الى ٣٥ م. افئانه زباء اللحاء . اوراقه معنقة مستديرة نصلها بارز العروق زغبية الصفحة السفلى مسنن الحافة ، بحري اللون القاتم .

٨٥٩٤ - حَوْر فَيْضِي ، حَوْر يَابَانِي

Populus sieboldi (S). *Peuplier argenté, Tremble du Japon* (F).

نوع من الحور الشرقي الياباني المنبت . يعلو من ١٥ الى ١٨ م. افئانه ونواميه خلية البشرة البدة الزغب . اوراقه معنقة طويلة الزناد الاسطواني الازغب ، قلبية الشكل ، مستديرة القاعدة ، مدبية الزام الاخير ، خلية النصل على صفحتيه .

٨٥٩٥ - حَوْر فِيرَجِينِيَة

Populus virginiana (S). *Peuplier de Virginie, P. Suisse* (F). نوع من الحور يعلو من ٣٥ الى ٤٠ م. ازهاره مبهكارة تسبق الاوراق من الاسبوعين الى الثلاثة اسابيع . اوراقه معنقة مشرومة تطول نحو ١٠ سم. زنادها احمر اللون طولها نحو ٤ سم .

٨٥٩٦ - حَوْر كَرُولِينَة

Populus angulata (S). *Peuplier de la Caroline* (F).

نوع من الحور يعلو من ٢٠ الى ٣٠ م. افئانه زيتية

٨٥٨٢ - حَوْدَان مَائِي * ، شَقِيْق مَائِي

Ranunculus aquatilis (S). *Renoncule aquatique, Grenouillette, Mort aux vaches* (F). *Water anemone, Water crowfoot* (E). *Wasser hahnenfuss* (D). *Ranuncolo acquatico, Ranonchiella* (I).

نوع من الحودان البري المعمر يكثر في المناقع وعلى ضفاف الماء . يعلو نحو ٣٠ سم. اوراقه طويلة الزناد . ازهاره صفراء . بثلاثها بيضية الشكل مقلوبة || يعتبر من النباتات السامة التي تؤذي المواشي اخصها الابقار .

٨٥٨٣ - حَوْدَان مَدَاد * ، رَجُلُ الْغُرَابِ الْمَدَاد

Ranunculus repens (S). *Renoncule rampante, Clair bassin* (F). *Creeping buttercup, Cruping crowfoot* (E). *Kriechender hahnenfuss* (D). *Ranuncolo strisciante, Capo di turco* (I).

نوع من الحودان المعمر . ساقه منتصبه فراء تعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم. جذوره سطحية مدادة . ازهاره صفراء . ازهاره يستمر من ايار الى تموز . يزرع للتزيين . يرغب في الأتربة المتوسطة الاندماج الرطبة .

٨٥٨٤ - حَوْدَانِيَّات

Renonculées سبط من فصيلة الشقيقيات . اجناسه وانواعه عديدة اعرفها الحودان .

٨٥٨٥ - حَوْر ، جَوْن ، أَلِيَة

Alcor, Alioth, Allath (F). *Alcor, Alioth* (E). الحور والجون والألية ثلاثة أسماء لنجم واحد من كوكبة الدب الأكبر اي نبات تمش الكبرى . مركزه قرب النعش ويليه العناق ثم القائد .

٨٥٨٦ - حَوْر ، حَوْر ، حَوْر

Populus (S). *Peuplier* (F). *Poplar* (E). جنس اشجار حرجية وزراعية صناعية من فصيلة الصفصافيات . ترغب في الاراضي الرطبة . تتميز بسرعة نموها . يفضيها ابيض ، خفيف ، لدن ، شائع الاستعمال الصناعي المختلف المرامي ، من عيدان النقب الى صناعة الورق . || انواعه عديدة وضروبه كثيرة نخص منها بالذكر ما يلي .

٨٥٨٧ - حَوْر أَيْض

Populus alba (S). *Peuplier blanc, P. cotonneux, Abele, Franc picard* (F). *White poplar, Abele tree* (E). *Weisse pappel, Silberpappel, Abele* (D). *Popolo bianco, Albarello, Gattero* (I).

نوع من الحور يعلو من ٢٠ الى ٣٠ م. نواميه خلية البشرة الثلجية اللون . اوراقه البالغة معنقة طويلة الزناد الازغب ، خاسية التفصيص ، بحرية الصفحة العليا ، ثلجية السفلى الكثيفة الازغب القطي .

٨٥٨٨ - حَوْر أَسْوَد * ، حَوْر رُوْمِي

Populus nigra (S). *Peuplier noir, P. franc, Liard* (F). *Black poplar* (E). *Schwarzpappel* (D). *Ploppo nero, P. da polli, P. tuberino* (I).

نوع من الحور . يعلو من ٢٥ الى ٣٠ م. افئانه ونواميه زغبية . اوراقه معنقة ، قلبية ، ملساء النصل السوي اللون على صفحتيه العليا والسفلى || من ضروبه المشهورة الحور الايطالي الهرمي الشكل (*P. italica pyramidalis*)

٨٥٨٩ - حَوْر بَلْسَمِي

Populus balsamifera (S). *Peuplier baumier* (F).

نوع من الحور الايريكي المنبت يعلو من ٢٥ الى ٣٥ م.



حودان مائي



حودان مداد



حور ابيض



حور اسود



حور رجراج



حور فرائي

٨٦٠٦ - حَوْصَل *Pélican (F). Pelican (E).*
راجع بجمع .

٨٦٠٧ - حَوْصَلَة ، ذَوْرَة *Gésier, Jabot (F).*
Gizzard, Crop (E).
عضو من أعضاء الهضم في الطير ، اطلب قانصة .



حور كندي

٨٦٠٨ - حَوْض *Abreuvoir, Bassin (F).*
Watering-place, Basin (E).
هو المكان المعد لجمع الماء اللازم لسقاية الدواجن ، وهو بركة تجمع فيها المياه لمختلف الحاجات .

٨٦٠٩ - حَوْض السَمَك *Vivier (F). Fish-pond (E).*
حوض جعل لتربية السمك خاصة .

٨٦١٠ - حَوْضِي *pelvien (F). Pelvic (E).*
نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بحوض الحيوان كقوائم زعانف حوضية .



حوسك

٨٦١١ - حَوْقَث *Hétérodon (F).*
جنس حيات من الحنثيات يدعى عصابة ، اطلبها .

٨٦١٢ - حَوْقَث مُتَوَج *Hétérodon diadème (F).*
هو العصابة المتوجة ، من الثعابين المفيدة اللامؤذية . اطلبها .

٨٦١٣ - حَوْقَل ٥ ، قُلَنْسُوءَة ، ثِيْرَس *Coiffe (F). Tîp (E).*
بسة واقية صلبة المادة تغلف طرف الجذر وتشق له الطريق في اندفاعه خلال حبيبات التربة .



حوشب

٨٦١٤ - حَوْقَلَة ٥ *Protandrie (F). Protandry (E).*
هي ادراك الطلع في مآبر الزهرة قبل ادراك الازيم والتفاف المدقة .

٨٦١٥ - حَوْق *Châssis (F). Case, Frame (E).*
اطار من خشب او حديد .

٨٦١٦ - حَوْق مُقَرَّر *Châssis vitré (F).*
Garden-frame (E).
اطار من خشب او حديد سقف بالزجاج .

٨٦١٧ - حَوْقَل ٥ *Mastacembelus (S).*
Mastacembla (F).



حوفل

جنس اسماك نهريه من شائكات الزعانف . انواعها المعروفة سبعة . اعطانها انهر الهند والصين وماليزية || اجسامها صغيرة القد او معتدلة ، مستغرقة الشكل المستطيل الاعوج الخط . رؤوسها اسفينية صغيرة تنتهي بمخاطم مدببة . عيونها صغيرة ماصحة . زعانفها الظهرية قاطبة ، القسم الامامي منها شائك المناخس الدقيقة ، اما القسم الخلفي فنفسروفي المادة يتقابل الشرجية . الذيلية صغيرة مقطوعة . اثوابها عادمة الرونق يكثر فيها الخضار الالفس القائم والخضار الاربد الباهت والسمة الحديدية || لحومها متوسطة الصنف مأكولة .

اللون بارزة النضج الاحمر . اوراقه معتقة كبيرة القد قلبية القاعدة طولها من ١٠ الى ٢٠ سم . وعرضها من ٨ الى ١٦ . اما زنادها فيبلغ نحو ١٠ سم .

٨٥٩٧ - حَوْر كَنْدِي * *Populus canadensis (S). Peuplier du Canada (F).*
Canadian poplar (E). Kanadischenpappel (D). Pioppo Canada (I).
نوع من الحور . يعلو من ٣٠ الى ٤٥ م . افنانه مضلعة . اوراقه معتقة قلبية كبيرة القد طولها من ٦ الى ١٢ سم . زنادها اخضر اللون ، نصلها ينحرف من الخمرة الجؤرية الزاهية اللون الى الخضرة البحرية الزيتية الموج || ضرره عديدة أشهرها الحور الذهبي الورق .

٨٥٩٨ - حَوْر وَحِيَّة *Ophiuchus, Serpenteaire, l'Homme au serpent (F).*
Ophiuchus, Serpentarium (E).

كوكبة نجوم شمالية الموقع . اما الحور فصورة رجل قائم قد قبض بيده على حية ونجومه تسعة وعشرون . اما الحية فتجربها ثمانية عشر وعلى عنقها نجم يسمى « عنق الحية » . وتسمى الكواكب المصطفة على رأس الحية « نسفاً شامياً » ، والمصطفة تحت العنق « نسفاً يمانياً » . ويسمى ما بين النسقين الروضة . والكواكب التي بين النسقين ، في الروضة « الاغنام » . والذي على رأس الحور يدعى « الراعي » .

٨٥٩٩ - حَوْرَاء ، حَوْرِيَّة ، عَدْرَاء *Nymphe (F). Nymphe (E).*
تمر الحشرة في دورتها الحياتية بعدة مراحل انتقالية . وقد تكون حورية او عدراء في مرحلة الانتقال والتحويل من يرقة الى حشرة كاملة .

٨٦٠٠ - حَوْرَان *Peau de l'éléphant (F).*
Skin of elephant (E).
الحوران / جلد الفيل وباطن جلده يدعى الحرسيان .

٨٦٠١ - حَوْسَك ٥ *Trachystemon (S).*
Trachystème (F).

جنس نباتات عشبية معمرة سبوتية من فصيلة الحمحميات . انواعها المعروفة قليلة العدد مهددا الشرق الاوسط || سوقها قصيرة سمراء اللون تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقها السفلى معتقة متقاربة . اوراقها الجذمية متعاقبة ، معتقة ، سنانية النصال المكتسية بالخلب الدقيق الجامد . ازهارها عثقودي التجميع . ازهارها صغيرة ، بنفسجية اللون او بيضاء . تنويرها يستمر من اذار الى ايار . اعرف انواعها وأشهرها الحوسك الشرقي والحوسك الاكريقي .

٨٦٠٢ - حَوْسَكَة
كل سمكة صغيرة كثيرة الحسك تدعى حوسكة .

٨٦٠٣ - حَوْش ، زَرْبَة *Enclos pour bestiaux (F).*
Paddock (E).

٨٦٠٤ - حَوْشَب * *Boulet (F). Fetlock-joint (E).*
هو في الخيل المفصل الواقع بين اسفل الوظيف واعلى الرسغ .

٨٦٠٥ - حَوْشَب *Lapin mâle (F). Male rabbit (E).*
الحوشب هو الارنب الذكر .

نشيطة . اثوابها ملونة || تألف الحراج والغابات . تعيش بين الاعشاب . قوتها ما تستطيع قنصه من قواقع صغيرة .

٨٦٢٩ - حَوْمَلَكَة *
Brama (S).
Brame (F). Brama (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة الاسقمريات شائكات الزعانف . اعطانها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط ، اخصها الممتدة من اليونان الى ايطاليا || جسمها اهليلجي الشكل ، معتدل التبسيط ، يطول من ٢٥ الى ٤٥ سم . ثوبها الى الرتبة الفضية يعبق في الظهر ويبيض في البطن . رأسها قصير الخطم المقطوم . فكها الاسفل يتقدم الاعلى بعض الشيء . شدقها واسع الانفراج . عينها كبيرتان مستديرتان . اسفاطها متراكبة ، كبيرة . زعانفها الظهرية والشرجية متقابلة ، مستطيلة ، شارفة المقدم . زعنفتها الذيلية هلالية الشكل || تعتبر من الاسماك البنية التي لا تقترب من المجاذج الا في بعض الازمنة || لحمها فاخر الصنف ، مرغوب فيه .

٨٦٣٠ - حَوْمَلِيَّات *
Homalidae (S).
Homalidés (F). Homalidae (E).

فصيلة حشرات مفترسة من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم حراج البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها مستطيلة الشكل ، معتدلة التبسيط ، تطول من ٥ الى ١٠ سم . رؤوسها صغيرة ، مستعرضة . عيونها بارزة تأشيرها وفكوكها نظامية . قرونها الاستشعارية خيطية ، مركبة من ١١ فصلة . كواسلها حادة الاطراف الخلفية . اغدادها لاحفة ، رخفة . ارساغها خاسية العقل . اثوابها ملونة || تألف الحراج . تعيش بين الاعشاب . قوتها القواقع الصغيرة || اشهر اجناسها الحومل .

٨٦٣١ - حَوَيْة *
Pitangus (S). Pitangue (F).
جنس طير من الجواثم سنيات المناقير وفصيلة الغصوييات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض المناطق الاستوائية الممتدة من الهند الى امريكا || اجسامها متوسطة القد تطول من ١٨ الى ٢٢ سم . مناقبها مسننة المخاطم العلوية . سواقطها متوسطة الطول . اذنانها رتاجية الرفال ، مستديرة الاطراف . اثوابها مبلقة ، ثلاثية الالوان فيها الاسود والابيض والاصفر . بطونها دائماً بيضاء اللون || قوتها الحشرات والدويبات والعطاء والجوارن .

٨٦٣٢ - حَوَيْشَرَة *
Aetheria (S).
Ethérie (F). Aetheria (E).

جنس حيوانات مائية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة الحويشريات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع انهر وبحيرات القارة الافريقية || اصداقها كبيرة القد ، شبه مستديرة الشكل ، مقرنة الاطراف . مصاريعها محدبة ، لامساوية . اصفاها مضلعة وملونة من الخارج ، لؤلؤية من الداخل || تعيش لاصقة بالصخور المغمورة . حومها مأكولة متوسطة الصنف .

٨٦٣٣ - حَوَيْشَرِيَّات *
Aetheriidae (S).
Aetheriids, Ethériids (F). Aetheriidae (E).

فصيلة حيوانات مائية من الرخويات صفيحيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد . اعطانها معظم انهر وبحيرات البلاد الحارة || اصداقها متباينة القد والشكل ، لانظامية التنسيق . اجسامها مائحة المئاعب ، مستغلظة الارجل || اعرف اجناسها واشهرها الحويثيرة .

٨٦١٨ - حَوْقَلَةُ الْبَنْغَال *

Mastacembelus pancalus (S).
Mastacemle du Bengale (F).

نوع من الحوقل . سمكة نهريه اعطانها انهر الهند . جسمها يطول نحو ٣٠ سم . ثوبها الى اخضرار الاربد يملوه تسنج معترض اسود يمتد الى الزعنفة الشرجية || لحمها متوسط الصنف .

٨٦١٩ - حَوْقَم *
Pisonia (S). Pisonie (F).
Pisonia, Cockspur (E). Pisonie (D). Pisonia (I).

جنس شجيرات برية من فصيلة الشيات انواعه قليلة بعضها شائك السوق والاغصان . اوراقها كاملة متعاقبة . ازهارها عنقودي التجميع . ثمارها عشبية دبقه . عيدانها شديدة الالتواء تستعمل في عدة صناعات .

٨٦٢٠ - حَوَك *
Basilic commun (F). Basil (E).
هو الحبق المعروف ، اطلبه .

٨٦٢١ - حَوَل ، حَلَل ، اخْتَزَل *
Réduire (F).
To reduce (E).

٨٦٢٢ - حَوْلِي ، سَنَوِي *
Annual (F).
Annual, Yearly (E).
النبات الحولي هو كل نبات يزهر في السنة التي ينبت فيها ثم يذبل ويموت عقب الاثمار .

٨٦٢٣ - حَوْمَان *
Psoralea (S).
Psoraliar, Psoralée (F). Bread-root (E). Brodwurzel, Harzklea (D). Psoralea (I).
جنس جنبات برية من فصيلة القرنيات الفراشية . انواعه عديدة . اوراقها معنقة متعاقبة نفلية الشكل والتركيب . ازهارها نورية منها ، البيض والزرقي والبنفسجية . اشهر انواعه الثلاثة التالية :

٨٦٢٤ - حَوْمَان جَزَرِي *
Psoraliar comestible, Picotiane (F).
نوع من الحومان جذوره تشبه الجزر الطويل وهي مأكولة تحوي بعض المواد النشوية .

٨٦٢٥ - حَوْمَان زَفْتِي ، عَوَيْنَة *
Psoraliar bitumeux, Trèfle odorant (F).
نوع من الحومان اوراقه تستعمل في بعض المستحضرات الطبية الخاصة بالامعاء .

٨٦٢٦ - حَوْمَان مَغْضَنِي *
Psoraliar glanduleux, Thé du Paraguay (F).
نوع من الحومان اوراقه عطرية صحية تستعمل استعمال الشاي .

٨٦٢٧ - حَوْمَر *
Tamarinier (F). Tamarind-tree (E).
هو التمر الهندي ، اطلبه .

٨٦٢٨ - حَوْمَل *
Homalidae (S).
Homalide (F). Homalidae (E).

جنس حشرات مفترسة من فصيلة الحويليات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعها المعروفة متوسطة العدد . اعطانها حراج وغابات بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها مستطيلة الشكل ، معتدلة التبسيط ، تطول من ٥ الى ٨ سم . رؤوسها مستعرضة . عيونها صغيرة ، بارزة . قرونها الاستشعارية خيطية ، مستطيلة . تأشيرها وفكوكها وملامسها نظامية . كواسلها شبه اسطوانية . اغدادها لاحفة . قوائمها



حوقلة البنغل



حومان



حومل



حوملة



حوية



حويثيرة



حَوَيَّرَاء

٨٦٤٤ - حَيِّ الْعَالَمِ ، حَيَّوْن ، وَدْنَه

Sedum (S). Orpin, Sedum (F). Orpine, Stonecrop (E). Fetthenne (D). Fabaria (I).

جنس نباتات عشبية لحمية حولية ومعمرة من فصيلة الخلدات معظمها من النباتات الطبية التي تدمل الجرح وتشفي البواسير . انواعه نحو ١٣٠ تقسم الى ثلاث لم . اللمة الاولى تشمل الحَيَّوْن الاسطواني والبيضي الورق منها كانت الوان الازهار . اللمة الثانية تشمل الحَيَّوْن الصفيحي النصل الابيض والاحمر الزهر . اللمة الثالثة تشمل الحَيَّوْن الصفيحي النصل الاصفر والاخضر الزهر || اوراقه لحمية مختلفة الاشكال لانظمة التركيب والترتيب . ازهاره طرفية الارتيكار . اشهر انواعه الزينية والطبية ما يتبع .

٨٦٤٥ - حَيِّ الْعَالَمِ الْاَبْيَض ، حَيَّوْن اَبْيَض

Sedum album (S). Orpin blanc, Trique-Madame, Perruque (F).

نوع معمر من اللمة الاولى . يعلو نحو ٢٥ سم . ساقه قليلة الفروع . اوراقه اسطوانية مضلعة تطول نحو ٢ سم . لونها جيل الخضار يعلوه موج احمر . ازهاره تاجية بيضاء اللون او وردية .

٨٦٤٦ - حَيِّ الْعَالَمِ الْاَحْمَر ، حَيَّوْن اَحْمَر

Sedum rubens, Crassula rubens (S). Orpin rougeâtre (F).

نوع حولي من اللمة الاولى . يطول نحو ٢٠ سم . ساقه قليلة التشعب . اوراقه اسطوانية مقطوعة تطول نحو ٢ سم . ازهاره وردية اللون ، حمراء العروق خماسية البتلات والاسدية .



حَيِّ الْعَالَمِ الْاَحْمَر

٨٦٤٧ - حَيِّ الْعَالَمِ الْاَرْغْنِي ، حَيَّوْن اَرْغْنِي

Sedum oreganum (S). Orpin de l'Oregon (F).

نوع معمر من اللمة الثالثة . يعلو من ٨ الى ١٥ سم . اوراقه صغيرة قليلة التشعب . ازهاره مندعمة البتلات ، صفراء اللون .

٨٦٤٨ - حَيِّ الْعَالَمِ الْاَزْب ، حَيَّوْن اَزْب

Sedum pilosum (S). Orpin poilu (F).

نوع معمر من اللمة الاولى . يطول نحو ١٠ سم . ساقه قليلة الفروع زباء . اوراقه مستطيلة متراصة زغبية . ازهاره وردية اللون .

٨٦٤٩ - حَيِّ الْعَالَمِ الْاِسْبَانِي ، حَيَّوْن اِسْبَانِي

Sedum hispanicum (S). Orpin d'Espagne (F).

نوع حولي من اللمة الاولى . يطول نحو ١٥ سم . ساقه نحيلة . اوراقه خيطية ، متقاربة ، بحرية اللون تطول نحو ٥ سم . ازهاره بيض او وردية ، سداسية البتلات .

٨٦٥٠ - حَيِّ الْعَالَمِ الْاَفْنَد ، حَيَّوْن اَفْنَد

Sedum multiceps (S). Orpin branchu (F).

نوع معمر من اللمة الاولى . يعلو من ٥ الى ١٥ سم . ساقه فرعاء . اوراقه زباء النصل ، بحرية اللون . ازهاره كبيرة ، خماسية البتلات ، صفراء اللون . قطرها نحو ١٢ مم .

٨٦٥١ - حَيِّ الْعَالَمِ الْبَرِيطَانِي ، حَيَّوْن بَرِيطَانِي

Sedum anglicum (S). Orpin d'Angleterre (F).

نوع معمر من اللمة الاولى . يطول نحو ١٠ سم . ساقه غليظة . اوراقه بحيلة الخضار ، بيضية الشكل . طولها نحو ٥ مم . ازهاره كبيرة القدر قطرها نحو ١٠ مم . بتلاتها قلبية مدببة لونها الى الابيض او الوردي .

٨٦٣٤ - حَوَيَّرَاء * ، تَفْرُزْ Tephrosia (S).

Téphrosie (F). Tephrosia (E).

جنس نباتات عشبية وجنية وشجرية من فصيلة القرنيات الفرائية . انواعها نحو ١٢٥ معظمها بري وبعضها زراعي وتزييني . قشورها غفيرة غفارها ناعم ، حريري الملص ، رمادي اللون . اوراقها متعاقبة مركبة ريشية كبيرة القدر . ازهارها لا قياسي التنوير . ازهارها بيض او حر او بنفسجية . ثمارها قرون مقلطحة مستطيلة . اشهر انواعه ما يلي .

٨٦٣٥ - حَوَيَّرَاء صِبَاغِيَّة

Tephrosia tinctoria (S). Téphrosie tinctoriale (F).

نوع من الحويراء يستخرج منها صباغ نيل اللون جيد الصنف . منها البلاد الحارة .

٨٦٣٦ - حَوَيَّرَاء كَبِيرَة الزَّهَر

Tephrosia grandiflora (S). Téphrosie à grandes fleurs (F).

نوع من الحويراء الزراعية الزينية وهي بحلة معمرة تعلو من ٦٠ الى ٨٠ سم . وريقاتها مخروطية الشكل ازهارها كبيرة القدر حمراء اللون .

٨٦٣٧ - حَوَيَّرَاء مُسْكِرَة ، غَبَادَة

Tephrosia senticosa (S). Téphrosie toxique, T. toxicaire (F). Fish poison plant, Surinam poison (E).

Aschen-frehme (D). Tefrosia (I). نوع من الحويراء ثمارها واوراقها تستعمل لاثمال السمك وصيده . يستخرج من جذورها مادة الروتينون التي تستعمل في مكافحة الحشرات .

٨٦٣٨ - حَوَيَّرَاء مُسَهِّلَة Tephrosia cassia (S).

Téphrosie séné (F).

نوع من الحويراء اوراقها طبية مسهلة ويستخرج من جذورها مادة الروتينون .

٨٦٣٩ - حَوَيَّرَة Chamélaucier (F).

Chamelaucion (E).

جنس نباتات جنية من فصيلة الآسيات . انواعه قليلة العدد مهددا استرالية جميعها خلنجية الشكل . اوراقها وازهارها فواحة العرف المستحب . ثمارها عنبية وحيدة البزرة .

٨٦٤٠ - حَوَيَّصَلَات مَنُوِيَّة

Vésicules séminales (F). Seminal vesicles (E).

اوعية جرابية الشكل صغيرة القدر تستلقي وتصرف المادة المنوية . وهي تدعى الحويصلات الشلجية في الحيوان والحويصلات الزكبية في الحشرات .

٨٦٤١ - حَوَيَّصَلَة Vésicule (F). Vesicle (E).

عضو في الجسم كالجراب الصغير يجمع ويصرف ما تفرزه بعض الغدد الخاصة .

٨٦٤٢ - حَوَيِّن Animalcule (F). Animalcule (E).

كل حيوان مجهرى شديد الصغر لا يرى بالعين المجردة يدعى حويِّن ج حويِّنات .

٨٦٤٣ - حَوَيِّن مَنُوِي Spermatozoïde (F).

Spermatozoon (E).

الغامة الحيرانية الذكر وهي مؤلفة ، عادة ، من الرئيس حامل الجيلة ومن الوسط الذي يؤمن الانتقال .

٨٦٦١ - حَيَّ الْعَالَمِ السَّرْعِي ، حَيَّون سِرْعِي
Sedum sarmentosum (S). Orpin sarmenteux (F).
نوع معمر من اللمة الاولى . يطول نحو ٣٠ سم . ساقه
مدادة . اوراقه ضيقة مستطيلة بحيلة الخضار . ازهاره
نجمية الشكل صفراء اللون .

٨٦٦٢ - حَيَّ الْعَالَمِ السَّمْنَجُونِي ، حَيَّون سَمْنَجُونِي
Sedum heptapetalum (S). Orpin azuré (F).
نوع حولي من اللمة الاولى . يطول نحو ١٥ سم . ساقه
متشعبة اوراقه متعاقبة تطول نحو ٦ سم . ازهاره زرق
سباعية او تساعية البتلات .

٨٦٦٣ - حَيَّ الْعَالَمِ السَّمِيكَ الْوَرَق ، حَيَّون سَمِيكَ
الوراق
Sedum dasphyllum (S).
Orpin à feuilles épaisses (F).

نوع معمر من اللمة الاولى . يطول نحو ١٥ سم . ضروبه
عديدة منها الابيض الزهر والوردي والبنفسجي والاصفر .
ساقه نحيلة فرعاء . اوراقه بيضية الشكل بحرية اللون
تطول نحو ٥ سم .

٨٦٦٤ - حَيَّ الْعَالَمِ الشَّجَرِي ، حَيَّون شَجَرِي
Sedum arboreum (S). Orpin arborescent (F).
نوع معمر من اللمة الاولى . يعلو نحو ٦٥ سم . ساقه
ليفية متشعبة . اوراقه مقرنة الضلوع تطول نحو ٣ سم .
ازهاره كبيرة القد خماسية البتلات ، بيضاء اللون ، قطرها
نحو ١٢ سم .

٨٦٦٥ - حَيَّ الْعَالَمِ الصَّخْرِي ، حَيَّون صَخْرِي
Sedum rupestre (S). Orpin des rocaïles (F).
نوع معمر من اللمة الاولى . يعلو من ١٥ الى ٣٠ سم .
ساقه نحيلة قليلة الفروع . اوراقه متعاقبة . ازهاره نجمية
الشكل ، صفراء اللون ، خماسية او ثمانية البتلات .

٨٦٦٦ - حَيَّ الْعَالَمِ الظَّرِيف ، حَيَّون ظَرِيف
Sedum pulchellum (S). Orpin gracieux (F).
نوع معمر من اللمة الاولى . يعلو من ٨ الى ١٥ سم .
ساقه نحيلة منتصبه فرعاء . اوراقه خيطية متراسة تطول
نحو ٢ سم . ازهاره قرمزية او بيضاء اللون .

٨٦٦٧ - حَيَّ الْعَالَمِ الْعُشْكُولِي * ، حَيَّون عُشْكُولِي ،
جَوَزُ الْبَرِّ
Sedum cepaea (S).
Orpin paniculé, Orpin capé (F).

نوع حولي او محول من اللمة الثانية . يعلو من ٢٠ الى
٤٠ سم . اوراقه اهليلجية تطول نحو ٣ سم . ازهاره
عشكولي التجميع . ازهاره معققة زباء ، بتلاتها خلية
الصفحة الخارجية ، بيضاء الداخلية ، حمراء العروق .

٨٦٦٨ - حَيَّ الْعَالَمِ الْقَصِير الْوَرَق ، حَيَّون قَصِير
الوراق
Sedum brevifolium (S).
Orpin à feuilles courtes (F).

نوع معمر من اللمة الاولى . يطول نحو ٨ سم . ساقه
ليفية معتوجة . اوراقه شبه كروية الشكل ، رباعية
التصنيف ، متراسة . ازهاره صغيرة اهليلجية البتلات .

٨٦٦٩ - حَيَّ الْعَالَمِ الْكَبِير ، حَيَّون كَبِير
Sedum maximum (S). Orpin grand, Grand orpin (F).
نوع معمر من اللمة الثانية . يعلو من ٥٠ الى ٩٠ سم .
اوراقه اهليلجية متقابلة . ساقه واوراقه حمراء
عطرية العرف ، خضراء اللون ، يعلوها توشيح وردي .

٨٦٥٢ - حَيَّ الْعَالَمِ النَّتْرِي ، حَيَّون نَتْرِي
Sedum tatarinowi (S). Orpin de Tatarinow (F).
نوع معمر من اللمة الثانية . يعلو من ١٠ الى ٢٠ سم .
اوراقه سنانية مسننة الحافة . ازهاره رهل التجميع .
ازهاره وردية اللون حادة البتلات .

٨٦٥٣ - حَيَّ الْعَالَمِ الْجَبَّار ، حَيَّون جَبَّار
Sedum praealtum (S). Orpin géant (F).
نوع معمر من اللمة الثالثة . يعلو نحو ١٦٠ سم . ساقه
فرعاء . اوراقه مستطيلة طولها نحو ٧ سم . وعرضها ٢ .
ازهاره عنقودي . التجميع . ازهاره كبيرة القد صفراء اللون .

٨٦٥٤ - حَيَّ الْعَالَمِ الْجَبَلِي ، حَيَّون جَبَلِي
Sedum alpestre (S). Orpin alpestre (F).
نوع معمر من اللمة الاولى يرغب في الاتربة الرملية
والمواقع الباردة . يعلو من ٥ الى ٧ سم . اوراقه مستطيلة ،
رافعة الصفحة العليا . ازهاره خماسية البتلات صفراء اللون .

٨٦٥٥ - حَيَّ الْعَالَمِ الْحَرِيف * ، حَيَّون حَرِيف
Sedum acre (S). Orpin âcre, Pain d'oiseau, Vermi-
culaire, Orpin brûlant (F).
نوع معمر من اللمة الاولى . يعلو من ٥ الى ١٥ سم .
اوراقه رافعة ملساء النصل تطول نحو ٦ سم . ازهاره ثنائي
او رباعي السطوح . ازهاره عديدة ذهبية اللون || عصارة
اوراقه حريفة محرقة .

٨٦٥٦ - حَيَّ الْعَالَمِ الْحُنْدُوقِي ، حَيَّون حُنْدُوقِي
Sedum aizoon (S). Orpin aizoon (F).
نوع معمر من اللمة الثالثة . يعلو من ٢٠ الى ٣٥ سم .
ضروبه عديدة . سوقه قوية . اوراقه مستطيلة . ازهاره
خيمي التجميع . ازهاره بحيلة الصفار رباعية او سداسية
البتلات .

٨٦٥٧ - حَيَّ الْعَالَمِ الْحَوْرِي الْوَرَق ، حَيَّون
حَوْرِي الْوَرَق
Sedum populifolium (S). Orpin à feuilles de peuplier (F).
نوع معمر من اللمة الثانية يعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم .
اوراقه مستطيلة معنقة متعاقبة مسننة الحافة . ازهاره بيض
عطرية العرف .

٨٦٥٨ - حَيَّ الْعَالَمِ الْخَمْلِي ، حَيَّون خَمْلِي
Sedum villosum (S). Orpin velu (F).
نوع معمر من اللمة الاولى يرغب في الاتربة الرملية الرطبة .
ساقه قليلة الفروع تطول نحو ٢٠ سم . اوراقه اسطوانية
خلية متباعدة الرصف . ازهاره رهل التجميع صفراء اللون .

٨٦٥٩ - حَيَّ الْعَالَمِ الدَّاكِن الْوَرَق ، حَيَّون دَّاكِن
الوراق
Sedum ternatum (S).
Orpin à feuilles ternées (F).

نوع معمر من اللمة الثانية يعلو من ١٠ الى ١٥ سم .
ساقه ثلاثية او رباعية الفروع . اوراقه ملققة مستطيلة
ثلاثية التصنيف . ازهاره بيض رباعية البتلات والفصل .

٨٦٦٠ - حَيَّ الْعَالَمِ الزَّخْرَفِي * ، حَيَّون زَخْرَفِي
Sedum spectabilis (S). Orpin décoratif (F).
نوع معمر من اللمة الثانية يعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم .
اوراقه بيضية الشكل . ازهاره ارجوانية مزخرفة . ضروبه
عديدة تختلف بلون زخارفها .



حي العالم الحريف



حي العالم الزخرفي



حي العالم العشكولي

٨٦٨٠ - حيّ العالم الوردي* ، حيّون وردي
Sedum roseum, Rhodiola rosea (S). Orpin rosat (F).
نوع معمر من اللمة الثانية يعلو من ١٥ الى ٣٠ سم.
ارومته بنفسجية الرائحة . اوراقه اهليلجية مسننة . ازهاره
رباعية البتلات والنصل . ثمانية الاسدية ، لونها الى الخضار
الاصفر يعلوه موج احمر .



حي العالم المكرار

٨٦٨١ - حيّ العالم الياباني* ، حيّون ياباني
Sedum sieboldi (S). Orpin de Siebold (F).
نوع معمر من اللمة الثانية . اوراقه دقيقة ثلاثية التصفيف
ضخلاء اللون حمراء الاطراف . ازهاره وردية كثيفة .

٨٦٨٢ - حيّة
Vie (F). Life (E).

الحياة هي حالة الكائن الحي . اما مصدر الحياة الاول ..
ومن اوجد الحياة .. وكيف نشأت .. فن يعلم ؟ ..
نحن نعرف بوجود رب خلق الكون والحياة . اما العلم
الحديث فيقول ان الفهم والعوامل الطبيعية المتباينة المفاعيل ،
التي كانت تهيمن على الكرة الارضية في الازمنة السحيقة
القاهرة ، هي التي كونت اول الجراثيم الحية علمياً ،
لامتطابقاً ، وبصرف النظر عن مفاهيم الاديان السماوية
ومعطياتها الوجدانية ، وبعد الاخذ بالنظريات البيولوجية
والكيمياوية والفيزيائية والاحاثية الشائعة في هذا العصر ،
يبدو ان نشأة الحياة على هذه الارض او بالاحرى في هذا
الكون المعروف بالكرة الارضية ، يعود الى بعض الوف
ملايين السنين . وان عمر الارض لا يقل عن سبعة الاف
مليون سنة كما هو مفصل في الجدول البياني التابع ، رقم ١ .
اما نشأة الحياة وتطوراتها عبر الازمنة القاهرة فهي موضوع
الجدول رقم ٢ || والجدول رقم ٣ يعطي العدد التقريبي
لمختلف انواع المخلوقات الحيوانية المعاصرة المعروفة .



حي العالم الوردي

٨٦٨٣ - حيّات
Ophidiens (F). Ophidia (E).

شعبة من الحيوانات الزحافة عديدة الفصائل والاجناس
والانواع تجسمها خمس رتب صار تحديدها بالنسبة الى وضع
اسنانها . اما رتبها فهي : اماميات الاخاديد ، انبوييات
الاخاديد ، خلفيات الاخاديد ، عديمات الاخاديد
ومتراوحات الاسنان .

٨٦٨٤ - حيّاتي
Vital

٨٦٨٥ - حيازة ، وضع اليد
Détenion (F).
Detainment (E).
حق استعمال العين المادية دون امتلاكها كالمستأجر مثلاً .

٨٦٨٦ - حيّة
Opnis (S). Serpent (F). Snake (E).

اسم شامل يطلق على جميع اجناس وانواع الحيات من
الافعى الى الصل والثعبان والحش || قال الجاحظ :
« الحية اسم يطلق على الذكر والانثى فيقال هذا حية ذكر
وهذه حية انثى . والحية انواع منها الرقشاء والرقطاء والازعر
والازب وذات القرنين والشجاع والعريد والاصلة والصل
والابتر والناشر والارقم وابو عثمان وابو العاصي وابو مذخور
وابو وثاب وابو يقطان وام عافية وام عثمان وام الفتح
وام محبوب ... »

٨٦٨٧ - حيّة الماء* ، هيدروفيس
Hydrophis
جنس حيات مائية من اماميات الاخاديد . انواعها المعروفة
١٥ جميعها سامة خبيثة . طولها يراوح من متر الى مترين .
اثوابها عديدة الالوان يكثر فيها التخطيط الطوقي . اعطائها
بحار المناطق الحارة اخصها بحار الهند .



حيّة الماء

٨٦٧٠ - حيّ العالم الليدي ، حيّون ليدي
Sedum lydium (S). Orpin de Lydie (F).
نوع معمر من اللمة الاولى . يعلو من ١٠ الى ١٢ سم .
اوراقه مخززية الشكل تطول نحو ٦ سم . لونها الى
الخضار البحري يعلوه موج احمر . ازهاره وردية .

٨٦٧١ - حيّ العالم المائي
Pistie (F).
Water lettuce (E).
هو الزيم ، اطلبه .

٨٦٧٢ - حيّ العالم المتقابل الورق ، حيّون متقابل
الورق
Sedum oppositifolium (S).

Orpin à feuilles opposées (F).
نوع معمر من اللمة الثانية . يعلو نحو ١٥ سم . اوراقه
متقابلة معينة الشكل طولها نحو ٤ سم . عرضها ٢ .
ازهاره بيض خاسية التركيب .

٨٦٧٣ - حيّ العالم المستدير الورق ، حيّون مستدير
الورق
Sedum anacampseros (S).

Orpin à feuilles rondes (F).
نوع معمر من اللمة الثانية . يرغب في الاتربة الرملية .
يعلو من ١٠ الى ٢٥ سم . اوراقه متعاقبة ، اهليلجية ،
مقطوبة . ازهاره بنفسجية .

٨٦٧٤ - حيّ العالم المشجر ، حيّون مشجر
Sedum dendroideum (S). Orpin en arbre (F).

نوع معمر من اللمة الثالثة . يعلو نحو ٦٠ سم . اوراقه
مستطيلة ، مفروضة ، بيضاء الاطراف ، حمراء الحافة . ازهاره
عنفودي التجميع ، كبير القد يبلغ نحو ١٠ سم . ازهاره
الى الصفار الكبريتي .

٨٦٧٥ - حيّ العالم المكرار* ، حيّون مكرار
Sedum telephium (S). Orpin reprise, Herbe à la
coupure, O. telèphe (F).

نوع معمر من اللمة الثانية . ضروبه كثيرة العدد . ساقه
تعلو من ٢٠ الى ٦٠ سم . اوراقه متعاقبة بيضية الشكل .
ازهاره كثيفة التجميع . لونها يختلف مع الضرب .

٨٦٧٦ - حيّ العالم الملعقي ، حيّون ملعقي
Sedum spatulifolium (S). Orpin spatulé (F).

نوع معمر من اللمة الثالثة يعلو من ٧ الى ١٢ سم .
اوراقه ملعقية الشكل قائمة الخضار المنش بالاحمر .
ازهاره كبيرة القد ، عريضة البتلات ، لونها الى الاصفر القاقع .

٨٦٧٧ - حيّ العالم المنشوري ، حيّون منشوري
Sedum selskianum (S). Orpin de Mandchourie (F).

نوع معمر من اللمة الثالثة . يعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم .
ساقه زباء منتصب . اوراقه خيطية مسننة زغبية النصل .
ازهاره مستعرضة الشكل بحيلة الصفار الكبريتي .

٨٦٧٨ - حيّ العالم النحيف ، حيّون نحيف
Sedum gracile (S). Orpin gracile (F).

نوع معمر من اللمة الاولى . يعلو من ٣ الى ٥ سم . ساقه
نحيلة قصيرة . اوراقه مخززية الشكل ، مهابزية القاعدة
تطول نحو ٨ سم . ازهاره بيض موشحة بالاحمر والاخضر .

٨٦٧٩ - حيّ العالم الهندي ، حيّون هندي
Sedum kirilow (S). Orpin de Kirilow, O. de l'Himalaya (F).

نوع معمر من اللمة الثالثة . يعلو من ٢٠ الى ٣٠ سم .
ارومته غليظة . ساقه فرعاء . اوراقه مستطيلة مسننة . ازهاره
الى الصفار الاخضر . منبته جبال حملايا .

جدول رقم ١
مراحل تطورات الكرة الأرضية وعلاقتها عبر الزمن

إباح	Ere	حقبة	Epoque	زمن	Période	مليون سنة	حياة مائة	Vie a quatique	حياة برية	Vie terrestre
رابعي	Quaternaire	معاصرة	Actuel	اعتدال الحرارة	Tempérée	٥	جميع النغات المعاصرة	تطور الجنس البشري	تطور الجنس البشري	أزمة الدبوك والدلف
		بيستوسانية	Pleistocène	تجلد	Glaciation					
				اعتدال الحرارة	Tempérée					
				تجلد	Glaciation					
ثالثي ، حديث	Tertiaire	نيوجينية	Néogène	يساني	Pliocène	١٠	معظم الأجناس والأنواع المعاصرة	عصر الثدييات	عصر الثدييات	
				ميساني	Miocène	٢٠				
				أوليغوساني	Oligocène	٤٠				
ثاني ، اوسط	Secondaire	نقورية	Nummulitique	إيساني	Eocène	٦٠	انتشار الترموليتات	انتشار الثدييات والطيور والحشرات والنبوت الكبيرة	انتشار الثدييات والطيور والحشرات والنبوت الكبيرة	
		جورونية	Jurassique	بلويساني	Paleocène	١٠٠				
		طباشيرية	Crétacé			١٢٥	انقراض المعنويات ومعظم الزخافات المائية	انقراض الدناصور وأعظم - عصر الزخافات	انقراض الدناصور والحشرات الكبيرة - ظهور الثدييات والنباتات الزهرة	
أول ، قديم	Primaire	كربونية	Carbonifère	Permien		٢٦٠	انقراض الترموليت	عصر الزخافات المائية الأشكال والحجور	عصر الزخافات المائية الأشكال والحجور	
		ديفونية	Devonien	Carbonifère		٣٣٠	انتشار الفنبات والأشباك المعقبة	عصر الفوازيب - ظهور الزخافات والحشرات ومعديلات الأرجل	عصر الفوازيب - ظهور الزخافات والحشرات ومعديلات الأرجل	
		سيلورية	Silurien	Devonien		٤٢٠	انتشار الترموليت والنويات - ظهور الأشباك المعقبة (فقرنات)	انتشار الأشباك المعقبة والنويات والفنبات	انتشار الأشباك المعقبة والنويات والفنبات	
ما قبل الكمبري	Précambrien	كمبرية	Cambrien			٦٥٠	انتشار الترموليت والرخويات والقشريات والشوكيات والاصفنجيات والجوفات .	لا حياة برية على اليابسة	لا حياة برية على اليابسة	
		ما قبل الحيوان	Protérozoïque			١١٠٠	بعض الأحافير اللامنسوية			
ما قبل الكمبري	Précambrien	محقة	Archéen			٣٠٠٠				
		التكوين	Origine de la Terre							

جدول رقم ٣
العدد التقريبي لمختلف أنواع المخلوقات الحيوانية المعاصرة

صنف	صنيف	عدد الأنواع	Sous-Classe	Classe
فقاريات		٧٠.٠٠٠		Vertébrés
	قشريات	٢٥.٠٠٠	Crustacés	
مفصليات	عنكبوتيات	٣٠.٠٠٠	Arachnides	Arthropodes
	دغذخيات	٨.٠٠٠	Myriapodes	
	حشرات	٨٥٠.٠٠٠	Insectes	
رخويات		١٠٠.٠٠٠		Mollusques
حلقيات		١٠.٠٠٠		Annélides
حيوانات طحلبية		٤.٠٠٠		Bryozoaires
شوكيات		٦.٥٠٠		Echinodermes
سلكيات		١٠.٠٠٠		Nématodes
عريصات		١٦.٠٠٠		Vers plats
مخوفات		١٠.٠٠٠		Coelentérés
اسفنجيات		٥.٠٠٠		Spongiaires
أوليات		٣٠.٠٠٠		Protozoaires
دوارات		١.٥٠٠		Rotifères
مختلف		٢.٠٠٠		Divers
المجموع		١.١٧٨.٠٠٠		Total

منها الحولية والمحولة والمعمرة . سوقها نخيلة فرعاء . أوراقها متعاقبة ، مركبة ، شعبة . أزهارها رئيسية مستطيلة الزناد . ألوانها متعددة منها الأزرق السماوي والأصفر الكبريتي والأبيض والليلكي والموشح || تنويرها صيفي أو خريفي يستمر نحو ثلاثة أشهر .

٨٦٩٢ - حيدبة * Chiton (S). Oscabrion (F).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات ممديات الأرجل أماميات الغياشيم مصفحات القشار وفصيلة الكيتونيات . أنواعها المعروفة قليلة العدد جميعها هندية المهد . أجسامها صغيرة القد . أثوابها إلى الصبهة المتفاوتة الموج . صدورها وبطنها منمشة بالاسمر الكستني .

٨٦٩٣ - حيدكة Anneau (F). Ring (E).
هي العتدة في القرن وفي القصبة . ج حيد .

٨٦٩٤ - حيدلان ، مندورة * Monodora (S).
Monodora (F).
جنس أشجار متوسطة القد من فصيلة القشديات . أنواعها المعروفة خمسة جميعها من نباتات أفريقية الحارة والاستوائية . سوقها فرعاء . أوراقها متعاقبة ، بيضية النصل الجامد

٨٦٨٨ - حبة عمياء Blane cendré (F).
هي البلتوس الاربد ، اطلب .


٨٦٨٩ - حيشل * Pellorneum (S).
Pellornée (F). Pellorneum (E).
جنس طير من الجواثم سنيات المناقير وفصيلة الدخليات . أنواعها المعروفة قليلة العدد جميعها هندية المهد . أجسامها صغيرة القد . أثوابها إلى الصبهة المتفاوتة الموج . صدورها وبطنها منمشة بالاسمر الكستني .

٨٦٩٠ - حيجن * Brunonia (S).
Brunonia (F). Brunonia (E).
جنس نباتات عشبية حولية ومعمرة من فصيلة الحيجنيات . أنواعها المعروفة عديدة . منبتها الطوعي بعض اصمقاع أمريكا وأستراليا وأفريقية . معظمها بري وبعضها تزييني || سوقها نخيلة فرعاء . أوراقها متعاقبة مركبة ، شعبة الترتيب . أزهارها رئيسية ، فردية ، متراكبة البتلات اللسنية الشكل ، عديدة الألوان الزاهية الجميلة . يكثر فيها الأزرق ثم الأصفر فالأبيض فالأرجواني ... || تنويرها يستمر نحو ثلاثة أشهر ، معظمها صيفي وبعضها خريفي .

٨٦٩١ - حيجنيات * Brunoniaceae (S).
Brunoniacées (F). Brunoniaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة القملات ، قريبة الشبه بالمركبات والديساسيات . أنواعها المعروفة عديدة ، يجمعها جنس واحد || جميعها نباتات عشبية برية وتزيينية ،



حيشل



حيدبة



حَيْدَلَانَ الطَّيْب

٨٧٠٢ - حَيْصَل برازيلي (S). *Solanum warscewiczii* (S).
Morelle de Warscewicz (F).
نوع من الحَيْصَل المعمّر البري والتزييني . ساقه فرعاء تعلو
نحو ١٨٠ سم . أوراقه بيضية الشكل ، قلبية القاعدة ،
تساعية الفصوص ، منعقفة الشوك الأحمر . أزهاره بيض .
ثمارة صغيرة القد كبيض العصفور .

٨٧٠٣ - حَيْصَل بطيخي

Solanum citrullifolium (S). Morelle à feuilles de
pastèque (F).
نوع من الحَيْصَل الحولي التزييني . ساقه فرعاء قصيرة
تعلو من ٥٠ إلى ٦٠ سم . أوراقه بطيخية الشكل ، مستنة
الحافة . أزهاره كبيرة عريضة ، قطرها نحو ٤ سم . لونها إلى
الازرق البنفسجي . ثمارة بيضوية صغيرة القد جووية اللون .

٨٧٠٤ - حَيْصَل جبار (S). *Solanum giganteum* (S).
Morelle géante (F).

نوع من الحَيْصَل المعمّر البري والتزييني . يتعلو من
مترين إلى خمسة أمتار . فروعه زبابة البشرة الطحلاء .
أوراقه مستطيلة الشكل ، نصلها أخضر الصفحة العليا الملساء
البشرة ، أزغب السفلى . أزهاره صغيرة القد متدللة لونها
إلى البنفسجي العابق . ثماره أرجوانية بحجم الحمص .

٨٧٠٥ - حَيْصَل جيلو (S). *Solanum gilô* (S).
Morelle gilô (F).

نوع من الحَيْصَل البري والتزييني المعمّر . ساقه فرعاء
مرطاة تعلو نحو ٩٠ سم . أوراقه بيضوية متمنعة الحافة
المشرمة . نصلها ملس الصفحة العليا نجلي السفلى .
أزهاره إلى البياض الوردي . ثماره بيضوية الشكل والقَد ،
لونها أصفر أو برتقالي .

٨٧٠٦ - حَيْصَل شمّاري

Solanum sisymbriifolium (S). Morelle à feuilles de
vélar (F).
نوع من الحَيْصَل الزراعي المأكول الثمار . ساقه فرعاء تعلو
من ١٠٠ إلى ١٥٠ سم . أوراقه مفرصة . أزهاره بيضاء
اللون أو ليلية . ثماره بيضوية الشكل والقَد ، برتقالية
اللون مأكولة .

٨٧٠٧ - حَيْصَل مُجْتَع (S). *Solanum alatum* (S).
Morelle ailée (F).

نوع من الحَيْصَل المعمّر البري والتزييني . ساقه زغبية ،
فرعاء ، شائكة ، تعلو نحو المتر . أوراقه كبيرة تطول
نحو ٢٥ سم . تفصيصها قليل العمق ، نصلها خلي
البشرة على صفحتيه . أزهاره بيض . ثماره كروية صغيرة .

٨٧٠٨ - حَيْصَل مُوشَّح

Solanum marginatum (S). Morelle marginée (F).
نوع من الحَيْصَل الحولي البري والتزييني منبته الشرق
الأدنى والحبشة . ساقه فرعاء تعلو من ١٠٠ إلى ١٥٠ سم .
لوراته شبه قلبية . نصلها خلي البشرة على صفحتيه .
أزهاره بيض تعلوها رقشة حمراء . ثماره بندقية الحجم
والشكل لونها إلى الصفار الباهت .

٨٧٠٩ - حَيْقَة

الحقيقة : شجرة كالشيخ يؤكل بها التمر (اللسان) .

٨٧١٠ - حَيْقُطَان* ، حَيْقُط (S). *Pternistes* (S).
Pterniste (F).

الأنثى حَيْقُطَانة . طائر من الدراج طولهُ نحو ٣٢ سم .

العابق الخضار . أزهارها فردية ، مستطيلة الاهان ، محفوفة
ببعض القنابات الورقية الشكل المفروضة النصل || أشهر
أنواع حَيْدَلَانَ الطَّيْب .

٨٦٩٥ - حَيْدَلَانَ الطَّيْب* ، مُنْدُورَة كبيرة

الزَّهَر (S). *Monodora grandiflora* (S).

Monodora muscadier (F).

نوع من الحَيْدَلَانَ شجرته تعلو من ٧ إلى ٨ أمتار . أوراقها
عروية . أزهارها كبيرة القَد تبدو بيضاء اللون منمشة بالجُزوي
ثم يتحول بياضها إلى الأصفر وأحمرها الجُزوي إلى
الأرجواني الزاهي . ثمارها تفاحية الشكل والقَد تغلف
بزوراً طيبة خواصها خواص جوز الطيب .

٨٦٩٦ - حَيْدِي ، عَقْصِي ، أَحْبَد

Annelé (F). Ringed (E).

نعت وصفي للقرن المتتابع الحيد أو العقص .

٨٦٩٧ - حَيْدُوان*

Columba livia (S).
Colombe biset, Pigeon de roche (F). Rock dove (E).
نوع من الحمام البري يقال أن الحمام الداجن قد تحدر
منه . ضروبه عديدة جميعها صغيرة القَد . طولها نحو ٣٢ سم .
ثوبها إلى الرمادي الرصاصي يعلوه توشيح أبيض وأخضر
وبنفسجي . أجنحتها مخططة بالأسود . قوادمها بيض .
مناقيرها حنطية . عيونها حمراء وأرجلها كذلك || موطنه
فسيح الأرجاء يعم الشرق وأروبة وأفريقية . يألف
المناطق الصخرية والجبلية والبقاع الجرداء . يعيش أسراباً
صغيرة يراوح عدد أفرادها من ٤٠ إلى ٨٠ . قوته المحبوب
والبدور . يدين عشه بين الصخور وفي نقارها . أناته
تبيض مرتين في السنة .

٨٦٩٨ - حَيْرَم (S). *Bubalis, Alcelaphus, Achronotus* (S).
Bubale (F).

جنس حيوانات لبولة من بقر الوحش ، كبيرة الجثة ، عالية
الدوارج ، رفيعة الحارك ، منحدر الكفل ، طويلة الرأس
الضيق ، منعطفة القرون المحدودة ، كبيرة الاذان ،
طويلة الذيل || طولها يراوح من ٢٦٠ إلى ٢٨٠ سم .
وارتفاعها من ١٢٠ إلى ١٣٠ سم . قرونها نحو ٥٠ سم .
أنواعها الحالية المعروفة ٢ : حيرمة كاما وحيرمة كنزي .

٨٦٩٩ - حَيْرَمَة كاما*

Bubalis caama (S).

Bubale caama, Alcélaphe (F).

نوع من الحيرم . ثوبه أشهب اللون حنطي الموج . ظهره
يميل إلى السمرة وبطنه إلى البياض . جبهته فحمة وذيله
أسود . الأنثى بحجم الذكر لكنها أفتح لوناً || موطنه
أفريقية الجنوبية والشرقية . أجله يراوح من ٨ إلى ١٠
أنفار .

٨٧٠٠ - حَيْرَمَة كنزي

Bubalis lichtensteini (S). *Bubale konzi* (F).

هو النوع الثاني من الحيرم موطنه أفريقية الشرقية وهو
أصغر . جثة من حيرمة كاما ذيله ودوارجه سود . أجله
لا يقل عن ٢٠ نفراً .

٨٧٠١ - حَيْصَل*

Morelle épineuse (F).

قسم من الباذنجان . أنواعه عديدة تتميز بكبر أوراقها
الشائكة الفلج والبروق ، نصلها مزغب البشرة . أزهارها
أبطية الارتكاز . ثمارها بيضوية الشكل || أعرف وأشهر
أنواعه ما يتبع .



حيدوان



حيرمة كاما



حيسل



حيقطان

٨٧١٤ - حَيَوَان Animal
كل كائن حي يتميز بالحركة والانتقال يدعى حيواناً .
ملكة الحيوان وعلى رأسها الانسان تقسم الى صفوف
ورتب وفصائل واجناس وانواع صار ترتيبها وفقاً لتركيبتها
الجسموري ومظهرها وغرائزها .

٨٧١٥ - حَيَوَان أَهْلِيّ ، حَيَوَان دَاجِن Animal domestique (F). Domestic animal (E).
هو الحيوان الاليف الذي يعيش في حى الانسان .

٨٧١٦ - حَيَوَان مَنَوِيّ Zoosperme

٨٧١٧ - حَيَوَان نَبَاتِيّ Zoophyte
كل حيوان نباتي الشكل كالاسفنج وغيره .

٨٧١٨ - حَيَوَانَات طَحْلِيَّة Bryozoaires (F). Bryozoon (E).
صف من اشباه الديدان .

٨٧١٩ - حَيَوَانَات نَبَاتِيَّة Phytozoaires (F). Phytozoon (E).
صف يشمل شعب الاسفنجيات والجوفيات والشوكيات .

٨٧٢٠ - حَيَوَات Serpent mâle (F). Male snake (E).
ذكر الحيات .

٨٧٢١ - حَيَوَد Neutre (F). Neutral (E).
هو ما كانت صفات خواصه المميزه موزونة الاعتدال
لا تنسم بعنصر متفوق او بطابع جلي خاص .

٨٧٢٢ - حَيَوَان Orpin (F). Orpine (E).
نبات عشبي لحمي يعرف بحى العالم ، اطلبه .

٨٧٢٣ - حَيَوِيّ Blotique (F). Blotic (E).
المنسوب الى المتعضيات الحية من حيث البيئة وتوابعها
قبل العوامل الفيزيولوجية .

ثوبه متراكب الالوان العابقة . اسود باطن الجناحين
اما ظاهرهما فأغبر مؤذر . صدره وبطنه الى الصهبة الربداء
يعملوها توشيم مستطيل . عنقه ورأسه الى الجرؤة الرصاصية
المواج . اطلب دراج .

٨٧١١ - حَيْقَل * Promerops (S).

Promérops (F). Promerops (E).
جنس طير من فصيلة المغفريات ورتبة الجواثم رقيقات
المناكير . انواعه المعروفة قليلة العدد لا تتجاوز الخمسة .
اعطانها المناطق الحارة من القارتين الاسيوية والافريقية ||
جميعها صغيرة القد ، مستطيلة المناقيد المقوسة . اذناها
خارقة الطول ، رتاجية الريش . اثوابها جميلة الالوان
المتباينة السفعاء المواج || قوتها الخوام ورحيق الازهار ||
تدثن في الاشجار الفناء الوارفة الظل . اناثها تضع نحو ٥
بيضات قرخها بمنابرة الذكور نحو ١٥ يوماً .

٨٧١٢ - حَيْقَلَة * Hebeloma (S).

Hébélome (F). Hebeloma (E).
فطر من فصيلة الفاريقونيات . يوجد في بعض مراعي
الغابات الجبلية . ساقه معتدلة الارتفاع والفلاطة ، طحلاء
اللون . نكهته صاجية مقلوبة ، قطرها نحو ٧ سم . لونها
الى الصفار الاغبر يعملوه مواج بني . اطراسها الى الطحلة
الفضية || لحميته كاعنة الصنف ، مستهجنة الرائحة ، غير
مرغوب فيها .

٨٧١٣ - حَيْهَلَة Carrichtera (S).


Carrichtère (F). Carrichtera (E).
نبات عشبي حولي بري وحيد الجنس والنوع من فصيلة
الصليبيات . منبته بعض مناطق الشرق الاوسط || ساقه
قليلة الفروع تعلو من ٥ الى ٦٠ سم . اوراقه متعاقبة .
مركبة ، ثنائية التفصيل الريشي . ازهاره الى البياض الاصفر
المواج . اعصاب البتلات وردية اللون . تنويره صيفي .



حَيْقَل



حَيْقَلَة



خاتم سليمان الأموط



خاتم سليمان الكثير الزهر

٨٧٢٩ - خاتَمُ سُلَيْمَانَ الضَّمِيّ الْوَرَقِي ، عَقْدَاءُ ضُمِيَّةُ الْوَرَقِي

Polygonatum verticillatum (S). *Polygonate verticillé*, *Sceau de Salomon verticillé* (F).

نبات عشبي معمر يعلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أوراقه مستطيلة الشكل ، ضمية الارتكاز ، رباعية أو خماسية أو سباعية الانتشاب . طولها نحو ١٠ سم. وعرضها ٢ نصلها خلي الصفحة السفلى . معاليق أزهاره تحمل من زهرة إلى ثلاث زهرات صغيرة القد لونها إلى البياض الاخضر || تنويره يستمر من ايار إلى تموز .

٨٧٣٠ - خاتَمُ سُلَيْمَانَ الْكَبِيرِ الْوَرَقِي ، عَقْدَاءُ كَبِيرَةُ الْوَرَقِي

Polygonatum latifolium (S). *Polygonate à grandes feuilles*, *Sceau de Salomon à grandes feuilles* (F).

نبات عشبي معمر منبته اربعة الشرقية والشالية . ساقه زباء تملو من ٦٠ إلى ١٢٠ سم. أوراقه مستطيلة الشكل ، نصلها خلي الصفحة السفلى . يطول من ٨ إلى ١٦ سم. معاليق أزهاره تحمل من زهرة إلى خمس زهرات . تنويره يستمر من ايار إلى حزيران .

٨٧٣١ - خاتَمُ سُلَيْمَانَ الْكثيرِ الزَّهَرِ* ، عَقْدَاءُ كثيرةُ الزَّهَرِ

Polygonatum multiflorum (S). *Polygonate multiflore*, *Sceau de Salomon multiflore* (F).

نبات عشبي معمر يعلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. ساقه اسطوانية . أوراقه اهليلجية متعاقبة بارزة العروق . أزهاره لا عرف لها . معاليقه تحمل من زهرتين إلى ست زهرات لونها إلى البياض الاخضر || أزهاره يستمر من نيسان إلى حزيران .

٨٧٢٤ - خَابُور
زارع على نصيب معين كالثلاث أو الربع وقيل ببعض ما يخرج من الارض .

٨٧٢٥ - خَابُور
هو البيلسان الاسود ، اطلبه .
Sullon (F). Arn tree (E).

٨٧٢٦ - خَائِل
صفة الحشرة التي تعيش من قنصها .
Prédateur (F). Predatory (E).

٨٧٢٧ - خاتَمُ سُلَيْمَانَ ، عَقْدَاءُ
Polygonatum (S). *Polygonate*, *Sceau de Salomon* (F).
Seal-wort, *Salomon's seal* (E). *Salomonssiegel*, *Siegelwurz* (D). *Polygonato*, *Sigillo di Salomone* (I).

جنس نباتات جذسورية عقدية معمرة من اهلاليات وفصيلة الزنبقيات . انواعه عديدة منها البرية والزراعية . سوقها فردية منتصبة . أوراقها حاضرة متعاقبة أو متقابلة اوضمية . أزهارها شمراخية الارتكاز ، انبوية ، معنقة متدلية ، لونها إلى الابيض الموشح بالاخضر أو الوردى الموشح بالاصفر || اعرف واشهر انواعه ما يتبع .

٨٧٢٨ - خاتَمُ سُلَيْمَانَ الْأَمْوِط* ، عَقْدَاءُ مَرْطَاءُ
Polygonatum commutatum (S). *Polygonate glabre*, *Sceau de Salomon glabre* (F).

نبات عشبي معمر منبته امريكة الشالية . يعلو من ٥٠ إلى ٢٥٠ سم. ساقه مرطاء البشرة . أوراقه متعاقبة ، بيضية ، لامعة ، نصلها يطول من ١٠ إلى ١٥ سم. ويعرض من ٦ إلى ١٠ . أزهاره لا رائحة له . معاليقه تحمل من الزهرة إلى ثماني زهرات لونها إلى البياض الاخضر ، طولها نحو ٢٠ مم. وقطرها ٨ || تنويره يستمر من ايار إلى تموز .

٨٧٤٤ - خاشب Dendrophage (F).

Dendrophagous (E).
نمت تعريفه يطلق على كل حيوان أو حشرة قوتها المواد الخشبية.

٨٧٤٥ - خاشبيات Xylophages (F).

Xylophagous (E).
هي الحشرات من أي نوع كانت تغذي من الياف النبات الخشبية حية كانت أو ميتة. مفردتها خاشب وخاشبية.

٨٧٤٦ - خاشبيات ٥ ، تشرانيكيات

Trombididae, Tetranychidae (S). Trombidids, Tetranychids (F). Trombididae, Tetranychidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة القراديات، أجناسها وأنواعها عديدة جميعها صغيرة القدر لا تكاد ترى، تركيب مختلف أنواع النبات فتعيش على خلايا النسج النباتية التي تقضي عليها ومن النسج الذي تمتصه من الأعصاب والشرابين.

٨٧٤٧ - خاشبيكة Trombidion

جنس حشرات ضارة من فصيلة الخاشبيات، أنواعه عديدة جميعها شبه مخروطية الشكل، طولها نحو نصف مليمتر، مكنتها ذري أبيض اللون أو أحمر تمتصه الأنثى، في الربيع والصيف، على صفحة النصل السفلى، وفي الخريف بين تجاعيد اللحاء وفي شقوقها، فينقف عن يرقات تدعى أرينوز (Erinose) تلغم بشرة النسيج ومسامه وتحدث فيه ما يشبه الجرب.

٨٧٤٨ - خاشبيكة الإرجاص ٥ ، فيتوبتوس الإرجاص

Phytoptus pyri, Eriophyes pyri (S). Phytopte du poirier (F). Pear leaf blister mite (E). Birnblatt-pockenmilbe (D).

حشرة من الخاشبيات المجهرية المخروطية الشكل طولها نحو نصف مم. لونها إلى الصفرة النارية تركيب أوراق الإرجاص فتلغم مسام النصل وبشرته وتسبب له ما يشبه الجرب. تكافح كثيرها من الحشرات.

٨٧٤٩ - خاشبيكة التفاح ٥ ، أكاروز التفاح، كنهذب التفاح

Tetranychus pilosus, Paratetranychus pilosus, Penthalodes mytilaspis (S). Araignée rouge du pommier, A. r. des arbres fruitiers (F). Red spider (E). Rote spinne, Obstbauspinnmilbe (D).

حشرة من الخاشبيات المجهرية طولها نحو نصف مم. لونها إلى الحمرة تركيب أوراق وثمار التفاح فتؤذيها وتشوهها. أجيالها الحولية عديدة تبث من الربيع وتنتهي في أوائل الخريف حيث تمتص مكنتها الشتوي في شقوق وتجاويف اللحاء وعند ابط الافئاد والبراعم وفي جميع أخاديد وثنايا البشرة || تكافح أولا في الشتاء باستعمال الزيوت المعدنية أو أحد الموائين الفعالة على دفعتين متواليتين بين الأولى والثانية من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. ثم في الربيع، بعد نقف المكن، باستعمال أحد الحواشير المجربة الفعالة.

٨٧٥٠ - خاشبيكة الكرمة ٥ ، فيتوبتوس الكرمة

Phytoptus vitis (S). Phytopte de la vigne (F).
حشرة من الخاشبيات المجهرية المخروطية الشكل طولها نحو نصف مم. تركيب أوراق الكرمة فتلغمها وتسبب مرض الارينوز.

٨٧٥١ - خاصة، خاصية Propriété (F).

Characteristic (E).
الميزة التي يتصف بها الشيء.

٨٧٣٢ - خاتم سليمان المخزني* ، خاتم

سليمان العطري، عقدة عطرية
Polygonatum officinale, P. odoratum, Convallaria polygonatum (S). Polygonate officinale, P. odorant, Sceau de Salomon odorant, Genouillet (F).

نبات عشبي طبي بري معمر يعلو من ٢٠ إلى ٥٠ سم. ساقه مضطعة، ملساء البشرة. أوراقه مستطيلة يراوح طولها من ٥ إلى ٨ سم. وعرضها نحو ٢ سم. أزهاره عطري العرف، مبالغته تحمل من زهرة إلى زهرتين، لونها إلى الأبيض الأخضر، طولها نحو ٢٠ مم. وقطرها ٧ مم || يكثر في الغابات والحراج الرطبة. يستعمل في علاج داء النقطة || تنويره يستمر من أيار إلى حزيران.

٨٧٣٣ - خاتم سليمان الوردي، عقدة وردية

Polygonatum roseum (S). Polygonate rose, Sceau de Salomon rose (F).

نبات عشبي معمر منبته الاصقاع الاسيوية الباردة. ساقه ملساء البشرة تعلو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. أوراقه مستطيلة النصل الضيق. أزهاره ثنائية التجميع لونها إلى الوردي || أزهاره يستمر من أيار إلى حزيران.

٨٧٣٤ - خائير Lait caillé (F). Curdled milk (E).

هو اللبن الرائب إذا ظهرت حموضته ولم تشتد.

٨٧٣٥ - خادرة* Chrysalide (F). Chrysalis (E).

هي كل عذراء من فراشات حرشفيات الاجنحة عندما تكون في دورها الانتقالي من يرقة إلى حشرة كاملة.

٨٧٣٦ - خادشة

طرف السفا. خادشات السفا: اطرافه من منبل البر والشعر.

٨٧٣٧ - خار Mugir (F).

To bellow (of bull), To low (of cow) (E).

خار البقر يخور خواراً: صاح وجار وصج ونأج.

٨٧٣٨ - خارج القسمة Quotient

٨٧٣٩ - خارجي Exogene (F). Exogenous (E).

صفة بعض الاعضاء النباتية وأخصها الفطور التي تتكاثر من الخارج.

٨٧٤٠ - خارجي الإتجاء Extrorse

٨٧٤١ - خارصين، زرنك، توتيا Zinc

معدن ذو لون أبيض ضارب إلى الزرقة يصدأ عند تعرضه للهواء الرطب فيصبح رمادياً. وهو قابل للسحب والطرق، موصل للحرارة والكهرباء || رمزه (Zn)، وزنه الذري ٦٥.٣٨، تكافؤه ٢ ثقله النوعي يراوح من ٦.٨٥ إلى ٧.٢٠. ينصهر عند بلوغه ٤١٩°سغ. ويغلي في ٩٣٢°سغ. || لا يوجد نقياً في الطبيعة. خاماته عديدة أخصها كربونات الخارصين. يستخدم في عدة صناعات وتركيب وفي وقاية الحديد من الصدأ.

٨٧٤٢ - خارطة Carte (F). Playing-card (E).


٨٧٤٣ - خازن الجليوز، خازن البندق

Sittelle (F). Sitta, Nuthatch (E).

طائر يدعى كياسر الجوز، اطلبه.



خاتم سليمان المخزني



خادرة



خاشبية الإرجاص



خاشبية التفاح



خاشبية الكرمة



خاطف الذباب



خافور



خالدة دموية



خالدة سنية



خالدة صفراء



خالدة طاقية

٨٧٦٥ - خَالِدَة ، هَلِيكْرِيْز Helichrysum (S).

Helichryse, Immortelle (F). Eternal flower (E). Strohlume, Gartenimmortelle (D). Elicriso, Immortali (I).

جنس نباتات برية وزراعية تزيينية من فصيلة المركبات. أنواعه نحو ٣٠٠ منتشرة في جميع الاصقاع العالمية. منها العشبية والليفية والحولية والمعمرة. اوراقها متعاقبة، حاضرة. ازهارها روئسي كثيف القنابات الشارفة الزاهية الالوان. ازهارها صغيرة قرصية التجميع تحيطها القنابات الجامدة. ألوانها ثابتة تدوم ما دامت الازهار المقطوعة التي لا تذبل || أعرف أنواعه واشهرها ما يتبع.

٨٧٦٦ - خَالِدَة الْجُرُر Immortelle stéclade (F).

اطلب أمارنطون، نبات عشبي تزييني.

٨٧٦٧ - خَالِدَة دَمَوِيَّة* ، هَلِيكْرِيْز دَمَوِي Helichrysum sanguineum (S). Helichryse sanglante, Immortelle sanglante (F).

نبات عشبي زغبى معمر. منبته الشرق الادنى. يكثر في لبنان وفلسطين. ساقه زباء تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقه زغبية النصل السناني الشكل الاطحل اللون. ازهاره دموية || ازهاره يستمر من اوائل ايار الى اواخر حزيران.

٨٧٦٨ - خَالِدَة سَنِية* ، هَلِيكْرِيْز سَنِي Helichrysum fulgidum (S). Helichryse éclatante, Immortelle éclatante (F).

نبات عشبي معمر. ساقه منتصبية زباء البشرة تعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه عصفية الشكل منتصبية النصل تطول من ٤ الى ٨ سم. ازهاره كبيرة القد جميلة الصفار المذهب العابق || ازهاره يستمر من حزيران الى ايلول.

٨٧٦٩ - خَالِدَة صَفْرَاء* ، هَلِيكْرِيْز شَرْقِي Helichrysum orientale (S). Helichryse orientale, Immortelle jaune, l. à bouquets (F).

نبات عشبي معمر. ساقه فرعاء تعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم. اوراقه متعاقبة، حاضرة، سنانية، ضيقة النصل. ازهاره عذقية التجميع، صفراء اللون || زراعته واسعة الانتشار. ازهاره يستمر من نيسان الى آب.

٨٧٧٠ - خَالِدَة طَاقِيَّة* ، هَلِيكْرِيْز طَاقِي Helichrysum arenarium (S). Helichryse arénaire, Immortelle des sables (F).

نبات عشبي معمر. ساقه منتصبية فرعاء تعلو نحو ٣٠ سم. اوراقه ملعقية، مستطيلة، زباء النصل. ازهاره عذقية التجميع لونها الى الصفار || يرغب في الاتربة الرملية وينبت في جميع الاصقاع المعتدلة || ازهاره يستمر من تموز الى ايلول.

٨٧٧١ - خَالِدَة قَنَابِيَّة* ، هَلِيكْرِيْز قَنَابِي Helichrysum bracteatum (S). Helichryse à bractées, Immortelle à bractées, l. de la Malmaison, Fleur de paille (F).

نبات عشبي معمر عديد الفروع الزينية. ساقه صلبة تعلو من ٤٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه سنانية النصل الضيق تطول من ٧ الى ١٠ سم. ازهاره مستطيلة المالحق، عديدة الالوان التي تختلف مع الفروع. يكثر فيها الاصفر والاحمر والبفسجي || ازهاره يستمر من تموز الى تشرين.

Flanc (F). Flank (E).

٨٧٥٢ - خَاصِرَة

Actionner, Agir en justice

٨٧٥٣ - خَاصِم

رفع دعوى على. اي التجأ الى القضاء.

Faculté (F). Property (E).

٨٧٥٤ - خَاصِيَّة

ج. خاصيات وخصائص. هي قوة طبيعية كامنة تمكن الاحياء من القيام بعمل ما.

٨٧٥٥ - خَاصِيَّة الْإِنْتِاش

Faculté germinative (F). Germinal faculty (E).

القوة الجبلية الكامنة في البذور وتدعى قابلية الانتاش لانها نسبية متفاوتة النشاط.

Colorant (F).

٨٧٥٦ - خَاصِب ، صِبَاغ

Colouring (E).

٨٧٥٧ - خَاضِلَات ٥

Mélonthidés, Phyllophages, Phytophages (F). Melolonthidae, Phyllophagous, Plant-eating (E).

هي الحشرات المضرة من اي نوع كالت تركب اوراق النباتات وزيمعته فتقرضها وتؤذيها.

Phytophage (F).

٨٧٥٨ - خَاضِلَة ٥ ، رَابِلَة ٥

Plant-eating (E).

نعت تعريفي يطلق على الحشرات التي تغتذي من اي جزء كان من النبات.

٨٧٥٩ - خَاطِف الذَّبَاب* ، شَوْرَب ، بُوَيَالَة ، مَذْبَاب ٥

Muscicapa (S).

Muscicape, Gobe-mouches (F). Fly-catcher (E).

جنس عصافير من فصيلة الملبابيات. أنواعه عديدة جميعها صغيرة القد طويلا يراوح من ١٣ الى ١٦ سم. معظمها ابلق الثوب. ذكورها ازهى من اناثها. وهي باكثريتها من القواطع تجوب البلاد في طلب الرزق والمصيف والمشي. تألف الغابات والحدائق. قوتها الحشرات المجتمعة انحصار الذباب. تدش في الاشجار. اناثها تضع من ٥ الى ٦ بيضات تحضنها بمنابرة الذكور من ١٤ الى ١٥ يوما.

Céryle (F).

٨٧٦٠ - خَاطِف ظِلَّة

Pied kingfisher (E).

هو الرفراف، اطلبه.

Aigle impérial (F).

٨٧٦١ - خَاطِيَّة

Imperial eagle (E).

هي العقاب القيصرية، اطلها.

Lucifuge (F).

٨٧٦٢ - خَافِش ٥ ، دَالِس ٥

Lucifugous (E).

نعت تعريفي يطلق على كل حشرة تسرح في الظلام.

Danthonia (S).

٨٧٦٣ - خَافُور*

Danthonie (F). Wild oat-grass (E). Kelchgras, Danthonie (D). Vena spigata (I).

جنس نباتات عشبية، برية، حولية، مرعوية وعلفية تنتمي الى الحوطا وفصيلة النجيليات. أنواعه نحو ٢٠٠ منتشرة في جميع اصقاع العالم. يكثر وجودها في المراعي والحقول تحتلفها الماشية والجمال خاصة.

Avoron (F). Flaver (E).

٨٧٦٤ - خَافُور الْجِمَال

هو غرطال فتوا، اطلبه.

٨٧٨١ - خَامَة

الخامة من الزرع : اول ما ينبت على ساق وقيل الطاقة الغضة . وفي الحديث : « مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع يميلها الريح مرة هكذا ومرة هكذا » .

٨٧٨٢ - خَامَدْرِيس جَبَلِي (F). Dryade à pétales (F). White dryas (E).

هو الليميص الثماني البتلات ، نبات عشبي مداد ، اطلبه .

٨٧٨٣ - خَانِقِ الذُّبَاب * ، دَيُونَة

Dionaea (S). Dionée, Attrape-mouches, Trappe de Vénus (F). Venus's fly-trap, Fly catcher (E). Echte fliegenfalle (D). Chiappa mosche (I).

نبات بري وتزييني معمر من فصيلة النيدمانيات الحشرات . اوراقه ثنائية الفلقة المحمية ، هدية الامطار ، قرصية التجميع ، تلامس التربة . ازهاره عشكولي يقوم على شراخ طويل دقيق . ازهاره صغيرة القد ، نظامية التركيب ، بيضاء اللون : من ميزاته ان اوراقه تنطق على كل حشرة تلمسها كالذباب وعيره فتفرز عنه انطباقها مادة حضية تبيت الحشرة وتحولها الى غذاء يمتصه النبات .

٨٧٨٤ - خَانِقِ الفَهْد (F). Arnica (E). هو الارنيكا ، اطلبها .

٨٧٨٥ - خَانِقِ الكَلْب (F). Tue-chien (F). Dog's bane (E).

هو الخوشان نبات طبي من الدفليات ، اطلبه .

٨٧٨٦ - خَانِقِ النَّمِر (F). Doronic (F). هو الدرنوق ، اطلبه .

٨٧٨٧ - خَانُوق (F). Diphtheria (E). هو الديفتريا مرض وبائي .

٨٧٨٨ - خَائِثَة (F). Aigle impérial (F). هي العقاب القيصرية ، اطلبها .

٨٧٨٩ - خُب * ، سُعَادِي مَدَّاد (F). Carex extensa (S). Carex extensible, Laiche extensible (F). Long bracted sedge (E). Riedgras (D). Carico panico (I).

نوع من السعادي وهو نبات جذموري معمر من فصيلة السعديات يعيش في الرمال القاحلة ويستعمل لتثبيتها .

٨٧٩٠ - خُب * الخب هو لحاء الشجر الغض النضر .

٨٧٩١ - خُب * (F). Végéter (F). To vegetate (E). خب النبات اذا ارتفع عن التراب .

٨٧٩٢ - خِبَاء ، كَرَبَلَة (F). Carpel (E). مجموع الاعضاء الانثوية التي يتألف منها متاع الزهرة وهي المبيض والقلم والسمة والمدقة .

٨٧٩٣ - خِبَاء ، سَبَا (F). Alchiba الخباء ويدعى السبا وينتقل الغراب نجم نير من كوكبة الغراب .

٨٧٩٤ - خِبَاء يَمَانِي (F). le Corbeau (F). Corvus (E).

الخباء الباني كوكبة نجوم جنوبية الموقع تدعى الغراب ، اطلبه .

٨٧٧٢ - خَالِدَة مُذَهَبَة * ، هَلِيكْرِيز ذَهَبِي (F). Helichrysum plicatum (S). Helichryse dorée, Immortelle de Grèce (F).

نبات لبني معمر . ساقه فرعاء تعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم . اوراقه عصفية ، منبسطة ، خلية النصل ، فضية اللون . ازهاره عذقية التجميع ذهبية اللون . مبذول في الشرق الاوسط واليونان || ازهاره يستمر طوال الصيف .

٨٧٧٣ - خَالِدَة مُعَنَّقَة ، هَلِيكْرِيز مُعَنَّق (F). Helichrysum petiolatum, Gnaphalium lanatum (S). Helichryse pétiolée, Immortelle pétiolée (F).

جنية ليفية معمرة . ساقها فرعاء تعلو نحو المتر . اوراقها معنقة متعاقبة بيضية الشكل خلية النصل على صفحتيه . ازهارها عذقية التجميع صغيرة القد تبنية اللون || ازهارها يستمر طوال الصيف .

٨٧٧٤ - خَالِدَة نَتْنَة ، هَلِيكْرِيز نَتْن (F). Helichrysum foetidum (S). Helichryse fétide, Immortelle fétide (F).

نبات عشبي معمر . ساقه منتصبه قوية تعلو من ٤٠ الى ١٢٠ سم . اوراقه عصفية الشكل منبسطة . طولها نحو ٧ سم . وعرضها ٢ نصلها ازغب الصفحة السفلى . ازهاره كريمة الرائحة ، كثيفة التجميع ، لونها من الاصفر التبي الى الاصفر المذهب || ازهاره يستمر من حزيران الى ايلول .

٨٧٧٥ - خَالِص الى السَفِينَة ، قُوب (F). F.O.B., Franco à bord (F). Free on board (E).

صفة شرطية يتعهد بموجها البائع ان يسلم المبيع على ظهر السفينة الناقلة دون اضافة أي اجرة كانت .

٨٧٧٦ - خَامَا أَقْطِي (F). Yèble (F). Damwort (E). راجع بيلسان صغير .

٨٧٧٧ - خَامَا بُوْقِي * (F). Chamaepeuce diacantha, Cirsium diacantha (S). Chamépeuce (F). Fishbone thistle (E). Schirumpfler (D). Camepuce (I).

نبات عشبي بري شوكي طبي من فصيلة المركبات . يكثر في الاراضي البور وعلى حواشي الطرقات . ساقه مضلعة فرعاء تعلو نحو ١٠٠ سم . اوراقه حاضنة ، مفروضة ، ضيقة التشريح ، حسفة ، نصلها لامع الصفحة العليا ، خلي السفلى .

٨٧٧٨ - خَامَا دَرِّيُوس (F). Germandrée officinale (F). Common germander (E).

هو الطوقريون الخزفي نبات عشبي بري طبي جزيل النفع .

٨٧٧٩ - خَامَا سُوقِي * ، تِين الارْض (F). Euphorbia chamaesyce (S). Euphorbe monnoyer (F). Crenated annual spurge (E). Niedrige euphorbie (D). Erba pondina, Fico per terra (I).

نبات نجمي عشبي بري من فصيلة الفربيونيات . عيدانه لبنة العصارة . اوراقه مستديرة صغيرة القد . ثماره ثنائية مفلطحة تلحفها الاوراق || يقال انه طبي يسهل الاخلاط الغليظة ويسقط البواسير اكلا بالخبز ويلحم القروح ويقطع الثآليل .

٨٧٨٠ - خَامَا قَيْسُس (F). Asarine (F). هو سيسم اصرينه ، اطلبه .



خَالِدَة قَدَابِيَة



خَالِدَة مَذَهَبَة



خَامَا بُوْقِي



خَامَا سُوقِي



خَانِقِ الذَّبَاب



خَب

٨٨٠٤ - خُبَّازَة مِسْكِيَّة ، عِطْر

Malva moschata (S). Mauve musquée (F).
بجلة معمرة مهددا الشرق الأدنى تملو من ٣٠ إلى ١٠٠ سم. ساقها فرعاء متشعبة. أوراقها خنسية التفريضة العميق ، فصلها خلي البشرة. مسن الحافة. باهت الحصار الزيتي. ازهارها متوسطة القد ، قطرها نحو ٣ سم. لونها الى الوردي ، كرايلها زياء الصفحة ، خالية من التخديد. اوراقها وازهارها عطرية ، اريجها اريج المسك || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول.

٨٨٠٥ - خُبَّازَة مَغْرِبِيَّة
Malva mauritiana (S). Mauve de Mauritanie, M. d'Alger (F).
جنبه محولة تملو نحو ١٥٠ سم. ضروبها عديدة ، سوقها منتصبه زياء اللحم. اوراقها كبيرة القد ، خنسية التفصيص ، زغبية النصل. ازهارها كبيرة القد ، قطرها نحو ٦ سم. ألوانها تختلف مع ضروبها ، منها الوردي والبنفسجي والارجواني || ازهارها يستمر من اوائل حزيران الى آواخر تموز.



خبازة

٨٨٠٦ - خُبَّازِيَّات

Malvaceae (S). Malvacées (F). Malvaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين كثيرة القمالات ، سفلية الاسدية. اجناسها نحو ٥٠ تجمع ما لا يقل عن ١٥٠٠ نوع منتشرة في جميع اصقاع العالم اخصها المناطق الحارة والاستوائية || نباتاتها مختلفة القد والشكل ، منها الاعشاب واليجلات والجنبات والشجيرات والشجر. اوراقها معنقة ، اذينية ، متعاقبة ، بسيطة او مفصصة وبعضها زغبية النصل. ازهارها لاقياسي الارتكاز والتجميع ، منه الابطي والمحوري والتناحي والطامي ومنه الفردي والنوري والمنفودي والسنبلي. ازهارها خنسية التركيب عديدة الالوان || والخبازيات من اشهر فصائل المملكة النباتية لانها تشمل الكثير من الانواع الزراعية التي يستعملها الانسان لغذائه وصناعته وبهجته. كما انها غنية بالانواع الطيبة والصحية النافعة.

٨٨٠٧ - خُبَّاط *
Ophiocephalus (S).

Ophiocephale (F). Ophiocephalus (E).
جنس اسماك نهريه من فصيلة الخباطيات. انواعه المعروفة ٤ اعطانها تمتد من الهند الصينية الى ماليزية وافريقية الاستوائية. تألف الانهر والبحيرات والمناقع || اجسامها اهليلجية ، مستطيلة ، معتدلة التبطيط. طول من ٣٠ الى ٥٠ سم. رؤوسها مستطيلة ، منخفضة الجباه ، مخروطية الاخطام ، كبيرة الاشدان. هيونها صفيرة ، ماسحة ، متقدمة. زعانفها الظهرية مشطية الشكل ، قاطبة ، تقابلها الشرجية حتى منتصف البطن. الذيلية مستديرة الاطراف. اثوابها الى الحصار الباهت يعلوه تجذيع متقطع يمتد من العنق الى الذيل || لحمها متوسطة الصنف ، مأكولة.



خباط

٨٨٠٨ - خُبَّاطِيَّات ه

Ophiocephalidae (S). Ophiocephalidés (F). Ophiocephalidae (E).
فصيلة اسماك نهريه وهورية من شائكات الزعانف وفئة البلعوميات النحبة. انواعها عديدة تجمع الى جنسين الخبباط والشنه. جميعها من اسماك المناطق الاستوائية الاسيوية والافريقية. يكثر وجودها في بحيرات واهوار وانهر الهند الصينية وماليزية وافريقية الاستوائية.

٨٧٩٥ - خُبَّاب

Trotteur (F). Trotter (E).
هو الفرس المروض على الخبب.

٨٧٩٦ - خُبَّازَة

Terrier de rat (F).
جحرة الجرذان ج خبار.

٨٧٩٧ - خُبَّازَة ، اخْتِيَّاز

Panification
هي صناعة الخبز اي تحويل الدقيق خبزاً.

٨٧٩٨ - خُبَّازَة * ، خُبَّازِي

Malva (S). Mauve (F). Mallow (E). Malve (D). Malva (I).
جنس نباتات عشبية من فصيلة الخبازيات. انواعه نحو ٢٠ منتشرة في جميع اصقاع العالم. اوراقه معنقة ، متعاقبة ، مفصصة او مفرضة. ازهاره لا قياسية الارتكاز والتجميع ، مختلفة الالوان ، تفيد الصدر وتدخل في بعض المستحضرات الطبية والتركيب الصحية || اشهر انواعه الزراعية الزينية ما يتبع :

٨٧٩٩ - خُبَّازَة اصْبَعِيَّة

Malva digitata, Callirrhoe digitata (S). Mauve digitée, Callirrhoe digitée (F).
بجلة معمرة تملو نحو المتر. مهددا امريكة الشمالية. اوراقها عميقة التفريضة الاصبعي الشكل. ازهارها كبيرة القد قطرها نحو ٥ سم. بتلاتها مثلثة الزوايا. مسنة الحافة ، جؤوية اللون || ازهارها يستمر طوال الصيف.

٨٨٠٠ - خُبَّازَة بَرِّيَّة

Malva sylvestris (S). Mauve sauvage, Grande mauve, Fromageon (F).
بجلة محولة تملو من ٤٠ الى ١٢٠ سم. ساقها ضعيفة منبسطة ، هلية وزياء اللحم. اوراقها لاقياسية التفصيص ، عدد فصوصها يراوح من ٣ الى ٧. ازهارها ابطية الارتكاز ، متوسطة القد ، قطرها نحو ٤ سم. بتلاتها بنفسجية اللون تقطعها ثلاثة خطوط عابقة. ازهارها يستمر من حزيران الى آب.

٨٨٠١ - خُبَّازَة جَعْدِيَّة

Malva crispa (S). Mauve frisée (F).
جنبه حولية مهددا الشرق الأدنى. تملو من متر الى مترين. ساقها مستقيمة ، منتصبه ، موزقة حتى ذروتها. اوراقها كبيرة القد ، مستديرة ، مجمدة النصل. ازهارها صغيرة لاطة ، بتلاتها ثنائية التفصيص لونها الى الابيض الوردي || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول.

٨٨٠٢ - خُبَّازَة مُخَطَّمِيَّة

Malva alcea (S). Mauve alcée, Aicée (F).
بجلة معمرة تملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها السفلى مقرنة الزوايا ، العليا خنسية التفريضة. فصلها ضيق الصفحة مسن الحافة. ازهارها كبيرة القد ، قطرها نحو ٥ سم. لونها الى الوردي. كرايلها مخددة ، مرطاه البشرة. ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول.

٨٨٠٣ - خُبَّازَة قِنَابِيَّة

Malva involucrata, Callirrhoe involucrata (S). Mauve involuquée, Callirrhoe involuquée (F).
عشبة معمرة تملو نحو ٨٠ سم. ساقها زياء اللحم. اوراقها مخروطية الشكل ثلاثية او خنسية التفريضة العميق. ازهارها كبيرة القد ، قطرها نحو ٦ سم. لونها الى البنفسجي يعلوه موج ارجواني || ازهارها يستمر طوال الصيف.

٨٨٢٢ - خُبْزِيَّات (F). Artocarpae (E). Artocarpées (F).
سيط من فصيلة الانجريات . انواعه المعروفة نحو ٢٠
معظمها من نباتات المناطق الاستوائية .

٨٨٢٣ - خَبْط، مَقْس (F). Malaxage (F).
Kneading (E).
خبط او مقس الزبدة بعد فصلها عن الخيض لتجانس
اجزائها بعد طرد الهواء منها .

٨٨٢٤ - خَبَقْ * (F). Chara (S).
Chara, Charagne, Lustre d'eau (F). Chara, Stone-
wort (E). Armleuchter (D). Chara, Foladina (I).
نبات بحري من فصيلة الخبقيات يتميز بزوائده التي
تحقق بالخلايا العقدية وتؤلف معها قلائس مركبة من
خمس نيمات جولية الخنار .

٨٨٢٥ - خَبَقِيَّات (F). Characées (S). Characeae (E).
فصيلة نباتية من الخباق . اجناسها وانواعها المعروفة
عديدة ، معظمها من متحجرات الحفبة الترياسية من الاباج
الاول || اكثر انواعها المعاصرة يعيش مغموراً في المياه
العذبة المستنقعة وبعضها في الماء الاجاج || جميعها قائمة
الخضار ويفوح منها عند لمسها صلابة نثنة .

٨٨٢٦ - خَبَل * (S). Strix aluco, Syrnium aluco (S).
Hulotte, Chat-huant (F). Tawny owl (E).
طائر من البوميات وعمارة الفداديات . جثته متوسطة
الحجم ، طوله نحو ٤٠ سم . رأسه غليظ الشكل . محسره
كروي القرص . منسره قصير القد ، منعقف الطرف ،
اسمر اللون . سقطاء منفرجة مستطيلة تكاد تشرف
على الذنب . ذنبه قصير الافنيك مستديره . ارساؤه
صغيرة قوية كاسية ومخالبه كذلك || موطنه جميع البلاد
المعتدلة الحرارة . يألف الغابات والاحراج . يبتعد
عن الاماكن الآهلة وهو كثير الزقاء لا ينقطع
عنه من الغسق الى الفجر || يدن عشه في صدوع الاشجار
القديمة الباسقة وفي اوكن غيره من الطير . انشاء تبيض
نحو ٤ بيضات مستطيلة خشنة عاجية اللون تحضنها وحدها
نحو اربعة اسابيع || يلتصق قوته في الليل ولا يعف عن
شيء يستطيع اقتناصه من الحشرة الى الحية .

٨٨٢٧ - خَبْه (F). Erysimum (F). Treacle worm-seed (E).
هي حشيشة الحفر ، اطلبها .

٨٨٢٨ - خَبْشَارِي ، صُعْثَر (F). Caviar (F).
Caviare (E).
هو سره السمك المحضر .

٨٨٢٩ - خَبِير (F). Expert
الخبير من درس الشيء واختبره وتوصل الى معرفته وادراك
كنهه . لذلك فهو اولاً واختيراً رجل علم واختصاص
وفطنة ودراية .

٨٨٣٠ - خَبِيرَة (F). Tonte de l'er choix (F).
الخبيرة : الصوف الجيد من اول الجز .

٨٨٣١ - خَبِيرَة (S). Althaea (S).
Guimauve (F). Marsh-mallow (E).
جنس نباتات عشبية سبوتية من فصيلة الخبازيات .
انواعها عديدة منها البرية والزرينية ، اوراقها شبه غليظة

٨٨٠٩ - خَبَال (F). Dysboulie (F).

الخبال اسم جنسي جامع يطلق على كل ما يسبب اضطراب
قوة الإرادة او اختلالها .

٨٨١٠ - خَبَب (F). Trot
هو مراوحة الفرس بين يديه ورجليه لذلك فهو نوع من
السير بين الخطو والعدو . وقد يكون على اشكال وهي :
خبب طويل Trot allongé (F).
خبب عادي Trot ordinaire (F).
خبب قصير ، هريرة Trot raccourci (F).
خبب معيب ، هملجة Trot décausé, Amble rompu (F).

٨٨١١ - خَبْت (F). Terrain déprimé (F).
Depress soil (E).
الخبث ج أخبات وخبوت هو المتسع المظلم من بطون
الارض .

٨٨١٢ - خَبْطَة (F). Bande de sables (F). Sand-strip (E).
الخبطة ج خبيب : طريدة مستطيلة من الرمل .

٨٨١٣ - خَبَث الحديد (F). هو التوبال ، اطلبه .

٨٨١٤ - خَبْدُوع (F). Rainette (F). Tree-frog (E).
هو الشرغوف نوع من الضفدع الاخضر اللون ، الصغير
القد ، يتسلق الاشجار .

٨٨١٥ - خَبْدُوعِيَّات (F). Firmisternes (F).
Firmisternes (E).
لغة من رتبة السونيات ، عديمات الذنب ، سلمات اللسان .
انواعها المعروفة كثيرة العدد تجمعها خمس فصائل الرزانيات
الشقدعيات ، المدموليات ، النشيديات والهورسيات ||
تتميز جميع ضفادع هذه اللغة بمساواة سطح ضلعي قوسها
الصدري في مركز تلاقيها || اشهر اجناس هذه اللغة
الضفدع والشقدع .

٨٨١٦ - خَبَر (F). Préparer (F). To prepare (E).
خبر التربة : حضرها للزراعة .

٨٨١٧ - خَبِيرَة (F). Expertise (F). Survey (E).
هي كشف الخبر وتقريره .

٨٨١٨ - خَبْز (F). Pain (F). Bread (E).
طعام يصنع من دقيق بعض الحبوب بعد عجنه بالماء واختاره
واختبازه . اشيع الحبوب المستخدمة في صناعة الخبز هي
الحنطة والذرة والشعير والشوفان || وهو يعتبر كالطعام
الرئيسي للانسان في اكثر انحاء العالم . يقال انه عرف
منذ اقدم العصور نظراً لبقايا خبز الشعير التي وجدت
في كهوف يرجع عهدها الى العصر الحجري .

٨٨١٩ - خَبْزُ الْعُقَاب (F). Campanule lacinulée (F).
Hare-bell (E).
هو الجريس الاعجن ، اطلبه .

٨٨٢٠ - خَبْزُ الْقَاق ، خَبْزُ الْغُرَاب (F).
Cotylédon ombilique (F). Pennywort (E).
هو سرة الارض ، اطلبها .

٨٨٢١ - خَبْزُ الْمَشَايِخ (F). Cyclamen (F).
هو السكم ، اطلبه .



خبق



خبيل



خَبِيزَة نَيْبِيَّة



خَبِيزَة وَدِيَّة



خَت



خَتِير اَرْجَوَانِي



خَتِير بَنْفَسَجِي

٨٨٣٩ - خَبَار ، خَبَارَة Condensat (F).
Condensat (E).
الخَبَار أو الخَبَارَة ما تبقى من مادة معينة بعد معالجتها بالتبخير أو التجفيف.

٨٨٤٠ - خَبْرُف Absinthe (F). Absinthium (E).
أَطْلَب أَبْسَنْت .

٨٨٤١ - خَبْعِيَّة Tigresse (F). Tigress (E).
الخَبْعَة : أنثى الببر ومن اسمائها المشهورة : فزارة .

٨٨٤٢ - خَبَل Tanière de lièvre (F).
Hole of hare (E).
جحر الارنب البري .

٨٨٤٣ - خَبْشُو* ، أَبُونَضْوَة Buceros (S).
Calao, Dichocère (F). Hornbill (E).
جنس طير من الجواثم الملتصقات الأصابع . أنواعه قليلة جميعها بلقاء الثوب . طولها براوح من ١٢٠ إلى ١٣٥ سم . منقارها كبير القد طولها من ٢٨ إلى ٣٦ سم . غليظ الهيئة مسلح بقرن غضروفي شكله شكل النضوة يمتد من الرأس إلى منتصف المنقار || موطنه البلاد الحارة . يألف الغابات الكثيفة . قوته الثمار على أشكالها وأنواعها . يلدن عشه في صدوع الأشجار . انشاء تضع من ٥ إلى ٦ بيضات تحضنها ثلاثة أسابيع دون أن تتركها دقيقة واحدة لأن الذكر يحجر عليها بالطين والقش ولا يترك لها سوى مخرج منقار ليتمكن من زلقها .

٨٨٤٤ - خَبُونِيَّات ٥ Chétognathes (F).
Chetognathes (E).
فئة دويبات بحرية من أشباه الديدان . أجسامها شبه انبوبية الشكل تطول من ١٠ إلى ٥٠ م . تعيش على الطوح . تتميز بنماتها وبسرعة تكاثرها .

٨٨٤٥ - خَبِير ٥ Cortinarius (S). Cortinaire (F).
جنس فطور غشائية من فصيلة الفاريقونيات . أنواعه المعروفة كثيرة العدد الذي يتجاوز ٣٠٠ أعطائها معظم أقاليم البلاد المعتدلة الحرارة . تعيش على المواد النباتية المنحلة . تتميز ببوغها النحاسي اللون وبأغشيتها الدقيقة التي تنقلص مع تقادم العمر وتجتمع على السوق || أنواعه الجيدة الصنف المأكولة قليلة العدد والآخرى كاعنة غير مرغوب فيها . أشهرها التالية :

٨٨٤٦ - خَبِير أَرْجَوَانِي ٥ Cortinarius purpurascens (S).
Cortinaire pourpré (F).
نوع من الختير ، يوجد في الغابات والحراج الرطبة . ساقه مستقيمة القاعدة ، معتدلة الارتفاع . أرسوته صيوانية الشكل ، أرجوانية اللون ، قطرها نحو ١٢ سم . أطراسه ولحميته إلى البنفسجي . لحميته جيدة الصنف ، مأكولة .

٨٨٤٧ - خَبِير بَنْفَسَجِي ٥ Cortinarius violaceus (S). Cortinaire violacé (F).
نوع من الختير ، يوجد في المواقع الظليلة . ساقه شبه مخروطية الشكل . أرسوته صيوانية ، بنفسجية اللون ، قطرها نحو ١٢ سم . أطراسه دقيقة لونها لون الارسوة والساق . لحميته جامدة ، جيدة الصنف ، مأكولة .

مفصصة متعاقبة . أزهارها أبطية متعددة الألوان || جذورها وأوراقها وأزهارها طيبة لعابية ملينة || أشهر أنواعها التزينية ما يلي .

٨٨٣٢ - خَبِيزَة نَيْبِيَّة Althaea ficifolia (S).
Guimauve à feuilles de figuier (F).
نوع من الخبيزة الخولة . تعلو نحو ٢٠٠ سم . أوراقها تشبه أوراق التين وهي سباعية التفريض العميق ، مسنة الخافة . أزهارها كبيرة القد برتقالية اللون || ترغب في المواقع الجبلية الباردة .

٨٨٣٣ - خَبِيزَة صَيْبِيَّة ، جَوْحَم صَيْبِي ، وَرْدُ الزَوَانِي الصَيْبِي Althaea chinensis (S).
Guimauve de Chine, Rose trémière de Chine (F).
نوع من الخبيزة يعلو من ١٠٠ إلى ١٥٠ سم . ساقه وفروعه مزأبرة البشرة الجامدة الملب . أوراقه مقرنة الزوايا لا مفصصة . أزهاره بيض وحر ، قصيرة الزناد ، كبيرة القد ، مكسبة . قطرها نحو ١٠ سم . أزهاره يستمر من تموز إلى أواخر الخريف .

٨٨٣٤ - خَبِيزَة قَنَابِيَّة Althaea cannabina (S).
Guimauve à feuilles de chanvre (F).
نوع من الخبيزة المعمرة . تعلو من ١٥٠ إلى ٢٥٠ سم . أوراقها قنابية الشكل ، خماسية التفريض العميق . نصلها أزغب الصفحة السفلى . مسن الخافة . أزهارها كثيرة العدد ، طويلة الزناد لونها إلى الوردي المصطب والموشح . أزهارها يستمر من حزيران إلى آب .

٨٨٣٥ - خَبِيزَة مَخْرُوفِيَّة* ، عَضْرَس Althaea officinalis (S). Guimauve officinale, Althée officinale (F).
White mallow, Marsh-mallow (E).
Apothekerstockmalve, Witte malve, Eibisch (D).
Malvavisco, Altea officinale (I).
نوع من الخبيزة وهو نبات عشبي طبي معمر يعلو من ١٠٠ إلى ١٥٠ سم . سوقه وأوراقه زباء البشرة . أوراقه خلبية ثلاثية أو خماسية الفصوص ، مسنة الخافة . أزهاره وردية اللون ، ثلاثية التجميع ، متوسطة القد ، قطرها نحو ٤ سم . || أزهاره يستمر من حزيران إلى أيلول .

٨٨٣٦ - خَبِيزَة وَرْدِيَّة* ، جَوْحَم ، وَرْدُ الزَوَانِي ، شَحَم المَرْجُوج ، سُبْت Althaea rosea, Alcea rosea (S).
Rose trémière, Rose de mer, Passe-rose, Alcée rose (F).
Hollyhock, Rose mallow (E).
Rosenstockmalve, Rosenalcee, Malvenstockrosen (D).
Alcea rosa, Malva rosa, Rosa di mare (I).
نوع من الخبيزة . يعلو من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ سم . ضروبه عديدة منها المكبس والعادي ثم الاحمر والارجواني والابيض والاصفر والوردي || ساقه خلية زباء . أوراقه خماسية أو سباعية التفصيص . متمجة النصل . أزهاره سنبلية التجميع ، طويلة الزناد ، كبيرة القد ، قطرها نحو ٨ سم .

٨٨٣٧ - خَبِيطَة Bryone dioïque (F).
Snake-bryony (E).
هي الفاشرا السوداء ، اطلبها .

٨٨٣٨ - خَبِيشَة Carphophore

٨٨٥٥ - خُثَّ ، خُثَيَّات ، أَلْغ

Algues (F). Algae (E).

نباتات من مستورات الزهر، تنتمي الى رتبة المشريات، لا تتميز في هيكلها السوي والاوراق والجذور وهي عديدة الفصائل والاجناس والانواع تعيش في البحار او في المياه العذبة || واخذت يقسم الى اربع مراتب:

٨٨٥٦ - خُثَّ أَهْمَر ، أَلْغ أَهْمَر

Algues rouges, Floridées, Rhodophycées (F). Red algae, Floridae, Rhodophyceae (E).

مرتبة من الخثيات تشمل بعض الفصائل.

٨٨٥٧ - خُثَّ أَخْضَر ، أَلْغ أَخْضَر

Algues vertes, Chlorophycées (F). Green algae, Chlorophyceae (E).

مرتبة من الخثيات تشمل بعض الفصائل كالمذغفات والممصيات.

٨٨٥٨ - خُثَّ أَزْرَق ، أَلْغ أَزْرَق

Algues bleues, Cyanophycées (F). Blue algae, Cyanophyceae (E).

مرتبة من الخثيات تنسب اليها بعض الجراثيم والبكتيريا.

٨٨٥٩ - خُثَّ أَسْفَع ، أَلْغ أَسْفَع

Algues brunes, Phéophycées (F). Brown algae, Pheophyceae (E).

مرتبة من الخثيات تشمل الفوقسيات وغيرها.

٨٨٦٠ - خُثَّة ، خِثِي

Bouse de vache (F).

Cow-dung (E).

هو روث البقر اللين اي رجيعة، ج اخفاء.

٨٨٦١ - خُثْرِيَّات

Saccharomycetaceae (S). Saccharomycetacées, Saccharomycètes (F). Saccharomyces (E).

فصيلة فطور مجهرية تنتمي الى مرتبة النغضيات ورتبة الزقيات تتميز بازرقاقها العريضة الحالية من كل غشاء، اجناسها وانواعها عديدة معظمها من الخمائر التي تخرج عن نطاق الطفيليات الزراعية. ومنها نوع يعرف بالقشبة يركب ثمار البرتقال والبنندورة والقطن... اطلبه.

٨٨٦٢ - خُثْق

Gyps fauve (F). Gyps fulvus (E).

هو القشعام الاكلف، اطلبه.

٨٨٦٣ - خُثْلَة

Bas-ventre, Hypogastre (F).

Hypogastrium (E).

هي اسفل البطن ما بين السرة والعمانة.

٨٨٦٤ - خُثْمَاوَات ، فَتْطَاسِيَّات

Platyrrhiniens (F). Platyrrhiniens (E).

هي مجموعة قرود العالم الجديد. انوفها مستعرضة، ثخينة الوثيرة، جانبية السام || اجناسها وانواعها كثيرة العدد تجتمع الى فصيلتين: السبوسيات والقرود الدبية.

٨٨٦٥ - خُثْمِي

Algueux (F).

نمت تعريفي يطلق على كل موقع في الماء يكثر فيه الخث.

٨٨٦٦ - خُثْمِي

Exogyne (F). Exogynous (E).

خشم م. خشيمة. نمت تعريفي توصف به الزهرة الناشئة المدقة المستفصمة.

٨٨٦٧ - خُثْد

Joue (F). Cheek (E).

الجزء الجانبي من الرأس وهما خدان.

٨٨٤٨ - خَيْتَر حُرْشَفِي

Cortinarius pholideus (S).

Cortinaire écaillé (F).

نوع من الختير، يوجد في الغابات الرطبة. ساقه نحيلة، رفيعة، عديدة الاطواق الغشائية. ارسوسته مظلية الشكل، حرشفية الصفحة، عنايبه اللون. لحميته كاعنة الصنف غير مرغوب فيها.

٨٨٤٩ - خَيْتَر دُمْلُجِي

Cortinarius collinitus (S).

Cortinaire à bracelets (F).

نوع من الختير، يوجد في حراج الصنوبريات. ساقه حرشفية الاطواق الغشائية التي تبدو كالدمايح، لونها الى اليلكي. ارسوسته كستنية اللون يعلوها موج برتقالي، قطرها نحو ١٠ سم. لحميته كاعنة الصنف لا تؤكل.

٨٨٥٠ - خَيْتَر رَفِيع

Cortinarius elatior (S).

Cortinaire élevé (F).

نوع من الختير، يوجد في حراج السنديان. يعيش على الدبال. ساقه رفيعة، معتدلة الشخانة، بيضاء اللون. ارسوسته شبه مظلية الشكل، كستنية اللون، قطرها نحو ١٠ سم. لحميته كاعنة الصنف غير مرغوب فيها.

٨٨٥١ - خَيْتَر كَافُورِي

Cortinarius camphoratus (S).

Cortinaire camphré (F).

نوع من الختير، يوجد في حراج الصنوبر. ساقه قصيرة مستفصمة القاعدة يبداء اللون يعلوها تمشيع اصفر. ارسوسته قلنسوية الشكل لونها الى الريدة يعلوها موج ازرق وشعة صفراء. رائحته رائحة الكافور. لحميته كاعنة الصنف غير مرغوب فيها.

٨٨٥٢ - خَيْتَر مُتَقَلِّب

Cortinarius multiformis (S).

Cortinaire variable (F).

نوع من الختير، يوجد في المواقع الظليلة. ساقه مستغلظة القاعدة طحلاء اللون. ارسوسته صيوانية، صفراء اللون، موشحة بالبي، قطرها نحو ١٠ سم. لحميته جامدة، جيدة الصنف، مأكولة، رائحتها رائحة العسل.

٨٨٥٣ - خَيْتَر مُنْتَصِر

Cortinarius triumphans (S).




Cortinaire triomphant (F).


نوع من الختير، يوجد في حراج الصنوبريات. ساقه رفيعة، معتدلة الجرم، مستفصمة القاعدة، عديدة الاطواق الغشائية. ارسوسته كبيرة، فارشة، قطرها نحو ١٢ سم. لونها الى البنفسجي الزاهي الاصفر الموج. اطراسها عنايبه اللون. لحميته كاعنة الصنف غير مرغوب فيها.

٨٨٥٤ - خَيْتَر مُوَشَّح

Cortinarius armillatus (S). Cortinaire volé (F).

نوع من الختير، يوجد في الغابات. ساقه صفراء اللون، برتقالية الاطواق. ارسوسته شبه صيوانية الشكل، صفراء اللون يعلوها موج امفر، قطرها نحو ١٠ سم. اطراسها الى الصفار الباهت. لحميته كاعنة الصنف غير مرغوب فيها.





خَدَّابَة



خَدَّاش مَبْدُول



خَدَّال المَتَوَسِّط



خَدَراف رَفِيع



خَدَرَنْق



خَوَرَنْق عَنكَبُونِي

٨٨٧٧ - خَدَّال المَتَوَسِّط *

Isurus oxyrhynchus (S).

Oxyrhine de la Méditerranée (F).

نوع من الخدال . سمكة بحرية ولود مفترسة من فصيلة
الخمفيات . اعطانها جميع مناطق البحر الابيض المتوسط ||
مسرحتها بمبي غوطي ولا تعبر المياه الاقليمية وتقترب من
المحاذج الا عند مطاردتها اسرلب الرنكة والسردين || جسمها
كبير القد ، وشعي الشكل ، يطول من ٣ الى ٤ امتار .
ثوبها الى الكلسة الزرقاء المواج يعبق عند الظهر وينحرف
نحو الابيض عند البطن . رأسها مخروطي . خطمها شارف .
فها لاطى ، مستعرض الشدق . اسنانها ذرية متراصة .
تتميز بفارق الحجم الكبير بين الزعنفة الظهرية الامامية
والخلفية || الاثنى معتدلة النثار تضع في كل حول ، بين
اوائل ايار وواخر حزيران ، نحو ٤٠ مجراً || لحمها
كاعن الصنف قل من يرغب فيه .

٨٨٧٨ - خَدَّابَاء الخدباء : المقور من كل الحيوان .

٨٨٧٩ - خَدَّاج

خدجت الناقة وكل ذات ظلف وحافر : ألقت ولدها قبل
اوانه وان كان تام الخلق || قال ابن مطير :
لما لقحن الماء الفحل أعجلها
وقت النكاح فلم يتسن تخديج

٨٨٨٠ - خَدَّر Loge (F). Cell (E).

الفجوة من آلبيض النباتي حيث تتكون البزرة وتستقر .

٨٨٨١ - خَدَّراف رَفِيع *

Alectryon excelsum (S). Alectryon élevé (F).

نبات شجري وحيد الجنس والنوع من فصيلة السابنديات .
منبته زيلاندا الجديدة وسيشل وبعض مناطق الهند ||
شجرته كبيرة القد فرعاء دائمة . اوراقها اهليلجية معنقة .
ازهارها عشكولي التجميع . ازهارها خاسية التركيب . ثمارها
اهليلجية الشكل متنفخة ، سريعة الانفلاق ، قليلة
الالياف ، مأكولة ، مستحبة الطعم . عجائتها دهنية المادة
يستخرج منها دهن شائع الاستعمال المنزلي .

٨٨٨٢ - خَدَّرَة

الخدرة : السرة تقع من النخل قبل ان تنضج .

٨٨٨٣ - خَدَّرَنْق *

Galéode (F).

جنس رتيلاوات من فصيلة الخدرنقيات انزاعه قليلة اعطانها
البلاد اخارة . اجسامها كبيرة او متوسطة القد . اثوابها حنطية
او شقراء اللون . جرامزها مرهقة التهذيب الكثيف . جميعها
خبيثة مفترسة تسرح في الليل . تلسع وتسبب بعض الحمود
او بعض القشعريرة المعاودة . ج خدران .

٨٨٨٤ - خَدَّرَنْق عَنكَبُونِي *

Galeodes araneoides (S). Galéode aranéide (F).

Galeodes aranoides (E).

دويبة من العناكب القانصة من ثنائيات الرواية سداسيات
المشاقن تنتمي الى فصيلة الخدرنقيات || جسمها كبير القد
يطول نحو ٥ م . عند الذكر ونحو ٦ م . عند الاثنى .
صدراسها مخروطي الشكل ، حنطي اللون أشقر المواج ،
يتوسطه من القمة الى قاعدة التأشير خط اسود . عينها
زغميتان . شيسفاها ضليمان ، ذربا الحمة . فكها
مستطيلان ، مهدبان . جرامزها مرهقة التهذيب الكثيف .

٨٨٦٨ - خَدَّ البَنْت Eupatoire d'Avicenne (F).

هو غث ابن سينا ، اطلبه . Hemp agrimony (E).

٨٨٦٩ - خَدَّأ

الخدأ : الدود يخرج من روث البهم . للواحدة خدأة .

٨٨٧٠ - خَدَّابَة * ، رَمَّاح البَحْر ، أَبُو رُمَح

Tetrapterurus belone (S). Tétraptérure aiguille, Poisson-pique, Marlin (F). Two-handed sword (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة السيافيات . اعطانها البحر
الابيض المتوسط || جسمها كبير القد ، وشعي الشكل ،
يطول نحو ثلاثة امتار . ثوبها الى الشبهة الفضية المواج
تزرق وتختصر وتسر عند الظهر وتغير وتبيض عند البطن .
رأسها مخروطي ، خطمها ذلق منقادي الشكل ، عظم فكه
الاعلى وهو مخروطي الشكل يتقدم الاسفل نحو ٢٠ سم .
زعنفها الذيلية هلالية ، اما الظهرية فستطيلة ، قاطبة ،
ثلاثية النتوءات || لحمها مأكول لكنه كاعن الصنف كثير
المادة الزيتية .

٨٨٧١ - خَدَّاج

الخداج هو إلقاء الاثنى ولدها قبل اوانه لغير تمام الايام
وان كان تام الخلق .

٨٨٧٢ - خَدَّأوَة *

Nymphose (F). Pupation (E).

الطور الانتقالي الذي تمر به اليرقة قبل ان تتحول الى
حشرة كاملة .

٨٨٧٣ - خَدَّأرِيَّة

Aigle des steppes (F).

هي عقاب البادية ، اطلبها . Booted eagle (E).

٨٨٧٤ - خَدَّأش

Pinicola (S).

Durbec (F). Hawfinch (E).

جنس طير من الجواثم مخروطيات المناقير وفصيلة
الشرشوريات . انواعه المعروفة ستة منتشرة في معظم اصقاع
العالم || جميعها صغيرة القد . اطوالها قراوح من ١٦ الى
٢٢ سم . اثوابها متباينة الالوان الزاهية || قوتها الحبوب
والبزور البرية والحشرات || اشهر انواعه الخدأش المبدول .

٨٨٧٥ - خَدَّأش مَبْدُول *

Pinicola enucleator, Corythus enucleator (S).

Durbec vulgaire (F). Common Hawfinch (E).

طائر من الخدأش مهده يمتد من الشرق الاوسط الى اروبة
الجنوبية والشرقية || جسمه يطول نحو ٢٠ سم . رأسه كبير
الجرم . متقاربه مخروطي الشكل ضليع وقصير . ثوبه الى
الحمرة الخمرية يعلوها تبقيع اسود وابيض || يألف الغابات
ويعيش ذكراً وانثى حتى زمن الارتحال حيث يجتمع الى
اسراب كبيرة تقطع البلاد سعياً وراء المنتجع والرزق في
المناطق الحارة || يدثن عشه في الاشجار الرقيقة . الاثنى
تضع من ٤ الى ٦ بيضات تحضنها بمنابرة الذكر من
الى ١٣ الى ١٤ يوماً .

٨٨٧٦ - خَدَّال *

Oxyrhina, Oxyrrhina (S).

Oxyrhine, Oxyrrhine (F). Oxyrrhina (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة اللغميات ورتبة الاشلاق .
انواعه المعروفة ثلاثة اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة
الحرارة || اجسامها مستطيلة يغلب فيها الشكل الوشعي .
رؤوسها هرمية المخاطم ، كبيرة الاشداق ، مستدقة الاسنان
المتكاثفة التجميع ، صغيرة النياسم والمناسم .
اشهر انواعه خدال المتوسط .

٨٨٩١ - خَدَمَانَة ٥ Kundmannia (S).

Kundmannie, Brignolle, Campdérie (F).

جنس نباتات عشبية معمرة برية من فصيلة الخيميات .
أنواعها المعروفة عديدة منبتها بعض مناطق حوض البحر
الابيض المتوسط واروبة الجنوبية والوسطى || سوقها
منتصبة فرعاء . أوراقها ريشية . أزهارها صيواني التجميع ،
طرفي الارتكاز . أزهارها متباينة الاحجام صفراء اللون
او بيضاء || أشهر أنواعها واعرفها الخدمانة السورية .

٨٨٩٢ - خَدَمَانَة سُورِيَّة ٥ Kundmannia

syriaca (S). Kundmannie de Syrie (F).

نوع من الخدمانة . ساقها ملساء فرعاء تعلو نحو ٦٠ سم .
أوراقها ريشية ، غضة ، تطول من ١٠ الى ١٥ سم .
أزهارها صيواني التجميع ، يعد من ١٠ الى ١٥ شعاعاً .
أزهارها صفراء اللون || تنويرها ربيعي .

٨٨٩٣ - خَدَتَّق ٥ Mygales (S).

Mygale (F). Mygale, Trap-door spider (E).

جنس عناكب من فصيلة الخدتنقيات . أنواعه المعروفة نحو
٢٠ جميعها من رتيلاوات البلاد الحارة والاستوائية . منها
البناءة والبياشة والنساجة . اجسامها متباينة الاحجام ،
منها الكبيرة الخارقة ومنها الوسطى والصغيرة . اثوابها مختلفة
الالوان . جرامزها مرهفة الهلب الكثيف || جميعها خبيثة
تلسع وتسبب بعض الحمود والقشعريرة المعادة .

٨٨٩٤ - خَدَتَّق سَاع ٥ Cteniza sauvagel (S).

Ctenize, Mygale plonnière, Mygalodonte (F).

دويبة من العناكب وحيدة الجنس والنوع من فصيلة
الخدتنقيات . موطنها معظم مناطق البلاد المعتدلة الحارة
اخصها حوض البحر الابيض المتوسط || جسمها يطول
نحو ٢٠ مم . ثوبها الى الرتبة الغبراء بطنها منقط بالاسود .
قوائمها كبيرة نشيطة || عكديتها بيش في التربة اسطوانى
الشكل ، جالس الارتكاز ، مالس الجانب ، مبطن القمر .
تكتم فوهته بصمام من النواس المجهول بالتراب والجشالة ،
مبكل الطرف تفتحه عند الخروج وتوصده عند الدخول ||
مسرحتها دجوي يستمر طوال الليل . قوتها الحشرات والموام .

٨٨٩٥ - خَدَتَّق شَرَس ٥ Mygale avicularia (S).

Mygale aviculaire (F). Bird-eating spider, Bird-spider (E).

دويبة من العناكب المفترسة وفصيلة الخدتنقيات . جسمها
كبير القد ، كثير الهلب . الانثى اكبر جرمًا من الذكر
وتطول نحو ٨٠ مم . اما الذكر فلا يتجاوز ٧٠ مم .
صدراسها مجني الشكل عثاري الاحاديد . عيناها زئيمتان .
شيفها كبيران ، ضليهان ، محجنان ، ذريان . فكها
مستغلخان ، مجهزان بعقاف محلية حادة . جرامزها
مستطيلة ، غليظة ، كثيفة الهلب . بطنها بيضي الشكل ،
رباعي الروايا والمشائن ينتهي بزائدتين . ثوبها الى السمرة
الخطية يعلوها موج جزوي || تألف البراري والاماكن
الاهلة . عكديتها بيش في التربة اسطوانى الشكل ، عمودي
الغور ، فسيح القمر ، تكتم فوهته بصمام من النواس
والجشالة والطين تبكله في التربة بمفصلة من النواس المتين
الحبك || مسرحتها دجوي . قوتها الحشرات والجوارن والعطاء
والوزغ وفراخ المصافير || ملجئها التناسلي لا يختلف عن
ملجئ غيرها من العناكب || لسعها شديدة الالم تسبب
بعض الحمود وقشعريرة معادة وحرارة تستمر من ٢٤ الى
٤٨ ساعة || تعتبر من الدويبات الضارة المؤذية .

بطنها كبير القد حنطي اللون ، كثيف الهلب الاغبر
تعلوه سبعة خطوط معترضة فحمية السواد || تألف البراري .
عكديتها سعة متوسطة الرحابة تنسجها بين الحجارة
والاعشاب النجمية . مسرحتها دجوي . قوتها الحشرات
اخصها المجنحة || يباتها الشتوي يستمر نحو خمسة اشهر
وينقضي ضمن جراب تنسجه تحت الحجارة القريب من
عكديتها || تعيش نحو اربع سنوات . ملجئها الحياتي لا
يختلف عن ملجئ غيرها من العناكب || تلسع الناس
فتؤذيهم وتسبب لهم بعض الحمود او بعض القشعريرة
المعادة .

٨٨٨٥ - خَدَرَنَقِيَّات ٥ Galeodidae, Solpugidae (S).

Galeodidés, Solpugidés (F).

Galeodidae, Solpugidae (E).

فصيلة الخدران من العنكبوتيات . اجناسها وانواعها
عديدة . اعطانها البلاد الحارة . جميعها مفترسة كبيرة القد
او متوسطة . تسرح في الليل قوتها الحشرات الصغيرة اخصها
المجنحة من الموام الى الذباب .

٨٨٨٦ - خَدَرَنَقِيَّات * قَشَاشِرَا اِفْرِيقِيَّة Kedrostis (S).

Kedrostis (S). Kédrostis, Bryone africaine (F). Kedrostis (E).

نبات عشبي بري طلي عارش من فصيلة القرعيات يطول
من ٤ الى ٦ امتار . حوالقه بسيطة . اوراقه كبيرة ثلاثية
او خماسية التفرييض الاصبعي الشكل . نصلها مالس البشرة
عابق الخضار . أزهاره الذكورية عنقودية التجميع اما
الانثوية ففردية . ثماره تبدو خضراء اللون وتستقر ، عند
الادراك في على الاحمر البرتقالي .

٨٨٨٧ - خَدَرِيَّات ٥ Lycopodiaceae (S).

Lycopodiacees (F). Lycopodiaceas (E).

ومنهم من سماها فصيلة رجل الذئب وفصيلة مقلب الذئب .
فصيلة نباتية من مستورات الزهر الوعائية . اجناسها
وانواعها عديدة . جميعها نباتات عشبية معمرة سوقها مدادة ،
أوراقها خيطية كثيفة التجميع . يكثر وجودها في المناطق
وفي الاراضي الرطبة .

٨٨٨٨ - خَدَرِيَّة * رَحَن ، رَجُل الذئب

Lycopodium (S). Lycopode, Griffes de loup, Mousse
terrestre (F). Club moss, Wolf's-claw (E). Kloben-
moss, Bärlappmoss, Wolfsklau (D). Licopodo,
Zampa di lupo (I).

جنس نباتات عشبية برية طلية معمرة من فصيلة الخدريات .
أنواعها عديدة . جميعها من نباتات المناطق الحارة والمعتدلة .
ترضب في الموام الرطبة . سوقها مدادة او منتصبة تعلو نحو
٥٠ سم . . أزراقها خيطية ، قصيرة ، كثيفة ، متراكبة .
أزهارها سنبلية مرصوفة . سنابلها فردية او ثلاثية التجميع
من منافعها الطبية انها مهوكة ومسهلة . ويستخرج منها مسحوق
ناعم ، خفيف كالحباب ، اصفر اللون ، سريع الاشتعال
يستعمل في التجميع وفي تركيب بعض العقاقير .

٨٨٨٩ - خَدَف Gouvernail (F). Rudder (E).

الخدف : سكان السفينة .

٨٨٩٠ - خَدَلَة

الخدلة : الحلية الضبيلة من العنب : والساق من الصابة
(شجرة الصاب) .




خدروس



خدريّة



خدمانة سورية



خدتنق ساع



خدتنق شرَس



خَدُوش أسود



خَدُوش مَمَاج



خَدُوش مَخَطَط




خَدَأَق



خَدَراف



خَدَرَفَة



خَدَرُوفَة الارز

والاصفر الباهت || اوراقها مأكولة ، مستحبة الطعم ، مذاقها بين الخس والهندباء .

٨٩٠٤ - خَدَرُوفَة ٥ ، قَلُوت ٥ *
Voluta (S). Volute (F). Voluta (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الخدرفيات . انواعه المعاصرة المعروفة نحو ١٠٠ منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة . تعيش على رمال الشواطئ || اصداقها متباينة الاشكال والأحجام ، يكثر فيها الشكل الاهليلجي . اعقابها صغيرة محلزنة . فروجها مستطيلة ، ضيقة ، ملتوية الاريفات او مغلوية . جميعها ملونة ومزخرفة ومسنجة || اجسامها شبه بيضية الشكل مستغلظة الرؤوس الثنائية اللوامس المميونة . افواهها مجهزة باخطام قوية مزودة بأسنان دقيقة محببة . اشهر انواعها :

— مركبة نبتون V. char de Neptune
— ذيل الطاووس V. queue de Paon

٨٩٠٥ - خَدَرُوفِيَّات ٥
Volutidae (S). Volutidés (F). Volutidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل ، اماميات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصداقها سمكية ملونة جميلة الزخارف ، متباينة الاشكال منها المحلزنة الاعقاب ومنها المطوقة بالمناخس الحادة . اعرف اجناسها واشهرها الخدرفة .

٨٩٠٦ - خَدَرُوفَة ٥
Piricularia

جنس فطور مجهرية من فصيلة الطوحيات . مشيجه داخلي الانتشاب . اجربته الكنيديية ضمية التجميع ، قليلة الفروع الملوثة . كئائده خدروفية الشكل ، فردية ، شفافة ، شفعية الانقسام || انواعه قليلة العدد اعرفها خدروفة الارز وخدروفة الموز .

٨٩٠٧ - خَدَرُوفَة الارز ٥ *

Piricularia oryzae (S). Brunissure du riz, Piriculariose du riz (F). Pitting disease of rice, Blast (E).

فطر مجهري يصيب الارز في اوراقه وسوقه فيؤذيه اشد الاذى || مظهره الخارجي يقع سمر كشفة التجميع ، هالية الحافة الفضية الموج تعلو نصال العصف في اواسطها وعند اطرافها العليسا فتذبلها وتقودها الى الياس . وهو على السوق يقع سمر تركب الزام الاخير . عند انتشاب السنبلة فتعطب الالياف وتسبب التواء السنبلة وبذوبها قبل ادراك الشلب || يدرك باستعمال الاسمدة مع الدورة الزراعية .

٨٩٠٨ - خَدَرُوفَة الموز ٥
Piricularia grisea (S). Piriculariosa de la banane (F). Pitting disease of banana (E).

فطر مجهري يصيب ثمار الموز فيعطبها || مظهره الخارجي قروح سمراء اللون ، فضية الحالة ، مستديرة الشكل . قطرها من ١٠ الى ١٥ مم . تركب قشور الثمار في طور نموها النهائي فتقرحها وتعطبها || يبيكافج باستعمال احد الفواطير الفعالة الحالية من المواد النحاسية .

٨٩٠٩ - خَدَعَة
Parcelle (F). Portion (E). هي القطعة من الارض .

٨٨٩٦ - خَدَنَقِيَّات ٥
Mygalidae (S).

Mygalidés (F). Mygalidae (E).

فصيلة من الرتيلاوات . اجناسها المعروفة ٢٤ تضم نحو ٣٥٠ نوعاً . اعطانها البلاد الاستوائية والحارة وبعضها يعيش في البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها متباينة القد ، كثيرة الهلب . جميعها مفترسة || اشهر اجناسها الخدنق .

٨٨٩٧ - خَدُوش ٥ ، أَلْتِيز الصَلْبِيَّات ، خُنْفَسَاء برغوثية ، نُضَارِيَّة الصَلْبِيَّات فيلوتراته
Phyllotreta (S). Altise des crucifères, Puce de terre (F). Flea beetle (E). Kohlerdfloh (D).

جنس خنافس صغيرة القد من فصيلة النضاريات . انواعه عديدة ، طولها يراوح من ٢ الى ٤ مم . لوناً يختلف مع النوع || يركب النباتات الصليبية ولا يعف عن مشاتل التبغ . قوته ما يمتصه من العصارة || يرقاته دقيقة نحيلة ، سمراء اللون ، تلغم الاوراق والجذوع والجذور || اعرف انواعه ما يلي :

٨٨٩٨ - خَدُوش أسود ٥
Phyllotreta atra (S).

نوع من الخدوش طولها نحو ٢ مم . ثوبه سوي السواد اللامع || يركب النباتات الفتية اخصها مشاتل الخس والتبغ . يرقاته قاضمة مؤذية .

٨٨٩٩ - خَدُوش مَمَاج ٥ *

Phyllotreta undulata (S).

نوع من الخدوش طولها نحو ٢ مم . ثوبه اسود عايق . يعلو كل من غمدية خط قاطب اصفر اللون زاهي الموج . ارجله سمر || يرقاته شديدة الاذى تقضم الجذور .

٨٩٠٠ - خَدُوش مَخَطَط ٥ *

Phyllotreta nemorum (S). Altise des crucifères (F). Striped turnip flea beetle, Turnip fly (E). Gestreifte Erdflöhe (D).

نوع من الخدوش طولها نحو ٣ مم . ثوبه اسود لامع ، يعلو كل من غمدية خط قاطب اصفر . ساقه صفراء . فخذيه سوداء || يركب جميع الصليبيات اخصها السلق والخردل والملفوف والكرنب || يرقاته تلغم الاوراق وتؤذيها .

٨٩٠١ - خَدُوتَر ٥
Logette (F).

Small lodge, Small cell (E).

كل نفرة في نص المتك حيث يوجد الطلع تدعى خديرا .

٨٩٠٢ - خَدَأَق ٥
Sepia officinalis (S).

Seiche officinale (F). Common cuttle-fish (E).

نوع من الحبار عشاري الذوائب الرأسية منها اثنين مستطيلتين جميعها محببة الاطراف اخاذة ناشبة ومنقبضة . سمي خدأقاً لانه اذا دهم خلق في الماء مادة سوداء اللون سريعة الانتشار تحجب عن النظر وتمكنه من الهرب .

٨٩٠٣ - خَدَرَأَف ٥
Hypochaeris (S).

Porcelle, Porcellie (F).

جنس نباتات عشبية حولية برية برعوية من فصيلة المركبات انواعها المعروفة عديدة جميعها من نباتات جبال البلاد المعتدلة الحرارة || جذورها وتدية . سوقها مقرة . اوراقها قرصية الانتشاب مستطيلة النصال الملوقة الشكل ، منشارية الحافة . شماريها دقيقة . ازهارها رؤسية . قلافة ازهارها عديدة القنابات اللامتساوية القد . الوانها تراوح بين التبي

٨٩٢٢ - خَرَّاطِينِيَّات Lombricidés (F).
Lumbricidae (E). هي الخراطونيات فصيلة من الديدان .

٨٩٢٣ - خَرَّاعَة ، فَسُولَة Rachitisme (F).
Rachitis (E). مرض بيولوجي من امراض النمو يصيب الحيوان فيشوه عظامه ويؤخر تصلبها . اسبابه نقص في الغذاء أو عوز في غدد الجسم .

٨٩٢٤ - خَرَّاف ، خِرَاف Cueillage, Cueillaison, Xeraph (F).
Cueille (F), Gathering-time (E). هو وقت اجتناء الثمر . خرف الثمار : اجتناها . أخرف النخل والتفاح والاجاص : حان له ان يخرف أي ان يجنى .

٨٩٢٥ - خِرَافِ الْبَحْرِ Manatidae (S).
Manatidés (F), Manatidae (E).

فصيلة حيوانات مائية لبونة من رتبة الخيلان أي بنات الماء . مسرحها البحار والانهار . اعطانها معظم المياه الافريقية والامريكية . يكثر وجودها في الانهر الكبيرة وعند مصباتها . اجسامها شبه اسطوانية الشكل مضغوطة المقدم والمؤخر ، تطول من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . رؤوسها قصيرة الاعناق والاعظام . شفاها العليا بحاجحة ، مستديرة الطرف . شعورها هليية مبعثرة . جلودها ناعمة خبنة || الانثى اصغر قدأ من الذكر . يحملها يلوم نحو ٣٦٠ يوماً تضع في نهايته من جرو الى جروين .

انواعه المعروفة ثلاثة : خروف البحر الافريقي والامريكي واللاتفيري الذي يعيش في نهري الامازون والاورينوك .

٨٩٢٦ - خَرَّافَة * Chimaera (S).

Chimère (F), Chimera (E). جنس اسماك بحرية من فصيلة الخرافيات . انواعها المعروفة خمسة جميعها كبيرة القد طولها يراوح من ٦٠ الى ١٠٠ سم . اجسامها مستحجنة الشكل ، عادمة الحراشف . فضية اللون غليظة الرأس والصدر ، مقطوعة الخطم ، مستدقة المؤخر ، مستطيلة الذنب السوطي الشكل || لحمها مأكول متوسط الصنف . يستخرج من كبدها زيت كريحه الرائحة يستعمل في الصناعة والانارة .

٨٩٢٧ - خَرَّافِيَّات Chimeridae (S).
Chimérédés (F), Chimeridae (E).

فصيلة اسماك بحرية من رتبة كاملات الرؤوس اجناسها وانواعها . المعروفة ثمانية اعطانها المحيط الاطلسي والبحر المتوسط . جميعها عجيبة الشكل ، مستطيلة الجسم العادم الفلوس ، غليظة الرأس والصدر ، مستدقة الذنب السوطي الطرف .

٨٩٢٨ - خَرَّام Astère attique (F), Sea aster (E).
راجع اسطراطيقيوس .

٨٩٢٩ - خَرَّاب Outarde houbara (F).

Houbara bustard (E). هي الحبارى المتوجة راجعها . الجمع خراب وأخراب وخربان .

٨٩٣٠ - خَرَبَاق Eranthis (S), Eranche (F).

جنس نباتات عشبية برية طيبة معمرة من فصيلة الشقيقيات . انواعه قليلة جميعها جذمورية ، نجمية . صغيرة القد . اوراقها قرصية التجميع ، تلامس التربة ، معنقة ،

٧٣٤٥ - خُدعة Tranche (F), Slice (E).

القطعة من البطيخ والقرع ونحوها .

٨٩١١ - خُدَق Fiente (F), Mute (E).

الخدق والذرق والسلمح : روث الطائر . يقال خدق الطائر وذرق وسلمح .

٨٩١٢ - خُدَّتَق ، خَزَرَنَق Aignée (mâle) (F), Spider (male) (E).

الخدنق : ذكر العناكب الكبيرة القد . اما الخزرنق فذكر العناكب الصغيرة القد . والعكاس هو ذكر العناكب بدون تخصيص .

٨٩١٣ - خُصْر Boitard (F), Vertical floor-bering (E).

الخر : قم الرحي . والخرّي : طوق الرحي وهو الخرق الذي تلفى فيه الحب .

٨٩١٤ - خُصْرَانَان

الخراتان نيجان وهما زبرة الاسد . وكل واحد منهما خراة . اطلب زبرة .

٨٩١٥ - خُجْرَاج Impôt (F), Tax, Impost (E).

الخراج هو المال المضروب على الارض واصله ما يحصل من غلة الارض .

٨٩١٦ - خُجْرَاج ، دُفْصَل Abscess (F), Abscess (E).

كل ما يخرج بالبدن من البثر ونحوه . الواحدة خراجة ودملة . ج خراج وخراجات ودمل ودمايل .

٨٩١٧ - خُجْرَاوَة * Spreo (S).

Spreo, Merle métallique (F).

طائر من الجواثم سنيات المناقير وفصيلة الزرزوريات . اعطانه تمتد من افريقية الشرقية الى الجنوبية || جسمه متوسط القد ، قريب الشبه بالزرزور الا انه اطول ساقاً واعرض ذنباً || ثوبه جميل الالوان المتراكبة يعلوها الاخضر الاسفع . بطنه وزمكاه الى الصهبة الخطية || ريشه مرغوب فيه ، شائع الاستعمال التزييني .

٨٩١٨ - خُجْرَاشَة Furfur (F), Furfur (E).

الخراشة رغام من الخلايا الميتة يكتنف قشار الجلد أو النسيج النباتية .

٨٩١٩ - خُجْرَاشِيّ Furfuracé (F).

Furfuraceous (E).

نعت تعريفي يطلق على السطوح الحيوانية والنباتية المدثرة بنشاء من الرغام الشبيه بالنخالة .

٨٩٢٠ - خُجْرَاص ، خُجْرَاص Homme pendu (F).

الخراص والخراص نبات عسقول مشهور باسم بحلبية ، اطلبها .

٨٩٢١ - خُجْرَاطِيْط Teignes des plantes (F).

Tinea of plants (E).

اسم شامل يدل على انواع مختلفة من الفراش تنسب الى حشرقيات الاجنحة جميعها صغيرة القد بسطها من ٨ الى ١٥ مم . اجنحتها منقوشة ومهذبة الخشار . يرقاتها قلغم الاوراق وتؤذيها || من اشهر انواعه خرطيط التفاح والتين والحمضيات والزيتون .



خَرَّارَة



خَرَّافَة



خرباق شتوي

شراخية تحمل من الزهرة الى الزهرتين . والزهرة كبيرة القد، جميلة الشكل، لونها الى الابيض يملوه موج وردي. ازهاره يستمر من اوائل كانون الاول الى اواخر شباط . والخريق الاسود مسهل مائي شديد الوقع ، مدر للطمث ومقو للقلب . بزوره تقتل الدجاج .

٨٩٣٨ - خَرَبَاق الشَّرْق . *Helleborus orientalis* (S). *Ellébore d'Orient* (F).

عشبة تزيينية معمرة تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم. ضرورها عديدة . اوراقها قرصية التجميع اهليلجية الشكل سباعية او تساعية التشريم ، نصلها خلي الصفحة السفلى . ازهارها كبيرة القد مختلفة الالوان من الابيض الاخضر الى الوردي والارجواني والاحضر الاسمر || ازهاره يستمر من شباط الى ايار .

٨٩٣٩ - خَرَبَاق عَطِير . *Helleborus odorus* (S). *Ellébore odorant* (F).

عشبة تزيينية معمرة تملو من ٣٠ الى ٤٠ سم ورقها قرصية وحيدة ، وريقاتها من ٧ الى ١١ . ازهارها كبيرة القد فواحة الارجيح المستعبد ، لونها الى الاخضر الفستقي || ازهارها يستمر من شباط الى نيسان .

٨٩٤٠ - خَرَبَاق عَقِيْقِي . *Helleborus atrorubens* (S). *Ellébore pourpre-noir* (F).

عشبة تزيينية معمرة تملو نحو ٣٠ سم. اوراقها عابلة قرصية التجميع ، برثنية الشكل ، تساعية الوريقات ، نصلها خلي الصفحة السفلى ، لونه الى الاخضر الزاهي . ازهارها صغيرة القد كثيرة العدد ، عقيقية اللون ، لا عرف لها || ازهارها يستمر من اذار الى ايار .

٨٩٤١ - خَرَبَاق مُسْتَمْدِر الْوَرَق . *Helleborus cyclophyllus* (S). *Ellébore à feuille circulaire* (F).

عشبة معمرة تملو نحو ٣٠ سم. اوراقها قرصية التجميع ، مستديرة الشكل ، سباعية او تساعية التشريم ، وريقاتها بارزة العروق ، زباد النصل على صفحته السفلى . ساقها شراخية تحمل من ٣ الى ٤ ازهار كبيرة القد عطرية العرف لونها الى الاخضر الفستقي || ازهارها يستمر من نيسان الى ايار .

٨٩٤٢ - خَرَبَاق نَجَس ، رَجُل الْعَنْقَاء . *Helleborus foetidus* (S). *Ellébore fétide*, *Pied de griffon*, *Patte d'ours*, *Rose de serpent* (F). *Bear's foot*, *Setter-wort*, *Stinking hellebore* (E). *Stinkendes nleswurz* (D). *Elleboro puzzolante*, *Piè di gallo*, *P. di griffo* (I).

عشبة برية وتزيينية معمرة تملو نحو ٧٠ سم. اوراقها قرصية التجميع ، كبيرة القد ، كثيرة التشريم ، نصلها خلي الصفحة السفلى . ساقها شراخية مستطيلة تحمل بعض الازهار الكريهة الرائحة ، الخضراء اللون ، المرتكزة على قنابات سنانية لونها الى الاخضر الاصفر يحوقها اطار خري || ازهارها يستمر من شباط الى ايار .

٨٩٤٣ - خَرَبَاقَات . *Elléborées*, *Helléborées* (F). سبط من فصيلة الشقيقات . اجناسه وانواعه نحو ١٥ جميعها نباتات معمرة . اوراقها قرصية التجميع ، جلدية النصل المفصص والمشرم . سوقها شراخية تحمل في اعلاها من الزهرة الى بعض الازهار الجميلة المنظر ، المختلفة الاحجام والالوان .

مستديرة النصل الخماسي او السباعي التشريم . سوقها شراخية نحيلة تحمل بعض الازهار الصغيرة القد || اعرف انواعه واشهرها الخرباق الشتوي .

٨٩٣١ - خَرَبَاق شَتَوِي * . *Eranthis hiemalis* (S). *Eranthe d'hiver*, *Hellébore d'hiver* (F). *Winter aconite*, *Winter hellebore* (E). *Echter winterling* (D). *Piè di gallo* (I).

نوع من الخرباق وهو نبات عشبي طبي جذموري معم . اوراقه قرصية معنقة خاسية او سباعية التشريم . ساقه شراخية نحيلة دقيقة تملو من ٩ الى ١٢ سم. ازهاره صغيرة القد || يستخرج من جذاميره مواد طبية بيطرية نافعة ورائحة .

٨٩٣٢ - خَرَبَاق . *Pastèque* (F). *Water-melon* (E). هو البطيخ ، اطلبه .

٨٩٣٣ - خَرَبَاقِيصَة . *Blatte (femelle)* (F). *Black-beetle (female)* (E). الخرباصيص : الانثى من بنات وردان .

٨٩٣٤ - خَرَبَاق . *Helleborus* (S). *Ellébore*, *Hellébore* (F). *Hellebore* (E).

اسمه العلمي يوناني وقد أخذ عن السامي الذي يعني « علاج الجنون » || جنس نباتات عشبية معمرة سامة من الخربقيات وفصيلة الشقيقات . انواعه عديدة جميعها جصاصمة تألف الازهار الكلسية . ازهارها كبيرة القد جميلة الشكل ، بتلاتها بوقية يراوح عددها من ٨ الى ١٠ ، فصلاتها خاسية ، اسديتها من ٣٠ الى ٦٠ . يستخرج من جذور بعض انواعها مواد غلوكوزية مخدرة ومسهلة كانت تستعمل في الطب القديم وقد اقتصر استعمالها الآن على الطب البيطري || اعرف واشهر انواعه ما يتبع .

٨٩٣٥ - خَرَبَاق اخْضَر * . *Helleborus viridis* (S). *Ellébore vert* (F).

عشبة طبية وتزيينية معمرة تملو نحو ٤٥ سم. اوراقها قرصية التجميع عابلة تشرم عن ٩ او ١١ وريقة مستطيلة ، نصلها مائل البثرة ، لونها الى البحري العابق . ساقها شراخية تحمل من ٣ الى ٥ ازهار كبيرة القد ، لا عرف لها لونها الى الاخضر الزاهي || ازهاره يستمر من اذار الى ايار || يستعمل طبياً استعمال الخريق الاسود الا انه اخصب مادة راشد مفعولاً .

٨٩٣٦ - خَرَبَاق اَرْجَوَانِي . *Helleborus purpurascens* (S). *Ellébore pourpré* (F).

عشبة تزيينية معمرة تملو نحو ٣٠ سم. اوراقها عابلة ، قرصية التجميع ، كفية الشكل ، خاسية الوريقات ، نصلها خلي الصفحة السفلى . لونه الى الخضار الجليل الزاهي . ازهارها كبيرة القد ، خرية اللون ثم ارجوانية لا عرف لها || ازهاره يستمر من اذار الى نيسان .

٨٩٣٧ - خَرَبَاق اَسْوَد * . *Helleborus niger* (S). *Ellébore noir*, *Rose de Noël*, *Herbe de feu* (F). *Christmas-rose*, *Black hellebore* (E). *Christwurz*, *Schwarze nieswurz* (D). *Elleboro nero*, *Rosa di Natale* (I).

عشبة طبية وتزيينية معمرة تملو من ١٥ الى ٣٠ سم. اوراقها قرصية التجميع ، سباعية او تساعية التشريم ، وريقاتها سنانية الشكل ، نصلها عابق الخضار . ساقها



خرباق اخضر



خرباق اسود



خرباق نجس



خربوس



خربوق ابيض



خردل ابيض



خردل اسود



خردل بري

٨٩٤٤ - خَرْبَقِينَ أَخْضَرَ Elléborine (F).

مادة غلوكوزية مخدرة تستخرج من جذور الخربق الاخضر وقد تكون سامة ممتة عندما تبلغ جرعتها ٠,٢٥ من الغرام || كانت تستعمل في الطب القديم وقد اقتصر استعمالها الحالي على الطب البيطري .

٨٩٤٥ - خَرْبَقِينَ أَسْوَدَ Elléboréine (F).

مادة غلوكوزية مخدرة تستخرج من جذور الخربق الاسود . جرعتها تكون سامة ممتة عندما تبلغ ٠,٣٠ من الغرام كانت تستعمل استعمال الخربقين الاخضر .

٨٩٤٦ - خَرْبُوسٌ * Ochyropus (S).

Ochyrope (F). Ochyropus (E).
جنس حشرات قانصة مفترسة نافعة من غديات الاجنحة وفصيلة السلكوتيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض مناطق افريقية الشمالية || اجسامها كبيرة ، محصورة ، تطول من ٤ الى ٥ سم . رؤوسها ضخمة ، تأشيرها ضليعة ، منعقفة الاطراف . قرونها الاستشعارية خيطية مدبسة الاطراف . كواسلها يرمية الشكل . اغدادها مجنية ، مخددة لاحقة . اثوابها الى السواد الاسفع || تسرح في الليل وتبيت في النهار تحت الحجارة والاشخاب . قوتها كل ما تستطيع قتصه من حشرات وحلازين وبزاق .

٨٩٤٧ - خَرْبُوقٌ Veratrum (S). Varaire, Vérate (F).

جنس نباتات عشبية جذمورية معمرة ، سامة في جميع اجزائها ، من فصيلة الزنبقيات السورنجانيات . انواعه قليلة ، جذاميرها ضخمة مدادة ، سوقها منتصبه قوية فرعاء . اوراقها كبيرة القد بيضيه الشكل متعاقبة منخفضة النصل بمحاذاة الضلع . ازهارها جميلة الشكل لونها يختلف مع النوع || اعرف واشهر انواعه ما يلي .

٨٩٤٨ - خَرْبُوقٌ أبيضٌ * ، بَقْلَةُ الرِّمَاح Veratrum album (S). Varaire blanc, Vérate blanc, Ellébore blanc (F). White veratrum, Lang-wort (E). Weisser germer (D). Veladro bianco (I).

نوع من الخربوق وهو نبات طبي وتريبي . يستخرج من جذاميره وسائر اجزائه مادة شبه قلوية تستعمل ضد الحميات ولعلاج الالتهابات || ساقه تعلو نحو ٥٠ سم . اوراقه زباء الصفحة السفلى . ازهاره الى البياض العاجي يعلوه موج اخضر || ازهاره صيني يستمر من اواسط تموز الى اواخر آب .

٨٩٤٩ - خَرْبُوقٌ أَسْوَدَ Veratrum nigrum (S).

Varaire noir (F).
نوع من الخربوق البري والتريبي . ساقه تعلو نحو ١٠٠ سم . اوراقه ملساء النصل على صفحتيه . ازهاره بلون الارجوان العابق القاتم || ازهاره صيني يستمر من اوائل تموز الى اواخر آب .

٨٩٥٠ - خَرْبُوقِينَ Vérateine (F). Veratrin (E).

مادة شبه قلوية تستخرج من بذور الخربوق الابيض كثيرة الاستعمال الطبي ، مضادة للحميات وبانمة الالتهابات .

٨٩٥١ - خَرْبُوسٌ ، خَرْبُوسٌ Carpinus (S).

Charme (F). Hornebeam (E).
هو الشرم جنس اشجار حرجية من البتوليات . انواعه عديدة . اطلب شرم .

٨٩٥٢ - خَرَّتْ

خرت = ثقب . يقال خرت انف الجمل والثور ...

٨٩٥٣ - خَرْوَع

الخرنع هو ثمر الصقلاب .

٨٩٥٤ - خَيْرْتِيَت Rhinocéros bicolore (F).

هو الكركدن الافريقي . Bicorned rhinoceros (E).

٨٩٥٥ - خَيْرْتَاءَة Fourmi rougeâtre (F).

Reddish ant (E).
نملة مستطيلة القد ثوبها الى الخمرة . ج خرتاء .

٨٩٥٦ - خَرْخَفْسِي Orme champêtre (F).

اطلب بوقيصا حمراء . English elm (E).

٨٩٥٧ - خَرْدَل Sinapis (S).

Moutarde, Sénévé (F). Mustard (E).

جنس نباتات عشبية برية وزراعية من فصيلة الصليبيات تنبت مع الزرع في الحقول وعلى حواشي الطرق . وقد يزرع بعضها لجناء بزوره الطيبة والمستعملة في صناعة الخردل . اوراقه متعاقبة يختلف شكلها وتفريضها باختلاف نوعها . ازهاره عنقودي التجميع . ازهاره صغيرة القد ، صفراء اللون . بزوره صغيرة ، حريفة ، نافطة ، غنية بالمواد الدهنية وبميروزين وميرونات البوتاسيوم || اشهر انواعه الثلاثة التالية .

٨٩٥٨ - خَرْدَلٌ أبيضٌ * ، أَسْفَنْد Sinapis alba, Brassica alba (S). Moutarde blanche, Sénévé blanc (F). White mustard, Salad mustard, Cultivated mustard (E). Echter senf, Weisser senf (D). Senape blanca, Luchettone (I).

هو الخردل الزراعي يعلو نحو ٥٠ سم . ازهاره الى الصفرة الفاقمة . بزوره حنطية اللون ، صفر الموج تستعمل في صناعة الخردل لانها لا تحوي ميرونات البوتاسيوم . ومنهم من استعمله كنبات علي او سماد خضري .

٨٩٥٩ - خَرْدَلٌ أَسْوَدَ Sinapis nigra, Brassica nigra (S). Moutarde noire, Sénévé noir (F). Black mustard (E). Senfkohl, Senf (D). Mostarda, Senape nero (I).

هو الخردل الكبير يعلو نحو ١٠٠ سم . اوراقه زباء مفرصة . ازهاره صفر . بزوره حمر ثم تستمر مع الزمن تحوي الكثير من مادتي الميرونين وميرونات البوتاسيوم . غناها بالادهان الطيارة الحريفة النافطة يجعلها معرقة ، تدر اللعاب وتنبه الهضم والقلب || يستخرج من بزوره بعد نقعها بالماء روح الخردل .

٨٩٦٠ - خَرْدَلٌ برِّي * ، خَرْدَلٌ حَقْلِي Sinapis arvensis, Brassica sinapistrum (S). Moutarde des champs, M. sauvage, Raveluche, Ravison (F). Wild mustard, Corn mustard, Charlock (E). Wilder ackersenf, Ackersenf (D). Senape salvatica, S. arvense, S. del campi (I).

هو الخردل البري ينبت في الحقول مع الزروع وعلى حواشي الطرق . كثرة وجوده ضارة تؤذي الزروع وتقاسمها الغذاء || يكافح باستعمال اخذ العواشب الحديثة القوة الفاعلية .

٨٩٦١ - خَرْدَلٌ فَارِسِي Cresson des champs (F).

هو حرف السطوح ، اطلبه . Field cress (E).



خرديل فيرجينية



خرز الصخور



خرشة الثمار



خرشة الزيتون



خرشة الكرز

٨٩٦٩ - خَرَزِيَّات

Parmeliaceae (S).

Parméliacées (F). Parmeliaceae (E).

فصيلة من الحزاز المورق الاربع . انواعها عديدة بعضها طبي نافع كخرز الصخور .

٨٩٧٠ - خِرْس

Jachère (F). Fallow (E).

الحرس : الأرض التي لم تحرث للزراعة .

٨٩٧١ - خَرَسُوِيَّات

Chrysopidae (S).

Chrysopidés (F). Chrysopidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة شارفات الاجنحة وطبقة عصيات الجناح . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم || جميعها نافعة مفيدة تقضي على الارق والهوم . اشهر انواعها الخرسوب .

٨٩٧٢ - خَرَش ، خَرَش

خرش الغصن : اجتذبه اليه بالمجن .

٨٩٧٣ - خِرْشَاء

الخرشاء هي جلدة البيضة الداخلة (الهديب) وهي جلد الحية || وخرشام العسل : شمع وما فيه من ميت نخله .

٨٩٧٤ - خَرَشَةُ الثَّار * ذُبَابَةُ الْبَحْرِ الْمَتَوَسِّط ،

ذُبَابَةُ الْبَرْتَقَال ، ذُبَابَةُ الْفَوَاكِهِ

Ceratitis capitata (S). Mouche des fruits, M. des oranges (F). Mediterranean fruit fly (E). Mittelmeerfruchtfliege (D).

ذبابة من فصيلة الخرشيات . موطنها جميع الاصقاع الحارة والمعتدلة . يكثر وجودها في مختلف اقاليم حوض البحر المتوسط || طولها من ٤ الى ٥ سم . اجنحتها شفافة مزركشة ، رأسها اصفر ، صدرها اسمر منقط ، بطنها مطوق . احيائها الحولية عديدة تراوح من ٣ الى ١٢ واختلافها هذا يعود الى المناخ والاقليم || مكنتها صغير القند وشعي الشكل ابيض اللون تمتعه الانثى على مختلف الثمار كالكرز والدراق والاجاص والسفرجل والبرتقال والاكيدنيا والموز والتين والبنندورة . فينقف عن يرقات اسطوانية الشكل ، غبراء اللون ، ملساء البشرة ، مدببة الرأس ، مقطوبة العقب . تعيش حيث تنقف فتتخر الثمرة وتقيم فيها حتى اكتمال تطورها اليرقي ثم تخرج منها الى التربة حيث تتحول الى كزود فحشرة كاملة .

٨٩٧٥ - خَرَشَةُ الزَيْتُون * ، ذُبَابَةُ الزَيْتُون ،

كَبْرُن

Dacus oleae (S).

Mouche de l'olive (F). Olive fly (E). Olivenfliege (D).

ذبابة صغيرة من الخرشيات . طولها نحو ٥ سم . اجنحتها شفافة تعلوها بقع ملونة . جسمها الى السمرة البنية . ارجلها صفراء وحر || تظهر في اوائل تموز . تمتع مكنتها في لب ثمار الزيتون ولا تمتع في الثمرة الواحدة اكثر من مكنة واحدة تنقف بعد وضعها بنحو ٦٠ ساعة عن رقة بيضاء طولها نحو ٤ سم . تعيش حياتها اليرقية في اللب ثم تتحول الى كزود فحشرة || احيائها الحولية تراوح من ٣ الى ٥ لانها مرتبطة بالمناخ والاقليم .

٨٩٧٦ - خَرَشَةُ الْكَرَز * ، ذُبَابَةُ الْكَرَز

Rhagoletis cerasi (S). Mouche des cerises (F).

Cherry maggot (E). Kirschfruchtfliege (D).

ذبابة من الخرشيات . طولها من ٣ الى ٥ سم . لونها اسود . اجنحتها شفافة مجزعة بخطوط سود . طيراتها بطي . ضعيف .

٨٩٦٢ - خَرْدَلِيَّة

Siliqua (F). Siliqua (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ثمرة تشبه ثمار الصليبيات . وهي سنفة ذات مصراعين ، مستطيلة ، مفتوحة ، مركبة من خبائين يفصلهما حاجز دقيق يشطر السنفة الى شطرين .

٨٩٦٣ - خِرْدِيل

Chordeiles (S).

Chordeile (F). Chordeiles (E).

جنس طير راس من فصيلة السيديات . انواعه المعروفة نحو ١٢ موطنها يمتد من امريكا الشمالية الى الجنوبية . تألف الاحراج وضفاف مجاري الماء والحقول المزروعة . تسرح من العصر الى ظلمة الليل ومن الفجر العميق الى اقبلاج النور || اجسامها متوسطة القد تطول من ٢٠ الى ٢٤ سم . رؤوسها مستعرضة . اعناقها قصيرة . اجنحتها واذاها مستطيلة . مناقيدها مخروطية مستعرضة الاشدق الرحبة ، مدببة الاطراف الذرية . اثوابها تختلف مع الانواع || قوتها الحشرات المختلفة الفصائل والرتب || اعرف انواعها واشهرها خرديل فيرجينية .

٨٩٦٤ - خِرْدِيل فيرجينية *

Chordeiles virginianus (S). Chordeile de

Virginie, Faucon de nuit (F). Nighthawk (E).

نوع من الخرديل . موطنه بعض مناطق امريكا الشمالية اخصها فيرجينية . يألف حواشي الاحراج وضفاف الانهر والحقول المزروعة ، ويرتاد المدن في الليل حيث يكثر الفراش والبعوض حول الانوار الساطعة || جسمه معتدل القد يطول نحو ٢٣ سم . ثوبه الى الطحلة السمر يعلوها تجذيع ابيض ورقشة شهباء . حدقة عينه كستنية اللون . سباله معتدل الكشافة والطول . منقاده واسع الشدق ، منعقف البهرة . جناحه مستطيل ذلق . ذنبه فارق الطرف || طيرانه خفيف الحركة سريعها ، يجيد التحليق والتصميمد والانقضاض || قوته الحشرات المختلفة من اي رتبة كانت || عشه افحوص يدبره في التربة بين الاعشاب . الانثى تضع من بيضتين الى ثلاث بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٨ يوماً .

٨٩٦٥ - خَرَز

Débitage (F). Cutting up (E).

تقطيع الخشب حسب تدعو الحاجة .

٨٩٦٦ - خَرَزُ الصُّخُور *

Cetraria Islandica (S).

Parmélie, Lichen d'Islande, Mousse d'Islande (F).

Iceland lichen, Iceland moss (E). Isländische tart-schenflechte (D). Lichène Islandico (I).

جنس من الحزاز الجامد البشرة . يكثر في المناطق المعتدلة والباردة . يعيش على المواد العضوية السائرة نحو الانحلال . انواعه عديدة معظمها طبي يتحلل ببعض الخواص النافعة الفعالة الحبيدة العواقب .

٨٩٦٧ - خَرَزَة

Vertèbre (F). Vertebra (E).

هي كل فقرة من الظهر والعنق . خرز الظهر : فقره .

٨٩٦٨ - خَرَزَة

حفصة من النجيل ترتفع قدر الذراع خضراء ترتفع غيطاناً من اصل واحد لا ورق لها لكنها منظومة من اعلاها الى اسفلها حباً مدوراً اخضر في غير علاقة اكائها خرز منظوم في سلك وهي تقتل الابل (السان) .

٨٩٨٥ - خَرَشَتَانِ مُتَوَجَّهَةٌ * ، أَبُو قُشَشْ

Sterna bengalensis (S). *Sterne du Bengale* (F). *Crested tern* (E).

طائر هندي الموطن له مصيفه ومشتاه . متوسط القد طوله نحو ٣٠ سم . أبيض اللون ، متوج الرأس ، أحمر المنقار ، أسمر الساق .

٨٩٨٦ - خَرَشُوف

Artichaut (F). *Artichoke* (E).

هو الارضي شوكي ، اطلبه .

٨٩٨٧ - خَرَشُومَةٌ

Proctonotus (S). *Proctonote* (F). *Proctonotus* (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الخرشوميات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد المعتدلة الحرارة وخصها البحر الابيض المتوسط || اصداؤها سنائية الشوزن ، قليلة التبليط والاعوجاج مستديرة القواعد المشرومة الخفاف ، مستدقة الاعقاب .

٨٩٨٨ - خَرَشُومِيَّات

Proctonotidae (S). *Proctonotidés* (F). *Proctonotidae* (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل خلعيات الخياشيم العديدة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، اعطائها بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها مستطيلة . بعض اجناسها عادم الغشاء الصدفي والبعض الآخر يحمل اصدافاً مستطيلة مقمرة الفوهات المستديرة ، مقرنة الاعقاب || اعرف اجناسها واشهرها الخرشومة والفيكل .

٨٩٨٩ - خَرَشِيَّات

Trypetidae (S). *Trypétides* (F). *Trypetides* (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها زهاء ٢٠٠٠ جميعها متوسطة القد او صغيرة . جملة الشكل ، متعددة الالوان المراكبة الزاهية . تعيش على مغثر الازهار وعلى الافرازات السكرية التي تنضجها النباتات والحشرات القشرية || مكنها وشعي الشكل ، ابيض اللون تمتحه الانثى في نصل الاوراق وفي الثمار وعلى السوق والجذور فينقف عن يرقات اسطوانية الشكل مدببة الرؤوس تحمل خطاطيف قوية تقوم مقام التأشير . وهي تعيش في المواضع التي نقفت فيها فتتخرها وتعطبها قبل ان تتحول الى عذارى وكزد .

٨٩٩٠ - خَرُص

Feuille de dattier (F). *Date-tree leaf* (E).

الخرص هو جريدة النخل .

٨٩٩١ - خَرُص ، خَرُص

Estimation des récoltes fruitières (F).

هو تقدير الانتاج الثمري .

٨٩٩٢ - خَرُصَة

Part, Dû (F). *Part, Due* (E).

الخرصة هي النصيب من الشيء . يقال اعطني خرصتي من الماء .

٨٩٩٣ - خَرُط *

Cupidonia (S). *Cupidon, Gélinothe des prairies* (F). *Prairie chicken* (E).

طائر وحيد الجنس والنوع من عمارة الخريسيات وفصيلة الطيهوجيات : الذكر منه يتميز بكشيتين من الريش الدقيق الناعم تركبان العنق من اليمين ومن اليسار . ثوبه متراكب الالوان المتداخلة فيه الاسمر والاسود والاحمر

تظهر في ايار . تمتح مكنها على ثمار الكرز فينقف عن يرقات اسطوانية غبراء اللون صلبة الجسم طويلا نحو ٤ مم . تنخر الثمرة ولا تتركها الا عند اقترابها من طور الكزود . جيلها الحولي واحد .

٨٩٧٧ - خَرَشَةُ الكَرَفَس *

Philophylla heraclei, Acidia heraclei (S). *Mouche du Céleri* (F). *Celery fly* (E). *Sellerieflye, Sellerieminiarfliege* (D).

ذبابة من الخرشبات . طولها نحو ٥ مم . لونها الى الصفرة العابقة . تظهر في الربيع وتمتج مكنها على اوراق الكرفس فينقف عن يرقات تلغم النصل الواحد تلو الآخر . اجيالها الحولية من ٢ الى ٣ .

٨٩٧٨ - خَرَشَةُ اَهْلِيَّون *

Platyparea poeciloptera (S). *Mouche de l'asperge* (F). *Asparagus maggot* (E). *Spargelfliege* (D).

ذبابة من الخرشبات . طولها نحو ٦ مم . لونها الى السواد اللامع . اجنحتها مستطيلة ، شفافة تعلوها زراکش سمر . تظهر من ايار الى حزيران . تمتج مكنها على اغاليج اهلين فينقف عن يرقات تعيش كامل حياتها اليرقية داخل الانفاق التي تخلدتها في الاغاليج ثم تخرج بعد الانسلاخ الاخير لتتحول الى كزود .

٨٩٧٩ - خَرَشَقْلِي

Castagnole (F).

الخرشقلي سمكة بحرية تدعى بلطي المتوسط ، اطلبها .

٨٩٨٠ - خَرَشَم

Ruchée (F). *Hiveful* (E).

جماعة النحل التي يتألف منها القفير .

٨٩٨١ - خَرَشَتَانِ ، خَطَافِ الْبَحْرِ

Sterna (S). *Sterne, Hironde de mer* (F). *Tern* (E).

جنس طيور مائية من كفيات القدم . انواعه نحو ٢٦ منتشرة في جميع الاقطار . قريبة الشبه من النورس او الخطاف . تتميز باثوابها البلقاء اللون وباذنابها المستطيلة الفرقاء || اعرفها ما يلي .

٨٩٨٢ - خَرَشَتَانِ الْمُتَوَسِّط *

Sterna media (S). *Sterne de Médie* (F). *Cheeked tern* (E).

طائر من القواطع . محبوب اقاليم المتوسط . معتدل القد . طوله نحو ٣٢ سم . أبيض اللون ، بياضه مشوب بالرماد . منقاره الى الجزوة وساقاه كذلك .

٨٩٨٣ - خَرَشَتَانِ سَرِيْعَةٌ ، حَقُط

Sterna bergii (S). *Sterne de Bergi* (F). *Swift tern* (E).

طائر من القواطع . يألف الشواطئ . كبير القد طوله نحو ٤٠ سم . ثوبه الى البياض المنش بالوردي . سقطاه الى الصهبة الرمادية يعلوها موج ازرق . منقاره اسود . ساقاه الى الحمرة القائمة .

٨٩٨٤ - خَرَشَتَانِ صَغِيرَةٌ ، دَغْبِيز

Sterna albifrons (S). *Sterne naine* (F). *Little tern* (E).

طائر من القواطع . يألف ضفاف الانهر والشواطئ . صغير القد طوله نحو ٢٣ سم . ثوبه ابيض ، سقطاه الى الرصاصي يعلوها موج ازرق . رأسه اسود . منقاره اصفر ، ساقاه الى البرتقالي .



خَرَشَةُ الكَرَفَس



خَرَشَةُ اَهْلِيَّون



خَرَشَةُ الْمُتَوَسِّط



خَرَشَةُ سَرِيْعَةٌ




خَرَشَةُ صَغِيرَةٌ



خَرَشَةُ مُتَوَجَّهَةٌ



خَرُط



خَرْطَال بَرْي



خَرْطَال زَرَاعِي



خَرْطَال عَرِيَان



خَرْطَال فَتَوَا



خَرْطَالِيَّة زَرْقَاء



خَرْطَالِيَّة قَرْنَفَلِيَّة

٩٠٠١ - خَرْطَالِيَّات (F).
Avenées (F).
سيط من فصيلة النجيليات يشمل بعض الاجناس والانواع
اشهرها الخَرْطَال .

٩٠٠٢ - خَرْطَالِيَّة (S).
Aira (S).
Canche (F), Hair-grass (E).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة النجيليات . النوع
عديدة منها الزراعية التزيينية ومنها البرية الكلائية تستحبها
الانعام ورعاها الماشية فتسمن عليها || جميعها اعشاب
صغيرة القد تعلو من ١٠ الى ٥٠ سم . اوراقها متعاقبة ،
عصفية النصل الغمدي . ازهارها هامى الارتكاز سنبل
او عنقودي التجميع || اعرفها الانواع التالية .

٩٠٠٣ - خَرْطَالِيَّة النَمِيص (S).
Aira cespitosa (S).
Canche gazonnante (F).
تعلو من ١٠ الى ٣٠ سم . تنبت وتكثر في الاراضي
البور ولا تحصى القاحلة والرملية . رعاها الماشية بشهية .

٩٠٠٤ - خَرْطَالِيَّة زَرْقَاء * ، مُولِينِيَّة

Aira caerulea, Molinia caerulea (S). Canche bleue,
Molinie, Flèche (F). Blowing grass, Lavender grass
(E). Pfeifengras blaues (D). Gramigna liscia, Melica
azzurra (I).

نوع زراعي تزييني يعلو من ١٥ الى ٤٠ سم . ازهاره
سنبل التجميع ، ازهاره زرقاء اللون مستحبة العرف .

٩٠٠٥ - خَرْطَالِيَّة قَرْنَفَلِيَّة *

Aira caryophylla (S). Canche caryophyllée (F).
Hair grass, Mouse grass (E). Nelkengrass, Nelken-
hafer (D). Ghingola, G. nebbia, Pabbio (I).

نوع زراعي تزييني يعلو من ١٥ الى ٣٥ سم . ازهاره
عنقودي التجميع . ازهاره مختلفة الالوان مستحبة العرف .

٩٠٠٦ - خَرْطَالِيَّة مُتَعَرِّجَة (S).
Aira flexuosa (S).
Canche flexueuse (F).

عشبة برية تعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم . تنبت في المواقع
الرطبة . تكثر في المراعي الطبيعية وفي الغابات والاحراج .
رعاها الماشية بشهية .

٩٠٠٧ - خَرْطُون (F).
Trompe (F). Trunk (E).

خَرْطُون القيل : ما يلفه على الشيء الذي يريد ان يتناوله
اذا كان كبيراً . وما يتناول به الشيء مباشرة اذا كان
صغيراً || والخَرْطُون هو اول ما يجري من عصارة العنب
قبل ان يداس الحب . وهو ايضاً الخمر السريعة الاسكار .

٩٠٠٨ - خَرْطُونِيَّ (F).
Proboscidiiforme (F).

نعت تعريفي يطلق على ما كان كالخَرْطُون قابلاً وقلباً .
Proboscidiiform (E).

٩٠٠٩ - خَرْطُونِيَّات (S).
Proboscidiens

رتبة حيوانات من ذوات الجثث الضخمة العظيمة . تمثل
الآن ، بعد انقراض اكثرها ، بنصيلة الفيليات .

٩٠١٠ - خَرْطُون ، أَبُو مِدِيد ، حُبْلِيل ،

دُوْدَة الارض (S).
Lumbricus terrestris (S).

Lombric, Ver de terre (F). Earth-worm (E).
الخَرْطُون ديدان طويلة حلقيه من فصيلة الخَرْطُونِيَّات .
تكثر في الاراضي الرطبة ، الحصبة ، الغنية بالمواد العضوية
والدبالية .

والابيض || يالفت الادغال الرطبة والمراعي الطبيعية .
قوته الاعشاب والحبوب . اثناء تدنن في افصوص ترصعه
بشئ الخشائش والافنان ، الدقيقة وهي تضع من ٨ الى ١٠
بيضات تحضنها وحدها نحو ٣ اسابيع .

٨٩٩٤ - خَرْطَال ، شَوْفَان (S).
Avena (S).

Avoine (F). Oats (E).
جنس نباتات عشبية حولية برية وزراعية من فصيلة
النجيليات . انواعه المعروفة نحو ٨٠ منتشرة في جميع
الاصقاع العالمية . تتميز بقلّة الاشطاء وباستطالة العناقد
الزهرية الفرقة التجميع . سوقها جوفاء . اوراقها متعاقبة ،
غمدية ، عصفية النصل || اعرف واشهر انواعه ما يتبع .

٨٩٩٥ - خَرْطَال بَرْي * ، شَوْفَان بَرْي ، هَرْطُمَان

Avena barbata (S). Avoine à 2 barbes (F). Slender
wild oat (E). Wilder hafer (D). Avena a due
barbe (I).

ينبت في المراعي ويكثر في الاراضي البور . رعاها الماشية .

٨٩٩٦ - خَرْطَال حَقْلِي ، شَوْفَان حَقْلِي

Avena pratensis (S). Avoine des prés, Avenette (F).
Oat grass, Perennial oat (E). Feldhafer, Wissenha-
fer (D). Avena dei prati (I).

يكثر في المروج الطبيعية ويزرع في المراعي . ترغب
فيه الماشية على اختلاف اجناسها وانواعها ، من الغم
الى الخيل .

٨٩٩٧ - خَرْطَال رَفِيع ، دَوْسَر (S).
Avena elatior (S).

Avoine élevée, Fromental (F). Tall oat grass (E).
Gemeines franzosengras (D). Avena elatior,
Saggian elatia (I).

نوع من الخَرْطَال المعمر الكلائي . قصته تعلو من ١٠٠
الى ١٥٠ سم . عصفه منبسط النصل ناعم الملمس . زراعته
المرعوية واسعة الانتشار لانه وافر الانتاج جيد الصنف
قابل الحش على عدة مرات || يرغب في الاتربة الخصبة
المتوسطة الاندماج .

٨٩٩٨ - خَرْطَال زَرَاعِي * ، شَوْفَان زَرَاعِي ،

قَرْطُمَان (S).
Avena sativa (S).

Avoine cultivée (F). Common cultivated oat (E).
Even, Hafer, Saathafer (D). Avena, Vena, Gramigna
montana (I).

هو النوع الزراعي العلني المشهور يفيد الخيل ويحسن
حال الجياد . ضروره عديدة جميعها حميدة الانتاج ولكل
منها ميزات خاصة وثرية صالحة واقلية مناسب || وهو
بوجه عام يرغب في المواقع المرتفعة عن سطح البحر كما
يفضل الاتربة الرطبة المتوسطة الاندماج .

٨٩٩٩ - خَرْطَال عَرِيَان * ، شَوْفَان عَرِيَان ،

زُمَيْر قَبْوِي (S).
Avena nuda (S).

Avoine nue, Avoine de Tartarie, Focillon (F).
Hull-less oat, Naked oat, Pill corn, Pillcorn (E).
Nackthafer, Tartaren hafer (D). Avena nuda (I).

نوع زراعي علني عديم الضروب . تكثر زراعته في البلاد
الامريكية .

٩٠٠٠ - خَرْطَال فَتَوَا * ، خَالْفُور ، زُمَيْر

Avena fatua (S). Avron, Folle-avoine, Avoine ani-
mée (F). Wild oat, Drake, Flaver (E). Flughafer,
Wilder hafer (D). Avena fatua, Av. matta, Vena
Europea (I).

ينبت مع الزرع وقد يكثر احياناً فيصبح من الاعشاب
الضارة الواجب اتلاؤها .

والكروم والحدائق. قوته الحشرات والديدان يقتصرها على الأرض وعلى الأشجار || جسمه صغير القد. طوله نحو ١٧ سم. وبسطته نحو ٢٤ سم. ثوبه العلوي، من الرأس إلى الرداء والظهر، أحمر اللون صفائي الموج. جناحاه إلى السعرة، وفالها مهدبة بالحنطلي الأشقر. عجزه حنطي اللون تعلوه مسحة سمراء. ذنبه مستعرض الشكل، محدب الطرف، لونه إلى الشقرة الزاهية تحوق به من جانبيه أربعة وقال بجذعة الأطراف بالأسود والابيض. عنقه وصدره وبطنه إلى البياض الأغبر. عيناه مستديرتان، معتدلتا القد. حدقة عينه عسليه اللون، سمراء الموج. منقاره إلى الجؤوة الباهتة. رسناه شيطان. محالبه نحيلة || الانثى اصغر قدأ من الذكر ولكنها تتعلى بذات الثوب || طيرانه سفيق خفيف الحركة قصير الشوط. تفريده مستحب الانعام لكنه دون العنديلين والحسون || يدثن عشه في الادغال وفي الأشجار الداسية. عشه قدحي الشكل يحبكه بالقش والاليف ويبطنه بالزغب والصوف || الانثى تضع نحو ٥ بيضات. الحفن يستمر نحو ١٣ يوماً تقوم به الانثى بمناوبة الذكر || يعتبر من المصافير الجزيلة النفع.

٩٠٢٢ - خُرْمَطَان *Loranthus globiferus* (S).

Loranthus globifera (F).

نوع من الحصال الطبي الحفيد الفوائد. راجع حصال.

٩٠٢٣ - خُرْم * *Nelle* (F).

مرض جرثومي، تسببه ثعبانية الحنطة. يصيب القمح فيعطب البر الذي يصبح اسود كبزور الحرم.

٩٠٢٤ - خُرْم *، سراج القطرب

Agrostemma (S). *Agrostemma* (F). *Agrostemma* (E).

جنس نباتات عشبية حولية من سبط السيلانيات وفصيلة القرنفلية. انواعه عديدة بعضها زراعي تزييني ومنها البري والجحالي الذي يعتبر من الاعشاب الضارة.

٩٠٢٥ - خُرْم الابرة *Alyse argentée* (F).

راجع اليسم بحري. *Sweet alison* (E).

٩٠٢٦ - خُرْم الحنطة *

Agrostemma githago (S). *Agrostemma du blé*, *Nielle des blés*, *Couronne des blés* (F). *Bastard nigella*, *Corn cockle*, *Wild savager* (E). *Kornrade*, *Raden*, *Rade* (D). *Agrostema* (I).

نوع من الخرم البري يكثر في الحقول بين الزروع. يزوره مرة الطعم سامة. اذا اختلطت بدقيق الحنطة احدثت في آكله اسهالا وفساداً في المعدة.

٩٠٢٧ - خُرْمَا * *Diospyros chinensis* (S).

Figue-caque, *Colng de Chine* (F). *Japanese date plum* (E). *Ita onische dattelpflaume* (D). *Ermellino*, *Lotu africano* (I).

جنس اشجار مثمرة من فصيلة الابنوسيات. درية الشبه من الكاكي. انواعه وضروبه عديدة، مهدبة الصين وقد انتشرت في جميع البلاد الحارة والمعتدلة || الشجرة صغيرة القد تعلو من ٣ الى ٤ امتار. ساقها بيشاء اللحاء.

اوراقها اهليلجية، متعاقبة، معنقة، زباء النصل. ازهارها صغيرة القد، عقدية الاهان. الذكورية منها كثيرة العدد تحمل من ١٦ الى ١٨ سداة مجموعة الى ثمانية اصصام. اما الازهار الحنطية فقليلة العدد، مدقاتها غليظة زباء واسديتها نحو ١٦ || ثمارها كروية او شبه كروية الشكل، قطرها يراوح من ٤ الى ٥ سم.

٩٠١١ - خُرْطُونِيَّات، خُرْطُونِيَّات

Lombricidae (S). *Lombricidae* (F). *Lombricidae* (E).

فصيلة من الديدان الحلقية الارضية.

٩٠١٢ - خُرْطِيْطُ الشَفَّاح *

Hyponomeuta malinellus (S). *Hyponomeuta du pommier*, *Teigne des pommiers* (F). *Small ermine moth* (E). *Apfelbaumgespinstmotte* (D).

فراشة من القوبيات وحيدة الجيل الحولي، صغيرة القد، منقوشة الرواشن، بسطتها نحو ١٢ سم. تمتع مكها في الخريف على الافناد والاغصان بشكل لطخ مربعة او مستطيلة التجميع لونها إلى الشقار الثني، فينقف بعد وضعه بيضة أيام عن رقات صغيرة تمضي الشتاء في شقوق اللحاء قوتها ما تيسر من المواد العضوية وتبقى كذلك حتى الاوراق حيث تتركب الاوراق الفتية فتلتغها ثم تنطق النوامي بنواصها الحريري الذي يشبه بيت العنكبوت فتقيم فيه بعض الوقت الى ان تقضي على الاوراق ثم تحولك صلجتها وتخلد في ثباتها الطبيعي الى اواخر الصيف حيث تتطور الى حشرة كاملة تعيد سيرتها الارلى.

٩٠١٣ - خُرْطِيْطُ التَيْن *، قَوْبَعَةُ التَيْن

Simaethis nemorana (S). *Teigne du figuier* (F).

فراشة من القوبيات صغيرة القد منقوشة الرواشن بسطتها نحو ١٥ سم. اجيالها الحولية اثنان. رقاتها رعى بشرة فصل الاوراق على صفحتها العليا.

٩٠١٤ - خُرْطِيْطُ الحَمْضِيَّات

Teigne du citronnier (F).

فراشة صغيرة القد مؤذية تعرف بقوبعة الحمضيات.

٩٠١٥ - خُرْطِيْطُ الزَيْتُون *Teigne de l'olive* (F).

فراشة مؤذية صغيرة القد تعرف بقوبعة الزيتون.

٩٠١٦ - خُرْعَب، خُرْعُوب، خُرْعُوبَة

Rameau d'un an (F). *Yearly bough* (E).

النصن لسنته. القصب السامق النص. الفن الناعم الحديث الشاخ الذي لم يشد. ج خرايب.

٩٠١٧ - خُرْفَاق مُشَبَّك

Coluteocarpus reticulatus (S).

Colutéocarpe réticulé (F).

نبات عشبي حزمي بري وحيد الجنس والنوع من فصيلة الفصليات. منبته بعض الجرود البنائية اخصها منطقة الارز || ساقه فرعاء منتصب. اوراقه الجذعية قرصية التركيب، حزمية، خطية النصال المستطيلة. مسنة الحنار. اوراقه الساقية شبه سنائية الشكل. ازهاره هامى الارتكاز. ازهاره صغيرة بيشاء اللون. تنويره صيفي.

٩٠١٨ - خُرْفَع، خُرْفَع

القطن الفاسد في لوزه عند جنبه.

٩٠١٩ - خُرْفَق *Thlaspi odorant* (F).

هو الاندلسية العطرة. اطلها.

٩٠٢٠ - خُرْق

ضرب من المصافير. الواحدة خرقة (اللسان).

٩٠٢١ - خُرْقَة

Aedon (S).

Aedon, *Agrobate* (F). *Aedon* (E).

طائر من فصيلة الدخليات. اعطانه تمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا وافريقية الشمالية. يالف المواقع الرطبة والرواشن



خُرْطِيْطُ الشَفَّاح



خُرْطِيْطُ التَيْن



خُرْمَطَان




خُرْم



خُرْم الحنطة



خُرْمَا



خرمآن عادي

النهرية التي تعيش في المياه العذبة ومنها البحرية . اعطائها مياه البلاد المعتدلة الحرارة || اصداؤها شبه اهليلجية الشكل ، رفيعة المقدم ، متساوية المصارع ، لامتناهية الاضلع ، جميلة الالوان ، نحيلة التحزير القاطب والمعرض || تعيش لاصقة بالصخور وبالاخشاب المنمورة بالماء . لحومها جيدة الصنف مرغوب فيها .

٩٠٣٧ - خرنوب* ، خروب (S). Cerantonis silliqua (S). Caroubier (F). Carob tree, Locust tree (E). Karobbaum (D). Carrubbio, Siliqua di Levante (I). شجرة مشرة من فصيلة القرنيات . وحيدة النوع عديدة الخروب منها المقدسي والحشاني والبري . يعلو من ٧ الى ١٢ م . ساقه شديدة الصلابة ، خشبها احمر اللون يستعمل في الصناعات الدقيقة . اوراقه عروية ، مركبة ، وريقاته شفعية بيضية ، نخيانية ، لامعة ، جلدية ، عفصة ، تستعمل في الدباغة . ازهاره ثنائية المسكن ، صغيرة القد ، حمراء اللون . ازهاره عنقودي الشكل منتصب ثماره قرنية مفلطحة تطول من ١٥ الى ٢٥ سم . لبها مخشوشب شبه اسفنجي يحوي بعض المواد السكرية والنشوية والازوتية || اقليمه اقليم الزيتون ، لكنه يتأثر من شدة البرد ، يرغب في المعارض الجنوبية ، يعيش ايما غرس وفي اي تربة كانت شرط ان لا تكون مرطاباً . يتكاثر بالبذور وبالفسائل . يثمر بعد غرسه بنحو ٨ سنوات وقد تثمر الشجرة المعنى بها عند بلوغها نحو ١٥ سنة من ٩٠٠ الى ٩٠٠ كيلو . حله حولي متتابع لكنه متناوب الانتاج الكامل || ثماره كثيرة الاستعمال تصلح لعدة صناعات منها الدبس والكحول والعلف . اما بزوره فغرائية صناعية || وثماره هذه من الوجهة الكيماوية العنصرية تحوي على :

٥٠,٨ ٪	من المواد الازوتية
٥٠,٥ ٪	الدهنية
٣٠,١ ٪	السكرية (سكاروز وغلوكوز)
٢٩,٨٧ ٪	الهيدروكربونية غير السكرية
١٩,٥٠ ٪	الحشبية
٥,٤٥ ٪	غير المقررة



لخرنوب



خرنوب هندي

٩٠٣٨ - خرنوب هندي* ، خنيزار شنبير (S). Cassia fistula (S). Cassier, Casse en siliqua, Canéflier (F). Golden shower, Indian laburnum, Pudding pipe tree (E). Purgierkassie, Röhrenkassie (D). Cassia solutiva, C. in bastoni, C. di Levante (I). شجرة برية وزينية من فصيلة القرنيات . بحيلة الغالب . تعلق نحو خمسة امتار . اوراقها عروية ، مركبة ، وريقاتها وريية اهليلجية جلدية لامعة . ازهارها عنقودي . ازهارها صغيرة متدلية . ثمارها قرنية اسطوانية تطول نحو ٤٠ سم . بشرتها ولها سمر . بزورها حمر ، سكرية الطعم ، تستحلب . وتستعمل في عدة مستحضرات طبية . ويقال انها من مسهلات المعدة القوية المفعول .



خرنوب

٩٠٣٩ - خرنوبية* ، خروب (F). Caroube, Carouge (F). Carob (E). ثمرة الخرنوب قرنية مخشوشبة سكرية المادة جثا على تحليتها في بحث الخرنوب .

٩٠٤٠ - خروب الخنيزير (F). Anagyris foetida (F). Stinking wood (E). اطلب ينبت نمن .

لونها الى الصهبة الصفراء . لبها عابق الصفار ، شديد الحلاوة عند تمام الادراك . تتميز بنيرج عطري يتقلص مع الضغط || زراعتها كزراعة الكاكي ومتطلباتها كذلك .

٩٠٢٨ - خرمآن (S). Phygellus (S). Phygellus (F). Phygellus (E).

بحلة معمرة من فصيلة الخنازيريات . ساقها مخشوشبة ترتفع نحو ١٠٠ سم . اوراقها معنقة ، متقابلة ، سانية النصل المسنن الختار ، تطول من ٥ الى ٨ سم . ازهارها الى الحمرة المرجانية المطوقة بالاصفر الكبريتي . قطرها نحو ٤ سم . ازهارها عشكولي التجميع ، محوري الارتكاز . تنويرها يستمر من تموز الى تشرين الاول .

٩٠٢٩ - خرمآن ، براك (S). Belone (S). Orphie (F). Belone, Garfish (F).

جنس اسماك بحرية من الاسقمريات الشائكات الزعانف . انواعها المعروفة خمسة جميعها خضراء اللون ، طويلة القد ، اسطوانية الشكل . رؤوسها مستطيلة المقدم على شكل المنقار . وهي من الاسماك غير المرغوب فيها لانها قد تكون سامة في بعض فصول السنة . اعرفها واشهرها ما يلي .

٩٠٣٠ - خرمآن المتوسط (S). Belone imperialis (S). Orphie de Cantraine (F). Imperial garfish (E).

اكبر انواع الخرمآن . طولها نحو ١٢٥ سم . ظهرها الى الخضار الازرق . بطنها فضي . منقارها مسنن . تقترب من الشواطئ . موطنها البحر المتوسط .

٩٠٣١ - خرمآن عادي* (S). Belone vulgaris (S). Orphie commune (F). Common garfish, Greenbone (E).

سمكة من الخرمآن طولها نحو المتر . منقارها مستطيل مسنن ، ظهرها اخضر . بطنها ابيض . موطنها بحار البلاد الحارة والمعتدلة . تكثر قرب الشواطئ .

٩٠٣٢ - خرمآن ميبير (S). Belone acus (S). Orphie aiguille (F). Needlefish, Billfish (E).

اصغر قليلاً من الخرمآن العادي . منقارها خال من الاسنان . موطنها المحيط الاطلسي . تكثر قرب الشواطئ الافريقية والاروبية .

٩٠٢٣ - خرمآنيات (S). Belonidae (S). Belonidés (F). Belonidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من الاسقمريات شائكات الزعانف . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها شبه اسطوانية الشوزن . مستطيلة الجرم . رؤوسها معتدلة الحجم ، مستطيلة الاغظام المتقادية الشكل || اعرف اجناسها واشهرها الخرمآن .

٩٠٣٤ - خرنباش (F). Amaraque (F). Amaracus (E). هو المرو ، اطلبه .

٩٠٣٥ - خرنيق (F). Levraut (F). Young hare (E). هو ولد القواقع ، الارنب الوحشي ، قبل بلوغه ستة اشهر . ج خرائق .

٩٠٣٦ - خرنقعة* (S). Modiola (S). Modiole (F). Modiola (E).

جنس حيوانات بحرية ونهرية من الرخويات ضفيعيات الخياشيم وفصيلة الميديات . انواعها المعروفة نحو ٧٠ منها

٩٠٤٩ - خِرْيَسَب ٥

Endostome (F). Endostom (E).

الخرب فوية في الغشاء الداخلي من البويضة النباتية .

٩٠٥٠ - خِرْيَسَبُ اسود العنق *

Indicator sparmanni (S). Indicateur à gorge noire, l. à bec blanc, Maroc (F). Honey-gulde (E).

طائر من الخريت وفصيلة الخريتيات . موطنه يمتد من حوض البحر الاحمر الى الحبشة افريقية الجنوبية || جسمه رشيق الشكل يطول نحو ١٨ سم . بسطته نحو ٢٨ سم . ثوبه العلوي الى الكهبة . لوحف جناحيه مرقوشة بالابيض . عنقه اسود . صدره وبطنه الى البياض الاشهب . مؤخر البطن مع الفخذين مرقوشة بالاسمر . منطقة العين والاذن الى الصفار الباهت . قاعدة الجناح هلالية الشكل صفراء اللون . حذفة عيحه عسليه . منقاده الى البياض الاسمر . ساقاه الى السمر || طيرانه خفيف الحركة ، معتدل الشوط . قوته الحشرات واساريها ودي النحل والعسل . وقد اطلق عليه اسم خريت لانه يهدي الى مكان وجود العسل وذلك بترداده عليه في الصباح وبعد العصر || الانثى لا تعشش بل تضع البيض في اعشاش غيرها من الطير ولا تضع في العش الواحد اكثر من بيضة .

٩٠٥١ - خِرْيَسَات ٥

Indicatoridae (S). Indicatoridés (F). Indicatoridae (E).

فصيلة طير من المتسلقات . مركزها بين القيقوبيات والنفازيات . انواعها المعروفة ١٢ جميعها من طيور البلاد الاسيوية والافريقية || تتميز بمناقيدها المخروطية الشكل ، المعتدلة الطول ، وباجنحتها الذلقة الاطراف ، وبريشها القصير اللبد || اناثها لا تعشش ولا تحضن البيض بل تضعه في اعشاش بعض الجواثم كالدخل والحوارج والذعر . اشهر انواعها الخريت الاسود العنق .

٩٠٥٢ - خِرْيَدَة

Perle non percée (F).

المؤلوة لم تثقب . ج خرائد وخرد وخرد .

٩٠٥٣ - خِرْيَدَلِيَّة

Silicule (F). Silicula (E).

نعت وصفي للدلالة على شكل ثمري خاص يشبه ثمرة الخردل الصغيرة التي يكاد طولها يفوق عرضها .

٩٠٥٤ - خِرْيَزَة

Coccidium (S).

Coccidie (F). Coccidia (E).

جنس حيوانات مجهرية من فصيلة الخريزيات .

٩٠٥٥ - خِرْيَزَة الارنب ، كُكْسِيْدِيوز

Coccidium cuniculi (S). Coccidiose, Coccidie du lapin, Maladie du gros ventre (F).

مرض فتاك يصيب الارانب والطيور الداجنة سببه حيوان مجهري من الخريزيات .

٩٠٥٦ - خِرْيَزِيَّات

Cocciens (F).

فصيلة حيوانات دنيا من الاوالي المجهرية .

٩٠٥٧ - خِرْيَس

Salicorne herbacé (F).

هو إشنان القلي ، اطلبه .

٩٠٥٨ - خِرْيَس ، خِرْيَس

Tétrás (F). Grouse (E).

هو الطيهوج ، اطلبه .

٩٠٤١ - خِرْوَع ، تَبْشُع Ricinus communis (S).

Ricin, Palma Christi (F). Castor oil plant, Palma Christi (E). Echter wunderbaum, Palme Christi (D). Risino, Palma Christi (I).

شجيرة من الفصيلة البتونية . وحيدة الجنس والنوع . عديدة الضروب المعمرة في البلاد الحارة والحرية في البلاد الباردة . ساقها ليفية مخشوشة تعلو نحو ٣ أمتار . أوراقها متعاقبة ، معنقة ، طويلة الزناد ، كفية النصل ، ثمانية أو تساعية الفصوص . ازهارها عنقودي منتصب . ازهارها صغيرة كثيفة التجميع . ثمارها جراء مستطيلة شائكة الغلاف . بزورها مصقولة لامعة القشرة الحمراء الخططة والمنمشة بالاسمر . لها ابيض كرية الطعم مقبى يستخرج منه زيت الخروع المعروف || ضروب الخروع عديدة ، اشهرها ما يلي :

خروع أبيض Ricinus albidus (S). Ricin blanc (F).

خروع أرجواني Ricinus purpureus (S).

خروع أخضر Ricinus viridis (S). Ricin vert (F).

خروع دموي Ricinus sanguineus (S).

خروع زنجباري Ricinus zanzibariensis (S).

خروع صغير Ricinus minor (S). Ricin petit (F).

خروع كبير Ricinus major (S). Ricin grand (F).

٩٠٤٢ - خِرْوَع صِينِي Croton cathartique (F).

هو كروتون الزيت ، اطلبه .

٩٠٤٣ - خِرْوَف Mouton (F). Sheep (E).

هو الذكر من النعم قبل ان يصير كبشاً وبعد ان يكون حلاً . ج خراف وخرفان وأخرقة .

٩٠٤٤ - خِرْوَف الْبَحْر ، أم زُبَيْبَة

Manatus (S). Lamantin (F). Manatee (E).

جنس حيوانات مائية لبونة من الخيلان يكثر وجودها في المحيط الاطلسي وفي بعض الانهار الكبيرة التي تصب فيه . انواعه ثلاثة جميعها قاتمة اللون الحنطي الاسمر ، عظيمة الجثة . شعورها هليية مبعثرة ، جلودها ناعمة خبنة .

٩٠٤٥ - خِرْوَف الْبَحْر الْافْرِيقِي

Manatus senegalensis (S). Lamantin d'Afrique (F).

نوع من خرووف البحر طوله نحو ٢٥٠ سم . وزنه ٢٥٠ كيلو ، ثوبه ارمدا اسمر ، هلبه الى السمرة . يعيش عند مصب الانهر الافريقية ويوجد منه في بحيرة تشاد .

٩٠٤٦ - خِرْوَف الْبَحْر الْامْرِيكي

Manatus latirostris (S). Lamantin d'Amérique (F).

نوع من خرووف البحر طوله نحو ٣٠٠ سم . وزنه ٣٥٠ كيلو ، ثوبه ارمدا أزرق يسمر ويمبق مع اقترابه من ثبج الظهر . هلبه الى الصفرة . يكثر قرب شواطئ الانثيل وفلوريدا .

٩٠٤٧ - خِرْوَف الْبَحْر الْلاظْفَرِي

Manatus inunguis (S). Lamantin sans ongles (F).

نوع من خرووف البحر اصغر من الافريقي . طوله نحو ٢٢٠ سم . وزنه ٢٠٠ كيلو ، عديم الاظفار ، ثوبه اعقب من الامريكي . يعيش في نهري الامازون والاورينوك .

٩٠٤٨ - خِرْوَمَانَة

بقلة خبيثة الريح تنبت في الدمن (السان) .



خروع دموي



خروع كبير



خرووف البحر



خربت اسود العنق



خزَام ابيض

٢٥ الى ٥٠ سم. فروعه عديدة متتابة ، منفردة الانتشاب . اوراقه شديدة الخضار . ازهاره الى الصفرة المشربة البياض .

٩٠٦٩ - خَزَام القِطْ Astragalus cruciatus (S).
Astragale pendu (F).
هو الاسطراغالوس المتصالب ، اطلبه .

٩٠٧٠ - خَزَام بَرِّي Réséda sauvage (F).
Wild reseda (E).
هو الاسليخ نبات عشبي بري ازهاره فسقية اللون .



خزَام الصياغين

٩٠٧١ - خَزَام عَطِير * Reseda odorata (S). Réséda odorant, Mignonette, Herbe d'amour (F). Common garden mignonette (E). Reseda-wau, Garten reseda-wau (D). Reseda odorosa, Amorette d'Egitto, Amorino (I).

نوع من الخزَام الزراعي التزييني . ضروبه عديدة جميعها مخشوشة معمرة تملو من ٢٥ الى ٤٥ سم. فروعه متتابة منفردة . اوراقها بسيطة كاملة شبه فصية . نصلها بحيل الخضار الزاهي . ازهارها فواحة العرف المستحب . بتلاتها الى الخضار الاصفر . اسديتها حمراء اللون || ترغب في الاتربة المتوسطة الاندماج والعنصر الكلسي || ازهارها يستمر طوال الصيف .



خزَام عطر

٩٠٧٢ - خَزَامِي ، لاوَنْدَه Lavandula (S).
Lavande (F). Lavender (E).
جنس نباتات عشبية ليفية نجمية معمرة من فصيلة الشفويات انواعه المعروفة نحو ٢٠ جميعها نجمية صغيرة القد فرعاء . اوراقها لسنة خيطية متقابلة . ازهارها سنيلي التجميع ، ناجي الارتكاز . ازهارها بنفسجية زاهية او زرقاء اللون . وهي من النباتات الزراعية الصناعية التي يستخرج من ازهارها واوراقها عطر ودهن الخزَامي || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .



خزَامِي بحرّية

٩٠٧٣ - خَزَامِي بحرّية * ، لاوَنْدَه بحرّية ، ضُرْم ، أَسْطُوخُوْدُس ، شاه اسبرم رومي Lavandula stoechas (S). Lavande stoechade, Quereillet (F). Stoechas, French lavender (E). Fremder lavendel (D). Lavanda stecade, L. dimonte, Stecade (I).
نوع من الخزَامِي وهي نجمة برية تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم. اوراقها خيطية رعاء اللون زباء النصل على صفحتيه . ازهارها سنابل مربعة التصفيف تقوم على ضمة من القنابات الضيقة . ازهارها بنفسجية . كانت ولا تزال شائعة الاستعمال الطبي . تدخل في عدة شرابات صحية ويستخرج منها دهن عزيز القدر .

٩٠٧٤ - خَزَامِي حَقِيقِيَّة * ، خَزَامِي مَخْزَنِيَّة ، خَيْرِي البرّ ، لاوَنْدَه أَصْلِيَّة Lavandula vera, L. officinalis (S). Lavande commune, L. vraie, L. femelle (F). True lavender (E). Echter lavendel (D). Lavanda, Lavandola (I).
اشهر واجود انواع الخزَامِي . تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقها كاملة ضيقة ، طولها يفوق عرضها ثماني مرات . ازهارها سنيلي . سنابلها دقيقة . ازهارها مغثية زرقاء اللون قناباتها سباجية المروق المزوجية الشكل || اوراقها وازهارها فواحة العرف يستخرج منها بالتقطير عطر ودهن الخزَامِي . وقد تستعمل في الطبخ وهي عديدة الفوائد .



خزَامِي حَقِيقِيَّة

٩٠٥٩ - خَرَيْسِيَّات ، خَرَيْسِيَّات Tétroniens (F). Tetraoninae (E).

صارة طير من فصيلة الطيوريات . تتميز بامتداد المنطقة الريشية على كامل رأسها حيث تكسوه حتى المنقار . اجناسها اربعة الخوط والسلكان والطيوج والعقد .

٩٠٦٠ - خَرَيْطَة ، رَسَم Plan (F).

٩٠٦١ - خَرَيْطَة المِسَاحَة Plan cadastral (F).
Cadastral plane (E).

مجموعة الرسوم الرسمية التي تخطط وتحدد الاملاك العقارية فتبينها بجلاء وتدلل على مساحتها بالتفصيل .

٩٠٦٢ - خَرَيْطَة تَقْسِيم القِطْع Plan parcellaire, Cadastre parcellaire (F). Register of lands divided into small portions (E).

هي رسم التعضية العقارية كما يفرضها القانون والحال والمكان .

٩٠٦٣ - خَرِيع Gourmand (F). Sucker (E).

القضيب الجديد السريع النمو الذي يستفيد من نسج الشجرة على حساب سائر أو بعض اجزاء هيكلها الخشبي .

٩٠٦٤ - خَرِيف Autonne (F). Autumn (E).

فصل بين الصيف والشتاء وهو في الاصل اسم مطر القيط ثم سمي الزمن به . مدته ثلاثة اشهر ، من ٢١ ايلول الى ٢٠ كانون الاول . يبتدئ عند نزول الشمس اول الميزان يتميز باستواء الليل بالنهار وابتداء الليل بالزيادة ، ومهبوب الشمال ونقص المياه وسقوط اوراق الاشجار وانصراف الطير في طلب المناطق الدافئة || يدوم حتى بلوغ الشمس آخر القوس حيث يدخل الشتاء .

٩٠٦٥ - مَحْرَ Marte commune (F).

هو السمور الشائع ، اطلبه . Common marten (E).

٩٠٦٦ - خَزَام Reseda (S). Réséda (F).

Reseda, Mignonette (E). Reseda, Wau (D). Reseda (I).
جنس نباتات عشبية حولية ومعمرة ، برية وزراعية تزيينية من فصيلة الخزَامِيات . انواعه عديدة . اوراقه بيضية مستطيلة مختلفة التركيب . ازهاره عنقودي التجميع . ازهاره صغيرة القد ، عطرية الرائحة ، متعددة الالوان . اشهر انواعه ما يلي .

٩٠٦٧ - خَزَام ابيض * ، ذَيْل الخُرُوف ، جَلْبَهَنَك Reseda alba (S). Réséda blanc (F). White upright mignonette (E). Weisser wau (D). Reseda bianca (I).

نوع من الخزَام يملو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقه مركبة . وريقاته مستطيلة متقابلة كثيرة العدد . نصلها اخضر اللون ، ازرق المواج . ازهاره عنقودي لبد . ازهاره عطرية الرائحة لونها الى البياض || ازهاره يستمر من ايار الى ايلول وهو من النباتات التي ترغب في المعارض البحرية وتخشى الصقيع والاتربة القوية الاندماج .

٩٠٦٨ - خَزَام الصبَاغين * ، بَلِيَحَاء ، وِبْه Reseda luteola (S). Réséda des teinturiers, Gaude, Herbe aux Juifs (F). Dyer's weed, D. rocket, Weld, Yellow weed (E). Färberwau, Gelbliche reseda (D). Reseda dei tintori, Guada, Guaderella, Luteola, Erba gialla, Biondella (I).

نوع من الخزَام وهو نبات عشبي صبغي حولي يملو من

صغيرة تطول من ٢ الى ٧ سم. رؤوسها كبيرة. عيونها فارقة عند الشقين. قرونها الاستشعارية قصيرة. ملامسها صغيرة او ضامرة. كواسلها مستطيلة. بطونها شبه يرمعية الشكل. اثوابها ملونة. رواشها قسطانية التخضيب || الحشرة الجمالانة تعيش على رحيق الازهار وطمعها. اما اليرقة فمعظم انواعها يعيش على النجيليات فيؤذيها. اشهر اجناسها الخزباء والمريزة.

٩٠٨٤ - خَزَرْج Vent froid du sud (F). الخزرج: ريح الجنوب الباردة.

٩٠٨٥ - خَزَرْوَلَقِي Araignée mâle (F). الخزرنق ذكر العناكب الصغيرة القد. اما ذكر العناكب الكبيرة القد فيسمى خزنق.

٩٠٨٦ - خَزَرْز Bouquin (F). Buck-hare or rabbit (E). هو الارنب الذكر والقواع الذكر. ج أخزة وخزان.

٩٠٨٧ - خَزَرْف Poterie, Faïence (F). Pottery, Crockery, Earthenware (E). ما عمل من الآنية بالطين وشوي بالنار فصار فخاراً. الواحدة خزفة.

٩٠٨٨ - خَزَرْم، خَشْس Bouclage, Boucllement (F). Ringing (E). الخزم هو وضع الخزامة او الخشاش في انف الثور ليذل او في خطم الخنزير ليمتنع عن اثارة التراب.

٩٠٨٩ - خَزَرْم * ٥، كَنْتِيَّة Kentia (S). Kentie, Howée (F). جنس اشجار ليفية الجذع من فصيلة النخلات. مهدا البلاد الاسترالية الحارة. انواعها عديدة معظمها بري وبعضها تزييني يزرع في المراكن. جذوعها منتصبه رشيقة مستدقة. براعمها كثيفة. خوص سعتها ريشي التركيب، متقابل، مفلق، دقيق النصل اللامع المتدلي الاطراف || اشهر انواعه التزيينية ما يتبع.

٩٠٩٠ - خَزَرْمَة بَلْمُور Kentia balmorea, K. australis, Grisebachia (S). Kentie de Balmore, K. d'Australie, Palmier frisé (F). نوع من الخزم جذعها بطيء النمو يعلو نحو ١٢ م. برمتها كثيفة التجميع. سعتها يطول ٢٧٥ سم. خوصها الى الخضار الزاهي اللامع، تحجبه رجب التقويس. تعيش في المواقع الدافئة وتزرع في المراكن. لا تحشى الرطوبة.

٩٠٩١ - خَزَرْمَة فُورستري Kentia forsteriana (S). Kentie de Forsteri (F). نوع من الخزم جذعها بطيء النمو يعلو نحو ٥ امتار. برمتها متوسطة الكثافة. سعتها مستطيل الكرب، خوصها جميل الخضار الزاهي الفاتح. تحجبه ضعيف التقويس. تزرع في المراكن، ترغب في الاتربة الجيدة والرطوبة المستمرة.

٩٠٩٢ - خَزَرْمَة كَنْتِيرْبُورِي Kentia canterburyana, Hedyscepe canterburyana (S). Kentie de Canterbury, Hedyscepe (F). نوع من الخزم جذعها بطيء النمو يعلو نحو ٨ امتار. برمتها كثيفة. سعتها مستطيل الكرب. خوصها جميل

٩٠٧٥ - خَزَامِي ذَكَرِيَّة *، لَوْنْدَة ذَكَر، هَنَان Lavandula spica, L. latifolia (S). Lavande spic, L. mâle, Grande lavande (F). Common lavender (E). Lavendel, Breiter lavendel (D). Lavanda nardo Spico (I).

نوع من الخزامي تعلو من ٣٠ الى ٨٠ سم. اوراقها اهليلجية مستطيلة، رمادية النصل، طولها من ٤ الى ٥ سم. وعرضها نحو ٧ مم. ازهارها سنبل. سنابلها قصيرة وعفية. ازهارها بنفسجية. قناباتها ضيقة، وحيدة المرق الاوسط. تزرع بكثرة ويستخرج من اوراقها وازهارها دهن الخزامي المشهور.

٩٠٧٦ - خَزَامِي رِيْشِيَّة Lavandula pinnata (S). Lavande pennée (F). نوع من الخزامي وهي نجمة برية وزراعية تعلو من ٢٥ الى ٥٠ سم. اوراقها مستطيلة، مشرمة، ريشية، خلية النصل. سنابلها دقيقة تطول نحو ٨ سم. ازهارها صغيرة القد والاهان لونها الى الليلي يعلو موج اذرق.

٩٠٧٧ - خَزَامِي صُوفِيَّة Lavandula lanata (S). Lavande laineuse (F). نوع من الخزامي وهي نجمة برية تعلو من ٣٠ الى ٨٠ سم. اوراقها كاملة، لسنة، زباء النصل على صفحتيه، زغبها صوفي لبد. ازهارها سنابل صغيرة القد دقيقة. ازهارها زرق.

٩٠٧٨ - خَزَامِي مُسَنَّنة Lavandula dentata (S). Lavande dentée (F). نوع من الخزامي وهي نجمة برية تعلو نحو ٥٠ سم. اوراقها اهليلجية الشكل مسننة او مقرضة الحافة، نصلها ازغب الصفحة السفلى. سنابلها رجلة يعلوها ضمة من القنابات الملونة. ازهارها ليلية اللون طويلة الاذن.

٩٠٧٩ - خَزَامِيَّات Resedaceae (S). Résédacées (F). Resedaceae (E). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين. اجناسها ستة وانواعها نحو ٧٠ منتشرة في جميع الاصقاع المعتدلة الحارة. نباتاتها اعشاب وجنبات متعاقبة الاوراق البسيطة المنقطة الاذنية. ازهارها خشوية او وحيدة المسكن، عنقودية التجميع او سنبلية.

٩٠٨٠ - خَزْرَان Réservoir (F). Reservoir (E). بحقن خزن الماء.

٩٠٨١ - خَزَوْب الخزوب ورم يصيب الفرع عند انتشاج وقد يشبه الرجل.

٩٠٨٢ - خَزَرْبَاء * Chlorops (S). Chlorops (F). Gout fly (E). Halmflege (D). ذبابة من ذوات الجناحين صغيرة الغد لونها الى الصفرة المؤذرة بالاسمر. عينها الى الخضار اللامع. حلقها الصدرية الثانية سوداء. انواعها نحو ٦٠ منتشرة في جميع الاصقاع المعتدلة الحارة. انها تتمتع مكنها في اصول النجيليات وغيرها من النباتات الزراعية والبرية فينقف عن يرقات تنخر السوق وتعيش في داخلها.

٩٠٨٣ - خَزَرْبَائِيَّات Chloropidae (S). Chloropidés (F). Chloropidae (E). فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين. اجناسها وانواعها كثيرة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم. تألف الغابات والحقول المزروعة والمروج وضايف مجاري الماء || اجسامها



خزامي ذكرية



خزباء



خزم

الماء . عصارته لبنة عاجية اللون جحالية المادة يكثر فيها الحامض العنبري .

٩١٠٣ - خَسّ الغاب (S). *Lactuca perennis* (S).
Laitue vivace, Salade de Ilèye (F).

نوع من الخس التريبي المعمّر . يعلو من ٢٠ الى ٦٠ سم .
اوراقه كبيرة انحد ، مستطيلة ، عميقة التفريص .
نصلها رهل الصفحة . قليل التسنين . ازهاره عذقي
الشكل . ازهاره رؤسية زرقاء اللون ، ثلاثية او رباعية
التجميع || يزرع للتزيين .

٩١٠٤ - خَسّ النعجة (F). *Valerianella potagère* (F).
Milk grass (E). هي السنة ، بقلة زراعية من الناردنيات .

٩١٠٥ - خَسّ بحري* ، أشنة خَسّية

Ulva lactuca (S). *Ulve laitue*, *Laitue de mer* (F).
Sea lettuce, Sloke, Oyster green (E). *Lattichwatt*,
Meersalat (D). *Lattuga dj mare* (I).

نبات بحري من الطحيات الخضراء . اوراقه بحجم وشكل
اوراق الهندباء ، لكنها لزجة ، خالية من الصلغ والعروق .
تؤكل نيئة ومطبوخة . يسميها الروس « زبدة بحرية » .
يوجد قرب الشواطئ البحرية . يكثر في بعض بحار الشمال .

٩١٠٦ - خَسّ بري* ، خَسّ الزيت

Lactuca scariola (S). *Laitue sauvage*, *L. scariola*, *L. d'huile* (F). *Oil lettuce*, *Prickly lettuce* (E). *Stachel-*
lattich (D). *Lattuga salvatica* (I).

هو الخس البري المعروف . يستعمل في حلة مستحضرات
طبية لمعالجة الحلق والصدر . يستخرج منه زيت الخس
المشهور || يكثر بين الزروع وفي الاراضي البور .

٩١٠٧ - خَسّ بُسْتَانِي* *Lactuca sativa* (S).
Laitue cultivée (F). *Common lettuce* (E). *Lattich*,
Gartenlattich, *Kopfsalat* (D). *Lattuga* (I).

هو الخس الزراعي الشائع ، المشهور ، المأكول الاوراق ؛
يحتوي الشيء الزهيد من الفيتامينات ا و ب . لكنه يحوي
الكثير من الفيتامين (٤) || ضرره عديدة اخصها
الثلاثة التالية :

الخس الروماني *Lactuca sativa romana* (S).
Laitue romaine, *Chicon* (F).
اوراقه بيضيه ، اهليلجية ، متراكبة ، متراصة ،
لاحقة ، غليظة الصلغ الغزير العصارة .

الخس القلبي *Lactuca sativa capitata* (S).
Laitue pommée (F).
اوراقه بيضيه ، قلبية ، متراكبة ، فارشة . ضلعها
متوسط الغلاظة والعصارة .

الخس المجعد *Lactuca sativa crispa* (S).
Laitue crispée (F).
اوراقه كبيرة ، مستعرضة ، مجعدة النصل المتجمع .
ضلعها قليل الغلاظة والعصارة .

٩١٠٨ - خَسّ جَبَّار *Lactuca altissima* (S).
Laitue géante (F).

نوع من الخس البري الطبي . يعلو نحو ٨٠ سم . ساقه
غليظة غزيرة العصارة . عصارته لبنة لزجة تدعى حليب
الخس . تعتبر من المسكنات النافعة .

٩١٠٩ - خَسّ مُدَرّن *Lactuca tuberosa* (S).
Laitue tubéreuse (F).
نوع من الخس التريبي المعمّر . منته الشرق الاوسط .

الخضار الزاهي العابق . تحجيتها ضعيف التقويس || تعيش
في المواقع الدافئة وتزرع في النراكن ، ترغب في الاتربة
الرطبة الغنية بالدبال وبسائر المواد العضوية .

٩٠٩٣ - خَزّمة مورو

Kentia mooreana, *Clinostigma mooreanum* (S).
Kentia de Moore (F).

نوع من الخزم جذعها بطيء النمو يعلو نحو ١٠٠ سم .
برهتها كثيفة . سفعها مستطيل الكرب الدقيق بطول نحو
٦٠ سم . خوصها جميل الخضار الزاهي العابق . تحجيتها
ضعيف التقويس . وهي من النباتات السبروتية التي
تعيش وتنمو في جميع المواقع الدافئة .

٩٠٩٤ - خَزّمة يونس *Kentia joanis*, *Veitchia* (S).
Kentia joanis, *K. de Velt* (F).

نوع من الخزم جذعها بطيء النمو . تعلو من ٢٠٠
الى ٣٠٠ سم . برهتها كثيفة . سفعها مستطيل الكرب .
خوصها جميل الخضار الفسقي ، بنفسجي الحافة ، مدب
البزيم ، تحجيتها واسع التقويس || سبروتية في اقليمها
الطبيعي . ترغب في الاتربة الرطبة . تعتبر من النباتات
التزيينية الفاخرة . تزرع في المراكن .

٩٠٩٥ - خَزْن *Engrangement* (F). *Getting* (E).
هو خزن الحصيد والتبن وغيرها في السقيفة او التبان .

٩٠٩٦ - خَزّية *Minière d'or* (F). *Gold-mine* (E).
منجم معدن الذهب .

٩٠٩٧ - خَزْرِي

هو العوسج او الشوك الذي يحمل على قن الحيطان منعاً
للتسلق .

٩٠٩٨ - خَسّ *Lactuca* (S).
Laitue (F). *Lettuce* (E). *Lattich* (D). *Lattuga* (I).
جنس نباتات عشبية برية وزراعية من فصيلة المركبات
السينية الزهر . انواعه كثيرة سوقها غليظة القاعدة لبنة
العصارة . اوراقها متعاقبة وهي متراكبة في الانواع
الزراعية . ازهارها عنقودي التجميع منتصب الارتكاز
الهامي . ازهارها صغيرة القد صفراء اللون . ثمارها زور
مستدقة مستطيلة || أشهر انواعه ما يتبع .

٩٠٩٩ - خَسّ الحمار *Alkanna tinctoriale* (F).
Alkanet (E).
هو الكنهان ، اطلبه .

٩١٠٠ - خَسّ الحيطان *Lactuca muralis* (S).
Laitue des murailles, *Pendrille* (F). *Wall lettuce*,
Ivy leaved lettuce (E). *Mauerlattich* (D). *Lattuga*
montana (I).

نوع من الخس البري يكثر في الارض البور وبين
البيوت وعلى الجدران والحيطان . اوراقه متعاقبة ، كبيرة ،
مفرضة ، حاضنة . ازهاره عنقودي منتصب . ازهاره
صغيرة صفراء اللون .

٩١٠١ - خَسّ الزيت *Laitue scariola* (F).
Oil lettuce (E).
اطلب خس بري .

٩١٠٢ - خَسّ السّم* ، لبّينه

Lactuca virosa (S). *Laitue vireuse* (F). *Acrid lettuce*,
Wild lettuce (E). *Giftlattich*, *Wilder lattich* (D).
Lattuga velenosa, *Finocchio acquaiolo* (I).
نوع من الخس البري يعيش بين الزروع وقرب اقنية



خس الحيطان



خس السّم



خس بحري



خس بري



خس بستاني

٩١١٧ - خُشَاف Nid de frelons (F).
Hornet's nest (E).

الخُشَاف ج خشاوات . هي وكر الخُشَاف .

٩١١٨ - خُشَاف ، خُشَافَة

الردى من كل شيء . وما لا لب له من الشعر .

٩١١٩ - خُشَافِيَّات ٥ ، قُرُصِيَّات

Discomycetes (S). Discomycètes (F). Discomycetesi (E).
فصيلة فطور تنتمي الى مرتبة الفشيعيات ورتبة الزقيات .
اعسامها مغشاة بنكعة مكونة من التكتات والنكت . مقها
مصرعي الانفلاف ، انفلاقها سهبي اذا انشق عن
النكة ولا سهبي اذا انشق عن السمة || اجناسها وانواعها
عديدة ، منها رمية كبيرة الحجم كالغوشنة ومنها طفيلية
صغيرة ومجهرية ، تجمعها نحو ١٦ عمارة اعرفها اقتصادياً
وزراعيّاً : الدشيّات ، الدرمليّات ، الذعلبيّات ،
الربشيّات ، الربنيّات ، الرهفيّات ، الرهيبيّات ،
الروخيّات ، الزيميجيات والسقديّات .

٩١٢٠ - خُشَافَة Bestiole (F). Little animal (E).
خُشَافَة ج خشا : هوام الارض وحشرات .

٩١٢١ - خُشَاف ٥ Vesperugo (S).
Vespérugo, Vespertilions (F). Bats proper (E).
Dämmerungsmäuse (D).

جنس حيوان من فصيلة الخفاشيات . انواعه عديدة
رؤوسها مسترصة . فراطيسها مخروطية الشكل ، قصيرة
القد ، مقطومة . آذانها كبيرة ، ذلقة ، منفصلة . سنّها
مستطيلة . اجنحتها فارشة || موطنه العالم . معظم انواعه
يعيش في البلاد الحارة والمعتدلة . وبعضها يألف البلاد
الباردة . انثاه تضع جروين تحملها حتى الفطام اي
نحو ثمانية اسابيع || اعرف واشيع انواعه ما يتبع .

٩١٢٢ - خُشَاف الشَمَال ٥

Vesperugo borealis (S). Vespérugo boréal (F).
نوع من الخُشَاف طوله نحو ١٠٥ مم . بسطته ٢٧٠ ،
ذنبه ٤٧ مم . ثوبه الى السمرة الدخنة يعلوها ذر تيري
شديد اللمعة || موطنه البلاد الباردة . يعتبر من القواطع
البعيدة المجال ينزح الى شمال روسيه وفنلنده والناروج
ابتداء من شهر آب عندما يطول الليل . يألف اغنية
وسقوف البيوت الآهلة والمهجورة . يعيش جماعات
كثيرة العدد . مسرحه من الفسق الى الفجر . قوته
الحشرات على اختلاف انواعها .

٩١٢٣ - خُشَاف الغَسَق ٥ Vesperugo noctula (S).
Vespérugo noctule, Noctule (F). Noctule (E).

نوع من الخُشَاف كربه الرائحة طوله نحو ١٢٠ مم .
بسطته ٣٨٠ مم . وذنبه ٤٠ . ثوبه الى السمرة الخطية
الصفراء ، ظهره عابق المواج ، بطنه زاهره || موطنه
شاسع الاطراف يعم جميع المناطق المعتدلة الحرارة من
اليابان الى الهند والشرق الاوسط واروبه وافريقية .
يألف الاشجار الحرجية العروة . يعيش جماعات كثيرة
العدد . مسرحه من الغروب الى فحمة الليل . قوته
الحشرات على اختلافها ، احصها غمديّة الاجنحة .

٩١٢٤ - خُشَاف الليل ٥ Vesperugo serotinus (S).
Vespérugo séroclin, Sérotine (F). Serotine (E).

نوع من الخُشَاف طوله نحو ١٢٠ مم . بسطته ٣٥٠ مم .

يعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم . اوراقه كبيرة القد طولها نحو
٣٠ سم . وعرضها ٢٠ وهي خلبية الشكل حادة الاسنان
الشائكة . ازهاره عنقودي التجميع ، هامي الارتكاز .
ازهاره رؤسية بنفسجية اللون .

٩١١٠ - خُشَاف ٥ ، فَخَّاش البُنْدُق ٥

Nucifraga caryocatactes (S).
Casse-noix vulgaire (F). Nut-cracker (E).
Nusshäher, Tannenhäher (D).

طائر من فصيلة الغربان متوسط القد يطول نحو ٣٥ سم .
ثوبه الى السمرة الخطية العابقة يعلوها توشيم ابيض لاقياسي
الشكل تكاثر فيه الاستطالة كالاندا . رأسه وجناحاه
وذنبه الى السواد العابق تعلوه ماجة خضراء ورقشة خفيفة
لانظامية تحتل اطراف الريش . حدقة عينه الى السمرة
البندقية . منقاده ورجلاه الى السواد الفحمي || اعطانه
تشمل معظم جبال العالم القديم . يألف احراج الصنوبر
قوته الحشرات والرخويات وبعض العصافير وجلايبتها
والثمار والبزور واهصها البندق وصنوبر سمبرو || وهو
من الطيور المدخارة المحترسة التي تجمع في انايبر خاصة ،
ترتبها في تجاويف الاشجار او في اوقاب الصخور ، ما
استطاعت جمعه من بزور وثمار تسد بها ففة الجوع عند
الحاجة || وهو يتميز ايضاً بغدة جرابية مطاطة تتاخم
مدخل المسرط تستوعب قدر البيضة الكبيرة يستعملها لنقل
ما يرغب في اختزانه || يدفن عشه في الشربين والتنوب .
انثاه تحضن وحدها من ٤ الى ٥ بيضات .

٩١١١ - خُشَافَة Tare (S). Tare, Waste (E).
ثقل الوعاء .

٩١١٢ - خُشَاف Etoiles qui ne se couchent pas
الحسان هي النجوم التي لا تغرب كالجدي والقطب وبنات
نعل والفرقدن الخ ...

٩١١٣ - خُشَبُورَة Choriospore (F).
جنس نباتات عشبية ، حولية ، برية من فصيلة الصليبيات
مشهورة باسم ديسومة ، اطلها .

٩١١٤ - خُشَبُولِيَّات ٥ Alleculidae (S).
Alléculidés (F). Alleculidae (E).

فصيلة حشرات من مفدمات الاجنحة مختلفات الاجزاء .
اجناسها وانواعها المعروفة ومتوسطة العدد اعطائها بعض
مناطق البلاد المعتدلة الحرارة من الشرق الاوسط واروبه ||
اجسامها صغيرة شبه بيضية الشكل ، معتدلة التبسيط ،
معدبة الصفحات العليا . قرونها الاستشعارية خيطية مركبة
من ١١ فصلة . ارساغها الامامية رباعية الاجزاء والاعرى
خماسيتها || يكثر وجودها في البراري على الازهار وفي
المواقع اللغلة والحرجية . يرقات معظم اجناسها دامتة
وبعضها خاشب يعيش تحت اللحاء على الشكير .

٩١١٥ - خُشَفِيّ Nucifère (F).
Nuciferous, Nut-bearing (E).

نعت تعريفي يطلق على ما كان شكله كالجوزة .

٩١١٦ - خُشُوف Eclipse de lune (F). Eclipse (E).

خُشُوف القمر او انخساف القمر ظاهرة طبيعية تتميز
باحجاب ضوء القمر عن الارض وقد يكون ذلك عندما
تتوسط الارض بين الشمس والقمر .



خُشَاف



خُشَاف



خُشَاف الفسق



خُشَاف الليل

سرفتها تعيش على أوراق الدبساسيات والحمليات || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٤ مم. بسطتها تراوح من ٣٣ الى ٣٧ مم. رأسها صغير الجرم. عيناها كبيرتان. زباناها صولجانيان. مرشفها دقيق الجرم، معتدل الطول. جوشنها كستني اللون، جؤوي الموج. بطنها كستني اللون، اصفر الاطواق || رواشها، عند الشقين، الى المغرة الصفراء الموج يملوها بتقيج احمر واصفر واشقق وصنابي تعترضه خطوط متعرجة كستنية || لها جيل واحد في الحول. تظهر الفراشة في ايار. تسرح في النهار. تعاظم بعد ظهورها بنحو ثمانية اسابيع وتمتج المكن مباحداً على نصال اوراق النبات العائل || السرفة عند بلوغها الكمال الجسموري تطول نحو ٣٠ مم. جسمها اسطواني الشكل، مبعر الهلب. ثوبها الى الحنطي الاسمر يعلوه خيطان جانبيين من التزاويق الصفرة وخط ثبجي قاطب من الهلب المنشعب الشائك. رأسها اسود. شرجها مجهز بزائدة سفلية الارتكاز || طور الاكمال يستمر نحو ثلاثة اسابيع.



خشاف المتوسط

Bois (F). Wood (E).

٩١٣٠ - خَشَب

الحشب مادة ليفية متماسكة صلبة متوازية الاتجاه الطولي مختلفة الرقعة والاندماج والكثافة. تتألف منها سوق واغصان النباتات العليا. وهو يتكون عادة من عدة طبقات مرصوفة متشابكة متتالية مركزها القلب حنارها الشكير فالحاء || والخشب يقسم، بالنسبة الى استعماله، الى ثلاثة اقسام: ١) اخشاب الترميم وهي التي تستعمل في بناء البيوت والسفن ٢) الاخشاب الصناعية وهي التي تستعمل في مختلف الصناعات من صناعة الورق الى النجارة ٣) اخشاب الوقود وهي التي تستعمل للحريق || ويقسم الحشب ايضا بالنسبة الى تركيبه الحشمي واستعماله الصناعي الى ست فئات: الاخشاب الصلبة والمتوسطة الصلابة واللينة والدقيقة والراتنجية والغريبة كما هو مبين في الجدول اللاحق.



خشاف شرقي

تصنيف الاخشاب بالنسبة الى ماهيتها واستعمالها

١ - الاخشاب الصلبة

النوع	الرقم النوعي	من	الى
بندق، جلوز	٠٧٢٩	٠٦٢٠	٠٧٢٩
جوز	٠٨٠٠	٠٧٥٩	٠٨٠٠
زان	٠٩٠٧	٠٦٨٦	٠٩٠٧
سنديان اخضر	١١٨٢	٠٩٠٣	١١٨٢
سنديان مبدول	١٠٢٠	٠٥٧٢	١٠٢٠
سنديان مزند	٠٩٠٠	٠٦٣٣	٠٩٠٠
غرغار	٠٨٥٤	٠٦٠٣	٠٨٥٤
غرغار جبلي	٠٦٦٠	٠٦٠٩	٠٦٦٠
قندلي	٠٨٨٢	٠٥٣٦	٠٨٨٢
كستنه	٠٧٤٢	٠٥٥٠	٠٧٤٢
مران	١٠٠٢	٠٦٢٦	١٠٠٢
ميس، نشم	٠٧٨٨	٠٦٠٥	٠٧٨٨

٢ - الاخشاب المتوسطة الصلابة

اسفندان، قيقب	٠٨٤٢	٠٥٦٣	٠٨٤٢
او كاليبتوس	٠٧٢٦	٠٥٧٧	٠٧٢٦
بهشية	٠٩٥٢	٠٧٦٤	٠٩٥٢
توت	٠٧٧٢	٠٥٨٣	٠٧٧٢
دلب	٠٧٨٢	٠٦٤٢	٠٧٨٢
روبينية سنطية	٠٧٧٢	٠٦٦١	٠٧٧٢



خشالة

ذنبه ٥٥ مم. ثوبه الى السمرة الحنطية: ظهره فاحم الموج، بطنه زاهر فاتح || موطنه العالم بآسره، يوجد في آسية واروپة وافريقية وامريكة واسترالية || يألف الكهوف والمغاور وسقوف البيوت الالهة والمهجورة يعيش منفرداً، الذكر لا يقرب الانثى ويتبعها الى مرقعها الا عند الكوم. مسرجه من الغسق الى الفجر. قوته الحشرات على اختلاف انواعها.

٩١٢٥ - خُشَافُ الْمُتَوَسِّط *٥

Vesperugo pipistrellus (S). Vespérugo pipistrelle, Pipistrelle (F). Pipistrelle, Small bat (E).

نوع من الخشاف سريع الطيران والحركة. طوله نحو ٧٠ مم. بسطته ١٨٠، ذنبه ٣٣. ثوبه الى الصهبه الدخناء، وقدة اذنه مدية الشكل || موطنه حوض وجزر البحر المتوسط. وحوض البحر الاحمر والخليج الفارسي. يألف البيوت القديمة الالهة والمهجورة والحربة والاشجار الحرجية الدائمة العروة والكهوف والمغاور. يعيش جماعات قليلة العدد. مسرجه من الغروب الى فحمة الليل. قوته الذباب على اختلاف انواعه.

٩١٢٦ - خُشَافُ شَرْقِي *٥

Vesperugo abramus (S). Vespérugo oriental (F).

نوع من الخشاف يعتبر من القواطع له مشتاه في البلاد الحارة ومصيفه في المناطق المعتدلة. طوله نحو ٧٠ مم. بسطته ٢٠٠ وذنبه ٣٠، ثوبه الى السمرة الدخناء، ظواهره اعقب من خوافيه || يألف اغنية وسقوف البيوت القديمة من حربة ومهجورة ومأهولة التي يفضلها على الاشجار والكهوف. يعيش جماعات قليلة العدد تجتمع في مواعيد زواجها فتصبح اسراباً كبيرة مؤلفة من بعض المئات. مسرجه من الغروب الى الفجر. قوته الذباب والحوام وجميع الحشرات الصغيرة.

٩١٢٧ - خُشَافُ لَيْزْلِي *٥

Vesperugo leisleri (S). Vespérugo de Leisler (F).

نوع من الخشاف طوله نحو ٩٥ مم. بسطته ٢٨٠ ذنبه ٨٠. ثوبه حنطي داكن اصفر الموج || موطنه يعم جميع البلاد الاسيوية والاروپية والافريقية المعتدلة الحارة || يألف الاشجار الحرجية العروة. يعيش جماعات قليلة العدد. مسرجه من الغروب الى فحمة الليل. قوته الحشرات الغمدية الاجنحة.

٩١٢٨ - خُشَافُ مُسَنَّج *٥

Vesperugo kuhlii (S). Vespérugo marginé (F).

نوع من الخشاف، طوله نحو ٨٠ مم. بسطته ٢٢٥، ذنبه ٣٨. ثوبه الى السمرة الدخناء. ظواهره اعقب من خوافيه، بطنه اصفر الموج، جناحه موشح الاطراف تمشيحه الى البياض الاصفر || موطنه يمتد من الشرق الاوسط حتى فرنسه، يكثر في البلاد التي تلتاخم البحر المتوسط. يألف اغنية وسقوف البيوت المهجورة والآلهة. يعيش جماعات قليلة العدد. مسرجه من الغسق الى الفجر. قوته الحشرات والحوام.

٩١٢٩ - خَشَالَة *٥

Melitaea aurinia (S). Mélitée aurinie, Damier des scabieuses (F). Melitaea aurinia (E).

حشرة من فصيلة البشوريات ورقبة حرشفيات الاجنحة. موطنها بعض اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط والاقاليم الداخلية المتاخمة. فراشتها جارية قوتها رحيق الازهار.

القد ، أوراقها عروية ، متقابلة ، مركبة ، وريقاتها بيضية شفعية . أزهارها زرق . ثمارها صغيرة القد جلدية القشرة . بزورها صفر ، غروية اللباب || أخشابها شديدة الصلابة لا تقنى . يستخرج منها مواد راتنجية شائعة الاستعمال (اطلب عود الانبياء) .

٩١٣٤ - خَشَبُ الْمِسْك هو الرقاق الموهج ، اطلبه .

٩١٣٥ - خَشَبُ الْمَوْس Bois de cuir (F).
هو الدرکه ، اطلبه .
Leather-wood (E).

٩١٣٦ - خَشَبُ فِرْتَمْبُوك Bois de Fernambouc (F).
هو العندم البرازيلي ، اطلبه .
Brasil-wood (E).

٩١٣٧ - خَشَبُ مَر Quassia (F). Bitter ash (E).
هو الكاسيه ، اطلبه .

٩١٣٨ - خَشَبُوز ، كَسِيلُوز ، زِيلُوز Xylose
مادة سكرية تستخرج من قش الحنطة والذرة الصفراء وخشب الزان ونبات الطرفيل ، الخ ...

٩١٣٩ - خَشَبِين ، لِيْنِين Lignine, Lignone, Lignose (F). Lignin, Lignose (E).
هي المواد الكيماوية الطبيعية التي تغم النسيج النباتية الخشوية فتشبعها الصلابة وتعلملها القوة .

٩١٤٠ - خَشَخَاش Papaver (S).
Pavot (F). Poppy (E).

جنس نباتات عشبية حولية ومعمرة من فصيلة الخشخاشيات . انواعه كثيرة العدد منها البرية والتزيينية والصناعية . تتميز بمصارتها اللبية المخدرة . سوقها مخشوشة ، أوراقها حاضرة ، متقابلة ، متواجهة . نصلها رهل النسيج ، كثيف العروق والشرابين ، سناني الزام الاخير ، مفرض الحافة . أزهارها فردية مستطيلة الزناد . الزهرة كبيرة القد ، تويجها ثنائي الفصل القاعدية ، رباعي البتلات ، عديد الاسدية ، ضخم المبيض . ثمارها جراء تغلف البزور . الجرو الواحد يحضن من ١٥٠٠٠ الى ٣٠٠٠٠ بذرة صغيرة القد ، ككلوية الشكل ، حنطية او سمراء اللون || اشهر انواعه الزراعية ما يتبع .

٩١٤١ - خَشَخَاشْ أَبْيَض * ، رُمُان السَّعَالِي Papaver somniferum album (S). Pavot blanc, P. officinal (F). White poppy, White opium poppy (E).
Weisser mohn, Weisse pavot (D). Papavero bianco (I).

ضرب من الخشخاش المنوم . يزرع للتزيين ولإستخراج الافيون . افيونه يحتل المرتبة الثانية وجراؤه الجافة طيبة تحوى بعض المورفين وغيره من الجواهر الفعالة || يستخرج من بزوره زيت حريف يستعمل في صناعة الصابون .

٩١٤٢ - خَشَخَاشْ أَعْمَى * ، خَشَخَاشْ مَنُور ، عَمَى الدَّجَاج ، شَقَائِقْ حُمُر ، شَقَائِقْ النُّعْمَان

Papaver rhoeas (S). Pavot coquelicot, P. des moissons, Coquelicot, Ponceau (F). Corn poppy, C. rose, Field poppy (E). Feldmohn, Gartenmohn, Klatschrose (D). Papavero rosolaccio, P. dei campi, Citole (I).
نوع من الخشخاش البري والزراعي التزييني . ضروبه عديدة برها مبدول ينبت في الحقول وبين الزروع وقد يصبح عند كثرته من الاعشاب الضارة الواجب ابادتها . اما زراعتها فمختلف الاشكال والاحجام يعلو من ٢٥ الى ٨٠ سم . الوانه عديدة منها الابيض والوردي والاحمر

شرم مبدول ٠,٧٥٩ ٠,٩٠٢
قيقب حميزي ٠,٥٧٢ ٠,٧٣٧

٣ - الاخشاب اللينة

بتولا ، سندر ٠,٦٠٠ ٠,٦٣٠
حور ٠,٣٦٠ ٠,٤٨٠
حور رجراج ٠,٤٠٠ ٠,٥٠٠
زيزفون ٠,٤٨٦ ٠,٥٢٥
صفصاف ٠,٣٨١ ٠,٦٩٠
مفت ٠,٥١٠ ٠,٦٥٠

٤ - الاخشاب الدقيقة

اجاص ، كثرى ٠,٧٠٧ ٠,٨٣٩
بقس ، شمشاد ٠,٩٠٧ ١,١٦٢
تفاح ، سيب ٠,٨٠٩ ٠,٨٦٥
خوخ ٠,٧٨٠ ٠,٨٨٦
زيتون ٠,٧٦٠ ٠,٨٥٨
صربة الحابلين ٠,٦٨٨ ٠,٧٣٤
صربة مبدولة ٠,٨١٣ ٠,٩٣٩
غيراء برية ٠,٧٣٤ ٠,٩٣٨
قرونوس ٠,٦٢٠ ٠,٨٤٠
كرز بري ومحلب ٠,٥٨٠ ٠,٧٨٥
مشمش ٠,٧٨٦ ٠,٨٩٤
تبق ٠,٧١٠ ٠,٨٢٦

٥ - الاخشاب الراتنجية

ايبسه ٠,٣٣٧ ٠,٥٧٩
ارز لبنان ٠,٤٥٠ ٠,٦٤٦
تنوب ٠,٣٨٠ ٠,٦٤٩
زرنب ، طقسوس ٠,٤٧٠ ٠,٨٩٦
شريين ٠,٦١٦ ٠,٦٤٦
صنوبر اسود ٠,٥١٤ ٠,٨٩١
صنوبر بحري ٠,٥٢٤ ٠,٧٦٩
صنوبر بري (برز) ٠,٤٠٥ ٠,٨٢٨
صنوبر حلبي ٠,٥٣٢ ٠,٨٦٦
صنوبر يموت ٠,٣٢٠ ٠,٤٨٧
لزاب ، عرعر ٠,٥٥٠ ٠,٧٩٠
ملز ، لاريس ٠,٤٤٨ ٠,٦٦٨

٦ - الاخشاب الغريبة

ابنوس ١,١٩٠ ١,٢٣٠
بلاذر ١,٠٦٥ ١,١٠٥
بليستدر ١,١٥٠ ١,١٩٠
خشب الورد ١,٠١٠ ١,٠٥٠
ساج ١,٠٨٥ ١,١٢٥
عود الانبياء ١,٣٠٥ ١,٣٤٥

٩١٣١ - خَشَبُ أَخْضَر Bois satin (F).
هو الخطبان ، اطلبه .
Satin-wood (E).

٩١٣٢ - خَشَبُ أَصْفَر Virgillier tinctorial (F).
هو الخطر الصباغي ، اطلبه .
American yellow-wood (E).

٩١٣٣ - خَشَبُ الْقَدِيسِن * ، غَيَّاك Guaiacum sanctum (S). Gaïac, Gayac, Bois saint (F).
Lignum-vitae, Holy-wood tree (E). Heiliges holz (D).
Legno santo, Guaiaco (I).
نوع من عود الانبياء وفصيلة الفرقديات . اشجاره صغيرة



خشب القديسين



خشخاش ابيض



خشخاش اعمرى

٩١٥٠ - خَشَخَاش كلیفورنیة *

Papaver californicum, Eschscholtzia californica (S). Pavot de Californie, Eschscholtzie de Californie, Globe du soleil (F). Californian poppy (E). Californische escholtzie, Goldmohn (D). Papavero di California, Escolzia di California (I).

نوع من الخشخاش الطبي التريبي. مهدد كلیفورنیة. جذوره غليظة يستخرج منها عصارة ذهبية اللون لها استعمالها الطبي. ساقه فرعاء تعلو نحو ٦٠ سم. أوراقه متعاقبة مستطيلة مفرصة النصل. أزهاره جميلة الشكل قطرها نحو ٥ سم. بتلاتها صفر القاعدة، حمر الاطراف. تتأثر بالعوامل الجوية، تنبلج وتفتح مع الرطوبة. تنقل وتنطبق مع الجفاف || وهذا النبات ينمو بجذوره وسوقه وأوراقه وأزهاره يحوي ما لا يستهان به من مادة المورفين.

٩١٥١ - خَشَخَاش مُقَرَّن

Glauc à fleurs jaunes (F). هي الماميا الصفراء، اطلبها.

٩١٥٢ - خَشَخَاش مُنَوَّم *، خَشَخَاش أَجْمَر، خَشَخَاش أَسْوَد، أَسْرُ النَوَّم

Papaver somniferum (S). Pavot somnifère, P. des jardins, Eillette (F). Poppy, Opium poppy (E). Schlafmohn, Opium-mohn (D). Papavero somnifero, Gran papavero, P. da oppio (I).

نوع من الخشخاش الزراعي الحولي. ضروبه عديدة أشهرها الابيض. جذوره وثنية. سوقه منتصبه تعلو من ٧٠ الى ١٠٠ سم. أوراقه حاضنة متعاقبة. نصلها متاوج الصفحة، مسن الحافة. أزهاره كبيرة القند. ألوانها تختلف مع الضروب فيها الابيض والاحمر والاصفر. يوجد في جميع الأتربة المتوسطة الاندماج الموزونة التركيب الغنية بالمواد العضوية وعنصر الآزوت والحامض الفسفوري واليوتاس والكلس || يستخرج من جرائه الافيون على الشكل التالي: عند سقوط التويجات الزهرية، تجرح الجراء يومياً لاستنزاف عصارتها التي تلتقط وتعرض للشمس حتى تمام جفافها واستمرار لونها فتفقد اذ ذاك نحو ٤٠٪ من وزنها الاصلي || اما الافيون فيحوي من ٥ الى ٢٢٪ من المورفين ومن ٢ الى ١٢٪ من المواد شبه القلوية. (راجع افيون) || انتاج الدم يراوح من ١٥٠٠ الى ٢٠٠٠ غرام افيون. ومن ١٢٠ الى ٢٠٠ كيلو بزر متوسط مقدوره الزيتي نحو ٤٠٪.

٩١٥٣ - خَشَخَاشِيَّات

Papaveraceae (S). Papaveracées (F). Papaveraceae (E). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين كثيرة القعالات تشمل بعض الاجناس والعديد من الانواع. جميعها نباتات عشبية حولية ومحولة ومعمرة. أوراقها مختلفة الاشكال والتفريض والانتظام. أزهارها طرفية مجتمعة او منفردة، رباعية البتلات، عديدة الاسدية. ثمارها جراء. بزورها دقيقة. عصارة معظم نباتاتها لينة طيبة ومخدرة || أشهر اجناسها الخشخاش.

٩١٥٤ - خَشَخَاشِيَّة Argémone (F). Devil's fig (E).

هي الارغون نبات طبي وريبي، اطلبه.

٩١٥٥ - خَشَخَاشِين Papavérine (F).

Papaverin (E). العنصر الفعال الموجود في الخشخاش وهو شبه قلوي من الافيون.

والقرمزي الاسود القاعدة والمنقط بالاسود والاصفر. ازهاره يستمر من ايار الى تموز.

٩١٤٣ - خَشَخَاش إفریقی

Papaver rupifragum (S). Pavot casse-pierres (F). نوع من الخشخاش المعمر التريبي. ضروبه اربعة تعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم. سوقها قوية منتصبه. أوراقها الى الحصار الزاهي. أزهارها فردية او ثلاثية التجميع، كبيرة القند، قطرها يراوح من ١٢ الى ١٥ سم. بتلاتها وردية او أرجوانية او قرمزية اللون. جراؤها خلية البشرة. سماتها من ٦ الى ٨ || ازهاره قصير الامد يستمر شهراً واحداً.

٩١٤٤ - خَشَخَاش العَجَم

Papaver persicum (S). Pavot de Perse (F). نوع من الخشخاش الحولي التريبي. يعلو نحو ٥٠ سم. أوراقه مخرمة الحافة، اهليلجية النصل، بحرية اللون. أزهاره الى الجوة، تعلو قاعدة بتلاتها مشحة خضراء عابقة تخف مع انتشارها || ازهاره قصير الامد يستمر شهراً واحداً.

٩١٤٥ - خَشَخَاش زَغْبَر

Papaver pilosum (S). Pavot velu (F). نوع من الخشخاش المعمر التريبي. يعلو من ٨٠ الى ١٠٠ سم. ساقه قوية، منتصبه، زباء، مورقة. أوراقه مخرمة النصل، زاهية الحصار. أزهاره عذقية التجميع متوسطة القند متعددة الالوان فيها الابيض والارجواني والمرقش. جراؤه مزغبة البشرة، سماتها من ٦ الى ٧. ازهاره يستمر طوال الصيف.

٩١٤٦ - خَشَخَاش شَائِك

Papaver aculeatum (S). Pavot épineux (F). نوع من الخشخاش الحولي التريبي. يعلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. ساقه منتصبه شائكة. أوراقه كبيرة مستطيلة مفرصة، نصلها هليبي البشرة. أزهاره فردية صغيرة القند. قطرها نحو ٥ سم. لونها الى الاحمر المختلف الموج. جراؤه بيضية الشكل، صغار القند، ملس البشرة. ازهاره ربيبي.

٩١٤٧ - خَشَخَاش شَرْقِي

Papaver orientale (S). Pavot d'Orient, P. de tournefort (F). نوع من الخشخاش المعمر التريبي. ضروبه عديدة تعلو من ٨٠ الى ١٣٠ سم. سوقها قوية، منتصبه، زباء. أوراقها مستطيلة خلية النصل المشرم. أزهارها فردية كبيرة القند، قطرها نحو ١٥ سم. ألوانها متعددة. ازهاره ربيبي وصيني وخريبي.

٩١٤٨ - خَشَخَاش عَيْن الطَاوُس

Papaver pavoninum (S). Pavot œil de paon (F). نوع من الخشخاش الحولي التريبي. يعلو نحو ٣٠ سم. أوراقه ريشية مخرمة. أزهاره أرجوانية تعلوها دوائر سود طوقية عيونية. جراؤه بيضية، صغيرة، هليبي البشرة. سماتها من ٤ الى ٧ || ازهاره يستمر طوال الصيف.

٩١٤٩ - خَشَخَاش فِلِيقِي

Glaucienne (F). هي الماميا الحمراء، اطلبها.



خشخاش كلیفورنیة



خشخاش منوم

٩١٦٧ - خُشَيْلَاءُ سَهْمِيَّةُ النَّصَلِ °

Xanthosoma sagittaeifolium (S).

Xanthosome à feuilles sagittées (F).

نوع من الخشيلاء. منبتها الاقاليم الاستوائية. تعلق من ١٠٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها مستطيلة المعاليق الخضراء، كبيرة النصال التي تطول من ٣٠ الى ٦٠ سم. سهمية الشكل، ذرية الفلق الجانبية. ضبتها اقصر من شرعافها الذي يطول من ١٦ الى ١٨ سم. وهو الى الخضار الاطحل الموج.

٩١٦٨ - خُشَيْلَاءُ

Myosurus (S).

Myosure (F). Mouse-tail (E).

جنس نباتات عشبية، برية، حولية من الشقاريات وفصيلة الشقيقيات. انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها المناطق الباردة وجبال البلاد المعتدلة الحرارة || سوقها قصيرة. اوراقها جذرية، خطية، مستطيلة النصال الجامدة. ازهارها صغيرة، فردية، صفراء اللون، خضراء الموج، خاسية الفصل والبثلاث. فصلها مهازية القواعد. بثلاثتها ذات محالب، وقواعدها مجهزة بمسام انبوبية الشكل منفرية يجرسها النحل || تنويرها ربيمي.

اعرف انواعها الخشيلة القرمة المشهورة باسم ذنب الفار.

٩١٦٩ - خُصَّ

Magnanerie (F).

Silkworm nursery (E).

سقيفة من قصب مرصوفة الجدران هردية السقف تشاد لتربية دود القز.

٩١٧٠ - خُصَّ

Compéter (F).

To be within the competence (E).

تعبير حقوقي يراد به الادخال في الاختصاص اي الصلاحية.

٩١٧١ - خِصَاءٌ ، مَتْنٌ

Castration (F).

Castration, Gelding (E).

القضاء على الغدد التناسلية في الذكر او الانثى من الحيوان.

٩١٧٢ - خِصَاءُ الْفِرَاحِ ، قَطُّشٌ

Chaponnage (F).

Caponizing (E).

عملية سل الحسيتين تم بشق خاصرة الديك اليسرى قرب رأس الفخذ حيث توجد الحسية اليسرى وخلفها اليمنى.

الفراخ المخصية تدعى مقاطيش واحدها مقطوش.

٩١٧٣ - خُصَاصَةٌ

ما يبقى في الكرم بعد قطافه ج خصاص.

٩١٧٤ - خُصْبٌ ، إِمْرَاعٌ

Fertilité (F). Fertility (E).

قابلية التربة للمحاصيل المنتظمة الجيدة الاتاة.

٩١٧٥ - خُصَرٌ

le Froid (F). the Cold (E).

الخصر البارد الصناعي في جميع استخداماته وطرق استعماله.

٩١٧٦ - خُصَلِيَّاتُ الْخَيْاشِيمِ

Lophobranches (F).

رتبة من الاسماك العظمية غير المأكولة. فصائلها ثلاث واجناسها ١٦. سفنها غليظ مصفح. اخطامها انبوبية خالية من الاسنان. خياشيمها خصلية التركيب والشكل يجننها تجويف وقبي ضيق الفوهة.

٩١٥٦ - نَحْشَرَم

Frelons (F). Hornets (E).
النحشرم: جماعة الزناير. قال الاصمعي لا واحد له من لفظه.

٩١٥٧ - نَحْشَش

Gazelle (petite) (F).

Gazelle (young) (E).

النحشش هو الغزال الصغير القد.
٩١٥٨ - نَحْشَفٌ ، نَحْشَيْفٌ
Grésil (F). Sleet (E).
حببات من الجليد الابيض سهلة الفت تسقط مع الثلج مختلفة الاشكال قطرها من ٣ الى ٥ مم.

٩١٥٩ - نَحْشَفٌ ، نَحْشَفٌ ، نَحْشَفٌ

Faon (F).

Fawn (E).

ولد الظبي اول مشيه وقيل هو طلاء ثم خشف ثم رشا.

٩١٦٠ - نَحْشَفَةٌ خَضْرَاءُ *

Lucilia caesar (S).

Lucilie verte, Mouche verte de la viande (F).

هي ذبابة اللحم الخضراء. طولها نحو ١٠ مم. ثوبها الى الخضار المذهب. تكثر في الصيف. يرقاتها تعيش على اللحم والجيف.

٩١٦١ - نَحْشَقَاءُ

Yack (F). Yak (E).

جنس ابقار وحشية تعرف بالقطاس موطنها بلاد التبت. راجع قطاس.

٩١٦٢ - نَحْشَلٌ

Elimination

النحل والتخثيل: ابعاد او منع تكاثر الهاليج النباتية التي لا تنى بالغاية المطلوبة.

٩١٦٣ - نَحْشَلٌ

Coquille d'œuf (F).

Shell (empty egg) (E).

النحل: البيضة اذا اخرج ما في جوفها.

٩١٦٤ - نَحْشَنَاءٌ ، نَحْشِينَةٌ

Lavatière (F).

Tree mallow (E).

هي الحبارى النوار، اطلبه.

٩١٦٥ - نَحْشَيْلَاءُ °

Xanthosoma (S).

Xanthosome (F). Xanthosoma (E).

جنس نباتات عشبية معمرة حلبوية العصارة من فصيلة القلقاسيات. مهدا بعض الاقاليم الاستوائية الاسيوية والافريقية || انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها قريبة الشبه بأذان الفيل. سوقها عسقلية. اوراقها قرصية التجميع، مستطيلة المعاليق، كبيرة النصال، رحيمة الشكل، تكسوها مادة طيسلية غبراء اللون || تزرع للتزيين ضمن البيوت وفي المواقع التي لا تحصى البرد. ترغب في الاتربة المناسبة التركيب المنصري، الوافرة المواد العضوية والازوت.

اعرف انواعها واشهرها التالية:

٩١٦٦ - نَحْشَيْلَاءُ بِنَفْسَجِيَّةٌ °

Xanthosoma violaceum (S).

Xanthosome violacé (F).

نوع من الخشيلاء. تعلق من ٦٠ الى ٨٠ سم. اوراقها مستطيلة المعاليق البنية اللون، البنفسجية الموج. نصالها كبيرة القد تطول من ٢٠ الى ٤٠ سم. فلقها الجانبية مستديرة الزوايا. شرعافها يطول نحو ٢٥ سم. زنادها بنفسيجي اللون، نصله الى الصفار الكبيرتي يعلوه موج تبني.



خشفة خضراء



خشيلاء بنفسجية

يألف المواعظ الرطبة حيث تكثر الحشرات . يدرأ فحوصه في التراب بين الصخور الشائعة الشارقة . ولكنه يضم من الافحوص الواحد الى نحو ٣٠ تجتمع فيه الاناث للبيض والترحيم || اعرف انواعه واشهرها الخضار المبذل والخضار القرمزي .

٩١٨٨ - خُضَار قِرْمِزِي * ، وَرَوَار قِرْمِزِي ، وَرَوَّر قِرْمِزِي

Merops nubicus (S). Guêpier écarlate, G. superbe (F). Blue cheeked bee eater (E).

نوع من الخضار موطنه غابات وأدغال افريقية الغربية . طوله نحو ٢٠ سم . ظهره احمر مدمى . بطنه وردي . رأسه ونحوه الى الخضرة الزرقاء . عينه حمراء مكحلة الحاجب الازج الممتد من فتحة المنقار الى اسفل القفن . اياهه سود . افنيكه اخضر اللون ، ازرق الموج . زمكه اخضر اطحل || سربه يعد من ٦٠ الى ١٠٠ . اناته تبيض وتخصن من ٤ الى ٥ بيضات . وكها يحوى من ٥ الى ٣٠ افحوصاً .



خصيف باربانوم

٩١٨٩ - خُضَار مَبْدُول * ، وَرَوَار مَبْدُول ، وَرَوَّر مَبْدُول

Merops aplaster (S). Guêpier commun, G. vulgaire (F). Common bee eater (E).

نوع من الخضار طوله نحو ٢٦ سم . ثوبه اسمر كستنائي يعلوه موج اخضر . جهته الى البياض الاخضر . عينه حمراء . منقاره اسود . نحوه الى الصفار المذهب يحوق به اطار اسود . صدره وبطنه الى الازرق الاخضر . جناحه اصهب الوسط عابقه ، زيتوني الاطراف والذنب . موطنه فسيح الاربعاء ، يحوب البلاد من الهند الى اربعة وافريقية الشمالية || اناته تبيض في حزيران من ٤ الى ٥ بيضات تخصنها وحدها نحو ثلاثة اسابيع || سربه متوسط العدد ، يعد من ٢٠ الى ٦٠ || يعتبر من الطيور المؤذية لانه يلتهم النحل بشراهة .



خضار قورمي

٩١٩٠ - خُضَارِي هو البط الوحشي ، اطلبه .

٩١٩١ - خُضَارِيَّات Meropidae (S). Méropidés (F). Meropidae (E).

فصيلة طير من الجواثم ملتصقات الاصابع ورقبة ضوؤضيات الشكل . انواعها المعروفة ٢٥ اعطانها معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة من العالم القديم واسترالية || معظم انواعها آبد وبعضها ضارب وقاطع . ملجئها الحياتي جماعي . اسراها متفاوتة العدد . قوتها الحشرات المختلفة الانواع اخصها الخشرم والنحل || اجسامها رشيقة ، متباينة القد ، تطول من ١٦ الى ٣٠ سم . رؤوسها معتدلة الجرم . عيونها مكحلة . مناقبها مستطيلة ، ذرية . اجنحتها مستطيلة ، ذلقة . اذانها طويلة تتوسطها رفلتان كبيرتان ناشرتان . تتميز باصابعها الثالثة والرابعة الملتصقة بحظاب يمتد حتى الزام الثالث . انواها جميلة متراكبة الالوان الزاهية البراقة . اشهر اجناسها الخضار .



خضار مبدول

٩١٩٢ - خُضَاص Collier (F). Collar (E).

الخضاص حزام من جلد او نحو يطوق عنق الكلب او السنور .

٩١٩٣ - خُصَالَة Psychrométrie (F). Psychrometry (E).

قياس رطوبة الهواء .

٩١٧٧ - خُصْم ، قُطْع Escompte (F). Discount (E). هو ما يستفيدة من عليه دين آجل اذا دفعه قبل حلول اجله .

٩١٧٨ - خُصَي الثَعْلَب ، خُصَي الكَلْب

هو السحلب ، اطلبه . Orchis (F).

٩١٧٩ - خُصِي Châtré, Châtron, Chapon (F). Emasculate, Castrated, Capon (E).

هو الذي سلت خصيتاه .

٩١٨٠ - خُصَيَان الجَمَل Moricandle (F). Moricandia (E).

هو الحم ، اطلبه .

٩١٨١ - خُصِيَة Testicule (F). Testicle (E).

الغدة التناسلية في الذكر وهما خصيتان يحويهما الصفن وتفرزان النطفة والمني والوداف عند الرجل . والشلخ عند الحيوان عامه . والصلوك عند الدواب والذنين عند الحشرات والكراض عند الطير والزكية عند الحشرات والرول عند السمك .

٩١٨٢ - خُصِيف ، بَسِيوم Pythium جنس فطور مجهرية من عمارة الخسيفيات وفصيلة الصنانيات . انواعه عديدة اكثرها لا مؤذية وبعضها قليل الاذى . اشهرها خصيف باربانوم .

٩١٨٣ - خُصِيف بَارِبَانُوم * ، دُوبَان

Pythium de Baryanum (S). Fonte des semis (F). Damping off and stem rot (E). Wurzelbrand (D). فطر من الخسيف يركب نواحي النبات فيؤذيها . مظهره الخارجي عقونة غبراء اللون ، شفاقة المشيج ، تغشى الاجزاء النامية فتعطلها || من النباتات الزراعية التي يؤذيها : الذرة والدخن والنفل وقد يقضي على مشاتل الشوندر والتبغ اذا اصابها عند كوثها || يكافح باستعمال المساحيق النحاسية الكبريتية .

٩١٨٤ - خُصِيفِيَّات Pythiées (F).

عمارة فطور مجهرية من فصيلة الصنانيات . تتميز بوجود القسم الاكبر من مشيجها خارج دعامة . ومشيجه يستطيع اجتياز الخلايا وهو عديم المراسف . تكاثرها بوغي ويضي || انواعها عديدة منها رمية تعيش على المواد العضوية المنحلة ومنها طفيلية تعيش على النباتات العليا دون ان تلحق بها شديد الاذى .

٩١٨٥ - خُصِيْن Hachette (F). Hachet (E). الفأس الصغيرة ، ج خصن .

٩١٨٦ - خُضَاب ، شِقَاح Pigment كل مادة صبغية عضوية تلون النسيج .

٩١٨٧ - خُضَار ، وَرَوَار ، وَرَوَّر

Merops (S). Guêpier (F). Bee eater (E). جنس طير من الخضاريات يحوب البلاد في طلب الرزق . انواعه قليلة تتميز برشاقة اجسامها وزهاء الوانها ، باستطالة مناقيرها المقوسة الدقيقة الملاقط ، بارساغها القصيرة ، باجنحتها المستطيلة الذلقة وباذنابها الطويلة المقطومة التي تملؤها وتخرج منها ريشتان فارقتان || حياته جماعية يعيش اسراباً كبيرة يراوح عدد افرادها من ٢٠ الى ١٠٠ . قوته الحشرات على اختلاف انواعها اخصها الخشرم .

٩١٩٤ - خَضَامَة ٥

Thalassographie, Océanographie (F).
Thalassography, Oceanography (E).

علم يبحث في عظم البحار ونبوتها .

٩١٩٥ - خَضَب ، خَضِيب (F).
Chlorophyll (E).
هي المادة الخضراء في النبات .

٩١٩٦ - خَضَد (F).
Flétrissement (F).
Fading, Withering (E).

هو التوهن والضعف في النبات وهو ضمور الثمار وأزواؤها .

٩١٩٧ - خَضْرَة (F).
Légume (F). Vegetable (E).
جماع النباتات الخضرية من احرار البقول وغيرها التي تصلح بكاملها او بجزء منها لغذاء الانسان .

٩١٩٨ - خَضْرَم (F).
ولد الضب اوله حسل ثم مطبخ ثم خضرم ثم غيداق ثم ضب .

٩١٩٩ - خَضْرَم (F).
Saumâtre (F). Brackish (E).
هو الماء الاجاج بين الحلو والمر .

٩٢٠٠ - خَضْرِي (F).
هو البط الوحشي ، اطلب .

٩٢٠١ - خَضْرِيَج (F).
Culture de pastèque (F).
الخضريج : المبطخة اي المكان الذي كثرت فيه زراعة البطيخ .

٩٢٠٢ - خَضْعَة (F).
النخلة التي تنبت من النواة . ج خضع .

٩٢٠٣ - خَضَل ، خَضَل ، أَخَضَل (F).
Humecter (F). To humectate (E).
خضل وخضّل وأخضّل الشيء : ندهاه حتى ابتل .

٩٢٠٤ - خَضَلَف (F).
Balsamea myrrha (S).
Balsamée, Myrrhe d'Afrique (F). African myrrh tree (E). Afrikanischer myrrhen baum (D). Albero del mirra d'Africa (I).

نوع من المقل وهو جنبة برية من فصيلة البخوريات . اعطائه البلاد الحارة . يكثر في السنغال والهند ومدغشقر وعلى شواطئ البحر الاحمر || يستخرج منه نوع من المر لا يقل جودة عن مر المقل والقطف والقفل .

٩٢٠٥ - خَضَلَة (F).
Perle fine (F). Real pearl (E).
الخضلة هي الدرة الصافية . ج خضل وخضّل . قالت امرأة للحجاج « تزوجني هذا على ان يعطيني خضلاً نبيلاً » اي لؤلؤاً صافياً كثيراً .

٩٢٠٦ - خَضِين ٥ (F).
Eburné (F). Eburnean (E).
نعت تعريفى يطلق على ما هو ناتج عن التخضين او ما هو شديد الشبه بالعاج .

٩٢٠٧ - خَضُور (F).
Verdet (F).
وصم عاطب شديد الوقع يصيب مطر الذره سببه فطر مجهرى يدعى فحمة الذره .

٩٢٠٨ - خَضِيب (F).
Chlorophyll (F). Chlorophyll (E).
الخضيب والخضب هي المادة الخضراء في النبات .

٩٢٠٩ - خَضِيْنَد الشجر الذي قطع شوكه .

٩٢١٠ - خَضِير ، مَخْضَرَة ، يَخْضُور

Gazon (F). Grass (S).
العشب الاخضر الصغير الكثيف يغطي التربة . وهو ايضاً الارض الكثيفة العشب الاخضر المعمر .

٩٢١١ - خَضِير * ، خَضِيرِي

Chloris chloris, Fringilla chloris, Ligurinus chloris (S). Verdier, V. ordinaire (F). Greenfinch (E). Grünfink (D).

طائر من العصفير من فصيلة الشرشوريات ورتبة الجواثم المحروطيات المناقير . موطنه آسيا الوسطى والشرق الادنى وبعض الاقطار الاروبية || طوله نحو ١٥ سم . ثوبه الصيبي ازهى من الشتوي . منقاره غليظ ، قصير . رأسه وكامل القسم الاعلى من جسمه الى الخضار الزيتوني . زوره وبطنه الى الخضار الاصفر . جناحه الى الريدة . قوادمه صفر . اباهره سود . ذنبه اصفر واسود || يألّف الغابات الرطبة والجنانث وضفاف الانهر . قوته الحبوب والبرور . يرغب في القنبر وبزر الكتان والسلجم وبرور العنب . يدنّ عشه في الاشجار والجنابات الظليلة . اناته تبيض من مرتين الى ثلاث مرات بالسنة ، الاولى في اواسط نيسان والثانية في حزيران والثالثة في آب . تضع في كل مرة من ٤ الى ٦ بيضات تحضنها وحدها نحو الاسبوعين .

٩٢١٢ - خَضِيرَة *

Bunias orientalis (S). Bunlade, Bunier, Roquette turque (F). Hill mustard, Turkish rocket (E). Hohe zackenschote (D). Bunia orientale (I).

نبات عشبي بري معمر من فصيلة الصليبيات . ساقه واوراقه زباء البشرة . يكثر في الحقول والمروج . ترغب فيه الماشية ، ترعاه وتختلفه .

٩٢١٣ - خَضِيرَة (F).
Lotier de Palestine (F).
اطلب لوطس فلسطيني

٩٢١٤ - خَضِيرَة صوت الخيل من بطونها .

٩٢١٥ - خَضِيرَة (F).
Jardinet (F). Small garden (E).
البستان الصغير خصص للبقول والزهور .

٩٢١٦ - خَضِيرَة * (F).
Streptocarpus (S).
Streptocarpe (F).

جنس نباتات عديمة الساق برية وتزيينية من فصيلة الجسنيريات . مهدا افريقية الجنوبية وقد انتشرت زراعتها في معظم البلاد الحارة || انواعها المعروفة سبعة . سوقها مقرة . اوراقها فريشة ، قرصية الانتشاب ، معنقة ، كبيرة النصل المتمتع اللامتساوي الانقسام ، الجميل الخضار ، الفستقي الموج . شماريحها الزهرية عديدة وكل شمراخ يحمل من زهرة الى زهرتين . ازهارها بحيلة ، بوقية ، خماسية البتلات ، عديدة الالوان فيها الابيض والاصفر والبرتقالي والارجواني . ثمارها لولبية الشكل || زراعتها لا تستوجب عناية خاصة لكنها تخشى البرد .

٩٢١٧ - خَضِير ٥ (F).
Eburine (F). Eburnean (E).

الخضين مادة صلبة مركبة من مسحوق العظام والعاج يصار الى مزجها وتحثيرها وتجفيفها في افران خاصة .



خضير



خضيرة



خضيمة



خطاف الشط



خطاف الشواقي



خطاف المتوسط

٩٢٣٨ - خطاف ، تقصير Faute (F). Fault (E).
هو في القانون المدني عدم تنفيذ التزام ما وذلك اما بالعجز او بالامتناع عمداً او سهواً .

٩٢٣٩ - خطاف ، سنونو ، عصفور الجنة ، زوار الهند Hirundo (S).
Hirondelle (F). Swallow (E).

جنس طير من القواطع وفصيلة الخطافيات . انواعه المعروفة نحو ٨٠ موطنها العالم تتميز بمنقارها الصغير القصير المستقيم . اجنحتها مستطيلة ذلقة . اذناها فرقة واسعة البين . ارساغها نحيلة . اصابعها لامتناهية الطول ، تفاريجها عارية ضيقة || قيل في وصفها :
« كن زاهداً فيها حوته يد الوري
تفسي الى كل الانسام حبيباً »
« او ما ترى الخطاف حرم زادهم
اضحى مقيماً في البيوت ربيسا »
اشهر انواعه ما يتبع .

٩٢٤٠ - خطاف البحر Sterne (F). Tern (E).
هو الخرشنة ، طائر مائي ، اطلبها .

٩٢٤١ - خطاف الشط* ، سنونو الشط ، خطاف الجرووف

Hirundo riparia, Cotyle riparia (S). Hirondelle de rivage, Cotyle (F). Sand martin (E).
نوع من الخطاف صغير القد طوله نحو ١٢ سم . بسطته ١٨ سم . رأسه وظهره الى الصهبة السمر . زوره وصدره وبطنه وزبكه الى البياض الاخير . عيناه ومنقاره سود || يألف الشطوط وصفاف الانهر . يدن عشه في افحوص يديره بين شقوق الحيطان والصخور . اناثه تضع ٤ بيضات تحضنها وحدها نحو ١٢ يوماً بينما الذكور تؤمن لها الغذاء . يعيش اسراباً كبيرة يراوح عددها من ٦٠ الى ١٦٠ .

٩٢٤٢ - خطاف الشواقي* ، سنونو الجبال

Hirundo montana, Cotyle rupestris (S). Hirondelle de montagne, H. des rochers (F). Crag martin (E).
نوع من الخطاف المتوسط القد ، المستطيل الذنب . طوله نحو ١٥ سم . ثوبه اسمر الظاهر ابيض الباطن . جناحه اسود الريش . ذنبه اسمر اسود تعلوه رقشة بيضية الشكل تبنيه اللون || يألف الجبال العالية . يبني عشه بالتراب اللزج مع القش في الكهوف وبين شقوق الصخور . اناثه تضع من ٥ الى ٦ بيضات تحضنها نحو ١٢ يوماً .

٩٢٤٣ - خطاف الماء ، جراد الماء Exocaetus (S). Exocet, Poisson volant (F). Flying-fish (E).

جنس اسماك بحرية من الملساوات وفصيلة الاسقمريات انواعه نحو ٥٠ منتشرة في جميع البحار الحارة . زعانفها الصدرية كبيرة القد شكلها شكل الجناح تمكنها من التحليق فوق الماء وتعاضدها عليه نحو الدقيقة || اشهر انواعه خطاف المتوسط .

٩٢٤٤ - خطاف المتوسط*

Exocaetus volitans (S). Hirondelle de mer (F). Exocaetus volitans (E).

سمكة بحرية من خطاف الماء يكثر وجودها في المتوسط . طولها نحو ٤٥ سم . ظهرها اطمن اللون ، اذرق المواجه . بطنها فضي . تعيش جماعات متوسطة العدد .

٩٢١٨ - خطاف Ligne (F). Line (E).
الخط في الهندسة هو ما يصل بين نقطتين وهو لا عرض له وقد يكون على انواع . المستقيم والمنحني والمنكسر .

٩٢١٩ - خطاف الاستواء Equateur (F). Equator (E).
خط وهمي يرمز له بدرجة صفر طوله نحو ٤٠٠٧٦ كم . يمتد حول الكرة الارضية فيشطرها الى شطرين متساويين شمالي وجنوبي طول الواحد منهما نحو عشرة الاف كم .

٩٢٢٠ - خطاف الاعتدال Ligne équinoxiale (F).
Equinoctial line (E).
هو الخط الوهمي القائم بين خطي مدار الشمس والاستواء .

٩٢٢١ - خطاف الطول Ligne méridienne (F).
Meridian line (E).

٩٢٢٢ - خطاف القوة Ligne de force (F).

٩٢٢٣ - خطاف المقدوف Ligne de tir (F).
Shooting line (E).

٩٢٢٤ - خطاف المييطان Ligne de départ (F).
Start line (E).

٩٢٢٥ - خطاف النفلر ، خطاف الافق Ligne d'horizon (F). Vanishing line (E).

٩٢٢٦ - خطاف بياني ، مخطط Graphique (F).
Graphic (E).

٩٢٢٧ - خطاف تساوي البرد Ligne isochimène (F).
Isochimene line (E).

٩٢٢٨ - خطاف تساوي التصوب Isocline (F).
Isoclinal line (E).

٩٢٢٩ - خطاف تساوي الضغط Ligne isobare (F).
Isobaric line (E).

٩٢٣٠ - خطاف تساوي المطر Ligne isohyète (F).
Isohyet line (E).

٩٢٣١ - خطاف جانبي Ligne latérale (F).
Lateral line (E).

هو في علم الاسماك الخط الفاصل بين القسم العلوي والسفلي من جانبي السمكة .

٩٢٣٢ - خطاف شلجيمي ، خطاف عديسي ، قطع مكافئ Parabole (F). Parabola (E).

٩٢٣٣ - خطاف مستدير Ligne courbe (F).
Graphic curve (E).

٩٢٣٤ - خطاف مستقيم Ligne droite (F).
Straight line (E).

٩٢٣٥ - خطاف مقارب Asymptote

٩٢٣٦ - خطاف منكسر Ligne brisée (F).
Broken line (E).

٩٢٣٧ - خطاف هذلولي Hyperbola (E).

٩٢٥١ - خَطَر - Cladrastis, Virgilla (S).

Cladraste, Virgilier (F). Yellow-wood (E).
جنس اشجار حرجية طبية وزراعية تزيينية من فصيلة القرنبيات. اوراقها عابلة، مركبة، وثرية. وريقاتها بيضيه سنانية مدببة الزام الاخير. ثمارها قرنية. بزورها مأكولة. اخشابها صلبة، قصيفة، لونها الى الصفرة، تستعمل في الصناعات الدقيقة || انواعه قليلة، اعرفها الخطر الصباغي والصيني.

٩٢٥٢ - خَطَر صِبَاغِي *، خَشَب أَصْفَر

Cladrastis lutea, Cl. tinctoria, Virgilia lutea (S).
Cladraste tinctorial, Virgilier tinctorial, V. à bois jaune, Bois jaune (F). American yellow-wood (E).
Echter gelbholzbaum (D). Legno giallo (I).

شجرة حرجية طبية وصناعية. منبتها الاصقاع الامريكية. تعلق من ١٢ الى ٢٠ م. اوراقها مركبة، كبيرة القذ، تطول نحو ٣٥ سم. وريقاتها وثرية، بيضيه، مدببة، طوطا يراوح من ٦ الى ١٥ سم. نصلها مالمس البشرة، ازغب الضلع والعروق. ازهارها عنقودي متبدل. ازهارها صفر. ثمارها قرنية. بزورها مأكولة. جذورها طبية تنفع المعدة والامعاء وتقضي على الزحار. اوراقها صباغية، خضابها نيلي. اخشابها صفر، فاخرة الصنف، تستعمل في الصناعات الدقيقة.

٩٢٥٣ - خَطَر صِينِي Cladrastis sinensis (S).

Cladraste de Chine, Virgilier de Chine (F). China yellow-wood (E).

شجرة حرجية وتزيينية. مهدا الصين. تعلق من ١٠ الى ١٥ م. اوراقها مركبة مستطيلة. وريقاتها وثرية اهليلجية. ازهارها عنقودي، هرمي، منتصب. ازهارها جميلة، وردية اللون، عطرية الرائحة || اخشابها صناعية، لونها الى الاصفر الخنطي.

٩٢٥٤ - خَطَرَة Gourmand (F). Sucker (E).

هو الخربع ومنهم من قال غصن عرضي. قضيب دقيق ينبت في جذع او فرع الشجرة، ثم ينمو بسرعة ولا يثمر بل يؤدي الاغصان المثمرة لانه يمنع عنها بعض النسغ.

٩٢٥٥ - خَطَف Martinet (F). Swift (E).

هو السماعة، اطلبها.

٩٢٥٦ - خَطَف المَاء Exocoetidae (S).

Exocoetids (F). Exocoetidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من شائكات الزعانف مفتوحات المشاة. اجناسها وانواعها عديدة تناهز المئة. جميعها من اسماك بحار البلاد الحارة || اجسامها شبه اهليلجية الشكل تطول من ١٠ الى ٦٠ سم. رؤوسها مخروطية قصيرة الخاطم. زعانفها الصدرية كبيرة القذ تشبه الجناح وتمكنها من التحليق فوق سطح الماء من ٣٠ الى ٥٠ ثانية. اشواطها مستقيمة الخط، مداها من ٢٠٠ الى ٤٠٠ م. زعانفها الظهرية والشرجية متقابلة. زعانفها الخوضية لاقياسية الارتكاز والحجم. زعانفها الذيلية هلالية الشكل، كبيرة الفلقة السفلى || اشهر اجناسها خطاف الماء.

٩٢٥٧ - خَطَم Mufle, Museau (F).

Snout, Muzzle, Nose (E).
الجزء العاري المخاطي الذي ينتهي به انف الحيوانات وبعض الحيوانات الاخرى || وهو في الحشرة مقدم الرأس حينما يكون مستدقاً ومستطيلاً على شكل الخرطوم.

٩٢٤٥ - خُطَاف المَدَاخِن *، سُنُونُو العُمُرَان

Hirundo rustica (S). Hirondelle rustique, H. de cheminée (F). Delichon rustica (E).

نوع من الخطاف طوله من ١٨ الى ٢٠ سم. بسطته نحو ٣٠ رأسه وظهره وجناحاه الى السواد الازرق الاسفع الموج. نحره اسمر كستنائي يحده طوق اسود. صدره وبطنه الى الشقحة. ريش ذنبه اسود الظاهر ابيض الباطن. عيناه ومنقاره سمر || يألف الاماكن الآهلة. يبني عشه بالتراب اللزج الممزوج بالقش. الانثى تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها نحو ١٢ يوماً بينما الذكر يؤمن لها الغذاء.

٩٢٤٦ - خُطَاف النَوَافِد *، سُنُونُو البُيُوت ،

حُجَيْبِيَّة Hirundo urbica,

Chelidon urbica (S). Hirondelle de fenêtre, H. à cul blanc, Chéldon (F). House martin (E).

نوع من الخطاف طوله نحو ١٤ سم. بسطته ٢٠. رأسه وظهره وجناحاه الى السواد اللامع الازرق الموج. نحره وصدره وبطنه وزمكه بيض. ارساغه واصابعه لا تخلو من الريش الور. عيناه ومنقاره سود || يألف الاماكن الآهلة. يبني عشه بالتراب اللزج مع بعض القش والصوف. انشاء تحضن من ٤ الى ٦ بيضات || قوته الحشرات على اختلافها ما عدا الخشرم وجميع اصحاب الحمة.

٩٢٤٧ - خُطَاف أَمْرِيكِي * Progne (S).

Hirondelle d'Amérique, Progné (F). Progne (E).

نوع من الخطاف موطنه البلاد الامريكية يجوبها من الشرق الى الغرب ومن الشمال الى الجنوب. طوله نحو ٢٠ سم. بسطته ٣٠ سم. ثوبه اسود اللون يعلوه موج لامع يختلف بريقه مع انعكاس النور من الازرق الى البنفسجي والاحمر || يألف الريف. قوته الحشرات على اختلافها. يعيش اسراباً كبيرة العدد. يبني عشه بالتراب اللزج بين البيوت الآهلة والمهجورة افائه تضع نحو ٥ بيضات تحضنها وحدها.

٩٢٤٨ - خُطَافِيَّات ، سُنُونِيَّات Hirundinidae (S).

Hirundinids, Hirondinids (F). Hirundinidae (E).

فصيلة الخطاف او السنونو من الطيور الجواثم المشرومة المناقير. قوتها الذباب والبعوض ومختلف الهوام والحشرات المجنحة. تتميز بطيرانها السريع الخطاف وبقنصها وشرها واغتسالها وسائر اعمالها التي تقوم بها وهي طائفة || اجناسها وانواعها عديدة اشهرها الخطاف.

٩٢٤٩ - خَطَام Anneau nasal (F). Nasal ring (E).

حلقة نجم في انف الحيوان كالثور والبعر والدب ليتتاد بها. راجع برة.


٩٢٥٠ - خُطَبَان *، خَشَب أَخْضَر

Chloroxylon (S). Chloroxylon, Bois satin (F). Satin-wood, Yellow-wood (E). Seidenholz, Atlasholz (D). Legno rasato (I).

جنس اشجار حرجية من فصيلة الازدرختيات. انواعه قليلة منبتها الهند الشرقية. اخشابها صناعية، فاخرة الصنف، حريرية الرقة لونها الى الاخضر الاصفر. يستخرج منها بالحز عصارة راتنجية غزيرة تستعمل في قلافة المراكب والسفن.



خطاف المداخن



خطاف النوافذ



خطاف امريكي



خطبان



خطر صباغي



خطمي

٩٢٦٥ - **خَطْمِيّ مَنَقِيّ** (S). *Hibiscus palustris* (S).
Ketmie des marais (F).
نوع من الخطمي البجلي التزييني المعمر . ضرابه عديدة .
يعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقه كفية ، نصلها
زغبى البشرة على صفيحتيه . ازهاره مختلفة الالوان ، متوسطة
القد ، قطرها نحو ٧ سم . || يرغب في الاتربة الرطبة
المتوسطة الاندماج ، الغنية بالمواد العضوية || ازهاره
يستمر من آب الى ايلول .

٩٢٦٦ - **خَطْمِيّ مَنِيْهَوْت** (S). *Hibiscus manihot* (S).
Ketmie manihot (F).
نوع من الخطمي البجلي التزييني المعمر . مهدد الصين
واليابان . يعلو من ١٠٠ الى ٢٥٠ سم . اوراقه خماسية
او تساعية التفريص . نصلها مالمس البشرة ، مسنن
الحافة . ازهاره كبيرة القد قطرها يراوح من ١٠ الى
١٨ سم . بتلاتها الى الصفرة الباهتة ، قواعدها قرمزية .
ازهاره يستمر طوال الصيف والخريف .

٩٢٦٧ - **خَطْمِيّ هِنْدِيّ** (F). *Althée* (F).
White mallow (E).
راجع ابوتيلون نجمي .

٩٢٦٨ - **خُطُوطُ الرُّهَاء** (F). *Courbes de niveau* (F).
Level knee (E).
هي خطوط منحنيات الارتفاع تسجل على الخوارط للدلالة
على مقادير مختلف الارتفاعات عن سطح البحر .

٩٢٦٩ - **خُطُوطُ العَرَض** (F). *Parallèles de latitude* (F).
Parallels of latitude (E).
خطوط موازية تبتدئ من خط الاستواء بدرجة صفر وتمتد
شمالاً وجنوباً الى القطبين حيث تنتهي بدرجة ٩٠

٩٢٧٠ - **خَطْمِيَّة**
الارض لم ترو بين مروييتين وقيل التي لم تمطر بين مطورتين .
ج خطاطط .

٩٢٧١ - **خُفَّ**
Plante de pied du chameau et de l'autruche (F).
الحف للبعير والنعام بمنزلة الحافر الخيل .

٩٢٧٢ - **خُفَّ** (F). *Eclaircissage* (F). *Clearing up* (E).
راجع تخفيف .

٩٢٧٣ - **خُفَّار** (F). *Méropé* (F). *Merope* (E).
الخفار والخفراء نجم من مجموعة الثريا ، اطلب وروار .

٩٢٧٤ - **خُفَّاش** (S). *Vespertilio* (S).
Vespertilion (F). *Vespertilio* (E).
جنس حيوان من فصيلة الخفاشيات أنواعه نحو ٤٥ منتشرة
في جميع اصقاع العالم من المناطق الاستوائية الى الحارة
والمعتدلة || اجسامها صغيرة ربة طولها يراوح من ٨٠
الى ١٢٥ مم . رؤوسها مخروطية . آذانها مستقلة كبيرة
القد ، غناباتها هلالية . اجنحتها عريضة وقصيرة .
اناثها تضع جرواً واحداً تحمله حتى الفطام نحو ثمانية
اسباع || اشهر انواعه الاربعة التالية .



خفّاش

٩٢٥٨ - **خَطْمِيّ** * ، **خَطْمِيَّة** (S). *Hibiscus* (S).
Ketmie (F). *Ketmia* (E).
جنس نباتات عشبية وبجلية من فصيلة الحبازيات .
انواعه عديدة منها البرية والطبية والتزيينية والزراعية
المأكولة الثمار كالبامية . سوقها زباد ، اوراقها معنقة
منقصصة . ازهارها كبيرة القد متعددة الالوان || اشهر
انواعه التزيينية ما يتبع .

٩٢٥٩ - **خَطْمِيّ إفريقيّ** ، **تِيل شَيْطَانِيّ**
Hibiscus trionum, *H. africanus* (S). *Ketmie trifide*,
K. d'Afrique (F). *Bladder ketmie*, *Flower of an hour*
(E). *Afrikanischer ketmie*, *Stundeneibisch* (D). *Ibis-*
co a tre foglie (I).
نوع من الخطمي العشبي الطبي التزييني الحولي والحول .
يعلو من ١٥ الى ٦٠ سم . اوراقه ثلاثية التفريص .
ازهاره متوسطة القد ، صفراء اللون ، ارجوانية القاعدة .
تنفجر من الساعة الثامنة الى الظهر ثم تنطبق حتى الساعة
الثامنة من اليوم التالي || ازهاره يستمر من تموز الى
ايلول .

٩٢٦٠ - **خَطْمِيّ جُنْدِيّ** (S). *Hibiscus militaris* (S).
Ketmie militaire (F).
نوع من الخطمي البجلي المعمر . مهدد امريكا الشمالية .
يعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . اوراقه ثلاثية التفصيص ،
مستطيلة الفص الاوسط . نصلها مالمس البشرة ، مسنن
الحافة . ازهاره كبيرة القد ، جرسية الشكل ، قطرها نحو
١١ سم ، لونها الى الحمرة الزاهية || ازهاره يستمر من
آب الى ايلول .

٩٢٦١ - **خَطْمِيّ خَمْلِيّ** (S). *Hibiscus lasiocarpus* (S).
Ketmie à capsule velue (F).
نوع من الخطمي البجلي التزييني المعمر . مهدد امريكا .
ضرابه عديدة حجمها سبروتية . اوراقه كفية ثلاثية او
خماسية او سباعية التفريص ، نصلها ازغب البشرة .
ازهاره كبيرة القد قطرها نحو ٢٠ سم . لونها ابيض او
وردي . ثماره حقية ، خلية البشرة || ازهاره يستمر
نحو خمسة اسابيع ابتداء من آب .

٩٢٦٢ - **خَطْمِيّ سُورِيّ** * ، **خَطْمِيّ مَلَكِيّ**
Hibiscus syriacus (S). *Ketmie de Syrie*, *K. des Jar-*
dins, *K. royale* (F). *Ketmia*, *Syrian rose*, *Rose of*
sharon (E). *Elbisch*, *Syrischereibisch* (D). *Ibis-*
co del giardini, *Chetmia* (I).
نوع من الخطمي الشجري السبروتي المعمر . مهدد البلاد
السورية . ضرابه عديدة . يعلو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم .
اوراقه كفية ثلاثية التفصيص ، نصلها مالمس البشرة ،
مسنن الحافة . ازهاره كبيرة القد ، بسيطة او مكسبة ،
عديدة الالوان منها الاحمر والليلكي والازرق والبنفسجي
والابيض || ازهاره يستمر من آب الى تشرين .

٩٢٦٣ - **خَطْمِيّ قِرْمِزِيّ** (S). *Hibiscus coccineus* (S).
Ketmie écarlate (F).
نوع من الخطمي البجلي التزييني المعمر . يعلو من ١٠٠
الى ٢٠٠ سم . اوراقه كفية خماسية التفريص . ازهاره
قرمزية اللون ، كبيرة القد ، منبسطة البتلات قطرها نحو
١٢ سم . ازهاره يستمر نحو ثمانية اسابيع من اواخر
الصيف الى اواسط الخريف .

٩٢٦٤ - **خَطْمِيّ مَسْكِيّ** (F). *Ketmie musquée* (F).
Abelmosk (E).
مرحب المسك ، اطلبه .

٩٢٨٠ - خُفَّاشِيَّاتٌ * Vespertilionidae (S).

Vespertilionidés (F). Vespertilionidae (E).

فصيلة من الخفافيش عديدة الأجناس والأنواع. تتميز بخلوها من الزوائد المنخرية، بأذناها الودية المنفصلة، بأذناها المستطيلة المدرجة ضمن غشاء قاعدة الفخذ، بتسغيها الذي يختلف مع الأجناس وبشائها العلوية الفارقة || أذناها تضع جروين تحملها دائما وترضعها أثناء طيرانها. أنواعها المعروفة نحو ١٥٠ تنتمي إلى عدة أجناس أعرفها التالية: الطمروق والسحاة والخشاف والذعماط والخفاش والزنباع (اطلها في مواضعها).

٩٢٨١ - خُفَّافِيَّشٌ * Microchiroptères,

Petites chauves-souris (F). Microchiroptera (E).

مرتبة حيوانات من مجنحات الأيدي. أنواعها نحو ٣٥٠ تجمعها خمس فصائل. تتميز بنواجذها المدببة الحادة كالخفة. بقوف أذناها المنفرجة القاعدة. بسبها الوحيدة أو الثنائية السلامي، العديمة الخلب. أذناها، عند وجودها، مدرجة في الغشاء الجلدي بمستوى القاعدة الفخذية. عيونها صغيرة مستديرة يحجبها الهدب والوبر. معظمها من الحيوانات الحاشرة ومنها الثامرة والدائمة. موطنها العالم، تكثر في البلاد الحارة، تقل في المعتدلة وتندر في الباردة || أما فصائلها الخمس فهي: الخفاشيات والرماسيات والعاشيات والوحريات والورقيات.

٩٢٨٢ - خُفَّافٌ Ponce (F). Pumice (E).

هو الكاذن والنسفة حجارة خفيفة نخرة يكثر وجودها عند مرمى الموج.

٩٢٨٣ - خُفَّت Rue (F).

هو السذاب، اطلبه.

٩٢٨٤ - خُفَّجٌ Saillie des chèvres (F).

الخفج هو سفاد الماعز. يقال خفج التيس إذا سفد.

٩٢٨٥ - خُفَّجٌ، لَبْسَانَةٌ Lampsane (F).

Nipplewort (E).

جنس نباتات عشبية برية من فصيلة المركبات اللسنية. أنواعها أربعة اقليمها حوض البحر المتوسط. أوراقها متقابلة. أزهارها رؤسية، طويلة الزناد، صفراء اللون. واحدته خفجة || أعرف أنواعه الخفج المبذول.

٩٢٨٦ - خُفَّجٌ مَبْدُولٌ * Lampsana communis (S).

Lampsane commune, Herbe aux mamelles (F).

Common nipplewort (E). Niplewurz, Gemeine milche, Rainkhol (D). Lampsano, Lassano, Erba da mammelle (I).

نوع من الخفج الطبي البري. اقليمه سواحل البحر المتوسط. أوراقه كبيرة القد، غزيرة المادة الفعالة، مأكولة وتستعمل في علاج القشب خاصة قشب حلمة الثدي.

٩٢٨٧ - خُفَّخَفَةٌ Cri de l'hyène (F).

صوت الضبع. ومنهم من قال صوت الضبع والخنزير.

٩٢٨٨ - خُفَّخُوفٌ * Sericulus (S).

Séricule (F). Sericulus (E).

طائر من التبشريات الفردوسيات. موطنه جزر الزايج وأستراليا || ثوبه جميل الألوان المتباينة. رأسه وقف

٩٢٧٥ - خُفَّاشُ أُسْبَلٌ * Vespertilio

mystacinus (S). Vespertillon à moustaches (F).

Moustached vespertilio (E).

حيوان لبون حاشر من فصيلة الخفاشيات. موطنه البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || جسمه صغير القد يطول نحو ١٢٠ مم. بسطته نحو ٣٥٠ مم. ثوبه إلى السمرة الطحلاء تعبق في الرأس والظهر وتنعرف إلى الخنطي في البطن. رأسه مخروطي الشكل. أذناه وتديتان، مستقلتان. عيناه صغيرتان. خنابتاه هلالية الشكل. سباله كثيف التجميع. فقه مستعرض الشدق || يألف البيوت الخربة والكهوف والمغاور. ملجئه الحياتي جماعي. أفواجه كثيرة العدد. بباته الشتوي يستمر نحو عشرة أسابيع. مسرحه دجوي. قوته الحشرات على اختلاف أجناسها وأنواعها || يحبل الانثى يدوم من ٣٨ إلى ٤٠ يوماً تضع في تمامه من جرو إلى جروين يكتسيان ويسمعان بعد ستة أيام ويصبران بعد عشرة أيام ويتعلقان بصدر الام حتى الفطام أي نحو ثمانية أسابيع || يعتبر من الخفافيش اللامؤذية النافعة.

٩٢٧٦ - خُفَّاشُ الصَّحْرَاءِ * Vespertilio

desertorum (S). Vespertillon du désert (F).

نوع من الخفاش. ثوبه بلون الرمال الخنطية. رأسه وظهره اعبقا لوناً من بطنه. جسمه ربع القد، طوله نحو ٨٠ مم. بسطته ٢٤٠ مم. وذنبه ٣٠ مم. || موطنه صحاري الشرق الأوسط. يعيش جماعات قليلة العدد. يألف النخل وأوقاب الصخور. قوته الحشرات على اختلافها إخصها الجراد.

٩٢٧٧ - خُفَّاشُ الْمَاءِ * Vespertilio

daubentoni (S). Vespertillon aquatique (F).

نوع من الخفاش ثوبه اطحل اغبر. جسمه ربع القد. طوله نحو ٨٥ مم. بسطته ٢٦٠ مم. وذنبه ٣٥ مم. || موطنه الشرق الأوسط وأروبة. يعيش جماعات قليلة العدد، يرتاد المناقع ومجاري الماء والبحيرات في طلب الحشرات والهوام. يألف المناور والكهوف وأوقاب الصخور.

٩٢٧٨ - خُفَّاشُ بِيَشْتَيْنِ * Vespertilio

bechsteini (S). Vespertillon de Bechstein (F).

نوع من الخفاش ثوبه إلى الجؤوة للطحلاء عابق الرأس والظهر، أبيض البطن. جسمه ربع القد طوله نحو ٩٠ مم. بسطته ٢٧٠ مم. وذنبه ٤٠ مم. رأسه مخروطي الشكل. أذناه كبيرتان || موطنه البلاد الأروبية المعتدلة الحرارة. يعيش منفرداً. يألف تجاويف الأشجار. مسرحه من الليل إلى الفجر. قوته الحشرات على اختلافها.

٩٢٧٩ - خُفَّاشُ فَأْرِي * Vespertilio

murinus (S). Vespertillon murin, Murin (F). Murine (E).

نوع من الخفاش ثوبه إلى السمرة الفاحة، ظهره اطحل الموج، بطنه إلى ألباض التبي. جسمه ربع القد يشبه الفأرة، طوله نحو ١٢٥ مم. بسطته ٣٨٠ مم. وذنبه ٥٥ مم. موطنه فسيح الأرجاء يعم الشرق الأوسط وأروبة وأفريقية الشمالية. يألف البيوت والكهوف والمغاور. يعيش جماعات كثيرة العدد. مسرحه من الليل إلى الفجر. قوته الحشرات على اختلافها.



خُفَّاشُ أُسْبَل



خُفَّجٌ مَبْدُولٌ



خُفَّخُوفٌ

٩٣٠٢ - خِلَاصَةٌ أَزُوتِيَّةٌ Extractif azoté (F).
Azotized extract (E).
هي المادة الازوتية الموجودة في الشيء المطلوب تحليله .

٩٣٠٣ - خِلَاصَةٌ الْجُنْجُلِ Lupuline (F).
Lupulin (E).
مادة راتنجية عطرية مرة الطعم توجد بين حراشف مخاريط الجنجل تستعمل في صناعة البيرة .

٩٣٠٤ - خِلَاصَةٌ جَافَةٌ Extrait sec (F).
Dry extract (E).
الخلاصة الجافة أو اليابسة هي ما يبقى من المواد المعلقة والمذابة بعد تبخير مائها أو سوائها .

٩٣٠٥ - خِلَاصَةٌ غَيْرُ أَزُوتِيَّةٌ Extractif non azoté (F). No azotized extract (E).
عبارة ترادف المادة الهيدروكربونية أي هيدرات الكربون .

٩٣٠٦ - خِلَافٍ Différend (F). Difference (E).
النزاع القائم بين اثنين أو أكثر إذا تباينت آراؤهم أو مصالحهم في موضوع معين .

٩٣٠٧ - خِلَافٍ * ، زَقُومٌ Elaeagnus (S).
Chalef, Eléagne (F).
جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية من فصيلة الخلافيات . انواعه عديدة منها الشائكة والسرحة . اوراقها عروية أو عابطة ، كاملة ، معنقة ، جامدة النصل . ازهارها عطرية العرف ، خشوية يتخللها بعض الذكورية ، لونها الى الصفرة أو البياض || اشهر انواعه ما يلي .

٩٣٠٨ - خِلَافٍ سَرَحٍ ، زَقُومٍ سَرَحٍ Elaeagnus glabra (S). Chalef glabre (F).
نوع من الخلاف العارش . مهدد الصين واليابان . يعلو من متر الى مترين . اوراقه عروية مستطيلة ، نصلها لامع الصفحة العليا ، حنطي السفلى . ازهاره ونواميه حرشفية الغلاف واللحاء || يزرع للتزيين . ازهاره يستمر من آب الى تشرين .

٩٣٠٩ - خِلَافٍ ضَيِّقِ الْوَرَقِ ، زَقُومٍ بَلَدِي ، طَبِيي الكَلْبَةِ ، سَوَجَر ، زَيْزْفُون الشَّرْقِي Elaeagnus angustifolia, E. hortensis (S). Chalef à feuilles étroites, Olivier de Bohême, Oléastre, Eléagne oléastre (F). Zakkoum-oil plant, Oil tree (E). Schmale ölweide (D). Eleagno, Olivagno, Leagno balsamico (I).
نوع من الخلاف . منبته الشرق . يعلو من ٥ الى ٨ أمتار افئانه شائكة . اوراقه عابطة ، معنقة ، مستطيلة ، فضية النصل على صفحتيه . ازهاره محورية الارتكاز . ثماره برتقالية اللون زيتونية الشكل ، مأكولة . ازهاره محبة تفيد الصدر .

٩٣١٠ - خِلَافٍ فِضِّي ، زَقُومٍ فِضِّي Elaeagnus argentea (S). Chalef argenté, Eléagne argentée (F).
نوع من الخلاف مهدد البلاد الامريكية . يعلو من مترين الى اربعة أمتار . ساقه وأغصانه سرحة ، أفئانه ونواميه حرشفية اللحاء . اوراقه سنائية ، عابطة ، فضية النصل على صفحتيه . ثماره ناشفة اللب ، بشرتها مزعجرة فضية . يزرعها صلدة كالحجر .

وجوشنه وأواسط جناحيه الى الصفار الكبير يني ، سائر ريشه الى السواد الفحمي الخمي الموج || يالف الادغال والحراج الكثيفة . قوته الثمار والحشرات . يدثن عشه في الاشجار القليلة الارتفاع || الانثى تضع ثلاث بيضات صفراء اللون مرقوشة بالاسمر ، تحضنها بمتابوة الذكر نحو ١٥ يوماً .

٩٣٨٩ - خُفْدُود ، خُفْدُود Pipistrelle (F).
هو خشاف المتوسط ، من الخفافيش المفيدة ، اطلبه .

٩٣٩٠ - خُفَيْش Nyctalope (F). Nyctaliopic (E).
الخفش والاختفش والاجهر من لا يبصر الا في الليل . م . خفشاء .

٩٣٩١ - خُفَيْي ، سَرِي Esotérique (F).
Esoteric (E).
نعت تعريفي يطلق على بعض التعاليم ، اغصها الفلسفية ، التي كانت في قديم الزمان لا تعلن الا للمطلعين على مبادئ تلك العلوم .

٩٣٩٢ - خُفَيَّاتُ الْأَرْجُلِ Cryptopodes (F).
Cryptopoda (E).
فئة من القشريات مستورات الارجل .

٩٣٩٣ - خُفَيَّاتُ الشَّرْحِ Endoproctes (F).
Endoprocta (E).
خفيات الشرح فئة من الحيوانات الطحلبية تتميز باستتار الشرح داخل نطاق اللوامس .

٩٣٩٤ - خُفَيَّاتُ الْوَلْبِيعِ ، مَسْتَوْرَاتُ الزَّهْرِ Cryptogames (F). Cryptogamous (E).
شعبة من النبات مستورة الاعضاء التناسلية تشمل الاشنة والحث والسراخس والطحالب والفطور الخ .

٩٣٩٥ - خُفَيَّْةٌ ، خُفَيَّْةٌ Crépide (F).
Hawk's-beard (E).
هي السرعة ، اطلبها .

٩٣٩٦ - خُفَيْرَاء Mérope (F). Merope (E).
الخفيراو او الخفار اكبر نجم في الثريا ، اطلب وروار .

٩٣٩٧ - خُفْل Vinalgre (F). Vinegar (E).
هو الحامض الخلي الخفيف . سائل حضي عديم اللون ، نفاذ الرائحة ، حريف الطعم يستحضر من تخمير العنب وبأكسدة الميثروبات الكحولية اغصها النبيذ ويتطير الخشب ، الخ . والخل الثقيف هو الحامض جداً .

٩٣٩٨ - خُفْلَاب Colluvion (F).

٩٣٩٩ - خُفْلَابِي Colluvial (F).

٩٣١٠ - خِلَاة Acétate (F). Acetate (E).
هي الاسيتات ، اطلبها .

٩٣٠١ - خِلَاصٌ ، بِشِيْمَةٌ Délivre (F).
After-birth (E).
هو القاء المشيمة وتوابعها عقب الولادة .



خِلَافٍ

اوراقه ضيقة النصال تطول من ٥ الى ١٠ سم. وتعرض من ١٢ الى ١٤ سم. ازهاره صيواني التجميع. ازهاره بنفسجية اللون يعلوها مزاج ارجواني || تنويره ربيعي .

٩٣٢١ - **خُلْبُوبٌ كَرْدَر** (S). *Bomarea carderi* (S). *Bomaree de Carder* (F).

نوع من الخلوبوب . منبته جبال الاند . ساقه عارشة ، اوراقه تطول من ١٠ الى ١٥ سم. وتعرض من ٣ الى ٨ سم. نصالها الى الخضار الاطحل . ازهاره صيواني التجميع . زهرته تطول نحو ٥ سم. لونها الخارجى الى الوردي المنقوش بالاحمر اما الداخلى فالى البياض المرقوش بالاخضر || تنويره يستمر من آب الى ايلول .

٩٣٢٢ - **خُلْبُوبٌ مَأْكُول** (S). *Bomarea edulis* (S). *Bomaree comestible* (F).

نوع من الخلوبوب . اوراقه ودرناته مأكولة . منبته نيكراغوا . ساقه عارشة مألسة اللحماء . اوراقه معتدلة الحجم تطول من ١٥ الى ٢٠ سم. وتعرض من ٣ الى ٥ سم. نصالها الى الخضار اللبس . ازهاره صيواني التجميع . قطر الخلية يراوح من ٢٠ الى ٣٠ سم. ازهاره كبيرة تطول من ٦ الى ٧ سم. لونها الخارجى الى الحمرة الوردية المواج اما الداخلى فالى الصفار الباهت المرقوش بالاسمر || تنويره يستمر طوال شهر آب .

٩٣٢٣ - **خُلْبُوبٌ** (S). *Anoplangthus* (S). *Anoplangthe* (F).

جنس نباتات طفيلية ضارة من فصيلة الجعفلديات . انواعه المعروفة قليلة جميعها جردية او من نباتات البلاد الباردة . تنشب في جذور عائلها من النبات فتعيش عليه وتنمو من نفسه .

٩٣٢٤ - **خُلْبُوبٌ قَرْمَزِيّ** (S). *Anoplangthus coccineus* (S). *Anoplangthe écarlate* (F).

نوع من الخلوبوب يعيش في الجرد البنيانية . ساقه نحيلة حرشفية تعلو نحو ٢٠ سم. حراشفها دقيقة لينة لينة . ازهاره سنبلية التجميع ، قمرزية اللون ، زباء الاسدية . يركب النباتات القرنية والنجيلية .

٩٣٢٥ - **خُلْبُوبٌ**

الخلبوب طائر اصفر من المصفور بلونه (محيط المحيط) .

٩٣٢٦ - **خِلَّةٌ * ، صَقْلِين ، صَقْلِين ، خَشْبَزَك ، نَائِخُوَاه ، نَائُوخَة**

Ammi visnaga (S). *Ammi visnaga*, *Visnaga*, *Visnague*, *Herbe aux gencives*, *Herbe aux curesdents* (F). *Pick-tooth*, *Toothpick* (E). *Zahnstocherkraut* (D). *Ammi visnaga*, *Erba da gengiva* (I).

نبات عشبي طبي حولى بري وزراعي من الامنيات وفصيلة الخيميات يكثر في الارض البور ويزرع في بعض البلاد كصر وغيرها || اوراقه متعاقبة مركبة طويلة الزناد . ازهاره صيوانية التجميع ، جامدة المعالين ، بيضاء اللون ، عطرية العرف ، حامزة الطعم . كانوا ولا يزالوا يتخللون بمعالين زهره || والمعروف عن بزور الخلة ان نقيعها على البارد يحلل المنص والغازات ، يدر البول ويطرد الحصى . امسا خلاصتها فتفيد اللذخمة القلبية . عنصرها الفمالي يدعى خلين وقد صنع منه اودية معروفة باسم لينامين واميكاردين وغلوكون لينامين .

٩٣١١ - **خِلَافٌ كَثِيرُ الزَّهْرِ ، زَقُومٌ كَثِيرُ الزَّهْرِ ، غُومِي**

Elaeagnus multiflora (S).

Chalef multiflore, *Goumi* (F).

نوع من الخلاف . ضرابه عديدة . مهدد الشرق . يعلو من مترين الى ثلاثة امتار . اوراقه مستطيلة ، متموجة ، نصلها اخضر الصفحة العليا ، فضي السفلى . ازهاره نورية . ثماره صغيرة القند مأكولة .

٩٣١٢ - **خِلَافِيَّات**

Eleagnaceae (S). *Eléagnacées* (F). *Eleagnaceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقين عديمة القملات . انواعها عديدة تنتمي الى اربعة اجناس . جميعها اشجار وشجيرات وجنبات . منها البرية والزراعية والتزيينية والشائكة والسرحة .

٩٣١٣ - **خِلَال**

الخلال هو البسر اذا اخضر واستدار .

٩٣١٤ - **خُلْبٌ**

Fibres (F). الخلب هو الليف واحده خلبة .

٩٣١٥ - **خُلْبٌ**

Palmité (F). *Palm-marrows* (E). الخلب هو لب النخلة اي قلبها . اطلب حمار .

٩٣١٦ - **خُلْبٌ**

الخلب هو الظفر وحجاب الكبد وغلاف البطن وورق الكربة . ج أخلاب .

٩٣١٧ - **خُلْبُوبٌ ***

Bomarea (S). *Bomaree* (F). *Bomarea* (E).

جنس نباتات عشبية درنية من فصيلة الترجسيات . منبتها بعض مناطق امريكا الجنوبية : سوقها مدادة عارشة . اوراقها معتدلة لاقياسية الشكل . ازهارها صيواني التجميع اوهاشي وطرفي . ازهارها قمية الشكل عديدة الالوان || تزود للتزيين ضمن البيوت وفي الحدائق . ترغب في الاتربة المتناسبة التركيب المنصري الوفرة المواد الغذائية من عضوية ومعدنية || انواعه المعروفة عديدة ، اشهرها التالية :

٩٣١٨ - **خُلْبُوبٌ أَرْغَب**

Bomarea tomentosa (S). *Bomaree tomenteuse* (F).

نوع من الخلوبوب . منبته كوليبيا والبيرو . ساقه زباء عارشة . اوراقه مزغبة النصال على صفحاتها السفلى ، تطول من ٤ الى ٨ سم. وتعرض من ١٠ الى ١٥ سم. ازهاره صيواني التجميع . ازهاره ارجوانية اللون يعلوها تنقيط اسود من الداخل فقط || تنويره ربيعي .

٩٣١٩ - **خُلْبُوبٌ أَصْفَر**

Bomarea vitellina (S). *Bomaree jaune d'oeuf* (F).

نوع من الخلوبوب . منبته جبال الاند . ساقه عارشة ، مبعثرة الزغب . اوراقه تطول نحو ١٠ سم. وتعرض نحو ٤ سم. نصالها جميلة الخضار الزاهي . ازهاره صيواني التجميع ، كبير القند . ازهاره صفراء اللون تطول نحو ٤ سم. || تنويره يستمر من تموز الى آب .

٩٣٢٠ - **خُلْبُوبٌ فَشَاغِي**

Bomarea salsilla (S). *Bomaree salspareilla* (F).

نوع من الخلوبوب . منبته بلاد الشيلي . ساقه عارشة ملساء .



٩٣٣٤ - خُلْتَر المسك ، خُلْتَر عَطِير
Pois de senteur (F). Sweet-pea (E).
هو الجلبان المطر ، اطلبه .

٩٣٣٥ - خَلَص
الخلص : شجر ينبت نبات الكرم يتعلق بالشجر فيعلق
وهو طيب الريح وحبه احمر كخرز العقيق لا يؤكل
ولكنه يعى الواحدة خلصة (عن ابي حنيفة) .



خَلَّة كَبِيرَة

٩٣٣٦ - خَلَع
خلع الزرع خلعة : اسفى فهو خالغ . وأخلع : صار
فيه حب .

٩٣٣٧ - خَلَف
Ayant cause, Ayant droit (F).
هو الذي ينتقل اليه حق او التزام من شخص آخر يدعى
سلف . والخلف يكون على وجهين الخلف العام والخلف
الخاص .

٩٣٣٨ - خَلْف ، قَرْخ
Ceilieton (F).
Layer, Young bud (E).
هو الملمخ الصغير المشرش يفصل عن ارومته فيزرع كلخ
الحرشوف مثلاً .

٩٣٣٩ - خَلْف
Trayon, Pis (F). Dug, Teat (E).
حلمة ضرع البقرة والعز والنعجة والناقة ...

٩٣٤٠ - خَلْفَة
Chamelle (pieine) (F).
She-camel (plenum) (E).
هي الناقة الحامل . ج. خلفات .

٩٣٤١ - خَلْفِيَّات الأَخَادِيد
Opisthoglyphes (F).
رتبة من الحيات تشمل الزواحف من ذوات الانياب
الخلفية .

٩٣٤٢ - خَلْفِيَّات الخَيْشُوم
Opisthobranches (F).
صنيف حيوانات من الرخويات المعدية .

٩٣٤٣ - خَلْق الخَيْل
Extérieur du cheval (F).

٩٣٤٤ - خَلْقَة
Morphose (F). Morphosis (E).
الخلقة بيولوجياً الهيئة المتخذة .

٩٣٤٥ - خَلْقِي ، أَصْلِي ، قَرْجِي
Congénital (F). Congenital (E).
نعت تعريفي يطلق على صفات الحيوان التي تلازمه منذ
الولادة ورأية كانت ام اكتسابية رحم وحسنة كانت
ام سيئة .

٩٣٤٦ - خَلْقِي ، طَيْمِي ، غَرِيْزِي
Infus (F).
Infused (E).
نعت تعريفي يطلق على الميزات الطبيعية الموهوبة .

٩٣٤٧ - خَلْقِيْن
Cuve (F). Tub, Vat (E).
الرجل الكبير من النحاس .

٩٣٤٨ - خَلْم
Graisse de mouton (F). Suet (E).
ج أخلام وخلماء .

٩٣٤٩ - خَلْم
Gîte de la gazelle (F). Lair (E).
كناس الظية العظيم وقيل مريضها . ج أخلام .

٩٣٢٧ - خَلَّة كَبِيرَة * ، خَلَّة شَيْطَانِيَّة ، سَدَا
Ammi majus (S). Ammi commun (F). Amee, Bl-
shop's weed (E). Ammei, Grosser ammei (D). Ammi
rizzomolo, Rindoncolo, Soffione (I).

نبات عشبي بري طبي وزراعي من الامثليات وفصيلة
الحميميات . كثير الوجود في المزارع والبساتين || يزرع
الآن لجني بزره نظراً لفوائده الطبية العديدة اخصها علاج
البهاق .

٩٣٢٨ - خَلَج
Vertige (F). Vertigo (E).
الخلج : داء يصيب البهائم تخلج منه اعضاؤها سببه شدة
الحر او عارض معوي .

٩٣٢٩ - خُلْد * ، فَارَة عَمِيَاء ، جُلْد
Spalax (S). Rat-taupe, Spalax (F). Mole rat, Blind
rat (E).

حيوان جاس وحيد الجنس والنوع عديد الضروب من
فصيلة الخلديات . جسمه اسطواني الشكل ، كقدم .
طوله يراوح من ٢٠ الى ٢٢ سم . وزنه نحو ٣٠٠ غ .
رأسه غليظ ، عنقه قصير . عيناه مخفيتان تحت الجلد .
اذناه لا قوفية صغيرتان ماسحتان . ذنبه جدعة بارزة .
ثوبه الى الخنطي الاسمر . فقه وقوائمه بيض . بطنه
رمادي اللون تعلوه رقشة بيضاء || انشاء تضع في الصيف
من الدرعين الى الاربعة . قوته الجذور النباتية . يقيم
جحره على عمق ٦٥ سم . تتشعب منه عدة انفاق افقية
طولها من ٢٠ الى ٣٠ م . تتخللها فوه خارجية . اما
مدخره الذي يخزن فيه قوته الشتوي فيخلده تحت جحره
على عمق ١٢٠ سم . || يكافح باستعمال الفدارة او
الظعوم السامة .

٩٣٣٠ - خُلْد أُرُوبِي
Taupe (F). Mole (E).
هو الطوبين ، اطلبه .

٩٣٣١ - خُلْد المَاء *
Ornithorhynchus anatinus, O. paradoxus (S). Or-
nithorhynque, O. anatin, O. paradoxal, O. à bec de
canard, Taupe de rivière (F). Duckbill, Water-
mole (E).

حيوان استرالي وحيد الجنس والنوع . يبيض ويرضع .
وحيد المسلك له منقار شبيه بمنقار البط ومجدافان متحركان
في يديه . يعيش في الماء وعلى ضفاف الأنهار . يرغب في
المياه الراكدة . جحره نفق مستطيل لا يقل عن عشرة
امتار له مدخلان واحد في قعر الماء والثاني في الجرف
او على الضفة بين الاعشاب .

٩٣٣٢ - خُلْدِيَّات ، مَنَاجِد
Spalacidae (S).
Spalacidae, Rats-taupes (F). Spalacidae (E).

فصيلة حيوانات لبونة قاضمة جاسة من مرتبة قرقدييات
الشوزب ورتبة القواضم . اجناسها اربعة . انواعها
عديدة . اجسامها صغيرة القد اسطوانية الشكل . اسنانها
مستعرضة قاضمة ، قوائمها قصيرة ، اطرافها مستطيلة مقوسة
جاسة . فقامها غليظة مقطومة . آذانها وعيونها خفية .
اذناتها قصيرة او لا وجود لها || تعيش تحت سطح
التربة على اعماق مختلفة تراوح بين التربة الزراعية والهوم .
قوتها جميع الاعضاء النباتية التي تعترض انفاقها || اما
اجناسها الاربعة فهي البنون والخلد والرمة والريزوميس .

٩٣٣٣ - خُلْتَر
Gesse (F). Bitter vetch (E).
هو الجلبان ، راجعه .



خلد



خلد الماء



خلموس



خلنج اسود



خلنج المتوسط



خلنج شجري



خلنج مكسلي



خلود ابيض

الى آب . ازهاره رباعية او سداسية التجميع . جلجلية الشكل ، وردية اللون . كعابره خلية || ضروبه التزيينية اربعة ترغب في الاتربة الرملية الدبالية .

٩٣٥٨ - **خلنج كثير الزهر** (S). *Erica multiflora* (F). *Bruyère multiflora* (F).

نوع من الخلنج يعلو من ٦٠ الى ١٥٠ سم . اهدابه ضمية رباعية او خماسية . ازهاره كثيرة العدد ، تاجية الارتكاز ، وردية اللون ، مآبرها سود بارزة || يرغب في الاتربة الكلسية . ازهاره يستمر من تشرين الى شباط .

٩٣٥٩ - **خلنج مكسلي** (S). *Erica scoparia* (F). *Bruyère à balais* (F). *Small heath* (E). *Besanhaide* (D). *Scopa*, *Scoparia*, *Scoparella* (I).

نوع من الخلنج يعلو من ٤٠ الى ١٠٠ سم . ساقه مرطاء وفروعه كذلك . هديه مالمس البشرة . ازهاره عنقودي مستطيل . ازهاره جرسية الشكل ، صغيرة القد ، خضراء اللون ، يعلوها موج ابيض وردي || جذوعه وجذوره تستعمل في صناعة الغلايين وافنائه للمكانس .

٩٣٦٠ - **خلنجيات** (F). *Ericaceae* (E). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين الوحيديات القعالة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد معظمها بري وبعضها زراعي صناعي وتربي || من اجناسها المشهورة الخلنج والجلسان والمصل والمقطب والقمام والوثير .

٩٣٦١ - **خلو ، نقص ، عوز ، جحن** (F). *Carence* (F). *Deficiency* (E).

هو افتقار الجسم الحيواني او النباتي الى بعض العناصر الغذائية . وهو ايضاً مظهر ذاك النقص الفاضح .

٩٣٦٢ - **خلود ، عمير** (S). *Sempervivum* (F). *Jupiter's beard* (E). *Hauswurz* (D). *Sempervivo* (I).

جنس نباتات عشبية لحمية معمرة من فصيلة المخلدات . انواعه كثيرة العدد معظمها بري وبعضها زراعي تربي . اوراقه ضمية التجميع تنشب من وسط قرصها ساق شراخية تعلوها الازهار || اعرف انواعه ما يتبع .

٩٣٦٣ - **خلود ابيض** (S). *Sempervivum leucanthum* (F). *Joubarbe blanche* (F).

نوع من الخلود يعلو من ١٥ الى ٢٠ سم . اوراقه خلية النصل ، صغيرة ، مستعرضة ، مديبة المقصبة الجؤوية اللون . ازهاره صغيرة القد ، بتلاتها بيض النسيج ، خضر المروق . ازهاره يستمر شهراً واحداً ابتداء من اواخر حزيران .

٩٣٦٤ - **خلود الرمال** (S). *Sempervivum arenarium* (F). *Joubarbe des sables* (F).

نوع من الخلود يبيش في الرمال . يعلو من ١٠ الى ١٥ سم . اوراقه مستطيلة سمراء المقصبة المدببة . نصلها جميل الخضار خلي البشرة . ازهاره سداسية البتلات ، جرسية الشكل ، مهدبة الختار ، لونها الى الصفرة || ازهاره يستمر من تموز الى ايلول .

٩٣٦٥ - **خلود السطوح** (S). *Sempervivum tectorum* (F). *Joubarbe des toits* (F).

نوع من الخلود ضروبه عديدة . يعلو نحو ٦٠ سم . اوراقه مستطيلة لونها الى البحري . نصلها مالمس البشرة ، مهدب الحافة ، جؤوي المقصبة ، اسمر الخمة . ازهاره فارشة البتلات الشفمية العدد الذي يراوح من ٨ الى ١٨ ،

٩٣٥٠ - **خلْمُوس** (S). *Chalimus* (F). *Chalime* (E).

جنس دوبيات بحرية طفيلية من القشريات الدنيا مجذافيات الارجل وفصيلة الكليجيات . انواعها المعروفة قليلة العدد || اجسامها شديدة الصغر ، وحيدة العين . رؤوسها ملحوفة بزوائد جامدة محدبة || تنطفل على جميع انواع الاسقمريات اغصنها الطراخور .

٩٣٥١ - **خلنج ، شنطف** (S). *Erica* (F). *Heath*, *Heather* (E).

جنس نباتات برية وزراعية تزيينية من فصيلة الخلنجيات . انواعه المعروفة تبلغ ٤٠٠ جميعها معمرة عروة دائمة الخضار . معظمها جنبات وجنابات مهدبا افريقية الجنوبية . اوراقها هدية الشكل قصيرة || اعرف واشيع انواعه ما يتبع .

٩٣٥٢ - **خلنج احمر** (S). *Erica australis* (F). *Bruyère rouge* (F). *Red heath* (E).

نوع من الخلنج يعلو من ٣٠ الى ٤٠ سم . اهدابه ضمية رباعية . ازهاره تاجية ، نورية ، رباعية التجميع ، هلية التويج ، حمراء اللون || ازهاره يستمر من آذار الى حزيران .

٩٣٥٣ - **خلنج اسود ، خلنج رمادي** (S). *Erica cinerea* (F). *Bruyère cendrée*, *B. franche* (F). *Black heath*, *Black heath* (E). *Grane heide* (D). *Scopa cinerina* (I).

نوع من الخلنج المبدول يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم . اهدابه ضمية ثلاثية . ازهاره جلجلية وردية او بنفسجية اللون . ازهاره يستمر من حزيران الى آب .

٩٣٥٤ - **خلنج الثلوج** (S). *Erica carnea* (F). *Bruyère des neiges* (F).

نوع من الخلنج اقلية البلاد الباردة الجبلية . يعلو من ١٥ الى ٦٠ سم . اهدابه مستطيلة النصل ، ضمية الارتكاز رباعية او خماسية التجميع . ازهاره وردية موشحة ، مآبرها بارزة قرمزية || يرغب في الاتربة الكلسية . ازهاره يستمر من كانون الى آذار .

٩٣٥٥ - **خلنج المتوسط** (S). *Erica mediterranea* (F). *Bruyère méditerranéenne* (F). *Mediterranean heath* (E).

نوع من الخلنج عديد الضروب . مهدب حوض البحر المتوسط . اهدابه بحرية النصل اللامع . ازهاره وردية او بيضاء اللون . مآبرها قليلة البروز ، لونها الى السمرة . ازهاره يستمر من كانون الى آذار .

٩٣٥٦ - **خلنج شجري** (S). *Erica arborea* (F). *Bruyère arborescente*, *B. en arbre* (F). *Briar-root*, *Tree heath* (E). *Baumheide* (D). *Scopa in albero*, *S. forcilli*, *S. maschia* (I).

نوع من الخلنج يعلو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم . افنائه مزغرة ، هلبها ريشي الشكل . ازهاره عنقودي ، مستطيل ، منتصب . ازهاره بيض او وردية اللون || قضبانه تستعمل استعمال الشيع للقر وخشبه في صناعة الغلايين .

٩٣٥٧ - **خلنج صيواني** (S). *Erica terminalis* (F). *Bruyère à ombelles* (F).

نوع من الخلنج يعلو من ٤٠ الى ١٠٠ سم . اهدابه ضمية رباعية . ازهاره صيواني ، تاجي الارتكاز ، يستمر من تموز




خلود السطح



خلود عنكبوتي



خلية



خلية نباتية



خلود

تقسم الى فئتين : فئة ذوات المسام وهي التي يدخل اليها الطعام من مسام دقيقة مركزها سطح الجسم . وفئة ذوات القناة الهضمية التي يدخل الطعام الي تجويفها الباطني بواسطة فم يمكنها من التقاط الطعام وتوجيهه .

٩٣٧٤ - خلية * Ruche (F). Bee-hive (E).

هي مأوى النحل مثل الشجرة والفنير والكوار والفسالة والمبابة .

٩٣٧٥ - خلية ، حبيزة Cellule (F). Cell (E).

الخلية جسم مركب زلاي المادة ذو حياة ذاتية وصورة قابلة للتغير متناهية الصغر . والخلية بوجه عام تتألف من نطفة ونواة وغشاء . ولكل من هذه الاجزاء طبيعة وميزات . والخلية اساس كل كائن حي . تتكاثر بالانقسام ومن تكاثرها تتركب الانسجة الحية || والخلايا تنقسم الى نباتية وحيوانية . فالحيوانية تعرف بالحجيرة اما النباتية فتعرف بالخلية او الخلية النباتية .

٩٣٧٦ - خلية نباتية * Cellule végétale (F).

Vegetable cell (E).

الخلية النباتية هي اصل تكوين كل نبات ومحور نموه تتميز بجدارها الصلب المركب من السليلوز .

٩٣٧٧ - خليلش Etourneau (F). Starling (E).

الخليلش طائر مشهور باسم زوزور ، اطلبه .

٩٣٧٨ - خليط Provenda (F). Provender (E).

هو العلف المركب من انواع مختلفة كالذيق والقت والفول والتبن وغيرها .

٩٣٧٩ - خليود * ، مسقه

Chauliodus solani (S). Chauliode, Masca (F).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة الرعاسيات مفتوحات المشاة . انواعها المعروفة قليلة . اعطانها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط || جسدها شبه وشي الشكل ، مستدق المؤخر ، يطول نحو ٣٥ سم . ثوبها الى الورد الفضية المتفاوتة الماجات . تتميز بضخامة الرأس المكور المشبه بالشكل . شدقها واسع ، رجب وكبير . فكها الاسفل يتقدم الاعلى . اسنانها فارقة دقيقة ، مستطيلة . عيناها صغيرتان ، مستديرتان ، ماصحتان . || زعانفها متباينة الاشكال . الظهرية الاولى سداسية الشع ، قريبة من الرأس ، تتميز باستطالة الشعاع الاول الذي يبدو كالسلك . الظهرية الثانية مزوانية تحتل قاعدة الذيل . زعنفتها الصدرية سفلية الارتكاز ، مجدافية الشكل ، تتأخم الزور . زعنفتها الحوضية قدية الشكل ، خلفية الارتكاز . زعنفتها الشرجية شديدة الصغر ، تقابل الظهرية الثانية . زعنفتها الذيلية فارقة || تعتبر من اسماك الاغواط المتوسطة العمق . لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٩٣٨٠ - خليون Cheilio (S). Chéillon (F).

جنس اسماك بحرية بيوض من شائكات الزعانف وفصيلة الكيديات . انواعها المعروفة نحو ٢٠ اعطانها تحت من البحر الاحمر الى المحيط الهندي || اجسامها مستطيلة الشكل . مخاطها ذلقة . أشداقها كبيرة . زعانفها الظهرية فردية مستطيلة . زعانفها الذيلية مستديرة . أثوابها متباينة الالوان ، جميعها زاهية || لحمها متوسطة الصنف مأكولة || اعرف انواعها واشهرها الخليون الاخضر الازرق .

لونها الى الحمرة الوردية المختلفة الموج | ازهاره يستمر من تموز الى آب .

٩٣٦٦ - خلود جصاص

Sempervivum calcareum (S). Joubarbe calcicole (F).

نوع من الخلود يرغب في الاتربة الجصية ، يعلو من ١٥ الى ٢٥ سم . اوراقه اهليلجية ملعقية . نصلها خلي البشرة . ازهاره عشكولية التجميع كثيرة البتلات المستعرضة الشفعية العدد ، لونها الى الحمرة الارجوانية الجميلة || ازهاره يستمر نحو سبعة اسابيع من تموز الى آب .

٩٣٦٧ - خلود جفري

Sempervivum flagelliforme (S). Joubarbe escour-gée (F).

نوع من الخلود يعلو نحو ١٠ سم . اوراقه بيضية الشكل مدببة العقصة . نصلها خلي الصفحة العليا لونه الى الخضار الباهت . ازهاره جعرية الشكل ، ضمية التجميع السنبل لونها احمر قاني || ازهاره يستمر شهراً واحداً من اواخر حزيران الى اواخر تموز .

٩٣٦٨ - خلود شائك Sempervivum hirtum (S).

Joubarbe hérissée (F).

نوع من الخلود يعلو من ١٠ الى ٢٥ سم . اوراقه سنانية النصل المزخرف البشرة ، المهذب الحافة . اهدابه جامدة شائكة . ازهاره سداسية البتلات ، جرسية الشكل ، صفراء اللون ، مهدبة الحثار || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

٩٣٦٩ - خلود عنكبوتي *

Sempervivum arachnoideum (S). Joubarbe aranéeuse (F).

نوع من الخلود يرغب في الاتربة الرملية يعلو نحو ١٢ سم . اوراقه صغيرة القد ، نصلها مدبب العقصة التي تحمل في طرفها خصلة من الخيوط البيض العنكبوتية . ازهاره مستعرضة ، بتلاتها مألسة البشرة ، قرمزية اللون . ازهاره يستمر من تموز الى ايلول .

٩٣٧٠ - خلود كبير الزهر

Sempervivum globiferum (S). Joubarbe à grandes fleurs (F).

نوع من الخلود اوراقه مفلطة ، بيضية ، اسفينية ، نصلها خلي البشرة البحرية اللون . عقصتها مدببة لونها الى الجذوة القائمة . ازهاره كبيرة القد . قطرها من ٢ الى ٤ سم . بتلاتها الى الصفرة الموشحة بالارجواني . ازهاره ضبي يستمر نحو ١٣ اسبوعاً .

٩٣٧١ - خلود مريخ Sempervivum soboliferum (S).

Joubarbe prolifique (F).

نوع من الخلود يعلو من ١٠ الى ٢٥ سم . اوراقه مستطيلة نصلها مألس البشرة ، هلي الحافة . ساقه مورقة . ازهاره سداسية البتلات المنتصب ، جرسية الشكل ، صفراء اللون ، مهدبة الإطار || ازهاره يدوم من حزيران الى تموز .

٩٣٧٢ - خليون Acéto (F). Acetone (E).

راجع ايتون .

٩٣٧٣ - خلويات ، نوال Métazoaires (F).

Metazoa (E).

حيوانات مركبة تنمو بانقسام البويضة وهي تتركب من حجيرات عديدة مختلفة الشكل والوظيفة . كما انها

٩٣٩٠ - خُمْمَاسِيٌّ أَعْضَاءُ التَّأْنِيثِ (F).
Pentagynous (E).

نعت تعريفي يطلق على الازهار الخماسية المدقات اي الاعضاء التناسلية الانثوية .

٩٣٩١ - خُمْمَاسِيٌّ الْأَجْزَاءُ (F).
Pentamerous (E).

نعت تعريفي يطلق على اللويحات والحشرات والنباتات الخماسية الاجزاء .

٩٣٩٢ - خُمْمَاسِيٌّ الْأَزْهَارِ (F).

نعت تعريفي يطلق على كل نبات ازهاره خماسية التجميع .

٩٣٩٣ - خُمْمَاسِيٌّ الْأَقْلَامِ (F).

من النبات ما كانت مدقات ازهاره خماسية الاقلام .

٩٣٩٤ - خُمْمَاسِيٌّ الْبَتَلَاتِ (F).
Pentapetal (E).

نعت تعريفي يطلق على الكأس الزهرية الخماسية البتلات .

٩٣٩٥ - خُمْمَاسِيٌّ الْبُزُورِ (F).
Pentasperme (E).

نعت تعريفي يطلق على الثمار الخماسية البزور .

٩٣٩٦ - خُمْمَاسِيٌّ الصُّفُوفِ (F).

ما كان ترتيبه خماسي الصفوف .

٩٣٩٧ - خُمْمَاسِيٌّ الْفِصَلِ (F).

من الازهار ما كان كاسها مركب من خمس فصل .

٩٣٩٨ - خُمْمَاسِيَّاتُ الْفَوَاصِلِ ، فَكَّاسِيَّاتِيَّاتُ (F).
Pentatomidae (S). Pentatomidés (F). Pentatomidae,
Stink bugs (E). Schildwanzen (D).

فصيلة حشرات من رتبة مختلفات الاجنحة وطبقة نصفية الجناح . عماراتها ١٥ ، اجناسها ٧٦٠ . انواعها عدة آلاف . تتميز بقرونها الاستشعارية المركبة من خمس فواصل . اجسامها مفلطحة مبططة . لها غدة او غدتان تقذف منها بسائل كريه الرائحة دفاعاً عن النفس .

٩٣٩٩ - خُمْمَاسِيَّةُ الْإِسْدِيَّةِ (F).
Pentstemon (E).

هي البنسون ، اطلبه .

٩٤٠٠ - خُمْمَاسِيَّاتُ (F). Dog-days (E).

وقت من الزمن يدوم ٥٠ يوماً يتميز بحمد الشديد للاهب .

٩٤٠١ - خُمْمَاسِيَّاتُ (F). Elder tree (E).

هو اليلسان ، اطلبه .

٩٤٠٢ - خُمْمَاسِيَّاتُ (F). Water elder (E).

هو اليلسان ، اطلبه .

٩٤٠٣ - خُمْمَاسِيَّاتُ (F). Ground elder (E).

هو اليلسان الصغير ، اطلبه .

٩٤٠٤ - خُمْمَاسِيَّاتُ (F). Boon tree (E).

هو اليلسان الاسود ، اطلبه .

٩٣٨١ - خَلْيُونُ أَخْضَرُ أَزْرَق * (F).

Chellio cyanochloris (S). Chéllion vert bleu (F).

نوع من الخليون . اعطائه تمتد من شط العرب الى اطراف الهند || جسمه مستطيل الشكل ، معتدل التبسيط ، يطول من ٣٠ الى ٣٥ سم . ثوبه متراكب الاخضر والازرق . ظهره مبقع بالاحمر . بطنه وردي اللون . زعانفه الى الصفار الباهت تملوه رقشة سمراء || لحمه متوسط الصنف ، مأكول .



خَلْيُونُ أَخْضَرُ أَزْرَق

٩٣٨٢ - خَلْيُونُ * ، عِشْبَةُ الْخَلْيُونِ ، زَهْرَةُ السَّلْحَفَةِ (F).

Chelone (S). Chélone, Galane (F). Balmony, Turtle head (E). Kahler fünffaden, Schildblume (D). Galana (I).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الخنازيريات . انواعه عديدة معظمها بري وبعضها تزييني . اوراقها منعقة ، متقابلة . سنانية النصل المشعاري الحافة . ازهارها سنبلية او عشكولية التجميع تاجية الارتكاز . اشهر انواعه التزيينية ما يلي .

٩٣٨٣ - خَلْيُونُ أَعْوَج (F).

Chelone obliqua (S). Galane oblique (F).

نوع من الخليون يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقه اهليلجية ، سنانية معوجة النصل الخليلي الصفحة السفلى || ازهاره خمرام اللون او بنفسجية ، سنبلية التجميع ، كؤوسها زياء البشرة مهدبة الاطراف || ازهاره يستمر من تموز الى ايلول .

٩٣٨٤ - خَلْيُونُ الْغَابِ (F).

Chelone nemorosa (S). Galane des bois (F).

نوع من الخليون يعلو من ٣٠ الى ٧٠ سم . اوراقه بيضية القاعدة والزام الثاني ثم سنانية . نصلها كرية الرائحة ، خلي الصفحة السفلى . ازهاره عشكولية طويلة المعاليق ، لونها الى البنفسجي || ازهاره يستمر من تموز الى تشرين الاول .

٩٣٨٥ - خَلْيُونُ أَمْرَطِ (F).

Chelone glabra (S). Galane glabre (F).

نوع من الخليون يعلو من ٥٠ الى ١٣٠ سم . اوراقه قصيرة العنق ، مستطيلة النصل المائل البشرة ، الزاهي الخضار || ازهاره سنبلية التجميع كثيفة ، لونها الى الابيض يعلو موج وردي || ازهاره يستمر من آب الى تشرين الاول .

٩٣٨٦ - خَلْيُونِيٌّ (F). Cellulaire (E).

راجع حبيري .

٩٣٨٧ - خَلْيُونِيَّةٌ (F).

Cellularisme (F). Cellularism (E).

الخليوية مذهب تكوين الخلية وحياتها في النسيج الحية .

٩٣٨٨ - خَمِيمٌ (F).

Jardin inculte (F). Uncultivated garden (E).

هو البستان المتروك غير المستعمل .

٩٣٨٩ - خَمٌّ * ، قُنٌّ ، مَدَّجَتَجَةٌ (F).

Poulailler (F). Hen-house (E).


هو مأوى الدجاج وسائر الطيور الالهية ما عدا الحمام والمصافير .



خَلْيُونُ



خَمٌّ



خَمَج النَخِيل



خَل

٩٤١٩ - خَمَمَر الزَّيْبِب ، نَبِيد حُلُو

Vin de paille, V. doux (F). Sweet wine (E).
شراب كحولِي يستحصل من اختار عصير العنب الخفيف
بعض الوقت أو المذلي على النار .

٩٤٢٠ - خَمَمَر فَوَارَة

Vin mousseux (F).
Sparkling wine (E).
اسم شامل يطلق على جميع الخمر التي تفور عند انتزاع
سدادات قنانيها وذلك لانهتاق الحامض الكربوني الذي
يولد تلك الفقاعات فتسبب الفوران || أشهر الخمر
الفوارة واجودها خمر شبنانية .

٩٤٢١ - خَمَرَة ، ثَمَالَة

Lie de vin (F).
Dregs (E).
عكر النبيذ الراسب .

٩٤٢٢ - خَمَرِيَّة

Baccharide (F).
Ploughman's spikenard (E).
هي البخاريد ، اطلبها .

٩٤٢٣ - خَمَط

الخبط : الحامض وقيل المر من كل شيء . وهو كل
نبت اخذ طعاماً من مرارة . وهو الحمل القليل من كل
شجر . وهو كل شجر لا شوك له . وهو ثمر الاراك .

٩٤٢٤ - خَمَط الخمر

Casse (F).
وصم يصيب الخمر فيبدل لونها الى الاسمر والازرق
والايض . سببه عفن يعتري الحب قبل اعتصاره واختاره .
يعالج الخبط الاسمر باستعمال بيسولفيت البوتاس بمعدل
٧ غ . لكل ١٠٠ ليتر نبيذ || ويعالج الخبط الازرق
باستعمال الحامض الترتري بمعدل يراوح من ٢٠ الى
٧٠ غ . لكل ١٠٠ ليتر || اما الخبط الايض فيعالج
باستعمال الحامض الليموني بمعدل ٢٥ غ . لكل ١٠٠ ليتر .

٩٤٢٥ - خَمَل *

Salanx
جنس اسماك بحرية ونهرية من فصيلة السلمونيات .
موطنها شطوط وانهار الشرق . ترحل الى المياه العذبة في
زمن السراء فتقيم فيها نحو ٤ شهور ثم تعود فتركب البحر .
اجسامها ضيقة مستطيلة ، رؤوسها اسطوانية طويلة .
فلوسها دقيقة ، حولية الانسلاخ . انواجها الى السمرة
الزيتونية تبقي عند ثيج الظهر || لحومها متوسطة الصنف
سراء اللون .

٩٤٢٦ - خَمَل

Colchique d'automne (F).
هو سورنجان الخريف ، اطلبه .

٩٤٢٧ - خَمَل

Plumes d'autruche (F).
Feathers of ostrich (E).
الحمل والحماله والخميلة : ريش النعام .

٩٤٢٨ - خَمَلِي

Duveté, Duveteux (F). Downy (E).
كل عمو يغشاها زغب دقيق لبد وقصير .

٩٤٢٩ - خَمَن

Estimer (F). To estimate (E).
خمن الشيء : حدد مقداره أو ثمنه .

٩٤٣٠ - خَمُود

Déferescence (F).
هو انقطاع الفوران أو اقلعه الوقي .

٩٤٣١ - خَمُود صَيْفِي ، رُقَاد صَيْفِي

Estivation (F). Aestivation (E).
حالة وقوف النشط الانمائي في فصل الصيف من جراء
ارتفاع الحرارة أو من انحباس المطر مدة طويلة .

٩٤٠٦ - خَمَائِيَّات

Caprifoliacées (F).
هي البيلسانيات فصيلة نباتية .

٩٤٠٧ - خَمَائِر أُمُونِيَاكِيَّة ، خَمَائِر نَشَادِيرِيَّة

Ferments ammoniacaux (F). Ammoniacal ferments (E).
هي الخمائر التي تحول البولة الى كربونات الامونياك ،
والأزوت العضوي الى أزوت امونياكي .

٩٤٠٨ - خَمَائِر شَحْمِيَّة

Lipases (F).
هي الخمائر المنحلة الموجودة في معظم العصارات الهضمية
والتي تمكن اماعة الدسميات .

٩٤٠٩ - خَمَائِر كِيمَاوِيَّة

Ferments chimiques, Ferments solubles (F). Chemical ferments (E).
خمائر تفرزها بعض الخلايا النباتية والحيوانية ، من ميزاتها
الخاصة الذوبان في الماء وتحويل بعض المواد .

٩٤١٠ - خَمَائِر لَبَنِيَّة

Ferments lactiques (F). Lacticus ferments (E).
هي الميكروبات الخاصة التي تحول سكر اللبن الى حامض
لبنبي .

٩٤١١ - خَمَج ٥

Mauguinella (S). Khamedj (F).
جنس فطور مجهرية ، وحيد النوع ، من التوسيات
وفصيلة الوطحيات . مشيجه خارجي الانتشاح تعلوه
خيوط زغبية عروية الارتكاز . كئائله اسطوانية وحيدة
أو متعددة الخلايا ، مؤثرة وغير مخنوقة . بويغاته
مستديرة الاطراف .

٩٤١٢ - خَمَج النَخِيل ٥ ، دَمَن ٥ ، أَدَمَان ٥

Mauguinella scaetiae (S). Khamedj du dattier (F).
فطر مجهري يركب كافور النخل فيعطب الطلعة . مظهره
الخارجي يقع لاقياسية الشكل والحجم تصيب الكافور
فتبدو شقراء اللون ثم تنحرف الى الصفرة العابقة تحيطها
هالات حنطية نتابعة وتعلوها نقط سمر مبعثرة || يكافح
عند ظهوره باستعمال سائل بوردو المحلول ١٥٪ أو
مسحوق النحاس والكلس بمعدل كيلو سلفات النحاس
مع ٢ كيلو كلس حراق تعفيراً على الطلعة أو ذراً على
الكافور .

٩٤١٣ - خَمَجَر ، خَمَجَر

Eau légèrement saumâtre (F).
الخمجرج والخماجر الماء الذي لا يبلغ الاجاج وتشربه
الدواب .

٩٤١٤ - خَمَخِيم

Giroflée livide (F).
هو المشتور البري ، اطلبه .

٩٤١٥ - خَمَخِيم

Crabe, Cantre (F). Crab (E).
دورية بحرية تعرف بالسرطان .

٩٤١٦ - خَمَخِمَة

صوت الفرس اذا طلب العلف .

٩٤١٧ - خَمَر ، نَبِيد ، رَاح ، عَقَار ، مَدَام

Vin (F). Wine (E).
شراب كحولِي يحصل من اختار عصير العنب .

٩٤١٨ - خَمَر التَّفَاح

Cidre (F). Cider (E).
هي السيدر عصير التفاح المختمر .

٩٤٤٤ - خميرة النتروجية

Ferment nitrificateur (F). Nitro bacteria (E).
هي التي تحول الاملاح الامونياكية الى نيتريت ومنها الى نترات قابل التمثيل فالامتصاص من النبات .

٩٤٤٥ - خميرة اهلليجية * ، دردية

Saccharomyces ellipsoideus (S). Levure elliptique (F).
شكلها اهلليجي . من خمائر عصير العنب والنبيذ ، مقطوعيتها الكحولية جيدة تفوق مقطوعية الخميرة النحلية .

٩٤٤٦ - خميرة باستور

Saccharomyces pastorianus (S). Levure de Pasteur (F).

من خمائر العصور والنبيذ . شكلها قضيبى لا قياسي الالتحام والانشعاب . عملها بطيء تقوم به عند اقتراب التخمر من النهاية .

٩٤٤٧ - خميرة مخاطية ، ميكودرمة

Mycoderma (S). Mycoderme (F). Mycoderma (E).
اسم تعريفي يطلق على بعض الخمائر الطوائية النشاط التي تطفو وتتكاثر على سطوح العصارات المختمرة السكرية .

٩٤٤٨ - خميرة نحلية

Saccharomyces apiculatus (S). Levure apiculée (F).
خيرة الثمار الحلوة الناضجة . تبقى حتى التخمر اذا كان الوسط معتدل المادة السكرية لانها تحشى فرط السكر . وهي من خمائر النبيذ المعروفة || شكلها بيضي مستطيل تحمل في كل من قطبيها حمة مستدقة كحمة النحل .

٩٤٤٩ - خمير صامر البطن كالسلوقي

Levretté (F). Slim (E).

٩٤٥٠ - خمير الحميم : اللبن ساعة يحلب .

٩٤٥١ - خميرة

Putoria (S). Putoria (F).
جنس نباتات جنينية معمرة من فصيلة الفويات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها حوض البحر المتوسط . جميعها جنينية متسلقة دقيقة الفروع : اوراقها متقابلة صغيرة القد سنانية النصال . ازهارها شفعية التجميع ، خصية الشكل ، طرفية الارتكاز ، صغيرة القد ، مستطيلة ، بيضاء اللون او وردية || اوراقها وازهارها كريهة الرائحة المستهجنة .

٩٤٥٢ - خنابة

Narine (F). Nostril (E).
الخنابة هي سم الانف . والخنابتان : سما الانف .

٩٤٥٣ - خنابلة

Androgynie (F). Androgyny (E).
صفة الخنثى او الخنثى .

٩٤٥٤ - خنازو *

Zonure (F).
جنس عظام من فصيلة الخنازريات . انواعه اربعة موطنها البلاد الحارة الافريقية والاسيوية . جميعها متوسطة القد . اثوابها الى السمرة الطحلاء . حراشفها صغيرة متراكبة . قوتها الحشرات والهوام .

٩٤٥٥ - خنازريات

Zonuridae (S).

Zonuridés (F). Zonuridae (E).
فصيلة حيوانات زحافة من رتبة اللفظائيات . اجناسها وانواعها قليلة العدد . اعرفها واشهرها الخناز .

٩٤٥٦ - خنازيريات

Scrophulariaceae (S).

Scrophulariacées, Personées (F). Scrophulariaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقنتين . اجناسها وانواعها عديدة .

٩٤٣٢ - خمير *

Evernia (S).
Evernie (F). Evernia, Crottle lichen (E). Astflechte, Bandflechte (D). Evernia (I).

جنس من الخنازير انواعه نحو ٢٠ منتشرة في جميع البلاد الحارة والمعتدلة . بعضها طيبى وصباغى يعيش على جذوع السديان والتنوب والخوخ || أشهره خمير اذار Evernia furfuracea الذي ينفع داء النقطة وهو يركب الخوخ في المواقع الرطبة .

٩٤٣٢ - خميرة

Saccharomyces (S).

Ferment, Levure (F).
الخمائر فطور مجهرية مكونة من خلية كروية او بيضية الشكل متعضية قادرة على تحويل المواد العضوية . والخمائر عديدة منها العادية والكميائية وخمائر الكحول والنتيجة .

٩٤٣٤ - خميرة الانحلال

Hydrogénase, Réductase (F). Reductase (E).

دياستاز هيدروجينية توجد في الحليب والكثاء تتمكن في بيئة خاصة وظروف معينة ، من تحويل الحليب وحله .

٩٤٣٥ - خميرة البيرة ، خميرة الجعة

Saccharomyces cerevisiae (S). Levure de bière (F). Barm (E).

لها نوعان المرتفعة والمنحدرة فالمرتفعة تجتمع كالأكداس المتشعبة وتقوم بعملها التخمرى بين ١٢ و ٢٠ °م . خلاياها تطفو على سطح السوائل || اما المنحدرة فتجتمع اثنتين اثنتين وتقوم بعملها التخمرى بين ٤ و ٨ °م . خلاياها تركد في القعر .

٩٤٣٦ - خميرة التأكسد

Oxydase (F).
دياستاز (خميرة منحلة) تتميز بخاصيتها المؤكسدة في المواد العضوية .

٩٤٣٧ - خميرة الخل *

Ferment acétique (F).

Ferment acetic (E).
خميرة تحول الكحول الى حامض خلوي .

٩٤٣٨ - خميرة الخل المخاطية ، ميكودرمة

Mycoderma aceti (S).

Mycoderme du vinaigre (F). Mycoderma aceti, Mother of vinegar (E).

تسبب مضر الخل وقد تأتي غالباً بعد ميكودرمه الخمر .

٩٤٣٩ - خميرة الخمر المخاطية *

ميكودرمة الخمر

Mycoderma vini (S). Mycoderme du vin (F). Myco-

derma vini (E).

نوع من الميكودرمه يركب الخمر فيفسدها .

٩٤٤٠ - خميرة الدار

Leontice commun (F).

Lion's-ear (E).
هي عسلج الاسد ، اطلبه .

٩٤٤١ - خميرة السيلر

Saccharomyces mali (S).

Levure de cidre (F).

لها نوعان عملها يقوم على تخمير عصير التفاح بالاشتراك مع الخميرة النحلية .

٩٤٤٢ - خميرة العجين *

Levain (F). Leaven (E).

هي العجينة المختمرة التي تصاف الى العجين فيختمر .

٩٤٤٣ - خميرة اللبن

Ferment lactique (F).


Ferment lactic (E).
خميرة تحول سكر اللبن الى حامض لبني .




خمير




خميرة البيرة



خميرة الخل المخاطية



خميرة الخمر المخاطية



خميرة العجين



خميرة اهلليجية



خنزيرية الصحراء



خنزيرية الكلاب



خنزيرية المناقع



خنزيرية عقداة



خنجر

٩٤٦٢ - خنساس

داء يصيب الزرع فيتجعش منه ولا يطول .

٩٤٦٣ - خنساس

Escarbots (F). Histers (E).

اسم شامل يطلق على عدة حشرات من غمديات الاجنحة .
واحداه خنفساء .

٩٤٦٤ - خنافة

Butteuse, Buttoir (F).

Ridging-plough (E).

هي المكنة محراث خاص يستعمل لكم اي تخنيق المزروعات .

٩٤٦٥ - خنجان ، خنجان الخليل

Gourme (F).

Strongles (E).

مرض ميكروبي سار يصيب جهاز التنفس في الخليل .

٩٤٦٦ - خنث

Sybarite (F). Sybarite (E).

الخنث من كان مفهومه للحياة الترف والحمول .

٩٤٦٧ - خنثعة

Renarde (F). She-fox, Vixen (E).

الانثى من الثالب (الديري) .

٩٤٦٨ - خنثي

Hermaphrodite

الخنثى من النبات ما كانت زهرته تحوي اعضاء التذكير والتأنيث اي الاسدية والمدقة || والخنثى من الحيوان ما كان يحمل في آن واحد اعضاء التناسل الذكورية والانثوية .
والخنثاء نواذر الا في بعض الحيوانات الدنيا كالحلزون والبلق .

٩٤٦٩ - خنثى كذاب

Narthécia des marais (F).

Bog asphodel (E). هو الكرمدان المنقي ، اطلبه .

٩٤٧٠ - خنثي

Sybaritique (F). Sybaritic (E).

نعت تعريفي يطلق على من يعيش حياة الخنث .

٩٤٧١ - خنثية

Hermaphrodisme (F).

Hermaphroditism (E).

هي وجود الاعضاء التناسلية للذكور والاناث في جسم واحد .

٩٤٧٢ - خنثية

Sybaritisme (F). Sybaritism (E).

الخنثية مذهب الذين يعيشون بالترف والحمول .

٩٤٧٣ - خنجر ، ميكروستوم

Microstoma (S). Microstome, Serpe microstome (F). Microstome (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة السلمونيات . انواعه المعروفة ثلاثة اعطائها بحار المناطق المعتدلة الحرارة . منها نوع يكثر وجوده في البحر الابيض المتوسط . جسمه مستطيل الشكل كالخنجر بطول نحو ٢٠ سم . عيانه كبيرتان ، بارزتان . زعنفته الذيلية فارقة . ثوبه الى الاربعة الفضية . زعانفه صفراء || لحمه متوسط الصنف ، مأكول .

٩٤٧٤ - خنجولة

Megalops (S).

Mégalo (F). Megalops (E).

جنس اسماك بحرية بيوضة من فصيلة البسميات . انواعها المعروفة ثلاثة ، اعطائها بحار البلاد الحارة . مسرحها الاغواط والمهادج والنقاف . وتدخل الاغوار . قوتها الاسماك الصغيرة . تمخر الماء بسرعة وتقفز فوق سطحه || اجسامها كبيرة ، اهليلجية ، تطول من ١٢٠ الى ٢٠٠ سم . رؤوسها مخروطية . اشداتها كبيرة . اثنائها الى الكهبة

معظمها جنبيات واعشاب معمرة . اوراقها متقابلة بيضية لسنة . ازهارها عنقودي او عثكولي التجميع . اشهر انواعها عشبة البواسير وعرف الديك وانف المعجل وزهرة القمع النخ .

٩٤٥٧ - خنزيرية

Scrophularia (S).

Scrofulaire, Scrophulaire (F). Figwort (E).

جنس نباتات عشبية وجنبية من فصيلة الخنازيريات . انواعها نحو ١١٢ معظمها بري وبعضها تربييني . تكثر فيها النباتات الحولية ثم الحولية والمعمرة . جميعها سبروتية كريمة الرائحة . سوقها منتصب مربعة الزوايا والصلوع . اوراقها كاملة معنقة لاقياسية الترتيب . نصلها مسنن الحافة ، مدبب العقصة . ازهارها ابوية وهامية الارتكاز ، لاقياسية التجميع ، صغيرة القد عديدة الالوان يكثر فيها الارجواني الاخضر الموج والاحمر والاصفر . تويجاتها خماسية الفصوص اللانظامية الترتيب || اشهر انواعها ما يلي .

٩٤٥٨ - خنزيرية الصحراء * ، قرصه ، زينة

Scrophularia saharae (S). Scrofulaire du désert (F).

Desert figwort (E). Arabischer braunwurz (D).

Scrophularia dei deserti (I).

عشبة برية حولية تعلق من ١٠ الى ٢٥ سم . اوراقها معنقة متقابلة . نصلها سناني الشكل ، جامد الصفحة ، متباعد التسنين . ازهارها هامية الارتكاز . قنوية التجميع ، صغيرة القد ، صفراء اللون .

٩٤٥٩ - خنزيرية الكلاب *

Scrophularia canina (S). Scrofulaire des chiens (F).

Dog's rue (E). Hundsbraunwurz (D). Ruta canina,

R. di cane (I).

عشبة برية حولية تثبت في البور والحقول تعلق من ٢/٥ الى ٤٠ سم . ساقها قليلة الفروع . اوراقها معنقة متقابلة . نصلها اهليلجي الشكل مسنن الحافة . ازهارها ابوية وهامية الارتكاز ، عذقية التجميع ، صغيرة القد ، حمراء اللون .

٩٤٦٠ - خنزيرية المناقع * ، حشيشة الخنازير

Scrophularia aquatica (S). Scrofulaire aquatique,

Bétoine d'eau (F). Brook, Water figwort, Water betony (E). Wasserbraunwurz (D). Scrophularia ac-

quatica, Erba del sedere (I).

عشبة برية معمرة تعلق من ٥٠ الى ٩٠ سم . ساقها فرعاء . اوراقها السفلى متقابلة والعلوية متعاقبة . نصلها اهليلجي الشكل ، مدبب الزام الاخير ، متباعد التسنين . ازهارها محورية وهامية الارتكاز ، عنقودية التجميع . صغيرة القد حمراء اللون .

٩٤٦١ - خنزيرية عقداة * ، عشبة البواسير

Scrophularia nodosa (S).

Scrofulaire noueuse, S. des bois, Herbe du siège,

Herbe aux hémorroïdes (F). Figwort, Great pile-

wort, Knotted figwort (E). Knotige braunwurz (D).

Scrophularia maggiore, Erba da emorroidi,

Castagnola (I).

عشبة برية معمرة . اروعها عقداة ، ساقها منتصب . اوراقها متقابلة ، نصلها قلبي الشكل ، مسنن الحمار ، مدبب العقصة . ازهارها هامية الارتكاز قنوية التجميع لونها الى الحمرة الخضراء الموج || يقال ان عصارة سوقها واوراقها ومسحوق بزورها تقضي على البواسير اذا استعملت تليخا .

الاراضي الزراعية وضفاف المنافع ومجاري الماء . عكديتها سعة متوسطة الرحابة تنسجها بين الحجارة أو بين اشطاء النبات || مسرحها دجوي يستمر طوال الليل . تسعى وراء قنصها ركضاً في البر وعلى صفحة الماء . قوتها الحشرات واساريها ويرقاتها والذباب والهلوم || ملجئها التناسلي لا يختلف عن ملجئ سائر العناكب والانهي تقضي على الذكر بعد الكرم || لسعتها مؤلة لكنها قليلة الأذى .

٩٤٨١ - خَنْدَرَقِيَّات Lycosidae (S).
Lycosidés (F). Lycosidae, Wolf-spiders (E). Wolf-spinnen (D).

فصيلة من العناكب تشمل بعض الاجناس والعديد من الانواع . جميعها قانصة . اناثها تحمل مكناً في جراب شرطي يتسع الى اكثر من مئة مكنة تبقى الى حين نفقها . اشهر اجناسها الخندرق والرتلاء .

٩٤٨٢ - خَنْدَرُوس Epeautre (F). Speit wheat (E).
هو الخنطة الرومية ، اطلبها .

٩٤٨٣ - خَنْدَق ، مَشْبَرَة Fossé (F). Drain (E).

٩٤٨٤ - خَنْدَل Chute d'eau (F). Falls (E).
الخدل كالشلال منحدر مائي يعترض مجرى النهر .

٩٤٨٥ - خَنْدَوِيل * ، مَرْيَرَة Chondrilla (S). Chondrille, Jxérís (F). Chondrilla, Gum succory (E). Grosser krümling, Krümelsalat (D). Condrilla, Lattaiola (I).

نبات عشبي بري طيب حولي مبذول من فصيلة المركبات . اعطائه الشرق الادنى واروبه الجنوبية والغربية . ساقه فراء . اوراقه تشبه اوراق الهندباء ، نصلها مسنن الختار . ازهاره الى الحمرة . اوراقه مرة الطعم مأكولة نافعة . سوقه تنضج مادة صمغية جامدة شفافة . عصارة سوقه حلابية لزجة || يقال ان صمغه يشفي من السل ويسقط البواسير والاجنة ويدبر الدم ويفتت الحصى .

٩٤٨٦ - خَنْدِيل ، طَوَاشِي Cheval castré, C. châtré, Hongre (F). Gelded (E).
هو الحصى من الخيل وهو ما انتزعت أو سلت خصيتاه .

٩٤٨٧ - خِنْزَارَة ، زَرْيَبَة الخَنْزِير Porcherie (F). Pigsty, Piggery (E).
بناء خاص بالخنازير عد حسب مقتضيات التربية وما توجيه العناية الصحية .

٩٤٨٨ - خَنْزُرَان Verrat (F). Boar (E).
هو الخنزير الذكر .

٩٤٨٩ - خِنْزِير Sus (S).
Porc (F). Pig, Swine, Hog (E).

جنس حيوان من فصيلة الخنزيريات منه الوحشي والداجن فالوحشي عديد الانواع اما الداجن فوحيد النوع عديد الضروب والسلالات || جسمه اسطواني الشكل ، عنقه قصيرة غليظة ، راسه ضخيم اسفني الشكل ينتهي بفنطيسة مستطيلة مقطومة . له نبيان مستطيلان بارزان مرتفعان . قوائمه قصيرة . يسافد عند بلوغه تسعة اشهر . اناثه تحمل نحو ثلاثة اشهر وثلاثة اسابيع وتضع من ٤ الى ١٤ خنوص . اطباؤها ٦ او ٧ ازواج || قوته الاعشاب والجذور والحبوب واللحوم والحيات يفترسها لا يخشى

الخنضراء الموج . تشتد سميتها عند الظهر المسطح وتصفر عند البطن . زعانفها الظهرية والذيلية فارقة || اعرف انواعها واشهرها خنجولة الاطلسي وخنجولة الهادي .

٩٤٧٥ - خَنْجُولَة الْأَطْلَسِي *o

Megalops atlanticus (S).
Mégalope de l'Atlantique, Tarpon (F).
نوع من الخنجولة . سمكة بحرية بيوض . طولها يراوح من ١٢٠ الى ١٨٠ سم . اعطائها المناطق الحارة من المحيط الاطلسي || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٩٤٧٦ - خَنْجُولَة الْهَادِي *o

Megalops cyprinoides (S).
Mégalope du Pacifique, Œil-de-bœuf (F).
نوع من الخنجولة . سمكة بحرية بيوض . طولها يراوح من ١٦٠ الى ٢٠٠ سم . اعطائها المناطق الحارة من المحيط الهادي والهندي . تتميز . بعينها الكبيرتين الجاحظتين || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٩٤٧٧ - خَنْدَاعَة كَبِيرَة الرَّأْس *o

Platysternum megacephalum (S).
Platysterné mégacéphale, Tortue à grosse tête (F).
سلحفاة من فصيلة الخنداعيات . موطنها يمتد من الهند الى اطراف الصين || جسمها متوسط القد ، يطول من ٣٨ الى ٥٠ سم . ذبلها بيضي الشوزن ، معتدل الاحدياب ، يطول من ١٥ الى ٢٠ سم . كنفها منبسط الصفحة . رأسها كبير الجرم ، افطح الخطم . عنقها معتدل الغلاظة والطول . ذنبها عادم العرف طوله يضاهي طول الذبل || تعيش في مياه الجداول . قوتها كل ما تستطيع الوصول اليه من ضفادع وعطاء وثعابين وديدان وجيف في قعر الاغوار .

٩٤٧٨ - خَنْدَاعِيَّات *o Platysternidae (S).

Platysternidés (F). Platysternidae (E).
فصيلة حيوانات بيوضة من رتبة السلاحف . انواعها المتحجرة الغابرة عديدة اما المعاصر منها فواحد ، ويدعى خنداعة كبيرة الرأس .

٩٤٧٩ - خَنْدَرَق * ، عَنَكَبُوتَة ذُنَيْبَة

Lycosa (S). Lycose, Araignée-loup (F). Wolf-spider (E).

جنس عناكب قانصة مفترسة من فصيلة الخندرقيات . انواعه نحو ٤٠٠ اعطائها جميع البلاد المعتدلة الحرارة . تتميز باجسامها الربعة المتوسطة القد وبجرامزها النشيطة الرباعية الأزواج .

٩٤٨٠ - خَنْدَرَق قُرْصَان *o Lycosa piratica (S).

Lycose pirate, Araignée loup (F). Wolf-Spider (E).

دويبة من العناكب الذئبية الساعية القانصة من فصيلة الخندرقيات . موطنها معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة من العالم القديم || جسمها صغير القد ، يطول عند الذكر نحو ٧ سم . وعند الانثى نحو ١٢ سم . صدراسها مستطيل الجرم ، يغطي الشوزن ، حنطي اللون ، اسمر الموج ، عينها زرقمتان . شيفهاها صغيران ضليعان . فكاهما مرفقي الشكل ، معتدلا الطول . جرامزها مستطيلة ، مستدقة الاطراف . كثيرة الطلب . بطنها يرسمي الشكل ، ثنائي الروايا ، سداسي المشاتن ، حنطي اللون ، اكهب الموج تعلوه ست تزاويق سود اصغرهما قدماً اقربها من الطرف || تألف



خنجولة الاطلسي



خندرق



خندرق قرصان



خندويل




خنزير الأرض



خنزير الماء



خنزير بري



خنزير داجن



خنشار أصفر



خنشار أنثى

والفرنسية والايطالية والالمانية والبلفارية والرومانية والبولندية والتركية والاسبانية والامريكية || وهو حيوان مبشار ، اكول ، شره . جهازه الهضمي بسيط التركيب ، مذاخره متوسطة الطول . لذلك فهو يهضم جميع المواد الغذائية ويستفيد منها شرط ان لا تتوافر فيها نسبة السيلولوز . اعضاءه التناسلية الذكورية خالية من الحويصلات الشلخية لذلك فكوبه يطول بعض الوقت ريثما تفرز الغدد ما يلزم من شلخ . يسافد الذكر بعمر ١٢ شهر والانثى بعمر ٩ شهور . ودقاتها شهري حملها يستمر من ١١٠ الى ١٢٠ يوماً . يقولون ثلاثة اشهر وثلاثة اسابيع وثلاثة ايام .

٩٤٩٩ - خنزيرة
Trule (F). Sow (E).
انثى الخنزير .

٩٥٠٠ - خنزيرة
Treull (F). Windlass (E).
هي الملفاف آلة بسيطة تستعمل لرفع بعض الاثقال .

٩٥٠١ - خنزيرة ، ذاء الخنازير
Ladriere (F).
Mustiness (E).
مرض طفيل يعتبر من العيوب المبطله البيع . سببه الدودة الوحيدة .

٩٥٠٢ - خنزيرات
Suldés, Sétigères (F).
Sulda (E).
نصيعة الخنازير من رتبة مزدوجات الاصابع الجسديات اي صفيقات الجلود . اجناسها خمسة الخنزير والحلوف والبايروسه والمجلاج والحلوف .

٩٥٠٣ - خنفس
Planètes (F). Planets (E).
الخنفس الكواكب السيارة الثانية التابعة لمجموعة النظام الشمسي . وهي بالنسبة الى ابتعادها عن الشمس عطارد الزهرة المريخ المشتري زحل اورانوس نبتون وبلطون يضاف اليها الارض لانها كوكب سيار اما مركزها فيأتي بعد الزهرة وقبل المريخ .

٩٥٠٤ - خنفساء الخنساء : البقرة الوحشية .

٩٥٠٥ - خنشار
Polypodium (S).
Polypode (F). Polypody (E).
نوع من السراخس البرية والبريانية المعمرة . اروعته مدادة لحمية حلوة الطعم . اوراقه غروية ، ثنائية الصنف ، متعاقبة ، اهليلجية الشكل ، جامدة النصل ، كثيرة التفريش والتشريح || يرغب في الارربة الرطبة الظليلة .

٩٥٠٦ - خنشار أصفر
Polypodium aureum (S). Polypode doré, P. jaune (F). Golden polypody, Hares-foot fern (E). Gelber engelsüss (D). Polipodio (I).
نبات عشبي بري وزيتوني معمر من السراخس البسياسيات .

٩٥٠٧ - خنشار أنثى
Polypodium filix-femina, Athyrium filix-femina (S). Polypode femelle, Fougère femelle (F). Lady fern, Female polypody (E). Waldstreifenfarn, Weiblicherschildfarn (D). Polipodio felce femmina (I).
نبات عشبي بري وزيتوني معمر من السراخس يملو من

سمومها || كنيته عن الدميري : ابو جهم ، ابو زرع ، ابو دلف ابو عتبة ، ابو علي وابوقادم .

٩٤٩٠ - خنزير أبو قرن
Phacochoère (F).
African sanglier, Wart hog (E).
هو الحلوف من فصيلة الخنازير ، اطلبه .

٩٤٩١ - خنزير الأرض ، أبو أظلاف ، دوتيل
Orycteropus (S). Oryctérope, Cochon de terre (F).
Aard-vark, Earth pig (E).
جنس حيوانات افريقية لبونة من النملات ورتبة الدرد .

انواعه ثلاثة اشهرها الحبشي وهو كبير الجثة ، بطي الحركة ، صغير الرأس ، مستطيل الفنتيسية . اذنا كبيرتان مستطيلتان متصبتان . جلده خشن سميك . حليه كثيف قصير . قوائمه قوية . مقاطعه حادة تمكنه من احتفار التربة بها صلبت . طوله نحو ١٤٠ سم . وذنيه ٥٠ . ثوبه اسمر حطلي سوي اللون تعلوه ماجة صهباء || قوته الارضة والنمل يلتقها بلسانه الطويل . يعيش منفرداً مسرحه من الغروب الى الشروق . اناته تفضع جرواً واحداً ترضعه بضعة اشهر .

٩٤٩٢ - خنزير البحر
Marsoulin (F). Porpoise (E).
هو النخس من الحيتان الدلفينية .

٩٤٩٣ - خنزير الماء
Hydrochærus (S).
Cabiats, Capybara, Carpincho, Cochon d'eau (F).
Capybara (E).
حيوان لبون من القوارض وحيد الجنس والنوع . موطنه امريكا الجنوبية . ضخم الجثة ، ثقيل الحركة ، ابر الذيل . راسه مستطيل غليظ . شفته العليا مشرومة شارفة . عيناه بارزتان . اذناه مستديرتان ذلقتان . قوائمه قوية . طوله نحو ١١٥ سم . علوه ٥٠ وزله من ٤٥ الى ٥٥ كيلو . ثوبه الى الصبغة الخطية الصفراء || يألف المناقع وضفاف الانهر . يعيش جماعات متوسطة العدد . الانثى تفضع نحو ٥ جراء مرة واحدة في العام . قوته الاعشاب المائية والجنود والارز والذره والبطيخ الخ .

٩٤٩٤ - خنزير النهر
Potamochère (F).
River hog (E).
هو الحلوف ، اطلبه .

٩٤٩٥ - خنزير الهند
Cobaye (F). Cavia (E).
هو الكويبي ، اطلبه .

٩٤٩٦ - خنزير بحري
Sangler (F).
Boar-fish (E).
سمكة بحرية تدعى كبروس خنزيري ، اطلبها .

٩٤٩٧ - خنزير بري ، رت ، عفر
Sus (S). Sanglier (F). Wild boar (E).
انواعه عديدة جميعها من حيوانات العالم القديم . رؤوسها غروية ، فنانيسها مستطيلة مقطوعة . اذناها متوسطة القد منتصبه . قوائمها قصيرة . جلودها كثيفة اطلب . اذناها دقيقة مستطيلة ملتفة || تألف الغابات والمستنقعات تسرح في الليل . قوتها الجنود والكم والديدان والحلزون والبيض والفار والحبوب والبطاطا والملفت والحيات على اختلافها || انواعه عديدة اطلبها في مادة رت .

٩٤٩٨ - خنزير داجن
Sus domesticus (S).
Cochon, Porc (F). Pig, Swine (E).
نوع من الخنزير عديد الصروب والسلالات منها الانكليزية

٩٥٢٠ - خنفساء الانبار. Tribolium castaneum (S).
Petit ver de la farine (F). Rust-red flour beetle (E).
Reismehlkäfer (D).
حشرة من الغبشيات . اطلب تريبوليوم .

٩٥٢١ - خنفساء البطاطا

هي دوريفور البطاطا . اطلبها .

٩٥٢٢ - خنفساء التفاح

Anthonyme du pommier (F). Apple blossom weevil (E). Apfelblütenstecher (D).
هي أنتونوم التفاح حشرة من السوسيات . اطلبها .

٩٥٢٣ - خنفساء الجزر* ، فوليت قرناء

Molytus coronatus, Liparus coronatus (S). Molyte cornée (F).
حشرة من فصيلة السوسيات ورقية غمديات الاجنحة .

طولها نحو ١٢ مم. لونها الى السواد اللامع تعلوه بقع صفراء . الانثى ترمي بمكها في التربة فينقذ عن يرقات تنقب جذور الجزر والشوندر وتخلد فيها الانفاق والسرايب .

٩٥٢٤ - خنفساء الشوندر

Atomaire de la betterave (F).

حشرة مؤذية تتركب الشوندر وتدعى اتوماريه خطية . اطلبها .

٩٥٢٥ - خنفساء الفصة* ، فيتونوم الفصة

Phytonomus variabilis (S). Phytonome variable, P. de la luzerne, Babotte grise (F). Lucerne weevil, Alfalfa weevil (E). Luzerneblattnager (D).

حشرة من السوسيات طولها نحو ٥ مم. لونها كستني اغبر . تظهر في اذار تمتح مكها على سوق واوراق الفصة فينقذ عن يرقات تلتهم النصل وتبقى على المروق . وقد تركب النفل والملفوف والبطاطا .

٩٥٢٦ - خنفساء الورق

Galéruque (F).

Strawberry leaf beetle (E). Erdbeerblattkäfer (D).

حشرة من النضاريات تسمى الغرلوق .

٩٥٢٧ - خنفساء بيرية

Cicindèle (F).

هي السيستيديل ، اطلبها .

٩٥٢٨ - خنفساء برغولية

Puce de terre (F).

خنفساء صغيرة القد تركب الصليبيات ومشاغل الحس والتبع . اطلب خدوش .

٩٥٢٩ - خنفساء كاتبة

Ecrivain (F).

هي بروس الجفنة ، اطلبه .

٩٥٣٠ - خنفسيات بيرية ، سيستيديليات

Cicindélidés (F). Cicindelidae (E).

فصيلة الخنافس البيرية وهي حشرات من غمدات الاجنحة . اطلب سيستيديليات .

٩٥٣١ - خنق

Etouffage (F). Stifling (E).

هو خنق خادرات دود القز في الصلابة وذلك بواسطة الحرارة الرطبة او الناشفة .

٤٠ الى ١٢٠ سم . يعيش في الاماكن الظليلة الرطبة . اوراقه ضمية التجميع قمية الارتكاز جميلة الخضار الباهت كثيرة التفريخ والتشريع . زكائمه كلوية الشكل مهدبة الفشاء || يزرع ويحصد في جميع الاودية ، يخشى المعارض الجنوبية الكثيرة الشمس .

٩٥٠٨ - خنشار كبير

Fougère commune (F).

Eagle fern (E).

هو الديشار ، اطلبه .

٩٥٠٩ - خنشع

Rousserole turdoïde (F).

هو هازجة القصب ، اطلبها .

٩٥١٠ - خنشع الزيتون

Hypolais des oliviers (F).

طائر من الذعاليق وفصيلة الشحروريات . اطلب ذعلوقة الزيتون .

٩٥١١ - خنشع المصصاف

Hypolais icterine (F).

طائر مشهور باسم ذعلوقة المصصاف ، اطلبها .

٩٥١٢ - خنشع ثرثار

Hypolais polyglotte (F).

اطلب ذعلوقة ثرثارة .

٩٥١٣ - خنشول*

Janthocincla ocellata (S).

Janthocincla ocellé (F).

طائر يلفت النظر بحسن تقاطيعه من فصيلة التيمليات . موطنه بعض اصقاع الهند اخصها جبال خللا . يالف الادغال والبراري والاحراج المبعثرة الاشجار . ملجئه الحياتي جماعي ، جماعته قليلة العدد . قوته الحشرات والدويبات والبروز البرية || جسمه منسجم التكوين يطول نحو ٣٠ سم . رأسه معتدل الجرم . منقاده مخروطي صغير . جناحاه ذلقا الاطراف . ذنبه مروحي الشكل مستطيل . ساقاه معتدلتا الارتفاع . ثوبه متراكب الشقعة والصهبة والسمة السوداء . رأسه ومخسراه وزوره الى السواد اللامع . رداؤه وجناحاه منمشان بالابيض والاصفر . حنار ذنبه ابيض || يدثن عشه في الادغال القليلة الارتفاع عن سطح الارض . الانثى تحضن وحدها من ٥ الى ٧ بيضات بيضا الذكر يؤمن لها الغذاء .

٩٥١٤ - خنصر

Auriculaire (F).

Little finger (E).

الخنصر والخنصر الاصبع الصغرى من اليد . ج خناصر .

٩٥١٥ - خنصيص

الخنصيص : ولد البير .

٩٥١٦ - خنطل

Chat sauvage (F). Wild cat (E).

هو السنور الوحشي ، اطلبه .

٩٥١٧ - خنطبة

دوية (السان) .

٩٥١٨ - خنفساء

Coléoptère (F). Coleopter (E).

كل حشرة من غمدات الاجنحة مهما كانت فصيلتها .

٩٥١٩ - خنفساء الاجاص ، خنفساء الكمثري

Anthonyme du poirier (F). Apple bud weevil (E).

Birnknospenstecher (D).

حشرة من السوسيات . راجع أنتونوم الاجاص .



خنشول



خنفساء الجزر



خنفساء الفصة



خنكار

٩٥٤٢ - خَوَات ٥ Bousier (F). Dung-beetle (E).

نمت تعريف يطلق على بعض اجناس الحشرات من مدمات الاجنحة تعيش على الخثي وغيره من المواد البرازية .

٩٥٤٣ - خَوَار Mugissement (F). Bellowing (E).

صوت البقر وجوارها وعجيجها وتثيجها .

٩٥٤٤ - خَوَارَة Meuble (F).

Light, Mellow soil, Loose ground (E).
التربة الخوارة : اللينة السهلة . ج خور .

٩٥٤٥ - خَوَاف Eudromias (S).

Guignard (F). Eudromias (E).
جنس طير من طوال الساق وفصيلة الزقزقيات . انواعه المعروفة اربعة جميعها صغيرة القد ، ثنائية الثوب ، ثوبها الريبي ابيض من الخريفى || قائف الحياة الجماعية . سرها يمد بعض المئات . وهي من الفوارب القواطع التي تجوب البلاد في طلب الرزق اولاً ثم المشق . قوتها الحشرات والديدان || تدفن في افاحيص تعالجها في التربة بين الاعشاب وتبطنها بالقش والحزاز || اناتها تضع من ٣ الى ٤ بيضات اجاسية الشكل ، صغيرة القد ، زيتية اللون ، مرقشة بالاسود ، تحضنها وحدها نحو ١٥ يوماً .
اما انواعه الاربعة فهي :

خَوَاف أُسِيرِي Eudromias asiaticus (S).

خَوَاف جَنُوتِي Eudromias australis (S).

خَوَاف هِنْدِي Eudromias veredus (S).

خَوَاف مَبْدُول Eudromias morinellus (S).

٩٥٤٦ - خَوَاف مَبْدُول *

Eudromias morinellus (S). Guignard commun, G. de Sibérie, Pluvier des Alpes (F).

طائر من الخواف الفوارب القواطع . اعطانه تمتد من سيبيريا الى الشرق الاوسط وافريقية الشرقية والشمالية واروبة يحويها في طلب الرزق والمصيف والمشي || جسمه صغير القد ، ثوبه الريبي يتميز بروق الخضاب . ظهره وجناحه الى السمرة الزيتية الموج ، ريشها مطوق بالصهبة . رأسه اسود . محسره وحاجباه وزوره الى البياض الاخر . اسفل عنقه واعلى جوشنه الى الريدة المجعدة بالاشقر يحدها عند اواسط الجوشن خط اسود يعقبه طوق ابيض . بطنه ابيض الوسط ، صناعي الاطراف ، ذنبه الى السمرة الزيتية ينتهي بالابيض . متقاده وحدة عينه الى السمرة الخنطية . قائمته الى الريدة الخضراء || ثوبه الخريفى ينحرف الى الريدة المتفاوتة الاسمرار تعمق من الرأس الى الذنب وتزهر من المنق الى الافنيك . والاقسام البيض في الثوب الريبي تتحول الى صباية تملؤها رقشة ممره .

٩٥٤٧ - خَوَافِي Points cardinaux (F).

هي الجهات الاربعة الاصلية الشرق والغرب والشمال والجنوب .

٩٥٤٨ - خَوَافِي Chocottes (F).

من ريش جناح الطائر ما يكسي القوادم والمناكب من حافي السقط الداخلية والخارجية .

٩٥٤٩ - خَوَبَة Terre aride (F).

Barren ground (E).
ارض مدهاة لا نبت فيها .

٩٥٣٢ - خُنْكَار * Callistephus chinensis (S).

Callisthèphe, Reine-Marguerite commune (F).

China aster, Queen Margaret (E).
نبات زهري تزييني حولي وحيد الجنس والنوع عديد الضروب من الاسطريات وفصيلة المركبات . يعلو من ٢٥ الى ٨٠ سم . ساقه منتصب . اوراقه متعاقبة غليظة التسنين . ازهاره رؤسية ، فردية ، عريضة . قرصها اصفر ، لسيناتها مختلفة الالوان بالنسبة الى الضروب . يعيش في جميع التربة ويستمر ازهاره في فصلي الصيف والخريف .

٩٥٣٣ - خَنْتُور

كل شجرة رخوة الساق خوارة فهي خنورة .

٩٥٣٤ - خَنْشُورَة Echinorhine (F).

هي السنودة المشقة ، سمكة بحرية من القرشيات ، اطلبها .

٩٥٣٥ - خَنْشُوص

Porcelet, Goret, Cochonnet, Lalton (F). Young pig, Dirty fellow, Sucking-pig (E).

هو جرو الخنزير في اول عمره . ج خناقيص .

٩٥٣٦ - خَنْشُوص وَخْشِي Marcassin (F).

Young wild boar (E).
جرو الخنزير الوحشي .

٩٥٣٧ - خَنْثِين *٥ Dolium (S).

Dolium, Tonne (F). Dolium (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الخنثينيات . انواعه المعاصرة المعروفة نحو ١٧ منها ١٥ تعيش في المحيط الهندي والبحر الاحمر ونوعان في البحر الابيض المتوسط || جميع انواعه كبيرة القد بطينة اشهرها واحملها لونا الخنثين الحجلي (Dolium perdix) لونه الى الصفار الاشقر المرقوش بالابيض والاطحل .

٩٥٣٨ - خَنْثِينِيَّات ٥ Dolidae (S).

Dolidae (F). Dolidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل مشطيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعاصرة قليلة العدد منتشرة في بعض بحار البلاد الحارة || اصداؤها بطنية متتابعة الحلزونة المتقاربة الخفيفة التخديد الناعم . قواها مستطيلة مستعرضة الحثار الجانبي المحرز من الداخل والخارج || اجسامها معتدلة الحجم . رؤوسها مستعرضة ، مبطة ، ثنائية اللوامس المستطيلة المعبونة ، كبيرة الاخطام الاسطوانية النابضة . ارجلها راحة فضفاضة . ارجلها كبيرة اهليلجية الشكل ، تنفخ بالماء عند الحاجة تسهلا للوم وسرعة الحركة || اعرف اجناسها واشهرها الخنثين والكعكة .

٩٥٣٩ - خَنْو Miel (F). Honey (E).

الخمر هو الشراب العسل .

٩٥٤٠ - خَنْوَاء ، خَنْصَر Chaos (F). Chaos (E).

الخواء او النمر اختلاط عناصر المادة عند تكوين الكرة الارضية وفي بداية عهدها .

٩٥٤١ - خَنْوَانِم Pleuronecte zèbre (F).

سمكة بحرية تدعى بحباس مؤذر ، اطلبها .



خنثين



خواف مبدول

٩٥٦٠ - خَوْءَن ٥ ، فَوْزَارِيَوْم ٥
Fusarium
جنس فطور مجهرية من عمارة الوطحاتيات وفصيلة الكنتنيات . ونبمته سطحية الارتكاز ، كئائده عديدة الخلايا ، مستدقة الاطراف . كرىماته قزعية خلية لبدة . انواعه عديدة تركيب مختلف اعضاء النبات . اعرفها واشهرها ما يتبع .

٩٥٦١ - خَوْءَن الاسْطَر ٥

Fusarium conglutinans (S). Fusariose de l'aster (F).
فطر مجهرى يتطفل على الاسطر فيؤذيه || مظهره الخارجى ذبول في الاوراق والازهار يعقبه ظهور لطفة سماء اللون قليلة العرض تركيب الساق من جنبها الى قتها . يكافح باستعمال اسيتات النحاس المحلول ٠,٥ ٪ .

٩٥٦٢ - خَوْءَن البطاطا ٥

Fusarium coeruleum (S). Pourriture sèche de la pomme de terre (F).
فطر مجهرى يتطفل على البطاطا المخدوشة فيعطىها في اثناء حفظها || مظهره الخارجى قروح لاقىاسية الشكل والحجم يعملوها ندف خلى ابيض اللون ، اطحل الموج يقودها الى الانفلاق والعفن يعقبه جفاف اللباب واسمراره . يكافح بتطهير المخزن قبل ادخال البطاطا عليه وقد يتم ذلك اما باستعمال الفرمول او سلفات النحاس المحلولة ٢ ٪ .

٩٥٦٣ - خَوْءَن الخبازيات ٥

Fusarium vasinfectum (S). Fusariose des malvacées (F).
فطر مجهرى يتطفل على بعض الخبازيات منها القطن والياميه والعنبريون || مظهره الخارجى شحوب وانقباض وذبول في الاوراق يعقبها ارتخاء في الافنان يسبب لها نحو الترية . ثم تظهر على الجذور والسوق لطخ سمر كان سببها وصول المشيج الى الاوعية وغزوه خلايا اللحم والشكير .

٩٥٦٤ - خَوْءَن العشب ٥ ، خَوْءَن الشوفان ٥

Fusarium herbarum, Fusarium avenaceum (S).
فطر مجهرى عميم الانتشار يركب مختلف النباتات والار الناضجة والبذور الناشئة والمواد النباتية والمضوية المحفوظة . مظهره الخارجى يقع منبهة لاقىاسية الشكل والحجم حطية اللون سماء الخنار تركيب العضو المنحار ثم يمتطقه بنشاء من الحبل اللبد ، وردي اللون ، فضي الموج يتسع وينتشر بسرعة فيقضي على النسيج المنحارة بعد ان يعفها ويقودها الى الانحلال .

٩٥٦٥ - خَوْءَن العفن ٥ ، خَوْءَن صولاني ٥

Fusarium solani (S).
فطر مجهرى يعيش ريباً على عدة نباتات ويتطفل على غيرها . يركب الجذور والسوق والاغصان والاوراق والثمار لكنه يأتي بعد غيره فيتابع العمل الهدام الذي يشره سلفه || مظهره الخارجى يقع سمر لاقىاسية الشكل والحجم تركيب بشرة النسيج ثم تتحول الى قروح تعلوها كتل من العفن تعطب الاعضاء المصابة وتقودها الى اليباس .

٩٥٦٦ - خَوْءَن القَرْءَنفَل ٥

Fusarium d'ianchi (S). Fusariose de l'oeillet (F).
فطر مجهرى يتطفل على القَرْءَنفَل فيؤذيه ويميته || مظهره الخارجى ذبول في نصل الاوراق يعقبه اصفرار وجفاف ثم سقوط الاوراق الواحدة تلو الاخرى الى ان يذوي

٩٥٥٠ - خَوْءَة
Terre inculte (F).
الخوا : الارض الخالية الجادسة . Waste land (E).

٩٥٥١ - خَوْءَع ٥

Lyperosia (S).
Lyperosie, Mouche irritante (F). Lyperosia (E).
جنس ذباب لاسع من فصيلة الدبابيات . انواعه عديدة جميعها صغيرة القد جشعة الى الدم . اثوابها الى السمرة يعملوها توشيح وتبييض اصفر . متاكها رهيفة ناخزة وماصة . مكئها احمر اللون تمتحه في رجيع الحيوانات العاشية فينقف عن ذباب يعيش اول عهده على الرجيع ويكثر وجوده فوق اعشاب المراعى الرطبة . يقتحم الدواب والابقار والكلاب فيلسعها وينقل اليها الامراض المعدية .

٩٥٥٢ - خَوْء ٥

Prunus domestica (S).
Prunier (F). Prune tree, Plum tree (E). Hans-pflaume (D). Prugno, Susino (I).
جنس اشجار مثمرة من فصيلة الورديات . انواعه وضروبه عديدة جميعها شجيرات واشجار يراوح ارتفاعها من ٣ الى ٧ امتار . جذورها سطحية . سوقها ضخمة . اغصانها فارشة اوراقها معنقة متعاقبة ، نصلها بيضي مسنن الحافة ، خلى الصفحة السفلى . ازهارها صغيرة القد مختلفة التجميع ، يتلاتها الى البياض الاصفر . ثمارها مأكولة لذيدة الطعم تجفف وتربب ويستخرج من عصيرها كمحول جيد الصنف . وهي خوخية ، بيضية او مستديرة ، سودقها لحمي لبي ، عجباتها مستطيلة مفلطحة قاسية تطف برة جامدة اللباب يبيض اللون مرة الطعم || تنمو في جميع المناطق المعتدلة الحرارة . ترغب في التربة المنسوبة التركيب ، العميقة الغور . تحشى الرطوبة المستحكمة والجفاف المضني . تتكاثر بالبذر والفسائل والتطعيم .

٩٥٥٣ - خَوْء الماء

Lysimaque commune (F).
Common yellow loosestrife (E).

هو السرمج الشائع ، اطلبه .

٩٥٥٤ - خَوْء بري

Prunier sauvage (F).
Wild prune tree (E).

هو البرقوق ، اطلبه .

٩٥٥٥ - خَوْء شائك

Prunier épineux (F).
Sloe tree (E).

هو البرقوق الشائك ، اطلبه .

٩٥٥٦ - خَوْء مجفف

Pruneaux (F).
French plum (E).

كل خوخ جفف وحفظ . اجوده ما فقد ازبمة اخناس مائته دون ان يفقد اللدانة والرهمة .

٩٥٥٧ - خَوْء ملابار

Jambosier (F). Jambosa (E).

هو تفاح الورد ، اطلبه .

٩٥٥٨ - خَوْءة ، بَرْءَوْءة

Prune (F). Plum (E).

ثمرة الخوخ والبرقوق .

٩٥٥٩ - خَوْءَل

Volvariella speciosa (S).
Volvaire remarquable (F).

قطر مأكول من فصيلة الغاريقونيات . يوجد في غابات الاشجار العروة اخصها السديان . يعيش على المواد النباتية المنحلة . ساقه رفيعة ، منتصبية ، مستضخنة القاعدة ، كبيرة اللحية ، لونها الى البياض الاغبر . نكمتة قلنسوية الشكل ، طحلاء اللون ، لزجة عند اللمس ، قطرها نحو ١٠ سم . اطراسها الى الصفرة الصناعية || لحميته جامدة المكسر ، جيدة الصنف ، مأكولة .



خَوْءَع




خَوْء



خَوْءَن البطاطا



خَوْءَن البطاطا




خَوْءَن العشب

٩٥٧٢ - خَوْدَن يَآت ٥

Cassididae (S).

Cassidids (F). Cassididae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مديات الأرجل مشطيات الخياشيم. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة بعضها من متحجرات الاحقاب الطباشيرية والثالثة والبعض الآخر معاصر منتشر في معظم بحار العالم || تتميز دويبات هذه الفصيلة باصدافها الرافعة وبارجلها المستعرضة وباسقاطها الهلالية الشكل || اعرف اجناسها واشهرها الخوذية والعراط.



خودن لبني

٩٥٧٣ - خَوْدِيَّة ٥

Cassidaria (S).

Cassidaria (F). Cassidaria (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الأرجل وفصيلة الخوذيات. انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد المتوسطة الحرارة ومنها البحر الابيض المتوسط || اصدافها قريبة الشبه بالخوذة الرومانية. فوهات مستطيلة. اعقابها هرمية الشكل.

٩٥٧٤ - خَوْر

Embouchure, Estuaire (F).

Embouchure, Mouth, Estuary (E).

الخور هو مصب مياه النهر في البحر اذا اتسع وعرض. ج الخوار.

٩٥٧٥ - خَوْرَان

Anus des solipèdes (F).

Anus of solipeds (E).

٩٥٧٦ - خَوْرَمَة

Rocher crevassé (F).

خورمة ج خورم، صخرة من حشاف البحر والنهر تكثر فيها الخروق والثقوب المتباينة الاشكال.

٩٥٧٧ - خَوْرَنَق *، سِيدَا

Sidalcea (S).

Sidalcée, Sida, Side (F). Checker bloom, Greek mallow (E). Doppelmalve (D). Sida (I).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الجبازيات. انواعه عديدة معظمها بري وبعضها زراعي تربيته. سوقها فراء متشعبة. اوراقها متعاقبة مفصصة او مفرضة. ازهارها تاجي الارتكاز عنقودي او سنبلية التجميع. ازهارها لاطة او قصيرة الزناد، متكها ازرق بثلاثية مختلفة الالوان. اعرف انواعه التزيينية الثلاثة التالية.

٩٥٧٨ - خَوْرَنَق اَبْيَض

Sidalcea candida (S).

Sidalcée blanche (F).

بجلة معمرة تعلق من ٨٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها لاقياسية التفصيص، نصلها لامع البشرة الملساء. ازهارها عنقودية التجميع. بيضاء اللون، زرق المياسم || ازهارها يستمر من اوائل حزيران الى اواسط تموز.

٩٥٧٩ - خَوْرَنَق حُبَارِي

Sidalcea malvaeflora (S).

Sidalcée à fleurs de mauve (F).

جنية معمرة تعلق من ١٠٠ الى ١٨٠ سم. اوراقها صغيرة القد، مفرضة، نصلها ملس البشرة. بحري اللون. ازهارها كبيرة القد عنقودية التجميع، لونها الى الاحمر الارجواني || ازهارها يستمر طوال الصيف.

٩٥٨٠ - خَوْرَنَق سُنْبِلِي

Sidalcea spicata (S).

Sidalcée en épis (F).

عشبة معمرة تعلق من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقها لاقياسية التفصيص. نصلها خلي البشرة. ازهارها صغيرة القد، سنبلية التجميع، خراء اللون || ازهارها يستمر من تموز الى آب.



خورنق

النبات || اما الفطر وهو مجموعة من الكتل الندية الحملية الصغيرة، لونها الى البياض يعلوه موج وردي، يظهر على السوق بعد بياضها || يكافح عند ظهوره برش التربة والنبات بسائل سلفات الحديد المحلول ٥ ٪ بمعدل ٣ لتر للمتر المربع الواحد.

٩٥٦٧ - خَوْدَن الْقَرْنِيَّات ٥

Fusarium redolens

فطر مجهري يتطفل على نباتات الفصيلة القرنية انحصها الحصص والبرسيم والتفل || مظهره الخارجي اصفرار في الاوراق يعقبه ذبول وارتماء ثم ظهور بقع سمر مستطيلة على السوق والجذور تقضي على التبادل النسفي وتقود النبات الى الهلاك || يكثر في الاراضي الخصبة الرطبة لذلك يحسن اجتنابها.

٩٥٦٨ - خَوْدَن الْكَتَّان ٥

Fusarium lini (S).

Fusariose du lin (F).

فطر مجهري عيم الانتشار يتطفل على الكتان فيميته. مظهره الخارجي ذبول يحل بالنبات يقوده الى بياس الاوراق والسوق. سببه اختناق الجذور عن عرصات الفطر ومشيجه التي تبدو بيضاء اللون ثم تنحرف الى الوردي || يكافح باقتلاع وحرق النباتات الموصومة وبتطهير البذار قبل استعماله بعد اجتناب التربة القوية الاندماج.

٩٥٦٩ - خَوْدَن النَّجِيلِيَّات ٥

Fusarium culmorum, Fusarium rubiginosum (S).

فطر مجهري يتطفل على معظم النجيليات الزراعية. انحصها الشوفان والشعير والشيلم والحنطة والذرة || يركب الحب عند انتاشه في التربة فيقضي عليه. ويركب السوق عند الاشطاء فيذويها. ويصيب الزروع قرب اسباطها في سلامياتها واعقاد عصفها فيعطها وقد يحول دون تكوين الحب || يكافح بتطهير البذار وواجتناب المواقع الرطبة وتقتين عنصر الازوت الذي ينشط المواد الخضرية التي تلام انتشار الفطر.

٩٥٧٠ - خَوْدَن اُوكْسِيَسْبُورُم ٥، وَصَم بَنَمَا

Fusarium oxysporum (S). Maladie de Panama (F).

فطر مجهري شائع الانتشار يكثر في البلاد الاستوائية والحرارة، يركب عدة نباتات مختلفة الاجناس ويتطفل على الثمار الناضجة المخدوشة فيعطها || مظهره الخارجي يختلف باختلاف النبات العائل. فهو على التبغ اسوداد يحل بالجذور وبالزمام الاول من الساق في القسم المتجه نحو اشعة الشمس || وهو على الموز وصم يعثري الارومة وجذورها فيمنعها عن القيام بعملها الحيوي على الوجه الاكل فتبدو النصوص ضعيفة هزيلة يعلوها طرح صغير القد يستمر كضمة زهرية، خراء اللون، في قمة الجذع الى ان يذبل ويذوي على النصبة || يكافح باقتلاع النباتات الموصومة وبتطهير التربة بسائل سلفات الحديد المحلول ٥ ٪ بمعدل ٥ لتر للمتر المربع الواحد.

٩٥٧١ - خَوْدَن لَبْنِي ٥

Fusarium lactis

فطر مجهري يتطفل على التفاح والاجاص والسفرجل والحليب واللبن والزبدة || يركب الثمار الناضجة المشوهة التي عطها العفن فيسرع في انحلالها وهريانها || ويركب الحليب واللبن والزبدة عند فساد بعض الحماز فيذكي الفساد ويسبب مرارة الطعم.

٩٥٩٠ - خَوَق ° Phtiriose, Maladie de Jaffa (F).
ويسمى مرض يافا ومرض الكرم. وصم تحذره الدمة
البيضاء في سنخ الكرمة سببه وخز الحشرة الذي يهريق
العصارة فتعيش عليها بعض الفطور المجهرية الرمية التي
تلحف السنخ ثم تمتد شيئاً فشيئاً الى ان تقضي على الجذور.
يكافح بالقضاء على الدمة البيضاء. اطلبها.

٩٥٩١ - خَوْلَان Lyciet d'Arabie (F).
هو حوض الجزيرة، اطلبه.

٩٥٩٢ - خَوْلَنْجَان Alpinia (S).
Alpinie, Galanga (F).
جنس نباتات عشبية جذمورية معمرة من فصيلة الزنجبيلات.
انواع عديدة منها الطيبة والتريينية والبرية. جذاميرها متشعبة
اوراقها مزدوجة التصنيف سنانية النصل الكبير القد.
ازهارها سنبلية هامي. ازهارها بيض. تويج الزهرة مستطيل
الشفيفة، قصير البتلة || اعرف واشهر انواعه الطيبة
والتريينية ما يلي.

٩٥٩٣ - خَوْلَنْجَان صِينِي Alpinia chinensis (S).
Alpinie de Chine (F).
نوع من الخولنجان يعلو نحو المتر. جذاميره اصبعية
القد والشكل. اوراقه معنقة قصيرة الزناد، نصلها سناني
الشكل يطول نحو ٢٥ سم. ازهاره صغيرة القد بتلاتها
تطول نحو ٦ مم. || يزرع للتزيين.

٩٥٩٤ - خَوْلَنْجَان كَبِير *، خَوْلَنْجَان Alpinia galanga (S).
Galanga majeur (F). Galangal
major, Siamese ginger (E). Galgant, Grosse galgan
(D). Galanga maggiore (I).
نوع من الخولنجان الطبي. جذاميره عفية تستعمل استعمال
الخولنجان المخزني، لكنها اقل نفماً وقية || يعلو نحو
٢٠٠ سم. اوراقه كبيرة سنانية النصل. ازهاره مستعرضة
البتلات. خواصه المميزة قليلة الجوهر والمادة الفعالة.

٩٥٩٥ - خَوْلَنْجَان مَخْزَنِي * Alpinia officinarum, Galanga officinalis, Maranta
galanga (S). Galanga vrai, G. mineur, G. de la Chine
(F). Galangal, Lesser galangal (E). Galgantwurz, Pfeilwurz (D). Galanga, G. minore, Erba ginestrina (I).
نوع من الخولنجان الطبي مشهور بخواصه المقوية النافعة
المستعملة لاستنهاض الشبق. يعلو نحو ٧٠ سم. اوراقه
سنانية النصل، ذلقة الزام الاخير المذهب المقصصة.
ازهاره سنبلية. جذاميره اصبعية الشكل تطول نحو ٦ سم.
قطرها من ١٠ الى ١٢ مم. رائحتها عطرية مفلطلة، طعمها
حاد حريف. خواصها المميزة مواد صمغية راتنجية مع
بعض الجواهر الفعالة والادهان العطرية.

٩٥٩٦ - خَوْلَنْجَان مَلَقَّة Alpinia malaccensis (S).
Alpinie de Malacca (F).
نوع من الخولنجان يعلو من المترين الى الثلاثة امتار.
جذاميره غليظة، كبيرة القد. اوراقه سنانية النصل
الازغب، تطول من ٣٠ الى ٣٥ سم. ازهاره سنبلية
عنقودي يطول نحو ٤٠ سم. ازهاره خلية الاجزاء مستطيلة
الشفيفات، مستعرضة البتلات || يزرع للتزيين.

٩٥٩٧ - خَوْلَنْجَان مُمَوَّه * Alpinia speciosa (S).
Alpinie spéclause, Langose (F). Shell flower (E).
Alpinie (D). Alpinia (I).
نوع من الخولنجان الطبي المتوسط الخواص والمواد. يعلو

٩٥٨١ - خَوَزْب Enflure (F). Swelling (E).
الخوزب هو الورم في ضرع الناقة والبقرة والنعجة والعنز.
٩٥٨٢ - خَوْش Flanc (F). Side (E).
هي الحاصرة عند الدويبات والحشرات.

٩٥٨٣ - خَوْشَان *، خَانِي الْكَتْل Apocynum (S). Apocyn, Tue-chien, Apocin (F). In-
dian hemp, Dog's bane (E). Hundskohl, Indischen
hanf, Hanfhundsgift (D). Apocino (I).
جنس نبات عشبي طبي معمر من فصيلة الدفليات. ساقه
وفروعه ليفية منتصب. اوراقه كاملة متقابلة رهلة النصل.
ازهاره تاجي الارتكاز. ازهاره جرسية صغيرة القد،
ثمارة نخيلة مستطيلة بزورها دقيقة نائشة العفرة || اوراقه
وبزوره تدخل في عدة مستحضرات طبية مسهلة وبقيشة.
يستخرج من الياض خيوط كالقنب تستعمل استعماله.
انواع عديدة منها البرية والزراعية والتريينية، اشهرها
الثلاثة التالية.

٩٥٨٤ - خَوْشَان الذُّبَاب Apocynum androsaemifolium (S). Apocyn gobe-
mouches (F).
نوع من الخوشان يعلو من ٧٠ الى ١٢٠ سم. فروعه
افقية الانتشاب، متباعدة، لاقياسية الارتكاز. اوراقه
بيضية الشكل تطول نحو ٧ سم. وتعرض ٤، نصلها
ازغب الصفحة السفلى. ازهاره وردية اللون يعلوها موج
ابيض || يزرع للتزيين. ازهاره يستمر من تموز الى
ايلول.

٩٥٨٥ - خَوْشَان قُنْبِي Apocynum cannabinum (S). Apocyn chanvrin (F).
نوع من الخوشان. يعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. فروعه
شبه منتصب. اوراقه معنقة بيضية الشكل تطول نحو
١٠ سم. وتعرض ٥ ازهاره بيضاء اللون تعلوها مشحة
خضراء || يزرع للتزيين. ازهاره يستمر من حزيران
الى تموز.

٩٥٨٦ - خَوْشَان مُنْتَصِب Apocynum erectum (S). Apocyn dressé (F).
نوع من الخوشان البري الطبي يعلو نحو المتر. فروعه
منتصب. اوراقه لائحة، حاضرة، اهليلجية تطول نحو
٥ سم. ازهاره قرمزية اللون || اوراقه وازهاره وبزوره
طبية.

٩٥٨٧ - خَوْشَل * Tétracère (F).
جنبه عارضة معمرة طبية من فصيلة الدلانيات. مهدا البلاد
الاfrيقية الاستوائية والحارة. ساقها تطول اكثر من ٥٠
متراً. اوراقها متناوبة، معنقة، اهليلجية النصال،
ازهارها ابوية الارتكاز، خمبية التجميع، بيضاء اللون
او صفراء. ثمارها جراء تفلت بعض البزور || اوراقها
وثمارها حفصة تستعمل في معالجة الجروح.

٩٥٨٨ - خَوْص Feuilles du dattier (F).
ورق التخليل. الواحدة خوصة. Leaves of date tree (E).

٩٥٨٩ - خَوْط * Lambourde (F). Soft (E).
قصيب صغير وقصير طوله يراوح من ١ الى ٣ سم.
ينتشب عمودياً في فروع التفاح والاجاص ويتحول الى
براعم ثمرية.



خوشان



خوشل



خوط



خولنجان كبير



خولنجان مخزني



خولنجان مموه



خونق



خويلدة



خيار



خيار منديرا



خيتل

٩٦٠٦ - خَيْتَارُ الْفَرَنْجِي Chayote (F).
هو السكيوم نبات زراعي من القرعيات ، اطلبه .

٩٦٠٧ - خَيْتَارُ الْبَحْرِ Holothurie (F).
Sea cucumber (E). هو قنار البحر ، اطلبه .

٩٦٠٨ - خَيْتَارُ الْكَبِيرِ Cornichon (F).
Gherkin (E). كل خيار من اي ضرب كان قطف باكراً ، قبل اكتمال
بزره ، للاكل او للكبس .

٩٦٠٩ - خَيْتَارُ بَرِّي Echinocystis lobata (S).
Concombre sauvage (F). Bitter root, Wild cucumber-vine (E). Wilder gurkenischt (D). Cocomero salvatico (I).

نبات عشبي بري حولي مداد من فصيلة القرعيات .
ثمارة صغيرة القد حمراء اللون غير مأكولة . ينبت في
الآتربة الرطبة .

٩٦١٠ - خَيْتَارُ شَنْبَرِ Cassier (F).
Pudding pipe tree (E). هو الخرنوب الهندي ، اطلبه .

٩٦١١ - خَيْتَارُ مَسْدِيرَا * Cucumis sacleuxii (S).
Concombre de Mandéra (F). Cucumber of Mandira (E).

نبات عشبي زراعي معمر من القرعيات . ساقه فرعاء
مدادة . اوراقه متعاقبة مستطيلة الزناد . نصلها خشن
الملس مهدب الصفحة . ثماره بيضية الشكل تطول من
٨ الى ١٠ سم . وتعرض من ٤ الى ٥ سم . لونها الى الخضار
الاصفر يعلوه تمشيع قائم قاطب . وهي جامدة المكسر
تستعمل في الخللات .

٩٦١٢ - خَيْتَالُ الْبَادِيَةِ Courvite (F).
هو الزغزغ ، من الزقزاقيات ، اطلبه .

٩٦١٣ - خَيْتَانَةُ الْأَمَانَةِ Abus de confiance (F).
Breach of trust (E). جنحة يرتكها كل من بدد عهدة في ذمته فتصرف فيها
لغير القصد الذي تسلمها لاجله .

٩٦١٤ - خَيْتَانَةُ التَّوْقِيعِ عَلَى بَيَاضٍ Abus du blanc-seing (F).
Breach of signature to a blank (E). جنحة يرتكها المستأمن وذلك لخالفته العقد الذي استؤن
التوقيع عليه .

٩٦١٥ - خَيْتَعُورُ Hydromètre (F).
Water skipper, W. strider (E). حشرة صغيرة القد من الزخارف مستطيلة القوائم تعيش
على سطح الماء الراكد تستن فيه ذهاباً واياباً ، راجع زخرف .

٩٦١٦ - خَيْتَلُ * ، مَنَعُ مُصْرَفُ Portunus (S). Portune, Etrille, Crabe à laine (F).
Swimming crab (E). جنس دوبيات بحرية من القشريات وفصيلة الخيتليات .
انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد المعتدلة
الحرارة والباردة . اجسامها مبططة . دروعها قليلة الاحديداد
زباء القشار مما دعا الى تسميتها بالمنع المصوف . حشار

نحو ١٢٠ سم . اوراقه معتقة مستطيلة ، نصلها سناني
ازغب الصفحة السفلى . ازهاره متوسطة القد مستطيلة
الشهيفات مستعرضة البتلات || تكثر زراعته في بعض
مناطق الشرق الاقصى نظراً لكثرة انتاج جذاميره التي
يغشون بها الخولنجان الحزني .

٩٥٩٨ - خُولَنْجَان يَابَانِي Alpinia japonica (S).
Alpinie du Japon (F). نوع من الخولنجان يعلو من ٤٠ الى ٥٠ سم . جذاميره
نخيلة مستطيلة . اوراقه معتقة زناده يطول نحو ٢ سم .
نصلها سناني الشكل مستعرض طوله نحو ٣٠ سم . صفحته
السفلى خلية البشرة . ازهاره كبيرة القد || يزرع
للزينة .

٩٥٩٩ - خَوَيْي Rhynchée (F).
راجع جوائنة ، طائر من دجاجيات الارض .

٩٦٠٠ - خَوَيْي الرَّزْ Glaréole à collier (F).
Pratincole (E). هو أبو اليسر ، اطلبه .

٩٦٠١ - خَوَمَع Mouche bleue de la viande (F).
هو الصيدن الازرق ، اطلبه .

٩٦٠٢ - خَوَلَفُ * Gymnopilus penetrans (S).
Gymnopile pénétrant (F).

فطر كاعن الصنف لا يؤكل من فصيلة الفاريقونيات .
اعطائه اقليم الصنوبريات حيث يعيش على الاخشاب
النخوة . بوغه اخضر اللون . ساقه قصيرة . بيضاء القاعدة ،
عنابية القسم الآخر . ارسوسته شبه مخروطية الشكل ، بنية
اللون ، صفراء المواج ، قطرها نحو ٥ سم . اطراسه حادة ،
لبدة التجميع . رائحته ، عند لمس ، مستحبة .

٩٦٠٣ - خَوَيْلْدَةٌ * Cucullaea (S). Cucullée (F).
جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفيحيات الخياشيم
وفصيلة الفلكنيات . انواعها المعروفة ثلاثة موطنها انوار
الانهر الهندية والصينية || اصداقها تزاوية الشكل قريبة
الشبه بالخوذة . مصاريهما متساوية . مفصلاتها مسننة .
اسنانها الداخلية قصيرة || تعيش في الاسحال والرمال .
لحومها كاعنة الصنف .

٩٦٠٤ - خَوَيْطُ ، خَيْطُ الْمَشْبَرِ Filet (F). Fillet (E).
الجزء الخيطي ، حامل المشبر ، من سداة الزهرة .

٩٦٠٥ - خَيْتَارُ * ، قَشْدُ Cucumis sativus (S).
Concombre (F). Cucumber (E). Echte gurke, Gurken, Kukumer (D). Cocomero, Cetriolo (I).
نبات عشبي حولي زراعي من فصيلة القرعيات . ضروبه
عديدة سوقه ليفية مدادة عارشة . اوراقه كبيرة القد .
كفية الشكل ، زناده منتصب مستطيل ، نصلها بارز
الضلع والعروق ازغب البشرة على صفحته . ازهاره
غشوية كبيرة القد ، صفراء اللون . ثماره بطيخية اسطوانية
مستطيلة مأكولة مختلفة الاشكال والالوان . حصارة ثماره
صناعية تدخل في عدة تراكيب ومستحضرات صحية خاصة
بالبشرة || يزرع في جميع الآتربة المنسوبة العناصر
الغذائية . يفضل الخفيفة والمتوسطة الانساج اخصها
الانواع الباكورية التي ترغب في المواقع الدافئة والمعارض
المشمسة .

٩٦٢٩ - خَيْرَزَان ، جَنْهِي *Bambusa* (S).
Bambou (F).
 جنس نباتات قصبة برية وزراعية من عمارة الخيزرانيات
 وفصيلة النجيليات . انواعه عديدة ترغب في الاراضي
 الخفيفة الرطبة . اشهرها ما يلي .

٩٦٣٠ - خَيْرَزَان رُبَاعِي التَضْلِيْع *Bambusa quadrangularis* (S). *Bambou quadrangulaire* (F).
 نوع من الخيزران يعلو من ٦ الى ٩ امتار سلامياته
 رباعية التضييع لونها الى الخضار الاصفر . اوراقه تطول
 من ١٥ الى ١٨ سم . وتعرض نحو ٢ سم . نصلها منشاري
 الحافة باهت الخضار || يرغب في الاتربة الخفيفة الغنية
 الرطبة .

٩٦٣١ - خَيْرَزَان ضَيْقُ الْوَرَق *Bambusa angustifolia* (S). *Bambou à feuilles étroites* (F).
 نوع من الخيزران يعلو من ٣٠ الى ٧٠ سم . سوقيه نحيلة
 سلامياته الى الخضار الشبي . اوراقه ضيقة تطول نحو ١٠
 سم . وتعرض نحو ٦ سم . نصلها منشاري الحافة جميل
 الخضار || يرغب في الاتربة الخفيفة الغنية الرطبة .

٩٦٣٢ - خَيْرَزَان عَلْجَانِي * *Bambusa arundinacea* (S). *Bambou commun*, *Bambousier* (F). *Common bamboo* (E). *Bambusrohr* (D). *Bambie* (I).
 نوع من الخيزران يعلو من ٦ الى ٢٠ م . سلامياته
 مستطيلة . ثلاثية او رباعية التضييع . عجره بارزة الختار .
 افئاده ثنائية الانتشاب . اوراقه تطول من ٣ الى ٩ سم .
 وتعرض من ٥ الى ١٥ م . نصلها مسنن الحافة ، ذلق
 الزام الاخير ، لونه الى الخضار العابق الموج ثم ينحرف
 مع البلوغ الى الاصفر || يعتبر من النباتات السبروتية
 التي تجود في جميع الاتربة الخفيفة والمعتدلة الاندماج
 الممكن ربا .

٩٦٣٣ - خَيْرَزَان قَرَم *Bambusa pygmaea* (S). *Bambou pygmée* (F).
 نوع من الخيزران يعلو من ١٥ الى ٣٠ سم . سلامياته
 بنفسجية اللون . اوراقه تطول من ٧ الى ٢٠ سم . نصلها
 خلي الصفحة العليا لبد السفلى || يرغب في الاتربة
 الخفيفة الغنية الرطبة .

٩٦٣٤ - خَيْرَزَان مَبْدُول *Bambusa vulgaris* (S). *Bambou vulgaire* (F). *Feathery bamboo* (E). *Bambus* (D). *Bambie* (I).
 نوع من الخيزران يعلو من ٦ الى ٨ امتار . سلامياته
 متوسطة الطول . عجره بارزة الختار . افئاده منفرجة
 الزوايا والانتشاب . اوراقه تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم .
 نصلها مسنن الحافة ، ذلق الزام الاخير ، اخضر الصفحة
 العليا ، بحري السفلى || يزرع ويجود في جميع الاتربة .
 يفضل الرطبة .

٩٦٣٥ - خَيْرَزَان مَبْهَرَج *Bambusa fastuosa* (S). *Bambou fastueux* (F).
 نوع من الخيزران يعلو من ٥ الى ٢٥ م . سلامياته
 اسطوانية مستطيلة لونها الى الاخضر الاصفر ينحرف
 مع البلوغ الى السمرة . اوراقه تطول من ١٢ الى ١٧ سم .
 وتعرض نحو ٣ || يرغب في الاتربة العميقة الغور
 المتوسطة الاندماج الوفرة المواد العضوية والرطبة .

دروعها الامامية مسنن الحافة . الزوج الخلفي من قوائمها
 مجدافي الفصل الطرفية . اثنائها تراوح من الشبهة الرصاصية
 الى الجؤرة || لحومها متوسطة الصنف ، مأكولة .

٩٦١٧ - خَيْتَلِيَّات ٥ *Portunidae* (S). *Portunidés* (F). *Portunidae* (E).
 فصيلة من القشريات عشاريات الارجل نصيرات الذيل .
 اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . اجسامها مبططة ،
 قليلة الاحديداب . الزوج الخلفي من قوائمها مجدافي الفصل
 الطرفية || اعرف اجناسها واشهرها الخيتل .

٩٦١٨ - خَيْتَمَة *Tigresse* (F). *Tigress* (E).
 الخيشمة : انثى الببر .

٩٦١٩ - خَيْدَع ، خَيْطَل *Chat* (F). *Cat* (E).
 هر السنور والهر والقط .

٩٦٢٠ - خَيْرَا *Catéchu* (F). *Khair tree* (E).
 هي الكاشو ، اطلبه .

٩٦٢١ - خَيْرَالله *Perce-feuille* (F). *Thorow-wax* (E).
 هر الحلاب المستدير الورق ، اطلبه .

٩٦٢٢ - خَيْر بُوا *Meleguette* (F). *Meleguetta-pepper* (E).
 هو الهال الذكر ، اطلبه .

٩٦٢٣ - خَيْرُوط ٥ *Chirotes* (S). *Chirote* (F).
 جنس عطاء من فصيلة الخيروطيوات . انواعه المعروفة قليلة
 العدد . اعطانها المكسيك || اجسامها حديدية التركيب ،
 دودية الشكل ، تطول نحو ٢٠ سم . جميعها ثنائية القوائم
 الشديدة الصغر ، المنقية الانتشاب والارتكاز ، تبدو
 كأنها لا تصلح للعمل || اثنائها الى الصبهة تعلوها مشعة
 كستنية تمتد من العنق الى الذيل || قوتها الديدان والحشرات
 الصغيرة .


٩٦٢٤ - خَيْرُوطِيَّات ٥ *Chirotidae* (S). *Chirotidés* (F). *Chirotidae* (E).
 فصيلة زحافات من العظائيات . اجناسها وانواعها المعروفة
 قليلة العدد . اعطانها بمصر مناطق امريكة الشمالية والجنوبية
 اجسامها حديدية التركيب ، اسطوانية الشكل ، تطول من
 ١٨ الى ٢٦ سم . رؤوسها صغيرة ، مستديرة الاخطام .
 عيونها شديدة الصغر ، ماسحة . قوائمها ثنائية ، صغيرة
 تنشب بين مؤخر الرأس والعنق || قوتها الديدان والحشرات
 الصغيرة .

٩٦٢٥ - خَيْرِي *Giroflée* (F). *Garden stock* (E).
 هو المنشور ، اطلبه .

٩٦٢٦ - خَيْرِي أَصْفَر *Giroflée jaune* (F). *Yellow gillflower* (E).
 هو المنشور الاصفر ، اطلبه .

٩٦٢٧ - خَيْرِي الْبَر *Lavande femelle* (F). *True lavender* (E).
 هو الخزامى الحقيقية ، اطلبها .

٩٦٢٨ - خَيْرَزَان الاكر من فراخ النعام .



خيزران علجاني



خيزران مبدول



خيزقة

٩٦٤٤ - خَيْضَل رَحْص ٥

Malope malacoides (S). *Malope malacoides* (F).
نوع من الخيزل. عشبة حولية تزيينية هرمية الشكل، تملو نحو ٤٠ سم. أوراقها ثلاثية أو خماسية الفلق المسننة الحتار. نساها خلية البثرة على صفحتها العليا والسفل. ازهارها وردية اللون، معتدلة الحجم || تنويرها يستمر من تموز الى ايلول.

٩٦٤٥ - خَيْضَل رُوب ٥

Cylichna (S).
Cylichne (F). *Cylichna* (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الطائيات. انواعها المعاصرة المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم بحار العالم || اصداقها صغيرة القد، بيضاء اللون، شبه اسطوانية الشكل ملحوفة بالارضية الفضفاضة.

٩٦٤٦ - خَيْضَل ٥

Tallis (F). *Copse* (E).
الخيس هي الحرجة او الغابة المكونة من اشجار ملحاء نمت فراخاً على اروم اشجار قطعت.

٩٦٤٧ - خَيْضَل قُوج ٥

Grains de coton (F).
Cotton seeds (E).
هو حب القطن. ومنهم من قال الخشب البالي.

٩٦٤٨ - خَيْضَل ٥

Scalenostoma (S).
Scalénostome (F). *Scalenostoma* (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الاوليميات. انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض مناطق المحيط الهندي || اصداقها صغيرة مخروطية الشوزن، رقاجية الحلزونة، محززة، لماعة، وحيدة اللون المتفاوت الماحات.

٩٦٤٩ - خَيْضَل شُوم ٥

Branchies (F). *Fish-gills* (E).
الخياشيم هي اعضاء التنفس عند السمك.

٩٦٥١ - خَيْضَل شُومِي ٥

Pneumobranchie (F). *Pneumobranchial* (E).
نعت تعريف يطلق على كل حيوان يتنفس من خياشيمه.

٩٦٥٢ - خَيْضَل شُومِيَّات ٥

Branchiata (E).
احدى قسمي المفصليات وفيها صف القشريات.

٩٦٥٣ - خَيْضَل شُومِيَّات الاطراف، وَرَقِيَّات الارجل ٥

Branchiopodes, *Phyllopodes* (F). *Branchiopod*, *Phyllopod* (E).
رتبة من القشريات تتميز بكثرة ارجلها الدقيقة الورقية الشكل.

٩٦٥٤ - خَيْضَل ٥

Orltes (S).
Orltes (F). *Orltes* (E).
جنس طير من فصيلة القرقفيات. النوع المعروفة قليلة العدد، اعطائها بعض مناطق البلاد الاسيوية والاروبية || جميعها تتميز بقصر المنقار المخروطي الشكل، باستطالة الذنب الرقاجي الانتظام، باعتدال الاجنحة المنفرجة

Bambous (F). *Bamboo* (E).
عمارة نباتات قصية، معمرة، برية وتزيينية وصناعية من فصيلة النجيليات. اجناسها وانواعها كثيرة العدد منبتها البلاد الحارة الرطبة || اعرف واشهر اجناسها الخيزران والعسوطوس والعرجان والغريف والنصي والهرداء.

Lavatera (S).
Lavatera (F). *Sea-mallow* (E). *Bechermaive* (D).
جنس نباتات عشبية من الفصيلة الجبازية. انواعه نحو ٣٠ جميعها اعشاب بحلية وجنية زباء الملحاء. أوراقها متعاقبة، معنقة، مقرنة او مفصصة النصل. ازهارها وردية او بنفسجية اللون. معظمها نباتات برية وبعضها زراعي تزييني. اشهرها ما يلي.

Lavatera thuringiaca (S). *Lavatera de Thuringe* (F).
بجلة محولة تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. أوراقها عريضة التفصيص القلبي الشكل. لون ازهارها الى الوردي الباهت يعلوه تشيخ عابق، بتلاتها ثنائية التفصيص مستعرضة. ازهارها يستمر من تموز الى ايلول.

Lavatera arborea (S).
Lavatera arborescent (F).
جنية ليفية معمرة تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. أوراقها قلبية التفصيص مدبية الاطراف. ازهارها محورية الارتكاز ضمية التجميع، كبيرة القد، قطرها نحو ٥ سم. لونها الى الاحمر البنفسجي. كرابنها محددة. مرتفعة الخوافي. ازهارها يستمر من نيسان الى ايلول.

Lavatera olbia (S).
Lavatera d'Hyères (F).
جنية ليفية معمرة تملو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم. أوراقها قلبية التفصيص. ازهارها كبيرة القد قطرها نحو ٥ سم. لونها الى البنفسجي او الاحمر القروي. كرابنها صفراء اللون، خلية البثرة || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران.

Lavatera trimestris (S).
Lavatera royal, *Mauve royale* (F).
بجلة حولية تملو نحو ١٢٠ سم. مبدولة على شواطئ البحر المتوسط. أوراقها مفصصة بجيلة الخضار الفستقي. ازهارها ابطية رقاجية يكثر فيها اللون الوردي وبعضها ابيض || ازهارها يستمر من تموز الى آواخر الخريف.

٩٦٤٢ - خَيْضَل ٥

Malope (S).
Malope (F). *Malope* (E).
جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة الجبازيات. سوقها فرعاء. أوراقها متباينة الاشكال. ازهارها كبيرة، وردية اللون او بنفسجية، مستطيلة المعاليق، محورية الارتكاز، فردية التجميع || انواعه المعروفة قليلة العدد، اشهرها التالية.

٩٦٤٣ - خَيْضَل لِّلَايِي الفلق ٥

Malope trifida (S). *Malope trilobée* (F).
نوع من الخيزل. عشبة تزيينية حولية فرعاء تملو نحو ١٠٠ سم. أوراقها ثلاثية الفلق. نساها مرطاء لامة الخضار الاصفر. ازهارها بنفسجية اللون يعلوها مزاج ارجواني || تنويرها يستمر من تموز الى ايلول.

٩٦٦٣ - خَيْضَلُود *
Eciton (S).
Eciton (F). Eciton (E).
جنس حشرات ناهمة وأنجة من غشائيات الاجنحة الحمويات
وفصيلة النمليات . انواعه المعروفة سبعة منها خمسة باصرة
ونوعان كهان لا يبصران || موطنها معظم الاقاليم الاستوائية
الاسيوية والافريقية والامريكية || اجسامها صغيرة .
قوائمها مستطيلة . قرونها الاستشعارية منكسرة الدوكل .
جنودها وحراسها مجهزة بمخاطم ضليمة مخبئة الاطراف
الذرية . وهي اكبر قدماً من عمالها || ملجئها الحياتي لا
يختلف عن غيرها من النمل الا انها لا تستكن في قري
معينة لانها جواله تجوب الغابات في طلب القوت . والانواع
الكهنة كذلك لا تستقر في مواقع معينة || عديد الزببة
يتجاوز المليون وقد يبلغ ثلاثة ملايين عند بعض الانواع
الافريقية || يقال انها لا تعف عن كل حيوان يعترض
طريقها ان صغيراً او كبيراً وانها تلتهم كل ما تصادف
من مواد نباتية وعضوية مخزونة وغير مخزونة .

٩٦٦٤ - خَيْل - Chevaux, Cahallins (F). Horses (E).
الخيول والخيول والاحيال هي جماعة الافراس .

٩٦٦٥ - خَيْلُ الرِّهَان ، خَيْلُ السِّبَاق ، خَيْلُ السِّبَاق
Chevaux de course (F). Race-horse (E).
هي الخيل التي صار تحضيرها للمباراة في ميدان السباق
وتدعى ايضاً جياد الرهان .

٩٦٦٦ - خَيْلُ الْعَرَبِيَّات
Carrossiers (F).
Coach-horse (E). هي الخيل الصالحة لجر العربات فقط .

٩٦٦٧ - خَيْلَانِيَّات
Siraniens (F). Sironia (E).
رتبة حيوانات لبونة بحرية منها الخيلان ، الذي انقرض ،
والاطوم وخحرف البحر .

٩٦٦٨ - خَيْلُولِيَّة
Phénoménisme (F).
Phenomenism (E).
الخيولوجية مذهب فلسفي يدعى الظاهرية ، اطلبها .

٩٦٦٩ - خَيْلِي
Hippique (F). Hippic (E).
ما هو مختص بالخيول .

٩٦٧٠ - خَيْلِيَّات
Equidés (F). Equidae (E).
Equidae (S).
هي فصيلة الخيل من رتبة مفردات الاصابع منها الفرس
والحمار وحمار الزرد وحمار الوحش .

٩٦٧١ - خَيْمَة * ، خَيْمِيَّة
Ombelle (F).
Umbel (E).
شكل او بالاحرى نظام ازهار تكون فيه الازهار على
شكل مظلة محمولة على علاقات تنطلق جميعها من نقطة
واحدة .

٩٦٧٢ - خَيْمِيَّات ، هَيْوَالِيَّات
Umbelliferae (S). Umbellifères (F). Umbelliferae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفنتين كثيرة القعالات عالية
الاسدية . اسباطها ستة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد .
من نباتاتها المشهورة الجزر والكمون والكزبرة .

٩٦٧٣ - خَيْوَل الْجَرِّ الثَقِيل
Chevaux de gros trait (F). Carriage-horses (E).
هي الخيول المعدة لجر الاحمال الثقيلة فيقتضي ان تكون

الاطراف ، بنعومة ارياشها الصغيرة المفسخة وبدقة
ارساغها واصابعها النحيلة || اعرف انواعه واشهرها الخيصل
الطويل الذنب .

٩٦٥٥ - خَيْضَل طَوِيل الذَّنْب *

Orites caudatus (S).
Orite à longue queue, Queue de poêle (F).
طائر من الخيصل جميل الشكل ، صغير القد ، طوله الكامل
نحو ١٥ سم . منها ٥ سم . للجسم و ١٠ سم . للذنب . رأسه
وعنقه وجوشنه الى البياض العاجي . بطنه الى البياض . الاشهب
المواج . جناحاه والرداء والظهر متتابعة الالوان المركبة من
الاسود والازرق والرمادي والاحمر العنابي والابيض . ذنبه
اسود اللون يحف به من جهتي طوله حثار ابيض . منقاره
وحدة عينه ورجلاه الى السمر السوداء || اعطائه تمتد من
اروبة الى الصين . يألف الغابات المبعثرة الاشجار . قوته
الحشرات والهوم دون غيرها || يدثن عشه على جذوع
الاشجار عند انتشار الفروع . الانثى تضع من ١٢ الى
١٥ بيضة تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٣ يوماً .

٩٦٥٦ - خَيْطَل
Chat (F). Cat (E).
هو السنور والهر والقط والخيدع .

٩٦٥٧ - خَيْطَلِي
Filiforme (F). Filiform (E).
شكل من الزبان قوامه فواصل اسطوانية مستطيلة متتابعة
مستقيمة او ملتوية .

٩٦٥٨ - خَيْطَلِيَّات
Némathelminthes (F).
Nemathelminthes (E).
شعبة الديدان الخيطية منظمها طفيلي .

٩٦٥٩ - خَيْطَلِيَّات الْخَيْشَم
Filibranches (F).
Filibranchial (E).
رتبة من الرخويات . تتميز بخيشتها الخيطية الملتوية او
المحجبة تجمعها الى بعضها البعض زرع عن الغلب او فصل
ضيق .

٩٦٦٠ - خَيْطَلِيَّات الْقُرُون
Nématocères,
Némocères (F). Nemocera (E).
مرتبة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . فصائلها واجناسها
وانواعها نحو ١٥٠٠٠٠ منتشرة في جميع اصقاع العالم ||
تتميز جملاتها باستطالة القرون الاستشعارية المركبة من
١٠ الى ٢٧ فصلة . ملامسها الفكسية مستطيلة ، متدلية
او منتصبة ، مركبة من ٤ او ٦ عقل || يرقاتها بادية
الرؤوس . رؤوسها مدرة او جزئية التدريع . ناكشها
افقية الحركة . بعضها مجهزة بقرون استشعارية مهدبة ||
اشهر فصائلها البعوضيات والبيبيونيات والعلشاريات
والقرسيات والقمصيات .

٩٦٦١ - خَيْف
Fourreau du chameau (F).
Scabbard of camel (E).
الخيف : وعاء قضيب البعير . والخيف : جلد الضرع .
والخيفاء : الواسعة الضرع من البقر .

٩٦٦٢ - خَيْفَانِيَّات
Protoures (F).
رتبة حشرات من الثلاث الواثجات ، انواعها نحو ٥٠
تجمعها فصيلتان . جميعها صغيرة القد عديمة الجناح
والزباني . يكثر وجودها في السرجين والبدال العضوي
والنباتي .



خيصل طويل الذنب



خيفود



خيمة



خييمة

٩٦٧٦ - خيول العربات Chevaux d'attelage (F).
Carriage-horses (E).

هي خيول الركوب التي ثقلت همها والجياد التي لا تصلح للسباق فتستعمل في جر العربات وما أشبه.

٩٦٧٧ - خيول النزو Chevaux de remonte (F).
Stallion blood-horses (E).

هي الخيول المعدة للأنزاء وقد يشترط فيها أن تتحل بجميع الصفات النوعية الخاصة المميزة وأن تكون خالية من العيوب، مرفهة الاحساس، نشيطة.

٩٦٧٨ - خييمة* Ombellule (F).
Umbellula, Umbellet (E).

هي، في التحلية النباتية، كل خيمة صغيرة تؤلف مع رفيقاتها، أي بمجموعها، خيمة مركبة.

كبيرة القد، ضخمة الجثة، قوية العضلات، متينة المفاصل شديدة القوامة، بطيئة السير.

٩٦٧٤ - خيول الجر الخفيف


Chevaux de trait léger (F). Draught-horses (E).

هي الخيول المعدة لجر الاحمال المتوسطة الثقل بأسرع وقت ممكن لذلك يقتضي أن تكون كبيرة الجثة، نشيطة، قوية، لا يزيد وزنها على ٦٠٠ كيلو.

٩٦٧٥ - خيول الركوب، جيئاد

Chevaux de selle (F). Saddle-horses (E).

هي الخيول المعدة لحمل فرسانها ونقلهم بسرعة لذلك يجب أن تكون خفيفة، قوية المراس والعضلات، نشيطة الهمة لتتمكن من السير السريع المستمر.



د

الزمرعات والنوامي والثمار . انائها تفصح جرواً واحداً تحمله وترضعه حتى القطام || اشهر انواعه داب اي .

٩٦٨٥ - دآبة آي* *Bradypus tridactylus* (S). *Bradype al. Al* (F). *Bradypus Al* (E).

اعرف واشهر انواع الداب . موطنه احراج البرازيل وفنزويلا وكولومبيا . طوله نحو ٥٥ سم . ذنبه ٤ سم . اما اظافره فن ٤ الى ٦ سم . ثوبه كثيف الوبر ، لونه الى الصهبة الغبراء ، كثفاه الى السرة . بطنه فضي اللون . عيناء مطوقتان باطار اسود .

٩٦٨٦ - دآبات ، كسآلي *Bradypodidae* (S). *Bradypodidés, Paresseux* (F). *Bradypodidae* (E). فصيلة حيوانات شجرة من رتبة الدرد تشمل جنسي الداب والكولب .

٩٦٨٧ - دآبركة *Ergot, Eperon* (F). *Spur* (E). زائدة قرنية قاسية تكون في مؤخر رجل الديك .

٩٦٨٨ - دآبركة *Talon* (F). *Heel* (E). هي عند الخيل ما يلي مؤخر الرسغ من غلاف الحافر .

٩٦٨٩ - دآبرين *Ergotine* (F). *Ergotin* (E). شبه قلوي يستخلص من عاكوب الشيلم . راجع ارغوتين وعاكوبين .

٩٦٩٠ - دآثورة *Datura* (S). *Stramoine* (F). *Datura* (E). جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة الباذنجانيات . انواعه نحو ٢٠ اقليمها المناطق الحارة والمعتدلة . منها الجنبات والاعشاب الطبية والسامة والزينية . اوراقها منعقة متعاقبة مزراقية النصل المفروض . ازهارها فردية ، كبيرة القد ، بوقية . منها الابيض والبنفسجي والاحمر . اشهر انواعه ما يتبع .

٩٦٧٩ - دآء ، مَرَض ، وَصَم *Maladie* (F). *Illness, Malady* (E).

تغير في النسجة الجسم او اعضائه يعقبه اضطراب موضعي او شامل يؤثر في حياة الكائن الحي او في طاقته الطبيعية . والامراض قد تكون حادة ، مزمنة ، وظيفية ، وراثية ، وبائية ، الخ . اما علم الامراض الذي يبحث في طبيعتها وتخليتها وتشخيصها فهو الوصامة . اطلبها .

٩٦٨٠ - دآء الشعلب ، ثَعْيَلْبَة

Alopécie, Pelade (F). *Baldness, Fox's evil, Pelada* (E). مرض عضوي يصيب الحيوان والطير فيسبب انمعاط وبر الاول وسقوط ريش الثاني .

٩٦٨١ - دآء المفاصل ، رَئِيَة ، شَوْصَة

Rhumatisme (F). *Rheumatism* (E). علة مثيلة طابعها ورم يحل بالمفاصل او العضلات او الاحشاء .

٩٦٨٢ - دآبة ، زاحيف ، قَرِيْش *Rampant* (F). *Creeping, Crawling* (E).

نعت تعريفي يطلق على الحيوان الذي يدب او يزحف وعلى النبات المداد .

٩٦٨٣ - دآبة *Tichodrome de murailles* (F). *Wall creeper* (E). هو صرّ الصخور طائر من المتوقلات ، اطلبه .

٩٦٨٤ - دآبة* ، كَسْلاَن *Bradypus* (S). *Bradype* (F). *Bradypus* (E).

جنس حيوان من فصيلة الدابات . موطنه امريكا الجنوبية . انواعه خمسة . جميعها بطيئة الحركة تسير على الارض بصعوبة . قوائمها ثلاثية الاصابع . اظافرها مستطيلة ، منعقة تمكها من التسلق . تعيش على الاشجار قوتها



داب



داب اي



داتوره زاهية



داتوره شائكة



داتوره فاغية



داتيسكه قناية

٩٦٩٨ - دَاتُورَه فَاغِيَّة *

Datura suaveolens (S). *Stramoine odorante*, *Brugmannsia* (F). *Cow's-horn*, *Angel's trumpet plant* (E). *Trompetenstechapfel* (D). *Trombetta angelica* (I).

جنبه معمرة تعلو من ٣ الى ٥ امتار . ساقها ليفية مخشوشة . اوراقها اهليلجية ، نصلها ملس البشرة . ازهارها كبيرة ، متدلية ، عطرية ، بيضاء اللون . كعابرها سرحة . ازهارها يستمر من آب الى تشرين .

٩٦٩٩ - دَاتِيْسَكِه

Datisca (S). *Datisque*, *Cannabine* (F).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الداتيسكيات . انواعه ثلاثة . اوراقه مركبة متعاقبة . ازهاره ابطي الارتكاز ، عنقودي التجميع ، متصب . ازهاره ثنائية المسكن . ثماره كعابر مستطيلة || اشهر انواعه الداتيسكه القناية .

٩٧٠٠ - دَاتِيْسَكِه قَنَابِيَّة *

Datisca cannabina (S). *Cannabine faux-chanvre*, *Chanvre de Crète* (F). *Bastard hemp*, *Cretan hemp plant* (E). *Gelber scheinhanf*, *Bastardhanf* (D). *Canapa di Creta* (I).

نوع من الداتيسكه . وهو نبات زراعي هيته كهيئة القنب . ساقه منتصبه تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقه متعاقبة مركبة . وريقاته سباعية او تساعية ، نصلها اهليلجي مدبب العقصة : منشاري الحافة ، بطول نحو ٥٠ سم ويعرض ١٢ || ازهاره عنقودية التجميع ، خضراء اللون ، عادمة التويج ، قصيرة الفصل . الذكورية منها تساعية الاسدية والانثوية بيضية الكأس ثلاثية او خماسية السمت الخيطية الريشية || ثماره كعابر مستطيلة بزورها دقيقة وكثيرة العدد || يرغب في الاثربة الرطبة المتوسطة الاندماج . اوراقه صباغية نعيمها اصفر اللون . الياف سوقه صناعية .

٩٧٠١ - دَاتِيْسَكِيَّات

Datisca (F). *Datisca* (E).

فصيلة نباتية من ثنائيات الفلقة ، عديمات القعالة ، منخفضة المبيض . اجناسها اربعة وانواعها سبعة فيها الاشجار والاعشاب . ازهارها ثنائية المسكن . ثمارها حقبة عديدة البزور || اعرف اجناسها واشهرها الداتيسكه .

٩٧٠٢ - دَاخِلِي

Endogene (F). *Endogenous* (E). صفة بعض الاعضاء النباتية ومنها الفطور التي تنمو من الداخل فيكون نموها عاماً ومنظماً في جميع الجهات .

٩٧٠٣ - دَاذِي

هو البوط المريض ، اطلبه .

٩٧٠٤ - دَاذِي ، هِيُورْقَارِيْقُون ، أَوْقَارِيْقُون

Hypericum (S). *Millepertuis* (F).

جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة الداذيات . انواعه نحو ١٨٠ جميعها من نباتات المناطق الحارة والمعتدلة . منها الاشجار والشجيرات والجنبات والاعشاب . اوراقها حافضة ، متعاقبة ، بسيطة ، نصلها كثير الجيوب الدهنية الشفافة التي تبدو كالثقوب . ازهارها عنقودية التجميع ، مختلفة الالوان يكثر فيها الاصفر والابيض . ثمارها جرداء ثلاثية الفلق || اشهر انواعه ما يتبع .

٩٦٩١ - دَاتُورَه بَنْفَسَجِيَّة

Datura tatula (S). *Stramoine violette* (F).

جنبه حولية تزيينية تعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم . اوراقها ملساء البشرة . ساقها وازهارها وعروق اوراقها بنفسجية اللون || ازهارها يستمر من تموز الى تشرين .

٩٦٩٢ - دَاتُورَه دَمَوِيَّة

Datura sanguinea (S). *Stramoine sanguine* (F).

جنبه معمرة تعلو من مترين الى اربعة امتار . ساقها ليفية مخشوشة . اوراقها كبيرة القد ، نصلها ملس البشرة . ازهارها مستطيلة متدلية تبدو صفراء اللون ثم تنحرف رويداً رويداً نحو الاحمر الدموي || ازهارها يستمر من آب الى ايلول .

٩٦٩٣ - دَاتُورَه زَاهِيَّة * ، دَاتُورَه مَصْرِيَّة

Datura fastuosa (S). *Datura fastueux*, *D. d'Egypte*, *Stramoine fastueuse* (F). *Purple flowered thorn-apple* (E). *Roter stechapfel* (D). *Stramonio fastoso*, *Mantello di Cristo* (I).

جنبه حولية تزيينية تعلو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم . ساقها منتصبه بنفسجية مرقوشة بالابيض . اوراقها بيضية ذلقة مسننة . ازهارها عطرية مكبة . بتلاتها بنفسجية الصفحة الخارجية ، بيض الداخلية . كعابرها كروية شائكة . ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

٩٦٩٤ - دَاتُورَه سَامَّة

Datura ferox (S). *Stramoine féroce* (F).

جنبه حولية تزيينية تعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . ساقها حمراء زياء . اوراقها مفصصة ، قلبية القاعدة ، ذلقة الزام الاخير . نصلها جزوي اللون خلي البشرة . ازهارها كبيرة القد لوناً الى البياض . كعابرها منتصبه كثيرة الشوك || ازهارها يستمر من تموز الى تشرين .

٩٦٩٥ - دَاتُورَه شَائِكَة * ، نَفِير

Datura stramonium, *D. spinosa* (S). *Stramoine commune*, *Herbe à la taupe*, *Pomme épineuse*, *P. du diable* (F). *Thorn-apple*, *Devil's apple*, *Devil's trumpet* (E). *Echter stechapfel* (D). *Stramonio*, *Mela spina*, *Pomo spinoso* (I).

جنبه حولية برية وزراعية تزيينية تعلو من ٤٠ الى ١٠٠ سم . ساقها ملساء واوراقها كذلك . ازهارها منتصبه بيضاء اللون . كعابرها شائكة بيضية الشكل تطول نحو ٥ سم . || تعتبر من النباتات الطبية ذات السموم ويستعمل ورقها لفائف لتسكين الربو وقد يجوز خلطه بالتبغ || ازهارها يستمر من تموز الى تشرين .

٩٦٩٦ - دَاتُورَه شَمْعِيَّة

Datura ceratocaula (S). *Stramoine cirreuse* (F).

جنبه حولية تزيينية تعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم . ساقها جقوية اللون موشحة بغشاء شمعي اطحل . اوراقها اهليلجية ، نصلها ازغب الصفحة السفلى . ازهارها كبيرة القد ، بتلاتها بيض الداخل بنفسجية الخارج تنفتح من الساعة الخامسة مساء الى العاشرة صباحاً . كعابرها متدلية سرحة . ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

٩٦٩٧ - دَاتُورَه صَفْرَاء

Datura chlorantha (S). *Stramoine jaune* (F).

جنبه حولية تزيينية تعلو من ١١٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها بيضية النصل المتمتع المسن الحافة . ازهارها متدلية تويجها خماسي التفريش ، بتلاتها صفراء || ازهارها يستمر من تموز الى تشرين .

٥ سم. ازهارها لاطئة مستعرضة قطرها نحو ٤ سم. لونها الى الذهبي اللامع. ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

٩٧١١ - دَاذِي مَرِيح ، هِيُوفَارِيَقُون مَرِيح
Hypericum prolificum (S). Millepertuis prolifère (F).

نوع من الداذي وهو جنبه تزيينية معمرة تعلو نحو ١٢٠ سم. اوراقها تطول من ٥ الى ٨ سم. وتعرض من ١ الى ٢ سم. ازهارها مستعرضة قطرها نحو ٢ سم. لونها الى الصفار الزاهي الفضي الموج || ازهارها يستمر من تموز الى تشرين.

٩٧١٢ - دَاذِي مُنْتِن * ، هِيُوفَارِيَقُون مُنْتِن ، شَجَرَة التَّيْس ، دَمُوع البَيْسِن
Hypericum hircum (S). Millepertuis fétide, M. de bouc (F). Goat-scented St John's wort (E). Bockskraut, Stinkendes harthen (D). Iperico fetido, Ruta caprina (I).

نوع من الداذي وهو نبات عشبي بري طبي معمر كريحه الرائحة يعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. فروعها مستقيمة او مربعة الهيكل ، جزوية اللون . اوراقها اهليلجية مدببة الزام الاخير . ازهاره صفراء اللون قليلة العدد || ازهاره يستمر من تموز الى ايلول .

٩٧١٣ - دَاذِي هُوَكِر ، هِيُوفَارِيَقُون هُوَكِر
Hypericum hookerianum (S). Millepertuis de Hooker (F).

نوع من الداذي وهو جنبه تزيينية معمرة تعلو نحو ٢٠٠ سم. فروعها اسطوانية . اوراقها بيضيه ، نصلها بحري الصفحة السفلى. اخضر العليا يطول نحو ١٠ سم. ويعرض ٥ سم. ازهارها كبيرة القد ، قطرها من ٥ الى ٦ سم. لونها الى الصفار التبي || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

٩٧١٤ - دَاذِيَّات ، هِيُوفَارِيَقُونِيَّات
Hypericaceae (S). Hypéricacées (F). Hypericaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القعالات المستقلة ، مرتفعة المبيض . اجناسها وانواعها كثيرة . سوقها وجذورها دهنية الاوعية . اوراقها متقابلة ، بسيطة ، كاملة ، نصلها مفعم بالجيوب الافرازية الدهنية . ازهارها خشوية ، عنقودية التجميع ، هامية الارتكاز || اشهر اجناسها الداذي والحفرد والدملوق .

٩٧١٥ - دَار شَيْشَعَان هو القندول ، اطلبه .

٩٧١٦ - دَار صُوص هو القرفة الصينية ، اطلبها .

٩٧١٧ - دَار صِيْنِي هو قرفة سرنديب ، اطلبها .

٩٧١٨ - دَار فِلْفَل *
Capricum frutescens (S).

Piment enragé, P. d'oiseau (F). Bird pepper, Spur pepper (E). Vogelpfeffer, Ziegenpfeffer (D). Peperone rabbioso, Pepe d'uccello (I).

نوع من الفليفلة وهو نبات عشبي حولي زراعي من الفصيلة الباذنجانية . ثماره حريفة لاذعة ، مستطيلة الشكل ، جامدة القشرة المأكولة ان خضراء او جافة || يتكاثر بالبذر . زراعته مروية تنجح في معظم الارربة المعتدلة الاندماج الوافرة المواد الغذائية .

٩٧١٩ - دَارِجَة
Membre (F). Limb (E).

هي قائمة الدابة ج دوارج .

٩٧٠٥ - دَاذِي رُومِي * ، هِيُوفَارِيَقُون مَعْرُوف ، حَشِيْشَة القلب ، عَصْبَة القلب ، مُنْسِيَة

Hypericum perforatum (S). Millepertuis perforé, Chasse diable, Herbe de St-Jean, H. aux piqures, Trucherau (F). Perfoliate St John's wort (E). Johanneskraut, Tüpfelharthen (D). Perforata, Iperico comune, Erba di San Giovanni (I).

نوع من الداذي وهو نبات عشبي بري طبي معمر يعلو من ٤٠ الى ٨٠ سم. اوراقه بيضيه مستطيلة كثيرة الجيوب العطرية . ازهاره صفراء اللون مستعرضة قطرها نحو ٢ سم. || منافعها الصحية والطبية عديدة . يكثر في الاراضي البور وقرب السياجات || ازهاره يستمر من حزيران الى آب .

٩٧٠٦ - دَاذِي صَخْرِي ، هِيُوفَارِيَقُون صَخْرِي

Hypericum empetrifolium (S). Millepertuis à feuilles de camarine (F).

نوع من الداذي وهو نبات عشبي بري ، طبي ، معمر يعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. اوراقه عروية ، ضيقة النصل ، ثلاثية الضمة . ازهاره صفراء اللون قطرها نحو ٢ سم. اسديتها ثمية ثلاثية . ازهاره يستمر من ايار الى تموز .

٩٧٠٧ - دَاذِي كَبِير الْوَرَق ، هِيُوفَارِيَقُون كَبِير الْوَرَق

Hypericum grandifolium (S). Millepertuis à grandes feuilles (F).

نوع من الداذي وهو جنبه برية وزراعية تزيينية تعلو نحو ١٠٠ سم. اوراقها اهليلجية ، نصلها قلبي القاعدة ، مدبب العقصة ، لامع البشرة ، طوله نحو ٦ سم. عرضه ٤ سم. ازهارها عذقية التجميع مستحبة الرائحة || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

٩٧٠٨ - دَاذِي كَثِيْف الزَّهَر ، هِيُوفَارِيَقُون كَثِيْف الزَّهَر

Hypericum densiflorum (S). Millepertuis densiflore (F).

نوع من الداذي وهو جنبه معمرة تعلو من ١٠٠ الى ١٨٠ سم. اوراقها عروية مستطيلة ضيقة النصل ، ثنائية الضمة . ازهارها كثيفة التجميع صفراء اللون . قطرها نحو ١٠ سم. ثمارها جراء تطول نحو ٥ سم. || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

٩٧٠٩ - دَاذِي مَخْرِي * ، هِيُوفَارِيَقُون مَخْرِي ، رُمَّان الْاَنْهَار ، اَنْدُرُوسَامُن

Hypericum androsaemum (S). Androsème, Millepertuis androsème, Toute saine (F). Park-leaves, All saint's-wort, Tutsan (E). Grundheil, Grosses Johanniskraut (D). Iperico tutto sano, Androsamo, Tuttasana (I).

نوع من الداذي وهو نبات عشبي بري طبي معمر يعلو من ٣٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه بيضيه مستطيلة . ازهاره زاهية الصفار . مستعرضة . قطرها نحو ٣ سم. ثماره عنية سوداء اللون || منافعها الطبية عديدة ويستخرج منه صباغ احمر يناع بالدهن والماء || ازهاره صبي يدوم من حزيران الى تموز .

٩٧١٠ - دَاذِي مُذْهَب ، هِيُوفَارِيَقُون مُذْهَب

Hypericum aureum (S). Millepertuis doré (F).

نوع من الداذي وهو جنبه تزيينية معمرة تعلو نحو ١٢٠ سم. اوراقها بيضيه الشكل ، جلدية النصل ، تطول نحو



دَاذِي رُومِي



دَاذِي مَخْرِي



دَاذِي مُنْتِن



دَار فِلْفَل

٩٧٢٠ - دارم

الدراهم شجر شبيه بالغضا ولونه اسود يستاك به النساء فيحمر لثاتهن وشفاهن تحميراً شديداً وهو حريف . (اللسان) .

٩٧٢١ - داس

Rabougri (F). Stunted (E).
نمت تعريفي يطلق على كل نبات غير نام .

٩٧٢٢ - داسيع ، دوسع

Vecteur (F).
Vector, Vehicle (E).
الداسيع والدوسع خط موجه ثابت المنشأ كمقرب الساعة يتحرك وفقاً لنظام دائري معين .

٩٧٢٣ - داسيعي ، دوسعي

Vectoriel (F).
Vectorial (E).
نمت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالداسع .

٩٧٢٤ - داص

Engraisser (F). To fatten (E).
داس المال ودئص : امتلأ سناً .

٩٧٢٥ - داعرة

Infertile (F). Unfruitful (E).
الداعرة هي كل نبتة من ثنائيات المسكن كالنخلة لم تقبل الاخصاب ج مداعير .

٩٧٢٦ - داغيش

Allèle, Allélomorphe (F).
Allele, Allelomorph (E).
اسم يطلق على كل زوج من الارثين او الجين يعلو النشبة اي الكروموزم .

٩٧٢٧ - دأغصة

Rotule (F). Patella (E).
هي الرضفة : العظم المدور المتحرك في رأس الركبة .
ج دواغص .

٩٧٢٨ - دأغي

Octoden (S).
Octodon, Dégu (F). Octodon (E).
جنس حيوانات لبونة قاضية من فصيلة الداغيات انواعه عديدة قريبة الشبه من الجرذان . طولها نحو ١٨ سم . وأذناها ١٠ سم . رؤوسها صغيرة القد . مقاضها مقطوعة . اذانها معتدلة الكبر تطول نحو ٢ سم . || اثوابها الى الصهبة السمرى يعلوها موج اسود ، بطونها بيض ، اطراف اذانها سود || موطنها امريكا الجنوبية اخصها الشيلي والأند تألف الادغال والحقول والحدائق والبساتين . قوتها الاعشاب والجذور والحبوب .

٩٧٢٩ - دأغيات

Octodontidae (S).
Octodontidés (F). Octodontidae (E).
فصيلة حيوانات لبونة قاضية من مرتبة شبيهيات الشوزب ورتبة القواضم . اجناسها وانواعها عديدة منها الارضية والجمامة والقازية . جحافلها شديدة الاذى تقصر جميع المزروعات || أشهر اجناسها الداغي واليرنب والقباع والغندي والكبرميس .

٩٧٣٠ - دافع

Mobile
هو الغاية الخاصة التي دفعت الى العمل .

٩٧٣١ - دافع

Tradens
هو الذي يدفع المعقود عليه او ينقل الملكية .

٩٧٣٢ - دافع البرد

Paragrêle (F).
Cloud-cannon (E).
كل ما يستعمل لوقاية النبات من البرد كصواريخ البرد والشلالات الكهربائية والمناطيد المتفجرة .

٩٧٣٣ - دافع الجلد

Paragelée (F).
كل ما يستعمل من ضروب الوقاية لاجتناب تأثير الوضاء والجلد على النبات .

٩٧٣٤ - دافع الرطوبة

Hydrofuge (F).
Damp-proof (E).
دافع الرطوبة ومانع الرطوبة وطارد الرطوبة . نمت تعريفي يطلق على كل طلاء واق من الرطوبة يطل به الخشب لمنع تأثير الرطوبة فيه .

٩٧٣٥ - دافع الصاعقة ، شاري ، حرشة ،

Paratonnerre (F).
Lightning conductor (E).
جهاز خاص يستلقي الكهرباء الجوية ويفرغها يستعمل لوقاية البناء من شر الصاعقة . يلسب اختراعه الى بنيامين فرانكلين عام ١٧٥٥ . وهو مؤلف من قضيب طويل من الحديد الصلب مذهب الطرف يثبت رأسياً فوق ذروة البناء ويهبط عمودياً الى التربة ثم يغورها الى باطن الارض حيث ينتهي اما في بئر ماء او في حفرة افعمت بمسحوق الفحم المبلل بالماء .

٩٧٣٦ - دافسة

Necrophorus (S).
Nécrophore (F). Necrophorus (E).
جنس حشرات من مغذات الاجنحة وفصيلة الدرقيات . قوتها الجيف تبيض وتعيش عليها . انواعها كثيرة العدد ، لاقياسية القد . مختلفة الالوان . تتميز باجسامها المستطيلة الشكل وبقرورها الاستشعارية الدبوسية .

٩٧٣٧ - دافسة مأكرة

Necrophorus vestigator (S).
Nécrophore trompeur (F). Burying-beetle (E).
حشرة وانحة من فصيلة الدرقيات ورتبة مغذات الاجنحة . تألف البراري والحقول والاحراج والاماكن المأهولة . قوتها الجيف من القوازم الى الزحافات والحيوانات الصغيرة والكبيرة || جسمها متوسط القد يطول من ١٥ الى ١٨ مم . ثوبها اسود اللون يعلوه تبقيع غندي احمر . رأسها معتدل الجرم ، مستدير . فكها قويان ذربان . زباناها دبوسية الاطراف . عيناها كبيرتان جاحظتان . ظهرها يلحف أكثر من نصف البطن . غداها ثلاثيتا التخديد ، مبقجتان بالاحمر . ارساغها خاسية العقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجمالنة في اوائل الربيع وتعيش حتى اواخر الخريف . تسرح في الليل . وتمتص المكن في الجيف من الجهة التي تلامس التراب || اليرقة عند بلوغها الكمال الجسموري تطول من ٢٠ الى ٣٦ مم . جسمها مستطيل الشكل ، مستغلظ المقدم ، مستدق المؤخر ، اسمر اللون اسود الرأس والشرح والرواجب || طور الاكمال الذي يستمر من ٢٢ الى ٢٨ يوماً ينقضي في التربة .

٩٧٣٨ - دافه

Exotique (F). Exotic (E).
راجع حاكك .



داغي



دافسة مأكرة

المحلولة هي منفصلة وتكون شوارد ايديروجينية || ترتيبه العملي يشمل ١١ فئة تحديدها ما يلي :

١ - من ٠ الى ٤ درجات : تربة حامضية صرفة لا تصلح للزراعة .

٢ - من ٤ درجات الى ٤ درجات و ٦ خطوط : تربة مفرطة الحامضية .

٣ - من ٤ درجات و ٦ خطوط الى ٥ درجات وخطين : تربة قوية الحامضية .

٤ - من ٥ درجات وخطين الى ٥ درجات و ٨ خطوط : تربة حامضية .

٥ - من ٥ درجات و ٨ خطوط الى ٦ درجات و ٤ خطوط : تربة متوسطة الحامضية .

٦ - من ٦ درجات و ٤ خطوط الى ٦ درجات و ٩ خطوط : تربة قليلة الحامضية .

٧ - من ٦ درجات و ٩ خطوط الى ٧ درجات وخط واحد : تربة حيودة .

٨ - من ٧ درجات وخط واحد الى ٧ درجات و ٥ خطوط : تربة قليلة الحرضية .

٩ - من ٧ درجات و ٥ خطوط الى ٨ درجات و ٣ خطوط : تربة حرضية .

١٠ - من ٨ درجات و ٣ خطوط الى ٩ درجات : تربة مفرطة الحرضية .

١١ - من ٩ درجات الى ١٤ درجة : تربة حرضية مطلقة لا تصلح للزراعة .

وقد لحصنا في المخطط الدائري التابع مجمل ما تقتضي معرفته عن مقاييس الدالف العادية وما يقابلها من امكانيات زراعية :

٩٧٤٨ - دَالِفْ مَهَبِطِي ، كاثيون Cation
عنصر موجب الكهربائية .

٩٧٤٩ - دَالِي Deltoïde (F). Deltoid (E).

٩٧٥٠ - دَامِير * Cloche en verre (F).
Beli-glass (E).

وعاء من زجاج جرمي الشكل يستعمل للغطية وهو شائع الاستعمال في الزراعات الباكورية .

٩٧٥١ - دَامِقُ ٥ Gibellina (S). Gibelline (F).

جنس فطور مجهرية من السخاميات وفصيلة العشويات اعسانها متحدة مستطيلة الاعناق ترتكز على وئمة رهلة تغرز في نسج النبات المنحار || تكاثرها مصحوبة بالنكات . بوعها حنطي اللون وشعي الشكل شفي الارتكاز معترض الوئمة || انواعه قليلة اعرفها واشهرها دامق الزرع .

٩٧٥٢ - دَامِقُ الزَّرْع ٥ Gibellina cerealis (S).
Gibelline du blé (F).

فطر مجهرى يصيب الزرع فيمنعه عن الاسبال . مظهره الخارجى يقع حنطية تبدو مستديرة ثم تستطيل وتلتصق . تركيب قصب الزرع من مركز انتاش الجذور حتى ارتفاع ١٥ سم . ثم تتحول الى غشاء من العفن الاطحل . اضراره جسيمة لانه يوقف النمو ويمنع الاسبال بعد ان يسبب ذبول المصنف والتفافه ورياسه . يكافح بالحريق .

٩٧٣٩ - دَالِكْ Couvrir (F). To couple with (E).
دالك الحصان الحجر : علاما (التاج) .

٩٧٤٠ - دَال ، دِيل Chacal (F). Jackal (E).
اطلب ابن آوى .

٩٧٤١ - دَالَّة Fonction (F). Function (E).

٩٧٤٢ - دَالَّة مُشْتَقَّة Fonction dérivée (F).
Derived function (E).


٩٧٤٣ - دَالَّة مُولِّدَة Fonction génératrice (F).
Generating function (E).

٩٧٤٤ - دَالِج Hérisson (F). Hedgehog (E).
هو القنفذ ، اطلبه .

٩٧٤٥ - دَالِج الدالح والدلوح : السحاب الكثير الماء .

٩٧٤٦ - دَالِيس ٥ ، دَامِيس ٥ ، دَالِش ٥ Lucifuge (F). Lucifugous (E).
نعت تعريبي يطلق على كل حشرة تخشى النور فتتخذ فيه الى السكينة وتنشط وترسخ في الظلام .


٩٧٤٧ - دَالِفْ pH
الدالف هو التعبير الرمزي العددي عن درجة التفاعل الشاردي في التربة . مقياسه التقني يراوح من الحامضية الصرفة التي تبتدئ بدرجة صفر الى الحرضية المطلقة التي تنتهي بدرجة ١٤ تتوسطها الحيودة || وهو من الوجهة الحكمية - الكيماوية . يعبر عن مقدار ايونات اي شوارد الايدروجين عملاً بالنظرية العلمية القائلة ان جميع الحوامض




دامر



دامق الزرع





داهفة النجيليات



دب ابقع

٩٧٦٥ - دَائِرَةُ التَّشَابُهْ ، دَائِرَةُ الْمُحَاكَاةِ

Cercle de similitude (F). Circle of similitude (E).

٩٧٦٦ - دَائِرَةُ الْجَدْيِ

Tropique du capricorne (F). Capricorn tropic (E).

دائرة الانقلاب الشتوي .

٩٧٦٧ - دَائِرَةُ السَّرَطَانِ

Tropique du cancer (F). Cancer tropic (E).

دائرة الانقلاب الصيفي .

٩٧٦٨ - دَائِرَةُ السَّمْتِ

Colure (F).

٩٧٦٩ - دَائِرَةُ السَّمْتِ الْإِعْتِدَالِيَّةِ

Colure des équinoxes (F). Colure of equinox (E).

٩٧٧٠ - دَائِرَةُ السَّمْتِ الْإِنْقِلَابِيَّةِ

Colure des solstices (F). Colure of solstice (E).

٩٧٧١ - دَائِرَةُ اللَّثَامِ

Cercle osculateur (F).

Osculatory circle (E).

٩٧٧٢ - دَائِرَةُ مُحَاطَةِ

Cercle inscrit (F).

Inscribed circle (E).

٩٧٧٣ - دَائِرَةُ مُحِيطَةِ

Cercle circonscrit (F).

Circumscribed circle (E).

٩٧٧٤ - دَائِرِيٌّ ، دَوَّارٌ

Giratoire (F). Gyratory (E).

٩٧٧٥ - دَائِرِيٌّ

Circulaire (F). Circular (E).

٩٧٧٦ - دَائِنٌ

Créancier (F). Creditor (E).

هو الذي يكون الدين مطلوباً له . والدائن قد يكون :

- دائنٌ عادي وهو من ليس لديه ضمانٌ عيني خاص .

- دائنٌ مداعي هو الذي رفع الدعوى طالباً تسديد دينه .

- دائنٌ مرهون وهو الذي يضمن دينه بالرهن العيني .

- دائنٌ ممتاز هو الذي يتخذ لدينه الصفة الخاصة التي يقرها

القانون فيكون مفضلاً على سائر الدائنين عند قبض دينه .

٩٧٧٧ - دُبٌّ

Ursus (S). Ours (F). Bear (E).

كنيته أبو جهينة وأبو الحلاج وأبو سلمة وأبو حميد

وأبو قتادة وأبو اللباس . والآنثى تسمى دبة والجمع دببة

وأدباب || جنس حيوانات من الثدييات اللواحم وفصيلة

الدببات . أنواعه عديدة جميعها كبيرة أو متوسطة القد ،

ثقيلة الجثة . رؤوسها غليظة مستطيلة . أذناها صغيرة

منتصبة . قوائمها قصيرة قوية . تمشي على مناسمها وتقف

على قوائمها الخلفية . برائنها خماسية ، أطرافها كبيرة قوية

قليلة الانعكاف . أذناها متناهية القصر . أصوافها

جشلة . ألوانها متعددة الألوان || أأنها تضع من

جروين إلى ستة جراء || أشهر أنواعه ما يتبع .

٩٧٧٨ - دُبُّ أَبْقَع * ، دُبُّ الْخَيْرَانِ

Alluropus, Ursus melanoleucus (S). Ailuropus, Ours du Père David, O. des bambous (F). Aeluropus, Parti-coloured bear (E).

نوع من الدببة قليل الوجود موطنه التبت الشرقية . يألف

مقاصب الخيران . قوته الأعشاب والجذور والزروع

٩٧٥٣ - دَائِلٌ

Sarcotique (F). Sarcotic (E).

يساعد على اندمال الجرح .

٩٧٥٤ - دَامِنٌ ، هَوَّالٌ

Saprophage (F).

Saprophagous (E).

الدائمة والهاوكة : الحشرة التي تعيش على المواد النباتية المنحلة .

٩٧٥٥ - دَامِيٌّ

Sanguivore (F). Sanguinivorous (E).

الدامي والدامية ج داميات هي الحيوانات والحشرات التي تعيش من امتصاص الدم .

٩٧٥٦ - دَاهِفَةٌ ، دِيلُوفِيَا

Dilophia (S).

جنس فطور مجهرية من السخاميات وفصيلة العشويات . أعصابها متحدة ضخمة مستطيلة ترتكز على وئمة سوداء . بوعها وشعي . الشكل عديد الاقسام الوثيرية المعترضة . أنواعه الاقتصادية قليلة . أعرفها داهفة النجيليات .

٩٧٥٧ - دَاهِفَةُ النَجِيلِيَّاتِ *

Dilophia graminis, Dilophospora graminis, D. alopecuri, Sphaeria alopecuri (S).

فطر مجهري يركب الزروع وجميع النباتات النجيلية فيعطبها ويمنعها عن الاسبال || مظهره الخارجي بقع سود تصيب قصب الزرع وأغماره ، قبل الاسبال وعنده فتسنعه او تحول دون اكتماله بعد ان تمتلئه بوشاح من العصيفات السود ينشأها الفبار الفحشي || ومن العلماء من قال ان انتشار الداهفة يعود الى الديدان الثعبانية التي تنقلها || يكافح بالحريق وبتهطير البذار قبل نثره بمذوب كلوريد الصوديوم المحلول ٢٠ ٪ او بمذوب كلوريد البوتاسيوم المحلول ١٧ ٪ على ان يغسل البذار ، بعد تطهيره بالماء العذب .

٩٧٥٨ - دَالِدٌ

Vermivore (F). Vermivorous (E).

نمت تعريفي يطلق على كل حيوان او طير قوته /الديدان او يأكل الديدان .

٩٧٥٩ - دَائِرَةٌ ، نَيْشَانٌ

Epi (Zoot.) (F). Tuft (E).

نكتة من الشعر مستديرة صغيرة يختلف اتجاهها عن اتجاه سائر الشعر . يعدون منها في الخيل أكثر من ١٤ أما أشهرها فدائرة الحيتا بأسفل الناصية ودائرة اللطاة في وسط الجبهة ودائرة السامة في وسط العنق .

٩٧٦٠ - دَائِرَةٌ ، مُحِيطٌ

Circonférence, Cercle (F). Circumference, Circle, Circuit (E).

الدائرة هي المنحنى المقفل المحدد لسطح مستدير .

٩٧٦١ - دَائِرَةُ أُسَاسِيَّةٌ

Cercle de base (F).

Base circle (E).

٩٧٦٢ - دَائِرَةُ الْإِسْتِدْلَالِ ، دَائِرَةُ مُوجَّهَةٍ

Cercle de directeur (F). Director circle (E).

٩٧٦٣ - دَائِرَةُ الْإِنْقِلَابِ

Tropique (F). Tropic (E).

٩٧٦٤ - دَائِرَةُ الْبُرُوجِ

Cercle du Zodiaque (F).

Zodiac circle (E).

هي فلك البروج اي مجرى الشمس في الفضاء . اطلب فلك البروج .

الثالثة ، وجنوبي القفزة الاولى ، وجنوبي القفزة الثانية ،
وشمالي القفزة الاولى ، وشمالي القفزة الثانية .

٩٧٨٤ - دُبْ الْبَحْر *
Otaria ursina (S).

Otarie ourson (F). Sea bear (E).

نوع من الاتارية الزباء . يعيش في بعض مناطق المحيط
الهادي قرب الشواطئ الامريكية والاسيوية . ذكوره
كبيرة الجثة طولها من ٢٠٠ الى ٢٥٠ سم . وزنها من
٣٥٠ الى ٤٠٠ كيلو || انثاه رشيقه نحيلة طولها نحو
١٢٠ سم . وزنها من ٤٠ الى ٥٩ كيلو . راجع اناريه .

٩٧٨٥ - دُبْ التَّبَت * ، دُبْ حَمَلَايَا ، دُبْ

مَطُوق
Ursus thibetanus (S).

Ours à collier de l'Himalaya (F). Himalayan bear (E).

نوع من الدب شرس الاخلاق والطباع موطنه التبت وحلابة
من ارتفاع ٢٦٠٠ م . وما فوق . ثوبه الى السمرة العابقة .
عنقه مطوق بهلال ابيض ينتهي عند الكتف . طولهُ من
١٤٠ الى ١٧٠ سم . قوته الحبوب والثمار والجذور والغم
والماعز والبقر والجيف .

٩٧٨٦ - دُبْ الشَّمْس * ، دُبْ مَلَقَّة

Ursus helarctos malayanus (S). Bruan, Ours du so-
leil, Ours malais (F). Malayan bear, Sun bear (E).

نوع من الدب موطنه ملقه ومليزا والهند الصينية . لا يستلّي
او يرتاح او ينام الا معرضاً لاشعة الشمس . جسمه
مستطيل الشكل طولهُ يراوح من ١٢٠ الى ١٤٠ سم .
ثوبه الى السواد اللامع . صوفه لبد قصير . صدره مطوق
بالابيض . رأسه ضخم . شدقه عريض . اذناه صغيرتان .
قوائمه قوية . اظافره طويلة حادة || يألف الاشجار
الخرجية . قوته الثمار والعسل والطيور والحشرات .

٩٧٨٧ - دُبْ آمْرِيكِي * ، بَرِيْبَال

Ursus americanus (S). Baribal, Ours noir d'Amé-
rique (F). American black bear, Baribal (E).

نوع من الدب موطنه امريكة الشمالية من كندا حتى
المكسيك ثوبه الى السواد الفحمي العابق . صوفه جثث
خشن . طولهُ يراوح من ١٣٠ الى ١٥٠ سم . وزنه نحو
٣٠٠ كيلو . قوته النمل والعسل والاعشاب والجذور
والحبوب والثمار والاسماك والضفادع والجردان والطيور
الداجنة والغم والخنزير .

٩٧٨٨ - دُبْ سُورِي *
Ursus syriacus (S).

Ours de Syrie (F). Syrian bear (E).

نوع من الدب موطنه الشرق الادنى يمتد من الافغان الى
ايران وخراسان والقفقاز وجبال طورس ولبنان || ثوبه
الى الصهبة السمراء يعلوها موج اشقر . طولهُ من ١٢٠
الى ١٥٠ سم . قوته الثمار والحبوب والنبات . لا يتعدى
على الغم والماعز الا عند الجوع القاهر .

٩٧٨٩ - دُبْ كَسْلَان * ، دُبْ الْعَسَل

Melursus ursinus (S). Melurse, Ours jongleur, O.
lippu (F). Sloth bear (E).

نوع من الدببة موطنه الهند وسرنديب يألف المناقع وضفاف
الانهر والادغال الرطبة . جسمه مستطيل القد طولهُ يراوح
من ١٣٥ الى ١٧٥ سم . وزنه نحو ١٥٠ كيلو . ثوبه
الى السواد اللامع خطمه حتى الجبهة ابيض اللون . شدقه
كبير مستعرض . اظافره بيض || قوته الثمار والحشرات
والعسل .

والثمار . طولهُ نحو ١٧٠ سم . ثقل الجثة . قصير القوائم .
ثوبه الى البياض الثلجي . قوائمه وكتفاه واذناه وعيناه
سود .

٩٧٧٩ - دُبْ أَيْبُض *
Ursus maritimus (S).

Ours polaire, O. blanc (F). Polar bear (E).

نوع من الدب موطنه البلاد القطبية المجمدة . جثته كبيرة
غليظة ، طولها نحو ٢٧٠ سم . وزنها من ٣٠٠ الى ٤٠٠
كيلو . رأسه مستطيل . جبهته منبسطة . اذناه صغيرتان
مستديرتان . فوهة شدقه متوسطة الانفراج . صوفه كثيف ،
قط ، مستطيل . ثوبه الى البياض الفضي . عيناه مكحلستان
بالاسود . حنار شدقه واطافيره سود . يجيد السباحة
والغوص . قوته الفقمه والفظ والحيتان الصغيرة والسلمون
والاعشاب والحزاز والفوقس .

٩٧٨٠ - دُبْ أَسْمَر *
Ursus arctos (S).

Ours brun (F). Brown bear (E).

اشهر انواع الدببة واكثرها ضرراً وانتشاراً . موطنه
احراج وجبال البلاد الاسيوية والاروبية . جثته غليظة .
طولها يراوح من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم . وزنها من ١٠٠
الى ٣٠٠ كيلو || قوته الاعشاب والجذور والزعمات
والثمار على اختلافها والعسل واللحوم . يتعدى على الغم
والماعز والبقر والخنزير الداجنة والوحشية .

٩٧٨١ - دُبْ أَشْمَط * ، دُبْ فَطِيم

Ursus horribilis (S). Ours gris, Ephraïm, Grizzly (F).
Grizzly bear (E).

نوع من الدب كبير الجثة شرس الاخلاق موطنه امريكة
الشمالية من الاسكا حتى جبال المكسيك . ثوبه الى
السمرة الطحلاء الفضية الموج . طولهُ يراوح من ٢٥٠
الى ٣٣٠ سم . وزنه من ٦٠٠ الى ٩٠٠ كيلو . قوته
الثمار والحبوب والجذور وما صادف من حيوان مها كان
نوعه وجنسه .

٩٧٨٢ - دُبْ أَصْفَر ، بَنَات نَعَش الصُغْرَى

La Petite Ourse (F).

the lesser Bear, Ursa minor (E).

الدب الأصفر اقرب كوكبة نجوم الى القطب الشمالي .
نجومها من نفس الصورة سبعة واخراج عن الصورة خمسة .
والعرب تسمي هذه السبعة بنات نعش الصغرى ، فالاربعة
التي على المربع نعش والثلاثة التي على الذنب بنات . وتسمي
النيرين من الاربعة « الفرقدين » والنير الذي على طرف
الذنب « الجددي » ويدعى ايضاً جدي الفرقة ونجم القطب
وسمار الفلك . وتسمي ايضاً جميع النجوم الداخلة في
الصورة والخارجة عنها « الفأس » لشبهها بفأس الرماح .

٩٧٨٣ - دُبْ أَكْبَر ، بَنَات نَعَش الكُبْرَى

La Grande Ourse (F).

the great Bear, Ursa major (E).

الدب الاكبر كوكبة شمالية تقابل الدب الاصفر . نجومها
سبعة وثلاثون . والعرب تسمي الاربعة النيرة التي على المربع
المستطيل « نعش » والثلاثة التي على الذنب « بنات » .
وتسمي النجم الذي على طرف الذنب « القائد » والذي في
وسطه « العناق » والذي يلاصق النعش « الخور » . اما
الاربعة التي تمثل النعش فهي « الدبة » ، و « المراق » ،
و « فخذ الدب » ، و « المفرز » أو « مفرز الذنب » .
وهناك انجم عديدة اخصها السها ، والقفزة الثانية ، والقفزة



دب أبيض



دب أسمر



دب أشمط



دب البحر



دب التبت



دب الشمس



٩٧٩٠ - دَبَّاء هو القرع ، اطلبه .

٩٧٩١ - دَبَّاء البَقَر اطلب فرنع البقر .

٩٧٩٢ - دَبَّاء الحَمِير اطلب فرنع اخمير .

٩٧٩٣ - دَبَّاء الهِنْد هو البيايا ، اطلبها .

٩٧٩٤ - دَبَّاب هو نعنق الحقل ، اطلبه .

٩٧٩٥ - دَبَّاقَة ، دَبَّاقَة Sauterelle (F). Locust (E).

الجرادة عند نفقها وخروجها من السراة . والجراد دبا . وهو اصهب اللون ابيض او اخضر . فاذا اصفر واسودت خطوطه فهو برقان والواحدة برقانة . فاذا صار فيه خطوط صفر وبيض وسود فهو السليح . فاذا بدأ حجم جناحه فذلك الكثفان لانه حينئذ يكتف المشي والواحدة كثفانة .

٩٧٩٦ - دَبَّارَة ، دَبَّرَة ، كُرْدَة Rigole (F).

Trench (E).

هي انشارة في المزرعة والساقية بين الزروع ج دبار ودبارات ودبر .

٩٧٩٧ - دُبَّاسِي Gouras

جنس طير من فصيلة الحماميات . انواعه قليلة جميعها كبيرة القد ، مستطيلة الذنب ، عارية الارساغ الغليظة ، طويلة الاصابع والاطافر . ثوبها ادبس اللون يعلوه موج جقوي . اشهر انواعه الدبسي المتوج . اطلبه .

٩٧٩٨ - دَبَّاش * Phyllorhina (S). Phyllorhine (F).

جنس حيوان من فصيلة الماشيات . انواعه ٢٢ تتميز بزوائدها المنخرية النضوية المستديرة . اذنانها بوقية لا وتدية . ثناياها العليا دقيقة الحد فارقة . اجسامها صغيرة القد ، يراوح طولها من ٩ الى ١١ سم . وبسطها من ٣٥ الى ٥٠ سم . اثارها من السمرة الكستنائية الى الصهبة الصنابية || موطنها جميع البلاد الحارة الاسيوية والافريقية والاسرائيلية . تألف الكهوف والمغاور . تعيش جماعات متوسطة العدد . ذكورها لا تقرب انثاها الا عند الكرم . مسرحها من الفسق الى فحمة الليل . قوتها الحشرات على اختلاف انواعها .

٩٧٩٩ - دَبَّاغ ، دَبَّاغَة ، دَبَّغ Tannage (F).

Tanning (E).

عملية اعداد الجلود المصبوغة من اهاب بعض الحيوانات . قوامها اشباع الجلود من العطان وغيره من المواد القابضة المأخوذة من لحاء واخشاب وثمار بعض النباتات .

٩٨٠٠ - دَبَّاقَة Viscose

سليوز اشنائي يستعمل في صناعة الرदन والبرق والسيلوفان .

٩٨٠١ - دَبَّاقَة Roridulus (S).

Roridula (F). Roridulus (E).

جنس نباتات عشبية ، برية ، معمرة من فصيلة الدباقيات . انواعها المعروفة ثلاثة اعطانها بعض مناطق افريقية الجنوبية والشرقية || اعشابها مخشوشبة صندرة الحجم . اوراقها لاطنة سنانية النصال الكثيفة الرغب اللزج الدابق الذي يثصر كل حشرة تقترب منه فيقضي عليها ويمتصها . ازهارها صفراء اللون ، سنبلية التجميع ، طرفية الارتكاز .

٩٨٠٢ - دَبَّاقِيَّات Roridulaceae (S).

Roridulacées (F). Roridulaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة القعالات مرتفعات المبيض . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . منبتها بعض المناطق الحارة ، اخصها افريقية الجنوبية || نباتاتها اعشاب صغيرة لينة معمرة . سوقها مخشوشبة فرعاء . اوراقها متعاقبة لاطنة ، نصالها هدية ، لزجة ، دابقة تشصر كل حشرة تلامسها . ازهارها سنبلية التجميع ، طرفي الارتكاز . كؤوس ازهارها خماسية الاجزاء . تويجاتها خماسية البتلات اللامنفصلة والاسدية المتلاصقة . ثمارها كعابر خذروفية الشكل ، ثلاثية الاخبية والبذور الحرة || اشهر اجناسها الدباقَة .

٩٨٠٣ - دُبَّال ، دَجَّال ، هُومُس Humus

مادة عضوية سمراء اللون ، لاقياسية التركيب ونسب العناصر الغذائية ، تنجم عن انحلال المواد العضوية في التربة . يقال دبل التربة . وتربة مدبولة .

٩٨٠٤ - دُبَّالِي Humique (F). Humic (E).

نعت تعريبي يطلق على ما هو دبالي التركيب .

٩٨٠٥ - دَبَّب Duvet (F). Down (E).

هو الرغب الناعم الدقيق الذي يلحف معظم الطيور عند نفقها من البيض .

٩٨٠٦ - دُبَّة Ourse (F). She-bear (E).

انثى الدب وتدعى جهبر .

٩٨٠٧ - دَبَّح Cernier (F).

الدبح سمكة بحرية تدعى قباب ، اطلبه .

٩٨٠٨ - دَبَّح Scorzonera (S).

Scorzonère (F). Scorzonera (E).

جنس نباتات عشبية برية وزراعية معمرة من فصيلة المركبات اللسنيات الزهر . جذورها وتدية غليظة . سوقها مصمتة . اوراقها عصفية الشكل ضيقة النصل . ازهارها رؤسية مركبة . يزورها مستطيلة لا منقارية . اشهر انواعه ما يلي :

٩٨٠٩ - دَبَّح أَرْجَوَانِي Scorzonera purpurea (S). Scorzonère pourprée (F).

نوع من الدبح الزراعي التريبي المعمر . ساقه تملو من ٣٠ الى ٧٠ سم . اوراقه محددة النصل الباهت الخضار . ازهاره خماسية الرؤيسات . ارجوانية اللون || ازهاره يستمر من ايار الى تموز .

٩٨١٠ - دَبَّح زَرَاعِي * سَلَسْفِيل أُسُود ، قَعْبَارُون ، قَوْمِي أُسُود

Scorzonera hispanica (S). Scorzonère d'Espagne, Salsifis noir (F). Black salsify, Spanish salsify (E).

Echte schwarzwurzel (D). Scorzonera hispanica, Salsifica nera (I).

نوع من الدبح البقي المأكول الجذور والاوراق . جذره غليظ مستطيل . لونه الى البنفسجي الاسود . ساقه شمراخية مصمتة يعلوها الازهار . اوراقه قرصية ضمية ، زباء النصل || يرغب في الاتربة العميقة النور ، المتوسطة الاندماج ، الغنية بالمواد العضوية والعناصر المعدنية .



دب سوري



دب كسلان



دباش



دبح زراعي

منها باطنية تعود الى عوامل الامعاء وافرازات الغدد ومنها خارجية تعود الى شتى العوارض .

٩٨٤٠ - دَبَقُ
Bergerie (F). Sheepfold (E).
حظيرة الغنم المخاطة المسقوفة للوقاية من البرد والريح .

٩٨٤١ - دَبَوَاءُ *
Daboia elegans (S).
Daboia (F). Daboia (E).

حية خبيثة وحيدة الجنس والنوع من فصيلة الافاعي . جسمها متوسط الغلاظة يطول من ٢٠٠ الى ٢٢٠ سم . الانثى اطول من الذكر . رأسها مستعرض القاعدة غليظة الخطم . عنقها دقيق الجرم . ثوبها الى الغيرة السمراء يعلوها تبقيع اصفر ورقشة حنطية || اعطائها الهند والبلاد المجاورة . مسرحها دجوي . تدخل البيوت الآهلة في طلب الفأر والجردان . لسعتها تقضي على الثور بعد ثلاث ساعات وتقضي على الانسان بعد ساعتين وعسل الطير كالدجاجة بعد ثلاثين ثانية || تعتبر من الافاعي السامة الشديدة الاذى .

٩٨٤٢ - دَبُور
Vent d'ouest (F). West wind (E).
هي الريح الغربية .

٩٨٤٣ - دَبُور
هو الزنبور ، اطلبه .

٩٨٤٤ - دَبُوسِيَّات
Clavariaceae (S).
Clavariacées (F). Clavariaceae (E).

فصيلة الفطور الدبوسية من رتبة الدعاميات . تتميز ببساطة تركيبها . تحتها لحمي التكوين ، مستقيم الانتشاب رزني التجميع او فردي . تلحفه نكهة مخددة الصفحة او ملساء || اجناسها وانواعها عديدة معظمها من الفطور الدائمة التي تعيش على الدبال وعلى المواد الخشبية المنحلة . ومنها جنسان يعيشان على الاعضاء النباتية الحية هما التيفولا والفرطوش .

٩٨٤٥ - دَبُوسِيَّات القُرُون
Clavicornes (F).
Clavicornis (E).
قسم من رتبة مغمدات الاجنحة يشمل جميع فصائل الخنافس من ذوات القرون الاستشعارية الدبوسية الشكل .

٩٨٤٦ - دَبُوسِيَّة ، فَطَرُ المَرَجَّان
Clavaria (S).
Clavaire (F). Goat's beard fungus, Club-topped mushroom (E). Kenlenschamm (D). Ditola (I).
جنس فطور من فصيلة الدبوسيات ورتبة الدعاميات . انواعه عديدة معظمها مؤذ وسام وبعضها مأكول للذيذ الطعم . جميعها منتصبة القامة فوارقها الشكل والقدر واللون . اشهر انواعها ما يتبع :

٩٨٤٧ - دَبُوسِيَّة صَفْرَاءُ *
Clavaria flava (S).
Clavaire jaune (F). Yellow clavaria (E).
نوع من الدبوسية المأكولة وهي متوسطة القد ، مقطوعة المسقلان ، صفراء اللون . ترغب في المواقع الظليلة الرطبة .

٩٨٤٨ - دَبُوسِيَّة مَبْدُولَةٌ *
Clavaria formosa (S). Clavaire commune (F). Common clavaria (E).
نوع من الدبوسية كبيرة القد . نكهتها تشبه زهرة القنبط لونها الى الياض الاصفر يملوه موج وردي . مأكولة مستحبة الطعم .

Sebesten's plum, Cordia, Assyrian plum (E). Sebestenbaum, Brustbeerbaum (D). Sebesto (I).

جنس اشجار وشجيرات برية من فصيلة الحمحميات الخيطيات . انواعه سبعة اوراقها معنقة متعاقبة . نصلها جلدي الصفحة الكاملة المسننة الخافة . ازهارها بيض او صفراء . ثمارها نورية ، لبابية مخاطية كانت ولا تزال تستعمل في الطب لتلين الصدر وفي صناعة دبق الطير . اخشابها تستعمل في صناعة السروج || اعرف انواعها واشهرها .

٩٨٢٩ - دَبَقُ الحَبَشَةِ
Cordia abyssinica (S).
Sébestier d'Abyssinie (F).

٩٨٣٠ - دَبَقُ مَبْدُول
Cordia mynae (S).
Sébestier domestique (F).

٩٨٣١ - دَبَقُ مَخْزَنِي
Cordia officinalis (S).
Sébestier officinal (F).

٩٨٣٢ - دَبَقُ السِّنْدِيَّان
هو البنتموه ، اطلبه .

٩٨٣٣ - دَبَقِيَّات
Loranthées (F). Loranthus (E).
سبط من فصيلة الغنيمات اجناسه وانواعه نحو ٣٠٠ جميعها نباتات طفيلية معمرة عروة تعيش على عوائلها من الاشجار بواسطة براشفيها التي تمكنها من امتصاص النسغ . راجع حضاليات .

٩٨٣٤ - دَبَقِيَّة *
Viscaria (S). Viscaire (F).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة القرنفليات . اوراقها متعاقبة ضيقة النصل اللزج . ازهارها عثكوية تاجية حراء اللون وبعضها ابيض || انواعها قليلة العدد بعضها تزييني . اشهرها ما يتبع .

٩٨٣٥ - دَبَقِيَّة جَبَلِيَّة
Viscaria alpina (S).
Viscaire alpine (F).
عشبة معمرة تملو نحو ١٥ سم . ساقها لا دابة تحمل ثلاثة ازواج من الورق اللاطي المستطيل النصل . ازهارها وردية اللون قطرها نحو ١٢ مم || ترغب في التربة الرملية الجبلية . ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

٩٨٣٦ - دَبَقِيَّة جَوُورِيَّة
Viscaria atropurpurea (S).
Viscaire pourpre foncé (F).
عشبة معمرة تملو من ٤٠ الى ٦٠ سم . ساقها زباء لزجة . اوراقها قرصية التجميع خيطية النصل . ازهارها زغبية التويج ، خلية الفصل ، لونها الى الجؤوة العابقة الزاهية . ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

٩٨٣٧ - دَبَقِيَّة دَابِقَةٌ *
Viscaria viscosa (S).
Viscaire visqueuse, Lychnide visqueuse, Attrape-mouches, Œillet de Janséniste, Bourbonnalse (F).
عشبة معمرة تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم . ساقها دابق السلاميات العليا ، لزج السفلى . اوراقها خيطية ، شبه قرصية التجميع . ازهارها ضيقة ارجوانية اللون || ضررها عديدة فوارقها الرائحة . ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٩٨٣٨ - دَبَل
Anon (F). Young ass (E).
الدبل هو الخمار الصغير .

٩٨٣٩ - دُبَلَّة
Tumeur (F). Tumor, Tumeur (E).
ورم سلمي الشكل يظهر في الجسم اسبابه عديدة متباينة



دَبَقِيَّة



دَبَقِيَّة دَابِقَةٌ



دَبَوَاءُ



دَبُوسِيَّة صَفْرَاءُ



دَبُوسِيَّة مَبْدُولَةٌ



دبوسية مرجانية



دييب الحوت



ديسة



ديفة



دقموس



دقموس كبير الرأس



دكيمة

٩٨٦١ - دُنْزِيَا Deutzie
جنس نباتات جنبية من القليبات تدعى الاشجر، اطلبه .
٩٨٦٢ - دُنْمُوسٌ * Ditomus (S). Ditome (F).
جنس حشرات من فصيلة الهربلوسيات . انواعه عديدة
جميعها صغيرة الحجم مضمورة القد طولها يراوح من ١١
الى ١٤ مم . اثوابها الى السواد القاتم رؤوسها بيضية
الشكل مقطوعة القاعدة . تركيب النجيليات والخيشيات
فتتزع ما بر ازهارها وبزورها وتخزنها في دهايز فسيحة
تحتفرها وتحرس عليها .

٩٨٦٣ - دُنْمُوسٌ كَبِيرُ الرَّأْسِ *
Ditomus capito (S).
Ditome à grande tête (F). Ditomus capito (E).
حشرة خاضعة مفترسة من فصيلة الهربلوسيات ورتبة مغمدات
الاجنحة . تألف البراري والاراضي المذحاة حيث تكثر
النجيليات والصيوانيات || جسمها متوسط القد يطول من
١٢ الى ١٤ مم . ثوبها الى السواد العابق . رأسها كبير
الجرم . فكها ضليعان . زباناها خطيان . عينها صغيرتان
بارزتان . ظهرانها مستدير الطرف اللاحف ، متتابع
التحزيز الغمدي . ارساغها خماسية العقيل || لها جيل واحد
في الحول . تظهر الحشرة الجمالانة في اواخر ايار وتعيش
حتى اواخر آب . تسرح في الليل وتبيت في النهار في
الدهاليز التي تحتفرها في التربة وتخزن فيها ما تنزعه من
مآبر ازهار النجيليات والصيوانيات ومن البزور بعد عقدھا .
اليرقة عند الادراك التام تطول من ١٨ الى ٢٢ مم . جسمها
اسطوانى الشكل ، سداسى الرواجب ، اسمر اللون ، اسود
الرأس || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع
ينقضي في التربة حيث تنغمن اليرقة على عمق ٥ او ٦ سم .

٩٨٦٤ - دَثْ ، دِثَات Pluie fine (F).
هو المطر الضعيف . Little rain (E).

٩٨٦٥ - دَقَر دثر الشجر : اوراق وتشمبت خضرته .

٩٨٦٦ - دَقْن Nicher (F). To nestle (E).
دثن الطائر في الشجرة : اتخذ فيها عشاً .

٩٨٦٧ - دَكِيمَةٌ * Exhyménine (F).
الدثيرة الغلاف الخارجى لجذرة الطلع وهو غالباً كثير
المسام تملوه بعض التنوعات .

٩٨٦٨ - دَكِيمَةٌ * ، فَأَرَةُ الْحِرَاجِ Mus sylvaticus (S). Mulot, Souris des bois (F).
Fieldmouse, Long-tailed field mouse (E). Wald-
maus, Kleine waldmaus (D).

نوع من الجرذ صغيرة القد موطنها الشرق الاوسط واروبه .
ثوبها الى الصهبة اسمرام يملوها موج اصفر يعبق ويربد
مع اقترابه من ثبج الظهر . بطنها الى البياض التبي . طولها
نحو ١٢ سم . وذنبها كذلك . اذنانها كبيرتان . ارساغها
طويلة . سراشت ذنبها تبلغ ١٥٠ . اطباء الانثى ٦ .
تألف الحراج وجميع الاماكن المشجرة . تقترب من
المساكن . قوتها الحشرات والديدان والعصافير والثار على
اختلافها والبلوط ولحاء الاشجار || الانثى تضع ثلاث
مرات في السنة وكل مرة من ٤ الى ٦ ادراص تبصر
وتكتسي بعد وضعها باسبوعين .

٩٨٤٩ - دَبُوسِيَّةٌ مُذْهَبَةٌ Clavaria aurea (S).
Clavaire dorée (F). Golden clavaria (E).
نوع من الدبوسية ذهبية اللون متوسطة القد مؤذية . لبابها
مر الطعم . مرارته تذهب بالغلي . لا ينصح بأكلها .

٩٨٥٠ - دَبُوسِيَّةٌ مَرَجَانِيَّةٌ * ، فُطْرٌ مَرَجَانِي Clavaria coralloides (S). Clavaire corail, Trlpette,
Barbe de chèvre (F). Goat's beard fungus (E).
نوع من الدبوسية . متوسطة القد ، كثيفة التجميع ، مرجانية
اللون ، سامة .

٩٨٥١ - دَبُوسِيَّةٌ وَرْدِيَّةٌ Clavaria botrytis (S).
Clavaire rosée (F). Roseate clavaria (E).
نوع من الدبوسية المأكولة وهي كبيرة القد ، عنقودية
الشكل تعلوها رقشة وردية .

٩٨٥٢ - دَبُون هو الانشورزا المخزنية ، اطلبها .

٩٨٥٣ - دَبِيّ الدب اصغر الجراد وقيل الجراد ساعة نقفه وخروجه
من المروء .

٩٨٥٤ - دُبِيَّات Ursidae (S). Ursidés (F). Ursidae (E).
فصيلة حيوانات لبونة من رتبة اللوامح تشمل اجناس وانواع
الدبة الاسيوية والاروبية والامريكية .

٩٨٥٥ - دَبِيْبٌ ، رَحْفُف Reptation (F). Creeping (E).
الانتقال دباً او زحفاً على البطن .

٩٨٥٦ - دَبِيْبُ الْحَوْتِ * ، ذَاتُ النَّفْسَيْنِ Ceratodus (S).
جنس أسماك نهريه وبحيرية تعيش في المياه الراكدة السملة .
تتميز بازواجية اعضائها التنفسية . انواعها قليلة
جميعها كبيرة القد ، صغيرة الرأس ، مستعرضة المؤخر ،
طولها يراوح من ١٠٠ الى ١٨٠ سم . لحمها متوسط
الصنف مأكول

٩٨٥٧ - دَبِيْسَةٌ * Daboecia (S).
Daboecie (F). Daboecia (E).
بجلة معمرة من فصيلة الخلنجيات . مهدا الشرق الاوسط
واروبه الجنوبية . ساقها وفروعها مخشوشة . اوراقها عروء ،
متعاقبة ، صغيرة القد . نصالها خلية الصفحات السفلى ||
ازهارها عنقودي التجميع ، تاجي الارتكاز . ازهارها
وردية او بيضاء اللون ، قبيعية الشكل || تزرع للتزيين .
تنويرها يستمر من حزيران الى تشرين .

٩٨٥٨ - دَبِيْقَةٌ * Velezia (S).
Vélézie (F). Velezia (E).
جنس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة القرنفليات .
انواعها المعروفة قليلة العدد . منبتها بعض المواقع الجبلية
البنانية والسورية || سوقها قليلة الفروع منتصبه . اوراقها
لحمية ، خطية . ازهارها فردي او ثنائي التجميع ، طرفي
الارتكاز . ازهارها بحيلة وردية اللون او بيضاء .
اعرف انواعها :

٩٨٥٩ - دَبِيْقَةٌ حَزْمِيَّةٌ Velezia fasciculata (S).
Vélézie fasciculée (F).

٩٨٦٠ - دَبِيْقَةٌ قَاسِيَةٌ Velezia rigida (S).
Vélézie rigide (F).

٩٨٦٩ - دُج

Petrocincla (S).

Pétrocincle (F), Fieldfare (E).

جنس طير من القواطع وفصيلة الشروريات. انواعه قليلة تتميز بتغيريها الشجي، بألوانها المتراكبة الالوان وباراساتها الدقيقة المستطيلة التي تمكنها من سرعة الانتقال على الارض || قوتها الحشرات والثمار. تألف الاراضي الصخرية المذحاة. الانثى تبيض من ٤ الى ٦ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو الاسبوعين || اعرف انواعه ما يلي.

٩٨٧٠ - دُجَازَرَق *، سَكَلَة

Turdus cyaneus, Monticola solitarius (S), Merle bleu, Pétrocincle bleu (F), Blue fieldfare (E).

طائر من الدج طوله نحو ٢٥ سم. ثوبه الى الزرق العاقبة الجميلة، جناحه وذنبه الى السواد الفحمي اللامع. يألف الاماكن الصخرية النائية. قوته الحشرات والثمار. يدشن عشه في صدوع الصخور || يقبل التهذيب ويقلد الاصوات.

٩٨٧١ - دُجَاسْفَع

Juida (F).

هو الجداس، اطلبه.

٩٨٧٢ - دُجَاصُخُور *

Petrocincla saxatilis, Monticola saxatilis (S), Merle de roche, Pétrocincle de roche (F), Ring ouzel (E).

طائر من الدج طوله من ٢٠ الى ٢٣ سم. ثوبه جميل الالوان المتراكبة. رأسه وعنقه الى الرمادي الازرق. ظهره الى السواد الموشم بالابيض. صدره وبطنه الى الصهبة الزاهية. ذنبه الى السمرة السوداء. منقاره اسود، ورجلاه رصاصية اللون || يألف الجبال والهضاب والتهام الصخرية. قوته الحشرات والديدان والحلزونات والثمار. يدشن عشه في صدوع الصخور وشقوقها || يقبل التهذيب ويقلد الاصوات والانغام بسهولة.

٩٨٧٣ - دُجَاج

Grondin (F).

الدجاج سمكة بحرية تدعى طريق، اطلبه.

٩٨٧٤ - دُجَاجِاحْمَر

Trigle pin (F).

سمكة بحرية تدعى طريق احمر، اطلبه.

٩٨٧٥ - دُجَاجِالْأَرْض

Scolopaciens (F).

Scolopax, Woodcocks (E).

عمارة من فصيلة دجاجيات الارض. اجناسها ١٩. اما انواعها فكثيرة العدد. تتميز برؤوسها الصغيرة. محاسرها جالسة، عمودية. عيونها كبيرة بارزة. اجنحتها مستديرة. مناقيرها تحمل اخدوداً وسطياً واحداً || جميعها من القواطع. قوتها الديدان والرخويات والحلزونات والحشرات. تألف المناطق والشواطئ البحرية وضياف الانهر والبحيرات.

٩٨٧٦ - دُجَاجِأَهْلِي

هو العرفان الداجن، اطلبه.

٩٨٧٧ - دُجَاجِرَمَادِي

Trigle gornard (F).

سمكة بحرية تدعى طريق رمادي، اطلبه.

٩٨٧٨ - دُجَاجِسِنْدِي

هو الفرغو، اطلبه.

٩٨٧٩ - دُجَاجِمَرَجَانِي

Trigle morrude (F).

سمكة بحرية تدعى طريق مرجاني، اطلبه.

٩٨٨٠ - دُجَاجَة

le Cygne (F).

Cygnus, Swan (E).

قالوا الدجاجة في حين ان الصحيح هو اليم او القنوس. والدجاجة كوكبة نجوم موقعا الشمال. مركزها بين القيثارة والعقاية. وهي كثيرة النجوم اخصها المزدوجة التي لا يقل عددها عن ٣٥ || والعرب تسمي الاربعة المصطفة «الفوارس» وقد قطعت الهجرة عرضاً. والنير الذي على الذنب «الردف». ومن نجومها المشهورة «الصدر» و«الجناح الايمن» و«منقار الدجاجة» و«ظلف الفرس».

٩٨٨١ - دُجَاجَة

Poule (F), Hen (E).

انثى الديك.

٩٨٨٢ - دُجَاجَةالْأَرْض *

Scolopax (S).

Bécasse (F), Woodcock (E).

طائر من دجاج الارض طوله نحو ٤٠ سم. منقاره جالس مستطيل. جناحه رجب ذلق. ذنبه صغير اقطم. راسه قصير. اصابعه منفردة. ثوبه الى الصهبة الطحلاء تعلوه رقشة بيضاء وتوشم اسود || قوته الحشرات والديدان. يدشن في افصوص بين العوسج والنباتات الشائكة. الانثى تضع نحو ٤ بيضات تحضنها وحدها ثلاثة اسابيع.

٩٨٨٣ - دُجَاجَةالْحِرَاج

هي السلكان، اطلبه.

٩٨٨٤ - دُجَاجَةالمَاء

Gallinula (S), Gallinule,

Poule d'eau (F), Moor hen, Water hen (E).

جنس طير من فصيلة التفلقيات. انواعه قليلة صغيرة القد تتميز بطول مناقيرها الذي يعادل طول رؤوسها. اجنحتها ضعيفة ذلقة. قوادمها عريضة جالسة. اذنانها مستديرة قصيرة. ارساغها قصيرة حافية الجهة الصدرية الامامية، سرديّة الجهة البطنية الخلفية. اصابعها الامامية جالسة الملص || اعرف واشهر انواعه دجاجة الماء المبدولة.

٩٨٨٥ - دُجَاجَةالمَاءِ الْمَبْدُولَة *

Gallinula chloropus (S), Gallinule commune, Poule d'eau ordinaire (F), Common moor hen, Vulgar water hen (E).

نوع من دجاج الماء. طولها نحو ٣٥ سم. ثوبها الى السمرة الزيتونية يعبق عند ظهرها يطحل في جوانبها وينحرف الى الربعة عند بطنها. افنيكها وحثار اجنحتها بيض. جبهتها وعيناها ومنقارها حر. رجلاها الى الخضار الزيتوني || الانثى اصغر من الذكر تدشن عشها في الاسل فوق سطح الماء. تبيض من ٧ الى ١٠ بيضات تحضنها وحدها. قوتها الحشرات والديدان. تألف المناطق الظليلة وضياف الانهار والبحيرات حيث يوجد الاسل وتكثر المقاصب || موطنها فسيح الارعاء. تعتبر من اوابد المناطق الحارة ومن قواطع المناطق الاستوائية والمعتدلة.

٩٨٨٦ - دُجَاجَةحَبَشِيَّة، دُجَاجَةرُؤُوسِيَّة

انثى الديك الرومي او الحبشي. Dinde (F), Turkey hen (E).

٩٨٨٧ - دُجَاجِيَّات

Gallinaceae (S).

Gallinacées (F), Gallinaceae (E).

رتبة من الطير تتميز بجثتها الربعة وصغر رأسها واستدارة



دج أزرق



دج الصخور



دجاجة الأرض



دجاجة الماء المبدولة

عديدة . تعلو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم . قرونها ثنائية متقابلة مستطيلة متدلية . يوجد في الاثربة الخصبة المتوسطة الاندماج . يرغب في كثرة الري . محصوله وافر الانتاج .

٩٨٩٦ - دَجَر كَتَجَان Vigna catjang (S).
Dolique à oeil noir (F). Black-eyepoa, Catjang (E).
Bohnenwinde (D). Fagiolina, Faginolo (I).

نوع من الدجر الزراعي القليل الارتفاع عن الارض يوجد في جميع الاثربة الزراعية . لا يخشى سوى الرطوبة المستحكمة . محصوله وافر الانتاج . ضروبه تختلف بموافقها الاقليم ونوع التربة .

٩٨٩٧ - دَجَوَاة Rame (F). Stick (E).
مسند او قصبة يغرر في التربة تتسلى عليه النباتات المعترشة ج دجران .

٩٨٩٨ - دَجَل Amender (F).
To improve, to manure (E).
دجل ارضه : اصلحها بالسرجين .

٩٨٩٩ - دَجَلَة الدجلة : الموضع الذي يعمل فيه النحل البري .

٩٩٠٠ - دَجَم Catégorie (F). Category (E).
الدجم من الشيء : الفئة المصنفة منه . ج دجام .

٩٩٠١ - دَجْن Nébulosité (F). Patch of haze (E).
الدجن والدجون والدجان والأدجان والسدوم : ظل الغيم وملى حجب اشعة الشمس .

٩٩٠٢ - دَجَن Domestiquer (F).
To domesticate, to tame (E).
دجن وأدجن حول الحيوان الوحشي الى حيوان اليف داجن .

٩٩٠٣ - دَجَنَة ، مُخْبِلَة ، مُعْصِرَة Nimbus
نوع من الغيوم المتوسطة البعد الماطرة . تبدو لبدة كثيفة قائمة مترامية الاطراف المستديرة .

٩٩٠٤ - دَجَوِي ، رَامِس Nocturne (F).
Nocturnal, Nightly (E).
كل دابة مسرحها الليل هي دجوية .

٩٩٠٥ - دَجِينَة ، بَنِين Larve d'abeille (F).
Larva bee (E).
الدجينة هي يرقة النحلة . ج دجى . قيل : « ديبب الدجى وسط الضريب المعسل » وبعض النحالة يسمونها بنين للمفرد والجمع .

٩٩٠٦ - دَحَا ، دَحَى Etendre la terre (F).
To extend the soil (E).
دحا دحوا ودحى دحياً التربة : بسطها .

٩٩٠٧ - دُحَاب Copulation des insectes (F).
Copulation of insects (E).
تسافد الحشرات اي تذيئها .

٩٩٠٨ - دَحَّاس * Hyperoodon (S).
Hyperoodon (F). Hyperoodon (E).
جنس حيوانات بحرية لبونة من الحويثيات وفصيلة الدجاسيات انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها معظم بحار العالم ، اخصها الشمالية || اجسامها كبيرة شبه مردنية الشكل ،

شكل سقطيها وذيلها || فصائلها تسع : التدرجيات والجنونيات والحبيشيات والشقبانيات والطيوجيات والعرناسيات والفريغريات والنفوقيات والهدايبات .

٩٨٨٨ - دُجَاجِيَّات الأرض Scolopacidae (S).
Scolopacidés (F). Scolopacidae (E).

فصيلة طير من رتبة طوال الساق اجناسها وانواعها كثيرة العدد تجمعها سبع عمارات . جميعها من القواطع . قوتها الرخويات والديدان . والخفريات . تألف المناقع وضفاف الانهر الموحلة الكثيرة الغشاء || اما عماراتها فهي دجاج الارض والبوققيات والطوطانيات والعلاليات والكروانيات والككسيات والنكاليات .

٩٨٨٩ - دَجَالَة Zootechnie (F). Zootechnics (E).
الدجالة او علم الدواجن . علم يبحث في انسال وسلالات الدواجن ووسائل تربيتها وطرق استغلالها . الخ

٩٨٩٠ - دَجَّة الامير هي القطيفة الثلاثية اللون ، اطلبها .

٩٨٩١ - دُجْدُجَة Brunchorstia
جنس فطور مجهرية من فصيلة الدلاميات . بكنيداته جامية شارفة لاقياسية الانفلاق . شفيراته سباعية . بويغاته خيطية شفافة عديدة الخلايا الشفعية || انواعه كثيرة اعرفها دجداجة الصنوبر .

٩٨٩٢ - دُجْدُجَة الصنوبر Brunchorstia pinea
فطر مجهري يركب اوراق ونوامي بعض انواع الصنوبر فيذبلها بعد ان يوشمها بغطوره الطفيلية || اغمراره زهيدة لا تستوجب العناية .

٩٨٩٣ - دَجَر * Vigna (S).
جنس نباتات عشبية حولية زراعية من فصيلة القرنيات الفراشية . انواعه عديدة منها الصغيره القد ومنها العارشة . جميعها من نباتات المناطق الحارة . اوراقها كاملة مركبة ثلاثية طويلة الزناد . ثمارها قرون منتصبه او متدلية . بزورها كلوية الشكل صغيرة القد . قشورها مألصة صلبة ، لياها يحوي :

٢٤٪ من المواد الازوتية .

٢٪ « المواد الدهنية .

٥٧٪ « المواد الهيدروكربونية .

اشهر انواعه واعمها زراعة الثلاثة التالية .

٩٨٩٤ - دَجَر امريكي ، قَلْت Vigna biflorus (S). Dolique biflore, Grain de cheval (F). Gram, Horse-gram (E). Pferdekorn (D). Dolico cavallino (I).

نوع من الدجر مهدد امريكية الجنوبية وقد عمت زراعتها جميع مناطق العالم الحارة والمعتدلة . نباته منتصب السوق الفرعاء القليلة الارتفاع . قرونها ثنائية متقابلة منتصبه . يرغب في الاثربة القليلة والمتوسطة الاندماج ، الغنية بالمواد العضوية ، القليلة بالعنصر الازوتي .

٩٨٩٥ - دَجَر صيني ، ماش شرقي Vigna sinensis (S). Dolique de Chine (F). Cow-pea, Cherry-bean (E). Chinesische fasel (D). Occhiato (I).
نوع من الدجر . الزراعي الشرقي العارش . ضروبه



دجر



دحَّاس



دَحَداح

قطرها يراوح من ١٠ الى ٢٥ سم. || اوراقه مألسة النصل، رهلة، متدلية، تطول من ٦٠ الى ١٠٠ سم. وتعرض من ٨ الى ١٠ || شراخه يعلو من ٥٠ الى ٦٠ سم. صيوانه الزهري يعد من ٦ الى ١٠ ازهار عرقية الرائحة، قمية الشكل، وردية اللون، تطول من ١٦ الى ٢٠ سم. ازهاره يستمر طوال الصيف.

٩٩١٥ - دَحَرَج * Vicia calcarata (S).

Vesce éperonnée (F). Spurred vetch (E).
فوع من الباقية وهو نبات عشبي بري حولي يكثر بين زروع العدس والبقية والكرسة حبه كروي الشكل شديد الصلابة.

٩٩١٦ - دَحَس Grener (F). To seed (E).

دحس وأدحس السنبل: امتلأت أكنته من الحب. والدحس: الزرع اذا امتلأ حباً.

٩٩١٧ - دَحَسُوم Spermestes (S).

Spermeste (F).
جنس عصافير صغيرة القند ملونة من فصيلة التنوطيات. انواعه المعروفة قليلة موطنها البلاد الافريقية الحارة جميعها صغيرة الحجم. اطولها تراوح من ٨ الى ٩ سم. اثنائها جميلة الالوان الزاهية المتراكبة. تألف الحياة الجماعية. اسرابها كثيرة العدد. تأوى الى الاحراج وتسرح في السباسب والمراعي والحقول. قوتها البزور البرية اخصها بزور النجيليات وبعض الهوام والحشرات الصغيرة || تألف حياة الاسر وتتكاثر بسهولة. اعرف انواعه واشهرها الدحسوم الحكم.

٩٩١٨ - دَحَسُوم مَكَمَم ، قَطُوش Spermestes cucullata (S).

Spermeste à capuchon, Nonette de Calcutta (F).
نوع من الدحسوم. طولها يراوح من ٨ الى ٩ سم. ثوبه العلوي الى السواد الاغبر اللامع. ثوبه السفلي الى البياض العاجي الوردي الموج. رأسه وعنقه الى السواد العالق. صدره الى الخضار الزيتي. خاصرته مؤذرتان بالاسود والاطحلى || يألف حياة الاسر. يعيش ويتكاثر بسهولة فائقة، لكنه يخشى البرد || انشاء ترخم اربع مرات في الحول. حضنتها تستمر نحو ١٣ يوماً وتراوح من ٤ الى ٥ بيضات. الذكر يؤمن قوت الانثى والجلايط.

٩٩١٩ - دَحَل Réservoir (F). Reservoir (E).

مصنع يجمع فيه الماء.

٩٩٢٠ - دَحَلُول * ، قَنَازَة جَبَّارَة Prionothea coronata (S).

Prionotheque géante, Pimélie géante (F).
حشرة من غديات الاجنحة وفصيلة الغيشيات. موطنها شاسع الاطراف يمتد من صحارى السودان الى مصر وليبيا وتونس والجزائر. تعيش في الغياشي القاحلة قوتها ما تفتقره من هوام وذباب || جسمها كبير القند مجني الشكل. غدها مجهزان بمناسخ حنارية حادة. جرمها مستطيلة. ثوبها الى السواد الفحشي اللامع.

٩٩٢١ - دَحَم Géniteur (mâle) (F).

Begetter (male) (E).
هو في النبات ما استعمل وليع متكه في تنبيغ ميسم غيره لاختصاصه || فالدم هو الذكر العاطي والعدف هي الانثى اللاقطة.



دَحَلُول

تطول من ٧ الى ١٠ امتار. رؤوسها ضخمة، شبه مكورة تشرف على الاعظام الشبيهة بالناقيد. ومن ميزات هذا الجنس انه يحتمل في فكه الاسفل سنان ثابتان لا يتبدلان كسائر الاسنان. اثنائها الى الطحلة البحرية الموج تسمر كعقبي في الرأس والظهر وتغير في البطن || قوتها الرخويات، اخصها رأسيات الارجل. ملجئها الحيائي جماعي. افراجها تعد من ٢٠ الى ٥٠ زوجاً.

٩٩٠٩ - دَحَاسِيَّات Hyperoodontidae (S).

Hyperoodontidés (F). Hyperoodontidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية لبونة من الحوتيات متماثلات الاسنان. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار العالم اخصها الشمالية والقطبية || اجسامها كبيرة شبه وشمية الشكل، مستضخمة الرؤوس عادمة الاعناق، صغيرة الزعانف الظهرية المؤخرة الى الوراء || جميعها تألف الحياة الجماعية. قوتها الرخويات.

٩٩١٠ - دَحَدَاح ، زَنْبَقِيَّة Crinum (S).

Crinole, Lis asphodèle (F). White lily, Lily asphodel (E). Liliendolde, Liliennarcisse (D). Crino (I).

جنس نباتات بصلية برية وزراعية تزيينية من فصيلة النرجسيات. منبتها البلاد الحارة. انواعها نحو ٥٠ معظمها بري. اوراقه قرصية التجميع شرفانية مستطيلة. شماريحها ملتكة اللب، منتصبه، تحمل في رؤوسها بين شرعائها مجموعة من الازهار الصيوانية الارتكاز العديدة الالوان. اعرف واشهر انواعه التزيينية الاربعة التالية.

٩٩١١ - دَحَدَاح أُسَيَّوِي Crinum asiaticum (S).

Crinole asiatique (F).

نوع من الدحداح السام الشديد الذعاق. اوراقه من ٢٠ الى ٣٠ نصلها جميل الخضار الزاهي يطول من ٨٠ الى ١٠٠ سم. ويعرض من ٧ الى ١٠ سم. || شراخه يعلو من ١٥ الى ٢٠ سم. صيوانه الزهري يعد من ٢٠ الى ٥٠ زهرة. ازهاره مستطيلة، ضيقة، نجمية الانبساط، بيضاء اللون || ازهاره يستمر من ايار الى تموز.

٩٩١٢ - دَحَدَاح القُدْرَان Crinum campanulatum (S).

Crinole aquatique, C. des étangs (F).

نوع من الدحداح يرغب في التربة الغضوية الغنية الرطبة. اوراقه ضيقة النصل جميلة الخضار العالق تطول من ١٠٠ الى ١٢٠ سم. وتعرض نحو ٢ سم || شراخه يعلو نحو ٣٠ سم. صيوانه الزهري يعد من ٥ الى ٦ ازهار عادمة الرائحة، قمرزية اللون، تطول نحو ١٠ سم. ازهاره صيفي.

٩٩١٣ - دَحَدَاح مُسْتَطِيل الورق Crinum longifolium (S).

Crinole à longues feuilles (F).

نوع من الدحداح. اوراقه نحو ٢٠ نصلها بحري الخضار يطول من ٩٠ الى ١٥٠ سم. ويعرض من ٥ الى ٧ سم. شراخه يعلو نحو ٤٠ سم. صيوانه الزهري يعد من ٦ الى ١٢ زهرة. ازهاره عرقية الرائحة، قمية الشكل، تطول نحو ١٠ سم. لونها الى البياض الناصع || ازهاره يستمر من حزيران الى آب.

٩٩١٤ - دَحَدَاح مُور Crinum moorei (S).

Crinole de Moore (F).

نوع من الدحداح الامريكي المنبت. بصلته كبيرة القند،

المرجان والرجان حيث يكثر الفوقس والسرغاس || جسمها اهليلجي الشكل ، عادم الحراشف ، شديد اللزوجة ، يطول من ٢٠ الى ٢٤ سم. ثوبها يماثل البيئة التي تعيش فيها وهو غالباً الى الخضار الاطلحل يعلوه تجذيع معترض اسود واسمر || تتميز بلامسة تملو مقدم الفك وبقرنين غصروفيين الواحد تلو الآخر . زعنفتها الظهرية كبيرة ، قاطبة ، شائكة المناخس الحادة .

٩٩٢٩ - دَحْسِيَّة (F). She-monkey (E).
انثى القرد وتدعى إلقة وقردة .

٩٩٣٠ - دُحْيَسِيَّات *
Drilus (S).
Drile (F). Drilus (E).
جنس حشرات من فصيلة الدحيسيات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعه المعروفة نحو ١٥ اعطانها تمتد من الشرق الادنى الى اوروبا وافريقية الشرقية || اجسامها مستطيلة الشكل ، معتدلة التبسيط ، تطول من ٥ الى ١٠ مم. رؤوسها مستعرضة . عيونها ناشرة . تأشيرها وفكوكها وملامسها نظامية . قرونها الاستشعارية مشطية الشكل . كواسلها شبه مربعة . اغمارها لاحفة . قوائمها نشيطة اثوابها ثنائية اللون || اناثها عادمة الجناح . مستضخمة الجرم . صغيرة الرؤوس والعيون . قصيرة القرون الاستشعارية الخيطية . ضليعة الملامس الفكية . نحيلة القوائم القصيرة || ذكورها خاضعة واشعة . اناثها مفترسة تعيش على القواقع الصغيرة .

٩٩٣١ - دُحْيَسِيَّات *
Drilidae (S).
Drilidés (F). Drilidae (E).
فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم حراج البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها مستطيلة الشكل ، معتدلة التبسيط ، تطول من ٥ الى ١٠ مم. ذكورها مجنحة . رؤوسها مستعرضة . عيونها كبيرة ، ناشرة . تأشيرها وفكوكها نظامية . قرونها الاستشعارية مشطية الشكل ، مركبة من ١١ فصلة . كواسلها شبه مربعة . اغمارها لاحفة . قوائمها نشيطة . اثوابها ملونة || اناثها اصغر جرم من ذكورها . وهي عادمة الجناح ، صغيرة الرؤوس والعيون . ضليعة الملامس الفكية . قصيرة القرون الاستشعارية الخيطية الشكل . قصيرة القوائم النحيلة || ذكورها خاضعة واشعة تعيش على اوراق النبات وازهاره . اناثها مفترسة تعيش على القواقع وتقيم في اصداقها حتى الاكمال . اشهر اجناسها الدحيس .

٩٩٣٢ - دُخَاسِيَّات *
Eumenes (S). Eumène (F).
جنس حشرات نافعة من فصيلة الدخاسيات . انواعه نحو ٥٠ معظمها من حشرات المناطق الحارة . تتميز باجسامها المخسورة . طولها من ١٠ الى ٣٠ مم. بطونها اجاصية الشكل مقلوبة . اثوابها سود يملوها تأذير اصهب واصفر واحمر || عيشتها عيشة الدخاسيات واخلقها كذلك .

٩٩٣٣ - دُخَاسِيَّات *
Eumenidae (S).
Eumenidés (F). Eumenidae (E).
فصيلة حشرات نافعة من رتبة غشائيات الاجنحة المخسورة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . معظمها كبير القد . يرجح في الوانها الاسود والاصفر . تبني اوكارها بالطين على الارض وفي الحيطان والاخشاب والاشجار . تغرس ديدان حورشفيات الاجنحة وقد تقتنصها وتخرنها في اوكارها لغوت يرقاتها .

٩٩٢٢ - دُحْمُور الأرق *
Aphidius avenae (S).
حشرة صغيرة من الدحوريات تمتح مكنها في ظهور الارق فينقف عن يرقات تعيش على احشاء عائلها وتقضي عليه .

٩٩٢٣ - دُحْمُور الحورشيَّات *
الكبيرون *
Aphidius avenae (S).
حشرة صغيرة من الدحوريات طولها من ٤ الى ٥ مم. لونها الى الحمرة يعلوها موج اصفر . تمتح مكنها في جميع انواع الحورشيات . اخصها حشرة الزيتون (ذبابة الزيتون) فتقضي عليها .

٩٩٢٤ - دُحْمُور الكورنيَّات *
Apanteles glomeratus (S).
حشرة صغيرة من الدحوريات طولها من ٢ الى ٤ مم . تمتح مكنها بكثرة في اجسام مختلف ديدان حورشفيات الاجنحة اخصها الكورنيَّات فينقف عن يرقات تعيش داخل اجسام عوائلها لا تلبث ان تقضي عليها .

٩٩٢٥ - دُحْمُورِيَّات *
Braconidae (S). Braconidés (F). Braconidae (E).
فصيلة حشرات نافعة من رتبة غشائيات الاجنحة المخسورة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد تضم بضعة آلاف . جميعها صغيرة القد ، غليظة الجسم ، مختلفة الالوان ، يغلب فيها الاسود وبعضها يحمل مرزاً خارق الطول || يرقاتها طفيلية تتركب حورشفيات الاجنحة وبعض الغمديات . تعيش داخل عوائلها لا تخرج منها الا عند انسلاخها الاخير قبل تحويلها الى عذارى .

٩٩٢٦ - دَحْنَانَة *
Psettes (S).
Psette (F). Psettes (E).
سمكة بحرية بيوض من فصيلة الشيميات ورتبة شائكات الزعانف . اعطانها بحار البلاد الحارة والاستوائية . يكثر وجودها في البحر الاحمر والخليج العربي والمحيط الهندي || جسمها مبسط الجرم ، شبه مربع الشكل ، يطول من ٢٠ الى ٢٥ سم. سفنها صلب مستدق يغلف الجسم والقسم الاكبر من الزعنفة الظهرية . زعنفتها الذيلية فارقة . زعانفها الخوضية والشرجية شديدة الصغر . ثوبها الى الطحلة السمراء الرصاصية الموج يملوها في مقدم الجسم ضمن محيط الرأس ثلاثة خطوط معتزلة سوداء اللون || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٩٩٢٧ - دُحْنَسِيَّات *
Histrio (S).
Antennaire (F). Antennarius (E).
جنس اسماك بحرية من العظميات شائكات الزعانف . انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها من الاسماك اليمية تألف البضع المغسورة بالماء || اجسامها لزجة ، عادمة الحراشف ، صغيرة القد ، معتدلة التبسيط ، كبيرة الرؤوس والاشداق || اعرف انواعه واشهرها الدحنسة المجذعة .


٩٩٢٨ - دُحْنَسِيَّة مُجَذَّعَة *
Histrio histrio (S). Antennaire marbré (F).
Marbled antennarius (E).
نوع من الدحنس . سمكة بحرية يكثر وجودها في بعض بحار المناطق الاستوائية والحارة قرب البضع المغسورة وحشاف



دحور الارق



دحور الحورشيات



دحور الكورنيَّات



دحنانة



دحنسة مجذعة



دحيس



دخاس



دخاشة



دخدخ



دخدخ البساتين



دخلة البساتين



دخلة الغَزَّار

٩٩٣٩ - دُخَّاش ، نَبَج Exostose (F).

Exostosis (E).

نوع من التزيدات وهو انتفاخ في سطح العظم يعتري الخيل في السلاهي الثانية أي في الصفحة الداخلية من أطراف الحافر .

٩٩٤٠ - دُخَّاش هو الدلفين ، اطلبه .

٩٩٤١ - دُخْل ، عَالِدَة Rente (F).

Rent, Yearly income (E).

هو ايراد دوري يدفعه من اقترض مالا او اكتسب ملكية عقار مقابل اقراضه او امتلاكه .

٩٩٤٢ - دُخْل ، رَيْع Revenu (F).

Revenue, Income (E).

هو مجموع الثمار المدنية والطبيعية التي تنتج دورياً عن اموال المرء .

٩٩٤٣ - دُخْل عِقَارِي Rente foncière (F).

Ground-rent (E).

هي الغلة العقارية الصافية اي ما يدخل من الارض والابنية من فوائد .

٩٩٤٤ - دُخْلَة Sylvia (S).

Fauvette (F). Warbler (E).

جنس طير من العصافير وفصيلة الدخليات . انواعه عديدة معظمها غريد يأوي الى الادغال والغابات والحدائق . مناقيرها قصيرة ، جالسة ، ذلقة . اجنحتها متوسطة القد طويلاً يلحف الزام الاول من الذنب . اذنانها مقطوعة . ارساها قوية . اظافيرها منعقة ضعيفة || اشهر انواعه ما يتبع .

٩٩٤٥ - دُخْلَة البَسَاتِين *

Sylvia hortensis, S. borin (S). Fauvette des jardins (F). Garden warbler (E).

طائر من الدخيل طوله نحو ١٢ سم . ثوبه العلوي الى الوردية الزيتونية العابقة والسفلي الى الوردية الزاهية . زوره ربطته الى البياض . قوائمه وذنبه الى السمرة . منقاره ورجلاه الى الزرقة الرصاصية || يألف الحدائق والجنائن . قوته الحشرات والحوام وبعض الثمار الناضجة اخضاها التين . يدر في الاشجار . الانثى تبيض من ٥ الى ٦ بيضات تحضنها بمنوبة الذكر نحو اسبوعين .

٩٩٤٦ - دُخْلَة الصُرُود Sylvia subalpina (S).

Fauvette subalpine, F. passerinette (F). Subalpine warbler (E).

طائر من الدخيل طوله نحو ١٣ سم . ثوبه رمادي يعبق وينحرف الى الرصاصي في الرأس والظهر || يألف الهضاب والجبال الصخرية القليلة الاشجار . قوته الحشرات والثمار العنبية البرية . يدر في تجاويف الاشجار الهرمة وبين صدوع الصخور . انثاه تبيض ٥ بيضات تحضنها بمنوبة مع الذكر .

٩٩٤٧ - دُخْلَة الغَزَّار * Salicaria arundinacea,

Calamoharpe arundinacea (S). Effarvate, Fauvette des roseaux (F). Sedge-Warbler (E).

طائر من الدخيل ، وهو من عصافير لبنان الآبدة . جسمه صغير القد بطول من ١٤ الى ١٥ سم . ثوبه اصهب الصفحة العليا ، اسمر الرأس والرداء ، ابيض الصفحة

٩٩٣٤ - دُخَّاش ، دُخَّاشَة * Orchestia (S).

Orchestie (F). Orchestia (E).

جنس دوبيات بحرية من القشريات العليا وفصيلة الدخاشيات . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار المناطق الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها معتدلة القد ، مستقيمة الجوانب ، تطول من ٧ الى ٩ سم . زباناها مركبة ثلاثية الفصل . الزوج الاول من قوائمها الصدرية ينتهي بملاقط فكية ، الزوجان الثاني والثالث ينتهيان بكلايات قابضة . اثوابها تراوح بين الحمرة الارجوانية والصفرة المرجانية الموج . جميع انواعها مأكولة مرغوب فيها .

٩٩٣٥ - دُخَّاشِيَّات ، بَرَاغِيْث اليمّ

Orchestiidae (S). Orchestiids (F).

Orchestiidae (E).

فصيلة دوبيات مائية من القشريات العليا مزدوجات الارجل . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم || اجسامها عادية اللحاء . عيونها بسيطة . زوج من قوائمها الصدرية ينتهي بملاقط || اعرف اجناسها واشهرها الدخاش والشبوع .

٩٩٣٦ - دُخْدُوح * ، دُخْدُوح

lula (S). lule, lulus (F). Catkin, Galley worm (E).

جنس حيوانات دنيا من كثرات الارجل شفويات الاحناك . انواعه كثيرة منتشرة في جميع اقطار العالم . اجسامها اسطوانية مستطيلة كثيرة المفاصل عديدة الارجل الحيطية النحيلة . اثوابها مختلفة الالوان تستقر بين الصهبة والسواد تتخللها الحمرة . قوتها المواد العضوية الحيوانية المنحلة والنباتية وقد تقرض الجذور والمساقل والثمار القائمة على التربة كالشيلك وتوقع اشد الاذى بالبذور والحبوب الناشئة لانها تلتهم بوادرها || تسرح في الليل وتبيت في النهار ملتفة على ذاتها . تفرز عند شعورها بالخطر مادة حمضية كريهة الرائحة || تكافح بنفض التربة الملوثة بمحاليل الددت او الباراثيون .

٩٩٣٧ - دُخْدُوح البَسَاتِين * lulus albipes (S).

lule terrestre (F). lulus, Galley-worm (E).

دوبيية من الدخدخيات كثرات الارجل ، شفويات الاحناك . موطنها البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || جسمها حيدوي التركيب اسطواني الشكل بطول نحو ٢٥ سم . عند الذكر ونحو ٩٠ سم . عند الانثى . رأسها صغير الحجم ، مستدير . عيناها زيمتان . زباناها صغيران مستدقان . تأشيرها قاضية . جوامزها نحيلة كثيرة العدد . ثوبها الى الصهبة الحنطية السوداء الموج ، يعبق في الظهر ويژهو في الجانبين ويغير في البطن والمذب || تسرح في الليل وتبيت في النهار ملتفة على ذاتها تحت الحجارة والاعشاب . انتقلها بطيء وتفرز عند الشعور بالخطر مادة حمضية كريهة الرائحة || قوتها المواد العضوية المنحلة وتقرض الجذور والمساقل والثمار ، وتقضم البذور الناشئة وتلتهم رثمها وبوادرها || يكثر وجودها قرب المساكن الريفية || تعتبر من الدوبيات الضارة المؤذية .

٩٩٣٨ - دُخْدُوحِيَّات ، دُخْدُوحِيَّات

Myriapoda (S). Myriapodes (F). Myriapoda (E).

صف حيوانات مفصليية عديد الفصائل والاجناس والانواع تجمعها وتبتان : شفويات الاحناك وشفويات الارجل .



دخلة ثرثارة



دخلة رأساء



دخلة سودقية



دخلة شائعة



دخلة شواله



دخول



دخن احمر

السفل من الزور الى الافنيك || يالف المقاصب والآجام
وبجاري الماء . قوته الحشرات والهوماء || يدن عشه بين
الغزار والقصب . حضنته من ٤ الى ٦ بيضات ترخها
الانثى بمناوبة الذكر نحو ١٣ يوماً .

٩٩٤٨ - دُخْلَة ثَرْثَارَة *

Sylvia garrula, *S. curruca* (S). Fauvette babillarde,
Babillarde (F). Prattle warbler (E).

طائر من الدخيل طوله نحو ١٣ سم . ثوبه العلوي الى
الرمادي العايق والسفلي الى الرمادي الفاتح . جناحاه
وذنبه الى السمرة . موطنه فسيح الارحاء . يالف الحدائق
والسياجات والادغال والاحراج . يكثر من الصداح
يلقيه جاثماً وطائراً وخائفاً ومقاتلاً || قوته الحشرات
والهوماء وبعض الثمار الناضجة السكرية || يدن في
الاشجار . انشاء لها موسمان في السنة . تبيض في كل مرة
من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر .

٩٩٤٩ - دُخْلَة رَأْسَاء *

Sylvia melanocephala (S). Fauvette mélanocéphale (F). Sardinian warbler (E).

طائر من الدخيل صغير القد . رأسه اسود . دوحة عينه
حمراء . ظهره اطحل . بطنه اغبر . جناحاه وذنبه سمر .
يالف ضفاف الانهر والجداول . قوته الحشرات والهوماء
وبعض الحبوب . يدن في العوسج وفي الجنبات الشائكة
الفناء . انشاء لها موسمان في الحول تبيض كل مرة ٤
بيضات تحضنها بمناوبة مع الذكر .

٩٩٥٠ - دُخْلَة سَوْدَاء الرَأْس

Fauvette à tête noire (F). Black cap (E).

اطلب ابو قلنسوه .

٩٩٥١ - دُخْلَة سَوْدَقِيَّة * ، زُرْبَقَة

Sylvia nisoria (S). Fauvette épervière (F). Lesser
whitethroat (E).

طائر من الدخيل طوله نحو ١٦ سم . رأسه اسمر اللون
ظهره رصاصي . جناحاه وذنبه الى السمرة . صدره الى
البياض الاشهب المنق . بطنه اطحل ابيض .
يالف الحدائق والغابات الرطبة والسيجات والمراعي .
قوته الحشرات والهوماء وبعض الحبوب والثمار العنينة البرية .
يدن في الادغال والعوسج . انشاء لها موسمان في الحول تبيض
كل مرة ٤ بيضات تحضنها بمناوبة مع الذكر .

٩٩٥٢ - دُخْلَة شَائِعَة * ، جَمَلَانَة

Sylvia cinerea, *S. communis* (S). Fauvette grisette,
Grisette (F). Whitethroat (E).

طائر من الدخيل طوله نحو ١٥ سم . ثوبه رمادي اللون
يعبق مع اقترابه من ثبيج الظهر . جناحاه وذنبه الى السمرة .
بطنه وزوره الى البياض الوردي . موطنه فسيح الارحاء
وهو مبدول في لبنان . يالف الحدائق والغابات الرطبة
والسيجات والمراعي الطبيعية . قوته الحشرات وبعض
الحبوب . يدن في الادغال والعوسج . الانثى لها موسمان
في الحول . تبيض كل مرة لربع بيضات تحضنها بمناوبة
مع الذكر .

٩٩٥٣ - دُخْلَة شَوَالَة * ، شَوَالَة

Sylvia undata (S). Fauvette pitchou, Pitchou (F).
Desert warbler (E).

طائر من الدخيل صغير القد قصير الجناح طويل الذنب .
قال فيه ابن سيده : « الشواله دخلة كدراء اذا وقفت
على شجرة او سجر شطرت بزكها خطران الفحل

وسيت شواله لانها تشول بذنبها وفي بطنها وسفلتها شيء
من حرة . » || قوته الحشرات على اختلافها وبعض
الثمار العنينة البرية . يدن في العوسج انشاء لها ثلاثة مواسم
في الحول تبيض كل مرة ثلاث بيضات تحضنها بمناوبة
مع الذكر .

٩٩٥٤ - دُخْلَة غَرِيْدَة ، قَرَقَفَنَة ، كَحْبَحِيلَة

Sylvia orpheus (S). Fauvette orphée, Orphée (F).
Orphean warbler (E).

طائر من الدخيل طوله نحو ١٥ سم . ثوبه رمادي اللون
يعبق وينحرف الى السمرة مع اقترابه من قمة الرأس وثبيج
الظهر || موطنه حوض البحر المتوسط وهو مبدول في
لبنان || يالف الاشجار الرفيعة ويفرد طول النهار .
قوته الحشرات والهوماء وبعض الثمار الناضجة كالتين .
يدن في الاشجار الكثيفة العالية . انشاء وحيدة الموسم تبيض
٥ بيضات تحضنها وحدها .

٩٩٥٥ - دُخْلَة نَضَارَة ، أَمُ نَضَارَة

Sylvia conspicillata (S). Fauvette à lunettes (F).
Spectacled warbler (E).

طائر من الدخيل صغير القد ارم اللون رصاصي الرأس .
اسود دوحة العين . ابيض العنق والاجفان يأوى الغابات
والادغال . قوته الحشرات وبعض الثمار والحبوب . يدن
في العوسج . انشاء لها موسمان في الحول تبيض كل مرة
٤ بيضات تحضنها بمناوبة مع الذكر .

٩٩٥٦ - دُخْلُول * ، مَغَالُور

Megalurus (S). *Mégature* (F). *Megalurus* (E).

جنس طير من الجواثم مشرومات المناقير وفصيلة الدخليات .
انواعه المعروفة نحو ١٥ . اعطائها المناطق الحارة من العالم
القديم . ملجئها الحياتي جماعي . جماعاتها قليلة العدد .
تألف الغابات والرياح وضفاف مجاري الماء والمنابع .
قوتها الحشرات والديدان والثمار العنينة البرية وبعض البروزر .
اجسامها صغيرة القد تطول من ١٢ الى ١٥ سم . انثواها
تختلف مع الانواع يكثر فيها الاشقق الاسمر الموج والاطحل
الصنابي || تدن اعشاشها في الاشجار الرفيعة . انثاها
تحضن من ٤ الى ٦ بيضات على مرتين في الحول . والذكور
تناوب الاناث في الترخيم الذي يستمر نحو ١٣ يوماً .

٩٩٥٧ - دُخْلِيَّات ، هَوَازِج

Sylviidae (S). *Sylviidae*, Warblers (E).

فصيلة طير من رتبة الجواثم المشرومات المناقير . معظم
طيورها مفيدة صداحة . مناقيرها صغيرة وتدية ارساغها
نخيلة حشفية البشرة . اصابعها دقيقة مستطيلة . اطافيرها
منعقدة || تألف الادغال والغابات قوتها الحشرات .

٩٩٥٨ - دُخْن

Panicum (S). Millet (F).

Wood millet-grass (E).


جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة النجيليات . انواعه
عديدة منها البرية والزراعية الاقتصادية والزينية .
جميعها منتصب السوق . اوراقها عصفية . ازهارها عشكوي
او عنقودي التجميع . ثمارها حبوب صغيرة مختلفة الاشكال
والالوان . اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

٩٩٥٩ - دُخْن أَحْمَر * ، عِرْق النَجِيل

Panicum sanguinale (S). *Panic sanguin*, Sanguinole,
Manne terrestre (F). *Panic grass*, Crab grass, Fin-



دُخْنُ أَرْغَب



دُخْنُ جَرْمَانِي

دُخْنُ الْمَصَافِير



دُخْنُ حَرِيرِي



دُخْنُ شَائِع



دُخْنُ صَغِير



دُخْنُ كَبِير



دُخْنَا

٩٩٦٦ - دُخْنُ كَبِير * ، دُخْنُ غِيلِيَّة

Panicum maximum (S). *Panic élevé*, *Herbe de Guinée* (F). *Guinea grass* (E). *Guineagrass* (D). *Erba di Guinea* (I).

نوع من الدُخْن مَهْدَة أفريقية الاستوائية. يعلو من ١٥٠ إلى ٢٠٠ سم. نصل عصفه إلى الخضار البحري. عثكوله كبير الحجم يعلو من ٣٠ إلى ٥٠ سم. || يزرع كنبات كلالتي تمتلئه الماشية ومنهم من استعمل حبه.

٩٩٦٧ - دُخْنُ كُرْبُورِي

Panicum capillare (S).

Panic capillaire (F).

نوع من الدُخْن الزراعي التزييني مَهْدَة أمريكية الشالية. يعلو من ٢٠ إلى ٦٠ سم. نصل عصفه زيتوني اللون، كثيف الزغب المستطيل الناعم. عثكوله صغير الحجم متصب || يقاوم الذبول. شائع الاستعمال التزييني.

٩٩٦٨ - دُخْنَاء * ، دُخْنَان ، أْبُر دُخْنَة

Calamoherbe arundinacea, *Aeroccephalus scirpaceus* (S). *Rousserolle effarvate*, *Rosignol d'eau* (F). *Reed warbler* (E).

طائر من الدُخْنِيَّات صغير القد. طوله نحو ٢٠ سم. لونه إلى الغبرة يعيش بين القصب وفي الأدغال وعلى ضفاف الأنهار. مبدوك في لبنان || قوته الحشرات الصغيرة والذباب والهُوَام. يذن على علو ٤٠ أو ٥٠ سم. في النباتات المنمورة بالماء كالاسل والغازار، يجمع ثلاثة منها إلى بعضها ويحبك عشه القمي الشكل فوق مركز اجتماعها || أنشاه تبيض ٤ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر من ١٤ إلى ١٥ يوماً.

Octrol (F).

Town dues, *City toll* (E).

ضريبة غير مباشرة أو رسم تجبیه البلديات عن بعض الاشياء التي تدخل على البلدة.

٩٩٧٠ - دُخْنِيَّات ٥

Amérorporées (F).

Amerospora (E).

عمارة فطور مجهرية من فصيلة الطحنيات. تتميز ببويضاتها الوحيدة الخلية. اجناسها ثمانية: البرقونية، الرزوان، الزميمة، السراف، السليفة، الطرولة، المشحارة والهرميسيوم.

٩٩٧١ - دُخْنِيَّة ، عَارِضَة

Adventice (F).

Adventitious (E).

هي الاعشاب التي تنبت تلقائياً في الزروع وقد تعتبر من النباتات الطوعية الضارة.

٩٩٧٢ - د. د. ت.

حاشور جزيل النفع شائع الاستعمال المنزلي والزراعي يرتكز على مادة فعالة شديدة الوقع والتأثير تقضي على جميع انواع الهوام وعلى الكثير من الحشرات الضارة. له نوعان تجاريان: المساحيق والسوائل. فالمساحيق تستعمل تعفيراً والسوائل نفساً.

٩٩٧٣ - دَدَنْقُول ٥

Didunculus strigirostris (S).

Diduncule strigirostre (F).

طائر وحيد الجنس والنوع من فصيلة الددقوليّات. موطنه جزيرة ساموا حيث يدعونه «منوميه». يألف الإخراج ملجئه الحياتي جماعي. جماعته قليلة العدد. يسرح في

gered panicum (E). *Bluthirse*, *Finger-hirse* (D). *Panico sanguigno*, *Sanguinella* (I).

نوع من الدُخْن الزراعي التزييني والكلافي. ساقه واغداد عصفه موشحة بالاحمر. نصله عابق الخضار. عثكوله ليد التجميع متصب. حبه احمر النقيير.

٩٩٦٠ - دُخْنُ أَرْغَب *

Panicum crus-galli (S). *Panic pied de coq*, *Mil des rizières* (F). *Small millet*, *Cockspur panicum*, *Barn-yard grass* (E). *Hühner-hirse* (D). *Panico pié di gallina*, *Panicastrella* (I).

نوع من الدُخْن الزراعي الكلافي. يعلو من ٤٠ إلى ٨٠ سم. ساقه عقداء قصيرة السلاحيات. عصفه كبير العدد. نصله أزغب البشرة. عثكوله سنابل مجمعة على محور واحد يراوح عددها من ٣ إلى ٥.

٩٩٦١ - دُخْنُ الْمَصَافِير * ، دُخْنُ إِيْطَالِي

Setaria Italica (S). *Millet des oiseaux*, *M. d'Italie*, *M. à grappes* (F). *Italian millet*, *Bengal grass* (E). *Welsche hirse* (D). *Miglio d'Italia* (I).

نبات من النجنيّات قريب الشبه من الدُخْن مَهْدَة الاصيلي الصين تكثر زراعته في ايطاليا. يعلو من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. عصفه غليظ الصلغ الجامدة التنية اللون. نصله ضيق الشقة مسنن الحافة فستي اللون. ازهاره عثقودي الشكل عثكولي التجميع متدلي الاطراف || يزرع للتزيين وللعلف ولحبه الصغير المستطيل المأكول من الطيور الداجنة اخصها المصافير.

٩٩٦٢ - دُخْنُ جَرْمَانِي * ، مُوْهَا

Panicum germanicum (S). *Moha de Hongrie* (F). *German panick grass* (E). *Moha* (D). *Panico moha* (I).

نوع من الدُخْن الزراعي والكلافي. يعلو من ٨٠ إلى ١٢٥ سم. عصفه كثيف التجميع سناني الشكل مستعرض القاعدة ذلق القمة. نصله عابق الخضار، جامد اللسيج. عثكوله سنبل الشكل ليد التجميع حبه ابيض اللون.

٩٩٦٣ - دُخْنُ حَرِيرِي * ، شَعْرُ الْفَار

Setaria glauca (S). *Sétaire glauque*, *Pennisète glauque* (F). *Bristle grass*, *Fox-tail* (E). *Fennich*, *Gilb-hirse* (D). *Panico liçio*, *Panicastrella* (I).

نبات من النجنيّات قريب الشبه من الدُخْن يعلو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم. اوراقه كثيرة العدد بحيلة الخضار الاطحل نصلها كثيف الزغب المستطيل الرهل. ازهاره عثقودي فارش || يزرع للتزيين. يقاوم الذبول.

٩٩٦٤ - دُخْنُ شَائِع * ، دُخْنُ أَصْفَر

Panicum millaceum (S). *Millet commun*, *Panic millet* (F). *Millet* (E). *Echte hirse* (D). *Panico miglio*, *Miglio* (I).

نوع من الدُخْن مَهْدَة آسية الوسطى يعلو من ٣٠ إلى ١٠٠ سم. نصل عصفه أزغب البشرة مسنن الحافة. عثكوله متوسط التجميع مائل الارتكاز الى جهة واحدة || زراعته واسعة الانتشار يزرع لحبه الشائع الاستعمال.

٩٩٦٥ - دُخْنُ صَغِير *

Panicum miliare (S). *Petit panic*, *P. millet* (F). *Little millet* (E). *Kleine hirse* (D). *Piccolo miglio a spiga* (I).

نوع من الدُخْن الزراعي الكلافي. يعلو من ٢٠ إلى ٥٠ سم. ساقه عديدة السلاحيات النحيلة القصيرة. عصفه مستطيل النصل الضيق الباهت الخضار. عثكوله لبس التجميع كروي الشكل. علفه لا بأس به تقبيله الماشية بسهولة.

٩٩٨١ - دُرَّابَة رَمَادِيَّة Draba cinerea (S).
Drave cendrée (F).

٩٩٨٢ - دُرَّابَة شَرْقِيَّة Draba cuspidata (S).
Drave cuspidée (F).

٩٩٨٣ - دُرَّابَة صَخْرِيَّة Draba rupestris (S).
Drave des rochers (F).

٩٩٨٤ - دُرَّابَة مَدَّادَة Draba repens (S).
Drave rampante (F).

٩٩٨٥ - دُرَّاج ، دُرَّجُوج Francolinus (S).
Francolin (F), Francolin (E).

كنيته ابو الحجاج وابو خطار وابو ضبة . جنس طير من عمارة الحجلبيات وفصيلة الطيوريات . قريب الشبه من الحجل يتميز بقوة ودقة منقاره ، بقصر ذنبه واستطالة ريشه الاملط || انشاء تدن افعوصها في الارض ترصعه بالعبل والحشيش الناعم . تبيض من ١٢ الى ١٤ بيضة تحضنها وحدها ثلاثة اسابيع || قوته الاعشاب والحبوب والجذامير . يألف الخضاب والسهول الرطبة قرب مجاري الماء . اسرابه قليلة العدد || موطنه فسيح الارواء يمتد من الهند الى اروبة وافريقية الشمالية والشرقية . انواعها ٤٠ اشهرها الدراج الشائع والحقيقطان .

٩٩٨٦ - دُرَّاج شَائِع * ، فَيْس Francolinus vulgaris (S). Francolin vulgaire (F).
Common francolin (E).

طائر من الدراج طوله نحو ٣٠ سم . ثوبه متراكب الالوان . قمة رأسه وزوره وجوشنه الى السواد العابق . قفنه مشق بالاسود والابيض . عنقه كستني الطوق . بطنه وجناحه الى السمرة المؤذرة والمرقطة بالصهبة . منقاره اسمر . رجلاه الى الجؤوة || الانثى اصغر قدماً من الذكر وازهى ثوباً . يألف المراعي ومجاري الماء . سربه قليل العدد . يراوح من ٦ الى ٢٤ .

٩٩٨٧ - دِرَّاس ، دِرَّس Battage (F).
Threshing (E). هو فصل الحب عن السنابل والقش .

٩٩٨٨ - دِرَّاس حَيْلِي Battage mécanique (F).
Mechanical threshing (E).

هو الدراس الآلي الذي يتم بواسطة المدرس .

٩٩٨٩ - دِرَّاع هو مرزة المناقع ، اطلبها .

٩٩٩٠ - دُرَّاق * ، دُرَّاقِين ، دُرَّاقِين ، فِيرْسِيك Persica vulgaris, Prunus persica, Amygdalus persica (S). Pêcher (F). Peach tree (E). Echter pfirsich (D).
Pesco, Persico (I).

شجرة مثمرة من الفصيلة الوردية . ضرورها الزراعية تفوق ١٣٠٠ جميعها من نباتات الاقاليم المعتدلة المنحرفة نحو الحارة || يقال ان مهدا كان الشرق والاربع الصين ومنهم من قال بلاد فارس وهي الآن منتشرة في جميع بلاد المعمورة || شجرتها تملو من ٢ الى ٨ امتار . جذورها وتدية ساقها فرعاء . فروعها منتصب . اوراقها متعاقبة معنقة ، اذينية ، نصلها رمحي الشكل ، ساد الزام الاخير ، جلي المروق ، منشاري الحافة . زعماتها الورقية والحشوية مستدقة ثنائية او ثلاثية التجميع . براعمها الثرية غليظة فردية . ازهارها وردية اللون او مرجانية تنور قبل الاوراق . ثمارها لحمية كروية الهيئة عديدة

النهار ، يتنقل على الارض كالدجاج ، لا يحتم على الاشجار الا في الليل ولا يطير الا عند الضرورة القصوى . طيرانه شاق عادم الرشاقة ، كثير الضجيج . قوته الجلود وبعض النباتات الدوفصية التي يلتهم بصلها || جسمه قريب الشبه بالحمام ، يطول نحو ٣٠ سم . رأسه معتدل الجرم . عيناه كبيرتان ناشزتان . حدقة عينه ياقوتية اللون . منقاده ضخم ، غليظ ، احجن البهرة . افكه الادنى مسنن الطرف الامامي . جناحه مقعران ، مستديرا الاطراف . ذنبه معتدل الطول ، شبه مقطوم الطرف . رأسه وعنقه وصدره وبطنه الى السواد الاخضر المواجه . رداؤه وسائر ظهره وذنبه الى السمرة الكستنية السفعاء . زفده وجفونه ومنقاده الى الصفار الوردية المواجه . ساقاه واصابعه الى الحمرة || يدثن افعوصه في التربة كالدجاج . الانثى تحضن من ١٦ الى ٢٠ بيضة . زمن الترخيم يستمر نحو ثلاثة اسابيع تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء .

٩٩٧٤ - دَدَنْقُولِيَّات Didunculidae (S).
Didunculidés (F), Didunculidae (E).

فصيلة طير من الحماميات . اجناسها المعروفة اثنان الددقنول والديس . طيورها قريبة الشبه من الحمام ومن الدجاج في آن واحد . شكلها الخارجي شكل الحمام باستثناء المنقار . اخلاقها وعاداتها وطريقة عيشها لا تختلف عن الدجاج . تعيش على الارض ولا تطير الا عند مسيس الحاجة وتبيت في الليل على مجاثم لا ترتفع عن سطح الارض اكثر من ثلاثة امتار || اجسامها ضخمة . مناقيدها كبيرة ، غليظة ، محججة . ارتفاع افافها العليا يفوق عرضها . افافها السفلى مسننة الاطراف الامامية . قوائمها شديدة النشط . اصابعها غليظة . مخالبها كبيرة ، ضليعة ، منعقة الاطراف . الذرية || اعرف اجناسها الددقنول اما الديس فقد انقرض منذ اكثر من قرنين .

٩٩٧٥ - دَرَّ ، إلبَّان Lactation
هو تكوين وافراز وابراز الحليب .

٩٩٧٦ - دُرَّابَة * Draba (S).
Drave, Draba (F). Withlow grass (E). Hunger blume (D). Draba, Drava (I).

جنس نباتات عشبية معمرة صغيرة القد من فصيلة الصليبيات . انواعه عديدة معظمها بري من نبات الاقاليم المعتدلة وبعضها تزييني . سوقها مدادة او منتصبه تعلو من ٥ الى ٣٠ سم . اوراقها ضمية صغيرة مستطيلة الشكل ، نصلها خفي البشرة . ازهارها عنقودي التجميع هامي الارتكاز . ازهارها بيض او صفر . اعرف واشهر انواعها ما يلي :

٩٩٧٧ - دُرَّابَة إِسْبَانِيَّة Draba mawi (S).
Drave de Maw (F).

٩٩٧٨ - دُرَّابَة بَنْفُسَجِيَّة Draba violacea (S).
Drave violette (F).

٩٩٧٩ - دُرَّابَة جَامِيَّة Draba rigida (S).
Drave rigide (F).

٩٩٨٠ - دُرَّابَة ذَهَبِيَّة Draba aurea (S).
Drave dorée (F).



ددنقول



درايه



دراج شائع



دراق



دُرَّاقَة



دُرْب



دُرْبَانَة مَنجَلِيَّة



دُرْبَانِي



دُرْبَس

الجُرم . عيناها صغيرتان . زباناها مشطيان عند الذكر ، خيطيان عند الانثى . جوشها ويطنبا الى الخنطى || روشناها الاماميان الى الخنطى الاكلف المواج تعلوه خطوط ورقشة وبعض النقط والبقع جميعها الى السرة . روشناها الخلفيان الى البياض التبي يشقر مع الاقتراب من الطرف وتعلوه خطوط متعرجة سمراء اللون || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في مطلع نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في اواخر تموز . تسرح في الليل ، تعاغل بعد ظهورها بنحو ثلاثة اسابيع . تمتح المكن على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرة عند بلوغها الكمال الجسموري تطول نحو ٢٢ مم . جسها شبه اسطواني الشكل ، ثنائي الشعول الجانبية . ثوبها الى الخنطى الاسمر يعلوه خط ثنجي احمر وتسعة خطوط متعرجة صفراء . ثوبها مطوقة بالاسود . مدنها ورواسجها الى السرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي ضمن صلجة تحببها السرة في شقوق لحاء الاشجار .

٩٩٩٩ - دُرْبَانِي * ، سُنْمَة Bos indicus (S). Zébu (F). Zebu, Humped cattle of India (E).

الابقار الدربانية جنس حيوانات لبونة من البقرات . واحدها درباني والجمع دراب . انواعها عديدة مهدها الهند . منها الابقار المقدسة التي لا تمس . اشكالها متباينة تتميز باستنساها الرفيعة التي تعلو الحواك . اثنائها فاتحة يغلب فيها اللون اثنجي . بعضها كبير الجثة مستطيل القوائم يضاهي الثور ويعلوه وبعضها صغير الجثة حجمه حجم النيس الكبير .

١٠٠٠٠ - دُرْبَانِيَّات ٥ Drepanidae (S). Drépanidés (F) Drepanidae (E).

فصيلة حشرات فراشية من رتبة حرشفيات الاجنحة . انواعها المعروفة نحو ٣٧٠ منتشرة في معظم اصقاع العالم . تسرح في الليل . طيرانها خفيف الحركة ، معتدل الشوط || اجسامها صغيرة ، قصيفة . رؤوسها معتدلة الجرم . عيونها كبيرة جرداء . قرونها الاستشعارية مشطية مزدوجة عند الذكور ، خيطية او مشطية بسيطة عند الاناث . ملامسها صغيرة . مرآشها قصيرة . بطونها سفية الحمل . حذانتها في جانبي السكة البطنية الاولى . رواشها صغيرة الحجم ، قليلة التخفيض ، تنسطة الاسترسال عند الراحة . جراسمها تامة النمر . ظنايبها الخلفية ثنائية المناخن القصيرة || اساريها عريضة ، مبعثرة الشعول ، عادمة الرواجب الشرجية . سكتها الشرجية تنتهي بسن قرنية المادة ، معتدلة الطول || خادراتها تلتحف بفياالج رقيقة النسيج || اشهر اجناسها الدربانة والسليكة .

١٠٠٠١ - دُرْبَة Bosse (F). Boss, Hump (E). سنام الثور اذا ارتفع عن الحاروك .

١٠٠٠٢ - دُرْبَجَة

الدرجة : انصياح اناث الطير للسفاد من درجت الحماه لذكرها . طاوعته للسفاد .

١٠٠٠٣ - دُرْبُس ٥ Drapetes (S). Drapetes (F). Drapetes (E).

جنس حشرات من فصيلة الكورانيات ورتبة غمديات الاجنحة انواعه المعروفة نحو ٩٠ معظمها من عظم المناطق الاستوائية والحارة || اجسامها صغيرة ، شبه اهليلجية الشكل ، تطول من ٤ الى ٨ مم . رؤوسها صغيرة ، قليلة النشور .

الاشكال والالوان والاحجام . جميعها قصيرة الاهن ، خلية او زباء القشور . لبانها غزير العصارة ، لذيذ الطعم : ذكي العرف والنكهة . نواتها بيضية الشكل ، صلبة ، قاسية ، كثيرة التثروات والتجاويف . برزتها لوزية مرة الطعم غنية ببعض الحوامض الجحالية . يرغب في الاتربة العميقة ، الحصبه ، الرغاب ، القليلة او المتوسطة الاندماج ، الغنية بالمواد الغذائية وبجميع العناصر المعدنية الرئيسية والثانوية والثلاثية . يخشى الرطوبة المستحكة والجفاف المضي . يفضل المعارض الجنوبية والغربية || يتكاثر بالبذر والتطعيم . وهو من النباتات السريعة النمو والاثمار التي تتطلب عناية خاصة ومستمرة ترتكز على التشذيب النظمي والتقليم الصحيح وعلى حسن معاملة التربة وتنظيم الري ومكافحة الحشرات والامراض الفطرية .

٩٩٩١ - دُرَّاقَة * ، دُرَّاقِيَّة Pêche (F). Peach (E).

ثمرة الدراق او الدراق . خصائصها المذاقية وميزاتها الصنفية واشكالها واحجامها والوانها عديدة . يفضل فيها اللباب الغزير العصارة ، اللذيذ الطعم ، الذكي العرف والنكهة .

٩٩٩٢ - دَرَّام

هو القنفذ ، اطلبه . وهو السنديان الاخضر ، راجعه .

٩٩٩٣ - دَرَّامَة Lièvre femelle (F). She hare (E). انثى القواع اي الارنب الوحشي .

٩٩٩٤ - دُرَّالَة ، دَرِيْن Fenasses

هي حطام الكلاء اليابس مع بقية الحب والعصافة تبقى في ارض المتبنة .

٩٩٩٥ - دُرْب * ، لِسَان Chirocentrus dorab (S). Chirocentre (F). Chirocentrus (E).

سمكة بحرية من فصيلة الصابوغيات . وحيدة الجنس والنوع كبيرة القد ، مستطيلة الشكل ، ذهبية اللون ، لذيلة اللحم . اعطانها البحر الاحمر والمحيط الهندي والاسترالي .

٩٩٩٦ - دُرْب التَّبَان Vole lactée (F). Milky Way (E).

درب التبان ودرب التبانة وباب السماء وشرح السماء جميعها تعني الهجرة . اطلب هجرة .

٩٩٩٧ - دُرْبَاب Geai lancéolé (F). Jay (E).

هو القيق اطلبه . قال في وصفه الدميري : « طائر مركب من الشفراق والغراب وذلك بين في لونه وهو كما قال ارسطاطاليس انه طائر يجب الانس ويقبل التأديب والتربية وغداؤه من التبت والفاكهة واللحم وغير ذلك ومألفه الفياض والاشجار الملتفة . »

٩٩٩٨ - دُرْبَانَة مَنجَلِيَّة ٥

Drepana falcatoria (S). Platypéryx faucille, Faucille (F). Drepana falcatoria (E).

حشرة من فصيلة الدربانيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها بعض اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط . فراشها جارية قوتها رحيق الازهار . سرفتها خاضعة قوتها اوراق الاشجار الحرجية || جسها صغير القد يطول نحو ٩ مم . بسطتها تراوح من ٢٢ الى ٣٦ مم . رأسها مستعرض

١٠٠٠٩ - دَرَجِيَّة ، دِيَارِيَّة (S). Diartema (F). Diartema (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الأرجل وفصيلة الكنبيات. أنواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد. أعطانها بعض مناطق المحيط الاطلسي اخصها بحار البلاد السكندرية || اصداؤها صغيرة، وشعبة الشكل، محزنة. فوهاتا قليلة الانفراج، ثلاثية الاضواج اللامتساوية التي تبدو كارجل البط شكلاً وحظاً.

١٠٠١٠ - دَرَج ، أَبَت (F). Graduer (F).
To graduate (E). قسم الى درجات.

١٠٠١١ - دَرَجَة (F). Degree (E).
اصطلاح تقني يستعمل في عدة علوم اخصها الهندسة والجغرافية والطبيعة.
١ - فالدرجة في الهندسة هي الوحدة القياسية المستعملة لقياس الزوايا والاقواس. الدائرة الكاملة تتكون من ٣٦٠ درجة. ربعها الذي يعتبر زاوية قائمة يتكون من ٩٠ درجة. وتقسّم الدرجة الى ٦٠ دقيقة والدقيقة الى ٦٠ ثانية.

ب - اما الدرجة في الجغرافية فهي الوحدة التي تقسم اليها خطوط الطول والعرض على سطح الكرة الارضية. ترسم خطوط العرض على هيئة ٩٠ دائرة موازية خط الاستواء شمالاً ومثلها جنوباً. وترسم خطوط الطول على هيئة انصاف دوائر تبدأ من خط صفر وهو الخط المار بكرينيتش الى خط ١٨٠ وهو المقابل له في نصف الكرة الغربي.

ج - والدرجة في الحرارة هي الوحدة التي تقسم اليها مسافة حرارية، ثابتة البداية والنهاية، تقسماً متساوياً كتقسيم المسافة بين تجدد الماء وغليانه الى مائة درجة. فنقطة التجمد تعرف بالصفر ونقطة الغليان بالمائة. هذا في المقياس المئوي المعروف، بالسنتيفراد || وهناك مقياس اخرى اقل شيوعاً واستعمالاً منها مقياس ريويمير الذي يقسم ذات المسافة الى ٨٠ درجة. ومقياس فارنهایت الذي يقسم ايضاً ذات المسافة الى ١٨٠ درجة مع العلم ان درجة صفر سنتيفراد تقابل درجة ٣٢ فارنهایت. وفي سبيل الايضاح نورد في الجدول التالي مقابلات درجات هذه المقاييس الثلاثة :

سنتيفراد	ريو مير	فارنهایت
٠	٠	٣٢
١	٠٤٨	٣٣٠٨
٢	١٠٦	٣٥٠٦
٣	٢٠٤	٣٧٠٤
٤	٣٠٢	٣٩٠٢
٥	٤٠٠	٤١٠٠
٦	٤٩٨	٤٢٠٨
٧	٥٩٦	٤٤٠٦
٨	٦٩٤	٤٦٠٤
٩	٧٩٢	٤٨٠٢
١٠	٨٩٠	٥٠٠٠
١١	٩٨٨	٥١٠٨
١٢	١٠٨٦	٥٣٠٦
١٣	١١٨٤	٥٥٠٤
١٤	١٢٨٢	٥٧٠٢
١٥	١٣٨٠	٥٩٠٠

يلحفها الكوسل. عيونها صغيرة. تأشيرها وملامسها نظامية. قرونها الاستشعارية خيطية. كواسلها مستطيلة، مقببة. اغدادها لاحفة، ضيقة المؤخر. قوائمها نشيطة. اثنائها ملونة، اكثرها ثنائي اللون || تألف الحراج والادغال. الحشرة الجمالنة واشعة ومخالصة. اليرقة دامت تعيش في الجلود النخرة.

١٠٠٠٤ - دُرَّة (F). Pearl (great) (E). Perl (grande) (F).
هي اللؤلؤة العظيمة. ج در ودر ودرات.

١٠٠٠٥ - دُرَّة (F). Rut des caprins (F).
Rut of caprine (E). - هي استمراء المعز.

١٠٠٠٦ - دُرَّة * (S). Psittacula (S).
Perruche (F). Parakeet (E).
جنس طير من فصيلة الببغاوات. انواعه عديدة. اثنائها متراكبة الالوان المختلفة الزاهية الجميلة. موطنها شاسع الارحاء يمتد من آسيا الى افريقية وامريكا || معظمها يقبل العلم لكنه يقتبسه بشقة وعناء خلافاً لجنس الببغاة السريعة الادراك والاقتباس.



دُرَّة

١٠٠٠٧ - دُرَّة الْبَحْر (S). Scarus purpurus (S).
Scare pourpré, Perroquet de mer (F). Parrot-wrasse (E).
سمكة بحرية من بنات مصفار موطنها المتوسط والاطلسي على حدود خط الاستواء. اجسامها مفلطحة اعليجية. اسنانها ملحومة. زعنفتها الظهرية مستطيلة شائكة. قلوبها مربعات ومستطيلات. ثوبها اشهب ارجواني يعبق مع ثبج الظهر || لحمها لذيد الطعم لكنه سام في بعض فصول السنة وذلك عندما يكون مرعاباً براغم المرجان.

١٠٠٠٨ - دَرَجِيَّة ثَلَاثِيَّة الْبُقْج *

Derthisa trimacula (S). Derthise trimaculée (F).
Derthisa trimacula (E).
حشرة من فصيلة الفسقيات ورثبة حرشقيات الاجنحة. موطنها بعض اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط. فراشتها جارية قوتها وحيق الازهار. سرقها ناهمة قوتها اوراق الزنايق وازهارها واسفاطها || جسمها متوسط القد، بطول نحو ١٤ مم. بسطتها نحو ٣٦ مم. رأسها مخروطي الشكل. عيناها كبيرتان. زباناها خيطيان عند الانثى، مشطيان عند الذكر. جوشها مستطيل البدة، تبني اللون اشقر الموج. بطنها كثيف النمل، حنطي اللون، اسمر الحيد، اشقر الموج || رواشنها، عند الشقين، الى التبي الاشقر الموج تعلوه في الزوج الامامي ثلاث بقع لامتساوية الحجم وثلاثة خطوط معترضة جميعها الى الحنطي الاسمر الموج. لها جيل واحد في الحول. تظهر الفراشة في اوائل آب وتبقى حتى اواخر ايلول. تسرح في الليل. تعاظم بعد ظهورها بنحو خمسة اسابيع وتمتص المكن لطخاً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق التي تلامس التربة || السرفة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ٢٨ مم. جسمها اسطواني الشكل، مالمس القشار، اسمر اللون تعلوه اربعة خطوط جانبية مزدوجة قاطبة من الامفر والجووي، وخط ثبجي امفر. رأسها اسود. مدبها اسمر || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينفضي في التربة حيث تنغم السرفة على عمق ٤ سم.



دَرَجِيَّة ثَلَاثِيَّة الْبُقْج

١٥٩٠٨	٥٦٠٨	٧١	٦٠٠٨	١٢٠٨	١٦
١٦١٠٦	٥٧٠٦	٧٢	٦٢٠٦	١٣٠٦	١٧
١٦٣٠٤	٥٨٠٤	٧٣	٦٤٠٤	١٤٠٤	١٨
١٦٥٠٢	٥٩٠٢	٧٤	٦٦٠٢	١٥٠٢	١٩
١٦٧	٦٠	٧٥	٦٨	١٦	٢٠
١٦٨٠٨	٦٠٠٨	٧٦	٦٩٠٨	١٦٠٨	٢١
١٧٠٠٦	٦١٠٦	٧٧	٧١٠٦	١٧٠٦	٢٢
١٧٢٠٤	٦٢٠٤	٧٨	٧٣٠٤	١٨٠٤	٢٣
١٧٤٠٢	٦٣٠٢	٧٩	٧٥٠٢	١٩٠٢	٢٤
١٧٦	٦٤	٨٠	٧٧	٢٠	٢٥
١٧٧٠٨	٦٤٠٨	٨١	٧٨٠٨	٢٠٠٨	٢٦
١٧٩٠٦	٦٥٠٦	٨٢	٨٠٠٦	٢١٠٦	٢٧
١٨١٠٤	٦٦٠٤	٨٣	٨٢٠٤	٢٢٠٤	٢٨
١٨٣٠٢	٦٧٠٢	٨٤	٨٤٠٢	٢٣٠٢	٢٩
١٨٥	٦٨	٨٥	٨٦	٢٤	٣٠
١٨٦٠٨	٦٨٠٨	٨٦	٨٧٠٨	٢٤٠٨	٣١
١٨٨٠٦	٦٩٠٦	٨٧	٨٩٠٦	٢٥٠٦	٣٢
١٩٠٠٤	٧٠٠٤	٨٨	٩١٠٤	٢٦٠٤	٣٣
١٩٢٠٢	٧١٠٢	٨٩	٩٣٠٢	٢٧٠٢	٣٤
١٩٤	٧٢	٩٠	٩٥	٢٨	٣٥
١٩٥٠٨	٧٢٠٨	٩١	٩٦٠٨	٢٨٠٨	٣٦
١٩٧٠٦	٧٣٠٦	٩٢	٩٨٠٦	٢٩٠٦	٣٧
١٩٩٠٤	٧٤٠٤	٩٣	١٠٠٠٤	٣٠٠٤	٣٨
٢٠١٠٢	٧٥٠٢	٩٤	١٠٢٠٢	٣١٠٢	٣٩
٢٠٣	٧٦	٩٥	١٠٤	٣٢	٤٠
٢٠٤٠٨	٧٦٠٨	٩٦	١٠٥٠٨	٣٢٠٨	٤١
٢٠٦٠٦	٧٧٠٦	٩٧	١٠٧٠٦	٣٣٠٦	٤٢
٢٠٨٠٤	٧٨٠٤	٩٨	١٠٩٠٤	٣٤٠٤	٤٣
٢١٠٠٢	٧٩٠٢	٩٩	١١١٠٢	٣٥٠٢	٤٤
٢١٢	٨٠	١٠٠	١١٣	٣٦	٤٥

اما عملية معادلة درجات المقاييس بين بعضها

فهي :

$$\begin{aligned} \text{درجة سنتيفراد} &= \frac{A}{1} \times \text{درجة ريومير} \\ \text{» » } &= \frac{1}{18} (\text{درجة فارنهيٲ-٣٢}) \\ \text{درجة ريومير} &= \frac{A}{1} \times \text{درجة سنتيفراد} \\ \text{» » } &= \frac{1}{18} (\text{درجة فارنهيٲ-٣٢}) \\ \text{درجة فارنهيٲ} &= \frac{1}{18} \times \text{درجة سنتيفراد} + ٣٢ \\ \text{» » } &= \frac{A}{18} \times \text{درجة ريومير} + ٣٢ \end{aligned}$$

١٠٠١٢ - درّجّة *، درّنجّة، فطيرة

Calidris (S). Sanderling (F).

طائر طويل الساق من الزقزقيات ووحيد الجنس والنوع
عديد القروب المنتشرة في جميع الاصقاع . جثته صغيرة
القد ، رجله ثلاثية الاصابع ، ثوبه وظاهر جناحيه الى
الغبرة المنمقة بالاسود باطنها الى السمرة الحالكة || يالف
الشواطىء وضفاف الانهار . قوته الحشرات وبعض
الاعشاب .

Francolin

١٠٠١٣ - درّجوح

هو الدراج اطلبه .

Edentés (F). Edentate (E).

١٠٠١٤ - درّد

هي الثرم رتبة من الثدييات .

١٠٠١٥ - درّدار

هو البقيصا ، اطلبه .



درّجّة

١٢٠٨	١٦
١٣٠٦	١٧
١٤٠٤	١٨
١٥٠٢	١٩
١٦	٢٠
١٦٠٨	٢١
١٧٠٦	٢٢
١٨٠٤	٢٣
١٩٠٢	٢٤
٢٠	٢٥
٢٠٠٨	٢٦
٢١٠٦	٢٧
٢٢٠٤	٢٨
٢٣٠٢	٢٩
٢٤	٣٠
٢٤٠٨	٣١
٢٥٠٦	٣٢
٢٦٠٤	٣٣
٢٧٠٢	٣٤
٢٨	٣٥
٢٨٠٨	٣٦
٢٩٠٦	٣٧
٣٠٠٤	٣٨
٣١٠٢	٣٩
٣٢	٤٠
٣٢٠٨	٤١
٣٣٠٦	٤٢
٣٤٠٤	٤٣
٣٥٠٢	٤٤
٣٦	٤٥
٣٦٠٨	٤٦
٣٧٠٦	٤٧
٣٨٠٤	٤٨
٣٩٠٢	٤٩
٤٠	٥٠
٤٠٠٨	٥١
٤١٠٦	٥٢
٤٢٠٤	٥٣
٤٣٠٢	٥٤
٤٤	٥٥
٤٤٠٨	٥٦
٤٥٠٦	٥٧
٤٦٠٤	٥٨
٤٧٠٢	٥٩
٤٨	٦٠
٤٨٠٨	٦١
٤٩٠٦	٦٢
٥٠٠٤	٦٣
٥١٠٢	٦٤
٥٢	٦٥
٥٢٠٨	٦٦
٥٣٠٦	٦٧
٥٤٠٤	٦٨
٥٥٠٢	٦٩
٥٦	٧٠



دردار السامرة



دردون التفاح




دردون مرجاني



دردون ناعظ



دردية



دردية

دردية

١٠٠١٦ - دردّار السامرة *

Ptelea (S).

Ptélee, Orme de Samarie (F). Ptelea (E).

جنس جنّيات وشجيرات برية وتربينية من فصيلة السذابيات. انواعه ستة تعلو من مترين الى ستة امتار. اوراقه مركبة، عابلة، وتربية التجميع، ثلاثية او خماسية التركيب. وريقاتها بيضية، زباء انضلع والعروق، راتنجية الرائحة. ازهاره عثكولي التجميع. ازهاره رباعية الانتظام. ثماره صغيرة مستطيلة مجنحة || اعرف انواعه الثلاثي الوريقات.

١٠٠١٧ - دردّار السامرة الثلاثي الوريقات

Ptelea trifoliata (S). Orme de Samarie à 3 folioles, Ptélee trifoliée (F). Hop tree, Shubby trefoil, Wafer ash (E). Pfennigbanner (D). Olmo di Samaria, O. a tre foglie (I).

نوع من دردّار السامرة بري ويزرع للتزيين. شجيرة تنمو نحو ٤ امتار. اوراقه مركبة طويلة الزناد ثلاثية الوريقات. ازهاره كثيرة العدد لونها الى البياض الاخضر عرفها قريب الشبه من عرف الجنجل.

١٠٠١٨ - دردّاريات هي البوقصيات، اطلبها.

Dryodon

١٠٠١٩ - دردّون جنس فطور من الابريات تعيش طفيلية على بعض النباتات الحرجية والزراعية فتؤذيها || اشهر انواعه الثلاثة التالية.

١٠٠٢٠ - دردّون التفاح *، أصبّه سيثوزة

Dryodon luteo-carneum, Acia setosa (S).

فطر من الابريات قليل الانتشار كبير الحجم قطر نكته يبلغ ٥ سم. وسماكتها نحو ١٠ سم. لونه يبدو اصفر كبريتي ثم ينحرف نحو الخنطي الزاهي. ابره السفلية مدلاة صفراء اللون || يتطفل على جذوع الاشجار المعمرة اذا كان فيها بعض الياس فيعطب الخشب مع اليافه وخلاياه ويحوّله الى مادة مرنة رخوة يقوّم منها عند لمسها رائحة مستحبة كرائحة الاليسون.

١٠٠٢١ - دردّون مرجاني *

Dryodon coralloides (S).

فطر من الابريات، يكثر وجوده في الخريف والشتاء يركب العروق والافصان والجذوع اليابسة في كل من الزان والتنوب والخور || مظهره الخارجي فطر متوسط الحجم والقدر. قصير الساق الغليظة، رمي التخت المتشعب المتراكب. نكته مستديرة مفلطحة تحمل على صفحتها السفلى بالاضافة الى ابرها الصغيرة المرصوفة ابراً دقيقة مستطيلة مدلاة لونها كالمرجان.

١٠٠٢٢ - دردّون ناعظ *

Dryodon erinaceus, Hericium erinaceum (S).

فطر من الابريات يركب جذوع السديان المعمرة ويرقى بمشيجه الى القلب بعد ان يعطب الخلايا والالياف الخشبية ويحوّلها الى تجاويف فسيحة || مظهره الخارجي فطر متوسط الحجم والقدر، قصير الساق الغليظة، مستدير التخت والنكته. نكته مغطاة السطح العلوي بوشاح خفي ابيض اللون ثم ينحرف الى الشبي تعلوه ابر دقيقة مستطيلة عاقرة. اما سطحها السفلي فرصوف بالابر الخصبه. بويقاتها شفافة مردنية او بيضية الشكل طولها من ٥ الى ١٢ ميكرون.

١٠٠٢٣ - دردي

Détrit (F). Detritus (E).

دردي الزيت وغيره : ما يبقى راسباً في اسفله من الكدر.

١٠٠٢٤ - درديّة

Levure elliptique (F).

Elliptical leaven (E).

من خاثر عصير العنب والنبيذ. تدعى الخميرة الاهليلجية.

١٠٠٢٥ - درديّة

Anodonta (S).

Anadonte (F). Anodonta (E).

جنس حيوانات مائية من الرخويات صفحيات الخياشيم وفصيلة النياحات. انواعها المعروفة كثيرة العدد منتشرة في معظم بحيرات وناقص العالم القديم || اصداؤها كبيرة القد او متوسطة، شبه قصبية الشكل، متساوية المصاريح، لامتناهية الاضلع. مفصلاتها عادمة الاسنان || تعيش في الاسمال. رقادها الشتوي يستمر من ١٦ الى ٢٠ اسبوعاً || لحومها مأكولة، مبهذلة الصنف.

١٠٠٢٦ - درر

Direction du vent (F).

Direction of wind, Weather-side (E).

الدردر جهة مهب الريح.

١٠٠٢٧ - دررّة، فرّفاة

Girouette (F).

Weathercock (E).

آلة او جهاز بسيط لا قياسي الشكل والحجم خفيف الحركة ينصب في موقع طلق يستعمل للدلالة على جهة مهب الريح.

١٠٠٢٨ - درر

Suture

خط الالتصاق او الانفصال المصراعي في الثمرة وغيرها.

١٠٠٢٩ - درزان *

Triguère ambrosie (F).

نبات عشبي حولي بري وزراعي من فصيلة البابونجيات مهدد بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط. تكثر زراعته الصناعية في جنوب اسبانيا حيث يستخرجون من بزوره مادة زيتية صناعية || ساقه منتصبه تعلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. اوراقه متعاقبة، بيضية النصل الازغب المفرض الخافة. ازهاره ابطية الارتكاز، فردية او ثنائية التجميع، خماسية البتلات اللامتنسمة. ثماره كعابر خماسية الغريفات تغلف العديد من البزور الرقيقة الكستنية اللون.

١٠٠٣٠ - درّس الوصاصة

Phyto-pathologie (F).

Phyto-pathology (E).

هو درس الامراض النباتية. علم يرتكز على بحث الالوصام وماهيتها وخصائصها واسبابها ومؤثراتها. لذلك فهو يتطرق الى اجابات عديدة اخصها البحث الميكولوجي والجسموري والفيزيولوجي والعلاجي والوقائي.

١٠٠٣١ - درسة

Dircaea (S).

Dircée (F). Dircaea (E).

جنس حشرات من فصيلة الشرهوفيات ورتبة غمديات الاجنحة. انواعها المعروفة قليلة العدد لا تتجاوز سبعة. اعطائها بعض حراج وغابات المناطق المعتدلة الحرارة والمنحرفة نحو الباردة || اجسامها مستطيلة الشكل، معتدلة التبليط، تعلو من ٧ الى ١٠ سم. رؤوسها مستعرضة، قليلة النشوز. عيونها صغيرة، بارزة. تأشيرها متوسطة القد. ملاسها كبيرة. قرونها الامتشارية صولجانية. كواسلها مقببة.

١٠٠٣٦ - دُرْسَة صَفْرَاء (F). Bruant jaune (F).
راجع صفح ٥.



درزان

١٠٠٣٧ - دُرْسَة صَفْرَاء العُنُق (F). Bruant ortolan (F).
عصفور من الدرس. اطلب ارطلان.



درسة

١٠٠٣٨ - دُرْسَة كَبِيرَة (F). Bruant proyer (F).
عصفور من الدرس مشهور باسم اكحل ، اطلبه.

١٠٠٣٩ - دَرْص

الدرص ولد القارة واليربوع والقنفذ والهرة ونحوها ج درصة
وادراس ودرصان ودروص والدرص هو جنين الاتان.

١٠٠٤٠ - دَرْعَاء

هي الشاة التي رأسها اسود وساثرها ابيض.

١٠٠٤١ - دَرْعَام *٥

Armadillo officinarum, Armadillidium vulgare (S).
Armadillo officinal, Armadille vulgaire (F).
Armadillo Wood-Louse (E).



درسة رمداء

دويبة من القشريات متساويات الارجل تنتمي الى فصيلة
الظرموطيات. موطنها البلاد الحارة والمعتدلة الحارة من العالم
القديم. كانت فيما مضى شائعة الاستعمال الطبي وتدخل
خاصة في علاج اليرقان || جسمها قليل الصلابة ، سلمي
التركيب ، محذب الصفحة العليا ، يتألف من ١٢ سكة .
يطول عند الذكر نحو ١٠ سم. ويطول عند الانثى نحو ١٦ سم
رأسها صغير الجرم ، مستعرض الشكل . عينها زرقاوتان .
متكها قاضم قارض . قرونها الاستشعارية اربعة منها اثنان
علويان ، مقوسان ، يتألفان من ٨ عقل . واثنان سفليان
يتألفان من ٤ عقل . جرامها سبعة ازواج صغيرة متساوية
الطول . شرجها ينتهي بزائدتين منعقتين || ثوبها العلوي
الى الطلحة القائمة ، مدها اغبر اسمر . تألف الاماكن
الرطبة اغصها الاقبيبة والمساكن الارضية . تسرح في الليل
وتبيت في النهار وتتكرر عند الشعور بالخطر . قوتها المواد
المعضوية المنحلة .



درسة سواد الرأس



درعام

١٠٠٤٢ - دَرْعَة (F). Fibre du palmier (F).
Fibre of palm-tree (E).
الدرعة ما اكتسى الليف من الجمار في النخل . ج درع .



درعوسة

١٠٠٤٣ - دَرْعُوسَة *٥ Phasianella (S).
Phasianelle (F). Phasianella (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل
وفصيلة المديعيات . انواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة
في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة || اصداقها
جميلة ، مزخرفة ، كبيرة القد ، واضحة الخلقة وسعة
الفوهة القلبية الشكل || اجسامها اهليلجية . رؤوسها
خماسية الزوائد المسنة الاطراف ، مستطيلة الاخطام
الخروطية الشكل ، ثنائية اللوامس المبيونة . لوامسها الجانبية
خيطية الشكل ، سداسية .



درفور

١٠٠٤٤ - دَرْفُور *٥ Doryphorus (S).
Doryphore (F). Doryphorus (E).

جنس حيوانات زحافة من العظائيات لحميات الالسة
وفصيلة الحرفونيات . النوع المعروف قليلة العدد ، اعطائها

الشكل . بطونها مستطيلة ، مدببة الطرف . اغمارها لاحقة
قوائمها نشيطة . اثارها ملونة ومبقجة || جميعها خاضلة
ودامة . يرقاتها شكاره وخاشبة .

١٠٠٣٧ - دَرْسَت حو الدرياس ، اطلبه .

١٠٠٣٨ - دُرْسَة الْقَصَبِ الْمُطَوَّقَة

Bruant des roseaux (F).

طائر من الشرشوريات مشهور باسم طربال مطوق ، اطلبه.

١٠٠٣٩ - دُرْسَة رَمْدَاء *٥ ، صُفْرَاءِ الشَّعِيرِ

السُّورِيَّة (S). Emberiza cineracea (S).

Bruant cendré, Bruant de Syrie, B. de Perse (F).
Cinereous Bunting (E).

عصفور من الدرس وفصيلة الشرشوريات . موطنه بلاد
الشرق الادنى واغصها ايران وسورية ولبنان || جسمه
مشوق . طوله نحو ١٧ سم. وبسطه نحو ٢٠ سم. ثوبه
الى الصفار الارمد الموج . رأسه وعنقه الى الصفرة الخضراء
تعلوها مشحة بنية . رداؤه وظهوه وصجزه الى الخضر الاصفر
الخطي الموج . جناحاه الى الربرة الطحلاء الخطية . ذنبه
الى الخضر الاسمر يحوقه وشم ابيض . زوره وصدره وبطنه
وايطلاه الى الصفار الارمد يعلوه في الصدر ترقيط اسمر .
عيناه مطوقتان بالاصفر . حدقة عينه كستنية اللون .
منقاده ورسغاه الى السمرة || الانثى اصفر قدأ من الذكر
وادكن ثوباً منه || يألف السهول والجبال والادغال والمراعي
والرياض . قوته الحشرات واساريها ويرقاتها والديدان
والبرور البرية || يدثن عشه في الادغال والسياجات على
ارتفاع ٤٠ او ٦٠ سم. عن سطح التربة . الانثى تحضن
من مرتين الى ثلاث مرات في العام . حضنتها نحو ٤
بيضات ترخها بمنابرة الذكر نحو ١٣ يوماً || يعتبر من
العصافير النافعة القليلة الاذى .

١٠٠٣٥ - دُرْسَة سَوْدَاءِ الرَّأْسِ *٥ ، صُفْرَاءِ

الشَّعِيرِ سَوْدَاءِ الرَّأْسِ

Emberiza melanocephala, Passerina melanocephala (S). Embérize à capuchon, Bruant mélanocéphale, Passérine mélanocéphale, Roi des ortolans, Crocote (F). Black-headed Bunting (E).

نوع من الدرس وفصيلة الشرشوريات . موطنه يمتد من
الهند الى اطراف اروبة . يعتبر من ضارب لبنان ، يقم
في ربوعه بعض الوقت || جسمه يطول نحو ١٨ سم. وبسطه
نحو ٢٢ سم. ثوبه الى الصفرة تعلوها ماجات مختلفة .
رأسه اسود . قفنه ورداؤه وظهوه وعجزه الى الكستني الاحمر
المواج . جناحاه الى البني الاحمر يغبر عند الاطراف .
ذنبه بني تلحفه ماجة كستنية . صدره وبطنه وايطلاه
وافنيكه الى الصفار الباهت يعلوه في الصدر فقطع موج
كستني لامع . حدقة عينه كستنية . منقاده ورسغاه الى
السمرة الخطية || الانثى اصفر قدأ من الذكر وادكن
ثوباً منه || يألف السهول والخصاب والجبال وكروم العنب .
تغريده زقزقة لطيفة || يدثن عشه في الادغال والسياجات .
الانثى تحضن مرة واحدة في العام . حضنتها تراوح من ٥
الى ٧ بيضات ترخها بمنابرة الذكر نحو ١٣ يوماً || قوته
الحشرات المختلفة والاساريح والديدان والبرور البرية .
يعتبر من العصافير النافعة القليلة الاذى .

الجملانة ابتداء من نيسان . تسرح في النهار . تسطو على زراعات الشوندر فتتغصم النصال وتشرمها || تسافد بعد ظهورها باربعة اسابيع وتباشر متع الممكن بعد الكوم بأسبوع وتستمر عليه نحو ثلاثة اسابيع ، وتلقيه مكنة مكنة تغمرها في التربة قرب اسناخ العوائل || ينقف الممكن بعد متحه بأسبوع فتتوجه البرقة منذ اليوم الاول نحو النبات العائل للاغتذاء . وهي سريعة النمو تبلغ الادراك بعمر ٢٢ او ٢٤ يوماً . جسمها اسفيني الشكل ، شبه مبعط الجرم . سكتها الشرجية مجهزة بـسركين صغيرين . لونها الى الكلبة السمر . طولها عند الادراك التام يراوح من ٢٢ الى ٢٥ مم طور الاكمال ينقضي في التربة ويستغرق من ١٠ الى ١٢ يوماً . والحشرة الجملانة تنغم في الجشالة او في التربة طول مدة البيات الشتوي الذي يستمر حتى اوائل نيسان .

١٠٠٥١ - دُرُقْدُون * Dorcadion (S).
Dorcadion (F), Dorcadion (E).

جنس حشرات من فصيلة القرنبيات ورتبة غمديات الاجنحة انواعه المعروفة نحو ١٥٠ اعطانها تمتد من اطراف الصين الى اطراف اوروبا . جميعها صغيرة القد او متوسطة . اطولها تراوح من ٨ الى ٢٤ مم . اثنائها مختلفة الالوان السوية تتفوق فيها السمرة ثم الطحلة ثم الصهبة ثم السواد وقد يعلوها تخطيط قاطب ابيض || تسرح في النهار . تظهر في اوائل الربيع وتبقى حتى اواخر الصيف . مرتعها ازهار النباتات الطوعية || يرقاتها مؤذية تعيش على جذور النجيليات ومنها القمح والشعير والشوفان والذرة ...

١٠٠٥٢ - دُرُقُس * ، عُنْطُوب الصَفْصَاف Dorcus parallelipipedus (S), Dorque des saules (F).
حشرة من فصيلة العنطوبيات ثوبها الى السواد الشاحب طولها من ١٥ الى ٣٠ مم . تسرح في الليل . يرقاتها خاشبة تركب كل ما هو يابس من اشجار الصفصاف || الحشرة الكاملة تظهر من نيسان الى تموز وهي من الحشرات النافعة التي تقتس الضارة .

١٠٠٥٣ - دُرُقْنَة ، دُرُقْنِي Vive petite (F).
سمكة بحرية تدعى ترخون صغير . اطلبها . اما درقني فهو الاسم الشائع في لبنان .

١٠٠٥٤ - دُرُقُوس * Odontaspis (S).
Odontaspe (F), Odontaspis (E).
جنس اسماك بحرية سرلودة من فصيلة الدرقوسيات ورتبة الاشلاق . انواعه المعروفة قليلة العدد ، منتشرة في معظم بحار العالم . جميعها كبيرة القد ، مفترسة ، شرسة ، بطاشة || اجسامها شبه وشية الشكل تطول من ٣٠٠ الى ٤٠٠ سم . اثنائها الى الطحلة الصفراء او الطحلة الحمراء تعلوها في بعض الانواع رشة سوداء . مسكها مغشي بحجف ثلاثية الاخاذيد ، قرنية المادة || رؤوسها كبيرة ، اسفينية الاخطام الذلقة . اشدانها مستعرضة . فكوكها السفلية متأخرة . اسنانها مستطيلة مخززية الشكل ، ذرية . عيونها كبيرة . نياسمها فلولج ضيقة قريبة من الحواجب || زعانفها الظهرية والبطنية والشرجية متماثلة . زعانفها الذيلية خارقة الطول ، ثنائية التقرين في الفلق السفلي || تعيش نحو ٤٠ سنة وتضع من مرة الى مرتين في الحول . اعرف انواعها واشهرها :

بعض مناطق امريكة الجنوبية || اجسامها قريبة الشبه بالفسب . رؤوسها متوسطة الحجم اعناقها قصيرة . اذنانها مستطيلة ، حرشة ، مخددة ومعقدة . اثنائها الى الزرقة العابقة يعلوها تجذيع معترض اسود . بطونها الى البياض الاغبر او الاصفر || تدفن الانثى بيضها في الرمل فينقف بعد ستة اسابيع . قوتها الحشرات والديدان والاعشاب والجذور .

١٠٠٤٥ - دَرَقَة ، سِيلْفَة Silpha (S).
Silphe, Bouclier (F), Silpha (E).
جنس حشرات من فصيلة الدرقيات . انواعه عديدة معظمها نافع وبعضها ضار يسطو على الشوندر والقرير وغيرها . ج درق || اشهر انواعه ما يليج .

١٠٠٤٦ - دَرَقَة الشَوَاطِي * ، نَكْرُود الشَط Necrodes littoralis (S), Silphe des rivages (F).
حشرة نافعة من الدرق . طولها نحو ٢٢ مم . كوتلها اسود لامع ، غمدتها الى الشبهة السمر . زباناها الى الصفار المذهب . تعيش قرب الشواطئ . يكثر وجودها في اثناء الصيف .


١٠٠٤٧ - دَرَقَة الشَوَندَر * ، دَرَقَة مُعْتِمَة ، سِيلْفَة الشَوَندَر Silpha opaca, Aclypea opaca, Blitophaga opaca (S).
Silphe des betteraves, S. opaque (F), Beetcarrion beetle (E), Buckelstreifiger, Rübenaskäfer (D).

حشرة مؤذية من الدرق . طولها نحو ١٢ مم . ثوبها الى السواد الحلي . تسطو على الشوندر والملفوف واللفت . تكافح باستعمال الحواشير الفعالة تعفيراً على النبات والتربة .


١٠٠٤٨ - دَرَقَة رُبَاعِيَة النُقَط Xylodrepa quadripunctata (S), Silphe à quatre points (F).
حشرة نافعة من الدرق . طولها نحو ١٢ مم . كوتلها اسود . ظهرها اصفر يعلوه اربع نقط سود . يكثر وجودها في احراج السنديان لانها تقتس يرقات الفاتلات وغيرها .

١٠٠٤٩ - دَرَقَة سَوْدَاء * ، سِيلْفَة سَوْدَاء Silpha obscura, Phosphuga atrata (S), Silphe noir (F).
نوع من الدرق وهي حشرة مؤذية تطول نحو ١٣ مم . ثوبها الى السواد اللامع . رأسها مستطيل الشكل . تسطو على شمائل الشيلك فتعطبها || تكافح باستعمال الحواشير التي لا تضر بالثمار .

١٠٠٥٠ - دَرَقَة مُشْبَكَة * Aclypea undata, A. reticulata, Blitophaga undata, B. reticulata, Silpha undata, S. reticulata (S).
Silphe réticulé (F).
حشرة خاضلة مؤذية من فصيلة الدرقيات . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا الوسطى والشمالية . اعطانها اللبانية محصورة ببعض مناطق البقاع . تألف المواقع التي تكثر فيها زراعات الشوندر . خنافسها ويزقاتها تسطو على الاوراق فتؤذيها || جسمها متوسط القد ، منقطع الشكل ، يطول من ١٢ الى ١٤ مم . ثوبها الى الكستني الشديد السمرة . رأسها مستعرض القاعدة يغور بمعظمه تحت الكوسل . ازارها مغروض المقدم . زباناها صولجانيان . فكاهما نشيطان || الانثى اميز قدماً من الذكر وأغلظ بطناً منه واقصر زبانا . لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة



دَرَقَة الشَوَاطِي *



دَرَقَة الشَوَندَر



دَرَقَة رُبَاعِيَة النُقَط



دَرَقَة سَوْدَاء




دَرَقَة مُشْبَكَة



دُرُقْدُون



دوقس



دوقس



دوقلة



دركتوم الصوفان



دركه

١٠٠٦٠ - دُرُقُوسِيَّةٌ *، خَشَبُوس

Dirca palustris (S). *Dircé*, Bois de cuir, B. de plomb (F). *Leather wood* (E). *Lederholz*, *Lederbaum* (D). *Legno di cuoio*, *Legno di piombo* (I).

جنبة برية وحيدة الجنس والنوع من فصيلة المازريونيات . مهدها مناطق امريكة الشمالية وكندا . تعلق نحو ١٥٠ سم . أوراقها عابلة ، بيضية ، خلية النصل ، طولها نحو ٨ سم . وعرضها ٤ . أزهارها زنادية منحنية ، لونها الى الصفرة . خشبها رخو لدن . قشورها ثنية الطي متينة كالجلد تستعمل في صناعة الخبال .

١٠٠٦١ - دُرُقُوسِيَّةٌ ٥

Darluca جنس فطور مجهرية من فصيلة الصفييات . بكثافتها كروية ، ضمية التجسيم ، حنطية اللون ، ناعمة الملمس . بوبنتها مخروطية ، مستطيلة ، ثنائية الخلايا يعلوها من جهتي استطالها كشة من الحلب الشفاف || انواعها قليلة واضرارها كذلك .

١٠٠٦٢ - دِرْلِيد ٥

Dorylides (F). *Dorylides* (E). جنس نمل افريقي جوال . ذكوره مجنحة ، انثاه عديمة الجناح . انواعه المعروفة نحو ٢٠ اشهرها الدرينين .

١٠٠٦٣ - دِرْلِين ٥

Dorylus (S). *Doryline* (F). *Doryline* (E). نوع من النمل الافريقي الجوال ينتمي الى جنس الدريليد . قافلته ، عند انتقاله من مكان الى مكان تعد عدة ملايين وتنساب كانبوب اسود قطره من ٢٥ الى ٤٠ سم . وطوله يراوح من ١٠٠ الى ٣٠٠ م . فتقضي على كل شيء يعترض سبيلها ولا تعف عن الحيوان والانسان اذا كان غافلاً او نائماً .

١٠٠٦٤ - دَرَمَاء

الدرماء نبات سهلي دسقي ليس بشجر ولا عشب ، ينبت على هيئة الكبد وهو من الحمض . وقال ابو حنيفة : لها ورق احمر . وقال مرة : ورقها اخضر ولها نور احمر وهي تشبه الحلمة . (اللسان) .

١٠٠٦٥ - دَرَمَاءٌ ، حَمِيَّة

Charnua (F). *Fleshy*, *Pulpy* (E). نمت ثمريني يستعمل للدلالة على كثرة اللحم في بعض الاعضاء الحيوانية وعلى غزارة اللباب في بعض الثمار .

١٠٠٦٦ - دِرْمَتُوز ٥

Dermatose (F). *Dermatosis* (E). اسم يطلق على جميع الامراض الجلدية منها كان سببها .

١٠٠٦٧ - دُرُقُوس ٥

Dromia (S). *Dromle* (F). *Dromia* (E). جنس دوبيات بحرية من القشرييات عشاريات الارجل ، قصيرات الذيل ، حاملات القوائم وفصيلة الدرموسيات . انواعه المعروفة نحو ١٢ اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة يكثر وجودها حيث يكثر الاسفنج لانها تعيش بين شعابه || اجسامها صغيرة القد ، منعية الشكل ، كثيفة الحلب الدقيق . قوائمها قصيرة ونشيطة ، الزوجان الخلفيان رفيحا الارتكاز الذي يبدو بمستوى سطح الظهر وهما مجهزان بملاقط ثنائية الاصابع ، مسننة الاطراف || اعرف انواعه واشهرها الدرموس المبلول (*D. vulgaris*)

Odontaspis taurus (S).

الدوقس الثوري

Odontaspis ferox (S).

الدوقس الشكس

١٠٠٥٥ - دُرُقُوسِيَّات ٥

Odontaspidae (S). *Odontaspides* (F). *Odontaspidae* (E).

فصيلة اسماك بحرية سرلودة مفترسة من السنفقيات ورتبة الاشلاق . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . اعطانها جميع بحار العالم . مسرحها يمي ، لا تقترب من النفاث والمجادح الا في بعض الحالات الخاصة || اجسامها وشمية تطول من ٣٠٠ الى ٤٥٠ سم . اثوابها تختلف مع الاجناس والانواع . رؤوسها شبه مخروطية الشكل . اشداقها كبيرة . اسنانها مستطيلة ، ذرية || تتميز بخلو زعانفها الذيلية من الاتحاديد البارزة وبالمساواة في الحجم بين الزعانف الظهرية الامامية والخلفية ، وباستطالة الزعانف الذيلية || اناتها معتدلة النشار ، تضع من ٣٥ الى ٤٥ بجرراً . اشهر اجناسها الدوقس .

١٠٠٥٦ - دُرُقُوسِيَّةٌ *

Pristiurus melanostomus (S). *Pristiure bardoulin* (F).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة السليديات . اعطانها البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي || جسمها وشبي الشكل يطول من ٨٠ الى ١٠٠ سم . ثوبها الى الشبهة الحمراء الموج تشدد حمرة وتسمر في الظهر وتنقلص في البطن . ابطلاها مبقعان بالاسمر الحادق . رأسها اسفني الشكل . عظمها ذلق مستطيل . فها سفلي الارتكاز . فكها الاسفل صغير الحجم ، مقوس الختار . شدقها معتدل الانفراج || تتميز بزعنفتها الذيلية الحارقة الطول ، الشائكة الحافة العليا . لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

١٠٠٥٧ - دَرَقِيَّات

Silphidae (S). *Silphidés* (F). *Silphidae*, *Carrion beetles*, *Burying beetles* (E). *Aaskäfer* (D).

فصيلة حشرات من رتبة غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها عديدة معظمها نافع وبعضها ضار . جميعها دائنة متوسطة او كبيرة القد ، قليلة الاحديداب ، مخددة او ملساء الاغمدة . زباناها مركبة من ١١ فاصلة . فواصلها الطرفية مفلطحة دبوسية الشكل || الانثى تتمتع مكنها في جثث الحيوانات والطيور والافاعي فينتقف عن يرقات تعيش اول عهدها في صديد المواد العضوية السائرة الى الانحلال .

١٠٠٥٨ - دُرُقُوسُوم ٥

Dorcatoma (S). *Dorcatome* (F).

جنس حشرات نحاشبة من فصيلة الغفريات انواعه نحو ٢٠ منتشرة في جميع بلاد العالم . جميعها صغيرة القد . اجسامها ترسية الشكل مفلطحة . اثوابها الى السمرة . قرونها الامتشارية مروحية مركبة || يرقاتها تعيش على الفطور والاشخاب الميتة . اشهر انواعها دركتوم الصوفان .

١٠٠٥٩ - دُرُقُوسُومُ الصُوفَان * ٥

Dorcatoma chrysomelina (S). *Dorcatome des polypores* (F).

حشرة من الدركتوم طولها نحو ٢ سم . ثوبها الى السمرة الفحمية الموج . زباناها مروحية فرعاء . يرقاتها تعيش على الفطور اخصها الصوفان .

١٠٠٧٤ - دَرَنَّةُ أَزُونِيَّة (Nodosité(F). Nodosity(E).
الدرنات الازونية عقد صغيرة القد مستديرة الشكل تعلو
جذور معظم النباتات القطانية . وظيفتها امتصاص
وخزن ازوت الهواء . وقد يتم ذلك بواسطة الجراثيم الحية
المائشة في هذه الدرنات .

١٠٠٧٥ - دَرَنَسَةُ (Murmidius (S).
Murmidius (F). Murmidius (E).
جنس حشرات من فصيلة الدرنسيات ورتبة غمديات
الاجنحة . انواعها المعروفة ثلاثة اعطائها الاصلية بعض
مناطق البلاد الحارة وقد اصبحت الآن من الحشرات العكاظية
الموجودة في معظم عتابر مرقا العالم || اجسامها صغيرة
تطول من ٢ الى ٣ سم . رؤوسها مكورة . عيونها بارزة .
تأثيرها وفكوكها ضليعة . قرونها الاستشعارية خيطية ،
قصيرة . كواسلها مستعرضة ، محدبة . اغمادها لاحفة
مستديرة الطرف . قوائمها نشيطة . اثوابها الى الجؤوة ||
الحشرة الجمالنة قرضابة . اليرقة حابية يكثر وجودها على
الارز المكسور او المعطوب .

١٠٠٧٦ - دَرَنَسِيَّات (Murmidiidae (S).
Murmidiidés (F). Murmididae (E).
فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها
المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة ||
اجسامها صغيرة ، شبه اسطوانية الشكل ، تطول من ٢
الى ٥ سم . رؤوسها مكورة . عيونها بارزة . تأثيرها وفكوكها
نظامية . قرونها الاستشعارية خيطية ، قصيرة ، عشارية
الفصل || كواسلها مستعرضة . اغمادها لاحفة . قوائمها
نشيطة . ارساغها رباعية العقل . اثوابها ملونة || حشرات
الجمالنة قرضابة . يرقاتها حابية تثقب الحبوب وتنخرها
وتعيش على محتوياتها || اشهر اجناسها الدرنسة .

١٠٠٧٧ - دُرُنُوقُ ، دَرُونِكُ ، دَرُونَج (Doronicum (S). Doronic (F). Doronic (E).
جنس نباتات عشبية جذمورية معمرة من فصيلة المركبات
الشعاعية . انواعه عديدة بعضها حشولي الجذور . اوراقه
متعاقبة ، السفلية منها معنقة والعلوية حاضنة . ازهاره هامية
الارتكاز يكثر فيها اللون الاصفر || اعرف انواعه واشهرها
ما يتبع .

١٠٠٧٨ - دُرُنُوقُ بَلْقَانِي (Doronicum wulfenianum (S). Doronic de Wulfen (F).
Wulfen doronic (E).
نوع من الدرنوق البري والتريبي . ضروريه عديدة .
مهده الشرق الاوسط والبلقان . يعلو من ٢٠ الى ٦٠ سم .
اوراقه السفلى صغيرة القد ، قلبية ار كلوية الشكل ،
دقيقة العنق . الوسطى كبيرة قلبية حاضنة . ازهاره هامية
لا قياسية التجميع . قطر الزهرة نحو ٤ سم . لونها الى
الصفار الذهبي الزاهي || ازهاره يستمر من ايار الى
تموز .

١٠٠٧٩ - دُرُنُوقُ خَائِقِ النَّمِر * ، خَائِقِ النَّمِر (Doronicum pardalianches, D. cordatum (S). Doro-
nic tue-panthère, Herbe aux panthères (F). Leo-
pard's-bane, Panther strangler (E). Echte gemswurz,
Leopardenwurz (D). Doronico sospetto (I).
نوع من الدرنوق البري والزراعي التريبي يعلو من ٣٠
الى ٨٠ سم . ساقه زباء . اوراقه السفلى معنقة كثيرة التفريض
اما الوسطى فحاضنة وعريضة الاذينات . ازهاره هامية

الذي يميل في البحر الابيض المتوسط والذي يشاهد قرب
الشطوط عند الانقلاب الصيفي اي في زمن التمرة عند
الاناث .

١٠٠٦٨ - دُرْمُوسِيَّات (Dromiidae (S).
Dromiidés (F). Dromiidae (E).

فصيلة دوبيات بحرية من القشريات عشاريات الارجل ،
قصيرات الذيل ، حاملات القوائم || اجناسها وانواعها
المعروفة متوسطة العدد اعطائها بحار البلاد الحارة والمتدلة
الحارة || اجسامها صغيرة القد ، مربعة الشكل او
مستطيلة . تتميز بقصر قوائمها وبارتفاع الخلفية منها الى
مستوى سطح الظهر || اشهر اجناسها الدرموس .

١٠٠٦٩ - دَرْمِيَّت (Dermite (F). Poll-eil (E).
مرض البشر الساري يصيب الخيل والبقر .

١٠٠٧٠ - دَرْمِيْس (Dendromys (S).
Dendromys (F). Dendromys (E).

جنس حيوانات لبونة قاضمة من فصيلة الفأريات . انواعه
المعروفة سبعة موطنها بعض اقاليم افريقية الاستوائية والحارة ||
اجسامها صغيرة تطول من ٢٢ الى ٢٦ سم . رؤوسها شبه
مخروطية الشكل . سبالها كثيفة . اذانها شبه مستديرة .
اثوابها الى الرتبة الشهباء تغبر وتبيض في البطن . ظهورها
من القفن الى قاعدة الذيل سوداء الخط الشجي || تتسلق
الاشجار بخفة ومهارة . قوتها البرور والثار والبراعم والجذور .
اناثها تضع من ٤ الى ٥ مرات في الحول وكل مرة من ٤
الى ٥ ادراس تبصر النور بعد اسبوع .

١٠٠٧١ - دَرْنَس (Dentex (S).
Denté (F). Dentex (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الاسبوريات ورتبة شائكات
الزعانف || انواعها المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في معظم بحار
العالم . اجسامها كبيرة او متوسطة القد ، مستطيلة الزعانف
الظهرية والشرجية ، فارقة الزعانف الذيلية . اثوابها الى
الرتبة الرصاصية السفعاء المواج || جميعها بطاشة قوية
الاسنان الذرية || اشهر انواعها واعرفها الدرناسة الشائعة
لنو: المبدولة .

١٠٠٧٢ - دَرْنَسَة مَبْدُولَة * (Dentex vulgaris (S). Denté commun (F).
Sea rough (E).

نوع من الدرناس . سمكة بحرية بيوض من الاسبوريات .
اعطائها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط . تعتبر من
اسماك المياه الاقليمية || جسمها اهليلجي الشكل يطول
من ٦٠ الى ٨٠ سم . ثوبها يتبدل مع العمر ركيزته الشبيهة
يعلوها تمشيع اخضر ثم احمر ارجواني . رأسها كبير الجرم ،
قصير الخطم . شذقها معتدل الانفراج . فكها متعادلان .
اسنانها ثلاثية الصفوف . عيناها متقاربتان ، ناشرتان .
اعكاسها الخيشومية ثلاثية الاسقاط . زعنفتها الظهرية سنامية
الشكل . زعنفتها الصدرية رمجية حمراء اللون . زعنفتها الذيلية
هلالية الشكل حمراء الختار || لحمها متوسط الصنف ،
مأكول .

١٠٠٧٣ - دَرَنَّة ، عَسَقَل ، عَسَقُول (Tubercule (F). Tubercle (E).

كل جزء نباتي مصدره الساق او الجذر منتفخ الشكل
لبابي التركيب يدخر بعض المواد الغذائية .



درميس



درناسة مبدولة



درونوق خائق النمر

الارتكاز ، شفعية التجميع ، قطرها نحو ٥ سم. لونها الى الصفرة الذهبية . بزوره سود . يقال انه من الاعشاب السامة التي تقتضي على الحيوانات المفترسة || ازهاره يستمر من حزيران الى آب . يرغب في المعارض الشمالية لانه يخشى الشمس .

١٠٠٨٠ - دُرُنُوقٌ عَقْرَبِيٌّ* ، دُرُنُوقٌ كَبِيرُ الزَّهْرِ

Doronicum scorpioides, *D. grandiflorum* (S). *Doronic scorpioides*, *D. à grandes fleurs* (F). *Scorpioid doronic* (E). *Alpengemswurz* (D). *Doronic italiano*, *Falso doronic* (I).

نوع من الدرنوق التزييني يعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. ارومته سكرية الطعم . ساقه قليلة الزغب . اوراقه مقطوعة القاعدة . نصلها قليل التفريش مسن الحافة . ازهارها ذهبية اللون ، كبيرة القد ، قطرها نحو ٦ سم. ازهاره يستمر من حزيران الى ايلول . يرغب في الاتربة المندجة المتوسطة الرطوبة . يخشى المعارض الجنوبية الكثيرة الشمس .

١٠٠٨١ - دُرُنُوقٌ قَلْبَقَازِي

Doronicum orientale (S). *Doronic du Caucase* (F). *Oriental doronic* (E).

نوع من الدرنوق البري والتزييني مهده بلاد القفقاز . يعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. ساقه قوية قليلة الزغب . اوراقه السفلى مستديرة القاعدة معنقة اما الوسطى فقلبية حاصنة . ازهاره فردية التجميع قطرها نحو ٥ سم. لونها الى البرتقالي || ازهاره ربيعي . يرغب في الاتربة المندجة التي لا تقتصر الى الكلس والرطوبة .

١٠٠٨٢ - دُرُنُوقٌ مَجْرِي

Doronicum austriacum (S). *Doronic d'Autriche* (F). *Austrian doronic* (E).

نوع من الدرنوق يعلو من ٥٠ الى ١٥٠ سم. ساقه لا عكيس لها . اوراقه بيضيه الشكل ، قلبية القاعدة ، مدببة المقصبة ، مستديرة الاذينات . ازهاره الى الصفرة البرتقالية . قطرها من ٥ الى ٦ سم || يزرع للتزيين . يرغب في المعارض الشمالية والمواقع الرطبة . ازهاره يستمر من تموز الى آب .

١٠٠٨٣ - دُرُنُوقٌ مَزْمَارِي*

Doronicum plantagineum (S). *Doronic-plantain* (F). *Plantain-doronic* (E).

نوع من الدرنوق عديد الضروب . يعلو من ٣٠ الى ١٥٠ سم. اوراقه السفلى والوسطى بارزة العروق كاوراق لسان الحمل . ازهاره وثرية التجميع ، فردية او ثلاثية قطرها نحو ٤ سم. لونها الى الصفار الزاهي || يزرع للتزيين . يرغب في الاتربة المتوسطة الرطوبة والاندماج || ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

١٠٠٨٤ - دَرَنِيٌّ ، مُدَرَنِيٌّ

Tuberculeux (F). *Tubercular* (E).

ما كان شكله كالدرنة .

١٠٠٨٥ - دُرُوَاسٌ

Chien à grosse tête

الدرواس ج درواس : الكبير الرأس من الكلاب .

١٠٠٨٦ - دُرُوَكُولِي*

Nyctipithecus (S). *Douroucoulî*, *Singe de nuit* (F). *Douroucoulî* (E). *Mirikina* (D).

جنس قروود امريكية من فصيلة السبوسيات . انواعه ٥ موطنها يمتد من البرازيل الى الكيرو || اجسامها صغيرة

القد ربعة . رؤوسها مستديرة . قوائمها قوية ، اصابعها طويلة . اذنانها شديدة الطول . اثوابها سوية الالوان تكثر فيها الربدة . وجوهها بيض الجهة والحدود . شعورها ناعمة قصيرة وثرية . اذنانها جشلة || تألف الاحراج والغابات الرطبة الظليلة . موطنها الاشجار . مسرحها دجوي يستمر من الغروب الى انبلاج الفجر . قوتها الحشرات والعصافير والثمار .

١٠٠٨٧ - دُرُونِيَّةٌ*

Diervillea (S). *Diervillé* (F). جنس نباتات معقودة اهوية على اسم العلامة النباتي (Dierville 1708) . انواعها نحو ١٠ جميعها جنبات معمرة برية وتزيينية من فصيلة الهليانيات . اوراقها متقابلة ، عابطة ، مستنة النصل . ازهارها قمية او جرسية الشكل خماسية التفريش || اشهر انواعه ما يلي .

١٠٠٨٨ - دُرُونِيَّةٌ عَدِيدَةُ الزَّهْرِ

Diervillea florida (S). *Diervillé multiflore* (F).

نوع من الدرونيلة مهدها الصين . ضروبها عديدة تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها معنقة بيضيه . نصلها ازغب الصفحة السفلى مسن الحافة . ازهارها كثيرة العدد وثرية التجميع . قطر الزهرة نحو ٢ سم. لونها يختلف مع الضرب منها الابيض والاحمر والارجواني والموشح بالاصفر || ازهارها يدوم من ايار الى حزيران .

١٠٠٨٩ - دُرُونِيَّةٌ كَبِيرَةُ الزَّهْرِ

Diervillea grandiflora (S). *Diervillé à grandes fleurs* (F).

نوع من الدرونيلة مهدها اليابان تملو من متر الى مترين اوراقها اهليلجية ذلقة الزام الاخضر . نصلها خلي العروق مسن الحافة . ازهارها وثرية التجميع كبيرة القد قطر الزهرة نحو ٤ سم. لونها الى الوردي الزاهي . ازهارها يدوم شهراً واحداً ينتدئ في اواخر ايار .

١٠٠٩٠ - دُرُونِيَّةٌ كَنْدِيَّةٌ

Diervillea canadensis (S). *Diervillé du Canada* (F).

نوع من الدرونيلة مهدها كندا . ضروبها عديدة . تملو نحو ١٥٠ سم. اوراقها بيضيه الشكل مدببة المقصبة . نصلها مالمس البشرة مسن الحافة . ازهارها صفر . قطر الزهرة من ١ الى ٢ سم || ازهارها يدوم من حزيران الى تموز .

١٠٠٩١ - دُرُونِيَّةٌ لَاطِئَةٌ

Diervillea sessilifolia (S). *Diervillé à feuilles sessiles* (F).

نوع من الدرونيلة مهدها امريكة الشمالية تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها وفروعها زغبية اللحاء . اوراقها لاطئة . ازهارها نورية التجميع هامة الارتكاز لونها الى الصفرة الكبريتية || ازهارها يدوم من تموز الى آب .

١٠٠٩٢ - دُرُونِيَّةٌ يَابَانِيَّةٌ

Diervillea japonica (S). *Diervillé du Japon* (F).

نوع من الدرونيلة التزيينية مهدها اليابان تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها بيضيه الشكل نصلها خلي الصفحة السفلى ازغب العليا . ازهارها وثرية التجميع ، صغيرة القد ، بيضاء اللون || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

١٠٠٩٣ - دُرُونِيَّةٌ

Darwinia (S). *Darwinie* (F). جنس نبات من فصيلة الآسيات معقود اهوية على اسم العلامة دروين . انواعها المعروفة ٢٠ مهدها شرقي استرالية



دُرُنُوقٌ عَقْرَبِيٌّ



دُرُنُوقٌ مَزْمَارِي



دُرُوَكُولِي



دُرُونِيلَة

يزرع في المراكن داخل البيوت . ازهاره يدوم من شباط الى آذار .

١٠١٠٦ - **دُرَيْقَة مُوسَّحَة** (S). *Aspidistra elatior* (S).
Alpidistre panaché (F).

نوع من الدريقة اوراقه كبيرة القد مرشحة تطول من ٤٠ الى ٦٥ سم. وتعرض نحو ١٠ . ازهاره ارجوانية عابقة الوسط زاهية الاطراف || يزرع في المراكن داخل البيوت . ازهاره يدوم من آذار الى ايار .

١٠١٠٧ - **دَرِيْمَة ٥*** (S). *Piptanthus* (S).
Piptanthe (F). Piptanthus (E).

جنبه معمرة تزيينية من فصيلة السنفليات . ساقها منتصبه تملو نحو ثلاثة امتار . اوراقها عابله ، مركبة ، ثلاثية الوريقات . نصالها ستانية الشكل ، خلية الصفحات السفلى ، تطول نحو ٨ سم. وتعرض نحو ٢ سم. ازهارها عنقودي التجميع . طرفي الارتكاز . ازهارها كبيرة القد ، صفراء اللون ، قليلة العرف || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

١٠١٠٨ - **دَرِيْمُس ، دريميد** (S). *Drimys* (S).
Drimyde (F).

جنس نباتات برية طبية وزراعية تزيينية من فصيلة المغنوليات . انواعه ستة مهندها بعض الاصقاع الامريكية من المكسيك الى مضيق مجلان . جميعها اشجار وشجيرات دائمة الخضار جميلة الازهار . اوراقها طيبة . قشورها عطرية الرائحة يستخرج منها مادة راتنجية عديدة المنافع مقوية ومنهضة كما تستعمل في مكافحة داء الحفر . اشهر انواعه دريمس مجلان .

١٠١٠٩ - **دَرِيْمُس مَجْلَان * ، قَرْفَة كاذبة** (S). *Drimys winteri* (S). *Drimyde de Winter*, D. de Magellan, Fausse cannelle (F). Winter's bark, Winter's cinnamon (E). Wintersgewürzrinde (D). *Drimis di Winter* (I).

نوع من الدريمس الطبي والتزييني . شجيرة تملو من ٣ الى ٤ امتار . اوراقه زاهية الخضار . ازهاره بيض يملوها موج وردي || اوراقه وقشوره طيبة مقوية منهضة .

١٠١١٠ - **دَرِين** (F). *Fenasses* (F).
هو الدرائنة . قال عمر بن كلثوم ، الدرين : « حطام المرعى اذا قدم وهو ما يلي من الحشيش وقلم تلتفع به الابل . »

١٠١١١ - **دُرَيْقَة** (S). *Nodule*
هي الدرة الصغيرة القد .

١٠١١٢ - **دُرَيْوْب باهت ٥*** (S). *Dryops luridus* (S).
Dryop pâle (F). *Pallid dryops* (E).

حشرة مائية قانصة من فصيلة الدريوبيات ورتبة مفدمات الاجنحة . تألف المناقع ومجاري الماء . خنافسها وورقاتها تعيش في الماء قوتها الحشرات الدنيا والاوليات || جسمها صغير القد يطول نحو ٥ سم. ثوبها الى الشقحة السمره يملوها موج اكلس وخل دقيق كثيف يدفع الرزغ ويمنع البلل . رأسها يرسمي الشكل . عينها صغيرتان ، بارزتان . زباناها مركبان ، منشعبان . ظهرانها معتدل الاحديداب .

جميعها جنات وشجيرات معظمها بري وبعضها تزييني . اعرف انواعها التزيينية ثلاثة الارجوانية والسعترية واليمونية .

١٠٠٩٤ - **دُرَيْيَاس * ، دُرُوس ، دَرَسْت ، إدرياس** (S). *Thapsia gargarica* (S).

Thapsie, Faux fenouil, Faux turbith (F). *Drias plant*, Smooth thapsia (E). Falsche turbith (D). *Tassia*, Turbitto di Puglia (I).

نبات عشبي بري طبي معمر من فصيلة الخيميات مهنده حوض البحر المتوسط . اوراقه مركبة ريشية . ازهاره بيض . يستخرج من جذوره عصارة راتنجية نافطة ومهيجة تستعمل في بعض المستحضرات الطبية ذات الاستعمال الخارجي .

١٠٠٩٥ - **دُرَيْيَجَة** (S). *Sanderling*
راجع درجة .

١٠٠٩٦ - **دَرِيخَة** (F). *Marcotte* (F). *Layer* (E).
القضيب الذي يعكس ويرقد .

١٠٠٩٧ - **دُرَيْدَار أَبْيَض** هو الدقنون ، اطنبه .

١٠٠٩٨ - **دَرِيْس** (F). *Queue de chameau* (F).
هو ذنب البعير .

١٠٠٩٩ - **دُرَيْس** هو الاسطراغالوس القزي ، اطنبه .

١٠١٠٠ - **دَرِيْس** (S). *Derris* (S).
Derris, *Deguëlle* (F). *Derris* (E).

جنس جنات برية وزراعية صناعية من فصيلة القرنيات الفراشية . انواعه عديدة جميعها من نباتات المناطق الاستوائية . فروعها جرزونية مستلقية . يستخرج من جذورها مادة الروتينون التي تستعمل في اباد الحشرات . اشهر انواعه المزروعة لاستخراج الروتينون يلي .

١٠١٠١ - **دَرِيْس اهلياجي** (S). *Derris elliptica* (S).

١٠١٠٢ - **دَرِيْس مَلَقِي** (S). *Derris malaccensis* (S).

١٠١٠٣ - **دَرِيْس مَنَقِي** (S). *Derris uliginosa* (S).
زراعتها تكثر في الهند وفي بعض مناطق الشرق الاقصى اخصها جزر الزابج || جذورها تدعى بلغة الملايو (Akar teeba) وتدعى بالانكليزية (Tuba root) .

١٠١١٤ - **دُرَيْقَة * ، أسبيديسترا** (S). *Aspidistra* (S). *Aspidistra*, *Aspidistre* (F). *Parlour palm* (E). *Aspidisterfarn* (D). *Aspidistra* (I).

جنس نباتات عشبية جذمورية مدادة من فصيلة الزنيقيات . انواعها قليلة . سوقها عكائس مدادة . اوراقها قرصية عروية ، منققة ، نصلها جلدي عابق الخضار وقد يكون شاحبا او موشحا في بعض الانواع || ازهارها جميلة الشكل ارجوانية اللون تتركز على التراب || اعرف واشهر انواعه ما يلي .

١٠١١٥ - **دُرَيْقَة شاحبة** (S). *Aspidistra lurida* (S).
Aspidistre pâle (F).

نوع من الدريقة اوراقه شاحبة الخضار تطول من ٢٠ الى ٢٥ سم. وتعرض نحو ٤ . ازهاره ارجوانية جميلة .



درياس



دريفة



درعة



دريمس مجلان



دريوب باهت

انواعها خمسة اثوابها الى الصهبة المرقطة بالجؤوة والسمة .
اطرافها مدببة تعيش في الرمال وتندس فيها بسرعة فائقة .

١٠١١٨ - دَسَّاسَة *، سَبَس (F). Seps (S). Chalcides
جنس عطاء من فصيلة السقنقوريات. انواعه عديدة جميعها
مستطيلة الجسم ، دقيقة الذنب ، قصيرة الجرامز . اثوابها
الى الرعدة السفعية الموج ، بطونها بيض . من ميزاتها
انها تفوص في الرمل كما يفوص السلك في الماء .



دزير

١٠١١٩ - دَسَّاسَة مُخَطَّطَة *، سَبَس مُخَطَّط (F). Seps chalcide (F). Seps (E).
Chalcides striatus (S).

حيوان بيوض من العطاء وفصيلة السقنقوريات قابعات
الاسنان ، مكتسيات اللسنة ، رباعيات القوائم ، ثلاثيات
الاصابع . اناثها اكبر قدماً من ذكورها || جسمها رشيق
القوام بطول من ٢٢ الى ٢٥ سم . رأسها لوزي الشكل .
عينها صغيرتان تلحفها اجفان شفافة متحركة . لسانها
ذلق الطرف ، مشعل الصفحة . عنقها قصيرة . ذنبها
مستدق الطرف ، سريع الانقسام || ثوبها الى الرعدة
الخطية السفعاء الموج تعلوها خطوط قاطبة تمتد من الرأس
الى الذنب || بيئاتها الشتوي يستمر نحو اربعة اشهر .
الانثى تبيض من ٦ الى ١٢ شلقة تطورها في التربة ||
تألف الاتربة الرملية لانها تفوص فيها عند الشعور بالخطر .
تسرح في النهار . قوتها الحشرات والديدان والذباب .
تعتبر من الزحافات المفيدة .



دساس

١٠١٢٠ - دَسَّاسَة نَمِرَة *، سَبَس أَنْمَر ،
دُقَّان ، غَنْجِيل (F). Gongyle ocellé (F).
Chalcides ocellatus (S).

حيوان سرلود من العطاء وفصيلة السقنقوريات قابعات
الاسنان ، مكتسيات اللسنة ، رباعيات القوائم ، خماسيات
الاصابع . الذكر اصغر قدماً من الانثى || جسمها متوسط
القد بطول من ٢٤ الى ٢٧ سم . رأسها مخروطي الشوزن .
عينها صغيرتان . اذناها خافتتا الغشاء الصيواني . لسانها
ذلق الطرف ، عادم التفريش . تسنيها ينتظم في فئة
القابعات . قوائمها قصيرة ، خماسية الاصابع المجهزة باظافر
محججة . ظهرها متتابع الشعابيل الدقيقة . بطنها ملس المدب .
ذنبها معتدل الطول ، سريع الانقسام || ثوبها الى الصهبة
الخطية السفعاء الموج تعلوها تنمير اسود وبيض يمتد من
الرأس الى اواسط الذنب || بيئاتها الشتوي يستمر نحو
اربعة اشهر . تألف الخرائب والاماكن الكثيرة الحجارة .
تسرح في النهار وتستكن في الليل ، الذكر برفقة انثاه ||
قوتها الحشرات ، اخصها غمديات الاجنحة والديدان .
تعتبر من الزحافات المفيدة .



دساسة



دساسة مخططة

١٠١٢١ - دَسَّام (F). Bouchon à l'émeri (F).
Emery stopper (E). سداة من الزجاج تحكم الد تماماً .

١٠١٢٢ - دُسْبُوسُ الشَّفَّاح هو قرمزية التفاح ، اطلبها .

١٠١٢٣ - دُسْبُوسُ الثُّوت هو قرمزية الثوت ، اطلبها .



دساسة نمرة

١٠١٢٤ - دُسْبُوسُ الوَرْد هو قرمزية الورد ، اطلبها .

١٠١٢٥ - دَسْبُوسَة البَصَل هي قتع البصل ، اطلبها .

مستدير الطرف اللاحف . غمداها متتابعنا التحزيز المتوازي
المخطوط ، القاطب . ارساغها خماسية العقل || جيلها ثنائي
الحول . تظهر الحشرة الجمالنة في نيسان وتعيش حتى تشرين
الثاني ، تسرح في الليل وتستكن في النهار اما على الصخور
البارزة فوق الماء او على الاعشاب || الانثى تمتع المكن
في التربة الرطبة تحت الجثالة . البرقة بطيئة النمو ، تسمى
الى الماء فور نفلها . جسمها ، عند بلوغها الادراك التام ،
يطول نحو ٧ م . وهو اهليلجي الشكل ، سداسي الرواجب ،
مهدب الاطراف ، اطحل اللون || طور الاكمال الذي
يستمر نحو اربعة اسابيع يتقضي في التربة ضمن صلجة
مركبة من مواد عضوية ونباتية معجونة بالريال .

١٠١١٢ - دُرِّيَّات ° Dryopidae (S).
Dryopidés (F). Dryopidae (E).

فصيلة حشرات مائية قانصة من رتبة غمديات الاجنحة ||
اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد مهددا معظم مناطق
البلاد المعتدلة الحرارة . تألف المناطق والاهوار والبحيرات
والانهر . تعيش في الماء وتنتقل فيه متمسكة بالجذور
والصخور المغمورة لانها لا تحسن السباحة . قوتها الحشرات
الدنيا والاوليات || اجسامها صغيرة القد ، مستطيلة
الشكل ، مستعرضة الرؤوس ، لانظامية الزباني المتباينة
الاشكال . جرامزها قوية . ارساغها خماسية العقل . قشارها
ملحوف بخمل دقيق يدفع الرزغ ويمنع البلل .
اشهر اجناسها الدريوب والهللميس .

١٠١١٤ - دَزْيُور ° Dasyurus (S). Dasyure (F).
جنس حيوانات جرابية من فصيلة الدزيوريات . انواعه
خسة جميعها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، قريبة
الشبه من الرياح . اخطامها واذناها ذلقة . اثوابها مبقجة
بالابيض . اذناها جثلة مستطيلة . تألف الاحراج .
تعيش على الاشجار ، تسرح في الليل قوتها الدويبات
والطيور والافانم وسائر الحيوانات الصغيرة التي تتمكن
منها .

١٠١١٥ - دَزْيُورِيَّات ° Dasyuridae (S).
Dasyuridés (F). Dasyuridae (E).
فصيلة حيوانات لبونه مفترسة تعرف بمجئلات الذنب ،
اطلبها .

١٠١١٦ - دَسَّاجَة ° Latrodectus (S).
Latrodecte, Malmignate (F). Latrodectus (E).

جنس عناكب ساعية قانصة مؤذية ثنائية الروايا سداسية
المشائن من فصيلة الشهاذيات . انواعها المعروفة عديدة
منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة من
العالم القديم || اجسامها متوسطة القد او كبيرة . بطونها
ضخمة ، شبه بيضية الشكل ، يكثر فيها اللون الاسود
والرقشة الحمراء او الالكهب الاسمر المرقوش بالاغبر او
الابيض || تألف البراري والمواقع الدغلة . تسرح في
النهار . قوتها الحشرات الصغيرة والذباب والهوم || لسعتها
مؤذية تسبب ورماً موضعياً وحى خفيفة تستمر من
يومين الى ثلاثة ايام .

١٠١١٧ - دَسَّاس * Eryx (S). Eryx, javelot (F).
Eryx, Sand boa (E).

من اسمائه الاعرج والدفانة والتكاز الهندي والتكاز
المصري || جنس حيات غير سامة متوسطة الطول

١٠١٣١ - دَسْبِيرُس لُوطُس °
Diospyros lotus (S).
Diospyre lotus (F). Date plum (E).
نوع من الدسبيرس مهددة الشرق الأدنى وأروبة الجنوبية .
شجرتها متوسطة القد . ثماره حامضة الطعم ، عديمة النفع ،
كرزية الشكل والحجم || يستعمل كطعم للكواكي لأنه
يوجد في جميع الأتربة الزراعية ولا يخشى البرد وقلة الماء .

١٠١٣٢ - دَسْبِيرُس مِلُون °
Diospyros discolor (S). Diospyre discolor (F).
نوع من الدسبيرس مهددة الفيليبين وقد عمت زراعته معظم
البلاد الاستوائية . شجرتها متوسطة القد بحيلة الشكل .
أوراقها اهليلجية مدببة الزام الأخير . نصلها جامد النسيج ،
اخضر الصفحة العليا ، خلي السفلى . ثماره كروية
مقطوعة الاعقاب قطرها يراوح من ٦ إلى ٧ سم . قشورها
ناعمة ، خلية ، جؤوية اللون . لبها عاجي اللون ،
جامد المادة ، سكري الطعم ، عوفي الرائحة المستحبة .
يزورها تراوح من ٤ إلى ٨ || يرغب في الأتربة
الدبالية المتوسطة الرطوبة .

١٠١٣٣ - دَسْتُومَة °
Diastoma (S).
Diastome (F). Diastoma (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الأرجل
وفصيلة السريتات . أنواعها المعروفة قليلة العدد معظمها
من متحجرات الاحقاب الايسونية وبعضها معاصر منتشر
في بحار البلاد المعتدلة الحارة || اصداؤها صغيرة مردنية
الشكل متتابعة الحلزونة والتحيز يكثُر فيها اللون الكستني .

١٠١٣٤ - دَسْتِي °
Topique (F). Topic (E).
نعت تعريفي يطلق على ما هو مختص بالمكان أو الموقع ||
الاصنام في العصر الجاهلي كانت جميعها دسّية .

١٠١٣٥ - دِسْتِيَكِي ، ذُو صَفَيْن °
Distique (F).
Distichous (E).
صفة الازهار والاوراق والسنبيلات القائمة على صفين
متقابلين .

١٠١٣٦ - دَسْتِينِيَّة *
Dorstenia (S).
Dorsténie (F).
جنس نباتات طبية جنينية وعشبية معمرة من فصيلة التوتيات .
أنواعها المعروفة قليلة العدد مهددة بعض مناطق امريكا
الاستوائية || اشهر انواعها الدسطينية البرازيلية (D. Bra-
siliensis) أوراقها قرصية الانتشاب ، معنقة ، بيضية
النصال الغائرة العروق . ازهارها تحوت مستطيلة الشكل
مقرنة الزوايا . جذورها طبية تستعمل كمنهضة ومعرفة
ومضادة للعفونة .

١٠١٣٧ - دَسِق ، طَفَح °
Déborder (F).
To overflow (E).
دسق الخوض : امتلاء وساح مائه . والدسق امتلاء الخوض
حتى يفيض .

١٠١٣٨ - دِسْقَارِيَّة °
Discaria longispina (S).
Discaire à longues épines (F).
جنية معمرة وحيدة الجنس والنوع من فصيلة النبقيات .
مهددة بلاد الاربعين . ساقها فرعاء تملو من ١٠٠ إلى
٢٠٠ سم . فروعها متعابدة ، دقيقة ، مفصلية ، كثيرة

١٠١٣٦ - دَسْبِيرُس °
Diospyros (S). Diospyre (F).
جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية من فصيلة
الابنوسيات انواعه نحو ١٨٠ معظمها من نباتات المناطق
الحارة . سوقها منتصبه عديمة الخلاب . اخشابها صلبة
قاسية ثقيلة الوزن يكثُر فيها الاسمر والاسود . أوراقها
متعاقبة بسيطة جامدة النصل . ازهارها نظامية وحيدة أو
ثنائية المسكن ، خماسية أو رباعية أو ثلاثية التركيب .
ثمارها عنبية لا قياسية الشكل والحجم معظمها حامض الطعم .
يزورها صغيرة مستطيلة آحية المادة || اعرف انواعه
وأشهرها ما يليق .

١٠١٣٧ - دَسْبِيرُس أَبُنُوسِي °
Diospyros ebenaster (S). Diospyre ébenin (F).
نوع من الدسبيرس ضرابه الزراعية عديدة . اعطائه فسيحة
الارجاء تشمل بعض مناطق المكسيك والانتيل وهاواي
وفلوريدا والفيليبين والهند . شجرتها تملو من ١٥ إلى ٢٠ م .
أوراقها اهليلجية بحيلة الخضار الزاهي . ازهارها صغيرة
القد ، بيضاء اللون ، خمرية : الذكورية منها مجموعة اسدية
والانثوية خنثوية كاملة . ثمارها كروية الشكل أو
مفلطحة ، قطرها يراوح من ٥ إلى ١٢ سم . تتميز بكثورتها
الخضر الابيدة . قشورها رقيقة ناعمة زيتونية اللون .
لبها دسمي المادة الرخوة . سكري الطعم ، جوزي اللون .
يزورها تراوح من ١ إلى ١٠ || وهذا النوع من
الدسبيرس مع كامل ضرابه يرغب في الاقاليم الحارة
المنحرفة نحو الاستوائية .

١٠١٣٨ - دَسْبِيرُس صِينِي °
Diospyros chinensis (S). Diospyre de Chine (F).
نوع من الدسبيرس مهددة الصين وقد عمت زراعته معظم
البلاد الحارة . ضرابه كثيرة العدد . اشجاره صغيرة القد
تملو من ٤ إلى ٨ أمتار . سوقها بيضاء اللحاء أوراقها
سنانية مزقبة النصل . ازهارها صغيرة القد ثنائية المسكن .
الذكورية منها عديدة وكثيرة الاسدية . الانثوية قليلة
العدد ، خلية المبيض . ثمارها كروية أو بيضية الشكل ،
قطرها يراوح من ٤ إلى ٥ سم . لونها عند الادراك إلى
الصفرة الصفراء . لبها شديد الصفرة العافية ، سكري
الطعم ، نيرجي العرف ، ثنائي الفلق وكل فلقة تحضن
بذرة صغيرة سمراء اللون . وثمرته هذه تدعى قين الكاك
(Figue caque) وقد تحفظ زمناً طويلاً فيجود طعمها .
يرغب في الأتربة الخفيفة المتوسطة الاندماج وهو لا
يتأثر بالديدان الثعبانية لذلك يحسن استعماله كطعم
للكاكي الذي يخشى هذه الديدان .

١٠١٣٩ - دَسْبِيرُس فِيرْجِينِي °
Diospyros virginiana (S). Diospyre de Virginie,
Plaqueminier de Virginie, Persimmon (F).
نوع من الدسبيرس السبروتي مهددة امريكا الشمالية .
ضرابه الزراعية عديدة لا تخشى الحر والقر . اشجاره
تملو من ١٢ إلى ٣٠ م . أوراقها كبيرة القد نصلها جامد
الصفحة اللامعة الجميلة الخضار . ثماره مأكولة لكنها
لا قياسية الشكل والحجم واللون لأنها تختلف باختلاف
الضروب . اصفرها قدر الكرزة واكبرها قدر الخوخة
الكبيرة || يوجد في جميع الأتربة الزراعية ويستعمل
كطعم للكواكي .

١٠١٣٠ - دَسْبِيرُس كَاكِي °
Diospyre kaki
هو الكاكي ، اطلبه .



دسّية

العقد الشائكة . شوكة مستطيل الجرم ، مخززي الشكل ، ذرب الحمة . أوراقها شديدة الصغر سميكة النصال ، لامعة الخضار . أزهارها صغيرة ، فردية تبينة اللون .

١٠١٣٩ - دَسَم (F). Suppuratif (F). Suppurative (E).
دسم الجرح : جعل فيه فتيلة .

١٠١٤٠ - دِسْمَنْتُس (S). Desmanthus (S). Desmanthe (F). Desmanthus (E). Büschelblume (D). Desmanto (I).

جنس نباتات عشبية ليفية من فصيلة القرنيات . أنواعه المعروفة ثمانية معظمها بري وبعضها زراعي تزييني . أوراقها متعاقبة ريشية مشطية . أزهارها عثكولية التجميع زاهية الألوان . مستحبة العرف الخافت .

١٠١٤١ - دِسْمُودِيُوم هو الارقيس الهندي ، اطلبه .

١٠١٤٢ - دِسْمُوس (S). Didesmus (S). Didesme, Rapistre (F). Didesmus (E).

جنس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة الصليبيات . أنواعها المعروفة سبعة جميعها من نبوت حوض البحر الابيض المتوسط || سوقها منتصبه فرعاء . أوراقها كاملة او ريشية مخرمة . أزهارها طرفي الارتكاز . أزهارها بيضاء اللون . تنويرها ربيعي .

اعرف أنواعه وأشهرها الثلاثة التالية :

١٠١٤٣ - دِسْمُوس مِصْرِي

Didesmus aegyptius (S). Didesme d'Egypte (F).
الاوراق كاملة مستطيلة ، والسفلى منها قيسارية النصال .

١٠١٤٤ - دِسْمُوس مِيقَارِي

Didesmus rostratus (S). Didesme rostré (F).
الاوراق ريشية مخرمة ، طوعية في بادية سيناء .

١٠١٤٥ - دِسْمُوس نَحِيل الْوَرَق

Didesmus tenuifolius (S).
Didesme à petites feuilles (F).
الاوراق صغيرة ريشية مخرمة . طوعية في بعض مناطق الساحل اللبناني .

١٠١٤٦ - دَسَمِيَّات (F). Lipides (F). Lipoides (E).
هي المواد العضوية المركزة على الحوامض الدهنية والمعروفة عادة بالشحوم غير المنحلة بالماء .

١٠١٤٧ - دَسْمِيد (S). Desmidium (S). Desmide, Desmidie (F). Desmidium (E).

جنس نباتات مائية من الخشيات الخضرة وفصيلة المدغمت وحيدات الخلية . أنواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . تعيش في المياه العذبة . تتميز باشكالها الخيطية العادمة الفروع .

١٠١٤٨ - دَسُو ، دَسْمِي (F). Rabougrissement (F). Stuntedness (E).
حالة او صفة النباتات المثبوتة العادمة النمو .

١٠١٤٩ - دَسِيم (F). Base du cou (F). Basis of neck (E).
مغرز العنق في الكاهل .

١٠١٥٠ - دِش (S). Discina (S). Discine (F).

جنس فطور من فصيلة الخشاريات . انواعه المعروفة قليلة العدد . اعطائها بعض مناطق إقليم الصنوبر . جميع انواعه شبه بيضية العسقلان المحدودب الصفحة المتجمدة . سوقها شديدة القصر او جدعة . لحميتها كاعنة الصنف غير مرغوب فيها || اعرف انواعه اطلاقاً دش الصنوبر المشهور بالدش اللؤلؤي .

١٠١٥١ - دِش لُولُؤِي * (S). Discina perlata (S). Discine perlée (F).

نوع من الدش يعيش على ارومات الصنوبر وجذوعه المقطوعة . ساقه جدعة . فولف عسقلانه متتابع التتوات والتجاعيد يطول نحو ١٠ سم . ويرتفع نحو ٥ سم . لونه كاللؤلؤ يعملوه موج بني .

١٠١٥٢ - دَسَامِيَّات (S). Erycinidae (S). Erycinidés (F). Erycinidae (E).

فصيلة حشرات فراشية من رتبة حرشفيات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منها الصغيرة القد والوسطى والكبيرة || اجسامها كثيفة الخمل . رواشنها محرمة الزوايا ، متراكبة الحراشف البدة . ملامسها منتصبه ، اطول من الرأس نحو ثلاث مرات . قرونها الاستشعارية صولجانية . طيرانها مزيج من الحوم والسييف والعرقصة || مكنها قاروري الشكل ، مخدد السطح . اساريها اسطوانية الجرم ، خلية القشار ، خاضلة . تعيش على اوراق النباتات البرية || اشهر اجناسها الدشامة والبيته والنموس .

١٠١٥٣ - دِشْلُوس (S). Dichillus (S).

جنس خنافس صغيرة القد من فصيلة الغبشيات اجسامها مستطيلة طولها يراوح من ٣ الى ٥ مم . لونها الى السرة السوداء زباناها مركبة من ١١ فاصلة . تعيش تحت العبل والاشخاب والحجارة وبعضها مع النمل في قراها || قوتها المواد العضوية المنحلة وقد تؤذي البزور الناقشة .

١٠١٥٤ - دِشْلُوس صَغِير * (S). Dichillus minutus (S). Dichille minuscule (F). Dichillus minutus (E).

حشرة دامة من فصيلة الغبشيات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف البراري والاحراج الدفلة . تعيش تحت الجفالة والحجارة . قوتها المواد النباتية والعضوية المنحلة . مسرحها دجوي || جسمها صغير القد يطول من ٣ الى ٥ مم . ثوبها الى السرة السوداء . رأسها مكور الشكل ، قوي التأثير . عيناها صغيرتان . زباناها صغيران جالسان . ظهرانها ضيق القاعدة ، مستدير الطرف اللاحف ، قليل التعزيز القمدي || لها ثلاثة اجيال في الحول . الجيل الربيعي يستمر نحو ١٢٠ يوماً والجيل الصيفي نحو ١٠٠ يوم ويستمر الجيل الخريفي نحو ١٤٥ يوماً || البرقة عند الادراك التام تطول من ٨ الى ٩ مم . جسمها دودي الشكل ، مستطيل الرأس ، سداسي الرواجب ، ثنائي السرك الشرجي ، اممر اللون || طور الاكمال الذي يستمر من ١٢ الى ١٥ يوماً يتقضي في التربة تحت الجفالة طليقاً من كل غلاف .

١٠١٥٥ - دَسَم (F). Oolithe (F). Oolite (E).

الدسم ضرب من التربة الجصية يتكون من حبيبات مستديرة شبيهة بدعبل الضفادع وبره السك .



دش لؤلؤي



دشلوس



دشلوس صغير

١٠١٦٢ - دُشْمَة الكَرَز *٥ ، لَفْحَة حَمْرَاء ٥

Gnomonia erythrostoma, *Libertina stipata* (S). *Maladie des taches rouges du cerisier* (F). *Leaf scorch of cherry* (E). *Blattbraune der kirschen* (D). فطر مجهري يصيب الكرز على اختلاف أنواعه فيعطب الأوراق ويؤذي الشجرة || مظهره الخارجي يقع فسيحة لاقياسية الشكل لونها الى الصهبة تظهر على النصل في ايار ثم تنتشر بعد ان تطلوها بقع اخرى صغيرة القد قائمة اللون تسبب جفاف النسيج والتفاف النصل. ومن لخصائص هذا الفطر انه يحول دون الاعبال الطبيعي في الاوراق المصابة فتبقى على الشجرة الى ان تنزعها الرياح والامطار || يكافح بجمع الاوراق وحرقها وباستعمال احد الفواطير المخربة.

١٠١٦٣ - دُشْمِي *٥. *Oolithique* (F). *Oolitic* (E). نعت تعريفي يطلق على ما كانت طبيعته الدشم او ما كان يحتوي على الدشم.

١٠١٦٤ - دُشْمِيَّات ٥

Gnomoniaceae (F). *Gnomoniaceae* (E). عبارة فطور مجهرية من فصيلة الحشريات ورتبة الزقيات تتميز باعسانها الناشبة في نسج النبات المنحار. تكاثرها صقية، مقها واضح جلي، بوعها شفاف، ثنائي الخلية، خيطي او اهليلجي الشكل || اجناسها عديدة اما الضارة منها فالدشمة والذثار.

١٠١٦٥ - دُشِيرَة ٥ *Dasychira* جنس حشرات فراشية من فصيلة القزيات اجسامها ربعة مفلطحة لونها الى السمرة زغها حرشني كثيف. يرقاتها ناهمة مؤذية تعيش على اوراق النبات || اعرفها واضرها ما يلي:

١٠١٦٦ - دُشِيرَة الحِرَاج *٥ *Dasychira pudibunda* (S). *Dasychira polyphage*, *Patte étendue Bombyx pudibond* (F). *Dasychira pudibonda* (E). *Streckfuss*, *Rotschwanz* (D).

نوع من الدشيرة ثوبها الى الرمادي الابيض تعلوه غبرة حطية. اجنحتها الامامية مستعرضة الخط الاوسط. يرقاتها تركب الملحوات على اختلاف انواعها فتؤذي الاوراق وقد تعبلها.

١٠١٦٧ - دُشِيرَة الخَوْخ *٥ *Dasychira fascelina* (S). *Dasychira du prunier* (F).

نوع من الدشيرة ثوبها الى الريدة الطحلاء تعلوه غبرة حطية. اجنحتها مزركشة. يرقاتها تركب الخوخ والمشمش والزعرور فتؤذي الاوراق الفتية لانها تعيش عليها.

١٠١٦٨ - دُشِيرَة خَجُولَة *٥ ، دُشِيرَة الحِرَاج ٥

Dasychira pudibunda (S). *Dasychira confuse*, *D. polyphage*, *Bombyx pudibond*, *Patte étendue* (F). *Dasychira pudibunda* (E). حشرة من فصيلة القزيات ورتبة حرشفيات الاجنحة. موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا. فراشتها عجفة تعيش على مخزونها الامعاني. سرقها ناهمة تسطو على اوراق الاشجار النفضية والمثمرة وعلى السنديان والجوز والورد والعوسج ... || جسمها متوسط القد يطول من ١٧ الى ٢٠ مم. بسطها تراوح من ٤٨ الى ٦٠ مم. رأسها معتدل

١٠١٥٦ - دُشْمَة ٥ *Gnomonia*

جنس فطور مجهرية من الدشميات. اعسانها مستطيلة، تكاثرها ضخمة القنة المخروقة، بوعها شفاف ثنائي الخلية. انواعها المؤذية المشهورة ستة وهي:

١٠١٥٧ - دُشْمَة الجُوز ٥

Gnomonia leptostyla, *Marssonina juglandis*, *Leptothyrium juglandis*, *Cryptosporium nigrum* (S). *Anthracoze du noyer*, *Taches des feuilles et fruits du noyer* (F). *Anthracoze of walnut* (E). *Blattfleckenkrankheit der walnuss* (D).

فطر مجهري يصيب الجوز باوراقه وثماره. مظهره الخارجي يقع مستديرة، مبعثرة، لاقياسية، لونها الى السمرة تركب نصل الاوراق وقشور الثمار فتؤذيها وقد تعطب النوامي. تظهر من حزيران الى آب || تكافح باستعمال سائل بور دو المحلول ١٪ توأ بعد اكتمال الاوراق.

١٠١٥٨ - دُشْمَة الدَلْب ٥

Gnomonia (apiognomonina) veneta, *Laestadia veneta*, *Gloeosporium nervisequum*, *G. platani*, *Discula platani*, *Sporonema platani*, *Microstroma platani* (S). *Anthracoze du platane*, *Maladie des feuilles du platane* (F). *Anthracoze of sycamore* (E). *Blattfalkkrankheit und zweigkrebs der platane* (D).

فطر مجهري يصيب اوراق الدلب وافنانه فيعطبها. مظهره الخارجي يقع سم تركب عروق وشرابين الاوراق فتسبب يباسها والاعبال الباكر. وهي على الافنان تقع مستطيلة لاقياسية لونها الى السمرة الداكنة تسبب جفاف اللحاء وعطب الشجرة || يكافح بقطع الاعضاء المصابة وجمعها وحرقها مع الاوراق ثم تطهير الجروح بمحلول سلفات الحديد مع حامض السلفوريك (كيلو سلفات الحديد يضاف اليه ٢٠ سم ٤ حامض سلفوريك عيار ٥٢ درجة بومه، يضاف اليه ١٠ لتر ماء) || ومن المستحسن استعمال سائل بور دو المحلول ١٪ عند الاوراق.

١٠١٥٩ - دُشْمَة الزَيْزْفُون ٥

Gnomonia tillae, *Gloeosporium tillae* (S).

فطر مجهري يصيب اوراق الزيزفون فيعطبها. مظهره الخارجي يقع لاقياسية قطرها يراوح من ٢ الى ٤ مم. تركب نصل الاوراق فتتمعجه وتعطبه. تبدو في اول عيدها حزام اللون ثم بنفسجية وتستقر على السمرة الحطية || اضرارها تنحصر بعرقلة نمو الشجرة واعبالها الباكر.

١٠١٦٠ - دُشْمَة السِنْدِيَان *٥


Gnomonia quercina, *Gloeosporium quercinum*, *G. umbrineillum* (S).

فطر مجهري يصيب اوراق ونوامي السنديان. مظهره الخارجي يقع لاقياسية، صناعية اللون، تركب نصل الاوراق والنوامي فتسبب ذبولها ويباسها.

١٠١٦١ - دُشْمَة الشِيلِك *٥ ، دُشْمَة الفَرِيز ٥

Gnomonia fragariae, *G. fructicola*, *Gloeosporium fragariae* (S).

فطر مجهري يصيب الشيلك في زناد اوراقه وفي ثماره. مظهره الخارجي يقع صغيرة لونها الى الجؤوة العابقة تركب زناد الاوراق فتعرقل التبادل النسفي وتعلو الثمار فتبدو كالبثور الصغيرة لونها الى السمرة الزاهية || اضرارها محدودة لانها قليلة الاذى وانتشارها منوط ببيئة خاصة قوامها رطوبة التربة وحرارة الجو.



دُشْمَة الجُوز



دُشْمَة الدَلْب



دُشْمَة الزَيْزْفُون



دُشْمَة السِنْدِيَان




دُشْمَة الشِيلِك



دُشْمَة الكَرَز



دَشِيْلَة الحَرَاَج



دَشِيْلَة الخَوْخ



دَشِيْلَة خُجُولَة



دَشِيْلَة



دُعْشُوْقَة الشَّام



دُعْشُوْقَة القَطَانِيَّات



دُعْشُوْقَة المَنَاقِع



دُعْشُوْقَة سَبَاعِيَّة النُقْط

السوداويات ، الشصبيات ، الغاريقونيات ، الفلوسيات ، الكودانيات ، والنخريات .

١٠١٧٦ - دُعْشِيل
Œufs de grenouille (F).
Eggs of frogs (E).
هو بيض الضفدع .

١٠١٧٧ - دُعْشُوب هو الدعابة ، اطلبها .

١٠١٧٨ - دُعْث
Epiphytie (F), Epiphyty (E).
اسم يطلق على جميع علل النبات راوصامها وأدوائها من أي مصدر كانت . ج دعوث .

١٠١٧٩ - دُعْثَرَة
Larve de la zeuzère (F).
Grub of zeuzera (E).
دعرة ج دعر : دود القتع يعيش في الالتاق والدهاليز التي يحفرها داخل الشكير والحشب .

١٠١٨٠ - دُعْش
Kapoquier (F).
Cabbage wood (E).
هو الكابوك ، اطلبه .

١٠١٨١ - دُعْشُوْقَة الشَّمَام *

Epilachna argus, E. chrysomelina (S). Coccinelle du meton (F).
حشرة من الدعسوقيات طولها نحو ٨ مم . لونها إلى الحمرة المرجانية . غمدها منقطان بالأسود ، كل غمد يحمل ٦ نقط || تركيب مع يرقاتها جميع نباتات الفصيلة القرعية اخصها الشام . تكافح عند ظهورها بتغفير الأوراق بإحد الحواشير الفعالة .

١٠١٨٢ - دُعْشُوْقَة القَطَانِيَّات *

Lasia globosa, Subcoccinella 24-punctata (S). Lasie globuleuse, Coccinelle à 24 points, Coccinelle des légumineuses (F) Lagume lady bug (E).
Luzernemarienkäfer (D).

حشرة من الدعسوقيات طولها نحو ٤ مم . ثوبها وردي اللون . غمدها منقطان بالأسود كل غمد يحمل ١٢ نقطة . الحشرة ويرقاتها خاضعة تركيب القطانيات والقرنفل . تكافح عند ظهورها بنضج النبات أو تغفيره بإحد الحواشير المجربة .

١٠١٨٣ - دُعْشُوْقَة المَنَاقِع *

Coccidula scutellata (S). Coccinelle à 4 points (F).
حشرة من الدعسوقيات طولها نحو ٣ مم . شكلها مستطيل . لونها إلى الصبغة . يوجد على غمدها ٤ نقط سود || تركيب مع يرقاتها مختلف أعشاب ونباتات المناقع فتؤذيها بعض الشيء .

١٠١٨٤ - دُعْشُوْقَة سَبَاعِيَّة النُقْط *

Coccinella septempunctata (S).
Coccinelle à 7 points (F). Lady-bird (E).

حشرة خاتلة من فصيلة الدعسوقيات ورقبة مغمدة الاجنحة تألف المواقع التي يكثر فيها الارق والقرمزيات . خنافسها ويرقاتها تعيش على ما تقتنصه من الارق والوعف والمغفرات والقرمزيات ... || جسمها صغير القد ، بيضي الشوزن ، يطول من ٥ إلى ٨ مم . ثوبها إلى الحمرة المرجانية الصفراء المواجه يعلوها في غمدها سبع نقط سود منها نقطة درقية على هامش الغمدين . رأسها كبير الجرم . عينها كبيرتان جاحظتان . زباناها صقيان منفرجان . فكاهما ذريان ضليمان . غمدها كثيفتا الحمل الدقيق . ارساغها رباعية العقل || اجيالها الحولية ثلاثة . تخرج الحشرة الجملانة من

الجرم . عينها صغيرتان . زباناها مشطيان مزدوجان عند الذكر ، خيطيان قصيران عند الانثى . جوشها وبطنها إلى الطحلة يعلوها موج حنطي || رواشها إلى الرمادي الاغبر تملو في الزوج الامامي جددة وسطى سمراء ، وتملو في الزوج الخلفي بقبجة حنطية || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في أوائل ايار . تسرح في النهار . تعاغل بعد ظهورها بيومين وتمتدح الممكن لطخاً على سوق الاشجار || السرفة عند بلوغها الادراك التام تطول من ٣٢ إلى ٤٠ مم . جسمها اسطواني الشكل منشي بالهلب المتفاوت الطول . ثوبها إلى الخضار الباهت يعلوها موج اصفر . هلبها اصفر من السكمة الصدرية إلى السابعة وأحر اللون من السكمة الثامنة إلى الشرج ويملو في السكمة الحادية عشر ضمة من الهلب المستطيل تبدو كالمرد تطول نحو ١٠ مم . || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٢٥ اسبوعاً يتقضي ضمن صلجة حريرية الخيط تحببها السرفة بين طيات الاوراق ار تحت القشور .

١٠١٦٩ - دَشِيْلَة *

Scatophagus (S).
Scatophage (F). Scatophagous (E).
سكة بحرية بيوض من فصيلة السحليات ورتبة شائكات الزعانف . أعطانها تمتد من البحر الأحمر إلى مدغشكر واسترالية || جسمها شبه مستدير الشكل ، مبطط الجرم ، يطول من ١٥ إلى ٢٠ سم . رأسها صغير القد ، مخروطي الشكل . خطمها بالغ الصغر . زعنفتها الظهرية الامامية ثائكة تحمل ١٢ منخساً ذرباً . زعنفتها الشرجية تحمل أيضاً ثلاثة مناخس ذرية || ثوبها إلى الطحلة القفصية تملوها رقعة شديدة السمرة منسوبة التوزيع الذي يمتد إلى الرأس والزعانف الظهرية والذيلية || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

١٠١٧٠ - دُعْشُوب ، دُعْشُوبَة

Fourminoire ailée (F).
Winged black ant (E).
نملة سوداء مجنحة . ج دعاب .

١٠١٧١ - دُعْشَاة

عشبة تعطن وتخبز وهي ذات قطب وورق متسطحة النبتة ومنبتها الصحاري والسهل وجناتها حبة سوداء ج دعاع (لسان العرب) .

١٠١٧٢ - دُعْشَاة

Etai (F). Stay (E).
خشبة كبيرة غليظة يدعم بها الشيء ليستقر .

١٠١٧٣ - دُعْشَاة ، دُعْشَاة ، دُعْشَاة ، دُعْشَاة

Soutènement (F). Support (E).
اسم شامل يطلق على كل شيء يستعمل لدعم شيء آخر كالجدار لدعم التراب والدعامة لدعم الحائط الخ .

١٠١٧٤ - دُعْشَاة

Baside (F). Basidium (E).
الخلية العليا التي ينشأ فيها البوغ عند الفطور الدعامية .

١٠١٧٥ - دُعْشَاة

Basidiomycètes (F).
Basidiomycetes (E).

رتبة من الفطور فصائلها واجناسها وانواعها كثيرة العدد مختلفة الاشكال والاحجام منها الفطور المجهرية ومنها الصوفانية الكبيرة || تتميز بدعائمتها الخارجية المنتصبة القائمة على صنف كروية او بيضية الشكل || اشهر فصائلها الاربيات ، الدبوسيات ، الدعشيات ، الدفريات ، الدندميات ، الراهوبيات ، الرعشيات ، الزحاليات ، الزموليات ، السحاميات ، السحفيات ، السميات ،

١٠١٨٨ - دُعُشُوقُصْ أُنْكُولَا °

Galago montei (S). Galago d'Angola (F).

١٠١٨٩ - دُعُشُوقُصْ جَنْبَلُ الذَّنْب °

Galago crassicauda (S).

Galago à queue touffue (F).

١٠١٩٠ - دُعُشُوقُصْ مَبْدُول °

Galago galago (S).

Galago commun (F).

١٠١٩١ - دَعَكْر * °

Pomacanthus (S).
جنس اسماك بحرية من فصيلة السحليات. انواعه المعروفة ٤٠. اعطانها بحار البلاد الحارة. جميعها مأكولة صغيرة القد، مستطيلة الشكل، مفلطحة الجسم، فارقة الزعنفة الشرجية. اثنائها متباينة الالوان الزاهية.

١٠١٩٢ - دَعَكْر مَسِيك *

Pomacanthus sordidus (S).

Pomacanthus sordide (F). Pomacanthus sordidus (E).

نوع من الدعكر. سمكة بحرية بيوض من فصيلة السحليات شائكات الزعانف. اعطانها البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر والخليج العربي. مسرحها حشاش المجاذع والنقاف || جسمها اهليلجي الشكل يطول من ١٥ الى ٢٥ سم. ثوبها الى الريدة الدنسة يعلوها تمشيج معترض باهت الخضاب. ظهرها عابق السمرة. بطنها الى الغيرة. زعانفها الى الشبهة السمره الموج باستثناء الظهرية والشرجية فانها الى الصفرة ويعلو الظهرية بقجة سوداء، رأسها خذروني الشكل، ذلق الخطم. شذقها قليل الانفراج. فكها السفلي يتقدم العلوي. اسنانها كثيرة، صغيرة، ذرية، متحركة عيناها مستديرتان، ناشزتان. زعنفتها الظهرية واحدة، مستطيلة. زعنفتها الذيلية فارقة || لحها جيد الصنف، مرغوب فيه.

١٠١٩٣ - دَعَلْبَة °

Gastrostège (F).

الدعلبة هي الصفحة الواحدة من الصفائح التي تغلف مدب بطن الحية من العنق الى اول الذنب. ج دعالب. اما صفحة الذنب فتدعى ذيلة.

١٠١٩٤ - دُعَلَة °

Apnée (F). Apnoea (E).

الدعلة انقطاع التنفس الموقت، ويدعى البُهر.

١٠١٩٥ - دُعُلُوج °

Symphyandra (S).

Symphyandre (F). Symphyandra (E).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الجريسيات. سوقها فرعاء تملو من ٤٠ الى ٦٠ سم. اوراقها معتقة، الجذعية منها متعاقبة، العليا متعاقبة. نصالها سنانية الشكل، مسننة الحتار. ازهارها كبيرة القد عنقودية التجميع او عشكولية || تزرع للتزيين في المراكن والحدايق. انواعها المعروفة قليلة العدد، اشهرها التالية.

١٠١٩٦ - دُعُلُوج أُرْمَنِي °

Symphyandra armena (S).

Symphyandre d'Arménie (F).

نوع من الدعلوج. مهدد بلاد ارمينية. ساقه تملو من ٤٠ الى ٥٠ سم. افناده منتصبه، خلية اللحاء. ازهاره محورية، فردية. لونها الى الزرقة الباهتة. تويجاتها انبوبية قصيرة الفلق || تنويره يستمر من تموز الى آب.

بياتها الشتوي في اوائل الربيع وتساعد بعد ظهورها باربعة أسابيع. تسرح في النهار وتبيت في الليل || اليرقة عند ادراكها الكمال الجسموري تطول نحو ١٠ مم. تتميز بفلاظة البطن وبشكله الجمولي. ثوبها الى الخضار الازرق يشوبه موج احلل.

١٠١٨٥ - دُعُشُوقِيَّات ، بَنَات الْعَيْد

Coccinellidae (S). Coccinellidés, Catherines, Bêtes à bon Dieu (F). Coccinellidae, Lady beetles, Lady bugs (E). Marienkäferchen, Marienkäfer (D).

فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة. اجناسها وانواعها عديدة. جميعها شبه كروية السطح. جميلة الالوان الزاهية. قرونها الاستشعارية مركبة من ١١ فاصلة. ارساغها رباعية. مخالبها مسننة || مكنها دقيق مستطيل، تبني اللون او حطبي تمتحه الانثى عن غير قياس انما يغلب فيه التجميع || يرقاتها اهليلجية الشكل ملونة معظمها هليبي البشرة || اجناسها وانواعها باكثريتها مفترسة جزيلة النفع، وبعضها خاضل يركب النبات.

١٠١٨٦ - دُعُشُوقَة مَبْقَجَة °

Cardiophorus (S). Cardiophore à 2 taches (F).

Cardiophorus biguttatus (E).

حشرة خاضلة هواكة مفترسة من السالوليات ورتبة مفدمات الاجنحة. تألف الاحراج والادغال ولكنها لا تقترب من النباتات الراتنجية والصنوبر. خفافسها تعيش على اوراق الصيوانيات والنسرين والزعرور والسنديان. يرقاتها تعيش تحت لحاء الاشجار تنغرة قوتها المواد النباتية المنحلة وكل ما تستطيع افتراسه من الحشرات الخاضبة || جسمها صغير القد يطول من ٨ الى ٩ مم. ثوبها الى الجقوة الضاربة الى السواد الاسفع يعلوها في كل غمد من غمدتها بقجة حمراء. رأسها مستعرض. الشكل. زباناها خيطيان. عيناها لوزيتان. ظهرانها اهليلجي الشكل، تساعي التحديد الغمدي القاطب. ارساغها خاسية العقل || جيلها رباعي الحول. تظهر الحشرة الجملة في ايار وتعيش حتى آب. تسرح في النهار وتبيت في الليل || اليرقة بطيئة النمو سلكية الجسم تعيش نحو اربع سنوات وتطول من ١٦ الى ٢٠ مم. ثوبها في اول عهدها الى الصفار الباهت ثم يعمق وينحرف مع تقادم العمر الى الصفرة العناية الموج || الطور الاكمالي الذي ينتضي في التربة يستمر نحو ٥٠ يوماً.

١٠١٨٧ - دُعُشُوقُصْ °، غَلْفُو °

Galago (S).

Galago (F). Galago (E).

الاسم العلمي «غلغو» هو الاسم الشائع في لغة السنغال. جنس حيوانات لبونة من الليموريات. انواعه المعروفة تسعة. موطنها بعض المناطق الافريقية. تألف الغابات والحراج والسباسب. ملجئها الحياتي جماعي. جماعاتها متوسطة العدد. تسرح في الليل وتبيت في النهار || اجسامها متباينة الاحجام، اكبرها بحجم السور. تتميز بأذانها الكبيرة التي تمتد وتنقلص وتنطبق على الاصداع. اذانها مستطيلة، كثيفة الوبر الجلل || اناثها رباعية الاطباء، اثنان صدريان واثنان كاذبان. يحمل الانثى نحو ١٤٠ يوماً تضع في تمامه من جروين الى ثلاثة جراء || اثنائها تختلف مع اختلاف الانواع. اوبارها لبد، ناعمة، حريرية الملمس || قوتها الثمار والحبوب والحشرات. اعرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية.



دعشوقة بقجة



دعفوص



دعكر



دعكر مسيك

١٠١٩٧ - دُعْلُوج بَلْقَانِي °

Symphyandra Hofmanni (S).

Symphyandre des Balkans (F).

نوع من الدعلوج . مهدد بلاد البلقان . ساقه فرعاء تعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم . افناده كثيفة الخليل ، متدلية . ازهاره عنقودي التجميع . ازهاره بيضاء اللون ، مستطيلة المالبق ، متدلية ، قطرها نحو ٤ سم . || تنويره يستمر من تموز الى تشرين الاول .

١٠١٩٨ - دُعْلُوج مُحَجَّن °

Symphyandra pendula (S).

Symphyandre pendant (F).

نوع من الدعلوج . مهدد الشرق الادنى . ساقه فرعاء تعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم . افناده محججة ، متدلية ، خلية اللحاء . ازهاره عاجية اللون ، كبيرة القد . توريحاتها قمية الشكل || تنويرها يستمر من تموز الى آب .

١٠١٩٩ - دُعْمُوص °

Larve (F). Larva (E).

شكل انتقالي تكون فيه بعض الحيوانات كالحشرات بعد نفضها من المكينة وقبل بلوغها شكلها الكامل النهائي .

١٠٢٠٠ - دُعْمُوصِي ، يَرْقِي °

Larvaire (F).

Larval, Immature (E).

نعت تعريفية يطلق ، في علم الحشرات ، على طور معين من الاطوار الحياتية ، تكون فيه الحشرة في طورها الثاني الذي يمتد من النقف الى الانسلاخ الاخير .

١٠٢٠١ - دَعْوَة °

Convocation

هي الدعوة الى الاجتماع اسبابها ومقاهيمها عديدة .

١٠٢٠٢ - دَعْوَى إِحْتِيَاظِيَّة °

Acte subsidiaire (F).

Subsidiary deed (E).

هي الدعوى التي لا يخول القانون وسيلة غيرها لحماية حق منازع فيه .

١٠٢٠٣ - دَعْوَى الْخُلُول °

Acte subrogatoire (F).

Subrogation deed (E).

هي الدعوى غير المباشرة .

١٠٢٠٤ - دَعْوِيَّة °

هي الصعوة ، اطلبها .

١٠٢٠٥ - دَعِيرَة ° ، تَرْيُوتْسِيُوم °

Trichothecium

جنس فطور مجهرية من فصيلة الوطحيات . جريه الكنديية شجرية الهشة ، عديدة الفروع المتشعبة . كنانده شفافة مقوسة المكارن . مستطيلة او مردنية الشكل . ملساء السطح || انواعه قليلة اعرفها الدعيرة الوردية .

١٠٢٠٦ - دَعِيرَة وَرْدِيَّة ° ، عَقْن وَرْدِي °

Trichothecium roseum (S).

Molsissure rose, Pourriture amère (F).

Pink rot (E).

Schalenfäule, Bitterfäule (D).

فطر مجهرية عيم الانتشار يركب الثمار الناضجة والمخفولة على اختلاف اجناسها وانواعها . يعترى التفاح والاجاص والسفرجل والخوخ والمشمش والكرز والموز والبنندرة .

١٠٢٠٧ - دَعِيم °

Stéréome (F).

Stereoma (E).

الدعيم النسيج الداعم عند النبات .

١٠٢٠٨ - دَغِير °

هو الحرشنة الصغيرة ، اطلبها .

١٠٢٠٩ - دَغِير °

Dermatea

جنس فطور مجهرية من الزميجيات وفصيلة الحشاريات وهو من الفطور المشلاخية يتميز بسدائه الصلبة الرقعة ، القرصية او المخروطية الشكل ، العابقة اللون الخنطي . تكاثره متشابكة مع نكاته . بوغه اهليلجي او مردني الشكل وثيري الانقسام المعترض ، عديد الخلايا . انواعه عديدة اشهرها الثلاثة التالية :

١٠٢١٠ - دَغِير الْإِجَاص °

Dermatea corticola, Neofabraea corticola, Myxosporium corticolum (S).

فطر مجهرية يركب لحاء الافناد والاعصان فيعطها . مظهره الخارجي يقع فسيحة منخفضة الوسط الاسمر اللون ، بارزة الاطار المهدب الاحمر . تعلو لحاء الافناد المحولة والمعمرة فتسبب جفاف القشرة وتقطع على الاوعية طريق التبادل النسفي || يصيب الاشجار الضعيفة التي عطها الصقيع والتي تعرضت الى لفحة الشمس || يكافح اولا بقطع وحرق الاعضاء الموبوءة . ثانياً بتطهير الجروح بمحلول سلفات الحديد . ثالثاً بمد الشجرة بالاسمدة الازوتية وخصها النيترات .

١٠٢١١ - دَغِير الْخَوْخ °

Dermatea prunastri, Cenangium prunastri, Micropera spurium, Sphaeronema spurium (S).

فطر مجهرية يركب افناد الخوخ فيعطها || مظهره الخارجي تصدع خيطي عرضي يحل بادمة لحاء الافناد فيسبب انمراقها وانفلاقها وجفافها || يصيب افناد الاشجار الضعيفة دون سواها . يكافح بقطع وحرق الاعضاء الموبوءة ، بتطهير الجروح بمحلول سلفات الحديد ، ومد الشجرة ببعض الاسمدة الازوتية وخصها النيترات .

١٠٢١٢ - دَغِير الْكَرَز °

Dermatea cerasi, Micropera drupacearum (S).

فطر مجهرية قليل الاذى يركب الكرز وبعض اللوزيات كالموز والمشمش والدراقن || مظهره الخارجي بشور عدسية قرحية لاقياسية الحجم ، لونها الى الخضار الزيتي ثم يتحرف نحو السمرة ، يركب لحاء الاعصان والافناد فتشوها || يكافح بالكشط والتطهير ومد الاشجار بعنصر الازوت .

١٠٢١٣ - دَغْفَل °

Eléphantéau (F).

Young elephant (E).

صغير الفيل يتبع امه .

١٠٢١٤ - دَغْل °

Hallier (F).

Thicket (E).

هو السياج اليابس او السياج الذي جف .

١٠٢١٥ - دَغْل الْعَلِيْق ° ، هَيْشَة °

Roncerale, Roncier (F).

Brake, Brambly ground (E).

هو منبتة العليق وكل ارض كثر فيها هذا النبات .

١٠٢١٦ - دَغْلَة °

Bulsson (F).

Bush (E).

كل جنية او جنية فرعاء متراكبة الافناد والافنان .

١٠٢١٧ - دَغْلُوس °

Diglossa (S).

Diglosse (F).

Diglossa (E).


جنس طير من الجواثم سيات المناقير وفصيلة المغثريات .



دعيرة وردية




دغلوس




دغناش مبدول




دغيلة التين



دغيلة الحمضيات



دغيلة الدمامة



دغيلة فاسدة



دغان



دغدوف

انواعه المعروفة عشرة جميعها من طيور امريكا الجنوبية . تألف الغابات والاحراج والحدائق . ملجئها الحياتي زوجي . قوتها رحيق الازهار والحشرات المختلفة اخصها الفراش || اجسامها هيفاء تطول من ٢١ الى ٢٤ سم . اناثها تختلف مع الانواع يكثر فيها الاسود والشفقة السمره والتبقيج والتجذيع بالابيض . اجنحتها معتدلة الطول ، ذلقسة الاطراف . اذناها ضيقة مستطيلة || تدثن اعشاشها في الاشجار الرقيقة عند اطراف الاغصان . اناثها تحضن بمنابرة الذكور من ٣ الى ٥ بيضات على مرتين في الحول .

١٠٢١٨ - دُغْمُور ٥ Laccolite, Laccolithe (F). Laccolite (E).

كل كتلة صخر ثوار ، طافحة ، نائثة ، دخيلة بين طبقات الصخور الرسوبية تدعى دغموراً ج دغامر .

١٠٢١٩ - دَغْنَاش Pyrrhula (S).

Bouvreuil (F). Bullfinch (E).

جنس عصافير من فصيلة الشرشوريات انواعه ٧ منها واحد امريكي وآخر افريقي وخسة اسيوية ارربية . جميعها زاحية الالوان المتداخلة . مناقيرها قصيرة محدبة . اجنحتها مسترصة الشكل ، ذلقة الاطراف . اذناها متوسطة الطول . ارساغها قصيرة ومخالبها ايضاً . منها القواطع والاوبد . تألف الاحراج والحدائق . قوتها الحشرات والديدان والدعاميص والنمل وبعض الثمار العنية البرية . تدثن في الاشجار الباسقة الكثيفة الافنان . اناثها تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها نحو اسبوعين . اعرف انواعه واشهرها الدغناش المبدول .

١٠٢٢٠ - دَغْنَاش مَبْدُول * Pyrrhula vulgaris (S).

Bouvreuil commun (F). Common bullfinch (E).

Gimpel, Dompfall (D).

نوع من الدغناش . طوله يراوح بين ١٥ و ١٧ سم . رأسه ومحسره وجناحه وذنبه الى السواد القاتم يعلوه موج بنفسجي . ظهره رمادي اللون ازرق الموج . صدره وبطنه الى الجؤوة الزاهية . افيكه ابيض || يألف القفص ويسافد بعض عصافير فصيلته اخصها النعار والنغر .

١٠٢٢١ - دَغِيلَة Diaporthe

جنس فطور مجهرية من الذعلبيات . تتميز بوظيفتها الضخمة التي تحضن بعض الاعسان الغليظة المستطيلة المتعرجة . بونغها ثنائي الخلية شفهي الوثرة || اشهر انواعه الاربعة التالية .

١٠٢٢٢ - دَغِيلَة التين * Diaporthe cinerascens, Phomopsis cinerascens, Phoma cinerascens (S). Chancre du tronc du figuier (F).

فطر مجهرية يصيب التين في جذوعه واغصانه . مظهره الخارجي بقع قرحية تبدو مستطيلة ثم تميل الى الاستدارة تصيب السوق والاغصان الجروحة فتعطب القشور واللحاء وقد تطوق الساق فتسبب يباسها || يكافح بتنظيف الساق والاغصان من البقع القرحية ثم تطهر الجروح ومرحها بالمستيك .

١٠٢٢٣ - دَغِيلَة الحَمْضِيَّات * Diaporthe citri, Phomopsis citri (S). Mélanose des citrus (F).

فطر مجهرية يصيب الحمضيات واخصها الليمون الحامض والخلو واليوسني || مظهره الخارجي تجمعين يحل بالافنان

فيمنها من النمو ثم يقودها الى الذبول . وهو في الجذوع يقع ثعلوية ينضج منها مادة صمغية شفافة . اما في الثمار فهو عفن زغبى اطحل اللون يعلوا لاهن عند اتصالها بالشر فيؤبها بعد ان يفنضها ويوشمها ببقع سمره ثم سوداء اللون . يكافح عند ظهوره باستعمال مزيج مركب من سائل بوردو المحلول ١٪ ومن زيت صيني محلول ١٪ .

١٠٢٢٤ - دَغِيلَة الدَمَمَة * Diaporthe batatatis, Phomopsis batatae (S).

فطر مجهرية يصيب درنات الدمامة (البطاطا الحلوة) في اثناء حفظها وخزنها || مظهره الخارجي بقع سمر فسيحة تمنطق الدرنه فتفنضها وتسبب انحلال لها وعفنه الناشف فتبدو كأنها محتلة خالية من الاحشاء || العلاج الواقي يقوم على حفظ الدرنات وخزنها في مكان نظيف منخفض الحرارة والرطوبة .

١٠٢٢٥ - دَغِيلَة فَاسِدَة * Diaporthe pernicios, Phomopsis mali, Fusicoccum malorum (S). Diaporthe pernicios (F).

فطر مجهرية يصيب الاشجار المثمرة في افنانها وثمارها اخصها التفاح والاجاص والخوخ . والكرز والشمش والدراقن || مظهره الخارجي قروح مستديرة تصيب الافناد فتسبب يباس البشرة وانفصالها ثم جفاف اللحاء واسمراره || وهو على الثمار بقع سمر تركب الخوخ والدراقن والشمش فتفنض قشورها وتسبب جفافها وسقوطها || اما على التفاح والاجاص فهو على شكلين شكل يصيب الثمار عند انتصاف عمرها فيمنطقها بوشاح من الاوشم الفطري يقودها الى العفن . وشكل يصيب الثمار قبيل ادراكها ولا يظهر عليها الا بعد خزنها في بيئة كثرت رطوبتها وصلحت حرارتها ببلوغها حد الحيات السليبي || يكافح عند ظهوره على الاشجار باستعمال احد الفواطير الفعالة الكثيرة العدد .

١٠٢٢٦ - دَف Ados (F). Warm border (E).

الدف هو حرف التلم المحدث .

١٠٢٢٧ - دَفَّان Gongyle ocellé (F).

حيوان سرلود من العطاء يدعى دساسة نمرة ، اطلبها .

١٠٢٢٨ - دَفَّان * Platycephalus insidiator (S).

نوع من الراقد وهو سمكة بحرية مغزلية الشكل ، متوسطة القد ، مفلطحة الرأس ، كبيرة الزعانف المستطيلة المرقوشة ، مقطومة الزعنفة الشرجية . تعيش في بحار البلاد الحارة تستتب في الرمال وقد تغور فيها بكاملها دون رأسها تتربص فريستها .

١٠٢٢٩ - دَفْتَر الشُّرُوط Cahier des charges (F).

Specifications (E).

هو دفتر شروط الصفقة المطلوب انجازها يعرض للاطلاع والالتزام على كل راغب توفرت فيه العناصر الالزامية .

١٠٢٣٠ - دَفْدُوف * Heniochus (S).

جنس اسماك بحرية من فصيلة السحليات انواعه المعروفة قليلة جميعها صغيرة القد مستديرة الشكل ، مبططة الجسم ، زاهية الالوان الجميلة . اعطانها بحار المناطق الحارة .

١٠٢٣١ - دَفِير الحِرَاج ٥ Puant de la forêt (F).

حيوان لبون ادره مشهور باسم تمندهو ، اطلبه .



دفلوج

Diffuge (F).

١٠٢٤٣ - دَفْلُوج *٥

جنس حويئات مجهرية مائية من المتخربات وفصيلة الدفلوجيات. أنواعه المعروفة قليلة العدد معظمها بحري المسكن وبعضها يعيش في المياه العذبة || جسمه اسطواني الشكل تغلفه صدف شبة القارورة كيتينية أو شيتينية المادة تعلوها بعض الاجسام الغريبة اللاصقة بها. فوهة القارورة ضيقة العنق تخرج منها خمسة ملاس خيطية الشكل مبطة يستعملها الدفلوج لتلمس الاشياء وللاعتداء.

Diffugiidae (S).

١٠٢٤٤ - دَفْلُوجِيَّات ٥

Diffugiidés (F). Diffugiidae (E).

فصيلة حويئات مجهرية مائية من الاوالي الجذريات المتخربات النفاضات. اجناسها وأنواعها المعروفة عديدة معظمها بحري يعيش في المواقع المستكنة وبعضها يعيش في المياه العذبة اخصها البحيرات || اعرف أنواعها واشهرها الدفلوج.

Nerium (S).

١٠٢٤٥ - دَفْلِي، سَمِ الحمار

Laurier-rose (F).

جنس جنبات برية وزينية معمرة من فصيلة الدفليات. انواعه عديدة. سوقها فرعاء. اوراقها عروية متقابلة او ضمية التجميع، مستطيلة النصل. ازهارها كبيرة القد، جميلة الشكل || ترغب في الاتربة الرطبة القليلة الاندماج. أشهر أنواعه ما يتبع.

١٠٢٤٦ - دَفْلِي عَطْرَة، حَبْنِ هِنْدِي

Nerium odorum (S). Laurier-rose d'Inde (F).

نوع من الدفلي عديد الضروب. مهده بلاد الهند. يعلو من مترين الى ستة امتار. ساقه فرعاء. اوراقه ضمية ثلاثية او رباعية التجميع. نصلها جامد النسيج بحري الخضار. ازهاره عطرة، عادية او مكبسة منها البيض والاحمر والصففر والارجوانية والموشحة || يرغب في المواقع الجنوية الحارة وفي الاتربة الخفيفة الرطبة || ازهاره يستمر من حزيران الى ايلول.

١٠٢٤٧ - دَفْلِي مَبْدُولَة *، حَبْنِ، حَبْنِ

Nerium oleander (S). Laurier rose d'Europe, Oléandre (F). Oleander, Rose-bay, South sea rose (E). Echter oleander, Lorbeerrosen (D). Oleandro, Oleandrio, Lauro roseo, Nerio comune (I).

نوع من الدفلي عديد الضروب موطنه حوض البحر المتوسط. يعلو من مترين الى اربعة. ساقه فرعاء. اوراقه ثنائية او ثلاثية التجميع تطول من ٦ الى ١٤ سم. وتعرض نحو ٢. نصلها جامد النسيج اطحل الخضار. ازهاره عديدة الالوان تختلف باختلاف الضروب. فيها الابيض والاحمر والوردي ومنها العادية والمكبسة. ازهاره يستمر من حزيران الى ايلول.

Apocynaceae (S).

١٠٢٤٨ - دَفْلِيَّات

Apocynacées (F). Apocynaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين. اجناسها وأنواعها عديدة تجمعها ثلاثة اسباط: العرييات والابوسينات وعود الحيات نباتاتها مختلفة الاشكال والاحجام منها الاشجار والشجيرات والجنبات والاعشاب. معظمها بري وبعضها طبي او زيني. اوراقها لاقياسية الارتكاز فيها المتقابلة والمتعاقبة والضمية. ازهارها عشكولي. ازهارها خماسية التركيب. طلعا منظور الجذرة. ثمارها قرون مزدوجة كثيرة البزور.

Scoparia (S).

١٠٢٣٢ - دَفْرَاء، دَفْر

جنس نباتات عشبية وجنبية من فصيلة الحنازيريات. انواعها المعروفة خمسة منها الحولية والمعمرة. جميعها فرعاء متشعبة. اعطائها البلاد الحارة. اوراقها كاملة متقابلة او ضمية. ازهارها صغيرة القد، فردية او ثنائية التجميع، ابطية او محورية الارتكاز يكثر فيها الابيض والازرق والاصفر. تتكاثر بالبزور وترغب في الاتربة الدبالية. أشهر أنواعها الدفراء الحلوة.

Scoparia dulcis (S).

١٠٢٣٣ - دَفْرَاء حُلْوَة

Scopaire doux (F). Sweet broom weed (E). Süßes besenkrout (D). Scopa dolce (I).

نوع من الدفراء وهي بحلة عذبة تملو من ٤٠ الى ١٠٠ سم. ساقها منتصبه كثيفة الفروع. اوراقها ضمية ثلاثية الانتشاب. نصلها اهليلجي الشكل، مسن الحافة، يطول من ٢ الى ٤ سم. ازهارها بيضاء اللون، صغيرة القد، مستطيلة المعاليق الدقيقة. ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول. يقال ان نقيع ازهارها يدر البول.

١٠٢٣٤ - دَفْرَان هو العرعر النوي، اطلبه.

١٠٢٣٥ - دَفْرِيَّات ٥، أَذْيَنِيَّات

Auriculariaceae (S). Auriculariacées (F).

Auriculariaceae (E).

فصيلة فطور من رتبة الدعاميات عديدة الاجناس والانواع المختلفة الاشكال والاحجام. تتميز بدعاماتها الاسطوانية المستقيمة وبذماتها الرمية المستديرة || من فطورها جنس واحد يدعى الزقية يتطفل على النباتات الزراعية فيؤذيها.

Répulsion (F). Repulsion (E).

١٠٢٣٦ - دَفْع

حصيلة القوى المعرضة الساعية لانفصال جرمين عن بعضهما.

Alibi

١٠٢٣٧ - دَفْع بِالغَيْبَةِ

هو دفع التهمة بالثبات وجود المتهم ساعة حدوث الجريمة في مكان ما غير الذي ارتكبت فيه.

١٠٢٣٨ - دَفْع بَعْدَمِ الاختصاص

Déclinatoire (F). Taking exception (E).

هو احد وجوه الدفع التي يثيرها المدعى عليه ليحيل الدعوى الى محكمة غير التي طرحت عليها.

١٠٢٣٩ - دَفْع تَسْوِيفِي

Exception dilatoire (F). Dilatory exception (E).

هو الدفع المقصود به كسب الوقت والمماطلة.

١٠٢٤٠ - دَفْع قَطْعِي

Exception péremptoire (F). Peremptory exception (E).

هو الدفع الذي لا يقبل جدلا.

١٠٢٤١ - دَفْعَة عَلَى الحساب

Acompte (F). Partial payment (E).

هو ان يدفع المدين جزواً مما عليه الى دائته محتسباً من الاصل.

١٠٢٤٢ - دَفْعِيَّة

Cinétique (F). Kinetics (E).

الدفعية علم يبحث في الحركة.



دفل مبذولة

نصلها مالمس البشرة بحيل الخضار العابق. ازهارها ضمية التجميع لونها الى البياض تعلو مشحة بنفسجية. عرفها فواح الرائحة المستحبة || ازهارها ربيعي .

١٠٢٥٧ - دَقْنَة عُرْد الغَسار *

Daphne laureola (S). *Daphné lauréole*, *Laurier des bois* (F). *Dwarf bay*, *Spurge laurel* (E). *Lorbeerseidelbast*, *Immergrüner seidelbast* (D). *Laureola comune*, *L. maschio*, *Caccabasso* (I).

نوع من الدفنة التزيينية والطبية. تعلو من ٥٠ الى ١٢٠ سم. فروعها منبسطة متدلية. اوراقها جلدية، جامدة، عروية. ازهارها صغيرة القد، عنقودية التجميع، فسقية اللون، لا عرف لها.

١٠٢٥٨ - دَقْنَة قَاتِلَة *Daphné tartonraire* (F). نوع من الدفنة يعرف بالكرد، اطلبه.

Daphne cannabina (S). *Daphné de Ceylan*, *Lauréole chanvreux* (F). *Indian paper tree* (E). *Hanfseidelbast* (D). *Dafne del Ceylan* (I).

نوع من الدفنة الزراعية الصناعية. تعلو من ٨٠ الى ١٥٠ سم. فروعها عديدة منتصبية. اوراقها مستطيلة ضيقة، نصلها عابق الخضار. ازهارها عنقودية، صغيرة الحجم، هامة الارتكاز، فسقية اللون. لحاء فروعها تستعمل في عدة صناعات اخصها صناعة القبعات.

١٠٢٦٠ - دَقْنَة لَاحِفَة *Daphné gnidium* (F). هو المثنان، اطلبه.

Daphne genkwa (S). *Daphné genkwa* (F). نوع من الدفنة التزيينية مهدا اليابان. تعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها متقابلة، عابطة، اهليلجية، نصلها خلي الصفحة السفلى. ازهارها ليلية عطرية. ازهارها يستمر من نيسان الى آب.

١٠٢٦٢ - دَقْنِيس *Dracaena* (S). *Dracène* (F). *Dracaena* (E).

جنس حيوانات زحافة قازبة من المظاء وفصيلة التيدييات. انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها حوض الامازون. قوتها الاعشاب والحشرات والديدان والبلاغيط... || اجسامها كبيرة القد تطول من ٧٥ الى ٨٥ سم. اذناها مستطيلة، دقيقة الاطراف. اثوابها متباينة الالوان يكثر فيها الاخضر الاصفر الموج.

١٠٢٦٣ - دَقْه *Exotisme* (F). *Exotism* (E). طابع ما هو حاكل او دافه.

Davillea (S). *Davillea* (F). *Davillea* (E). جنس نباتات برية وتزيينية معمرة من فصيلة الدلانيات. انواعه المعروفة ١٢ منبتها البرازيل || سوقها سريعة او ملتفة. اوراقها متعاقبة، معنقة، ساخدة، نصالها جامدة، شبه بيضية الشوزن. ازهارها طرفي الارتكاز او محوري، عنقودي التجميع. ازهارها صفراء اللون، عطرية العرف المستحب.

١٠٢٤٩ - دَقْن *Enfouissement* (F). *Burying* (E). هو طمر انشيء الذي وضع في التربة كالبذار والاسمدة.

١٠٢٥٠ - دَقْنَانِيَّات *Daphniphyllaceae* (S). *Daphniphyllacées* (F). *Daphniphyllaceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القعالات. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد، اعطائها المناطق الاستوائية من العالمين القديم والجديد || جميع نباتاتها اشجار حرجية متفاوتة الارتفاع والدوحة. اوراقها لاقياسية التشكيل، منها البسيطة والمركبة. ازهارها ابوية الارتكاز، منها الخشوية ومنها الثنائية المسكن. ثمارها لحمية لا تؤكل وبعضها جعالي المادة الشديدة الاذى.

١٠٢٥١ - دَقْنَة *Daphne* (S). *Daphné* (F). *Daphne* (E). جنس نباتات معمرة برية وتزيينية من فصيلة المازريونيات انواعه المعروفة نحو ٣٠ جميعها جنبات صغيرة ومتوسطة القد. اوراقها لاقياسية الارتكاز. نصلها جلدي مستطيل. ازهارها مختلفة الالوان توججتها انبوبية الشكل، رباعية التخصيص الطرفي. اسديتها ثمانية || قشورها واوراقها وازهارها حاملة الطعم خطرة تحوي بعض المواد السامة. معظمها من النباتات الجصاصة التي تألف الاتربة الكلسية. اعرفها واشهرها ما يلي.

١٠٢٥٢ - دَقْنَة أَلْبِيَّة ، مَازَرِيُون جَبَلِي *Daphne alpina* (S). *Daphné alpestre* (F). *Alpine daphne*, *Alpine chamelea* (E). *Alpen seidelbast*, *Weisser seidelbast* (D). *Daphne collina*, *Olivella alpina* (I). نوع من الدفنة الطبية والتزيينية تعلو نحو ٥٠ سم. فروعها معقدة معوجة. اوراقها لاطئة شبه ضمية. نصلها ازغب البشرة على صفحتيه يطول نحو ٣ سم. ويعرض نحو ١. ازهارها نورية التجميع، عطرية العرف، بيض || يستخرج منها مادة فعالة تدعى دفتين.

١٠٢٥٣ - دَقْنَة زَيْتُونِيَّة * ، زَيْتُون الْبَر *Daphne Oleoides* (S). *Daphné-olivier* (F). نوع من الدفنة البرية والتزيينية صغيرة القد تعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم. ساقها فروع. فروعها منتصبية زباء اللحاء. اوراقها تشبه ورق الزيتون، نصلها خلي البشرة. ازهارها بيض تعلوها قوشيح جزوي ومواج اخضر || ازهارها يستمر من نيسان الى تموز.

١٠٢٥٤ - دَقْنَة سَامَة *Daphné mézéréon* (F). اطلب مازريون.

١٠٢٥٥ - دَقْنَة صَغِيرَة * ، مَازَرِيُون مَكْبَس *Daphne cneorum*, *Thymelaea cneorum* (S). *Daphné camélee*, *Petite thymelée* (F). *Garland flower* (E). *Rosmarinseidelbast* (D). *Cneoro*, *Timelea odorosa*, *Laureola odorosa* (I).

نوع من الدفنة التزيينية تعلو نحو ٤٠ سم. فروعها زباء اللحاء. اوراقها جلدية النصل، زاهية الخضار. ازهارها هامة الارتكاز، عطرية العرف، بيضاء اللون || ازهارها يستمر من نيسان الى آب.

١٠٢٥٦ - دَقْنَة عَطِرَة *Daphne odora* (S). *Daphné odorant* (F). نوع من الدفنة مهدا الشرق. اوراقها مستطيلة ذلقة،



دفنة زيتونية



دفنة صغيرة




دفنة عود الغار



دَقِيل



دَفِيلَة



دَفِيلَة



دَقَام قَرْمَزِي



دَقْتَمُون اَبْيَض



دَقْرَان

الشمالية . يألف الغابات وضيقات البحيرات ومجاري الماء . ملجئه الحياتي جماعي . فوجه يعد من ١٠ الى ٢٠ زوجاً || جسمه صغير القند يطول نحو ١٢ سم . ثوبه عديد الالوان ، رأسه اصفر . محسراه وقذاله ورداؤه وذنبه الى السواد الجزوي الموج . جناحاه الى الجؤرة ، لواحف الجناح . رقوشة بالحنطي . زوره وصدره وبعطه الى الحمرة القرمزية . فخذاه وزمكاه الى الحنطي . منقاره شديد السمرة . حدقة عينه كستنية اللون . رسفاه الى الطحلة || قوته الحشرات والاساريع والديدان والبزور البرية || يدثن عشه في الادغال . الانثى تضع من ٢ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها نحو ١٣ يوماً بيها الذكر يزمن لها الغذاء .

Dictamnus (S).

١٠٢٧٤ - دَقْتَمُون

Fraxinelle (F). Fraxinella (E).

جنس نباتات عشبية طبية معمرة من فصيلة السدابيات اوراقها مركبة متقابلة . وريقاتها بيضيه يراوح عددها من ٧ الى ١١ . ازهارها عطرية الرائحة سنبلية التجميع متراكبة الالوان || انواعه قليلة العدد اعرفها الدقتمون الابيض .

١٠٢٧٥ - دَقْتَمُون اَبْيَض * ، دُرَيْدَار اَبْيَض

Dictamnus alba (S). Fraxinelle blanche (F). White fraxinella, Candle plant, Gasplant (E). Echter dip-tam, Weisser diptam (D). Dittamno bianco, Frasinello (I).

نوع من الدقتمون المعطري الطلي والزييني يعلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم . اوراقه مركبة تطول نحو ٢٠ سم . وريقاتها بيضيه طولها يراوح من ٤ الى ٦ سم . نصلها باهت الخضار سنن الحافة . ازهاره سنبلية لونها الى الابيض المصلم بالارجواني . جذوره نافعة مقوية . وهو نبات طوعي في لبنان يوجد في غابات الجبل الاقارع || ازهاره يستمر من ايار الى تموز .

١٠٢٧٦ - دَقَر الدقر: الروضة الحسناء العميمة النبات .

١٠٢٧٧ - دَقْرَان * Treills (F). Treills (E).

وشية من خشب ار حديد ناطبة العوارض .

١٠٢٧٨ - دُقْسَة هي الاليز ، اطلها .

١٠٢٧٩ - دُقْسَة البَقُول Altise potagère (F).

راجع التيز البقول .

١٠٢٨٠ - دُقْسَة التَبغ Altise du tabac (F).

راجع التيز التبغ .

١٠٢٨١ - دُقْسَة الزَّرْع Altise des céréales (F).

راجع التيز الزرع .

١٠٢٨٢ - دُقْسَة الكَرْمَة Altise de la vigne (F).

راجع التيز الكرمه .

١٠٢٨٣ - دُقْسَة زَرْقَاء Altise bleue (F).

راجع التيز زرقاء .

١٠٢٨٤ - دُقْشَة Bestiole (F). Little animal (E).

كل دويبة رقطاء رقطاء صغيرة القند اصغر من العظاء .

Dafila (S).

١٠٢٦٥ - دَفِيلَة *

Pilet (F). Pintail (E).

جنس طير من البطيات . انواعها ثلاثة جميعها من القواطع . اجسامها كبيرة تطول من ٦٠ الى ٦٥ سم . تتميز باثوابها المبقة المتراكبة الالوان وبمناقيدها المنقاشية الاطراف وباذنابها المخروطية المستطيلة . مناقشها صغيرة متباعدة . اجنحتها مستطيلة ذلقة || الانثى اصغر قدماً من الذكر واهت ثوباً منه . قوتها الاعشاب وجميع الدويبات المائية . تألف الدجن اذا اخذت صغيرة وتتصالب مع البط || تدثن اعشاشها في العشب على ضفاف مجاري الماء . الاناث تبيض وتحضن من ١٠ الى ١٢ بيضة || تعيش جماعات متفاوتة العدد . سرها يراوح من ٣٠ الى ٦٠ زوجاً || تعتبر من الطرائد المستحبة . لحمها جيد الصنف مرغوب فيه .

اما انواعها الثلاثة فهي :

١٠٢٦٦ - دَفِيلَة الشَّيْلِي Dafila oxyura (S).

Pilet de Chili (F).

١٠٢٦٧ - دَفِيلَة بَهَامَا Dafila bahamensis (S).

Pilet de Bahama (F).

١٠٢٦٨ - دَفِيلَة مُسْتَطِيلَة اللَّكَب

Dafila acuta (S). Pilet acuticaude (F).

١٠٢٦٩ - دَفِيْشَة * Couche (F). Hotbed (E).

هي الجهاز المعد للحصول على زراعات باكورية بواسطة الحرارة المصطنعة . والدفيشة قد تكون على ثلاثة اشكال :

دَفِيْشَة حَارَة Couche chaude (F). Warm hotbed (E).

دَفِيْشَة فَاتَرَة Couche tiède (F). Tepid hotbed (E).

دَفِيْشَة ضَعِيْفَة Couche sourde (F). Dead hotbed (E).

١٠٢٧٠ - دَفِيْشَة الْبَوَاكِيَر ، بَكَارَة Forcerie (F).

Forcing-house (E).

هي البكارة . بناء زجاجي او نصف زجاجي يستعمل لزراعة البواكير .

١٠٢٧١ - دَفِيْشَة الْعِنَب ، مِعْنَبَة Grapperie (F).

Vinery (E).

دفيشة خاصة بالكرمه تستعمل لانتاج العنب من اواسط فصل الشتاء الى اواسط فصل الربيع .

١٠٢٧٢ - دَقَام Lanarius (S). Gonolek (F).

جنس طير من فصيلة الصرديات . انواعه المعروفة نحو ٤٠ موطنها يمتد من افريقية الشرقية الى الشمالية والجنوبية . تألف الغابات وضيقات مجاري الماء والادغال . ملجئها الحياتي جماعي . جماعاتها متفاوتة العدد الذي يراوح من اربعة ازواج الى مئة زوج واكثر || اجسامها ربة صغيرة القند تطول من ١٠ الى ١٤ سم . اثوابها متداخلة الالوان الزاهرة . تتميز بقصر اجنحتها وباستطالة اذنانها المستديرة الاطراف || قوتها الحشرات والاساريع والديدان وبعض البزور البرية || اعرف انواعه واشهرها الدقام القرمزي .

١٠٢٧٣ - دَقَام قَرْمَزِي *

Laniarius barbarus (S).

Gonolek écarlate, G. de Barbarie (F).

طائر من الدقام . موطنه يمتد من افريقية الشرقية الى

أنواعه المعروفة نحو ٢٠ أعطانها بعض اقاليم امريكة الجنوبية || اجسامها صغيرة تطول من ١٥ الى ١٨ سم. اثنائها جميلة الالوان الزاهية ، فيها الاحمر والاخضر والازرق والاصفر || ملجئها الحياتي جماعي . جماعاتها لا تتجاوز ٣٠ زوجاً || قوتها الحشرات والديدان والثمار اليابسة .

١٠٢٩٢ - دُقَيْيش *
Tanysiptera (S).
Tanysiptère, Halcyon de paradis (F).
جنس طير من المازوريات . انواعه قليلة العدد . اجسامها متوسطة القد . اثنائها متراكبة الالوان . رؤوسها واجنحتها الى الزرقة الزاهية . محاسرها وظهورها وجوانب اعناقها سود . صدورها وبطنها الى الصبغة الوردية . افانيكها وثنيج ظهورها بيض . وهي تألف الاحراج والغابات . قوتها الحشرات (راجع مازوريات) .

١٠٢٩٣ - دُقَيْيق ، طَحِين *
Farine (F). Flour (E).
مسحوق ناعم يحصل من طحن حبوب القمح والذرة والشعير . الخ ... وهو يستعمل بعد اصطناعه طعاماً للانسان والحيوان .

١٠٢٩٤ - دُقَيْيلة *
Doassansia
جنس فطور مجهرية من فصيلة النخريات يلاكب بعض النباتات البرية من مختلف الفصائل || يصيب النسيج النباتية في الميزوفيل حيث ينمو ويتكاثر فيسبب انفجار بشرة النصل وظهور بؤغ الفحيم الهبابي || ذميخته البوشية مغلقة بغشاء دقيق تكسوه البويضات العاقرة .

١٠٢٩٥ - دُكَاع
داء يأخذ الخيل والابل في صدورهما . فالمصاب به مذكوع .

١٠٢٩٦ - دُكُوتة *
Dictyota (S).
Dictyote (F). Dictyota (E).
نبات بحري من الخفيات البسر . اعطانه بحار البلاد المعتدلة الحرارة || كلاليتها قصيرة . ساقها فرقة متوالية الانشعاب .

١٠٢٩٧ - دُكُتِيل *
Dactylis (S).
Dactyle (F). Dactylis (E).
جنس نباتات عشبية برية من فصيلة النجيليات . انواعه المعروفة ٣٠ معظمها علني ترعاها الماشية . اشهر انواعه واعماها الدكيتيل المكبب .

١٠٢٩٨ - دُكُتِيل مُكَبِّب * ، تَيْل عمران
Dactylis glomerata (S). Dactyle pelotonné, Herbe des vergers (F). Cock's-foot, Orchard grass, Hard grass (E). Gemeines knänelgras (D). Dattilo aggomitolato, Erba mazzolina (I).

سماء الامير مصطفى الشهابي «اصبغة مجتمعة» || نبات عشبي بري كلاتي معمر من فصيلة النجيليات يعلو من ٤٠ الى ١٥٠ سم . اوراقه كثيفة التجميع ضمية لونها الى الاخضر العابق الازرق الموج . نصلها مستطيل الشكل جامد النسيج ، اصفر الختار || سنابلها كباب مستطيلة لينة || وهو من النباتات المبذولة التي تكثر في الجنائن والحدائق وقد يزرع كنبات كلاتي وعلني كما يصلح للخضير والغضاري .

١٠٢٨٥ - دُقل *
Ducula (S).
Ducule (F). Ducula (E).
الواحدة دقلة . جنس طير من فصيلة الحماميات . انواعه المعروفة نحو عشرة . اعطانها بعض مناطق الشرق الاقصى . تألف البراري والاكمام . ملجئها الحياتي جماعي . جماعاتها قليلة العدد الذي يراوح من ٥ الى ٢٠ زوجاً . قوتها البزور والحبوب والحشرات || اجسامها متوسطة القد تطول من ٢٥ الى ٣٢ سم . اثنائها سوية الالوان . رؤوسها وظهورها واجنحتها واذناتها اعقب من صدورها وبطنها . الالوان السائدة هي الشققة السمراء والطحلة الزرقاء الموج . عيونها مكحلة بالاسود . اجنحتها معتدلة الحجم ذلقة الاطراف . اذناها كبيرة مستديرة الاطراف || تدثن اعشاشها في الاشجار الداسية . الاناث تحضن من ٣ الى ٤ بيضات على ثلاث او اربع مرات في الحول بينها الذكور تؤمن لها الغذاء .

١٠٢٨٦ - دُقْبارة *
Decumaria (S). Décumaire (F).
جنس نباتات جنبيه معمرة متسلقة من فصيلة السفريات . انواعها المعروفة ثلاثة منبتها بعض اصقاع امريكة الشمالية . زراعتها التزيينية شائعة في حدائق البلاد المعتدلة الحرارة . مرقها سريعة ، متسلقة ، فراء . اوراقها متعاقبة ، صغيرة التصال المتسامكة الحملية البشرة . ازهارها فردية ، محورية ، بيضاء اللون ، عطرية العرف .

١٠٢٨٧ - دُقَمَاق ، دُقَمَاقَة *
Bagrus docmac
سمكة نهريه من فصيلة السلوريات تكثر في الفرات وتوجد في النيل والنيجر .

١٠٢٨٨ - دُقَنَاش *
هو الصرد الوردي ، اطلبه .

١٠٢٨٩ - دُقَنِيد *
Dacne (S).
Dacné (F). Dacne (E).
جنس حشرات من فصيلة الدقنيديات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعها المعروفة ١٢ منتشرة في بعض مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، اهليلجية الشكل ، تطول نحو ٦ مم . رؤوسها مستعرضة ، صغيرة . عيونها بارزة . تأثيرها ولامسها نظامية . قرونها الاستشعارية دبوسية الاطراف . كواسلها كبيرة محدبة . اغمارها لاحفة ، مخددة . قوائمها صغيرة . اثنائها ثنائية اللون || تعيش مع يرقاتها على الفطور وعلى النباتات الخفية الزهر .

١٠٢٩٠ - دُقَنِيدِيَّات *
Dacnidae (S).
Dacnides (F). Dacnidae (E).
فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، اعطانها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، بيضية الشكل او اهليلجية ، تطول من ٢ الى ٧ مم . رؤوسها صغيرة . عيونها بارزة . تأثيرها ولامسها نظامية . قرونها الاستشعارية دبوسية الاطراف ، مركبة من ١١ فصلة . كواسلها كبيرة ، محدبة . اغمارها لاحفة . قوائمها نشيطة . ارساغها خاسية العقل . اثنائها ملونة || تعيش على الفطور وعلى مختلف النباتات الخفية الزهر || اشهر اجناسها الدقيد .

١٠٢٩١ - دُقَنِيْس *
Dacnis (S).
Dachis (F). Dacnis (E).
جنس طير من الجوائم سنيت المناقير وفصيلة المغنريات .



دقل



دقيد



دقيس



دقش



دقيلة



دكوتة



دكيتيل مكبب

الغذاء والحماية || يألف القفص ويقلد الاصوات والنهات التي يسمها .

١٠٣٠٥ - دِكُرُورِيَّات ٥
Dicuridae (S). Dicuridés (F). Dicuridae (E).

فصيلة طير من الجواثم سنيات المناقير . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة اعطائها المناطق الحارة من العالم القديم || اجسامها متوسطة القد . اثنائها متباينة الالوان يغلب فيها الاسود الاسفع الموج . بعض انواعها متوج الرأس ، كثيف السبال . اذناها فارقة مؤلفة من اثني عشرة رقعة . اشهر اجناسها الدكروور والصلب والكسطان .

١٠٣٠٦ - دَكْرِيْد
Dacryde (F).

الدكريد نبات شجري طقسومي دائم الخضار يدعى دماعه اطلبها .

١٠٣٠٧ - دَكْرِيزَة القُرَاص ٥

Diacrisia urticae (S). Diacrise des orties (F).
Diacrisia urticae (E).

حشرة من فصيلة الحرمديات ورتبة حشرقيات الاجنحة . موطنها بعض اقالم حوض البحر الابيض المتوسط . فراشها جارية قوتها رحيق الازهار . سرقها خاضعة قوتها اوراق النباتات البرية الحولية واخصها القراص || جسمها معتدل القد يطول نحو ١٥ مم . بسطتها نحو ٤٠ مم . رأسها معتدل الجرم . عينها كبيرتان . زباناها حساسيا الشكل ، مشطيا التركيب . جوشنها حنطي اللون اصفر الموج . بطنها بني اللون تملوه ثلاثة صفوف من النقط الكستنية || رواشن الذكر الى البياض التني يعلوه في الزوج الامامي ثلاث نقط كستنية . رواشن الانثى الى البياض التني يعلوه مشحة سمراء || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في حزيران وتبقى حتى آب . تسرح في الليل . تعاظم بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتج المكن ميعاديا على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || المرفة عند الادراك التام تطول نحو ٢٤ مم . جسمها شبه اسطواني الشكل ، اسمر اللون ، اطحل الموج ، تملوه مجموعات من اللمب الدقيق الاشقر تكتنف كامل الجسم باستثناء الرأس والشرح . رأسها اسود اللون . مدنها ودواجها الى السمرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ستة اسابيع ينقضي داخل صليجة .

١٠٣٠٨ - دَكْرِيزَة صَفْرَاء ٥

Diacrisia lutea (S). Diacrise jaune (F).
Diacrisia lutea (E).

حشرة من فصيلة الحرمديات ورتبة حشرقيات الاجنحة . موطنها معظم اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط . فراشها جارية قوتها رحيق الازهار . سرقها خاضعة قوتها اوراق النباتات البرية || جسمها معتدل القد يطول نحو ١٤ مم . بسطتها تراوح من ٢٨ الى ٤٠ مم . رأسها معتدل الجرم عينها كبيرتان . زباناها مشطيان مستطيلان . جوشنها كثيف الخمل اصفر اللون . بطنها بني اللون . اصفر الموج تملوه ثلاثة صفوف من النقط الكستنية المستطيلة || رواشن الذكر الى الصفار التني يعلوه في الزوج الامامي موج اشقر وتنقيط كستني ويعلوه في الزوج الخلفي مشحة شقراء وخمس نقط كستنية . رواشن الانثى ابهت خضابا والزوج الامامي يعلوه تسع نقط بدلا من ١٥ عند الذكر . اما الزوج الخلفي فمادم النقط || لها جيل واحد في الحول .

١٠٢٩٩ - دِكْتِينَة ثَوِيَّة ٥
Dictyna civica (S). Dictyne civique (F).

دويبة من العناكب وفصيلة الدكتينيات . جسمها صغير القد يطول نحو ٣ مم . صدراسها مبسط الجرم ، مخروطي الشوزن ، اسمر اللون . عينها زئمتان . شيسفاها دقيقان . جرمها مستطيلة ، كثيفة اللمب . بطنها بيضي الشكل ، اطحل اللون ، تملوه زركشة سوداء تشبه الصليب || تألف جميع الاماكن . شعها قمعي الشكل ، متبدل الحبك ، منفرج النواطب ، يتوسطه أنبوب متين || قوتها الحشرات الصغيرة اخصها الذباب والهوم . بياتها الشتوي يستمر نحو خمسة اشهر ينقضي ضمن صليجة صغيرة تنسجها بين الحجارة التي لا يغمرها الماء || ملجئها التناسل لا يختلف عن ملجئ سائر العناكب || تعتبر من الدويبات اللامؤذية النافعة .

١٠٣٠٠ - دِكْتِينِيَّات ٥

Dictynidae (S). Dictynidés (F). Dictynidae (E).

فصيلة عناكب من رتبة الرتيلاوات . اجناسها وانواعها المعروفة نحو ١٥٠ منتشرة في جميع بلاد العالم || جميعها مفترسة ، صغيرة القد ، ثنائية الروايا ، سداسية المشاقن ، مجهزة الشيايف بمخاف محجنة نحو الداخل || اثنائها متباينة الالوان والزركشة . شعها متبدلة الحبك ، منفرجة النواطب تقيمها على مختلف النباتات وبين الصخور وفي كل مكان تتوقع فيه كثرة الصيد . اشهر انواعها الدكتينة .

١٠٣٠١ - دِكْرَان ٥

دِكْرَان ٥
Placosphaeria (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة الصغفيات . بكنيداتها كثيرة العدد تحضنها ونيمة لينة سمراء اللون تتمركز في الميزوفيل . شقيراتها خيطية ، بويضاتها مستطيلة . انواعها عديدة تعيش على الخشب واللحاء وبعضها يتطفل على الاوراق فيوشها يقع سود قليا تكون سيرة المواقب .

١٠٣٠٣ - دَكْرُور ٥

Dicrurus (S). Drongo (F). Drongo (E).

جنس طير من الجواثم سنيات المناقير وفصيلة الدكروريات . انواعه المعروفة نحو ٢٠ موطنها بعض المناطق الاسيوية اخصها مناطق الجنوب الشرقي . ملجئها الحياتي زوجي . مسرحها الحراج . قوتها الحشرات والديدان . تألف حياة الاسر وتقلد الاصوات التي تسمعها || اجسامها تطول من ٢٠ الى ٣٨ سم . اثنائها سوداء اللون ، زرقاء الموج او خضراء . مناقبها ضليعة ، حادة الاطراف . اذناها فارقة . اشهر انواعه الدكروور المخداف .


١٠٣٠٤ - دَكْرُور مِخْدَاف ٥

Dicrurus remifer (S). Drongo à rames (F).

نوع من الدكروور . موطنه جزيرة جاوا . طوله نحو ٣٨ سم . رقعا ذنبه الخارجيتان مستطيلتان تلتحيان بتصلين ، شبه المخداف ، طولها نحو ٢٠ سم . ثوبه الى السواد العابق يعلوه موج ازرق . رأسه صغير القزعة || قوته الحشرات والزبابير والنحل || يدثن عشه على اغصان الاشجار الفارشة . الانثى تحضن من ٢ الى ٤ بيضات بينها الذكر يؤمن لها



دكتينة ثوية



دكرانية



دكروور مخداف



دكريزة القراص



دكريزة صفراء

١٠٣١٦ - دُكَيْنَاء سَمَرَاء الْبَطْن *٥

Dipœna melanogaster (S). *Dipœne mélanogaster* (F). *Dipœna melanogaster* (E).

نوع من الدكيناء وفصيلة الشبازيات . جسمها صغير القد يطول نحو ٧ مم . عند العنكب ونحو ١٢ مم . عند العنكبة . صدراسها مزواني الشوزن ، اسود اللون تتوسطه بقعة دائرية بيضاء تعلوها نقطة سوداء . عيناها زُميتان . شيفافها صغيران ذريان . فكاهما دقيقتان يحلان في طرف كل منهما كتلة صغيرة لوزية الشكل ، مبعثرة الحلب . جرامزها قوية مستدقة . بطنها بيضي الشكل ، حنطي اللون ، اسمر المولج ، تعلوه عشر نقط بيض || تألف البراري وغابات الصنوبر والشربين . شعثها لا قياسي الشكل والرحابة ، كثير الشراك اللامتساوية تلسج بين الاغصان والافناد والافنان || قوتها الحشرات الصغيرة والذباب والهوم . تعتبر من الدوبيات المفيدة اللامؤذية .

١٠٣١٧ - دَلَاخ *٥

Regalecus (S). *Régalec, Gymnètre* (F) *Regalecus* (E).

جنس اسماك بحرية ببوضة من فصيلة العنجيليات ورتبة شائكات الزعانف . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها تشمل بحار البلاد الحارة وبعض مناطق البحر الابيض المتوسط || اجسامها سوطية الشكل تطول من ١٥٠ الى ٢٢٥ سم . رؤوسها متوجة بكشتين جالستين وهي مستغلظة الشكل مقطومة الفك الاسفل الجالس الشدق . ازوارها تحمل ارياش غضروفية مستطيلة . زعانفها الظهرية تمتد من القفن الى طرف الذنب وتنتهي بقضام من المناخص || اثوابها الى الطحلة المتباينة المائجات . اشهر انواعها الدلاخ الفضي .

١٠٣١٨ - دَلَاخ فِضِي *٥

Regalecus gladius (S). *Régalec épée, Roi des harengs* (F).

Regalecus gladius (E).

نوع من الدلاخ . اعطانه تمتد من شمال البحر الابيض المتوسط الى المحيط الاطلسي . ثوبه الى الطحلة الفضية المولج . جسمه يطول من ١٨٠ الى ٢٠٠ سم . || لحمه كاعن الصنف ، قل من يرغب فيه .

١٠٣١٩ - دَلَاغ *٥

Strombus (S). *Strombe*

جنس حلازين كبيرة القد . انواعه عديدة يكثر وجودها في البحر الاحمر وبحر الهند وفارس . واحده دولعة ودلاعة . اشهر انواعه السرنباقي والقبضان والطار . والدلاغ ايضاً هو البطيخ ، اطلبه .

١٠٣٢٠ - دَلَاغِيَّات *٥

Strombidae (S).

Strombidae (F). *Strombidae* (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل اماميات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة بعضها من متحجرات الاحقاب الطباشيرية والثالثية والبعض الآخر معاصر منتشر في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اعرف اجناسها واشهرها الدلاغ والجلاهب والصيكم والظهور والمشمبة .

١٠٣٢١ - دَلَاق *٥

Evagination (F).

Evagination (E).

الدلاقة نشوز الشيء من غده تلقائياً .

تظهر الفراشة في حزيران وتبقى حتى تموز . تسرح في الليل . تعاغل بعد ظهورها باربعة اسابيع . تمتح المكن ميحادياً على فصائل الاوراق || السرفة تطول نحو ٢٢ مم . جسمها شبه اسطواني الشكل ، اطحل اللون ، زيتي المولج ، تعلوه مجموعات من الحلب . الاغبر . رأسها اسود . مذهبها ورواجهها الى الطحلة الشديدة السمرة || طور الاكمال يستمر نحو اربعة اسابيع وينقضي ضمن صلجة مركبة من حنات النبات والحلب مع ما تفرزه السرفة لهذه الغاية .

١٠٣٠٩ - دِكْستروز

Dextrose

هو سكر العنب .

١٠٣١٠ - دِكْسترين

Dextrine (F). *Dextrin* (E).

مادة صمغية تُستخرج من النشا .

١٠٣١١ - دِكْسمين *٥

Dexamena (S).

Dexamène, Dexamine (F). *Dexamena* (E).

جنس دربيات بحرية من الفشريات مزدوجات الارجل وفصيلة الغمروسيات . انواعه المعروفة نحو عشرة بعضها لحي يعيش في الاعماق السحيقة والبعض الآخر مجداحي . اعطائها بحار البلاد المعتدلة الحرارة ومنها البحر الابيض المتوسط || اجسامها صغيرة القد . ملابسها الفكية مجهزة بطبقيات شائكة .

١٠٣١٢ - دِكْسيّة *٥

Dexia (S).

Dexie (F). *Dexia* (E).

جنس حشرات ذبابة من ذوات الجناحين وفصيلة النقيريات انواعها المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها معتدلة الجرم ، مستطيلة الشكل والقوائم ، قصيرة المصحات المتكاثفة الحلب . اثوابها تختلف مع الانواع . تكثر فيها الكهبة والشقحة || اشهر انواعها واعماها الدكسية السبروقية التي تدعى ايضاً نغير سبروتي .

١٠٣١٣ - دِكْسييد

Dixides (F). *Dixa* (E).

عمارة من البعوضيات اجناسها وانواعها عديدة جميعها صغيرة القد . اجسامها واجنحتها خالية من الحراشف والحلب . اعطائها قصيرة . متاكها رهوة . اناتها لا تقوى على امتصاص الدم . وهي تعيش قرب الماء وفوقه وعلى جميع انواع النباتات المائية والمنقعية والنهرية .

١٠٣١٤ - دِكْسيمّة *٥

Atropa, Orthotrope (F).

Atropous (E).

اسم يطلق على كل ببوضة مستقيمة النسيلة الواقعة في امتداد الفنقل .

١٠٣١٥ - دُكَيْنَاء *٥

Dipœna (S).

Dipœne (F). *Dipœna* (E).

جنس عناكب صغيرة من ثنائيات الروايا ، سداسيات المشائن وفصيلة الشبازيات . انواعها المعروفة نحو ٤٠ اعطائها البلاد المعتدلة الحرارة . تعيش بين الاشجار وعليها واخصها اشجار الفصيلة الصنوبرية . ومنها انواع تعيش بين النباتات العشبية وتخلد عكادها تحت الحجارة والطحالب والشبا . شعثها لاقياسي الشكل يختلف مع اختلاف الانواع || اجسامها صغيرة القد . بطونها رقيقة الشكل . قرونها الاستشعارية مدبسة الاطراف . اثوابها الى الربدة ، بطونها مبقجة بالاصفر ، عدد البقيج يختلف من نوع الى نوع ويراوح من ٤ الى ١٢ || جميع انواعها مفيدة لامؤذية .



دِكْسمين



دكسية



دِكَيْنَاء سَمَرَاء الْبَطْن



دَلَاخ فِضِي



دَلَاغ

اضواج فصوصها عيقة تبلغ الضلع. ازهاره عنقودي،
عناقيد خاسية او سباعية الثمار || يزرع للتزيين كسائر
انواع الدلب.

١٠٣٣٠ - دلب غربي، دلب امريكي

Platanus occidentalis (S). *Platane d'Occident* (F).
American plane tree (E).

نوع من الدلب مهدد امريكي الشمالية يعلو من ٢٠ الى
٤٠ م. نفاضة قشوره صغيرة القد مستطيلة. اوراقه
ثلاثية التفصيص متساوية الطول والعرض || يزرع
ويستعمل كسائر انواع الدلب.



دلانية

١٠٣٣١ - دلب قيقبي، صرا، عيشام

Platanus acerifolia (S). *Platane à feuilles d'érable* (F).

نوع من الدلب مهدد الشرق. يعلو من ٢٠ الى
٤٠ م. نفاضة قشوره مستطيلة الصفائح. اوراقه خاسية
التفصيص. فصوصها ذلقة الزام الطرفي. اضواجها قليلة
العمق. نصلها متساوي الطول والعرض || تكثر زراعته
على جوانب الطرقات وضياف الانهر.



دلب

١٠٣٣٢ - دلب هندي، هر الساج، اطلبه.

Dalbergia (S). *Dalbergie* (F).

جنس نباتات معمرة من فصيلة القرنيات الغراشية. انواعه
كثيرة العدد معظمها جنبات. عارشة وبعضها اشجار
وشجيرات منبها البلاد الاستوائية والحارة. اوراقها مركبة،
ريشية، متعاقبة. ازهارها عنقودية التجميع يغلب فيها
اللون الابيض. ثمارها سفية، بزورها قليلة العدد.
اخشائها ناعمة الرقعة، شديدة الصلابة، فاخرة الصنف.
اعرف انواعه واشهرها دلبرجية سيسو ودلبرجية شنف
الديك

١٠٣٣٤ - دلبرجية سيسو، سيسو، ساسم أصفر

Dalbergia sissoo (S). *Dalbergie sissoo*, *Ebenier jaune*
(F). *Sisso tree*, *Shisham*, *Back wood* (E). *Sissoobaum*
(D). *Sissie*, *Ebano giallo* (I).

نوع من الدلبرجية شجرته تملو من ٦ الى ١٠ امتار
منبها البلاد الحارة الاستوائية. خشبها اصفر اللون فاخر
الصنف عزيز الوجود.



دلبرجية سيسو

١٠٣٣٥ - دلبرجية شنف الديك، شنف الديك

Dalbergia arborea, *Pongamia glabra* (S). *Dalbergie*
du Guadeloupe, *Arbre de Pongalote*, *Pongamie*
(F). *Indian beech*, *Ponga oil plant* (E). *Mondboh-*
ne (D). *Pongamia* (I).

نوع من الدلبرجية شجرته تملو من ٦ الى ١٢ م. منبها
البلاد الحارة. خشبها احمر اللون، فاخر الصنف.



دلبوث

١٠٣٣٦ - دلثوث، سيف الغراب، غلديول

Gladiolus (S). *Gladiole*, *Glaieul* (F). *Gladiole*, *Sword*
lily (E). *Gladiole*, *Siegwurz* (D). *Gladiolo*, *Giaggino-*
lo, *Iride* (I).

جنس نباتات بصلية من فصيلة السوسنيات انواعه وضروبه
وهجنه عديدة. اوراقه سيفية الشكل وحيدة او مزدوجة
التصنيف. ازهاره متتابعة هامية جميلة الشكل زاهية
الالوان ترتكز على شراخ ثنائي الحرف يبطط الشكل
منتصب القامة || اشهر انواعه وهما له ما يتبع:

١٠٣٣٣ - دلالة *Crée* (F). *Auction* (E).
المناداة عالياً عند البيع بالمزاد العلني.

١٠٣٣٤ - دلاميئات

Excipulaceae (S). *Excipulacées* (F). *Excipulaceae* (E).

فصيلة فطور مجهرية من رتبة الزوميات. اجناسها وانواعها
عديدة تتميز ببيكنيداتهما الجامية الشكل، الفحمية اللون.
اجناسها عديدة معظمها لا علاقة له بالاقتصاد الزراعي.
اعرفها واشهرها: الدجاجة، الدتشيروا، الديسكوله،
الديسللا، السبورونيمه والظنية.

١٠٣٣٥ - دلانيات

Dilleniaceae (S). *Dillénacées* (F). *Dilleniaceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة العقالات اجناسها
١٦ وانواعها ٢٨٠ جميعها اشجار وشجيرات وجنبات.
جنباتها عارشة. اوراقها بسيطة، متعاقبة، مستطيلة
النصل. ثمارها عنبية لحمية غير مأكولة. بزورها غنية
بالمواد النشوية || اشهر اجناسها الدلانية.

١٠٣٣٦ - دلآله

Dillenia (S). *Dillénie* (F).

Showy dillenia (E). *Rosenapfel* (D). *Dillania* (I).

جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة الدلانيات معقودة
الهورية على اسم العالم دلائوس. انواعه المعروفة ثمانية
جميعها اشجار هندية وصينية المنبت تملو من ٦ الى ١٥ م.
واوراقها متعاقبة، معتقة، اهليلجية، نصلها مالمس
البشرة بحيل الخضار الزاهي. ازهارها ابضية الارتكاز،
خاسية البتلات، قرصية الاسدية. ثمارها عنبية حامزة
مرذولة. اما رحيق زهرها فغزير المادة، مستحب الطعم،
عطري الدف، قابل الامتصاص.

١٠٣٣٧ - دلب

Platanus (S). *Platane* (F).

Plane tree (E). *Platane* (D). *Platano* (I).

جنس اشجار كبيرة القد من فصيلة الدليات. انواعه
سته جميعها اشجار ضخمة، منتصبه الساق، دائمة
الاغصان، مستديرة القنة. تملو من ٢٠ الى ٤٠ م.
قشور جذوعها صافحة نافضة. اخشائها صلبة خشنة
الرقعة تتشقق مع العمر. اوراقها متعاقبة، معتقة،
عابلة، نصلها كفي مفصص. ازهارها قدي التجميع.
ازهارها وحيدة السكن || ترغب في المواقع الرطبة.
تجود على ضفاف الانهر والجداول || اشهر انواعه
واعمها زراعة ما يلي

١٠٣٣٨ - دلب شرقي، صنار، جُنار

Platanus orientalis (S). *Platane d'Orient* (F). *Orien-*
tal plane tree (E).

نوع من الدلب يشمل بعض الضروب. مهدد الشرق
الاوسط يعلو من ٢٠ الى ٤٠ م. نفاضة قشوره كبيرة
الصفائح. اوراقه خاسية اوسباعية التفصيص. طولها
وعرضها متساويان يراوحان من ١٨ الى ٢٥ سم. اضواج
فصوص الاوراق عميقة التفريص، رجة الزاويا || تكثر
زراعته على جوانب الطرقات وقرب الماء.

١٠٣٣٩ - دلب عنقودي

Platanus racemosa (S). *Platane à grappes* (F).

نوع من الدلب مهدد بلاد كليفورنية. يعلو نحو ٢٥ م.
نفاضة قشوره صغيرة القد بيضية الشكل. اوراقه خاسية
او ثلاثية التفصيص، نصلها ازغب الصفحة السفلى،

١٠٣٤٤ - دَلْبُوثُ شَائِع. *Gladiolus communis* (S). *Glaïeul commun* (F).

نوع من الدلبوث البري يعلو من ٣٠ إلى ١٠٠ سم. أوراقه سيفية تطول من ٢٠ إلى ٤٠ سم. سنبلة الزهرية تعد من ٦ إلى ١٠ أزهار متتابة الارتكاز على جهة واحدة لونها إلى الحمرة البنفسجية الباهتة. بتلاتها منفرجة مستعرضة، متك ساداتها أقصر من خويطها || يكثر في الجبال وفي الحقول وبين الزروع. أزهاره يستمر من أيار إلى حزيران.

١٠٣٤٥ - دَلْبُوثُ فَرَّاشِي. *Gladiolus papilio* (S). *Glaïeul papillon* (F).

نوع من الدلبوث يعلو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. أوراقه سيفية مستطيلة ومعتدلة العرض. أزهاره كبيرة القدر. بتلاتها العليا صفراء اللون، قرمزية أو بنفسجية الطوق. بتلاتها السفلى بيضاء اللون تعلوها لطخة حمراء تمتد من أوسط البتلة إلى قاعدة انتشاشها || أزهاره يستمر طوال الصيف.

١٠٣٤٦ - دَلْبُوثُ قَرَوِي. *Gladiolus byzantinus* (S). *Glaïeul de Constantinople* (F).

نوع من الدلبوث يعلو من ٥٠ إلى ٨٠ سم. أوراقه سيفية. سنبلة الزهرية تعد من ٦ إلى ١٠ أزهار متتابة الارتكاز على جهة واحدة لونها إلى الحمرة البنفسجية العابقة. بتلاتها الثلاث العليا متقاربة متساوية أما الثلاث السفلى فتعرضة ومجنحة. متك ساداتها يعادل خويطها. بزورها مجنحة || أزهاره يستمر من نيسان إلى أيار.

١٠٣٤٧ - دَلْبُوثُ كَرْدِيَنَاي

Gladiolus cardinalis (S). *Glaïeul cardinal* (F).

نوع من الدلبوث يعلو من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. أوراقه سيفية مستطيلة. سنبلة الزهرية تعد من ١٠ إلى ٢٠ زهرة متتابة الارتكاز على جهة واحدة. لونها إلى الحمرة القرمزية اللامعة يعلوها توشيح أبيض. بتلاتها ضيقة تطول نحو ٥ سم. || أزهاره يستمر من تموز إلى آب.

١٠٣٤٨ - دَلْبُوثُ كَلْفِيل. *Gladiolus colvillei* (S). *Glaïeul de Colleville* (F).

ضرب من الدلبوث الهجين. أزهاره صغيرة القدر وحيدة الصف. بتلاتها أرجوانية اللون يعلوها تلطخ أصفر وأبيض || أزهاره يستمر من حزيران إلى تموز.

١٠٣٤٩ - دَلْبُوثُ مُشَعَّب

Gladiolus ramosus (S). *Glaïeul ramifié* (F).

ضرب من الدلبوث الهجين. سواخه عديد الشعب السنبلية النحيلة. أزهاره متوسطة القدر كثيرة العدد. بتلاتها إلى الحمرة الزاهية يعلوها عند قاعدتها لطخة خمرية عابقة. أزهاره يستمر من تموز إلى آب.

١٠٣٥٠ - دَلْبُوثُ مُتَقَابِلُ الزَّهَر

Gladiolus oppositiflorus (S). *Glaïeul à fleurs opposées* (F).

نوع من الدلبوث يعلو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. أوراقه سيفية معتدلة العرض. سنبلة الزهرية مستطيلة تعد من ٣٠ إلى ٤٠ زهرة متقابلة الصف. بتلاتها ذلقة الطرف لونها إلى البياض الشبي عروقها حمراء. متك ساداتها فستق وخويطها كذلك || أزهاره يستمر من أيار إلى تموز.

١٠٣٣٧ - دَلْبُوثُ أَرْغَب. *Gladiolus hirsutus* (S). *Glaïeul hérissé* (F).

نوع من الدلبوث يعلو من ٣٠ إلى ٥٠ سم. أوراقه سيفية قصيرة زباء النصل. أزهاره وردية البتلات الزلقة المنعقدة. أنايبها إلى الصفار الباهت. اسديتها فستقية. أزهاره يستمر من نيسان إلى حزيران.

١٠٣٣٨ - دَلْبُوثُ أَفْغَانِي

Gladiolus kotschyanus (S). *Glaïeul de Kotschy* (F).

نوع من الدلبوث مهدد بلاد الأفغان يعلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أوراقه مستطيلة ضيقة النصل. سنبلة الزهرية صغيرة. أزهاره قصيرة الأنبوب، رهلة، تطول نحو ٤ سم. لونها إلى البنفسجي الزاهي || أزهاره يستمر من أيار إلى حزيران.

١٠٣٣٩ - دَلْبُوثُ الْحَصَاد

Gladiolus segetum (S). *Glaïeul des moissons* (F).

نوع من الدلبوث البري يعلو من ٥٠ إلى ٨٠ سم. أوراقه سيفية تطول من ١٥ إلى ٣٠ سم. سنبلة الزهرية تعد من ٦ إلى ١٠ أزهار متتابة الارتكاز على جهة واحدة. لونها إلى الحمرة البنفسجية || يكثر بين الزروع وفي الحقول. أزهاره يستمر من أيار إلى حزيران.

١٠٣٤٠ - دَلْبُوثُ بَبْغِي

Gladiolus psittacinus (S). *Glaïeul perroquet* (F).

نوع من الدلبوث يعلو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. أوراقه سيفية معتدلة العرض خميلة النصل. أزهاره مستعرضة البتلات المقطومة لونها إلى الصفرة الموشحة بالحمرة البنفسجية. أزهاره يستمر من آب إلى تشرين.

١٠٣٤١ - دَلْبُوثُ دَمَوِي

Gladiolus cruentus (S). *Glaïeul rouge sang* (F).

نوع من الدلبوث يعلو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. أوراقه سيفية قليلة العرض جامدة النصل. أزهاره ثنائية التصنيف كبيرة القدر قطرها نحو ١٠ سم. بتلاتها مستعرضة لونها إلى الأحمر الدموي العابق تعلوه خيوط بيض || أزهاره يستمر من أيلول إلى تشرين.

١٠٣٤٢ - دَلْبُوثُ دَوَيْكِي

Gladiolus primulinus (S). *Glaïeul jaune primevère* (F).

نوع من الدلبوث يعلو من ٦٠ إلى ٩٠ سم. أوراقه سيفية مستطيلة محددة النصل. سنبلة الزهرية تعد من ٣ إلى ٧ أزهار متتابة الارتكاز على جهة واحدة بتلاتها مستطيلة ضيقة صفراء اللون || يعتبر من الأنواع القوية المانعة الشائعة الاستعمال في التهجين. أزهاره يستمر من حزيران إلى آب.

١٠٣٤٣ - دَلْبُوثُ سَحَلْبِي

Gladiolus orchidiflora (S). *Glaïeul orchidée* (F).

نوع من الدلبوث يعلو من ١٠ إلى ٤٠ سم. أوراقه خيطية كثيرة العدد صغيرة القدر. أزهاره قصيرة الأنبوب ظهريه البتلات. بتلاتها العليا خضراء اللون، جؤرية التلطخ. بتلاتها السفلى صفراء الانتشاش خضر الظاهر، حر الباطن يطلوحتها حنار جؤوي الداخل جؤوي الخارج. أزهاره يستمر من نيسان إلى حزيران.

١٠٣٥١ - دَلْبُوثٌ مِزْهَارٌ

Gladiolus floribundus (S). *Glaëul florifère* (F).
نوع من الدلبوث يعلو من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. أوراقه
سيفية معتدلة العرض. سبيلته الزهرية تعد من ١٠ إلى ٢٠
زهرة. أزهاره كبيرة القند منتصبه. بتلاتها بيض النصل،
حمر المروق. سداتها حمراء المشك، بنفسجية الخويط.
أزهاره يستمر من أيار إلى تموز.

١٠٣٥٢ - دَلْبُوثٌ مُسْتَحَبٌّ

Gladiolus blandus (S). *Glaëul aimable* (F).
نوع من الدلبوث عديد الضروب يعلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم.
أوراقه سيفية معتدلة العرض، جامدة النصل الاملط
البشرة. أزهاره متراكبة الالوان تختلف مع الضرب.
يكثر فيها الانبوب الاصفر والبتلة البيضاء الملطخة
بالاحمر والمطوقة بالازرق || أزهاره يستمر من حزيران
إلى تموز.

١٠٣٥٣ - دَلْبُوثٌ مُلَطَّخٌ

Gladiolus gandavensis (S). *Glaëul de Gand* (F).
ضرب من الدلبوث الهجين ساقه منتصبه تعلو من ١٠٠
إلى ١٥٠ سم. أوراقه سيفية مستعرضة. أزهاره كبيرة
القند مستطيلة. بتلاتها قمرزية اللون يعلوها تلطخ اصفر.
أزهاره يستمر من تموز إلى تشرين

١٠٣٥٤ - دَلْبُوثٌ نَنْسِيٌّ

Gladiolus nanceianus (S). *Glaëul nancéien* (F).
ضرب من الدلبوث الهجين يعلو من ٦٠ إلى ١٥٠ سم.
سبيلته الزهرية تعد من ١٥ إلى ٢٢ زهرة. زهرته كبيرة
القند قطرها يراوح من ١٥ إلى ٢٠ سم. بتلاتها مختلفة
الالوان الزاهية منها الاحمر والقرمزي والارجواني والوردي
والازرق والبنفسجي والابيض والاصفر والموشح || أزهاره
يستمر من حزيران إلى آب.

١٠٣٥٥ - دِلْفَاسِيَّات

Platanaceae (S). *Platanacées* (F). *Platanaceae* (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقين تشمل جنس الدلب.
أزهارها وحيدة المسكن. أزهارها قدي التجميع ثمارها
مجموعة كروية من البزور.

١٠٣٥٦ - دَلْشَمَةٌ

Enoplosus (S). *Enoplose* (F). *Enoplosus* (E).
جنس اسماك بحرية بيوضة من فصيلة الفرغيات ورية
شائكات الزعانف. أنواعها المعروفة لا تتجاوز الخمسة.
جميعها صغيرة القند، مبططة الجرم، رقيقة الظهر، كبيرة
الزعانف أخصها الظهرية والشرجية || أعطانها بحار البلاد
الحارة وأخصها شطوط البلاد الافريقية. أشهر أنواعها
الدلشمة المسلحة.

١٠٣٥٧ - دَلْشَمَةٌ مُسَلَّحَةٌ

Enoplosus armatus (S). *Enoplose armé* (F).
Enoplosus armatus (E).
سمكة من الدلائم. أعطانها بحار البلاد الحارة || جسمها
صغير القند، مبطط الجرم، رفيع الظهر، يطول من ١٥
إلى ١٧ سم. رأسها منخفض الارتكاز، مخروطي الشكل،
صغير الجرم والخطم. عيناها مستديرتان، ناشرتان.
ثوبها إلى الشبهة الفضية تطوقه ثمانية خطوط سود متباعدة
المرض. زعانفها الظهرية والشرجية ناشزة حادة المناخس.
زعانفها الذيلية فارقة، هلالية التقعير || لحمها متوسط
الصنف، مأكول.

١٠٣٥٨ - دَلْدَلٌ

دَلْدَلٌ هو الشبم المبذول، اطلبه.

١٠٣٥٩ - دُلْسٌ

Dules (S). *Doule* (F). *Dules* (E).
جنس اسماك نهريه من العظليات شائكات الزعانف وفصيلة
الفرغيات. انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم انهر
البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها شبه اهليلجية
الشكل تطول من ٢٠ إلى ٣٢ سم. تتميز بزعانفها الظهرية
الفردية القاطبة المجهزة بمناخس حادة يعلوها دوقل خيطي
مستطيل. رؤوسها كبيرة مخروطية الشوزن، صغيرة
الاخطام الدلقة. زعانفها الذيلية مقطوعة الاطراف. انوارها
تختلف مع الانواع جميعها مجذعة بالاخضر الاليس القاتم.
لحمها مأكولة متوسطة الصنف لكنها كثيرة الحسك الدقيق.

١٠٣٦٠ - دِلْسَةٌ مَأْكُولَةٌ

Dilsea edulis (S). *Dilsée comestible* (F).
نبات بحري من الخشيات الحمر. أعطانها معظم بحار البلاد
الحارة والمعتدلة الحرارة || كلاليه طوقية صغيرة. ساقه
قصيرة ثنائية الفرق الدرقية. أوراقه كبيرة غشروفية المادة
مأكولة.

١٠٣٦١ - دَلْغَانٌ

Glaise (F). *Clay, Loam* (E).
هو الغضار تراب طيني شديد الانساج والصلابة.

١٠٣٦٢ - دَلْغَانِيٌّ

Glaiseux (F). *Clayey, Loamy* (E).
صفة التراب الذي يحوي الدلغان أي الغضار.

١٠٣٦٣ - دُلْفٌ

Lophaetes
جنس طير من العقبان وفصيلة الصقريات. موطنه
افريقية الشرقية والاستوائية. يألف الغابات وبحاري
الماء. قوته الطير والحيوان. اعرف انواعه الدلوف.

١٠٣٦٤ - دَلْفٌ

Dalf
حاشور منزلي يستعمل في مكافحة الجدايد وبنات
وردان (الصراصير) واللاحسات والبراغيث والنسل
وثاقبات الاذن وغير قبان || وهو مسحوق ناعم وردي
اللون يذر في الاماكن التي تكثر فيها هذه الحشرات فيقضي
عليها || ومن الحيلة الضرورية اجتناب لثر الدلف
على المواد الغذائية

١٠٣٦٥ - دِلْفَاسٌ غَلِيظُ الزُبَانِي

Delphax crassicornis (S). *Delphax crassicorne* (F).
حشرة من فصيلة الدلفاسيات. جسمها صغير القند، يطول
من ٦ إلى ٨ مم. || ثوبها حنطي يعلوه تمشيع كستني.
رأسها عريض. عيناها كبيرتان، بارزتان. زباناتها
مستغلا الفصل الاولى والثانية، مستدقا الطرفية. كوسلها
قصير. حجفتها مخروطية. ظهرانها كامل الحنجبة،
شارف، فارق الطرف. روشانها غشائيان، شفافان.
بطنها مبطط. الزوج الخلفي من قوائمها مجهز بمناخس حاد
ينشب في نمرة الظنبوب || مسرحها ضفاف بحاري الماء
وكل مكان يكثر فيه القصب.

١٠٣٦٦ - دِلْفَاسِيَّات

Delphacidae (S). *Delphacids* (F). *Delphacidae* (E).
فصيلة حشرات من رتبة متجانسات الاجنحة وطبقة نصفيات
الاجنح. اجناسها وانواعها كثيرة العدد منتشرة في معظم



دلشمة مسلحة



دلس

١٠٣٧٣ - دلفينيّات Delphinidae (S).
Delphinidés (F). Delphinidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية لبونة من مرتبة متاثلاث الاسنان ورتبة الحوتيات || انواعها المعروفة عديدة نحو ٦٠ . تتميز باستطالة الرأس وبالزعانف الصدرية المنجلية الشكل . أشهر انواعها الدلفين والتخنس والتخنس الاسود والاركة والجراقة .

١٠٣٧٤ - دلقق * Mustella foina (S).
Fouine, Marte fouine (F). Marten (E).
حيوان من فصيلة السموريات ورتبة اللوامح . قال القزويني « انه حيوان وحشي عذو اللحم اذا دخل البرج لا يترك فيه واحداً وتقطع الثعابين عند صوته . » || جسمه مستطيل الشكل طوله يراوح من ٤٦ الى ٥٠ سم . وذنبه نحو ٢٤ . قوائم قصيرة . ثوبه كثيف الصوف الناعم لونه الى الكهبة السمر . عنقه وصدره الى البياض النقي . موطنه فسيح الارحاء يمتد من الصين الى الهند والشرق الاوسط واروبة || يألف الدسائر والقرى . يأوى المقالع المتروكة والبيوت المهجورة والخرائب واكوام الخشب . قوته الطير والحيوان والثمار والعسل || الانثى تضع من ثلاثة الى خمسة جراء تبصر بعد وضعها بأسبوعين || فروته متوسطة الصنف قيمتها التجارية زهيدة .

١٠٣٧٥ - دلقنوس Dolichonyx (F).
Dolichonyx (S). Dolichonyx (E).
جنس طير من فصيلة الكاروجيات . انواعه المعروفة خمسة جميعها من القواطع . موطنها القارة الامريكية ، مشتاتها الاقاليم الدافئة مصيفها المناطق الجبلية . نظامها الحياتي جماعي . اسرابها وافرة العدد || اجسامها رشيقة القوام تطول من ١٨ الى ٢٠ سم . مناقبها مخروطية الشكل ، معتدلة الطول ، مخاطبها أسفل اعرض من العليا . اجنحتها مستطيلة ذرية . اذناها مستعرضة الاطراف . ارساغها دقيقة ، متوسطة الارتفاع . اثوابها ملونة او مبلقة . الاناث اصغر قدماً من الذكور وابتهن خضاباً || تألف الغابات والمستنقعات والحقول المزروعة . قوتها الحشرات والحبوب والبذور ومنها الحنطة والارز . تعتبر من الطيور المؤذية كالغربان || اعرف انواعها واشهرها دلقنوس رنّاز .

١٠٣٧٦ - دلقنوس رنّاز * Dolichonyx oryzivorus (S).
Dolichonyx oryzivore (F).
طائر من الدلقنوس يصيف في بعض مناطق امريكة الشمالية ويشقي في امريكة الوسطى والجنوبية . يألف الاجام والمستنقعات . سربه وافر العدد || جسمه معتدل القد يطول نحو ٢٢ سم . خضاب ثوبه يختلف مع فصول السنة ، وهو في الربيع ، عند الذكر ، اسود الثوب باستثناء مؤخر الظهر والافنيك فانها الى البياض الماجي . ويعلموه في جناحيه جدّة صفراء تمتد من المنكبين الى اواسط القوادم . ذنبه مروحي الطرف المنشاري الشكل . حدقة عينه سوداء . منقاده ورشاه الى السمرة السوداء . الانثى اصغر قدماً من الذكر . ثوبها الى الكهبة الخنطية المواج . صدرها وافنيكها مرقوشان بالاسود الباهت || قوته الحشرات والحبوب انحصارها الارز ولذا نعتوه بالرنّاز اي آكل الارز || يدثن افحوصه في المراعي وفي الحقول المزروعة . الانثى تضع من ٤ الى ٦ بيضات تحضنها بمنابذة الذكر نحو ١٥ يوماً .

اقطار العالم انحصارها البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة . رؤوسها مكظرة . اعظامها صغيرة او معتدلة . عيونها غالباً كبيرة . قروتها الاستشعارية غليظة الفصل الاول ، نحيلة الطرفية ، تنشب تحت الميرون . كواسلها قصيرة . اجنحتها لامتناهية الاشكال . قوائمها نشيطة . الخلفية منها مجهزة بمناخس حادة .

١٠٣٦٧ - دلقنوس * Dilophus (S). Dilophe (F).
جنس حشرات من فصيلة البيبونييات . انواعه عديدة جميعها صغيرة القد طوطا يراوح بين ٣ و ٧ مم . يكثر وجودها في الحقول المزروعة . ترمي بمكنها على التراب فينقف عن يرقات دقيقة همة تلثم جذور الزرع .

١٠٣٦٨ - دلقنوس عسّذول Dilophus vulgaris (S). Dilophe vulgaire (F).
Common dilophus (E).
حشرة من فصيلة البيبونييات . جسمها صغير يطول من ٥ الى ٩ مم . || الذكر اصغر قدماً من الانثى ، ثوبه الى السمرة السوداء . اما الانثى فالى الخنطية الاحمر المواج || رأسها مكور . عينها زُميتان . زباناها وملسها شديداً القصير . روشناها شبه شفافان . عروق الروشن ، عند الذكر ، سود . قوائمها الى السمرة عند الشقين || تظهر الحشرة الجمالانة من نيسان الى تشرين الاول . تألف الحقول المزروعة والمروج || يرقها سمراء اللون تركيب جذور النبات .

١٠٣٦٩ - دلقنوس اطلبب صمل الكرمه المخطط .

١٠٣٧٠ - دلقين Dauphin (F). Delphinus (E).
الدلفين كوكبة نجوم شمالية . مركزها بين الثعلب الاصفر والعقاب والفرس الاصفر . عدد نجومها ٢٠ اجملها من المرتبة الرابعة . أشهر نجومها النير الذي على الذنب ويدعى « ذنب الدلفين » و « عمود الصليب » . اما الاربعة التي في وسط العنق فتدعى « الصليب » .

١٠٣٧١ - دلقين ، دُخَس ، دُخَس شائع Delphinus (S). Dauphin (F). Dolphin (E).
جنس حيوانات لبونة من الحوتيات . انواعه نحو ١٢ اجسامها مستطيلة الشكل طوطا يراوح من ١٥٠ الى ٣٥٠ سم . اعظامها مستطيلة ذلقة . اثوابها تختلف باختلاف النوع . تعيش في بحار المناطق الحارة والمعتدلة . سربها يعد من ٦ الى ٣٠ . قوتها الاسماك والقشريات والرخويات . انثاه تضع جروراً واحداً . اعرف واشهر انواعه الدلفين الشائع .

١٠٣٧٢ - دلقين شائع * ، دُخَس شائع ، دُخَس شائع Delphinus delphis (S).
Dauphin commun, D. vulgaire (F). Common dolphin (E).
نوع من الدلفين طوله نحو ٢٥٠ سم . زعانفه الصدرية والظهرية منجلية الشكل . زعنفته الشرجية هلالية . ثوبه الى الربرة السمراء يعطوها مواج اخضر يعبق ويسود مع اقترابه من ثبج الظهر . يألف بحار المناطق الحارة والاستوائية . سربه يعد من خمسة الى عشرة ازواج . قوته الاسماك الصغيرة على اختلافها انحصارها السردين والرنكة وجراد الماء .



دلقنوس



دلفين شائع



دلق



دلقنوس رنّاز



دلقون



دلكة



دل



دلسة فضية



دلوف



دلوق

كبيرة ؛ الظهرية مستطيلة ، شائكة القسم الامامي المؤلف من ١٢ منخساً ، مقطوعة القسم الخلفي العادم المناخس . الشرجية تحمل ثلاثة مناخس ذرية . الذيلية مقعرة || يكثر وجودها في نهر الكنج . لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

١٠٣٨٣ - دلَهَقَان (F). Safran (F). Saffron (E). هو الزعفران ، اطلبه .

١٠٣٨٤ - دلهم (F). Ganga rayé (F). طائر من القطا يعرف بالقطاة الموشحة .

١٠٣٨٥ - دلَهْمَة ثُعْبَانِيَّة (F). Chelydra serpentina (S). Chélydre serpentine, Emysaure (F).

سلحفاة من فصيلة الدلحيات . موطنها امريكا الشمالية . جسمها كبير القد ، طولها يناهز المتر . رأسها كبير غليظ . فكها قويان ، قاطعان . عنقها غليظ الجرم ، معتدل الطول . ذيلها متراكب القتر اللامتناهية الشكل والحجم . زعنفاها كامل الصفحة . ذنبها أعرف الشج ، عرقه محرم الشكل || قوتها الحيوان والاسماك وبعض النباتات البحرية .

١٠٣٨٦ - دلَهْمِيَّات (F). Chelydridae (E). Chélydridae (F).

فصيلة حيوانات بيوضة من رتبة السلاحف . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . اعطائها بعض مناطق امريكا الشمالية || تعيش في المياه العذبة وفي الاسال . قوتها الاسماك والضفادع والعطاء والشعابين وبعض النباتات المائية || اعرف انواعها واشهرها الدلهم الثعبانى والدلهم التمساحية ودلهم تامينك التي تعتبر اكبر انواع هذه الفصيلة .

١٠٣٨٧ - دلُوح (F). Dattier prolifique (F). النخلة الكثيرة الحمل ج دلخ . Prolific date tree (E).

١٠٣٨٨ - دلُوف (F). Lophæte huppé (F). Lophæteus occipitalis (S).

طائر من الدلف ينتمي الى عمارة العقبان وفصيلة الصقريات . طول نحو ٥٥ سم . وبسطته ١٢٥ يتميز بقنبرته الناجية المنتصبة الكبيرة الريش . ثوبه الى السمرة العابقة بطه الى السواد . ذنبه ثلاثي الخطوط المعترضة البيضاء اللون . عيناه ورجلاه الى الصفرة . منقاره بني . يألف الغابات والاحراج القريبة من الماء . قوته كل ما استطاع اقتناصه من الطير والحيوان . يدن في اشجار السنط انشاء تبيض من رفنتين الى ثلاث رفئات تحضنها وحدها نحو ٤ أسابيع .

١٠٣٨٩ - دلُوق * ، سُوَيْدَة (F). Suoeda fruticosa (S). Salsola d'Afrique, Soude annulaire (F). African salsola, Shrubby sea-blite (E). Afrikanische seifenstande (D). Salsola d'Africa (I).

نبات عشي بري حولي من فصيلة السرمقيات يكثر في الاراضي المالحة . كانوا يستخرجون منه الصودا . يعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . فروعه عديدة هيكليها هرمي الشكل . اوراقه متعاقبة نصلها اسطوانى الشكل ، جامد النسيج ، ملس البشرة ، باهت الخضار . ازهاره لا بتلية محورية الارثكاز ، مزدوجة التجميع لونها الى الخضرة .

١٠٣٧٧ - دلُقُون * (F). Delichon napalensis (S).

طائر من الجواثم وفصيلة الخفاشيات . اعطائه الهند || جسمه صغير القد ، بطول نحو ١٢ سم . بسطته نحو ١٨ سم . يتميز بقصر منقاره الصغير النشط وبصغر ذنبه المقطوع الطرف . جناحاه لاحضان ، ذربتا الاطراف . ثوبه الى الزرقة البنفسجية العابقة السعفاء الموج . زوره وصدره وبطنه وزمكاه بيش || يألف الغابات . قوته الهوام والحشرات الصغيرة والديدان . يدن عشه في الاشجار الباسقة الانثى تحضن من ٤ الى ٥ بيضات بيها الذكرا يؤمن لها الغذاء .

١٠٣٧٨ - دلُكَة (F). Evanla (S).

جنس حشرات من فصيلة الدلكيات انواعه عديدة جميعها صغيرة القد طولها من ٦ الى ١٠ مم . لونها الى السمرة والسواد . تمتح مكنها في مكن بعض الحشرات اخصها بنات وردان فينقف عن يرقات تلهم محتويات عوائلها وتقضي عليها .

١٠٣٧٩ - دلُكِيَّات (F). Evanilidae (E). Evanilidae (S).

فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة المخصصة اجناسها وانواعها عديدة جميعها نافعة تتطفل على عدة حشرات مؤذية اخصها بنات وردان || اوصانها العامة : حشرات صغيرة القد . رؤوسها كبيرة مفلطحة . جواشها غليظة . ترجاتها البطنية الاولى مندمجة مع الصدور . خصورها انبوبية نحيلة . زياناها خيطية . ارجلها مستطيلة . ارساغها خماسية . لونها الى السمرة يغلب فيها الاسود || موطنها البلاد الحارة والمعتدلة . تمتح مكنها في مكن ويرقات سائر الحشرات فينقف عن يرقات صغيرة تتغذى من محتويات مكن ويرقات الحشرات العائلة وتقضي عليها .

١٠٣٨٠ - دلُم (F). هو الفيل ، اطلبه . والدلعة : لون الفيل.

١٠٣٨١ - دلُم * (F). Columba cenas (S). Colombe colombin (F). Stock dove (E).

نوع من الحمام البري طولها نحو ٣٥ سم . رأسه وعنقه وظهره الى الرمادي الأزرق يعلوه موج اسفع . منقاره احمر اللون اصفر اللواقط . صدره الى الجؤوة وجانباه الى الخضار البنفسجي . افيكه اسود الزام الاول والثاني ازرق الثالث والرابع || ضروره قليلة جميعها من القواطع لها مشتاه ومضيفها || موطنه حوض البحر المتوسط . يألف الاحراج والغابات . يعيش اسراباً صغيرة يراوح عددها من ٤٠ الى ١٠٠ . قوته الثمار والحبوب والبدور . يدن عشه في تجاويف ونخاريب الاشجار . انائه تبيض من مرتين الى ثلاث مرات في السنة .

١٠٣٨٢ - دلُكْسَة فُضِيَّة (F). Datnia argentata (S). Datnie argentée (F).

سمكة نهريّة من شائكات الزعانف وفصيلة الفرخيات . موطنها بعض انهر الهند والهند الصينية وماليزية || جسمها مبطط الجرم ، شبه اهليلجي الشكل ، مخصور المؤخر ، بطول نحو ٢٣ سم . ثوبها الى الزرقة الفضية الموج . رأسها مخروطي الشكل . شدقها معتدل الانفراج . اسنانها صغيرة ذرية . عينها ماحتان ، متقاربتان . جميع زعانفها



دليس



دليك



دليوم

١٠٣٩٨ - دَم Sang (F). Blood (E).
الدم سائل احمر يملأ تجويف القلب والاروعية الدموية المتصلة به . وهو مركب من سائل اصفر يدعى اثلة (بلاسما) تتكون بدورها من ماء واملاح قلووية التأثير ومواد بروتينية وسكرية تنسج فيها اجسام ذرية تعرف بالكريات . والكريات هذه تقسم الى مجموعتين تعرفان بالكريات الحمر والكريات البيض . فالحمر حجيرات حيوانية من ذوات الجيلة وقد تبلغ نسبتها الى البيض نسبة ٥٠٠ الى ١ اما لونها الاحمر فيعزى الى المادة الملونة المعروفة بالهيموغلوبين ويحوي المليمتر المكعب من الدم ما يراوح عدده من ٤ الى ٥ ملايين من الكريات الحمر التي تمتد حياتها الى بضعة اسابيع ثم تلتشط وتفتت وتمضحل . وظيفتها الرئيسية نقل الاكسجين من الرئة الى جميع اجزاء الجسم . اما الكريات البيض فهي على خمسة اشكال جميعها متحركة وظيفتها القضاء على البكتيريا السابحة في الدم .

١٠٣٩٩ - دَم الاخوين
هو التوز الخزي . وهو القاطر الجبار ، اطلبها .

١٠٤٠٠ - دَم التنين ، دَم الثعبان
هو القاطر ، اطلبه .

١٠٤٠١ - دَم العاشق هو المخلدة ، اطلبها .

١٠٤٠٢ - دَم الغزال هو الكرسفية الحمراء ، اطلبها .

١٠٤٠٣ - دَم النعمان راجع ادونيس صغير .

١٠٤٠٤ - دَماس Leclidurus (S). Diclidure (F).
جنس خفافيش من عمارة الراسات . موطنه امريكا الجنوبية . انواعه قليلة العدد تتميز ببشاعة رؤوسها وبقصر اذنانها الدقيقة . يعيش جماعات كثيرة العدد . يسرح طوال الليل . قوته الحشرات ، يألف الاشجار الحرجية . لا يخشى المطر .

١٠٤٠٥ - دَماسيات Leptotyphlopidae (S).
Leptotyphlopidae (F). Leptotyphlopidae (E).
فصيلة حيات بيوضة ، جاسة ، عديمة الاذى . انواعها المعروفة قليلة العدد . اعطانها بعض المناطق الاستوائية والحارة من البلاد الاسيوية والافريقية والامريكية . اجسامها دودية الشكل ، تطول من ١٨ الى ٢٥ سم . قشارها ملس السهف المتماثل في جميع انحاء الجسم . رؤوسها شبه مقطوعة ، قطرها قطر الجسم . عيونها صغيرة ، ماسحة ، يغلفها غشاء سهفي المادة . فكوكها السفلى مسننة ، اما العليا فعديمة الاسنان . قوتها الحشرات والديدان . بعض انواعها يعيش في قري النمل ونبات الارضة ولا يخشاها لانها لا تستطيع عضه .

١١٤٠٦ - دَماع Pleurs (F). Tears (E).
ما يسيل من سروع الكرمة اذا قطعت في ايام الربيع .

١١٤٠٧ - دَماع Lactescent
نعت تعريبي يطلق على كل نبات يسيل منه اللسع بغزارة اذا جرح .

١٠٣٩٠ - دليس Delesseria (S).
Delesserie (F). Delesseria (E).

جنس نباتات بحرية من الخثيات الحمر . انواعه المعروفة نحو ١٢ اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . كلاليتها قصيرة . سوقها اسطوانية تتشعب الى عراجيد ورقية الشكل وردية اللون او حمراء تجتازها ضلوع رئيسية وعروق جانبية متقابلة الانتشاب ، متوازية الابعاد .

١٠٣٩١ - دليس Strophomena (S).
Strophomène (F). Strophomena (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات عضديات الارجل وفصيلة النفديات . انواعها المعروفة عديدة ، جميعها من متحجرات الاباج القديم .

١٠٣٩٢ - دليك Gamolepis (S).
Gamolépiss (F). Gamolepis (E).

جنس نباتات جنبية معمرة من الشرونيات وفصيلة المركبات . انواعه المعروفة قليلة العدد ، مهدا افريقية الجنوبية . سوقها فرعاء . اوراقها متعاقبة اهليلجية النصال . ازهارها ابضية ، كبيرة القد ، جميلة الشكل ، صفراء اللون ، عادمة العرف .

١٠٣٩٣ - دليك Cynorrhodon, Fruit de l'églantier (F). Hip (E).

الدليك : ثمر النسر ين يحمر حتى يكون كالبر فيضج فيحلو فيؤكل .

١٠٣٩٤ - دليل « باير » Indicateur « Bayer »

مركب كيمياوي ، معروض بشكل اقراص صغيرة مستديرة ، يستعمل لمعرفة حموضة الحليب . يذوب القرص الواحد في لتر ماء ويؤخذ من هذا المحلول مقدار فنجان او نصف فنجان يضاف الى فنجان او نصف فنجان من الحليب فان بقي الحليب على لونه الطبيعي كان خبراً وان اصفر لونه فانه لا يصلح لحموضته . وقد يجوز سحق القرص واستعمال مسحوقه رشاً على الحليب فان اصفر لونه فهو حامض لا يصلح للاستهال .

١٠٣٩٥ - دليس Telline (F). Tellin (E).

هو الطلنس جنس محار من الرخويات .

١٠٣٩٦ - دليس Thyrsite (F).

الدليس سمكة بحرية تدعى ترسيت ، اطلبها .

١٠٣٩٧ - دليوم Dialium (S).

Diali, Dialion (F).

جنس اشجار برية وزراعية من فصيلة السنفيات العندميات . انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها من نبوت المناطق الاستوائية الاسيوية والافريقية . سوقها جالسة منتصب ترتفع من ١٢ الى ٢٥ متراً . اوراقها متعاقبة ، مركبة ، وترية ، خماسية او سباعية الوريقات المنقطة . نصالها اهليلجية الشكل ، جامدة الوثل . ازهارها عنقودي التجميع ، محوري او هامى الارتكاز . ازهارها صغيرة ، خماسية التركيب . سفاتها دقيقة مستطيلة تستعمل استعمال الصابون في تنظيف الثياب ذلك لانها تحوي مادة تماثل الصابونين .

المتقابلة . أوراقها العليا بسيطة ترتكز على صمغيخ صغيرة تنشب في الأباط . أزهارها ليلكية ، ضيقة البتلات . تنويرها يستمر من نيسان إلى أيار .

١٠٤١٧ - دَمَام رِيْشِي Dentaria pinnata (S).
Dentaire pennée (F).

نوع من الدمام . عشبة سبروتية معمرة . منبتها يمتد من الشرق الأدنى إلى أوروبا . حراشف أرومتها مستديرة الأطراف . ساقها فرعاء تعلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم . أوراقها خاسية أو تساعية الوريقات المتقابلة . أزهارها كبيرة القد ، وردية اللون أو ليلكية ، فصلها خضراء اللون . تنويرها يستمر من نيسان إلى أيار .



دَمَامَة

١٠٤١٨ - دَمَامَة * Sanguinolaria (S).
Sanguinolaire (F). Sanguinolaria (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة الساليات . أنواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة من سواطي الهند إلى سواطي جزر الزابج وأوقيانية وأمريكا الشمالية || أصدافها شبه صيوانية الشكل . لامعة ، يكثر فيها الأحمر الجؤوي يتخلله الأخضر والأصفر . أجسامها متوسطة القد ، مستطيلة المشاعب الطليقة || تعيش في الرمال والأممال القليلة الغور || لحومها مأكولة ، جيدة الصنف .



دَمَالِق

١٠٤١٩ - دَمَان * وِبَر Hyrax, Proavia (S).
Daman (F). Daman, Coney of the Bible (E).

جنس حيوانات قاضمة لبونة من فصيلة الدماييات . أنواعه ١٣ موطنها البلاد الحارة . تألف الجبال الصخرية . أجسامها ربعة كائزة تطول من ٣٠ إلى ٥٠ سم . أثوابها إلى الصهبة الصنابية تعبق مع اقترابها من قمة الرأس وشيخ الظهر . وبرها ناعم وقصير . قوتها الأعشاب والجذور والثمار والحبوب . أشهر أنواعه ما يلي .

١٠٤٢٠ - دَمَان النُوبَة Hyrax ruficeps (S).
Daman de Nubie (F). Nubian daman (E).

نوع من الدمان موطنه النوبة والصومال . طوله نحو ٥٠ سم . ثوبه إلى الصهبة الصنابية الصفراء المواج .

١٠٤٢١ - دَمَان حَبَشِي Hyrax abyssinica (S).
Daman d'Abyssinie (F). Abyssinian daman (E).

نوع من الدمان موطنه الحبشة حيث يعرف باسم اشكوكو . ثوبه قليل السمرة . طوله نحو ٤٠ سم .

١٠٤٢٢ - دَمَان سُورِي ، طُبْسُون Hyrax syriacus (S). Daman de Syrie, Saphan (F).
Syrian daman (E).

نوع من الدمان موطنه لبنان وسورية وفلسطين وسينا والحجاز . جسمه بطول من ٤٠ إلى ٥٠ سم . ثوبه إلى الصهبة الصفراء المواج .

١٠٤٢٣ - دَمَان قُطْبِي Hyrax capensis (S).
Daman du Cap (F). Daman of Cape (E).

نوع من الدمان موطنه القطب الجنوبي . جسمه يطول نحو ٣٥ سم . ثوبه إلى الصهبة الفضية المواج .



دَمَان

١٠٤٢٤ - دَمَائِيَّات Hyracidae, Procaviidae (S).
Hyracidae, Damans, Procaviidae (F). Hyracidae, Procaviidae (E).

فصيلة حيوانات لبونة قاضمة . أنواعها ١٩ تنضم إلى جنسين : الدمان والزلم . جميعها صغيرة القد حجمها حجم

١٠٤٠٨ - دَمَامَة * ، دَكْرِيْد Dacrydium (S).
Dacryde, Dacrydion (F). Dacrydium (E).

جنس شجيرات طقسوسية من فصيلة الصنوبريات . مهدا الهند . أنواعها المعروفة ١٢ سوقها متوسطة الارتفاع . فروعها متشعبة ، تبدو في أول عهدها منتصب ثم أفقية فتدلية . أوراقها ابيدة ، دائمة الخضار ، حشفية النصال السنانية الشكل . فروعها تقطر عصارة رائحية شائعة الاستعمال الصناعي والكحولي || من متطلبات زراعتها المواقع المعتدلة الحرارة والرطوبة .

أشهر أنواعها :

١٠٤٠٩ - دَمَامَة رَفِيْعَة Dacryde élevé (F).

١٠٤١٠ - دَمَامَة سَرُوِيَّة Dacryde cyprès (F).

١٠٤١١ - دَمَاكَة Vernalsation

هي معالجة البذور والشتول بالبرد لتنشيط خاصية الانتاش وتقديم زمنه وللإسراع في نمو الشتول وأدراكها .

١٠٤١٢ - دَمَال

الدمال : التمر العفن الأسود القديم .

» : ما رمى به البحر من خشاره .

» : السرقين .

» : ما وطئته الدواب من البعر والتراب .

» : فساد الطلع قبل أدراكه حتى يسود .

١٠٤١٣ - دَمَالِق * Lyophyllum

aggregatum (S). Lyophylle en touffe (F).

فطر مأكول من فصيلة الغاريقونيات . أعطانه الغابات الظليلة في المناطق المعتدلة الحرارة . يعيش على الدبال . ساقه غضروفية المادة ، شطئية ، ضخمتها تعد من ٧ أزواج إلى ١٥ زوجاً . أرسوسته مظلية الشكل قطرها يراوح ، عند الإدراك التام ، من ٤ إلى ١٠ سم . لونها إلى الكهبة يعلوها مواج تبني || لحيمته جيدة الصنف مرغوب فيها .

١٠٤١٤ - دَمَام ، عَشْبَة الاسْنَان Dentaria (S).
Dentaire (F). Toothwort, Bulbous coral-root (E).

جنس نباتات عشبية ، جذمورية ، معمرة من فصيلة الصليبيات . جذاميرها لحمية مدادة . أرومتها مغلفة بحراشف تشبه الاسنان . سوقها دقيقة . أوراقها متباينة الأشكال . أزهارها مختلفة الألوان || أنواعها المعروفة عديدة ، أشهرها التالية .

١٠٤١٥ - دَمَام إَصْبَعِي Dentaria digitata (S).
Dentaire digitée (F).

نوع من الدمام . عشبة سبروتية معمرة . منبتها الشرق الأدنى وأروبة . حراشف أرومتها ذرية الأطراف . ساقها فرعاء تعلو من ٣٠ إلى ٥٠ سم . أوراقها ثلاثية أو خماسية الأصابع . أزهارها بنفسجية اللون مخضبة الفصل || تنويرها يستمر من أيار إلى تموز .

١٠٤١٦ - دَمَام دَوْقِصِي Dentaria bulbifera (S).
Dentaire bulbifère (F).

نوع من الدمام . عشبة سبروتية معمرة . منبتها يمتد من الشرق الأدنى إلى أروبة . جذاميرها دوفصية الشكل . ساقها فرعاء تعلو من ٣٠ إلى ٥٠ سم . أوراقها السفلى مركبة ، وثرية التجميع ، خاسية أو سباعية الوريقات

Dope, Doping (F).

١٠٤٣٩ - دَمَشَّة ٥

Doping (E).

مادة اذا استعمالها الانسان تؤثر على جهازه العضوي فيؤدي مجهوداً جسدياً يفوق طاقة امكانياته الطبيعية .

١٠٤٤٠ - دَمَشَق هو الزقراق ، اطلبه .

١٠٤٤١ - دَمَشَقِيَّة هي المرموزة ، اطلبها .

Rangée de pierres d'un mur (F). دَمَص - ١٠٤٤٢

الدمص : كل عرق من اعراق الحائط ما خلا العرق الاسفل فانه رخص . العامة تقول دمس .

١٠٤٤٣ - دَمْعُ أَيُوب راجع أندريان .

Larmaire (F).

١٠٤٤٤ - دَمْعِي

نعت تعريفي توصف به كل بزة صغيرة شكلها كالدمعة .

Amendement (F). Improvement (E). دَمَل - ١٠٤٤٥

الدمل هو ان يضاف الى التربة ما يصلح خواصها لذلك فالدمل قد يكون باستعمال الرمل او الكلس او الجص او السماد الخ .

Furuncle (F). Furuncle (E).

١٠٤٤٦ - دُمَل

ورم قاس مؤلم حار سببه ميكروب يعترى جلد الحيوان ويصيب بعض الاسماك في امعائها فيحدث قروحاً في جلودها .

Balanus (S).

١٠٤٤٧ - دُمَلَّة البَحر *

Balane, Gland de mer (F). Balanus (E).

جنس دوبيات بحرية من القشريات هدايات الارجل وفصيلة الدمليات . انواعها المعروفة عديدة تعيش في اول عهدها طليقة ثم لاصقة بالصخور وبكل شيء يعوم في البحر || اصداؤها شبه بلوطية الشكل سداسية التركيب ، رباعية الاسقاط المتحركة المتساوية .

Cerbère (F). Cerberus (E). دَمَلَجَة - ١٠٤٤٨

كوكبة شمالية الموضع تتألف من اربعة نجوم تطوق يد الجاني .

Anthops ornatus (S).

١٠٤٤٩ - دُمْلُوح ٥

Anthops orné (F).

جنس حيوان وحيد النوع من العناشيات . يتميز بزوائده المنخرية القائمة كثورة الزهرة بين الشفة العليا والعين . جبهته مستعرضة تحمل ثلاث كرات معلقة القاعدة . جسمه صغير القد طوله نحو ٨ سم . بسطته ٣٢ . ثوبه الى الريدة الصهباء . رأسه وظهره وبساطه اعقب من عنقه وبطنه || موطنه جزر المحيط الهادي والهندي والبحر الاحمر . يألف الكهوف والمغاور . يعيش جماعات صغيرة العدد . ذكره لا تقرب انثاها الا عند الكوم . مسرحه من الغسق الى فحة الليل . قوته الحشرات والدوبيات والهوام .

Vismie

١٠٤٥٠ - دُمْلُوق

جنس نباتات شجرية وجنبية برية معمرة من فصيلة الداذيات . انواعه نحو ٧ منها البلاد الاستوائية والحرارة .

الارنب . اثوابها الى الصبهة المختلفة السمرة والمواج . رؤوسها صغيرة اسفينية الشكل . عيونها كبيرة ، اذانها مستديرة . اذانها قصيرة وقوائمها كذلك . اناثها سداسية الاطباء تضع من ٤ الى ٦ جراء . قوتها الاعداب والثمار والحبوب على اختلاف انواعها .

Rohita (F).

١٠٤٢٥ - دُمْبَرَا

هي الرهيطة من الاسماك النهرية ، اطلبها . والدمبرا من اسماكها الهندية .

Dambose

١٠٤٢٦ - دَمْبُوز

الدنبوز او الينوزيت مادة سكرية توجد في عضلات الجسم وفي اوراق بعض النباتات . (راجع ينوزيت) .

١٠٤٢٧ - دِمَّة * ، قُمَلَّة ، قُمَلَّة الجسم

Pediculus corporis (S). Pou du corps (F). Louse (E).

نوع من الفرعيات . طولها نحو ٣ مم . ثوبها الى السمرة . قوتها الدم تمتصه من جسم الانسان والحيوان . مكها يدعى ثيباناً تمتحه الانثى على الشعر فيلصق به الى ان ينقف وذلك بعد وضعه بنحو ثمانية ايام .

١٠٤٢٨ - دِمَّة بَيْضَاء

هي قرمزية الكرمة البيضاء ، اطلبها .

Incorporer (F). To incorporate (E). دَمَج - ١٠٤٢٩

مزج الشيء بشيء آخر فتجانسا .

١٠٤٣٠ - دَمَجَانَّة ، بَاطِيَّة ، نَاجُور

Dame-jeanne (F). Demi-john (E).

وعاء من زجاج مغلف بالقش يستعمل لحفظ الكحول والخمور والسوائل .

١٠٤٣١ - دَمْدَامَة هي البطاطا الحلوة ، ج دمدم .

١٠٤٣٢ - دَمْدَمُون هو اليلسان الاسود ، اطلبه .

١٠٤٣٣ - دَمْرَاء الدمراء : الشاة القليلة اللبن .

١٠٤٣٤ - دَمْس دمس الحمر : اغلق عليها دنها .

١٠٤٣٥ - دَمْسِي هو جربيل الاهرام ، اطلبه .

١٠٤٣٦ - دَمْسِيْس هو الامبروسيا ، اطلبها .

Achimenes (S). Achimène (F). دَمْسِيْسَة *

Achimenes (E). Schiefteller (D). Accimene (I).

جنس نباتات زراعية تزيينية معمرة من فصيلة الجسنديات انواعه سبعة جميعها من نباتات المناطق الاستوائية التي تحشى البرد || تزرع في المراكن والبيوت . اوراقها متعاقبة قلبية الشكل زنادية العنق . نصلها فارش الصفحة الحولية البشرة المتموجة المرقطة . ازهارها بوقية الشكل ، زاهية الالوان ، مستطيلة المعلق المنصبية .

Doper (F). To dope (E). دَمَش - ١٠٤٣٨

دمش الانسان او الحيوان حثه على زيادة النشاط والاقدام بالقاحه او بتجريمه نشعة جد قليلة من مادة معينة تثير الهمة .



دَمَّة



دمسيّة



دَمَلَة البحر




دملوكة مبدولة



دمن الجلود



دمية



دميجة شائعة



دميص

١٠٤٥٩ - دُمَيْصَة *، بَطَّ قُطَيْبِي Oedemia (S).

Macreuse (F). Scoter (E).

جنس طير من البطيات . انواعه المعروفة ستة جميعها من القواطع تجوب البلاد الباردة والمعتدلة . تألف الشطوط والاشجار والمناقع قوتها الاعشاب والقشريات وبعض الاسماك الصغيرة . اجسامها متوسطة الحجم . مناقبها مستعرضة . اجنحتها ذرية . اذناها منحروطة الشكل قصيرة القد || اشهر انواعه التي تجوب بعض مناطق المتوسط :

دمية سمراء Oedemia fusca (S).

Macreuse brune, M. vraie (F). Velvet scoter (E).

دمية مبدولة ، دمية سوداء Oedemia nigra (S).

Macreuse noire, M. commune (F). Common scoter (E).

١٠٤٦٠ - دَمِيْجَة *، فَيَانُوتْرِيْكُم Phymatotrichum

جنس فطور مجهرية من الطليسيات وفصيلة الوطحيات . انواعه قليلة قريبة الشبه من الطليسة . جرابه البويجي رافع الطرف وكثير الشعب التي ترتكز عليها الكائنات || اعرف انواعه واشهرها الدميعة الشائعة .

١٠٤٦١ - دَمِيْجَة شَائِعَة *، مَرَضُ التَّكْسَّاس Phymatotrichum omnivorum, Ozonium omnivorum, O. auricomum (S). Maladie du Texas du cotonnier (F).

فطر مجهري عيم الانتشار يعيش على ٧٧٠ نبات من مختلف الفصائل والاجناس . من الاشجار المثمرة والخرجية الى الجنبات الصناعية والزينية ومن النباتات البقلية الى الاعشاب العلفية والبرية || مظهره الخارجي ، على النباتات الحولية ، ذبول يحل باطرافها يقودها الى اليباس . سببه قروح حنطية اللون غائرة السطح ، جووية الخثار تركب الجلود بعد ان ينطقها مشيج الفطر بنواسه البلد الاسمر . يكافح بتطهير التربة الموبوءة او بالاقلع عن زرعها وبالكثا من الاسمدة العضوية مع اجتناب الاسمدة والمصلعات الكلسية .

١٠٤٦٢ - دُمَيْص *، وَرَيْقُ جَبَلِي Dryas (S).

Dryade (F). Dryas, Avens, Wild betony (E). Echte silberwurz (D). Erba del cervo (I).

جنس نباتات عشبية ليفية مدادة معمرة من سبط الدميصيات وفصيلة الورديات . اوراقها ضمية التجميع معتقة اهليلجية . ازهارها فردية طويلة الزناد تستعمل في عدة مستحضرات طبية || له نوعان فقط تحديدهما ما يلي .

١٠٤٦٣ - دُمَيْصُ أَصْفَر Dryas drummondii (S).

Dryade de Drummond (F).

نوع من الدميص يعلو من ١٠ الى ١٥ سم . اوراقه عرو مستطيلة ، نصلها مسنن الحافة ، بارز العروق ، خلي البشرة . ازهاره رباعية البتلات قطرها نحو ٣ سم . لونها الى الصفار الذهبي || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

١٠٤٦٤ - دُمَيْصُ ثَمَانِي البَتَلَات ، حَمَامْدُ رَيْس Dryas octopetala.

Chamaedrys alpina (S). Dryade à 8 pétales (F).

نوع من الدميص . منبته الجبال . يعلو نحو ١٥ سم . اوراقه عرو تطول نحو ٣ سم . نصلها مسنن الحافة ، ابيض الصفحة السفلى . ازهاره مستعرضة البتلات قطرها

١٠٤٥١ - دُمْلُوك Flesus (S).

Flet (F). Flounder (E).

جنس اسماك بحرية من الملساوات وفصيلة جانبيات العموم . انواعه المعروفة عديدة اعطانها بحار البلاد الباردة والمعتدلة الحرارة . سرسها اساطم الاغواط والمجادح || جميعها بيضيه الشوزن ، صغيرة السهف الدقيق . مبطة الجسم . تتميز بزعانفها الظهرية والبطنية المتقابلة الممتدة من الرأس الى قاعدة الذيل . زعانفها الذيلية محدبة الاطراف || اعرف انواعه واشهرها الدملوك المبدولة ودملوك المتوسط .

١٠٤٥٢ - دُمْلُوكَة الْمُتَوَسِّط Flesus passer (S).

Flet moineau (F). Passer Flounder (E).

سمكة من الدملوك . اعطانها تمتد من جبل طارق الى البحر الاسود . يكثر وجودها عند اشجار الانهار لانها تسرع في المياه العذبة || جسمها بيضي الشوزن ، مبطة الجرم ، يطول نحو ٣٠ سم . ثوبها الى السمرة الحنطية يعلوها موج اصفر || لحمها فاخر الصنف لذيد الطعم مرغوب فيه .

١٠٤٥٣ - دُمْلُوكَة مَبْدُولَة * Flesus vulgaris (S). Flet commun (F).

Common Flounder (E).

سمكة من الدملوك . اعطانها تشمل معظم بحار الشمال وتمتد من الدنيمرك الى الجزر البريطانية وفرنسه واسبانيا حتى جبل طارق وقد شوهدت في مياه مالطه وسردينيه || ثوبها الى السمرة الحنطية السفماء الموج . جسمها بيضي الشوزن ، مبطة الجرم يطول نحو ٤٠ سم . || لحمها لذيد الطعم مرغوب فيه .

١٠٤٥٤ - دُمَلِيَّات Balanidae (S).

Balanidés (F). Balanidae (E).

فصيلة دوبيات بحرية من القشريات هدايات الارجل . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم || جميعها صغيرة القد تتميز باصدافها القرية الشبه بالبلوط وباسقاطها المتحركة || اشهر اجناسها دملة البحر .

١٠٤٥٥ - دَمْنُ الْجُدُور Thielavia basicola (S).

فطر مجهري من المهبويات وفصيلة القسيات . يتميز بعن كروي الشكل اسمر اللون يحمل ازقافاً مستطيلة تشتمل على تكات بسيطة شفعية التجميع يبلغ عددها الثمانية . مظهره الخارجي عفن اسود يحوق بالجلود فيعطبها ويعطب السوق . يركب معظم البقول والنباتات التزينية اذا وافقته حرارة البيئة ورطوبتها . ويقضي على شتلات التبغ في المشتل واذا اصاب الشتول في الحقل سبب ذبول الازراق وازربابها اللاتبيعي || يكافح باقتلاع وحرق النباتات المصابة وتطهير التربة المعدة للمشائل بمحلول الفورمول المركز ١٪ قبل البذر بثلاثين يوماً .

١٠٤٥٦ - دُمْنَة Fosse à fumier (F). Dung heap (E).

الدمنة هي المزبلة . والدمن هو ما تلبد من السرقين والروث والبر .

١٠٤٥٧ - دُمُوعُ الْبُسَيْصِن

نبات عشبي طبي يعرف بالداذي المنن ، اطلبه .

١٠٤٥٨ - دَمِيَّانَة Damiana

نبات طبي شايق يعرف بالزواج الشايق ، اطلبه

١٠٤٧٤ - دُمَيْصِمَةٌ ٥
Systemema (S).
جنس فطور مجهرية من البيبايات وفصيلة العشويات .
أعسانها مركبة مجوفة قائمة على ونيمة بلسنية الشكل سوداء .
بوغها ثنائي الخلية اسمر اللون || أنواعه الاقتصادية قليلة
اعرفها دُمَيْصِمَةُ الدردار .

١٠٤٧٥ - دُمَيْصِمَةُ الدَرْدَارِ ٥
Systemema ulmi, Euryachora ulmi, Dothidella ulmi,
Piggotia astroidea (S). Maladie des croutes noires
de l'orme (F).

فطر مجهرية يصيب أوراق الدردار . مظهره الخارجي يقع
بلسنية الشكل تبدو سمراء اللون ثم تسود تركيب نصل الأوراق
على صفحاتها العليا فتسبب جفاف النسج المعطوبة .
أضراره زهيدة لأنها لا تؤثر في نمو النبات وحياته .

١٠٤٧٦ - دَنِّ
Cuve (F). Vat (E).
وعاء كبير يخمر فيه العصير ، ج دنان .

١٠٤٧٧ - دَنَارَةٌ مُطَوَّقَةٌ * ، دَنَارَةٌ مُذَهَبَةٌ
Philodromus aureolus (S). Philodrome doré (F).
دويبة من العناكب الساعية القانصة ثنائيات الروايا ،
سداسيات المشاتين ، تنتمي الى فصيلة الذوطيات || جسمها
يطول نحو ٤ سم . عند الذكر ونحو ٨ سم . عند الانثى .
صدراسها احمر اللون صناعي الموج يعلوه رباط ابيض .
عينها زيمتان . شيفها صغيران محببان . فكاهما دقيقان .
جرامزها مستطيلة . بطنها مبسط الجرم ، اصفر اللون ،
حنطلي التدنير والزخرفة || تألف البراري . قوتها الحشرات
الصغيرة والذباب والهوم . مسرحها دجوي . تسمى وراء
قنصها ركضاً وقفزاً || عكديتها يبش في التربة تحتفره قرب
النبات او في كنف الحجارة الكبيرة وتظلله بسعة مظلية
الشكل || يباتها الشتوي يستمر نحو ٢٠ اسبوعاً وينقضي
ضمن صلجة بلوطية الشكل . طليقة القمر ، تنسجها
داخل البيش || تعتبر من الدويبات المفيدة اللامؤذية .

١٠٤٧٨ - دَنَاصِير
Dinosauriens (F).
Dinosaurians (E).
رتبة من الزحافات المنقرضة . احافيرها تعود الى الحقبين
الجوروية والطباشيرية من الاباج الثاني اي الاوسط . فصائلها
واجناسها وانواعها عديدة . طابعها الجسموري مزيج من
الاشكال والصفات تتمثل فيها الطير والزحافات والفرعيات .
بعض انواعها كالدينصور الجبار (Atlantosaure) كان
طوله ٤٠ متراً . اما الدينصور المبدول فكان طوله من ٢٥
الى ٢٨ متراً .

١٠٤٧٩ - دَنَائِيَّة ٥
Périhélie (F). Perihellon (E).
الدناية آخر حدود الاقتراب لسيارة من الشمس . الكرة
الارضية تكون في دنائيتها في اول كانون الثاني من كل عام .

١٠٤٨٠ - دَنَّةُ الْأَزْهَارِ ٥
Anthobium ophthalmicum (S).
حشرة من الدنيات صغيرة القد تطول نحو ٢ مم . ثوبها
الى الشبهة . ظهرانها مالم الصفحة مقطوم الطرف .
تركب الازهار وتعيش عليها || تكافح كسائر حشرات
نمديات الاجنحة .

١٠٤٨١ - دَنَّةُ الْأَمِير ٥
Staphylinus caesareus (S).
Staphylin à raies d'or (F).
حشرة من الدنيات طولها نحو ٢٠ مم . جسمها اسود .

نحو ٤ سم . عددها ثمانية ، لوها الى البياض الحليبي .
أزهاره يستمر من ايار الى تموز .

١٠٤٦٥ - دُمَيْصِيَّات
Dryadées (F).
سبط نباتات عشبية وجنية من فصيلة الورديات .

١٠٤٦٦ - دُمَيْغَةٌ ٥
Zooglyphite, Zootypolithe (F).
دُمَيْغَةٌ ج دماغ . الدماغ اثار المتحجرات الحيوانية .

١٠٤٦٧ - دُمَيْقِي ٥
Introrse (F). Introrse (E).
نعت تعريفي يطلق على كل سداة تحمل مثبلاً ينفلق من
الجهة الداخلية ازاء مركز الزهرة .

١٠٤٦٨ - دُمَيْك ٥
Névé (F).
Firn, Granular Ice (E).
هو الثلج المللكد .


١٠٤٦٩ - دُمَيْكَةٌ * ، زَهْرَةُ الثَّلَج ، زَهْرَةُ اللَّبَنِ
Galanthus (S). Perce-neige, Galanthe, Galantine,
Clochette d'hiver (F). Purification flower (E). Echte
scheneeglockchen (D). Galantino, Lacrime della
madona, Foraneve (I).
جنس نباتات بصلية من فصيلة النرجسيات . انواعه عديدة
معظمها بري . يعيش في الجبال لا يخشى الثلج . بصلته
قرصية الشكل جزوية اللون . أوراقه اثنتان او ثلاث ،
قرصية الانشباب ، ضيقة النصل . شراخه الزهري اجوف
الجسم نحيله ينتهي بشراغف بسيط تعلوه زهرة واحدة .
اشهر انواعه التزيينية المعروفة ما يتبع .


١٠٤٧٠ - دُمَيْكَةُ الْمَلِكَةِ أُولُكَا
Galanthus
Olgae (S). Perce-neige de la reine Olga (F).
نوع من الدميكة أوراقها ثلاث ضيقة مستطيلة وحيدة
الكظر . شراخها يعلوه نحو ١٥ سم . زهرتها بيضاء .
بتلاتها الخارجية مستطيلة اما الداخلية فستديرة وقصيرة .
تزهري في تشرين الاول .

١٠٤٧١ - دُمَيْكَةُ الْوَيْس
Galanthus Elwesi (S).
Perce-neige d'Elwes (F).
نوع من الدميكة لها ورقتان مالمستان عادمتا التخديد
والكظر . شراخها يعلوه من ١٥ الى ٢٠ سم . زهرتها
كبيرة القد ، كروية الشكل ، بيضاء اللون ، قواعد اطراف
بتلاتها الداخلية موشحة بالاخضر || تزهري في شباط .


١٠٤٧٢ - دُمَيْكَةُ شَائِعَةٍ
Galanthus nivalis (S).
Perce-neige commun (F).
نوع من الدميكة أوراقها ضيقة ، مستطيلة ، محددة النصل
الوحيد الكظر ، لوها الى الخصار الازرق || شراخها يعلوه
من ١٠ الى ٢٠ سم . زهرتها بيضاء . بتلاتها الداخلية منمشة
بالاخضر || ازهارها يستمر من شباط الى نيسان .

١٠٤٧٣ - دُمَيْكَةُ مَغْبُونَةٍ
Galanthus plicatus (S).
Perce-neige plissé (F).
نوع من الدميكة أوراقها ثلاث . نصلها ثنائي التخديد
والكظر يبدو كأنه مغبون ، طولها نحو ٣٠ سم وعرضه ٣ .
شراخها يعلوه من ١٥ الى ٢٥ سم . زهرتها كبيرة القد
بيضاء اللون يعلوه موج اصفر . بتلاتها الداخلية منمشة
بالاخضر || ازهارها يستمر من آذار الى نيسان .






دنة الغاريقون دنة اللحاء



دنة النمل دنة رواغة



دنة شائكة دنة عطرة



دنة مذبة



دند الملوك



دند بري



دندروب

مستغلف الرأس الاسود ، اسمر المدب والرواجب ، اطحل اللون || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٤٠ يوماً ينقضي في التربة تحت الجشالة .

١٠٤٨٩ - دنج Propolis(F). Propolis Bee-glue(E).

صمغ رائنجي يلتقطه النحل ويستعمله لسد شقوق القفير ولستر الاساخ التي لا يتسكن من نقلها الى خارج المباءة .

١٠٤٩٠ - دند Medicinier (F). Jatropha (E).

جنس جنبات ونباتات عشبية معمرة من فصيلة الفربيونيات . مهدها المناطق الحارة . اوراقها مركبة قرصية متعاقبة معنقة طويلة الزناد ومنها زغنية النصل . ازهارها مظلية التجميع ، هامية الارتكاز ، طويلة الشمراخ || انواعه عديدة أشهرها دند الملوك .

١٠٤٩١ - دند الملوك ، جتروفيته ، حتب الملوك

Jatropha curcas (S). Medicinier cathartique, Gros pignon d'Inde (F). Jatropha, Physic-nut, Spurge nettle (E). Brechnussbaum, Purglernussbaum (D). Fagiolo d'India, Giatrofa catarica (I).

نوع من الدند وهو جنبة مستقيمة الساق جميلة الشكل تملو من ٨٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقها معنقة متعاقبة مركبة اصبعية مفروصة || يستخرج من ساقها واوراقها عصارة لبينة طيبة ومن بزورها مادة زيتية فعالة نسبياً نحو ٣٠٪ . بزورها مسهلة نافعة اذا استعملت برؤية وقد تصبح مقينة سامة عند الاكثار منها .

١٠٤٩٢ - دند بري ، قرقس Curcas (S).

Curcas, Pignon d'Inde, Noix des Barbades (F). جنبة طيبة وحيدة الجنس والنوع من فصيلة الفربيونيات . مهدها البلاد الحارة . ساقها زباء لبينة العصارة . اوراقها معنقة مركبة مفروصة . ازهارها قرصية تاجية ، ثمارها حبوب كروية || حبوبها طيبة وعصارتها كذلك .

١٠٤٩٣ - دندام Dendrodochium

جنس فطور مجهرية من عمارة الوطحانيات وفصيلة الكثنيات . جربه الكندية كثيرة الفروع العادمة الترتيب . كئائده وحيدة الخلية ، اسطوانية الشكل ، مستطيلة الاطراف . سادته مجنية دقيقة الزغب || انواعه قليلة العدد والاذى .

١٠٤٩٤ - دندالة Pépinière (F).

Nursery (of trees) (E). هو مكان استنبات الغراس الشجرية .

١٠٤٩٥ - دندران هو الاتاق ، اطلب .

١٠٤٩٦ - دندروب Dendrobium (S).

Dendrobe (F). Dendrobium (E). جنس نباتات اوعية جذمورية معمرة من فصيلة السحليات . منتها بعض مناطق الشرق الاقصى || سوقها مفصلي . اوراقها متباينة الاشكال ، جلدية النصال . ازهارها كبيرة . متساوية الفصل والبتلات ، مختلفة الالوان ، رائعة الجمال ، عطرية العرف || انواعه المعروفة قليلة العدد ، أشهرها التالية :

١٠٤٩٧ - دندروب أفروديت

Dendrobium Aphrodite (S). Dendrobe Aphrodite (F).

نوع من الدندروب . منتها بيرمانية . ساقها تملو من ١٠ الى ٢٥ سم . اوراقها جلدية النصال ، اهليجية الشكل ،

نمداها عناية اللون ، يعلوها من ترجة صدرها حتى شرجها خيوط ذهبية دقيقة . ارجلها وقرونها الاستشعارية برتقالية . تعيش في الاحراج تحت الحجارة . لا ضرر منها .

١٠٤٨٢ - دنة الغاريقون Oxyporus rufus (S).

Oxyore roux (F). حشرة من الدنيات طولها نحو ١٠ مم . رأسها اسود . صدرها احمر . بطنها برتقالي المدب اسود الجانب . نمداها الى السواد تعلوها ماجة زرقاء || تعيش على معظم الفطور اخصها الغاريقونيات .

١٠٤٨٣ - دنة اللحاء Siagonium quadricorne (S).

حشرة من الدنيات طولها من ٥ الى ٦ مم . لونها اسود او بني . قرونها الاستشعارية طويلة . الذكر يحمل على رأسه أربعة قرون || تعيش تحت لحاء الاشجار الضعيفة والمريضة .

١٠٤٨٤ - دنة النمل Othius myrmecophilus (S).

حشرة من الدنيات طولها نحو ٥ مم . لونها اسود نمداها الى الزرق . تعيش مع النمل .

١٠٤٨٥ - دنة رواغة Paederus riparius (S).

حشرة من الدنيات صغيرة القد طولها نحو ٨ مم . رأسها اسود ، صدرها اصهب صفاني . بطنها الى الصبهة الزاهية . طرفها اسمر . نمداها الى الزرق || تعيش قرب الماء وعلى الزراعات المروية تفترس الارق ويمكن مختلف الحشرات .

١٠٤٨٦ - دنة شائكة Emus hirtus (S).

Staphylin bourdon (F). حشرة من الدنيات طولها نحو ٢٦ مم . جسمها شائك . هلبها ذهبي اللون دقيق الحمة . رأسها وجسمها الى الصفار البني . نمداها الى الزرق السراء || تعيش تحت الحجارة وفي المزابل .

١٠٤٨٧ - دنة عطرة Staphylinus olens (S).

Staphylin odorant (F). حشرة من الدنيات طولها نحو ٢٥ مم . لونها الى السواد الداكن . تعيش تحت الحجارة تألف الاحراج والحقول والبساتين . يفوح منها عند لمسها رائحة عطرية مستحبة .

١٠٤٨٨ - دنة مذنبية Paederus fuscipes (S).

Paedere fourchu (F). Paederus fuscipes (E). حشرة فانصة من فصيلة الدنيات ورتبة غمديات الاجنحة . تألف الزراعات المروية والمواقع التي يكثر فيها العشب . قوتها الارق ثم مكن الحشرات || جسمها صغير القد يطول من ٨ الى ١٠ مم . ثوبها ثلاثي الالوان . رأسها والزمام الاخير من بطنها سود ، كوسلها والباقي من بطنها وجرامزها الى الشقحة الصنابية الموج . نمداها الى الزرق البحرية . رأسها مستدير الجرم ، قصير الخطم ، ضليج الفكين . عيناها صغيرتان ماحتان . زباناها شعليان مستطيلان . ظهرانها يلحف الزمام الاول من البطن . بطنها ذلق المؤخر ينتهي بشرج مذنب ثنائي السرك . ارساغها خفاسية العقيل || الذكر اكبر قدماً من الانثى والمع ثوباً منها واطول زبناً || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجمالنة في اوائل الربيع وتعيش حتى اواخر تشرين الاول . تسرح في النهار . تسافد في اواخر آب . تمتع المكن على سطح التربة تحت الاوراق اليابسة والعلل || البرقة عند بلوغها الادراك التام تطول من ١٦ الى ٢٠ مم . جسمها مستطيل الشكل ،

١٠٥٠٣ - دندل *، ميملولس، مقنعة

Mimulus (S). Mimule (F). Monkey-flower (E). Ganklerblume (D). Mimolo, Mimulo (I).

مقنعة تسمية الامير مصطفى الشهاني. جنس نباتات عشبية ونحشوشية من فصيلة الخنازيريات. انواعه نحو ٣٠ معظمها بري وبعضها زراعي تزييني. اوراقها متقابلة لاطحة ضيقة النصل. ازهارها ابطية معلقة فردية كبيرة الحجم، تويجها يشبه قناع مثلي الروايات الهزلية. الوانها زاهية متعددة || اشهر انواعه ما يتبع.

١٠٥٠٤ - دندل أشدق Mimulus ringens (S).

Mimule à gueule béante (F).

نوع من الدندل وهو عشبة معمرة تعلو من ٣٠ الى ٧٠ سم. ساقها فرعاء. اوراقها مستطيلة حاضنة، نصلها ملس البشرة، متشاري الحافة. ازهارها متوسطة القد، مشدقة، بنفسجية اللون || ازهارها يستمر من تموز الى آب.

١٠٥٠٥ - دندل أصفر Mimulus luteus (S).

Mimule jaune (F).

نوع من الدندل وهو عشبة معمرة تعلو من ٢٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها اهليلجية مستطيلة. نصلها مسنن الحافة. ازهارها الى الصفار الكبريتي || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول.

١٠٥٠٦ - دندل ثنائي اللون Mimulus bicolor (S).

Mimule bicolore (F).

نوع من الدندل وهو عشبة سولية تعلو من ١٠ الى ٣٠ سم. اوراقها مستطيلة نصلها ملس البشرة لامع الخضار. ازهارها قصيرة المالحق كبيرة القد قطرها نحو ٤ سم. لونها ابيض واصفر || ازهارها صبي.

١٠٥٠٧ - دندل دوبيكي Mimulus primuloides (S).

Mimule-Primevère (F).

نوع من الدندل وهو عشبة معمرة تعلو من ٨ الى ١٥ سم. اوراقها قرصية ضمية اهليلجية الشكل، نصلها ازغب البشرة. ازهارها فردية طويلة المالحق الخيطية، لونها الى الصفار الذهبي || ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين.

١٠٥٠٨ - دندل شقيقي، دندل كاردينالي Mimulus cardinalis (S).

Mimule cardinal, M. écarlate (F).

نوع من الدندل وهو عشبة معمرة تعلو من ٥٠ الى ١٢٠ سم. ساقها منتصب فرعاء. اوراقها بيضيه حاضنة، نصلها بارز المروق مسنن الحافة. ازهارها كبيرة القد ارجوانية اللون مسكية الرائحة || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول.

١٠٥٠٩ - دندل لزج Mimulus glutinosus (S).

Mimule visqueux (F).

نوع من الدندل وهو جنبه معمرة عديدة الضروب. ساقها لزجة تعلو من ٥٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها مستطيلة حاضنة، نصلها ملس البشرة مسنن الحافة. ازهارها قصيرة المالحق، كبيرة القد، مختلفة الالوان الزاهية || ازهارها يستمر من ايار الى ايلول.

١٠٥١٠ - دندل مسكي Mimulus moschatus (S).

Mimule musqué (F).

نوع من الدندل وهو عشبة معمرة لزجة مسكية الرائحة تعلو من ٢٥ الى ٣٥ سم. ساقها منبسطة منبطحة. اوراقها

معتدلة الحجم. ازهارها تنشب في اباط مفاصل الساق وهي صفراء اللون، برتقالية الشفيرة المطوقة بختار ابيض. تنويرها يستمر طوال شهر تموز.

١٠٤٩٨ - دندروب فاخير Dendrobium speciosum (S).

Dendrobe superbe (F).

نوع من الدندروب. منبتها الهند والافغان. ساقها غليظة ترتفع من ٢٥ الى ٣٥ سم. اوراقها تعد من ٢ الى ٣، نصالها اهليلجية، جلدية النسيج. ازهارها عقودي التجميع. ازهارها عاجية اللون. شفيفاتها مرقوشة بالاسود. تنويرها يستمر طوال فصل الخريف.

١٠٤٩٩ - دندروب نبيل Dendrobium nobile (S).

Dendrobe noble (F).

نوع من الدندروب. منبتها الصين. ساقها ترتفع من ٦٠ الى ١٨٠ سم. اوراقها عديدة، من ١٢ الى ١٨، نصالها اهليلجية بحيلة الخضار. ازهارها عقودي التجميع. ازهارها وردية الختار، عاجية الوسط. شفيفاتها قلبية الشكل، بيضاء اللون تعلوها بقع قرمزية || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران.

١٠٥٠٠ - دندروبوات * Dendrobates (S).

Dendrobate (F). Dendrobates (E).

جنس ضفادع قازقة من فصيلة الرئائيات. انواعه المعروفة قليلة العدد مهدها بعض مناطق امريكا الجنوبية والوسطى || اجسامها صغيرة القد. ذكورها تطول من ٥ الى ٦ سم. واناثها تطول من ٦ الى ٧ سم. رؤوسها معتدلة الشكل لامستعرضة. اخطامها شبه مخروطية. فكوكها العليا والسفلى عادمة الاسنان. اصابعها طليقة في القوائم الامامية ومقيدة بحظاب ضيق لا يتجاوز الزام الاول في القوائم الخلفية || جلودها مبعثرة الثمول والغدد الفارزة. فرزها قلوي المادة، نشيط السم، كان ولا يزال يستعمل في تسميم نبال بعض القبائل || اثوابها الى السمرة البنفسجية الخضراء المواج يعلوها تخطيط قاطب اغبر ورقشة دقيقة متباعدة بيضاء || تعيش من ١٠ الى ١٢ سنة. تألف المواقع القريبة من المناقع وبحاري الماء. سعيها على الارض قفز رشيق معتدل المجال. قوتها الحشرات والديدان || اناثها تسرا من ١٠٠ الى ١٢٠ دعبلة ضمن شلة متشعبة تطرحها عند اطراف المناقع في المياه الضحلة.

١٠٥٠١ - دندروفوم Dendrophoma

جنس فطور مجهرية من فصيلة الصغيات. بكتيدات لا قياسية النشوء منها ادمية ومنها سطحية، جميعها كروية سمكة الجول حلبيية المتق. شفيراتها متشعبة. بويضاتها اسطوانية شفافة || انواعه قليلة بعضها يعثر في النباتات الحرجية فيركب الاغصان والافناد دون أن يؤذيها.

١٠٥٠٢ - دندوك * Dendroica (S).

Dendroica (F). جنس طير من الجواثم سنيات المناقير وفصيلة المنطليات. انواعه المعروفة نحو ٥٠ منتشرة من الهند الى امريكا الجنوبية والشمالية || اجسامها صغيرة تطول من ١٢ الى ١٦ سم. اثوابها متباينة الالوان تختلف مع اختلاف الانواع رؤوسها وارديتها واجنحتها وازوارها واذنابها دائماً ملونة. محاسرها وصدرها واياطلها وبطنها غبراء اللون او بيضاء او متمشة || قوتها الحشرات والثمار اليانعة والبزور.



دندروبوات



دندك



دندل

معنقة بيضية ذلقة الزام الاخير. نصلها خلي البشرة. ازهارها الى الصفار الفاقع يعلوه توشيم اسمر || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

١٠٥١١ - دُنْدُلُ نَحَاسِي. *Mimulus cupreus* (S).

Mimule cuivré (F).

نوع من الدندل وهو عشبة معمرة تعلو من ١٥ الى ٢٥ سم . ساقها فرعاء منبسطة كثيرة الورق . أوراقها ثلاثية العروق البارزة . نصلها مالمس البشرة مسنن الحافة . ازهارها نحاسية اللون يعلوها موج اصفر . ضروبها عديدة تختلف بالوانها || ازهارها صبي .

١٠٥١٢ - دُنْدُلُ وَرْدِي. *Mimulus Lewisii* (S).

Mimule rose (F).

نوع من الدندل وهو عشبة معمرة تعلو نحو ٣٠ سم . أوراقها اهليلجية حاضنة . ازهارها وردية اللون كبيرة القد فارشة . ازهارها صبي .

١٠٥١٣ - دُنْدِمُ ، تَلْفُورَةٌ. *Stereum, Thelephora* (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة الدندميات ، انواعه عديدة منها طفيلية تعيش على النسيج النباتية المجروحة ومنها رمية تعيش على الاخشاب اليابسة والمقطوعة || اشهر انواعه ما يتبع .

١٠٥١٤ - دُنْدِمُ السِّنْدِيَانُ* ، عَفَنُ نُخْرُوبِي. *Stereum frustulosum, Thelephora perdrix* (S).

Pourriture alvéolaire, Pourriture en bois de perdrix (F).

فطر مجهرى رمي يركب اخشاب السنديان اليابسة والمقطوعة فيعطيها || مظهره الخارجى دمايل فطرية طحلاء اللون لا قياسية الشكل والحجم كثيفة التجميع تتركب صفحة الخشب الخارجية فتسبب نخوها بعد انحلال نسجها . يكافح باستعمال مركبات النحاس .

١٠٥١٥ - دُنْدِمُ خَشَبِي. *Stereum rugosum* (S).

فطر رمي مجهرى يركب البندق وبعض الاشجار الخرجية اخصها الزان والسنديان . ومنهم من اعتبره الودج الرئيسي للآكلة التي تعطب جلوع واغصان السنديان || مظهره الخارجى دملة تعلو الاعضاء المقطوعة في مستوى اللحاء والشكير ثم تقضي على الحواجز الحليوية طبقة بعد طبقة حتى القلب . اما الفطر فايض اللون تتوسطه بقعة حنطية وتفوح منه عند اللمس رائحة عطرية مستحبة كانها الويلا .

١٠٥١٦ - دُنْدِمُ شَالِك. *Stereum hirsutum* (S).

فطر مجهرى كثير الشروع على الاغصان الميتة حيث يركب اللحاء والشكير والخشب || يصيب الزان والسنديان والتوت والكرمة . مظهره الخارجى ثماليل صغيرة هليوية طحلاء اللون تعلو الاغصان والافناد اليابسة وتمتد زولا على الاجزاء السليمة فتعطيها بعد ان تقضي على الشكير الذي يصبح عديم الحيل وعلى اللحاء التي تنطلقها بقروح مستديرة عابقة اللون الحنطى || يكافح بقطع الاعضاء اليابسة والموصومة وبتطهير الجروح بمحلول زيت الكتان مع الزيرقون .

١٠٥١٧ - دُنْدِمُ قِرْمَزِي* ، وَرَزَا. *Stereum purpureum, Thelephora purpurea* (S).

Maladie du plomb (F).

فطر مجهرى يتطفل على عدة نباتات اخصها الاجاص

والافلوس والتفاح والخور والحنان والحوخ والدراقن والدلب والرند والزهرور والسفندر والسوقم والصفصاف والنيراء والقيقب والكرز والكرمة واللوز والمشش والمضاخ . مظهره الخارجى على الاوراق التي يصلها من اي جرح كان في الشجرة ، مشحة رصاصية اللون تعلو النصل على صفحته العليا فتدوم عدة اسابيع ثم تنحرف الى اللون الحنطى بعد ان تجمع صفحة النصل السفلى فتسبب الاعبال الباكر || وهو على الافنان والنوامي مشحة خلية رصاصية تدوم بعض الوقت وتسبب ، عند تفشيها ، املاص الازهار قبل عقدتها || يكافح باقتطاع الافنان المصابة وبتطهير الجروح بمحلول زيت الكتان مع الزيرقون .

١٠٥١٨ - دُنْدِمِيَّات. *Thelephoraceae* (S).

Thiélephoracées (F). *Thelephoraceae* (E).

فصيلة فطور مجهرية من رتبة الدعاميات . تتميز بدعاماتها غير الموثورة . نكاعها تلحف كميات جامدة ، صفحاتها الخصبية سفلية الاتجاه || اجناسها وانواعها قليلة العدد منها جنس واحد يهم الاقتصاد الزراعى يدعى دندم .

١٠٥١٩ - دَنَف. *Cachexia* (F). *Cachexia* (E).

هزال يصيب البقر والغنم فيضعفها ويسبب الى صحتها . اسبابه عديدة منها مباشرة ومنها متأخرة عن علة قديمة او عطب في بعض اعضاء الجسم .

١٠٥٢٠ - دَنَف الكَبِد ، دُوْدَة الكَبِد. *Distoma hepatica* (S).

Cachexie aqueuse, Distomatose, Douve du foie (F). *Cachexia aquosa, Distomum* (E).

مرض يصيب البقر والضأن فيؤذيها . سببه دزيدات طفيلية من العريضات تستقر في الكبد بعد ان تكون يويضات ذرية تبتلمها الابقار والاغنام مع الاعشاب المربوطة بهذه الديدان .

١٠٥٢١ - دَنَف عَظْمِي. *Cachexie osseuse, Ostéoclastie, Ostéomalacie* (F).

Osteoclasia, Osteomalacia (E).

مرض يعترى الماعز سببه نقص في تمثيل الغذاء ينتج عنه ضعف ظاهر في بعض اجزاء الهيكل العظمي يعود الى قلة الفسفات وعدم اتزان العناصر الكلسية في جسم الحيوان .

١٠٥٢٢ - دُنْفُصَة الزَنَابِير* . *Melittobia acosta* (S).

حشرة من الدنفصيات صغيرة القد تتطفل مع يرقاتها على دبا الزنابير وتقضي عليها .

١٠٥٢٣ - دُنْفُصَة المَن* ، أَفْلُونُسُ التَّفَاح. *Aphelinus mali* (S).

حشرة من الدنفصيات صغيرة القد طولها نحو ثمانية اجزاء المليمتر . تتطفل على المَن القطنى وتقضي عليه .

١٠٥٢٤ - دُنْفُصِيَّات. *Eulophidae* (S).

Eulophidés (F). *Eulophidae* (E).

فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الأجنحة المحصورة . انواعها عديدة جميعها نافعة تتطفل على عدة حشرات ضارة اخصها الزنابير والمَن القطنى . حشرات صغيرة القد طولها دون المليمتر الواحد . زباناها صغيرة ودقيقة . ارساغها رباعية العقل . اثوابها متباينة الالوان . اشكال ذكورها تختلف عن اشكال انثائها || اشهرها دنفصة المَن القطنى ودنفصة الزنابير .



دندم السنديان



دندم قرمزي



دنفصة الزنابير



دنفصة المَن

مربع . وكان في الماضي يساوي ٩١٩ متراً مربعاً وثلاث
المتراً المربع .

١٠٥٣٥ - دَنِيغَات ٥ Staphylinidae (S).

Staphylinidés (F). Staphylinidae, Rove beetles (E).
Kurzflügler, Kurzflügelkäfer (D).

فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها
تبلغ ٢٠٠٠ معظمها صغير القد . قرونها الاستشعارية
مختلفة الاشكال والقواصل . اجنحتها لا قياسية الحجم
والشكل || تعيش في مختلف البيئات وعلى مختلف الاشياء .
منها مفترسة وغيرها يركب الزهور وبعضها يعيش مع النمل
وفي الزبل وعلى الفطور وتحت لحاء الاشجار اليابسة .

١٠٥٣٦ - دَنِيغِيه ٥ Danaidia (S).

Danaidia (F). Danaidia (E).

جنس نباتات جنية معمرة من فصيلة البهشيات . اوراقها
متعاقبة سنانية النصل الجامد الصفحة . ازهارها تاجسية
الارتكاز ، ذكية العرف ، برتقالية اللون . زراعتها
التزيينية شائعة الاستعمال . ترغب في المواقع الظليلة .

١٠٥٣٧ - دَنِيغِيه ٥ Heterosporium

جنس فطور مجهرية من الريدانيات وفصيلة اللطحيات .
جريه الكندية نخيلة مستطيلة ملونة . كئانده اسطوانية
ضخمة ، مستديرة الطرف ، ثلولية الغلاف || انواعه
المؤذية قليلة اعرفها ما يتبع .

١٠٥٣٨ - دَنِيغِيه الاسبانخ ٥

Heterosporium variabile (S).

فطر مجهري يتطفل على الاوراق فيؤذيها . مظهره الخارجي
يقع مستديرة قطرها نحو ١٠ مم . تركيب نصل الاوراق .
تبدو شقراء اللون ثم تنحرف الى السمرة فيغشاها خلل كثيف
التجميع اسود المواج يقضي على النسيج المنحارة فيؤذي النبات
بعد ان يعطب كامل النصل || يكافح عند ظهوره باستعمال
بعض املاح النحاس الخفيفة .

١٠٥٣٩ - دَنِيغِيه الاغروان ٥

Heterosporium illacis (S).

فطر مجهري يتطفل على اوراق الاغروان . مظهره الخارجي
يقع صغيرة ، مبثرة ، لا قياسية الشكل ، سمراء اللون ،
عابقة الحتار ، تركيب نصل الاوراق على صفحته .
يسبب يباس الاوراق ويؤذي النمو والازهار || يكافح
باستعمال الاملاح النحاسية الخفيفة .

١٠٥٤٠ - دَنِيغِيه الثوم ٥ Heterosporium allii (S).

فطر مجهري يتطفل على اوراق الثوم . مظهره الخارجي
يقع مبثرة لا قياسية الشكل والحجم ، لونها الى الصفرة
تركيب الاوراق فتسبب ذبولها .

١٠٥٤١ - دَنِيغِيه الشوفان ٥

Heterosporium avenae (S).

فطر مجهري يتطفل على عصف الشوفان في الازمنة والمواقع
الرطبة || مظهره الخارجي يقع مستطيلة تركيب العصف
بموازاة اعصابه ، تكثر عند حافة النصل ، لونها الى
السمرة ، تسبب يباس النسيج المنحارة .

١٠٥٤٢ - دَنِيغِيه ٥ Didymiella (S).

جنس فطور مجهرية من السخاميات وفصيلة المشويات .
اعصابها ضخمة ، بوفها مستطيل شفاف ، ثنائي الخلية

١٠٥٢٥ - دَنَقْ هو الحرق ، اطلبه .

١٠٥٢٦ - دَنَقَار ٥ Dinocarsis (S).

Dinocarsis (F). Dinocarsis (E).

جنس حشرات نافعة من فصيلة الشرافيات ورقبة غشائيات
الاجنحة المضمورة . انواعه عديدة موطنها معظم مناطق
البلاد الحارة والمنحرفة نحو المعتدلة . جميعها تتطفل على
الحشرات الضارة من الحرشنيات وذوات الجناحين ||
اجسامها صغيرة القد تطول نحو ١ مم . رؤوسها مستعرضة ،
قرونها الاستشعارية خيطية مستطيلة . جواشها كبيرة .
بطونها مخروطية المؤخر . اناثها مجنحة . ذكورها صغيرة
الاجنحة القصيرة . اناثها تراوح بين الاسود والاخضر
الاليس . اجنحة الانثى موشمة بالبي .

١٠٥٢٧ - دَنَقَة * ، زُوَان مُسَكِر

Lolium temulentum, Bromus temulentus, Crepolea
temulentum (S). Ivraie, Lolium, Zizania, Ivraie en-
vrante (F). Ivray, Cheat, Darnel (E). Dolik, Taumel-
lolch (D). Lolio, Loglio, Zizzania, Pane vino (I).

نبات عشبي حولي من النجيليات ينبت بين الزروع
فيفسدها . حبه مسكر سام للانسان والحيوان ما عدا الدجاج .

١٠٥٢٨ - دَنَقَلَة * ، جُنُقَلَة

Cinclus cinclus aquaticus (S). Cincle plongeur (F).
Water-ouzel, Dipper (E).

طائر من دجاج الماء وفصيلة التفليقيات . يعيش قرب المياه
العذبة . صغير القد بحجم البلب ، ابيض الصدر ، والبطن
وساؤه اسود . يسبح ويفوص ويصطاد احوام .

١٠٥٢٩ - دَنَقُول ٥ Donacicola (S).

Donacicole (F). Donacicola (E).

جنس طير من الجواثم مخروطيات المناقير وفصيلة التنوطيات .
انواعه المعروفة ستة اعطائها تمتد من جزر الزابج الى
استرالية || اجسامها صغيرة مكتلة . رؤوسها كبيرة
مخروطية المناقير . اذناها صغيرة مدببة الاطراف . اناثها
الى الشققة . رؤوسها سود . بطونها بيض . صدورها
مرفرفة او متمشة || قوتها الحشرات والثمار اليافعة والبرزور .

١٠٥٣٠ - دَنَكَة Anaerobiose (F).

Anaerobiosis (E).

الدنكة حياة الكائنات الدنكسية اي الكائنات اللاهوائية .

١٠٥٣١ - دَنَكَسِي ، لاهوائي ، اَنِيروبي

Anaerobique (F). Anaerobic (E).

نعت تعريفية يطلق على جميع الاحياء المجهرية التي تستطيع
الحياة بعيداً عن الهواء .

١٠٥٣٢ - دَنَكَسِيَة ، لاهوائية ، اَنِيروبيَة

Anaerobie (F). Anaerobe (E).

صفة الكائنات الحية المجهرية التي تستطيع العيش منعطمة
عن الهواء مستمدة طاقاتها الحياتية من العناصر العضوية
التي تفسخها .

١٠٥٣٣ - دَنَكُو Dingo

هو ذئب استراليه ، اطلبه .

١٠٥٣٤ - دُنُم ، دُونُم Donum, Décare

الدنم مقياس سطحي يساوي بالعرف الحالي الف متر



دنقار



دنقة




دنقلة



دنقول




دنديه



دنيسة الاسبانخ

١٠٥٥٤ - دَهْم ٥ Effectif (F). Effective (E).

الدهم ج دهوم. مجموع الافراد الذين ينتمون الى فئة معينة او فصيلة او قبيلة... راجع عداد.



دَنِيعَةُ الْبَنْدُورَةِ

١٠٥٥٥ - دُهْن Hulle essentielle (F).

Essential oil (E).
مادة زيتية دسمة تستخلص من النبات او الحيوان وهي تدعى زيتاً اذا كان مصدرها النبات وشحماً اذا كان مصدرها الحيوان. وهي تتركب اساساً من الكربون والاكسجين والهيدروجين ، وقد تنحل عند تسخينها الى مجموعتين مجموعة الغليسرين ومجموعة الحوامض العضوية || والدهن الذي يعتبر من الاغذية الضرورية للجسام الحيوانية لانه يمدّها بالحرارة اللازمة للنشاط ، يوجد بنسب متفاوتة في بزور معظم النباتات وفي لحوم والبان الحيوانات .

١٠٥٥٦ - دُهْن الْقَدَاح Nérol (F). Neroli (E).

هو عطر القداح الذي يستحصل من تقطير زهر النارج .

١٠٥٥٧ - دُهْن الْقَطْرَان Huile de goudron (F).

Tar oil (E). مزيج من القطران والدهن الثقيل .

١٠٥٥٨ - دُهْن الْكِتَان ، زَيْت الْكِتَان

Huile de lin (F). Linseed oil (E). هو عصير بزر الكتان .

١٠٥٥٩ - دُهْن اللوز Huile d'amandes (F).

Oil of almonds (E). هو عصير لباب اللوز .

١٠٥٦٠ - دُهْن النَّارِجِيل ، سَمْن نَبَاتِي

Cocose هو عصير ثمار النارجيل .

١٠٥٦١ - دُهْن النَّخِيل Huile de palme (F).

Palm-oil (E). دهن اصفر اللون يستخرج من ثمرة نخل الدهن وهو دهن غير مأكول يستعمل في صناعة الشمع والصابون .

١٠٥٦٢ - دَهْنَج Malaxide

جنس نباتات عشبية برية متعفة من فصيلة السحليات . ازهارها عنقودية . يقال انها لا تخلو من المنافع الطبية .

١٠٥٦٣ - دَهْنَج Malachite

هو كبرونات النحاس الطبيعي المهدرت . لونه جميل الخضار خفي الموج . تبلوره لا قياسي الشكل يكثر فيه التصفيح المشتمل والموشور المعيني القائم . يقطع ويصقل بسهولة . يذوب في الحوامض وفي الامونياك . ثقله النوعي يراوح من ٣.٧ الى ٤.١ صلابته يراوح من ٣.٥ الى ٤ .

١٠٥٦٤ - دُهْنِي ، شَحْمِي Sébacé (F).

Sebacous (E). صفة ما كان تركيبه كالشحم او كانت طبيعته طبيعة الشحم .

١٠٥٦٥ - دُهْنِين Oléine (F). Oleine (E).

اصل دهني لا لون له يتكون في الاجسام الدهنية .

١٠٥٦٦ - دَوَاء Médicament (F). Medicament (E).

هو العلاج الموصوف لمرض معين .

١٠٥٦٧ - دَوَاء الْحَبَّة راجع جنطيانا صفراء .

شغبي الارتكاز الزقي || انواعه المؤذية قليلة اعرفها الثلاثة التالية .

١٠٥٤٣ - دَنِيعَةُ الْبَنْدُورَةِ ٥ *

Didymella lycopersici, Diplodina lycopersici (S).

فطر مجهري يصيب شتول البندورة والباذنجان فيؤذيها . مظهره الخارجي يكون على شكلين اما بقع سمر متلاصقة مستطيلة يبلغ طولها نحو ٦ سم . تتركب الساق على ارتفاع قليل عن التربة ، واما اطواق من البقع المتراصة تحيط بالساق كالسوار || اضراره جسيمة ان استحکم الزراعة لانه يعطب الشتول ويؤذيها || يكافح باستعمال الفواطير المرتكزة على النحاس .

١٠٥٤٤ - دَنِيعَةُ الثُّفَّاح ٥

Didymella mali, Didymella voglinoi, Sphaeropsis pseudo-diplodia (S).

فطر مجهري ثانوي قليل الإذى يركب قشور الاغصان والافناد الموصومة ولا يقرب القشور السليمة || مظهره الخارجي بقع بيضية الشكل مهدبة حنطية اللون .

١٠٥٤٥ - دَنِيعَةُ الْكَيْشْمِش ٥ *

Didymella applanata, Didymosphaeria applanata, Mycosphaerella rubina, Sphaerella rubina, Coniothyrium (S).

فطر مجهري يصيب الفروع والبراعم والاوراق . مظهره الخارجي بقع بنفسجية اللون تتركب البراعم الابعية ثم ينتشر على الاوراق من جانبي الضلع فيبدو بقعاً مقترنة الزوايا لونها الى السمرة . وهو على الفروع فقط سود متلاصقة تسبب جفاف البشرة وسقوطها || يفتك ويعطب في المناطق الرطبة الباردة || يكافح باستعمال سائل بوردو وغيره من الفواطير الفعالة .

١٠٥٤٦ - دَهَامِين هو الجذاب ، اطلبه .

١٠٥٤٧ - دَهَامِين شُكْرَانِي راجع ابرة العجوز .

١٠٥٤٨ - دَهَانَج Chameau (F). Camel (E).

الجمال الضخم ذو السنامين .

١٠٥٤٩ - دَهَب Nécrose (F). Necrosis (E).

هو النخر ، اطلبه .

١٠٥٥٠ - دَهْبَل * Casarca (S). Casarca (F).

جنس طيور مائة من البطيات صفحيات المناقيد كفيات القدم . انواعه ستة جميعها من القواطع . اعطائها تشمل البلاد الاسيوية والاروبية والافريقية . جميعها كبيرة الجثة قصيرة القوائم متباينة الالوان الزاهية ، اطواقها وافانيكها واطراف سواقطها سود . اشهر انواعها الشهرمان المعروف بأبي فرة .

١٠٥٥١ - دَهْن Compression forte (F).

Strong compression (E).

الدهق : شدة الضغط . ادعتت الحجارة : اشتد تلازها ودخل بعضها في بعض .

١٠٥٥٢ - دَهَق هو السوسن الابيض ، اطلبه .

١٠٥٥٣ - دَهْلِيَّة هي الاضاليه ، اطلبها .



دَنِيعَةُ الْكَيْشْمِش



دَهْبَل

من القارة الافريقية . تألف الفياقي والبراري . عدوها قفز مستمر . قوتها الحشرات واساريعها || اجسامها صغيرة تطول من ٢٤ الى ٣٢ سم . بما فيه الخنابة والذنب . رؤوسها مستفلطة . عيونها كبيرة جاحظة . خناباتها تطول من ٢ الى ٣ سم . اذناها ملعقة كبيرة . اذناها مستطيلة . ارجلها رباعية الاصابع . اثوابها الى الشقحة المتفاوتة السمرة . بطونها وصدرها تبنية اللون . اناثها عشارية الاطباء .

١٠٥٨١ - دَوَام (F). Perennality (E).
حالة الاستمرار الطويل .

١٠٥٨٢ - دَوَامَات (S).
Gyrinidae (S).
هي الجرنوسيات ، اطلبها .

١٠٥٨٣ - دَوَامَة * (S).
Cleodora (S).
Cleodore (F). Cleodora (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مجنحات الارجل وفصيلة القنبايات . انواعها المعروفة قليلة العدد ، بعضها من متحجرات الاراضي الثالثية والبعوض الآخر يعمى يعيش في بحار البلاد المعتدلة الحرارة ولا يقترب من الشطوط . اسرارها وافرة العدد . اجسامها صغيرة . ارجلها مجهزة بزوائد جانبية زعنفية الشكل . اصداؤها مخروطية ، شفافة ، سريعة العطب .

١٠٥٨٤ - دَوَائِر الطُول (F). Cercles de longitude (F).
Longitude circles (E).

١٠٥٨٥ - دَوْبَر * (S).
Asellus (S).
Aselle (F). Asellus (E).
جنس دوبيات مائية من القشريات العليا ، متساويات الارجل ، وفصيلة الدوبيريات . انواعها المعروفة عديدة معظمها من عظم البلاد الباردة وبعضها يعيش في بحيرات وغدران البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها اهليلجية مبطلة . قرونها الاستشعارية دقيقة ، مستطيلة . عيونها ناشزة صغيرة . قوائمها مهدبة منعقفة الاطراف المجهزة بمقاطم ذرية .

١٠٥٨٦ - دَوْبَرِيَّات * (S).
Asellidae (S).
Asellidés (F). Asellidae (E).
فصيلة دوبيات مائية من القشريات العليا متساويات الارجل . اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في مياه الاقطار الباردة والمعتدلة الحرارة || اجسامها مبطلة عادية الحواف ، واضحة الحلقات السككية متساوية القوائم || اعرف اجناسها واشهرها الدوبر والجيرة والمئة واللمنورية .

١٠٥٨٧ - دَوْبَل (F).
Ane de petite taille (F).
Young ass (E).
هو الحمار الصغير لا يكبر . جاء ان معاوية كتب الى ملك الروم : « لاردنك اريساً من الارارسسة ترعى الدوابل » || والدوابل ايضاً هو نخزير الارض (راجه).

١٠٥٨٨ - دَوْتِيشِيْزَا * (S).
Dothichiza (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الدلاميات . انواعه قليلة لا مؤذية . بكثيداته سطحية الارتكاز شارفة وفارشة . بويضاته بيضية الشكل بسيطة التركيب شفافة .

١٠٥٦٨ - دَوَاء سَائِل (F).
Brevage (F).
Beverage, Drench (E).
ماء يضاف اليه بعض الادوية وتسقاه الحيوانات الداجنة المريضة .

١٠٥٦٩ - دَوَاجِن ، رَوَاجِن ، حَيَوَانَات أَهْلِيَّة (F).
Animaux domestiques (F). Domestic animal (E).
هي الحيوانات الاليفة المستأنسة . اعرفها واشهرها الخيل والحمير والابل والفيلة والبقر والجمال والضان والماعز والخنزير والكلاب والسنائر والارانب والدجاج والبط والاوز والحمام والغرغر والتم والطاووس .

١٠٥٧٠ - دَوَاجِن قَرْنَاء (F).
Aumailles (F).
Horned cattle (E).
هي كبار الدواجن من ذوات الظلف كالابقار والجماليس .

١٠٥٧١ - دَوَاجِنِيَّ (F).
Zootechnicien (F).
Zootechnician (E).
من تخصص بعلم الدواجن .

١٠٥٧٢ - دَوَّار (F). Rotary (E).
Rotatif (F). Rotary (E).
ما كان يعمل بالحركة الدورية .

١٠٥٧٣ - دَوَّار الشَّمْس (F).
Rotateurs (F).
Rotifères (F). Rotifer, Wheel-animalcule (E).
صف حيوانات من شعبة اشباه الديدان .

١٠٥٧٤ - دَوَّارَات ، دَوَّلَابِيَّات (F).
Rotifères (F). Rotifer, Wheel-animalcule (E).
صف حيوانات من شعبة اشباه الديدان .

١٠٥٧٥ - دَوَّارَات * (S).
Orbicularae (S).
Orbiculés (F). Orbicularae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات عضديات الارجل . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة ، معظمها من متحجرات الاحقاب القديمة . جميعها شبه بيضية الشوزن ، معتدلة التبسيط ، ملتحمة باصداؤها بسويقات طينية قصيرة تخترق المصاريع السفلية الارتكاز || اعرف اجناسها واشهرها النواة والديسينة .

١٠٥٧٦ - دَوَّارَة (F). Verticille (F).
Verticilli (E).
جميع اعضاء متشابهة متحلقة حول محور .

١٠٥٧٧ - دَوَّارَة * (S).
Orbicula (S).
Orbicule (F). Orbicula (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات عضديات الارجل وفصيلة الدوارات . انواعها المعاصرة قليلة العدد يكثر وجودها في بحار البلاد الباردة والمنحرفة نحوها || تعيش على الصخور المغورة المتوسطة الغور . اصداؤها قرنية المادة ، بيضية الشوزن ، منبسطة المصاريع السفلى الرقيقة ، محدبة المصاريع العليا المتتابعة التحزيز المستدير .

١٠٥٧٨ - دَوَّارِي ، ضُمِّي (F).
Verticillé (F).
Verticillate (E).
نمت تعريفي يطلق على ما كان شكله ، من الاعضاء النباتية ، كالدوارة .

١٠٥٧٩ - دَوَّاس (F).
هو الملاقي الابيض ، اطلبه .

١٠٥٨٠ - دَوَّالْ * (S).
Rhynchocyon (S).
Rhynchocyon (F).
جنس حيوانات لبونة حاشرة جاسة من فصيلة الحداديات . انواعه المعروفة خمسة منتشرة في معظم المناطق الشرقية والوسطى



دَوَّارَة



دَوَّارَة



دَوْبَر



دوخر النعاج



دودة الحرير



دودة الحرير



دودة الحرير



فراشة دودة الدقيق

الدور الثاني : يبدأ بالانسلخ الاول اي الصومة الاولى التي تدوم نحو ٢٤ ساعة تمتنع فيها اليرقة عن الأكل ثم تعود فتتغذى مدة اربعة ايام .

الدور الثالث : يبدأ بالانسلخ الثاني اي الصومة الثانية التي تدوم نحو ٤٨ ساعة ثم تعقبها التغذية على مدة اربعة ايام .

الدور الرابع : يبدأ بالانسلخ الثالث اي الصومة الثالثة التي تدوم من ٣٦ الى ٤٠ ساعة ثم تعقبها التغذية مدة اربعة ايام تأكل فيها اليرقة بشراهة لأنها تكون في مرحلة نموها السريع .

الدور الخامس : يبدأ بالانسلخ الرابع اي الصومة الرابعة التي تدوم من ٤٠ الى ٤٨ ساعة تعقبها التغذية النشطة مدة ثمانية او عشرة ايام تأكل اليرقة في خلالها اربعة اضعاف ما تأكله في ادوارها السابقة .

الدور السادس : وهو الدور الصلجي يبتدئ عندما تتوقف اليرقات نهائياً عن التغذية فتتساقط الشيج وتحول الشرائق . يدوم هذا الدور طبيعياً من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع تتحول فيه اليرقة الى عذراء ثم تخرج فراشة كاملة بعد ان تفرز مادة قلبية بنية اللون ترطب بها احد قطبي الشرنقة وتسبب تلف الحرير .

لذلك تقطف الشرائق بعد تساقط الشيج بعشرة ايام ويصار الى نشرها في الشمس نحو ٤ ساعات لتفطيس العذارى ومنعها من عطب الحرير . ثم تباع من يقوم بحلها . اما الحرير فهو مادة عضوية لزجة تفرزها غدتان مستطيلتان قائمتان على جانبي الجزء الامامي من القناة الهضمية ثم تتصلان عند الرأس فتكونان انبوبة واحدة تنفتح على الشفة السفلى فيسيل منها الحرير الذي يحمد قوامه عند ملاسته الهواء فتوجهه اليرقة حيث تشاء || نسج الشرنقة يستمر نحو ٣ ايام . طول الخيط نحو ٦٥٠ م . ينسج من قم اليرقة بمعدل ١٥ سم . بالدقيقة الواحدة .

١٠٥٩٧ - دُوْدَةُ الخِنْزِير * ، تريخين ، تريشين Trichina spiralis (S). Trichine (F). Trichina, Thread-worm (E).

دودة من السلكيات الطفيلية تكثر في الخنازير والجردان . تنتقل الى الانسان والحيوان حيث تعيش وتتكاثر في الامعاء ثم تنتقل مع الدم الى سائر اعضاء الجسم .

١٠٥٩٨ - دُوْدَةُ الخَوْخ هي كاربوكبس الخوخ ، اطلبه .

١٠٥٩٩ - دُوْدَةُ الدَّقِيق * ، نَارِيَّة الدَّقِيق Asopia farinalis (S). Asople, Teigne des farines (F).

يرقة تعيش على التثارات النباتية والقش والثمار الجافة والدقيق والكسب والفلين ... فراشتها صغيرة القد من فصيلة الناريات تظهر من ايار الى تشرين تألف البيوت والافران والمطاحن . اجيالها الحولية ثلاثة .

١٠٦٠٠ - دُوْدَةُ الذَّرَّة هي غسقية الذرة الصفراء ، اطلها .

١٠٦٠١ - دُوْدَةُ الزَّرْع ، سِثْرِيس الزَّرْع Scythris temperatella (S).

يرقة دودية غيطية تدخل تحت بشرة فصل النصف فتتغذى عصارة النسج وتميتها . تركب الزرع لا سيما القمح فتؤذي . تظهر من ايار الى حزيران || فراشتها صغيرة القد سمراء

١٠٥٨٩ - دُوْدَةُ النِّعَاج * Dothiorella

جنس فطور مجهرية من فصيلة الصغيات . بكنيداتها ادمية محضونة ، تجمعها ونيسة ترقى بها حتى البشرة فتصدها . جوك القصمة جلدي التركيب يعلوه مق حليمي . بويغاتها بيضية او مستطيلة || انواعه عديدة تعيش على اللحاء والخشب دون ان تؤذي النبات .

١٠٥٩٠ - دُوْدَةُ النِّعَاج * Caloporus ovinus (S). Calopore des brebis (F).

فطر مأكول مستحب الطعم من فصيلة السميات ورثة الدعاميات . يكثر وجوده في احراج السنوبر . يعيش على المواد النباتية المنحلة . نكته فارشة ، شبه قعقة الشكل ، تنفلق عند الادراك ، لونها الى البياض الاغبر يعلوه موج اصفر ، قطرها نحو ١٠ سم . ساقه قصيرة ، ضخمة . لحيتها سمكية ، غبراء اللون . رائحته رائحة اللوز .

١٠٥٩١ - دُوْدَةُ Ver (F). Worm (E).

دودة ج دود وديدان . والدود في علم الحيوان شعبة من عديمات الفقار عديدة الفصائل والاجناس والانواع معظمها طفيلي يعيش على المواد العضوية في الاجسام الحية وفي الجيف || وفي الاصطلاح يطلقون لفظة الدود ايضاً على يرقات ودعاميص واساريع الحشرات . ويقال لصغار الدود : دراد .

١٠٥٩٢ - دُوْدَةُ الأَرْض Ver de terre (F). Earth-Worm (E).

هي الخرطون ، اطلها . Helminthe (F). Helminth, Intestinal worm (E).

اسم شامل يطلق على الديدان الطفيلية التي تعيش في امعاء الانسان والحيوان كالصفر والعريضة الخ .

١٠٥٩٤ - دُوْدَةُ التُّفَّاح هي كاربوكبس التفاح ، اطلها .

١٠٥٩٥ - دُوْدَةُ الجُدُّور الثُّعْبَانِيَّة هي ثعبانية الجدور ، اطلها .

١٠٥٩٦ - دُوْدَةُ الحرير * ، دُوْدَةُ القَز Ver à soie (F). Silkworm (E).

هي يرقة قزينة الحرير . عرفها الصينيون من نحو ٣٥٠٠ سنة واحتفظوا بسر تربيتها وانتاج الحرير ما استطاعوا من الزمن لانهم كانوا يعاقبون بالاعدام كل من حاول اخراج مكن الحشرة من بلادهم . اما الآن وبعد ان عمت تربيتها جميع اقطار العالم ، يقدر متوسط انتاج الحرير الخام السنوي بنحو ٥٠ مليون كيلو . ومتى عرفنا ان كيلو الحرير الخام يحتاج الى ٦٧٥٠ شرنقة نستنتج ان الخمسين مليون كيلو تحتاج الى ٣٣٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ شرنقة تنتجها بعض البلاد اخصها الصين واليابان والهند وأمريكا وإيطاليا وفرنسه وتركيه واسبانيه || لا نذكر شيئاً عن المكن (بدور القز) لأنها تستورد من الخارج في شروط صعبة معينة وضمن علب خاصة || بعد نقف المكن الذي يتم عادة بطرف اربعة ايام ، تعيش الدودة حياتها اليرقية التي تدوم نحو خمسة اسابيع حسب التطور النسوي التالي :

الدور الاول : من النقف الى ٥ او ٦ ايام . توضع الديدانات الصغيرة في مكان دافئ تراوح حرارته بين ٢٢ و ٢٥ درجة سنتيغراد ويوضع فوقها وبمناوئها هامة ورق التوت لتتغذى بها .

١٠٦١١ - دودة القطن الشوكية*، دودة اللوز الشوكية، دودة لوز القطن، قرآشة كنافيج القطن، إرياس إينسولانا

Earias Insulana (S). Chenille épineuse du cotonnier (F). Spiny bollworm (E). Stengelspitzbohrer (D).

يرقة يبلغ طولها عند اكتمال نموها نحو ١٥ سم. مقدمها ومؤخرها مستدقان. وسطها غليظ. لونها الى السمرة الخطية يعلوها موج جوي. جسمها مكسو بدرنات برتقالية اللون ترتكز على كل منها هلبة سمراء || تسرح في الليل. تسطو على النواصي واللوزيات الناشئة والكنافج الفتية فتثقبها وتتغذى من مواد بزورها الرخوة وتيلها المائع. فراشها صغيرة القد من فصيلة الليليات تدعى إرياس إينسولانا، اطلبها.

١٠٦١٢ - دودة القمح الثعبانية هي ثعبانية الخطية، اطلبها.

١٠٦١٣ - دودة الكبد راجع دنف الكبد.

١٠٦١٤ - دودة اللوز الشوكية

هي دودة القطن الشوكية، اطلبها.

١٠٦١٥ - دودة اللوز القرنفلية، دودة قرنفلية

هي يرقة عنجول القطن تسطو على اللوزيات فتعطبها وتؤذيها اشد الأذى (راجع عنجول القطن).

١٠٦١٦ - دودة بيضاء*

Ver blanc, Meunier, Mau (F). Grub (E).

هي يرقة الجمل الشائع اي الهنتون. تعيش من ٣ الى ٤ أعوام. جسمها مقوس الشكل، غليظ الطرف. لونها الى البياض اللؤلؤي. تسطو في اول عهدها على جذور بعض النباتات ثم يتفاد شرها مع تقدم عمرها وكبر حجمها فيصبح عظيم في عامها الثالث والرابع اذ انها لا تعف عن قرص اي نبات مهما كان جنسه او نوعه.

١٠٦١٧ - دودة ثعبانية

Anguillule (F). هي الثعبانية، اطلبها.

Microscopic worm (E).

١٠٦١٨ - دودة حرير آريا

هي قزبة الخروج، اطلبها.

١٠٦١٩ - دودة حلزونية

Spiroptère (F). Spiropterus (E).

دودة سلكية طفيلية تعيش في امعاء بعض الفقريات.

١٠٦٢٠ - دودة حمراء هي السنغام، اطلبها.

١٠٦٢١ - دودة خضراء اطلب دودة القطن الخضراء.

١٠٦٢٢ - دودة زبأ

هي يرقة أرجيا أنثيكا تلثم اوراق الاشجار اخصها الاجاص والتفاح والزعرور والورد والسنديان (راجع أرجيا أنثيكا).

١٠٦٢٣ - دودة غمما*، دودة مقوسة

Noctuelle gamma (F). Gamma noctua (E).

هي يرقة فيتوميرا نما. لونها الى الخضار الباهت. طولها نحو ٣ سم. أرجلها البطنية طرفية الارتكاز مما يحدو بها

اللون، مهدبة الاجنحة، وحيدة الجبل الحولي تظهر من تموز الى آب. اطلب سبتريس الزرع.

١٠٦٠٢ - دودة الساق الثعبانية

هي ثعبانية لساق، اطلبها.

١٠٦٠٣ - دودة السمسم، دودة قرون السمسم

قرآشة السمسم

Antigastra catalanalis (S).

يرقة خضراء اللون تعلوها بقع سود. طولها نحو ١٢ مم. تسطو على سوق السمسم وبزاعمه الزهرية وازهاره وثماره وتنسج خيوطا تشبك بها اوراق النواصي حيث تتخذ وتتحوّل الى عذراء || فراشها صغيرة القد من فصيلة الناريات طولها نحو ٧ مم. ثوبها الى البني يعلوه موج اصفر. زباناها حنطية مستطيلة جيلها الحولي واحد.

١٠٦٠٤ - دودة السنط الصغيرة

Nadiasa obsoleta (S).

يرقة سمراء اللون هلبية الجلد تركيب اوراق السنط. فراشها تدعى نديازة مبدولة. اطلبها.

١٠٦٠٥ - دودة الشكير

هي كاربوكس الشكير، اطلبه.

١٠٦٠٦ - دودة الشوندرة الثعبانية

هي ثعبانية الشوندرة، اطلبها.

١٠٦٠٧ - دودة القصب الصغيرة

هي يرقة فراشة شيلو القصب تسطو على المصان والارز والذره، اطلب شيلو القصب.

١٠٦٠٨ - دودة القصب الكبيرة

هي السيزاميا، اطلبها.

١٠٦٠٩ - دودة القرمز*

Coccus cacti (S).

Cochenille du Nopal (F). Cochineal of Nopal (E).

حشرة من القرمزيات صغيرة القد طولها نحو ٨ مم. ثوبها الى الجؤوة. مهدها المكسيك ومنها انتقلت الى الهند والجزائر واسبانيه. تعيش على صبار الهند. يربونها لاستخلاص خضابها الاحمر القاني المشهور.

١٠٦١٠ - دودة القطن الخضراء*، دودة ورق القطن الصغرى، دودة خضراء

Laphygma exigua (S). Chenille défoliante, Noctuelle de la betterave (F). Sugar beet armyworm, Lesser armyworm (E). Heerwurm (D).

يرقة يبلغ طولها عند اكتمال طورها البرقي نحو ٢٥ مم. تبدو خضراء اللون ثم تنحرف تدريجياً مع السلاخاتها الى الاخضر الزيتوني فالزيتوني العابق. يعلوها من جانبيها خطان دقيقان لونهما الى السمرة يتوسطهما خط اصفر. تسرح في الليل. تسطو على ورق القطن والذره والبرسيم والشوندرة الخ... فتثقب الاوراق وقد تلثم كامل النصل دون المروق || فراشها صغيرة القد من فصيلة الليليات تدعى لفيغمة، اطلبها.



فراشة دودة السمسم



دودة القرمز



دودة القطن الخضراء وفراشها



دودة القطن الشوكية وفراشها



الدودة البيضاء



دودة غمما وفراشها

١٠٦٣٣ - دَوْرَان Rotation
الحركة حول محور أو دورة محورية .

١٠٦٣٤ - دَوْرَانِي ، دَوْرِي Rotatoire (F).
Rotatory (E).

١٠٦٣٥ - دَوْرَة Session
هي الفترة من الزمن التي تكون فيها اجتماعات إحدى الجمعيات التداولية صحيحة . وإذا انعقدت الاجتماعات في المدة المعينة قانوناً فهي الدورة العادية وإذا انعقدت بحكم الظروف في غير مدتها فهي الدورة غير العادية .

١٠٦٣٦ - دَوْرَة Cycle
سلسلة ظواهر تتساق بترتيب دقيق وانتظام مسير .

١٠٦٣٧ - دَوْرَة ثَلَاثِيَّة Assolement triennal (F).
Triennial rotation of crops (E).
هي الدورة الزراعية الثلاثية الاطعام التي تتناوب فيها الزراعات على ثلاثة اعوام اي ان زراعة الحنطة لا تعود الى ذات القطم الا بعد زراعتين وحولين .

١٠٦٣٨ - دَوْرَة ثَنَائِيَّة Assolement biennal (F).
Biennial rotation of crops (E).
هي الدورة الزراعية الثنائية القطم اي التي تتناوب فيها زراعتان في حولين متتاليين .

١٠٦٣٩ - دَوْرَة دَمَوِيَّة Circulation du sang (F).
Systemic circulation (E).
الدورة الدموية هي حركة الدم في الجسم تحدث باندفاع الدم من البطين الايمن الى الشريان الذي يدفعه الى الرئتين حيث يتأكسد فيتحول من دم وريدي الى شرياني ويعود بواسطة الاوردة الرئوية الى الاذين الايسر الذي يدفعه الى البطين الايسر وهذا يدفعه بدوره الى الاجهر الذي يقوم بتوزيعه على جميع اجزاء الجسم || يقال ان اول من ذكر او اكتشف الدورة الدموية في الجسم كان الطبيب العربي ابن النفيس وذلك في اواخر الجيل الثالث عشر .

١٠٦٤٠ - دَوْرَة زِرَاعِيَّة Assolement (F).
Rotation of crops (E).
الدورة الزراعية معناها تقسيم المزرعة او الارض الى اقسام تتعاقب فيها الزروع المختلفة . غايتها الحد من استنزاف العناصر الغذائية في التربة . اكثرها شيوعاً الدورة الثنائية والدورة الثلاثية . (راجعها) .

١٠٦٤١ - دَوْرَة سَلَامِيَّة Cycle mérital (F).
Internode cycle (E).
هي الخط القياسي الذي يرسمه اللولب البرعي حول القضيب الى ان يستقر في الخط المستقيم القائم بين برعة المنشأ (ا) التي سار منها اللولب وبرعة الاستقرار (ب) التي انتهت فيها الدورة كما يبدو من الرسم .

١٠٦٤٢ - دَوْرَة فَلَكيَّة Rotation sidérale (F).
Sidereal rotation (E).
الدورة الفلكية اي الدورة الكاملة حول الشمس تختلف مدتها بالنسبة الى الكوكب . فالدورة الارض تستغرق ٢٣ ساعة و٥٦ دقيقة و٤ ثوان ، ودورة المريخ تستغرق ٢٤ ساعة و٣٧ دقيقة و٢٣ ثانية في حين ان دورة زحل لا

الى تقويس بطنها عند السير وذلك لتقارب ارجلها البطنية من الصدرية || تعتبر من الديدان القياسة النهمة التي تسطو على الخس والملفوف والشوندر والبطاطا واللوبياء والبق والكتان والبرسيم والتفل وبعض النباتات التريينية .

١٠٦٢٤ - دَوْدَة قَارِضَة * Agrotis ypsilon (S).
هي يرقة أغروتيس إبسيلون ، اطلبها . طولها عند اكتمال نموها يبلغ نحو ٥ سم . لونها يتغير مع انسلخاتها . يتبدى اخضر ثم اخضر زيتوني وينتهي بالرمصاصي . جسمها مشدود الجلد لامع البشرة . درقتها الصدرية واضحة . مدنها الى السمرة الباهتة . رأسها يميل الى الجفوة . تحمل على كل حلقة من حلقات جسمها الاثني عشرة اربع درنات سود تتوسطها هلبة سماء || تسرح في الليل ومن عاداتها التكور عندما تشعر بالخطر || تسطو على سوق العديد من النباتات فتقضي عليها ، منها التبغ والقطن والذرة والقمح والشعير والعدس والخص والفول ومختلف البقول والنباتات التريينية والمرعوية .

١٠٦٢٥ - دَوْدَة لَوَز القُطْن هي دودة القطن الشوكية.

١٠٦٢٦ - دَوْدَة مُزْدَوِجَة هي السنغام ، اطلبها .

١٠٦٢٧ - دَوْدَة مُقْوَسَة هي دودة نعا ، اطلبها .

١٠٦٢٨ - دَوْدَة وَحِيدَة Ver solitaire (F).
Tape worm (E).
هي التينيا المسلحة ، راجعها .

١٠٦٢٩ - دَوْدَة وَرَق القُطْن * Prodenia litura (S).
هي يرقة برودليا ليتورا ، اطلبها . طولها البرقي يدوم من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع في الصيف ومن ستة الى ثمانية اسابيع في الشتاء || طولها عند اكتمال نموها يبلغ نحو ٤ سم . لونها يتغير مع انسلخاتها الخمسة يتحول من الخضار الاصفر الى الزيتوني العايق . رأسها الى الجفوة السمر . ظهرها وجانبها مقطوبة بخمسة خطوط صفير تعترضها اشربة جانبية لونها الى الخضار العايق . مدنها تبني اللون . تحمل على ظهرها بعض البقع السود وعلى جانبيها درنات صغيرة ترتكز على كل منها هلبة دقيقة || تسرح في الليل . تسطو على الاوراق والنوامي والثمار الفتية فتؤذيها اشد الأذى || عوائلها عديدة تنتمي الى مختلف الفصائل النباتية نخس منها بالذكر القطن والبرسيم والذرة والهاميا واللوبياء والبطاطا والبادنجان والبندورة والتبغ والبطيخ والشام والخيار والبصل والشوم والزنايق والملفوف واللفت والكرمة والتين والجميز والحمضيات والتفاح والاجاص والخوخ والموز والتوت . الخ || تكافح عند ظهورها ، تعفراً على النبات والتربة ، باستعمال بعض الحواشير الفعالة المرتكزة على مادة الروتينون او غيرها من المواد النشيطة الاكيدة الفاعلية .

١٠٦٣٠ - دَوْدَة وَرَق القُطْن الصُّغْرَى

اطلب دودة القطن الخضراء .

١٠٦٣١ - دَوْدِيَّات الأَلْسَنَة Vermilingues (F).
رتيبة من العظائيات تشل فصيلة الحراشي وغيرها .

١٠٦٣٢ - دَوْر ظُرَّائِي ، دَوْر ظُرِّي Age de la pierre taillée (F).
Freestone age (E).
هو عصر الحجر المشنول .



دودة قارضة وفراشتها



دودة ورق القطن وفراشتها



دورة سلامية

بطنه وافنيكه الى الرمادي الباهت . جانباً صدره وبطنه منمشان بالاسود . جناحاه موشان بالابيض . منقاره اسود . رجلاه الى الجؤوة .

١٠٦٤٨ - دُورِي البَيَادِر *، دُورِي جَبَلِي

Passer montanus (S). Moineau friquet, Friquet (F). Tree-sparrow (E).

نوع من الدوري موطنه الشرق الاوسط واروبة وافريقية الشمالية . طوله نحو ١٣ سم . رأسه الى الجؤوة . محسراه الى البياض الاغبر . ظهره الى السمرة الكستنية تعلوها مشحة سوداء . جناحاه موشان بالابيض . منقاره اسمر . رجلاه الى الصبغة || يألف المراعي والسياجات والحقول والاشجار المنفردة .

١٠٦٤٩ - دُورِي البُيُوت *، دُورِي مَبْدُول

Passer domesticus (S). دُورِي مَعْرُوف Moineau commun, M. domestique, Pierrot (F). House-sparrow (E). Haussperling, Spatz (D).

نوع من الدوري كان موطنه العالم القديم الى عام ١٨٥٠ حيث ادخل الى امريكا ومن ثم الى اوستراليه || طوله نحو ١٥ سم . رأسه رمادي اللون ازرق المواج . ظهره وقفنه الى السمرة الكستنية الموشحة بالاسود . زوره وعنقه وصدره الى السمرة السوداء . بطنه وافنيكه الى الرمادي . جناحاه موشحة بخط ابيض . منقاره اسود . رجلاه الى السمرة الخنطية . يألف المدن والداكر والقرى، قوته الحشرات والحبوب والثمار .

١٠٦٥٠ - دُورِي الغَاب

Passer petronia (S). Moineau soucie, M. des bois, Soucie des rochers (F). Hedge-sparrow (E).

نوع من الدوري موطنه الشرق الاقصى والادنى واروبة الجنوبية وافريقية الشمالية . طوله نحو ١٥ سم . ثوبه الى الرمادي الاسمر . رأسه موشح بخطين جانبيين لونهما الى السمرة العابقة . ظهره مخطط بالاسود . زوره اصفر كبيرتي . اطراف قوادمه مبقجة بالابيض || يألف الغابات والاحراج ومجاري الماء والحقول الزراعية يدن في صدوع الصخور .

١٠٦٥١ - دُورِيَّة

Périodicité (F). Periodicity (E). الدورية كون الشيء دورياً اي انه يعاود بانتظام .

١٠٦٥٢ - دُورِيس *

Doris (S). Doris (F). Doris (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل خلفيات الخياشيم . انواعه المعروفة كثيرة العدد منتشرة في جميع بحار العالم . تعيش قرب الشطوط . تزحف ببطء || اجسامها عريضة متوسطة القد او كبيرة ، اهليلجية الشكل او شبه مستديرة ، جملونية الاحديداد . رؤوسها صغيرة ، رباعية اللوامس القصيرة ، الزوج الظاهر منها صولجاني الشكل ، الزوج المغلف بالرداء قضيبي الشكل . خياشيمها كالنجوم النباتية تغلف المنافذ الشرجية . ألوانها متباينة الالوان الزاهية .

١٠٦٥٣ - دُورِيسِيَّات

Dorididae (S). Dorididae (F). Dorididae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل خلفيات الخياشيم جلديات التنفس . اجناسها وانواعها

تستغرق اكثر من ١٠ ساعات و ١٤ دقيقة . اما دورة القمر فتستغرق ٢٧ يوماً و ٧ ساعات و ٤٣ دقيقة و ١٢ ثانية .

١٠٦٤٣ - دُورَس *

Doras (S). Doras (F). Doras (E).

جنس اسماك نهريه من مفتوحات المثانة وفصيلة السلوريات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها معظم انهر امريكا الجنوبية || اجسامها مستطيلة الشكل ، قليلة العرض ، تطول من ٣٠ الى ٤٠ سم . رؤوسها اسفينية مقطومة . اعظامها رباعية العذبات الدقيقة . اشداقها متوسطة الانفراج . عيونها صغيرة ماسحة . زعانفها الظهرية الاولى شراعية الشكل ، قريبة من الرأس . الثانية جداع قريبة من الذيل . زعانفها الصدرية والحوضية والبطنية والشرجية صغيرة القد ، ضيقة . زعانفها الذيلية فارقة . تتميز بخط جانبي من الصفائح العظمية الشائكة الاطراف يمتد من قاعدة الزعنفة الصدرية الى قاعدة الذيلية من الجانبين الايسر واليمن . اثوابها تختلف مع الانواع منها الاسمر والاكهف والارمك والاخضر البحري والاشهب الفضي || لحومها متوسطة الصنف ، مأكولة .

١٠٦٤٤ - دُورَق *

Matras (F). Matrass (E). وعاء من زجاج مستطيل العنق يستعمل في الاختبارات الكيميائية .

١٠٦٤٥ - دُورَم *

Dorema (S). Dorème (F). أشق Dorema (E). Ammoniakpflanze (D). Dorema (I).

جنس نباتات عشبية برية محولة من فصيلة الخيميات . انواعه قليلة اشهرها الدورم الخزفي وهو نبات بري طبي هذه العجم يستخرج منه صمغ الأمونياك المشهور في معالجة التشنج والامراض العصبية || اوراقه متعاقبة مركبة ، نصلها بحري الخضار الباهت ازهاره سداسية التركيب ، لونها الى الابيض العاجي الاصفر المواج .

١٠٦٤٦ - دُورِي

Passer (S). Moineau, Passerien (F). Sparrow (E).

جنس طير من الجواثم المحروطيات المناقير وفصيلة الشرشوريات . انواعه نحو ٣٠ معظمها افريقي الموطن وبعضها اسيوي واروبي || اجسامها ربعة ، رؤوسها منسوبة منسجمة . مناقيرها مخروطية قصيرة ، اجنحتها صغيرة ، اذنانها معتدلة . ارساغها نحيلة || جميعها حاشرة وحابية تقتنص مختلف اجناس الفراش والديدان والجنادب والجمل ... وتأكل مختلف الحبوب والبزور والثمار || يدن عشه في البيوت وصدوع الصخور وفي الاشجار . اناته تبض ثلاث مرات في السنة . تضع وتحضن في المرة الاولى من ٥ الى ٦ بيضات وفي المرة الثانية من ٤ الى ٥ بيضات وفي المرة الثالثة من ٣ الى ٤ بيضات . حضن البيض يدوم نحو ١٤ يوماً تقوم به الانثى بمناوبة الذكر || اعرف انواعه واشهرها ما يلي :

١٠٦٤٧ - دُورِي إسباني

Passer hispaniolensis (S). Moineau espagnol (F). Spanish-sparrow (E).

نوع من الدوري موطنه اسبانيه وايطاليه وشمالى افريقية . طوله نحو ١٤ سم . رأسه رمادي اللون ازرق المواج . قفنه وظهره وذنبه الى السمرة الكستنية الجؤرية المواج تعلوها نمشة سوداء . زوره وعنقه وصدره الى الرمادي الباق السمرة .



دورس



دورق



دورم



دوري البيادر



دوري البيوت



دوريس

المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار العالم وأخصها بحار البلاد الحارة || اعرف اجناسها وأشهرها الدوريس والسرثومة والهلكية ، جميعها عريضة عادية الاصداف .

١٠٦٥٤ - دُوريفُور * ، خُنْفَسَاء البَطَاطَا

Leptinotarsa decemlineata (S). Doryphore (F). Colorado potato-beetle (E). Kartoffelkäfer (D).
خنفساء محدودة الشكل من فصيلة النضاريات. تركيب نباتات الفصيلة الباذنجانية أخصها البطاطا فتوقع بها اشد الاذى || طولها نحو ٩ مم. غلافها اصفر. كوسلها مزركش بالاسود. درقتها سوداء اللون صفراء المواجه. غمدتها موشحة بخطوط سود ، كل غمد يحمل خمسة خطوط. زباناها صولجانية الشكل || اناثها اكبر من ذكورها تمتح مكنتها الاصفر الخططي المستطيل على صفحات الاوراق السفلى نجيلات متفرقة ، كل نجبة تعد من ٣٠ الى ٥٠ مكنة مجموعها نحو ٢٠٠٠ تنقف المكنة بعد متحتها بأسبوعين عن رقة صغيرة القد ضخمة الشكل مستدقة الاطراف لونها الى الحمرة الحمراء . رأسها اسود . طرفها مدبب . تركيب الاوراق والسوق فتتابع اذى الحشرة الكاملة وقد تقضي على النبات || تكافح باستعمال الحواشير والمواكين الفعالة .

١٠٦٥٥ - دُورِيكَنْيُوم *

Dorycnium (S).
Dorycnie, Dorycnion (F). Venemous trefoil (E). Backenklees (D). Erba velia, Trafogline (I).
جنس اعشاب وانجم برية معمرة من فصيلة القرنبيات الفرشاشية . انواعه المعروفة نحو ٢٠ مهدا الشرق الاوسط واروبة الجنوبية . اوراقها مركبة ثلاثية الوريقات . ازهارها صغيرة عديدة متفة خيمية التجميع هامية الارتكاز . تكثر في الجبال الجرداء وفي الاراضي المذحاة . جميعها كلاتية ترغب فيها الماشية .

١٠٦٥٦ - دُورِيُوم *

Durio zibetinus (S).
Dourian, Durian (F). Durian (E).
دوريو هو الاسم الماليزي . شجرة زراعية مثمرة من فصيلة البرازيات منبتها ماليزية والهند الصينية والجزر . ضرورها المشهورة اربعة اجودها دوريو ماليزية || شجرتها كبيرة القد قريبة الشبه من الدردار ، تعلو نحو ٢٥ م. اوراقها متعاقبة ، اهليلجية النصال الجامدة . ازهارها خنثوية ، سلامية الانتشاب ، فردية التجميع او ثنائية ، خماسية البتلات ، كثيرة الاسدية الدقيقة اللاحدة العدد . ثمارها كبيرة ، شبه بيضوية الشكل . حجمها حجم الشام . قشورها مدروزة بالشوك الخروطي الشكل ، الحاد الاطراف . لبانها مأكول رغم استهجان طعمه ويقال انه لا يخلو من الفوائد الصحية والطبية ، بزورها مأكولة طازجة ومجمعة .

١٠٦٥٧ - دُوسَر

Fromental (F). False oat (E).
هو الحوطال الرفيع ، اطلبه .

١٠٦٥٨ - دُوسَرَج * ، اَبُو حَديج ، شَعِير اِبْلِيَس

Aegilops, Triticum ovatum (S). Egilope, Aegilops (F). Hard grass, Goat grass, Oat grass (E). Walchweizen Bartgrass, Gerstenwalch (D). Egilopa, Egilope, Occhio di capra (I).
نبات عشبي بري حولي مرغوي من فصيلة النجيليات . يظن ان القمح يتحدر منه . وهو من النباتات العادمة القيمة الاقتصادية . كثرته في الزروع ضارة . قصبه دقيقة تلو من ٢٠ الى ٤٠ سم . اوراقه عصفية صغيرة وقصيرة النصل . سبلته ثنائية او وحيدة الحبة .

١٠٦٥٩ - دُوسَرَجِيَّات

Aegilopinées (F).
Aegilopinae (E).
سبط من فصيلة النجيليات . نباتاته عشبية برية حولية . اعرفها واشهرها الدوسرج المقول ان القمح يتحدر منه .

١٠٦٦٠ - دُوسَع *

Scopelus (S).
Scopèle (F). Scopelus (E).
جنس اسماك بحرية بيوضة من فصيلة الدوسيات مفتوحات المثانة . انواعها المعروفة لا تتجاوز العشرة . اعطانها معظم بحار العالم باستثناء القطبية والاستوائية || اجسامها متوسطة القد ، مردنية الشكل ، ثنائية الزعانف الظهرية . تتميز برؤوسها الضخمة المستديرة وبرحابة اشدائها . حراشفها صغيرة ، نحيلة ، نافضة تنحسر كل عام || اثوابها الى الرتبة الفضية الموج تعبق مع اقترابها من الظهر وتغير عند البطن || لحومها متوسطة الصنف ، مأكولة || اشهر انواعها الدوسعة السورية .

١٠٦٦١ - دُوسَعَة سُورِيَّة *

Scopelus syriacus (S). Scopèle syrien (F).
Syrian scopelus (E).
سمكة بحرية بيوض من فصيلة الدوسيات مفتوحات المثانة . اعطانها بعض اقاليم البحر الابيض المتوسط اخصها المنطقة المحاذية للشواطئ اللبنانية السورية || جسمها مردني الشكل يطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. ثوبها الى الرتبة الفضية الموج يعبق في الرأس والظهر ويغير في البطن ويعلوها في جانبيها تنقيط خفيف اسمر || رأسها مستضخم الشكل ، قصير الخطم المستدير . شدتها رجب الانفراج ، منحرف الارتكاز . اسنانها صغيرة ، كثيرة العدد ، ثلاثية الصفوف في الفكين . عيناها كبيرتان ، مستديرتان ، ناشزتان . زعانفها الظهرية اثنتان ، الاولى كبيرة شرعية الشكل والثانية صغيرة ، دقيقة ، وتدنية . زعنفتها الذيلية فارقة || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

١٠٦٦٢ - دُوسَعِيَّات *

Scopelidae (S).
Scopelidés (F). Scopelidae (E).
فصيلة اسماك بحرية من مفتوحات المثانة . اجناسها وانوعها قليلة العدد . اعطانها معظم بحار العالم . مسرحها المياه الاقليمية || اجسامها متفاوتة الاحجام بين الصغير والوسط . معظمها مردني الشكل . رؤوسها ضخمة شبه مستديرة . اشدائها كبيرة منحرفة . زعانفها الظهرية اثنتان ، كبيرة وصغيرة . حراشفها صغيرة ، رقيقة ، نافضة . اثوابها تراوح بين الرتبة والشبهة يعلوها موج فضي || لحومها مأكولة ، متوسطة الصنف || اعرف اجناسها واشهرها الدوسج والحترش والشرودج .

١٠٦٦٣ - دُوسَقَة زَرْقَاء *

Dasytes coeruleus (S). Dasyte bleu (F).
Dasytes coeruleus (E).
حشرة واسعة قانصة من فصيلة الملخيات ورتبة غمديات الاجنحة . تألف البراري والمراعي والحدائق والاحراج . خنافسها واسعة قوتها رحبق الازهار وبتلاتها . يرقاتها قانصة تعيش تحت لحاء الاشجار وفي الاخشاب النخرة ساعية وزاء اساريع الحشرات الخاشبة || جسمها صغير القد يطول من ٥ الى ٧ مم. ثوبها الى الزرقاة اللامعة . رأسها صغير الجرم . عيناها صغيرتان . زباناها غيظيان . ظهراتها مستعرض المؤخر الفارق اللامع ، نحيل التعزيز



دوريفور



دوريكنيوم



دوسرج



دوسعة سورية



دوسقة زرقاء



دوشر



دوصر



دوع احمر



دوع ذهبي



دوع شائع




دوع صبي



دوعمة عصفية الورق



دوغل



دوفصة

الغمدي . ارساها خماسية العقل || لها جيل واحد في الحول .
تظهر الحشرة الجمالنة في نيسان وتبقى حتى اواخر تموز .
تسرح في التبار . تسافد بعد ظهورها بنحو خمسة اسابيع .
تمتج الممكن تحت لحاء الاشجار وتشرورها وتحت الانقاض ||
البرقة عند بلوغها الادراك التام تطول من ٩ الى ١١ سم .
جسمها اسطواني الشكل ، مستغلظ الرأس المستطيل ،
مستدق الطرف النحيل ، سداسي الرواجب . ثوبها الى الطحلة
الغبراء . رأسها اسمر || طور الاكمال يستمر نحو ٣٠
يوماً وينتقي في آخر سرداب دخلته البرقة .

١٠٦٦٤ - دوسينية ، شيل ، سفسرجل هندي
Docynia (S). Docynie, Cognassier des Indes (F).
Docynia (E).
جنس شجيرات مشمرة من فصيلة الورديات . انواعه قليلة
مهدا الهند . تعلو نحو اربعة امتار سوقها قصيرة الجذع .
اغصانها فارشة افقية . اوراقها معنقة ، متعاقبة ، مفرصة
كأوراق الزعرور . ثمارها كروية صغيرة القد مأكولة ،
مستحبة الطعم .

١٠٦٦٥ - دوشسر *
Dasycerus (S). Dasycerus (F). Dasycerus (E).
جنس حشرات من فصيلة الصمليات ورتبة غمديات
الاجنحة . انواعه المعروفة خمسة اعطانها بعض مناطق
البلاد الممتدة الحرارة || اجسامها صغيرة تطول من ٢ الى
٣ سم . رؤوسها مخروطية الشكل ، صغيرة القد . عيونها
كبيرة ، ناشزة . تاشيرها نظامية . ملامسها مستطيلة .
قرونها الاستشعارية شديدة الطول ، مهدبة الفصل . كواسلها
مكورة ، مضلعة ومقرنة . اغصانها مضلعة ، لاحفة ، شبه
مجنبة الشكل . قوائمها نشيطة . اثوابها سوية اللون منها
الاطحل والاربد والاسمر القطراني والاديس || جميعها
دائمة تعيش في الجبال وتحت الجذام والقشور .

١٠٦٦٦ - دوشسر *
Ximenia (S). Ximénie (F). Ximenia (E).
شجيرة شائكة معمرة برية وزراعية من فصيلة الزيتونيات .
موطنها بعض المناطق الافريقية || ساقها وافنانها شائكة .
اوراقها متعاقبة ، معنقة . نصالحا سنانية ، جامدة ، بحرية
الخضار . ازهارها ضمي التجميع ابطي الارتكاز . ازهارها
صغيرة ، سباعية البتلات الحملية الصفحات العليا . ثمارها
مأكولة تدعى « الخوخ البحري » « Prunes de mer » .

١٠٦٦٧ - دوع
Carassius (S). Carassin (F).
جنس سمك من الشبوطيات يعيش في المياه العذبة وفي
الاحواض . انواعه عديدة مختلفة الاشكال والاحجام
والالوان . تطول من ٧ الى ٣٥ سم . اعرفها ما يلي .

١٠٦٦٨ - دوع أحمر ، سمك أحمر
Clprinus carassius (S). Poisson rouge (F). Red
fish (E).
نوع من الدوع احمر اللون سهل التناسل سريع النمو يربي في
الاحواض والاكواريوم .

١٠٦٦٩ - دوع ذهبي ، سبط ذهبي
Carassius auratus (S). Carassin doré (F). Gold caras-
sin (E).
نوع من الدوع عديد الضروب والاشكال . جميعها متوسطة
القد ذهبية اللون تربي في الاحواض والاكواريوم .

١٠٦٧٠ - دوع شائع *
Carassius vulgaris (S).
Carassin commun (F). Common carassin, Cyprine (E).
نوع من الدوع كبير القد . طوله يراوح من ٣٠ الى
٣٥ سم . ثوبه الى الحمرة . يرغب في المياه الجارية .

١٠٦٧١ - دوع صيني *
Cyprinus gibelio (S).
Cyprin doré, Gibèle (F). Gold fish (E).
نوع من الدوع . ضروبه عديدة جميعها صغيرة القد
ذهبية اللون . يربي في الاحواض والاكواريوم .

١٠٦٧٢ - دوعمة *
Stylidium (S). Stylidie (F). Stylidium (E).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الدلانيات . مهدا
بعض مناطق استرالية . سوقها شراخية . اوراقها متبانية
الاشكال . ازهارها مختلفة الالوان . اسديتها واقلامها ملتصمة
كالدعامة .
انواعها المعروفة عديدة ، اشهرها التالية :

١٠٦٧٣ - دوعمة زباء *
Stylidium piliferum (S). Stylidie pilifère (F).
نوع من الدوعمة . شراخها كثيف الزغب يعلو من ٢٠
الى ٣٠ سم . اوراقها صغيرة تطول نحو ٤ سم . وتنتهي
بهلبة شائكة . ازهارها سنبل التجميع ، طرفي الارتكاز .
ازهارها صفراء اللون || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

١٠٦٧٤ - دوعمة عصفية الورق *
Stylidium graminifolium (S).
Stylidie à feuilles de graminées (F).
نوع من الدوعمة . شراخها يرتفع من ٢٠ الى ٥٠ سم .
اوراقها جذعية الانتشاب ، قرصية التجميع تطول نحو
١٥ سم . وتعرض نحو ٥ سم . ازهارها سنبل التجميع ،
طرفي الارتكاز . ازهارها وردية اللون || تنويرها يستمر
من نيسان الى آب .

١٠٦٧٥ - دوعمة كدنة *
Stylidium fruticosum (S). Stylidie frutescente (F).
نوع من الدوعمة . ساقها ليفية مخشوشة تعلو من ٥٠ الى
٦٠ سم . اوراقها خطية جرداء النصال . ازهارها عنقودي
التجميع . ازهارها صغيرة القد ، بنفسجية اللون ، يعلوها
مواج وردي || تنويرها يستمر من ايار الى تشرين الاول .

١٠٦٧٦ - دوع
Caséine (F). Casein (E).
المادة الازوتية البيضاء الموجودة في حليب الثدييات .
تعرف ايضاً بالجبين والكازين .

١٠٦٧٧ - دوعغل *
Bessornis (S). Bessornis (F). Bessornis (E).
جنس طير من الجوائم سنيات المناقير وفصيلة الشحوريات .
انواعه المعروفة نحو عشرة اعطانها تمتد من الشرق الاوسط
الى افريقية الشرقية والجنوبية || جميعها قريبة الشبه بالدج .
اثوابها ملونة ومقرشة . الوانها تختلف مع اختلاف الانواع .
جميعها مكحلة العيون ، مستديرة الاذنان || قوتها البزور
والثار والحشرات || اشهر انواعها واعمها انتشاراً الدوعغل
الاشنعق (B. gutturalis) والدوعغل النريد (B. semirufa) .

١٠٦٧٨ - دوقصة *
Bulbe (F). Bulb (E).
الدوفصة وتسمى البصلة . ساق ارضية مستديرة مركبة من

قرص واسقاط لحمية النسيج متراصة متراكبة تحضن برعمة رئيسية ترتكز على القرص . ج دوفص .

١٠٦٧٩ - دَوْقَصِيّ (F). Bulbifère (F). Bulbiferous (E).

نمت تعريفياً يطلق على كل نبات يحمل دوفصة او ينتج دوفصة .

١٠٦٨٠ - دَوْقُس هو جزر الرعاة ، اطلبه .

١٠٦٨١ - دَوْقُل

Antenne (F).

Aerial, Antenna (E).

الدوقل ناقل معدني يسمح ببحث الذبذبات المتمنطة الكهربائية و بالتقاطها ، وهو على اشكال اخصصها :

Antenne en cadre (F).

دوقل إطارى

Antenne en nappe (F).

دوقل سماطى

Antenne en cage (F).

دوقل قفصى

Antenne de radio (F).

دوقل مذياعى

Antenne en éventail (F).

دوقل مروحي

اما دوقل الحشرة (A. d'insecte) فيدعى قرن استشعاري وزبان ، اطلبها .

Ephippus (S).

١٠٦٨٢ - دَوْقَم *٥

Ephippe (F). Ephippus (E).

الواحدة دوقة . جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة السحليات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار المناطق الحارة || اجسامها مبطة ، شبه مستديرة الشكل تطول من ٣٠ الى ٧٠ سم . اثوابها تختلف مع الانواع تكثر فيها الربدة الفضية والشبهة . رؤوسها شديدة القصر وتبدو كأنها عادمة المخاطم . اشدافها صغيرة قليلة الانفراج . زعانفها الظهرية خلفية الارتكاز تتقدمها امشاط سباعية او تساعية المناخس اللامتساوية الارتفاع ومنها ثلاثة مستطيلة منقفة الى الوراء . زعانفها الذيلية مزوانية الشكل || لحومها جيدة الصنف ، مرغوب فيها || اشهر انواعها الدوقة الماردة (Ep. gigas) التي يبلغ طولها نحو ٧٠ سم . والتي يكثر وجودها قرب جزر الاتيل .

Vulsella ruga (S).

١٠٦٨٣ - دَوْلَك

Vulselle ridée (F).

نوع من الاسبعية . حيوان بحري من الرخويات صفيحيات الخياشيم يكثر وجوده في البحر الاحمر || صدفته مستطيلة الشكل ، مخددة المصاريح اللامتساوية . ضليعة الملقط . صفحتها الخارجيتان الى الصنابي المفلح بالارجواني ، داخلها لؤلؤي المادة .

Douc

١٠٦٨٤ - دَوْلَك

هو هبار دوك نوع من القروء المقدسة ، اطلبه .

١٠٦٨٥ - دَوْكَمَة *٥ Pheidola (S). Pheidole (F).

جنس حشرات من غشائيات الاجنحة الحمويات وفصيلة النمليات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض مناطق البلاد الحارة الاسيوية والافريقية || ملجئها الحياتي بحامي كغيرها من النمل . ترتبها الطبقي يشمل الاناث وهي مجنحة كاملة الشوار الشقي . ثم الذكور وهي ايضا مجنحة كاملة الشوار الشقي . ثم الرعية وهي عادمة الجناح والشوار الشقي . وطبقة رابعة تدعى الحرس القومي او الجند وهي ايضا عادمة

الجناح والشوار الشقي لكنها تتميز بفلاظة الرأس المسلح بفكين ضليعين قاضمين نخبتهما مؤلفة دامية . وظيفة الجند المحافظة على سلامة الرعية وسلامة العمل اليومي خارج الزبية || تقيم قراها في التربة او في جذوع الاشجار النخرة .

١٠٦٨٦ - دَوْلَابِيَّات هي الدورات ، اطلبها .

Planorbis (S).

١٠٦٨٧ - دَوْلَب *٥

Planorbe (F). Planorbis (E).

جنس حيوانات مائية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة اللمنيات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحيرات ومناقع البلاد المعتدلة الحرارة . قوتها النبوت المائية || اصداؤها قرنية المادة ، مبطة ، شفاء اللوب ، سمراء اللون او خضراء او صفراء . اجسامها مستطيلة نحيلة . رؤوسها واضحة . لواسها مستطيلة قرنية الشكل . عيونها قاعدية . ارجلها وحيدة ، بيضية الشوزن ، مبطة ، عادمة السقاط .

Dolabella (S).

١٠٦٨٨ - دَوْلَبَة *٥

Dolabelle (F). Dolabella (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل خلفيات الخياشيم السقفية وفصيلة ارانب البحر . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بحار البلاد الحارة اخصها المحيط الهندي || اصداؤها كلسية المادة ، صغيرة ، داخلية ، منقفة المؤخر ، يكثر فيها اللون الاخضر . اجسامها كبيرة مستطيلة قريبة الشبه بأرانب البحر ، وقد تفرز مثلها مادة حريفة كريهة الرائحة .

١٠٦٨٩ - دَوْلَة هي الاخطبوط الشائع ، اطلبه .

Gîte (F). Lair, Form (E).

١٠٦٩٠ - دَوْلَج

هو كناس الطيبي وغيره من الهم ، راجع تولج .

١٠٦٩١ - دَوْلَسَة كَبِيرَة ٥

Xenosaurus grandis (S). Xénosaure grand (F).

حيوان بيوض وحيد الجنس والنوع من فصيلة الدولسيات . اعطائه بعض مناطق جنوب المكسيك || جسمه نحيل الشكل يطول نحو ٢٥ سم . يتميز باستطالة القوائم والذنب ، وبمطاي ابطليه التي تبدو كاخايد مستطيلة || قوته الحشرات والوزغ .

Xenosauridae (S).

١٠٦٩٢ - دَوْلَسِيَّات ٥

Xénosauridés (F). Xenosauridae (E).

فصيلة حيوانات زحافة ، بيوضة ، وحيدة الجنس والنوع من رتبة المظائيات . موطنها بعض مناطق بلاد المكسيك . مركزها ، من الوجهتين الجسورية والشوزية ، يأتي بين العيدشونيات والخنجوفيات || النوع الوحيد المعاصر يدعى دولسة كبيرة .

Protoma (S).

١٠٦٩٣ - دَوْلَع *٥

Protome (F). Protoma (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل اماميات الخياشيم وفصيلة البراميات . انواعه المعروفة عديدة معظمها من متحجرات الاباج الثالثي . المعاصر منها يكثر وجوده في بعض مناطق المتوسط والمحيط الاطلسي الموازي لافريقية الشمالية || اصداؤها برجية ، ملوبة ، مدببة الاعقاب ، منبسطة الدورة الخلزونية ، بيضية الفوهة المقعرة المخددة . جواضها ملتوية ومنقفة .



درفم



دوكمة



دولب



دولة



دولع

تمكنها من القفز . مسافة وثبتها لا تقل عن ٣٠ سم . || تعيش بين الحصى والرمال والاسمال المغسورة بالماء عند مصبات الانهر واخوارها || اعرف اجناسها واشهرها دونس ولافيجينية .

١٠٧٠٣ - دُونِيْجَة ٥
Downingia (S).
Downingie (F). Downingia (E).

جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة اللويليات . منبتها بعض مناطق امريكا الشمالية . سوقها قصيرة تعلو من ١٥ الى ٤٠ سم . اوراقها لاطئة كاملة ، شبه بيضية الشكل ، صغيرة القد . ازهارها لبيضة ملونة || لها نوعان معروفان الاثنية والرشيقة .

١٠٧٠٤ - دُونِيْجَة اُنِيْقَة ٥

Downingia elegans (S). Downingie élégante (F).
نوع من الدونيجة . ساقها تعلو من ١٥ الى ٤٠ سم . اوراقها صغيرة ، ضيقة ، ذرية ، تطول من ٢ الى ٣ سم . ازهارها لبيضة كبيرة القد ، زرقاء اللون ، مبقجة بالابيض || تنويرها يستمر من تموز الى ايلول .

١٠٧٠٥ - دُونِيْجَة رَشِيْقَة ٥

Downingia pulchella (S). Downingie gracieuse (F).
نوع من الدونيجة . ساقها نحيلة مرنة تعلو نحو ٢٠ سم . اوراقها صغيرة ، مستديرة الاطراف . ازهارها لبيضة كبيرة القد ، زرقاء اللون ، مبقجة بالاصفر المطوق بالابيض || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

١٠٧٠٦ - دُوَيْدِيَّة ٥
Vermicularia (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصفيقيات . تكاثرها سطحي ، اعضاءها كروية او مفلطحة تعلوها اهداب هلبية منتصبة سباعية التركيب لونها الى السرة . بويضاتها اسطوانية شفافة || انواعه عديدة معظمها رمي لا مؤذي .

١٠٧٠٧ - دُوَيْدِيَّة العُشْب ٥ *

Vermicularia herbarum (S).
فطر مجهري رمي يعتري اعشاب كثيرة اخصها القرنفل . مظهره الخارجي فساد عفن يركب اصول القرنفل عند سطح التربة فينشل الحركة النسغية ويقضي على الاجزاء المصابة || يكافح عند ظهوره باستعمال السائل البورغوني المحلول ١٪ .

١٠٧٠٨ - دُوَيْدِيَّة الفُفْل ٥ *

Vermicularia capsici (S).
فطر مجهري يصيب الفلفل في ثماره ونواميه . مظهره الخارجي بثور مستديرة تركب الثمار قرب ادراكها ، تبدو صغيرة ثم تتسع وتحول من الاسمر الى الحنطي ، تشبه الثمار وقد تسبب تلفها || وعندما يصيب النوامي يمنعا عن متابعة نشاطها الحيوي || يكافح باستعمال السائل البورغوني المحلول ١٪ .

١٠٧٠٩ - دُوَيْشَلَة ٥
Modiolaria (S).
Modiolaire (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيقيات الخياشيم وفصيلة الميديات . انواعها المعروفة كثيرة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اصداقها شبه معينة الشكل ، مستديرة الاطراف ، متساوية المصاريح ، نحيلة التحزيز القاطب والمعرض || تعيش منعنة في الرمال المغسورة بالماء . لحومها مأكولة جيدة الصنف .

١٠٦٩٤ - دَوْلَمَة
Tapinoma erraticum (S).
Tapinome (F).

الدولم نمل اسود صغير القد طوله نحو ٣ مم . جسمه دقيق الزغب متوسط المعان . موقه يطول نحو ٧ مم . || اعطائه العالم : يتميز برفع بطنه عند السير . سيره مستقيم الاتجاه لا تعرج فيه || زباه كبيرة يقيمها في المواقع الناشئة والمعارض الجنوبية .

١٠٦٩٥ - دَوْلَمِي ٥ ، دَوْلُمِي
Dolomie, Dolomite
صخر حجري مركب من كربونات الكلس والمغنيزيا . اشكاله عديدة ، بعضها يصلح للبناء .

١٠٦٩٦ - دَوْم *
Douma thebaica, Hyphaene crinita, Corypha thebaica, Coccifera thebaica (S). Doum, Palmier doum, Cucifère thebaïque (F). Doum-palm, Ginger bread tree (E). Dumpalme (D). Palma doma, P. cuc (I).

نخلة فرعاء مهدها الجزيرة العربية وبلاد النوبة . تعلو نحو ١٠ امتار . جذعها قصيرة الساق . قطرها نحو ٤٠ سم . فروعه عديدة . اوراقها هامة مروحية . ازهارها عنقودية التجميع يحضنها كافور ابطي الارتكاز . ثمارها نوية جافة || تزرع لتثبيت الرمال . اخشابها تصلح للاستعمال . اوراقها صناعية تستعمل في حبك الحبال والحصر وما اشبه .

١٠٦٩٧ - دَوْم تَدْمُر ٥
هو التال ، اطلبه .

١٠٦٩٨ - دَوَمَة
Testicula (F). Testicle (E).
هي الخصية المتدلية كما في الثور والكبش .

١٠٦٩٩ - دَوَمَس ٥
Furia (S). Furie (F).
جنس خفافيش من عمارة الرماصات ، موطنه امريكا الجنوبية والغويان . يتميز ببشاعة رأسه ويكبر اسرابه التي يبلغ عدد افرادها عدة مئات || يسرح كامل الليل . قوته الحشرات . يألف المغاور والكهوف واوقاب الصخور .

١٠٧٠٠ - دُون الاحمر
Infra-rouge (F). Infra-red (E).
راجع الطيف الشمسي .

١٠٧٠١ - دَوَنَس ٥
Donax (S).
Donax, Donace, Clovisse (F). Donax (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيقيات الخياشيم وفصيلة الدونسيات . انواعه المعروفة نحو ١٠٠ بعضها من متحجرات الاراضي الثالثية ، والانواع المعاصرة منتشرة في بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصداقها مثلثة الزوايا ، متساوية المصاريح ، لامتناهية الاضلع . مشاعها انبوية الشكل شديدة الطول ، ثنائية ، طليقة . ارجلها مستطيلة تمكنها من القفز || تعيش بين الحصى والرمال المغسورة بالماء عند مصبات الانهر || لحومها مأكولة جيدة الصنف .

١٠٧٠٢ - دَوَنَسِيَّات ٥
Donacidae (S).
Donacides (F). Donacidae (E).


فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيقيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصداقها صغيرة مثلثة الزوايا متساوية المصاريح لامتناهية الاضلع . مشاعها ثنائية ، انبوية ، طليقة ، مستطيلة . ارجلها طويلة



دوم



دونس



دويدية العشب



دويدية الفلفل



دووشلة

١٠٧٢١ - دِيوتريون الكرز *

Dibotryon morbosum, Plowrightia morbosa (S).

فطر مجهري يصيب الكرز والخوخ. مظهره الخارجي بشور متراصة متتابعة تركب الاذن والافناد على مساحات يراوح طولها من ١٠ الى ٣٠ سم. وعرضها من ٢ الى ٦ سم. وهذه البشور تبدو في اول عهدها خضراء اللون ثم تتحرف الى الجوزي وتنتهي بالسمرة الفحمية فتعرقل النمو بعد ان تشل الحركة النسجية وتسبب انعقاد الافناد والافناد ثم يياس القشور المعطوبة وانفلاتها حتى الشكير والخشب || يكافح بقطع الاجزاء المصابة وينضغ الاشجار بأحد الفواطير الفعالة.



ديلودينه البندورة

١٠٧٢٢ - دِيَتْرِيْمَة

Ditrème (F).

سمكة من المندوليات تدعى تريمية ، اطلبها .

١٠٧٢٣ - دِيَشْمَة

Opisthognathus (S).

Opisthognathe (F). Opisthognathus (E).

جنس اسماك بحرية من العظميات شائكات الزعانف وفصيلة الترخويات. انواعه المعروفة خمسة جميعها من اسماك بحار المناطق الحارة || ملجئها الحياتي جماعي. مرتعها المواقع التي تكثر فيها حشاش المرجان والرجان || اجسامها صغيرة القد ، معتدلة التبسيط ، تطول من ١٢ الى ١٦ سم. تتميز باستطالة اسفاطها التي تشبه المجاذيف. وتتميز ايضا بالاجسام الانبوبية الشكل التي تحتفرها في القاع لتبيت فيها.



ديوتريون الكرز

١٠٧٢٤ - دِيَجُور

Terre noire (F). Black ground (E).

هو التراب الاغبر الضارب الى السواد .

١٠٧٢٥ - دِيَجِيَتَالْ ، اصْبَعُ العَدْرَاء ، زَهْر

الكَشْسَاتِيْن ، قُمْعِيَة

Digitalis (S). Digitale, Doigtier, Gantelet, Queue de loup (F). Finger flower, Bloody finger, Foxglove (E). Fingerhut (D). Digitale, Guancelli, Coda di lupo (I).

جنس نباتات عشبية او ليفية من فصيلة الخنازيريات. انواعه عديدة منها البرية والزرينية. اوراقها متعاقبة بسيطة ازهارها عنقودي هامي. ازهارها انبوية الشكل تشبه الاصابع || اشهر انواعه الزرينية ما يتبع .



ديجيتال ارجواني

١٠٧٢٦ - دِيَجِيَتَالْ اَرْجَوَانِي *

Digitalis purpurea (S). Digitale pourpre, D. commune, Gants de Notre-Dame (F).

نبات عشبي محول يرغب في الاتربة الرملية. يعلو من ٥٠ الى ١٥٠ سم. ساقه سرحة. اوراقه محددة النصل، خلية البشرة، والجلدية منها صغيرة القد لينة الحمل || ازهاره مستعرضة القمع ، ارجوانية الصفحة الخارجية مرقشة الداخلية. يستخرج منه مادة الديجيتالين || ازهاره يستمر من ايار الى آب .

١٠٧٢٧ - دِيَجِيَتَالْ أَصْفَر

Digitalis futea (S).

Digitale jaune (F).

نبات عشبي معمر يرغب في الاتربة الكلسية ، يعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. ساقه سرحة. اوراقه عادية الزغب ، نصلها جميل الخضار اللامع. ازهاره صفراء اللون . ازهاره يستمر من خيران الى آب .

١٠٧١٠ - دَوَيْكُ الْجَبَل

Huppe commune (F).

طائر يدعى هدهد شائع ، من اوابد لبنان ، اطلبه .

١٠٧١١ - دَوِيل ، ذَوِيل

Desséché (F). Dried (E).

البابس من النباتات وغيره .

١٠٧١٢ - دِيَس ، دِيَسَة

Dépiquage (F).

Threshing (E).

هو الدوس اي الدراس بارجل الدواب والنورج .

١٠٧١٣ - دِيَسَاَسْتَا

Diastase

نوع من الخماير الكيماوية المحللة ، تذوب في الماء ، تفرزها بعض النسيج الحيواني والنباتي .

١٠٧١٤ - دِيَاغْرَام ، بِيَال

Diagramme (F).

Diagram (E).

رسم خطي بياني يمثل دراسة معينة .

١٠٧١٥ - دِيَانَا

Diane (F). Diana (E).

كوكب سيار مرقبي يحمل رقم ٧٨ اكتشفه « لوثر » عام ١٨٦٣ .

١٠٧١٦ - دِيَبْلُوْدِيْنَة

Diplodina

جنس فطور مجهرية من فصيلة الصغبيات . بكنياتها كروية / او مقطوعة القاعدة تجمعها ونيمة تنشأ محصورة في الطبقة الادمية ثم ترقى مع نموها حتى البشرة . جوفها سميك النسيج ، اسمر اللون . مقها ضيق الشق ، بوبناها شفافة ، مستطيلة ، ثنائية الخلايا || انواعه قليلة اشهرها ما يتبع .

١٠٧١٧ - دِيَبْلُوْدِيْنَة البَسْدُورَة *

Diplodina destructina (S).

فطر مجهري يصيب ثمار البندورة في طوري نشوئها وكالها . مظهره الخارجي يقع لا قياسية تركب الثمار في عواتها او عند نقطة اتصالها بمعالقها . تبدو مبعثرة حنطية اللون ثم تسمر وتتراكم وينتهي بها المطاف الى السواد العابق بينما العفن يقضي عليها من الداخل . يكافح باستعمال مركبات النحاس على عدة مرات منسد ظهور عوارض الوصم .

١٠٧١٨ - دِيَبْلُوْدِيْنَة الكَسْتَنَا

Diplodina castaneae (S). Javart du châtaignier (F).

فطر مجهري يصيب لحاء السوق الفتية على ارتفاع متر من التربة . مظهره الخارجي لطخة سمراء اللون بطيئة الانتشار والاتساع ، تركب القشرة فتسبب جفافها وسقوطها . يكافح في فصل الشتاء باستعمال احد الفواطير الفعالة مزوجاً مع بعض الزيوت الشنوية .

١٠٧١٩ - دِيَبُوب

Rapporteur (F). Protactor (E).

دائرة مدرجة او نصف دائرة مدرجة تستعمل لقياس الزوايا او لتخطيطها .

١٠٧٢٠ - دِيوتريون

Dibotryon, Plowrightia (S).

جنس فطور مجهرية من اليباييات وفصيلة العشويات . اعسانها مركبة مجوفة قائمة على ونيمة بثرية الشكل سمراء اللون . تكاثرها دبوسية . بوغها بيضي شفاف ، ثنائي الخلية لا متساوي الويرة || انواعه قليلة منها واحد مؤذ يصيب الكرز والخوخ .

١٠٧٢٨ - ديجيتال درياسي *

Didymaria

١٠٧٣٧ - ديديماريه

جنس فطور مجهرية من فصيلة الوطحيات . جربه الكنيديّة بسيطة التركيب ، حزيمة الانتشاب ، سمية المسالك . كنانده بيضية او مستطيلة الشكل ، شفافة ، ثنائية الخلية || اعرف انواعه ديديماريه الخوخ .

١٠٧٣٨ - ديديماريه الخوخ

Didymaria prunicola
فطر مجهري يركب اوراق الخوخ واللوز والتفاح . مظهره الخارجي يقع مبعثرة ، خلية ، مستديرة ، سمراء اللون ، قطرها نحو ٥ مم . تركب نصل الاوراق فتعطب النسيج المنحارة دون ان يمتد اذاها الى غيرها .

Dierama (S).

١٠٧٣٩ - ديرامة

Diérane (F). Dierama (E).

جنس نباتات عشبية دوفسية من فصيلة السوسنيات . منبتها بعض المناطق الافريقية . سوقها دقيقة فرعاء . اوراقها ضيقة النصال ، سيفية الشكل . ازهارها عشكولي التجميع او سنبل . ازهارها ملونة ، متدلية || تزرع للزينة في الحدائق التي لا تخشى شدة القس .

انواعها المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية :

١٠٧٤٠ - ديرامة فاخرة

Dierama pulcherrimum (S).

Diérane splendide (F).

نوع من الديرامة التريينية . ساقها فرعاء ترتفع من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقها جذعية الانتشاب ، عددها من ٧ الى ٨ . نصالها تطول نحو ٧٠ سم . ازهارها سنبل التجميع . ازهارها كبيرة القد ، قطرها نحو ٦ سم . لونها الى الحمرة العابقة السفعاء الموج || تنويرها يستمر طوال شهر تشرين الاول .

١٠٧٤١ - ديرامة متدلية الزهر

Dierama pendulum (S).

Diérane à fleurs pendantes (F).

نوع من الديرامة التريينية . ساقها فرعاء يرتفع من ١٠٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها جذعية الانتشاب ، عددها ٥ او ٦ . نصالها جامدة النسيج تطول نحو ٥٠ سم . ازهارها عشكولي التجميع . ازهارها كبيرة القد قطرها نحو ٤ سم . لونها ابيض او بنفسجي || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

١٠٧٤٢ - ديس *

Ampelodesma tenax (S).

Diss (F). Diss, Vine-tie (E). Südliches rebenrohr (D). Saracchi, Saracchio (I).

نبات عشبي بري معمر من فصيلة التيجليات يكثر في المناطق والمواقع الرطبة . يستعمل في صناعة الحصر والتقيش وما أشبه .

١٠٧٤٣ - ديس الحصر هو حلال الحصر ، راجعه .

١٠٧٤٤ - ديس ، جنفلة

Jungle
الغابة الكثيفة الاشجار المتلبدة . اما كلمة جنفلة فهي من وضع الامير مصطفى الشهابي .

١٠٧٤٥ - ديسع *

Echocerus cornutus (S).

Echocère cornu (F). Echocerus cornutus (E).

حشرة خنفسية من فصيلة الغبشيات ورقبة غمديات الجناح . جسمها صغير القد . طولها نحو ٤ مم . ثوبها الى الحمرة .

Digitalis thapsi (S). Digitale-Bouillon blanc (F).

نبات عشبي معمر يوجد في جميع الاودية . يعلو من ٥٠ الى ٧٠ سم . ساقه خلية اللحم . اوراقه محددة النصل الخلمي البشرة . خله كثيف التجميع ، فضي اللون . ازهاره صغيرة ، قليلة العدد ، ارجوانية اللون || يستخرج منه مادة الديجيتالين || ازهاره يستمر من ايار الى آب .

١٠٧٢٩ - ديجيتال زبرجي

Digitalis aurea, D. Digitale ferrugineuse (F).

نبات عشبي معمر يوجد في جميع الاودية . يعلو من ٦٠ الى ١٥٠ سم . ساقه سرحة . اوراقه مألسة النصل الزاهي الخضار . ازهاره كبيرة القد ، خلية النصل ، لونها الى الصفرة الزبرجدية الجووية الموج || ازهاره يستمر من تموز الى آب .

١٠٧٣٠ - ديجيتال صوفي

Digitalis lanata (S).

Digitale laineuse (F).

نبات عشبي محول يوجد في جميع الاودية . يعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . ساقه زباء اللحم . اوراقه عابقة الخضار كثيفة الزغب الصوفي . ازهاره كثيفة التجميع ، خلية البشرة ، لونها الى البياض التي يعلوها موج حنطي وتوشيح اسمر او بنفسجي || ازهاره يستمر من حزيران الى آب .

١٠٧٣١ - ديجيتال صولجاني

Digitalis sceptrum, Isolepis sceptrum (S). Digitale sceptre (F).

نبات لبني معمر يوجد في جميع الاودية . يعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . ساقه وفروعه زباء اللحم . اوراقه اهليلجية مستطيلة خلية النصل . ازهاره كثيفة التجميع لونها الى الصفرة يعلوها موج احمر || ازهاره يستمر من حزيران الى آب .

١٠٧٣٢ - ديجيتال كبير الزهر *

Digitalis grandiflora (S). Digitale à grandes fleurs (F).

نبات عشبي معمر يوجد في جميع الاودية . يعلو من ٥٠ الى ١٢٥ سم . ساقه زباء اللحم . اوراقه خلية النصل على صفحته السفلى . ازهاره كبيرة القد ، خلية البشرة ، صفراء اللون ، صناعية التوشيح || ازهاره يستمر من حزيران الى آب .

١٠٧٣٣ - ديجيتال كنارية

Digitalis canariensis (S). Digitale des Canaries (F).

نبات لبني معمر يوجد في جميع الاودية . يعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . ساقه وفروعه زباء اللحم . اوراقه سنانية النصل المسن الحافة ، صفحته السفلى خلية البشرة . ازهاره صغيرة القد لونها الى الصفار المذهب || ازهاره يستمر من حزيران الى آب .

١٠٧٣٤ - ديجيتالين

Digitaline (F). Digitalin (E).
مادة جمالية فعالة ممتدة تستخرج من الديجيتال الارجواني والدرياسي .

١٠٧٣٥ - ديدان ثعبانية

هي الثعبانيات ، اطلبها .
١٠٧٣٦ - ديدب هو حمار الوحش ، اطلبه .



ديجيتال درياسي



ديجيتال كبير الزهر



ديس



ديس

مخروطية الشكل. قرونها الاستشعارية وجرامزها الخلفية مستطيلة. اغمارها لا تلحف كامل الجسم. تظهر من ايار الى اواخر ايلول. قوتها رحيق الازهار || يرقاتها مؤذية تركب الاخشاب المقطوعة اليابسة فتتغذى وتتعطبها.

١٠٧٥٧ - ديسوس أكلف *

Stenopterus rufus (S). *Sténoptère fauve* (F).
Stenopterus rufus (E).

نوع من الديسوس. اعطائه بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط. جسمه صغير القد، يطول من ٩ الى ١٠ مم، عند الذكر ومن ١٢ الى ١٤ مم. عند الانثى. رأسه وكوسله الى السمرة السوداء. غمداه الى الكلفة. افخاذ قوائم الامامية والوسطى سود. فخذاه الخلفيتان الى الصهبة || يظهر من ايار الى ايلول. مسرعه يستمر طوال النهار. مرتعه الازهار واخصها ازهار الفصيلة الصيوانية || يرقه غبراء اللون، حنطية الرأس، تركب الاخشاب المقطوعة اليابسة ومنها السنت والجوز والكستناء فتتغذى الشكير وتسرديه وتعطبه.

١٠٧٥٨ - ديسوق ثلاثي النقطة *

Dysauxes tripunctata (S). *Dysauxe triponctué* (E).
Dysauxes tripunctata (E).

حشرة من فصيلة الهائيات ورقبة حرشفيات الاجنحة. موطنها بعض اصقاع البلاد الحارة من العالم القديم. فراشها جارية قوتها رحيق الازهار. سرقها خاضعة تعيش على الطحالب والسراخس والحزاز والخشار || جسمها صغير القد يطول نحو ٨ مم. بسطتها نحو ٢٢ مم. رأسها صغير الجرم. عيناها كبيرتان. زباناها خيطيان. جوشنها كثيف الحمل الاصفر الاحمر. بطنها اصفر اللون، بني الملاقى السكية || رواشن الذكر الى الحنطي الاصفر الموج تعلوه في الزوج الامامي ثلاث نقط بيض. رواشن الانثى الى الحنطي الاصهب يطوقه اطار اشقر ويعلوه في الزوج الامامي بقعة صغيرة صناعية اللون || لها جيل واحد في الحول. تظهر الفراشة في حزيران وتبقى حتى آب. تسرح في النهار. تعاظم بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتمتع المكن مباحداً على جدوع وفروع النبات العائل || السرفة عند بلوغها الكمال تطول نحو ١٨ مم. جسمها اسطواني الشكل. ثوبها الى الحنطي الاسمر تعلوه ثعول جانبية تمتد من السكة الثالثة الى التاسعة. ثوبها الى الحمرة القرمزية يتوجها هلب قصير. رأسها جزوي. مدنها ورواجها الى السمرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ستة اسابيع ينتهي داخل صلجة تحجبها السرفة على النبات العائل.

١٠٧٥٩ - ديسوم *

Dicœum (S).
Dicœe (F). *Dicœum* (E).

جنس طير من الجواثم رقيقات المناقير وفصيلة المغفريات. انواعه المعروفة نحو ٢٠ جميعها من عصافير الهند وماليزية والفلبين. تألف الغابات والحراج والادغال. ملجنها الحياتي جماعي. افواجها تعد من ٣٠ الى ٦٠ زوجاً. قوتها الحشرات ورحيق الازهار وبعض البزور البرية || اجسامها ربة صغيرة القد تطول من ١٠ الى ١٤ سم. اذانها قصيرة، مقطوعة. اثواب ذكورها مبلقة فيها الاحمر والاسود والابيض والبرتقالي والاخضر الاليس والاطحل... اثواب اناثها عادمة التليق تغلب فيها الشقمة والخضرة الزيتية || تدين اعشاشها في الادغال. اناثها

السعفاء الموج. غمداه متقاربة التضليع الدقيق || يرقها غبراء الثوب، سمراء الرأس، دقيقة الجسم تطول نحو ٥ مم. || الحشرة الجملاء ويرقها تعيشان على دقيق الحنطة.

١٠٧٤٦ - ديسكوريا هو الانيام، اطلبه.

١٠٧٤٧ - ديسك هو الطباب، اطلبه.

١٠٧٤٨ - ديسكوريزه *

Discosia

جنس فطور مجهرية من فصيلة الهدكيات. انواعه قليلة عديمة القيمة الاقتصادية. بكنيداته مغلفة، سوداء اللون. شفيرااته حمية، يورفااته مستطيلة، شفافة او زيتية اللون، هلبية الاطراف، ثنائية او ثلاثية المفاصل المؤثرة.

١٠٧٤٩ - ديسكوت *

Discuta

جنس فطور مجهرية من فصيلة الدلاميات. بكنيداته تنشأ محضونة بالادمة ثم ترقى حتى السطح فتسبب انصداع البشرة بعد انزاق النسيج الادمية || انواعه قليلة تركب اوراق بعض النباتات الحرجية دون ان تلحق بها الاذى.

١٠٧٥٠ - ديسللا *

Discella

جنس فطور مجهرية من فصيلة الدلاميات. بكنيداته لا قياسية الشكل والحجم تبدو محضونة خفية ثم ترقى وتشرى. يورفااته وشعية ملونة ثنائية الخلية || انواعه المؤذية قليلة اعرفها النوعان التاليان :

١٠٧٥١ - ديسللا الكاكاو *

Discella cacaoicola

فطر من الديسللا يركب الكاكاو، يوجد وينشط في المواقع الرطبة، اضاراه زهيدة لا تستحق المكافحة.

١٠٧٥٢ - ديسللا فحمية *

Discella carbonacea

فطر يركب قضبان الصفصاف فيوشم القشرة ببقع فحمية اللون لا قياسية الشكل والحجم تسبب ارتفاع وانصداع البشرة || اضاراه زهيدة لانها لا تؤر في النمو.

١٠٧٥٣ - ديسيم

Essaim (F). *Warm* (E).

هو ثول النحل من الهجرة الاولى. اما الثول من الهجرة الثانية والثالثة فيسمى لوثاً.

١٠٧٥٤ - ديسمة *

Rulzia (S). *Rulzia* (F).

جنبة ممرية برية وتزيينية من فصيلة الخبازيات. مهدها البلاد الحارة الاسيوية والافريقية || ساقها منتصبه فرعاء. فروعها جالسة. اوراقها متقابلة، معنقة، بيضية النصال الجمادة. ازهارها عكوكي التجميع، ابطي الارتكاز وطرفي || ازهارها ليلية اللون، عشارية البتلات المتراكبة. ثمارها صغيرة، مستديرة، عشارية الاحقاق الاحادية البزور || تنويرها يستمر من اواسط الربيع الى اواخر الصيف.

١٠٧٥٥ - ديسمولوجية

Desmologie (F).

Desmology (E).

الديسمولوجية علم يبحث في خصائص ربط الهيكل العظمي.

١٠٧٥٦ - ديسوس *

Stenopterus (S).

Sténoptère (F). *Stenopterus* (E).

جنس حشرات من فصيلة القرنييات ورقبة غديسات الاجنحة. اجناسه المعروفة عديدة معظمها من حشرات حوض البحر المتوسط. اجسامها صغيرة القد، شبه



ديسمة



ديسوس أكلف



ديسوق ثلاثي النقطة



ديسوم

وترية التجميع يراوح عددها من ١٩ الى ٢٣ طولها نحو ٤ سم وعرضها من ١ الى ٢ . نصلها مهدب الخنار . هذب احمر اللون || الجراء جثوية والبزور سود . اما الخشب فالصفر البرتقالي .

١٠٧٦٦ - ديش مشوك

Xanthoxylon americanum (S). Clavier à feuilles de frêne, Frêne épineux (F).

نوع من الديش يعلو نحو ٦ امتار . اوراقه كبيرة نحو ٢٠ سم . وريقاتها وترية التجميع يراوح عددها من ٥ الى ١١ ، طول الوريقة نحو ٦ سم . وعرضها ٣ . نصلها ازغب البشرة السفلى تعلوه غدد شفافة عطرية الرائحة يتوسطها هذب شائك . الجراء سوداء اللون والبزور كذلك . الخشب الى الصفرة الليمونية .

١٠٧٦٧ - ديشكار* ، خنشار كبير

Pteridium aquilinum, *Pteris aquilina* (S). Fougère-aigle, F. commune, F. à cerises, Grande fougère (F). Bracken, Brack fern, Eagle fern (E). Echter adlerfarn, Farn (D). Pteride, Pteris aquilina, Felce (I).

نبات عشبي معمر من السرخسيات الاسباجيات يكثر في الاماكن الرطبة ، يرغب في الاتربة الرملية والطينية ، يخشى الكلسية . سوقيه مدادة . اوراقه مركبة ، قليلة التجميع تطول من متر الى مترين .

١٠٧٦٨ - ديشلي

Dishley سلالة من الضأن الاروبي مشهورة بوفرة لحمها وبجودته .

١٠٧٦٩ - ديشلي مرييني* ، ديشلي مريوس

Dishley mérinos (F). *Dishley merino* (E).

سلالة من الضأن حصلت من تهجين وتأصيل ضأن ديشلي بضأن بني مريين او الضأن المرييني . وهي مشهورة بغزارة وجودة صوفها ولحمها .

١٠٧٧٠ - ديفتريا ، ذباح ، خائوق

Diphtherie (F). *Diphtheria* (E).

مرض جرثومي وبائي يصيب الحيوان .

١٠٧٧١ - ديفتريا الطير

Diphtherie variolique (F). *Varicelle diphtheria* (E).

هو جدري الطير مرض خبيث .

١٠٧٧٢ - ديفوني

Dévonien (F). *Devonian* (E).

نعت تعريفي يطلق على الحقبة الثالثة من الاباج القديم . فيقال العصر الديفوني والاراضي الديفونية ، وهي تتميز باحتوائها على متحجرات التريلوبيت والنفيديات وصدفيات الجلود . وبظهور الشلقيات ومزدوجيات التنفس والامسوخيات وعريانات البذور .

١٠٧٧٣ - ديك

Coq (F). *Cock* (E).

هو ذكر الدجاج . جمه ديوك وديكة . كنيته : ابو حسان وابو حماد وابو سليمان وابو عقبة وابو مدليج وابو المنذر وابو نهان وابو يقظان وابو برائل .

قال ابو بكر الصنوبري في مدحه :

مفرد الليل مسا يالوك تغريدا

مل الكرى فهو يدعو الصبح مجهودا

لما تطرب هز العطف من طرب

ومد للصوت لما مده الجيدا

كلايس مطرفا مرخ ذوائبه

تضاحك البيض من اطرافه السوداء

حالي المقلد لو قيت قلائده

بالورد قصر عنها الورد توريدا

تخصن بمنابرة الذكور من ٣ الى ٤ بيضات على مرتين في الحول .

١٠٧٦٠ - ديسومة

Choriospora (S). *Choriospora* (F). *Choriospora* (E).

جنس نباتات عشبية حولية برية من الهيفمانيات وفصيلة الصليبيات . انواعها المعروفة قليلة العدد منبتها بعض اصقاع الشرق الادنى واروبة الجنوبية || سوقها معتدلة الارتفاع ، فرعاء . اوراقها متعاقبة ، السفلى قيثارية النصال ، العليا مسننة الاطراف . ازهارها كبيرة القد ، رباعية البتلات ، منها الابيض والاصفر والارجواني . تنويرها ربيعي . ثمارها خرينبات شبه مخروطية الشكل تغلف بعض البزور المكورة الجذوية اللون || اعرف انواعها : الديسومة السورية (*C. Syriaca*) التي يكثر وجودها في المنطقة الممتدة من جبل الشيخ في لبنان الى تدمر في سورية .

١٠٧٦١ - ديسينة*

Discina (S). *Discine* (F). *Discina* (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات عضديات الارجل وفصيلة الدوارات . انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد تعيش على الصخور المنمورة البعيدة الغور في بحار البلاد الباردة || اصداقها قرنية المادة ، لامتناهية المصارع ، شبه بيضية الشوزن ، مسطحة الصفحات السفلى . مصاريها مجهزة بطباب مستديرة . طباب المصراع العلوي عادم الثقوب يتوسطه نشوز كالثندوة اما طباب المصراع السفلي فأبيض اللون يتوسطه كظير مستطيل الفلق .

١٠٧٦٢ - ديش*

Xanthoxylon, *Zanthoxylum* (S). *Clavier*, *Xanthoxyle* (F). *Prickly ash*, *Tooth-ash tree* (E). *Zahnwehgelholz* (D). *Clava erculea* (I).

جنس اشجار وجنبات برية وزارعية تزيينية من فصيلة السذابيات . انواعه نحو ١٢ جميعها فرعاء . اوراقها مركبة ، وريقاتها خلية او زباء النصل . ازهارها ثنائية المسكن ، عطرية ، وترية التركيب ، ثلاثية او خماسية البتلات والاسدية والمبايض والجراء . بزورها سود . اخشابها ناعمة الرقة ، جيدة الصنف ، لونها الى الصفار العابق . تستعمل في الصناعات الدقيقة || اعرف انواعه ما يتبع .

١٠٧٦٣ - ديش بنجي

Xanthoxylon bungei (S). *Clavier de Bunge* (F).

نوع من الديش يعلو نحو ٨ امتار . فروعه وافناده شائكة . اوراقه تطول نحو ١٥ سم . وريقاتها وترية التجميع خماسية او سباعية العدد ، طولها نحو ٤ سم . نصلها لامع البشرة ، خلي الخنار . جراؤها جثوية ، بزورها سود . خشبها جميل الصفار الزيتوني .

١٠٧٦٤ - ديش فلفلي

Xanthoxylon piperitum (S). *Clavier-polvrier* (F).

نوع من الديش يعلو نحو ٥ امتار . فروعه وافناده قليلة الشوك . اوراقه مركبة من ١١ او ١٣ او ١٥ وريقة طول الواحدة نحو ٤ سم . وعرضها ٢ . نصلها خلي البشرة مسنن الحافة . الجراء حنطية اللون . البزور سود والخشب الى الصفار الكبريتي يعلوه توشيع حنطي وماجة جثوية .

١٠٧٦٥ - ديش مسطح الشوك

Xanthoxylon planispinum (S). *Clavier à épines plates* (F).

نوع من الديش يعلو نحو ١٢ م . فروعه وافناده قليلة الشوك المسطح . اوراقه تطول نحو ٣٥ سم . وريقاتها




ديسينة



ديش



ديشار



ديشلي مرييني



ديك الشمس

١٠٧٨١ - ديلاريات

Dilaridae (S).

Dilaridés (F). Dilaridae (E).

فصيلة حشرات من رتبة شارفات الاجنحة . اجناسها وأنواعها عديدة ، معظمها من عظم البلاد الامريكية وبعضها منتشر في حوض البحر الابيض المتوسط وفي الهند واسيا الجنوبية . اجسامها صغيرة القد ومتوسطة . بسطة اجنحتها تراوح من ١٢ الى ٤٠ مم . رؤوسها شبه مكورة . عيونها كبيرة جاحظة . قرونها الاستشعارية مستطيلة ، دقيقة ، عديدة الفصل ، مشطية عند الذكور . كواسلها شبه عمودية الاتجاه بالنسبة الى محور الجسم ، يملؤها ملوك من الدرينات المشوجة بهلب دقيق . اجنحتها مستديرة الاطراف ، مرقوشة بالاسمر . بطونها اسطوانية الشكل ، مبعثرة الهلب . اناثها مستطيلة المرزات . يرقاتها مفترسة ، صغيرة القد ، اهليلجية الشكل ، يكثر فيها الثوب الاسمر . اشهر اجناسها الديلار واليدار .

١٠٧٨٢ - ديثلم

هو قطاة الرمل ، اطلبها .

١٠٧٨٣ - ديثلوبة زرقاء الرأس

Diloba caeruleocephala (S). Dilobe à tête bleue, Double oméga (F). Diloba caeruleocephala (E).

حشرة من فصيلة الفسقيات ورتبة حشرغيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الادنى الى اوروبا وافريقية الشمالية . فراشها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرفتها خاضعة تعيش على اوراق الزعرور واللوز والدراق والخوخ والمشمش اجسامها متوسطة القد يطول نحو ١٦ مم . بسطتها تراوح من ٣٤ الى ٤٠ مم . رأسها معتدل الجرم ، ازرق اللون . عينها صغيرتان . زباناها خيطيان ، مهدبان عند الذكر . حشرغها معتدل الجرم والطول . جوشنها كبير القد ، سبوري اللون ، ازرق الموج . بطنها كثيف الخمل ، اطحل اللون ، بني الموج . روشناها الاماميان الى النبي الاحمر الموج نعلوه بقع ممتدة الى الشبهة الزرقاء وزرقة يغلب فيها الخططي . روشناها الخلفيان الى الخططي الاغبر العاجي الموج يعلوه تبقيج اشهب ازرق . لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في مطلع ايلول . تعاظم بعد ظهورها بنحو ثلاثة ايام وتمتدح المكن بين شقوق المعاء او تحت القشور . يتقف المكن في الربيع بعد ايلال النبات العائل . السرفة تطول من ٣٢ الى ٣٨ مم . جسمها مائل القشار ازرق اللون اكهب الموج يعلوه خط ثنجي اصفر وعطان جانبيين الى الصفار الكبيرتي . سكمها منقطة بالاسود . رأسها ازرق . مدبها ورواجبها الى السمرة الفاتحة . طور الاكمال الذي يستمر نحو ٨ اسابيع ينقضي ضمن صلجة متينة تحببها السرفة بين طيات الازراق او في شقوق المعاء .



ديلوبة زرقاء الرأس

١٠٧٨٤ - ديثلوس

Dilus fugax (S).

Dilus fuyard (F). Dilus fugax (E).

حشرة من فصيلة القرنييات ورتبة غدييات الاجنحة . الذكر اصفر قدأ من الانثى يطول نحو ٧ مم . والانثى تطول نحو ١٠ مم . جسمه مستطيل الشكل اطحل الثوب ، حنطي الموج الاسفع . اعطانه البلاد المعتدلة الحرارة والحارة . يسرح في النهار . يظهر في نيسان ويبقى حتى تموز . مرتبه ازهار النباتات الحرجية . يرقته تركب قضبان اللزان والوزال والهدسكان والشيع فتتخرها وتؤذيها اشد الاذى .

Halcyon

١٠٧٧٤ - ديك البحر

هو القيون ، اطلبه .

Scarus gallus (S).

١٠٧٧٥ - ديك البحر

هو المخرد ، سمكة بحرية من بنات مصقار .

Alecthella (S).

١٠٧٧٦ - ديك الشمس

Alecthelle (F).

الاسم العلمي من اليوناني بمعنى ديك الشمس . جنس طير من فصيلة الشقباتيات . انواعه المعروفة قليلة العدد . موطنها المناطق الاستوائية . ملجئها الحياتي جماعي . افواجها قليلة العدد . قوتها البذور والحشرات . تعدو بسرعة فائقة وتطير بخفة . طيراتها معتدل الشوط . اجسامها صغيرة . اذناها شديدة القصر تلحفها الاجنحة . لحمها فاخر الصنف .

١٠٧٧٧ - ديكرانورة فرقاء الذئب

Dicranura vinula (S). Dicranura lie de vin.

Queue fourchue (F). Dicranura vinula (E).

حشرة من فصيلة الشوحليات ورتبة حشرغيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا . فراشها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرفتها خاضعة تعيش على اوراق الصفصاف والحور . جسمها كبير القد يطول نحو ٢٦ مم . بسطتها تراوح من ٦٤ الى ٧٠ مم . رأسها معتدل الجرم . عينها كبيرتان . زباناها مشطيان مزدوجان عند الذكر ، مشطيان بيطان عند الانثى . جوشنها اكهب اللون . بطنها الى الكهبة يعلوه خط ثنجي قاطب وقسمه خطوط معتمة جميعها سمراء قاتمة . رواشنها الى البياض الاغبر الحنطي الموج تعلوه خطوط وتزاويق قاتمة . لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في نيسان وتبقى حتى حزيران . تسرح في الليل . تعاظم بعد ظهورها بصحة اسابيع . السرفة عند ادراكها الكمال الجسموري تطول نحو ٥٠ مم . جسمها مستعجن الشكل اللامالوف . شرجها مجهز بزائدتين قرنيتين . وهي عند الدفاع عن النفس تقذف مادة حريفة تفرزها خيوط صدرية وشرجية حمراء اللون فياجة . طور الاكمال الذي يستمر من ٢٤ الى ٢٦ اسبوعاً ينقضي ضمن صلجة متينة تحببها السرفة تحت القشور او بين المعاء .

Dicksonia (S).

١٠٧٧٨ - ديكسونيه

Dicksonia (F). Dicksonia, Tree fern (E). Dicksonie (D). Dicksonia (I).

شجرة من السيتاسيات السرخسيات معقودة الهوية على اسم العالم الانكليزي جيمس ديكسون . مهدا استراليه . جذعها يعلو نحو ٢٠ م . قشورها ليفية سود القاعدة خضر الطرف . اوراقها هامة التجميع اهليلجية الشكل طولها يراوح من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم . عرضها من ٦٠ الى ١٠٠ سم . فصلها ثلاثي التفريغ اخضر الصفحة العليا ، زيتوني السفلى .

Pécarl (F). Peccary (E).

١٠٧٧٩ - ديكويل

هو الخلاح ، حيوان امريكي من فصيلة الخنازير .

Daikon

١٠٧٨٠ - ديكون

نوع من الفجل يعرف بالفجل الياباني ، اطلبه .

١٠٧٩٤ - دَيْن ثَابِت ، دَيْن صَحِيح
Créance certaine (F). Undoubted credit (E).
هو الدين الذي لا نزاع في صحته .

١٠٧٩٥ - دَيْن شَكِيَّت
Dette flottante (F).
Wavering debt (E).
هو دين حكومي قصير الاجل تعقده الخزنة العامة مباشرة .

١٠٧٩٦ - دَيْن طَوِيل الاجَل
Dette à long terme (F). Long-dated debt (E).
من انواع الديون الشئبة المستطيلة الاجل المطلوبة من الحكومة .

١٠٧٩٧ - دَيْن عُمَرِي ، دَيْن مَعَاشِي
Dette viagère (F). Life debt (E).
هو الدين المتوجب على الدولة الى ارباب المعاشات .

١٠٧٩٨ - دَيْن قَصِير الاجَل
Dette à court terme (F). Short-dated debt (E).
من انواع الديون الشئبة المطلوبة من الحكومة .

١٠٧٩٩ - دَيْن مُوَسَّخ
Dette consolidée (F).
Funded debt (E).
دين طويل الاجل يطلب رأساً من الحكومة . وفي العرف يصبح الدين مرتجاً اذا اضيفت متأخراته الى الباقي من رأسماله ومدد اجل دفعه .

١٠٨٠٠ - دَيْن مَطْلُوب
Dette passive (F).
Liabilities (E).
هو كل دين مطلوب من المرم .

١٠٨٠١ - دَيْن مُعَيَّن
Créance liquide (F).
Liquid credit (E).
هو كل دين عين مقداره تعييناً صحيحاً .

١٠٨٠٢ - دَيْن مَقْدُور الإِسْتِهْلَاك
Dette amortissable (F). Redeemable debt (E).
نوع من الدين يلتزم المرم بدفع اصله مجزئاً على اجمال معينة وبشروط مقرر .

١٠٨٠٣ - دَيْن مَقْبَد
Dette inscrite (F).
Inscribed debt (E).
هو الدين الذي يقيد في السجل العقاري .

١٠٨٠٤ - دَيْن مُوْتَقَّ
Dette gagée (F).
Pledge debt (E).
دين عام مضمون اما بعين مرهونة او بتخصيص بعض الموارد المالية . لدفعه .

١٠٨٠٥ - دَيْن وَاجِب الاداء
Créance exigible (F).
Demandable credit (E).
هو الذي يمكن الدائن من ارقام المدين على ادائه .

١٠٨٠٦ - دِينَارِيَّة
Clypeola (S). Clypéole (F).
جنس نباتات عشبية حولية ومحولة من فصيلة الصليبيات .
انواعها المعروفة عديدة منبتها يشمل حوض البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق اوروبا والشرق الادنى || سوقها عادة الفروع ، كثيفة الزغب المستطيل . اوراقها متعاقبة منها السنانية الضيقة والمصفية والخيطية || ازهارها ضمية التجميع ، هامة الازكاز ، متباينة الاحجام ، قريبة الشبه بالدنانير ، لونها الى الصفار الذهبي . تنويرها ربيعي .

١٠٧٨٥ - دِيمَاسِي
Souterrain (F).
Underground (E).
نعت تعريفي يطلق على كل عضو نباتي كالجذر والسرخ وما اشبه يعيش داخل التربة . وهو ايضاً صفة كل كائن يوجد في بطن الارض .

١٠٧٨٦ - دِيمَمَة
الدِّيمَة ، مطر يهطل ويستمر في سكون بلا رعد ولا برق .
ج ديم وديوم .

١٠٧٨٧ - دِيمُور
Diomorus (S).
Diomare (F).

جنس حشرات من فصيلة الطرميديات ورقبة غشائيات الاجنحة المخصورة . انواعه المعروفة لا تتجاوز العشرة . اعطانها البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . جميعها تتطفل على مختلف انواع الزناوير والذباب || اجسامها متوسطة القد النسبي تطول من ٥ الى ٧ مم . تتميز بانواعها اللهاة السغماء الموج وبممرزاتها الدقيقة الحارقة الطول .

١٠٧٨٨ - دِيمُول
Dimol
حاشور زراعي قوي الفاعلية شديد الوقع يقضي على معظم الحشرات الضارة . وهو سائل لزج يرتكز على بعض المواد السامة . يستعمل محلولاً بالماء بمعدل يراوح من الواحد الى الاثنين بالالف .

١٠٧٨٩ - دِيمِي
Dimidié (F).
نعت يطلق على كل عضو في النبات والحيوان ممي وتطور قسم منه وهزل واستقر القسم الآخر .

١٠٧٩٠ - دِيمِيَّات
Dimyidés (F). Dimyidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم الرباعية عادات المتاعب . اجناسها وانوعها المعاصرة قليلة العدد اعطانها بعض بحار البلاد الحارة || اصداؤها شبه مستديرة الشكل ، مخددة المصاريح اللامتساوية . اغشيتها الداخلية سمكة المادة اللؤلؤية || تعيش طليقة في رمال الاغوار البعيدة .

١٠٧٩١ - دِيمِيَّة
Dimya (S). Dimya (F).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة الديميات . انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد موطنها بعض بحار البلاد الحارة || اصداؤها متوسطة القد ، شبه مستديرة الشكل ، مخددة المصاريح اللامتساوية ، جووذية اللون غالباً . اغشيتها الداخلية وافة المادة اللؤلؤية || تعيش على سطح الرمال البعيدة الغور التي تراوح اعماقها بين ٥٠ و ١٥٠ متراً .

١٠٧٩٢ - دَيْن
Créance, Dette (F). Credit, Debt (E).
لفظة شاملة تستعمل للدلالة على المطلوب للمرم وصل المطلوب منه .

١٠٧٩٣ - دَيْن تجَارِي
Dette commerciale (F).
Commercial debt (E).
الدين التجاري في القانون المالي هو القرض الذي تعقده الحكومة في الاسواق الخارجية او الالتزامات التي تقطعها على نفسها للمصارف الاجنبية .



ديمور



دينارده

١٠٨١١ - ديوسمة ، جنبسة عطيرة Diosma (S).

Diosme (F), Diosma (E).

الاسم من اليوناني بمعنى «عطر ألهي» جنس جنبسات معمرة من فصيلة السذابيات. أنواعه عشرة جميعها جنبسات صغيرة القد ترتفع من ٥٠ إلى ٨٠ سم. تشبه الخلدنج. أوراقها عروية خيطية متقابلة ومتعاقبة ، نصلها يطول نحو ٣ سم. يحمل صلل صفحته السفلى بعض الغدد الدهنية التي تفرز مادة عطرية فواحة العرف الذي يقال أنها من المقويات الجزيلة النفع ومن منشطات الباه غير المؤذية || أزهارها صغيرة جميلة. ألوانها تختلف مع الأنواع. يكثر فيها الأبيض والوردي والاحمر || أزهارها يستمر طوال السنة. تزرع في المراكن وفي البيوت.

١٠٨١٢ - ديوسمة الشبق * Diosma ericoïdes (S).

Diosme, Buchu (F), Diosma, Bucku plant (E), Götterduft, Bukkostrauch (D), Diosma (I).

نوع من الديوسمة البرية والزراعية التزيينية. أوراقها غزيرة المادة الدهنية الشديدة الفاعلية في الشبق والباء.

١٠٨١٣ - ديون Passif (F), Passive; On debit side (E).

هو كل مطلوب الى الغير من الذمة المالية.

١٠٨١٤ - ديونته هي خائق الذباب ، اطلبه.

١٠٨٠٧ - دينترده * Dinarda dentata (S).

حشرة صغيرة القد من فصيلة الدنياث طولها نحو ٤ مم. ثوبها الى الصهبة العابقة ، تعيش في قرى النمل تفترس الهوام وجثث النمل.

١٠٨٠٨ - دينسورنيس ° Dinornis (F), Dinornis (E).

الاسم العلمي من اليوناني بمعنى «طائر رهيب». طائر من الرواكض يبلغ ارتفاعه ٣٥٠ سم. يعود عهده الى ارائل الاباج الرابعي. وجدت احافيره في طمى جزيرة زيلندا الجديدة.

١٠٨٠٩ - ديوان المحاسبة Cour des comptes (F).

Audit office (E).

هو الديوان الصالح الخاص بمراقبة واردات الدولة وصرفياتها.




١٠٨١٠ - ديوسقوريئات Dioscoréacées (F).

Dioscoreaceae (E).

فصيلة نباتية من وحيدات الفلقة ، اجناسها ٢٩ ، أنواعها ١٧٠ جميعها من نباتات المناطق الحارة والمعتدلة. سوقها ليفية ملتفة ، جذورها عسقلية. أوراقها معنقة كفية او مركبة. أزهارها صغيرة نظامية وبعضها ثنائي المسكن. الأزهار الذكرية سداسية الاسدية. عساقلها ديماسية لبابية مأكولة مختلفة الاشكال والاحجام || أشهر اجناسها الانيام والفاشرشين.



ديوسمة الشبق



١٠٨٢٢ - ذَاذِي هو الداذي من النبات ، اطلبه .

١٠٨١٥ - ذَاب ، ذِيم Dépréciation (F).
النقص في قيمة الشيء من جراء عيب . Depreciation (E).

١٠٨٢٣ - ذَارِعَات هي الارقيات من الحشرات ، اطلبها .

١٠٨١٦ - ذَات الْأَجْرَاس ، ذَات الصَّلَاصِل
هي الصنجية من الحيات السامة ، اطلبها .

١٠٨٢٥ - ذَاعِفٌ ، ذَاعِقٌ Léthal (F). Lethal (E).
نمت تعريف يطلق على المواد آسامة القتالة المستعملة في
مكافحة الحشرات وغيرها .

١٠٨١٧ - ذَات الْحَدِّ Monôme (F). Monomial (E).
هي العبارة الجبرية الحيدة التي لا يستبقها تعريف ايجابي
أو سلبي .

١٠٨٢٦ - ذَافٍ Mélanger (F).
To mingle, To bland (E).
خلط الشيء فانقص من قيمته الصنفية .

١٠٨١٨ - ذَات الرِّقَّة السَّارِيَة Pleuro-pneumonia,
Pneumonie infectieuse (F). Pleuropneumonia (E).
مرض معد يصيب الخيل والمجترات اخصها البقر فيؤذيها
أشد الاذى وقد يميتها في حال الإهمال .

١٠٨٢٧ - ذَا فِينْدَاس Daphné mézéréon (F).
Mezereon (E).

راجع مازريون . قال داود الانطاكي : « يسمى بالمغرب
مازريون ويقال له مازره وهو نبات عريض الاوراق
ابيض الزهر له حب دون الغار واصله كائما تولد بين
زيتون وغار عليه قشر شديد السواد يتقشر عن غصن نضر
لطيف الملمس الا انه حاد للذاع ويكثر بلبنان والمغرب
ويقطع بحزيران . يستعمل من خارج فيأكل اللحم
الزائد ، ويسقط التآليل ويقطع الآثار كالوشم ولا يجوز
استعماله من داخل لانه يحرق » .

١٠٨١٩ - ذَات الْقَرْنَيْن
هي القرناء من الحيات الخبيثة ، اطلبها .

١٠٨٢٠ - ذَات الْكَرْسِيِّ


Cassiope, la Chaise, le Trône (F).
Cassiope, Cassiopeia's chair (E).
كوكبة نجوم موقعا بالقرب من القطب الشمالي . وهي تمثل
امراة جالسة على كرسي أو عرش . وهي دائما تماكس
الذب الاكبر بالنسبة الى نجمة القطب || نجومها كثيرة ،
عددها لا يقل عن ٥٥ وبعضها مزدوج . والعرب تسمي
النيرة من هذه النجوم « الكف المنضب » ودركة ذات
الكرسي « و » السدير « (Schedir) .

١٠٨٢٨ - ذَاق Déguster (F). To taste (E).
ذاق الشيء : تذوق طعمه .

١٠٨٢١ - ذَات النَّفْسَيْنِ

١٠٨٢٩ - ذَاوَةٌ Mouton décharné (F).
Fleshless sheep (E).
الذَاوَة هي المهزولة من الغنم

من اسماء المياه العذبة لها غياثيم ورثان . تعرف بدييب
الحوت ، اطلبه .




ذبابة البساتين ذبابة الاصطبلات




ذبابة الحماض



ذبابة الحنطة



ذبابة الدم



ذبابة الشوادر ذبابة الشوادر



ذبابة الطير



ذبابة القرنفل

مستدق لونها رمادي اصفر. تظهر في الربيع، تلقي بمكثها على التربة في آب فينتف عن يرقات صغيرة تركب جميع الاعشاب اخصها النجيل بانتظار الحنطة. فتى قصمت الحنطة وطالت تركبها اليرقة وتدخل بين غمد العصف والقصب وتستقر عند اول كعبرة فتتخرها وتعطها.

١٠٨٤٤ - ذَبَابَةُ الدَّم * Hématopate (F).

Hématopate (E). جنس ذباب من النمرات. انواعه قليلة. اجسامها مستطيلة. اثارها الى التربة الفراء يعلوها موج اسمر. جناحها مستطيل منمش بالابيض. تعيش على المواد العضوية والدم الذي تمتصه من اي حيوان كان وقد تسع الانسان || توجد في الصيف. تكثر قرب مجاري الماء.

١٠٨٤٥ - ذَبَابَةُ الزَيْتُون هي خرشة الزيتون، اطلبها.

١٠٨٤٦ - ذَبَابَةُ الشَّحْم هي أريسة الشحم، اطلبها.

١٠٨٤٧ - ذَبَابَةُ الشَّوَادِي * Fucellia maritima (S). Fucellie maritime (F).

حشرة من ذوات الجناحين وفصيلة الذبابيات. جسمها صغير القد، بيض الحلب، يطول من ٤ الى ٦ مم. ثوبها الى الشقرة السمر السفاء. رأسها معتدل الجرم، اصفر اللون. خطمها معتدل الطول. زباناها دقيقان، قصيران. عينها صغيرتان، قمرزيتان. صدرها وبطنها مستطيلان. روثناها كبيران، شفافان. قوائمها نشيطة، قصيرة الملب الشائك || مبدولة على جميع الشوادي. طيرانها سريع الحركة. تركب ما يلفظه البحر من خث اخصها الضريع || يرقاتها وانجحة.

١٠٨٤٨ - ذَبَابَةُ الشَّوَادِي * Pegomyia betae, P. hyoscyami (S). Mouche de la betterave (F). Spinach leaf miner, Beet fly, Mangold fly (E). Rübenfliege, Runkelfliege (D).

حشرة من الذبابيات، طولها يراوح من ٥ الى ٦ مم. مرتعها من نيسان الى تشرين. تمتح مكثها خلال شهر ايار على اوراق الشوادر فوق صفحاتها السفلى فينتف عن يرقات دقيقة تنقب النصل وتسربه طولاً وعرضاً فتسبب ذبوله.

١٠٨٤٩ - ذَبَابَةُ الطَّيْرِ *، أنطومة الطير Anthomyia pluvialis (S). Anthomyie pluviale (F).

حشرة من الذبابيات، طولها من ٤ الى ٦ مم. ترتع من ايار الى تشرين. يرقاتها هراكة تعيش في أوكن الطير.

١٠٨٥٠ - ذَبَابَةُ الغَاب هي أريسة الغاب، اطلبها.

١٠٨٥١ - ذَبَابَةُ القَرْنَفُل *، هيلمة رصاصية Hylemyia brunescens, Phorbia brunescens (S).

Mouche de l'oeillet (F). Carnation maggot (E). Braune Neikenfliege (D). حشرة من الذبابيات، طولها من ٦ الى ٧ مم. لونها رصاصي تظهر في ايار. تمتح مكثها على اوراق القرنفل فينتف عن يرقات صغيرة دقيقة تدخل نصل الاوراق فتلفه بين البشرتين وقد تركب سلاميات السوق فتقضي عليها.

١٠٨٥٢ - ذَبَابَةُ الكَرَز هي خرشة الكرز، اطلبها.

١٠٨٣٠ - ذَبَابَةُ الأرض Phallus هر الفلوس، اطلبه.

١٠٨٣١ - ذَبَابَةُ البحر Holothurie (F). Sea-slug (E). جنس حيوانات بحرية مشهورة باسم قشاة البحر، اطلبه.

١٠٨٣٢ - ذَبَابَةُ الرِّيَاد Taureau sauvage (F). هو الثور الوحشي ويدعى الذب والأذب. Wild bull (E).

١٠٨٣٣ - ذَبَابُ Muscivore (F). Muscivorous (E). نعت تعريفي يطلق على كل طائر او حشرة تأكل الذباب. ويقال ايضاً مذباب.

١٠٨٣٤ - ذَبَابُ هِنْدِي هو الذراع، اطلبه.

١٠٨٣٥ - ذَبَابَةُ Mouche (F). Musca (E).

الذبابة كوكبة نجوم شمالية الموقع مركزها فوق برج الحمل || نجومها قليلة العدد أشهرها يحمل الرقم ٤١ وهو نجم مزدوج من المرتبة الرابعة.

١٠٨٣٦ - ذَبَابَةُ Mouche (F). Fly (E).

الذبابة واحدة الذباب والذبان والأذبة والذب. فتقول ارض مذبة ومذبوبة اي كثيرة الذباب. وكلمة ذباب تطلق في علم الحيوان، على حشرات فصيلة الذبابيات وهي في العرف او الاصطلاح تعني كل حشرة من رتبة ذوات الجناحين.

١٠٨٣٧ - ذَبَابَةُ الاصطبلات * Muscina stabulans (S). Muscine des étables, Mouche inerne des étables (F).

حشرة من الذبابيات، طولها يراوح من ٧ الى ٩ مم. يكثر وجودها في الاصطبلات. تركب الخيل والابقار. تعيش على ما تمتصه من جلودها. وهي تنقل العدوى في حالة المرض || يرقاتها مبخارة مؤذية.

١٠٨٣٨ - ذَبَابَةُ البحر المتوسط هي خرشة النار، اطلبها.

١٠٨٣٩ - ذَبَابَةُ البَسَاتِين * Morellia hortorum (S).

Mouche des jardins (F). حشرة من الذبابيات، طولها من ٧ الى ٩ مم. تعيش على الازهار والمواد العضوية المختمة والزبل... يكثر وجودها من ايار الى تشرين || يرقاتها نائلة.

١٠٨٤٠ - ذَبَابَةُ البيوت راجع ذبابة أهلية.

١٠٨٤١ - ذَبَابَةُ التَّيْنِ هي السرمان، اطلبه.

١٠٨٤٢ - ذَبَابَةُ الحَمَاض * Pegomyia bicolor (S).

Mouche de l'oseille (F). حشرة من الذبابيات، طولها من ٥ الى ٧ مم. يكثر وجودها من اذار الى تشرين الاول. مرتعها المراعي والاعشاب الحقلية وبعض البقول. تمتح مكثها على اوراق الحمض فينتف عن يرقات تلثم الاوراق وتقضي عليها.

١٠٨٤٣ - ذَبَابَةُ الحنطة *، هيلمة القمح Hylemyia coarctata (S). Mouche du blé (F).

حشرة من الذبابيات، طولها من ٦ الى ٧ مم. جسمها

الطول . زباناها صغيران ، نحيلان . عيناها كبيرتان ، جؤجؤيتان . روثناها كبيران ، قسطانيا الحصاب . قوائمها نشيطة || تظهر الحشرة الجملانة من حزيران الى ايلول . مسرحها البراري والحقول || تمتع الانثى مكناها في زبل المحترات فينتف عن يرقات نائلة تعيش في مكانها حتى الاكمال .

١٠٨٦٢ - ذبابة شائعة راجع ذبابة اهلية .

١٠٨٦٣ - ذبابة غبراء * ، أنطومة غبراء ،

هيلممة غبراء * Hylemyia cana (S). Anthomyie blanchâtre (F). Wheat bulb fly (E). Getreideblumenfliege (D).

حشرة من الذبابيات ، طولها يراوح من ٤ الى ٦ مم . تسرح من نيسان الى كانون . مرتعها الازهار والاعشاب البرية والحقلية . تمتع مكناها على مختلف النباتات اخصها القرصية الاوراق والبصلية وعلى بعض الجنادب فينتف عن يرقات وأجنة تنطفل على الحشرات العائلة فتقضي عليها ، وخاضعة تلهم النسيج النباتية فتؤذيها .

١٠٨٦٤ - ذبابة قانصة * ، لزبة *

Lispa tentaculata (S). Lispe tentaculée (F). حشرة من الذبابيات ، طولها يراوح من ٦ الى ٧ مم . ملامسها صفر . مخالبها قوية . تسرح من اذار الى كانون مرتعها مجاري الماء وضفاف الانهار . قوتها الهوام والحشرات الصغيرة تقتنصها بالمطاردة .

١٠٨٦٥ - ذبابة منشارية * هي المنشارية ، اطلبها .

١٠٨٦٦ - ذبابة يقظة *

Mylospila mediatunda (S). Mouche attentive (F). حشرة من الذبابيات طولها نحو ٧ مم . زباناها ولامسها بنية اللون ، متكها اسمر . تسرح من نيسان الى كانون . مرتعها الازهار والاوراق ومختلف المواد المختمة . يرقاتها نائلة .

١٠٨٦٧ - ذبابيات Muscidae (S). Muscides (F). Muscidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين ، اجناسها وانواعها زهاء ٢٠٠٠ جميعها صغيرة القد او متوسطة . عويناتها كبيرة ، متقاربة في الذكور متباعدة في الاناث . زباناها مهدبة الاطراف ، بطونها قليلة الهلب او عادمة . اجيالها الحولية كثيرة يختلف عددها باختلاف البيئة والاقليم . مكناها لؤلؤي اللون ، وشعي الشكل ، لا قياسي التجميع ، تمتع الانثى في مختلف انواع الزبل والبراز والمواد العضوية الثالفة الرطبة فينتف بعد وقت قصير ، تراوح مدته بين ٨ و ٣ ساعة ، عن يرقات مدبة الرأس ، غليظة الطرف المقطوم ، غبراء اللون ، يراوح طولها عند بلوغها كامل نموها من ٨ الى ١٢ مم . || كزودها برميكية الشكل لونها الى البني الاسمر ، طولها من ٣ الى ٦ مم . طورها العذري يلوم من ثلاثة ايام الى اسبوعين .

١٠٨٦٨ - ذبابة Diphtérie (F). Diphtheria (E). هو الديفترى مرض وبائي .

١٠٨٦٩ - ذبابة Dorippus (S).

Dorippe (F). Dorippus (E). جنس دوبيات بحرية من القشريات عشاريات الارجل

١٠٨٥٣ - ذبابة اللحم * ، سركوفيل *

Sarcophila (S). Sarcophile (F). جنس حشرات من الذبابيات القصيرات القرون . انواعها قليلة منتشرة في جميع اقطار العالم . اجسامها غليظة زباء . اقربها الى الكهبة المخططة بالاسود والاسمر . دعابصها لاحة تركب النسيج الحية فتؤذيها .

١٠٨٥٤ - ذبابة اللحم الخضراء

هي الخشفة الخضراء ، اطلبها .

١٠٨٥٥ - ذبابة الملفوف * ، أنطومة الملفوف *

هيلممة الملفوف

Hylemyia brassicae (S). Anthomyie du chou, Mouche du chou (F). Cabbage maggot (E). Kohlflye (D).

حشرة من الذبابيات ، طولها يراوح من ٤ الى ٦ مم . تسرح من ايار الى تشرين . مرتعها الاعشاب والازهار البرية والحقلية . تمتع مكناها على النباتات الصليبية اخصها الملفوف فينتف عن يرقات صغيرة دقيقة تلغم اضلاع الاوراق وتعطبها .

١٠٨٥٦ - ذبابة اهلية * ، ذبابة البوت ،

ذبابة شائعة Musca domestica (S). Mouche domestique (F). House fly (E). Stubenfliege (D).

حشرة من الذبابيات ، طولها يراوح من ٤ الى ٨ مم . وهي مبدولة شائعة توجد في كل مكان ، داخل المساكن وخارجها . قوتها جمع المواد الغذائية السائلة والقابلة للذوبان وقد لا تمف عن الدم لانها بحاجة اليه || تمتع مكناها في مختلف انواع الزبل والبراز والمواد العضوية والنباتية . وحيث ان الذباب يفتش الزبل والبراز والبصاق والجيف والافتار والاطعمة والحيوان والانسان . لذلك فهو من اخبث الحشرات واضرها بالصحة العامة .

١٠٨٥٧ - ذبابة نسي نسي

هي الشاة اللاسعة ، اطلبها .

١٠٨٥٨ - ذبابة خاتلة هي الاريسة الخاتلة ، اطلبها .

١٠٨٥٩ - ذبابة غبيشة * Stomoxys calcitrans (S).

Stomoxe, Mouche charbonneuse (F). Stinging fly (E). حشرة من الذبابيات ، طولها يراوح من ٥ الى ٨ مم . ثوبها الى السرة يعلوها تبقيع اسود مستدير الشكل ، منظم الترتيب ، مدارور ارجلها صفر . تتميز باستطالة متكها الثاقب الماص وبصغر زباناها . تسرح من حزيران الى تشرين . تلسع البقر والخيول وقد تهجم الانسان . تنقل عدة امراض خبيثة اخصها الحمى الجريرية .



١٠٨٦٠ - ذبابة راقصة * Fannia canicularis (S).

Fannle caniculaire (F). حشرة من الذبابيات ، طولها من ٤ الى ٦ مم . يكثر وجودها في المساكن . حركاتها سريعة ومختلفة الاتجاهات يرقاتها هواكة نائلة .

١٠٨٦١ - ذبابة رواغة *

Mesembrina callida (S). Mésebrine rusée (F).

حشرة من ذوات الجناحين وفصيلة الذبابيات . جسمها متوسط القد ، متكائف الهلب ، يطول من ٩ الى ١٢ مم . ثوبها الى السمرة السوداء . رأسها مفلطح . خطمها مستدل



ازهارها كبيرة القد خالسية الاضلاع . ازهارها الى البياض
الاخضر ، عطرية العرف || ازهارها يستمر من تموز
الى آب .

١٠٨٨٠ - ذَحَّح Pourfendre (F). To cleave (E).

ذح الحطب : شقه . والذح : عمل الحطاب من تفخير
وشق .

١٠٨٨١ - ذَحْجِي Morettia (S). Morettie (F).

جنس نباتات عشبية ، مدادة ، معمرة ، برية من فصيلة
الصليبيات . انواعه المعروفة خمسة اعطائها بعض مناطق
البلاد الحارة والمنحرفة نحو الاستوائية || سوقها مدادة .
متشعبة ، متكاثفة الزغب الكوكبي الشكل . اوراقها
متعاقبة ، متقاربة ، صغيرة النصال الشخية . ازهارها
صغيرة ، ابوية الارتكاز وطرفية ، وردية اللون او بيضاء .

١٠٨٨٢ - ذَحْيَان Koniga (S).

Koniga (F). Koniga (E).

جنس نباتات نجمية معمرة او عشبية حولية من فصيلة
الصليبيات . انواعه المعروفة عديدة منبتها يمتد من الشرق
الاقصى الى الادنى || جميعها نباتات مستلقية تتميز باوراقها
وازهارها المستحبة العرف الفواح || اعرف انواعها واشهرها
الذحيان العربي والبحري .

١٠٨٨٣ - ذَحْيَان بَحْرِي Koniga (S).

Koniga maritima (S). Koniga maritime (F).

نوع من الذحيان منبته بعض سواحل البحر الاحمر والبحر
الابيض المتوسط || نجمة معمرة كثيرة الفروع المستلقية .
اوراقها رحيمة النصال الحادة الاطراف . ازهارها طرفي .
ازهارها بيضاء اللون . تنويرها ربيعي .

١٠٨٨٤ - ذَحْيَان عَرَبِي Koniga arabica (S).

Koniga arabe (F).

نوع من الذحيان . عشبة حولية برية . منبتها السواحل
الممتدة من فلسطين الى مصر وليبيا . ساقها مستلقية ،
قليلة الفروع . اوراقها ملوقة مستطيلة . ازهارها طرفي .
ازهارها بيضاء اللون . تنويرها ربيعي .

١٠٨٨٥ - ذَحْجِيَة * Epicanta (S).

Epicante (F). Epicanta (E).

جنس حشرات نافطة من غمديات الاجنحة وفصيلة الملوذيات .
انواعها المعروفة عديدة اعطائها المناطق الحارة في معظم
اقطار العالم . تعيش على الازهار البرية اما يرقاتها ففترسة
وتقتضي على مكن الحشرات ودبابها ومنها الجراد || اجسامها
مستطيلة الشكل تطول من ١٥ الى ٢٥ سم . رؤوسها دائماً
حمراء اللون . كواسمها وبطنها الى السواد الفحشي او
الطحلة الرمضاء . اغمادها شبه لاحقة يكثر فيها الاسود
الاسفع وبعضها مشيز بالابيض || اناثها اكبر قدماً من
ذكورها . جميعها طيبة نافطة تستعمل استعمال الذراح
الناعظ .

١٠٨٨٦ - ذُخْر Réserve (F). Réserve (E).

هي الاشجار الحرجية التي استقيت بعد فرع الحرج .

١٠٨٨٧ - ذُخَيْرَة ، مَوْوَنَة Provision (F).

Provision, Stock (E).

جماع المواد الغذائية التي تسترجعها الحياة الحيوانية
والنباتية .



ذَحْجِيَة



ذَحْجِيَة

قصار الذيل وفصيلة الذباليات . انواعها المعروفة عديدة
اعطائها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة ومنها البحر
الابيض المتوسط || اجسامها صغيرة القد ، شبه مستديرة
الشكل ، مستعرضة المؤخر . دروعها معتدلة الاحديداب .
افوهها محرمة . تتميز بما تلتصقه بدروعها من فتات الاصداف
وغيرها ليخفيها عن الاعداء وعما تطارده من دويبات .

١٠٨٧٠ - ذَبَالِيَّات Dorippidae (S).

Dorippidés (F). Dorippidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الارجل
قصار الذيل . اجناسها وانواعها المعاصرة المعروفة متوسطة
العدد ، جميعها لجة منتشرة في معظم بحار العالم || اشهر
اجناسها واعرفها الذبالة والعلوز .

١٠٨٧١ - ذُبَح

الذبح : ضرب من الكساة . وهو الجزر البري . وهو نبت
حلو يؤكل له قشر اسود ونور احمر (عن أبي حنيفة) ،
واحدته ذبحة .

١٠٨٧٢ - ذُبَحُ النَّبِي

هو الزعيم المطوق عصفور من الجواثم ، اطلبه .

١٠٨٧٣ - ذُبْحَة هي الأنجين ، اطلبها .

١٠٨٧٤ - ذَبْل Carapace (F). Turtle-shell (E).

الذبل : غلاف غضروفي ، عظمي رصدي ، عديد الاشكال
والالوان ، يلحف ظهور بعض الحيوانات ، اخصها السلاحف
والدرود .

١٠٨٧٥ - ذَبْلَة Crotte (F). Dung (E).

هي بكرة الضأن والماعز والخيول والابل ...

١٠٨٧٦ - ذُبُول Flétrissement (F). Withering (E).

ذهاب نضارة الورق في النبات .

١٠٨٧٧ - ذُبَيْبِيْنَة * Moluccella (S).

Molucelle, Moluque (F).

جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة الشفويات . منبتها
الشرق الاوسط ، انواعها قليلة برية وزرع للتزيين . سوقها
قراء . اوراقها معنقة متقابلة ، نصلها سناني الشكل
مالس البشرة مسنن الحافة || ازهارها غريبة التركيب
تتكون من كأس قمية الشكل ترتكز في اسفلها الداخلي
اعضاء الزهرة وتوحياتها || اعرف انواعه ما يلي .

١٠٨٧٨ - ذُبَيْبِيْنَة شَائِكَة Moluccella spinosa (S).

Molucelle épineuse, Moluque épineuse (F). Spiny
molucca (E). Molukkische (D). Molucella spinosa,
Melessa spinosa (I).

نوع من الذببينة تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . كؤوس
ازهارها صغيرة القد ، اطرافها ثمانية التسنين ، اسنانها
مهدة سادة . ازهارها وردية اللون عطرية العرف .
ازهارها يستمر من تموز الى آب .

١٠٨٧٩ - ذُبَيْبِيْنَة مَلْسَاء Moluccella laevis (S).

Molucelle lisse, Moluque lisse (F). Molucca balm,
Shell flower (E). Molukkenlippe, Molukkische
melisse (D). Melessa delle molucche (I).

نوع من الذببينة تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم . كؤوس

صغیرتان . ظهرانها مستطیل الشكل ، مستدير الطرف الفارق بین الغمدین . ارساغها خماسية العقل || لها جیل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل نيسان وتبقى حتى اواخر تموز . تسرح في النهار وتبيت في الليل || البرقة عند الادراك التام تطول نحو ٢٦ مم . جسمها مبطل الجرم ، سداسي الرواجب ، ضلیع التأشير ، مبعثر الحلب . ثوبها الى الطحلة السمراء العابقة || تعتبر من الحشرات الطبية التي تحوي من ٠.٦٠ الى ٠.٧٠٪ من مادة الذراحين .

١٠٨٩٥ - ذُرَّاح نَاعِظٌ ، ذُبَاب هِنْدِي ، أَخْبَضَر

Lytta vesicatoria, *Cantharis vesicatorius* (S). *Cantharide vésicante*, *Mouche d'Espagne*, *M. de Milan* (F). *Spanish fly* (E). *Spanische Fliege* (D).

نوع من الذرايح جسمه مستدق الشكل يطول نحو ٢٠ مم . ثوبه الى الخضار الالامع يعلوه موج أزرق . زبانه خيطية مستطيلة منعطفة الى الوراء . مرتعه الاحراج حيث يركب ويلتهم اوراق عدة نباتات حرجية اخصها المزان والياسم والليلك || وهو من الحشرات الطبية المشهورة يؤخذ ويحفظ ويسحق ويستخدم في عدة مستحضرات اخصها الناعظة التي تنشط الباه والايلاع .

١٠٨٩٦ - ذُرَّاحِيَّات

Cantharididae (S). *Cantharididés* (F). *Cantharidae*, *Soldier beetles* (E). *Weichkäfer*, *Weichflügler* (D).

فصيلة حشرات من رتبة غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها عديدة تتميز باستطالة اجسامها وبقلة صلابة اعمادها . قرونها الاستشعارية مركبة من ١١ فاصلة . ارساغها خماسية العقل تعيش على ازهار ونوامي النباتات البرية . يرقاتها مفترسة لاحية تعيش على التربة .

١٠٨٩٧ - ذِرَاع

Avant-bras (F). *Forearm* (E). عضو من اعضاء الجسم مركزه بين التروقة واصابع اليدين . تتكون الذراع اساساً من عدة عظام اهمها العضد والكعبرة والزند والرسغ . وهي تتحرك بواسطة المفاصل والعضلات التي تكتنفها من كل صوب .

١٠٨٩٨ - ذِرَاع

مقياس طولي كان ولا يزال شائع الاستعمال في البلاد العربية . وهو عسل نوعين : الذراع العادي الذي يقدر بشبرين ونصف الشبر اي نحو ٥٨ سم . ويستعمل في قياس المنسوجات || والذراع المعاري الذي يبلغ طوله ٧٥ سم . ويستعمل في قياس الاراضي والبناء .

١٠٨٩٩ - ذِرَاع

الذراع او ذراع الاسد منزل من منازل القمر الشامية ينزله في الليلة السابعة من الشهر . وهما كوكبان نيران معترضان بين الشمال والجنوب . وللاسد ذراعان ، ذراع مقبوضة وهي الشامية واخرى مبسوطة ، تلي اليمن ، وهي نجم احمر يسمى مرزم الذراع || رقيب الذراع يدعى البلدة .

١٠٩٠٠ - ذِرَاع مَبْسُوطَة

الذراع المبسوطة اسم لنجمين نيرين من كوكبة برج التوامين مركزهما على رأسهما .

١٠٩٠١ - ذُرَاوَة ، نُسَاكَة

Vannée (F). *Winnow* (E). حصيلة نصف الحب .

١٠٨٨٨ - ذَّار * ٥

Paederia (S).

Paedérie (F). *Paederia* (E).

الذدار هو الاسم الهندي . جنس نباتات متسلقة معمرة من فصيلة الفويبات . انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها من نبات الهند وافغانستان || سوقها مدادة ، عارشة ومتسلقة . اوراقها متقابلة ، معنقة ، قلبية النصال الجامدة الناشزة العروق . ازهارها صغيرة ، بيضاء اللون ، تتركز على معاليق محورية || يقال ان اوراقها وجذورها تدر البول وتدفع الحمى .

١٠٨٨٩ - ذَرَّ

اشياء المنبت في الهواء اخذت منه الذرارة الواحدة ذرة . والذر : صغار النمل .

١٠٨٩٠ - ذَرَّ الْأَسْمِدَة

Epandage des engrais (F). *Scattering of fertilizer* (E).

هو نثر الاسمدة الكيماوية على التربة وقد يتم اما باليد او بواسطة منائر آلية تنفثه بدقة وانتظام .

١٠٨٩١ - ذُرَاب

Poison végétal (F). *Vegetable poison* (E).

الذراب هو السم النباتي

١٠٨٩٢ - ذُرَّاح ، ذُرَّوَح ، ذُرَّوَح

Cantharis, *Lytta* (S). *Cantharide* (F). *Cantharis*, *Blister beetle* (E).

الانثى ذراحة والجمع ذرايح . جنس حشرات صغيرة القد مستطيلة الجسم من فصيلة الملوديات . انواعه عديدة معظمها من حشرات الهند وحوض البحر المتوسط . اثوابها متداخلة الالوان يكثر فيها الزبرجدي والنحاسي والجوزي والجوزي المنمش بالاسود || اشهر انواعه الذرايح الناعظ .

١٠٨٩٣ - ذُرَّاح أَزْرَق *

Cantharis livida (S). *Cantharide livide* (F). *Livid Blister-fly* (E).

حشرة واشعة غاصلة من فصيلة الذراحيات ورتبة مفدمات الاجنحة . تألف الاحراج والبراري التي تكثر فيها الرياحين . خنافسها تعيش على بتلات الازهار ونوامي النبات . يرقاتها مفترسة || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٤ مم . ثوبها الى الزرقة يعلوها موج زيتي . زباناها خيطيان . عينها صغيرتان . ظهرانها مستطيل الشكل ، مستدير الطرف الفارق اللاحف . ارساغها خماسية العقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع وتعيش حتى اواخر آب . تسرح في النهار وتبيت في الليل || البرقة تطول نحو ٢٤ مم . جسمها مبطل الشكل . ثوبها الى السمرة العابقة . رأسها اسود . فكها ضليمان . تعيش في اول عهدا على المواد العضوية ثم على ما تستطيع اقتراحه من الحشرات الدنيا || وهي من الحشرات الطبية التي تحوي ٠.٦٠٪ من مادة الذراحين (الكانثاريدين) .

١٠٨٩٤ - ذُرَّاح أَسْوَد *

Cantharis fusca (S). *Cantharide noir* (F). *Black Blister-fly* (E).

حشرة واشعة غاصلة طبية من الذراحيات مفدمات الاجنحة . تألف البراري والاحراج والحدائق . خنافسها تعيش على ازهار النبات ونواميه واوراقه الريانة . يرقاتها مفترسة قوتها الهوام والحشرات || جسمها متوسط القد ، يطول من ١٥ الى ١٧ مم . ثوبها ثنائي اللون ، اسود الرأس والظهران والجرايمز ، احمر الكوسل والخطم . رأسها كبير الجرم ، مستعرض الشكل . زباناها خيطيان ، مستطيلان . عينها



ذدار



ذرايح أزرق



ذراع اسود



ذراع ناعظ

ذرب - ذرة بيضاء



ذرب الابيسة



ذربوب اصفر



ذربوب سورنجاني الزهرة



ذرة



ذرة بيضاء

الزهرة ، طول من ١٥ الى ٣٠ سم. وتعرض من ١٠ الى ١٥ م. شراخها يرتفع نحو ١٥ سم. زهرتها صفراء اللون ، ذهبية المواج ، طول نحو ٥ سم. || تنويرها يستمر من ايلول الى تشرين الاول .

١٠٩٠٩ - ذربوب سورنجاني الزهرة *

Sternbergia colchiciflora (S).

Sternbergia à fleur de colchique (F).

نوع من الذربوب . عشبة دوفسية سبروتية . اوراقها سنانية الشكل ، تظهر في الربيع ، طول نحو ١٠ سم. وتعرض نحو ٥ م. شراخها يرتفع نحو ٦ سم. زهرتها صفراء اللون ، مستحبة العرف ، طول نحو ٣ سم. || تنويرها يستمر من ايلول الى تشرين الاول .

١٠٩١٠ - ذربوب فيشر

Sternbergia fischeriana (S).

Sternbergie de Fischer (F).

نوع من الذربوب . عشبة دوفسية سبروتية . اوراقها سنانية الشكل طول نحو ١٠ سم. وتعرض نحو ٢٥ م. فصلها منبسط الصفحة ، عديم التخذيد ، جميل الخضار العابق . شراخها يرتفع نحو ٢٠ سم. زهرتها طول نحو ٣٥ م. لونها الى الصفار الكبريتي الباهت || تنويرها ربيعي .

١٠٩١١ - ذربوبية

كل سمكة سامة المتأخس تدعى ذربوبية .

١٠٩١٢ - ذربيات *

Oxyrhynques (F).

لمة من القشريات عشاريات الارجل تنتمي الى رتبة قصار الذيل . اجناسها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم || اجسامها متفاوتة الاحجام والاشكال يكثر فيها المزواني . اجهزتها العصبية صدرية المركز . دروعها قوية ومجهزة بمناخس حادة او بهلب جامد دقيق . قوائمها مستطيلة . بعض انواعها مجهزة بملاقط نشيطة .

١٠٩١٣ - ذرة *

Andropogon sorghum (S). *Sorgho vulgaire* (F). Foxtail millet (E). *Sorgho-gras* (D). *Miglio d'uccello* (I).

نبات عشبي حولي زراعي من النجيليات تكثر زراعته في المناطق الحارة وفي الاثرية غير المروية . ضرره عديدة . ساقه ليفية منتصبة جامدة . اوراقه عصفية سنانية الشكل متدللة الزام الاخير . ازهاره عتقودي عثكولي . ثماره حيوب تكتنف رباطها العصفيات . اما الحبة فبيديرة ، قطرها يراوح بين ٤ و ٥ م. || يستعمل استعمال الذرة الصفراء عند بعض شعوب افريقية والهند .

١٠٩١٤ - ذرة الماء اطلب فيكتوريا رجا .

١٠٩١٥ - ذرة بيضاء * ، ذرة صيفية

Sorghum durra, *Holcus durra* (S). *Sorgho commun*, *Grand millet*, *Gros mil*, *Dari*, *Doura*, *Durra*, *Kafir* (F). *Great millet*, *Guinea corn* (E). *Mohrenbartgras*, *Reiskorn* (D). *Sorgo a scope* (I).

نوع من الذرة وهو نبات عشبي زراعي حولي . زراعته صيفية عذبة واسعة الانتشار جيدة الانتاج . حبه غذائي كثير الاستعمال . يوجد في جميع الاثرية المتوسطة الاندماج والخصب .

١٠٩٠٢ - ذرب ، ذليق *Cuspidé* (F). *Cuspidate* (E). تمت تعريفه وصفي يطلق على بعض الاشكال المستطيلة الاطراف المدببة .

١٠٩٠٣ - ذرب *

Lophodermium (S). جنس فطور مجهرية من الريشيات ، يتميز بتكاته الشفعية الثمانية التجميع وبوغه الخيطي الشكل الوحيد الخلية . يعيش طفيلياً على اهداب الصنوبر ورمياً على الاعضاء النباتية اليابسة || اشهر انواعه الثلاثة التالية .

١٠٩٠٤ - ذرب الابيسة *

Lophodermium macrosporum, *Hypodermia hartigii* (S). *Maladie du brun de l'épicéa* (F).

فطر مجهرية يصيب هذب الابيسة فيؤذيها . مظهره الخارجي يقع ضيقة مستطيلة تعلو نصال اهداب الحولية ، تبدو صفراء اللون ثم تتحرف نحو البني || وهو يؤذي الشجرة ويؤخر نموها من جراء انتقال مشيجه مع اللسع في الاوعية ، وقد يسبب في ظروف خاصة سقوط اهداب || اضراره محدودة لكنها تستوجب المكافحة .

١٠٩٠٥ - ذرب التنوب *

Lophodermium nervisequum (S). *Maladie du brun du sapin* (F).

فطر مجهرية يصيب هذب التنوب فيؤذيها . يظهر في ايار بقماً ضيقة مستطيلة تبدو صفراء اللون ثم جنطية تركب نصال اهداب الحولية فتذبلها وتسبب سقوطها في الخريف . اضراره زهيدة لا تستوجب المكافحة .

١٠٩٠٦ - ذرب الصنوبر *

Lophodermium pinastri, *Leptostroma pinastri* (S). *Maladie du rouge du pin*, *Chute des aiguilles* (F). *Leaf cast of pine and fir* (E). *Kiefernritzenschorf* (D).

فطر مجهرية يصيب هذب الصنوبر فيؤذيها ويطلع به . مظهره الخارجي اصفرار يتحرف تدريجياً نحو الجؤوة يعلو اوراق الصنوبر منذ ايلول ويستمر في نشاطه البطي حتى يتم كامل النصل الهدي في اواخر نيسان فيسبب جفافه وسقوطه وقد يعطب النوامي ويؤذيها || اضراره منوطة برطوبة الجو التي تساعد على التمرکز والانتشار وهو شديد الفتك بنصب المشائل وبالاغراس الفتية التي تراوح اعمارها من سنتين الى خمس سنوات || يكافح باستعمال الاملاح النحاسية او سائل يورد عند ظهور الوراق الجديدة وذلك من ايار الى حزيران ثم ينضخ مرة ثانية بعد الاولى باربعة ايام .

١٠٩٠٧ - ذربوب *

Sternbergia (S). *Sternbergie* (F). *Sternbergia* (E).

جنس نباتات عشبية دوفسية صغيرة القدر من فصيلة النرجسيات . قريبة الشبه بالزعفران . مهدا بعض اقاليم البحر الابيض المتوسط . شراخها مصمتة ، قليلة الارتفاع ، وحيدة الزهرة القمية الشكل . اوراقها صغيرة ضيقة النصال || تزرع للزينة في المراكن والحدائق . ترغب في الاثرية المتوسطة الاندماج الوافرة الخصب .

انواعه المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية :

١٠٩٠٨ - ذربوب اصفر *

Sternbergia lutea (S). *Sternbergie jaune* (F).

نوع من الذربوب . عشبة دوفسية سبروتية . اوراقها سنانية الشكل ، مخددة الصفحة ، كبيرة القدر ، تظهر مع

١٠٩٢٣ - ذرة نيلية * ، ذرة بلديّة ، ذرة

عُرْبَجَة Sorghum vulgare cernuum (S). Sorgho penché, Millet d'Egypte (F). Egyptian millet (E). Nickende mohrenhirze (D). Miglio (I). نوع من الذرة وهو نبات عشبي زراعي حولي تكثر زراعته في البلاد المصرية حيث يأكلون حبه . يوجد في جميع الأتربة الخصبة ، المتوسطة والقليلة الاندماج .

١٠٩٢٤ - ذرة ، جزوي * Molécule (F). Molecule (E).

(كلمة جزئي من مجمع مصر) والذرة هي الجوهر العنصري الفرد يتكون من نواة تطوقها الكهارب . وهي متناهية في الصغر ، لا منظورة ، تستحيل رؤيتها تحت المجهر .

١٠٩٢٥ - ذرة حكيمة Micelle (F). Micella (E).

مجموعة من الذرات المائلة المتساوية والمتجانسة المحلول ، حجمها يراوح من ٠.٠٠١ إلى ٠.٢ من الميكرون .

١٠٩٢٦ - ذرح شجر تتخذ منه الرحالة .

١٠٩٢٧ - ذرفّة * ، زنبق الوادي

Convallaria maialis (S). Convallaire, Muguet de Mai, Lis des vallées (F). Mugget, May lily, Lily of the valley (E). Lilienkonnvallen, Maiblume, Maiglöckchen (D). Mughetto, Fioralisco, Giglio di maggio (I). نبات عشبي جذموري مداد معمر من فصيلة الزنبقيات . أوراقه بيضية سنانية الزام الأخير تطول من ١٥ إلى ٢٠ سم || سرائحه يقوم بين ورقتين يعلو من ١٠ إلى ١٥ سم . يحمل بانجاء واحد بعض الأزهار الجملجية الشكل ، البيضاء اللون المستحبة العرف العطري || أزهاره يستمر من أيار إلى تموز .

١٠٩٢٨ - ذرق Colombine (F). Columbine (E).

هو هيص الحمام . من الاسمدة العضوية الحارة الشديدة النشاط والغنية بعنصر الأزوت . متوسط تركيبه الكيماوي :
أزوت عضوي حامض فسفوري عناصر مختلفة
٪ ٩.٥ ٪ ١.٢ ٪ ٤.٠

١٠٩٢٩ - ذرق

هو الحلبة القرنية وهو الخندقوق ، اطلبها .

١٠٩٣٠ - ذرق أبيض Pullarose

مرض خبيث معد يصيب الطيور الداجنة اخصها الصيصان . عوارضه ذرق مائع أبيض اللون . يكافح باستعمال الادوية المطهرة للامعاء .

١٠٩٣١ - ذرمتيات Clypeosphaeriaceae (S).

Clypeosphaeriacées (F). Clypeosphaeriaceae (E). عمارة فطور مجهرية من فصيلة الخشاريات ورتبة الزقيات . تتميز بونيمة مجنية الشكل تغلف الاعسان الفردية الانتشاب . بوغها بيضي الشكل اسمر اللون عديد الخلايا او وحيدها . انواعها عديدة تجمعها بضعة اجناس لا صلة لها بالاقتصاد الزراعي ومنها نوع واحد يعترى النبات يدعى الذنيخة .

١٠٩٣٢ - ذرنوح هو الذراح ، اطلبه .

١٠٩٣٣ - ذروة Sommet (F). Summit (E).

ذروة الشيء : اعلاه فهي قته وقتته وقته . وذروة الزاوية هي رأسها .

١٠٩١٦ - ذرة حليّة ، حشيش الفرس

Andropogon halepensis, Sorghum haepense, Holcus halepensis (S). Sorgho d'Alep, Houque d'Alep (F). Aleppo millet grass (E). Aleppobartgras (D). Saggina d'Aleppo, Alco d'Aleppo (I).

نوع من الذرة وهو نبات عشبي زراعي علوي محصوله الخصري متوسط القيمة الغذائية ، وقد يمكن حفظه سليماً في المطامير نحو أربعة اشهر . زراعته عذبة صيفية يوجد في الأتربة المتوسطة الخصب .

١٠٩١٧ - ذرة سكرية * Sorghum

saccharatum, Holcus saccharatus (S). Sorgho sucré, Sorgho à sucre (F). Sugar sorghum, Sweet sorghum (E). Zuckerhirse (D). Saggina a spazzola, Sorgho zuccherino (I).

نوع من الذرة وهو نبات عشبي زراعي علوي وصناعي يستخرج من عصارة سوقه مادة سكرية تخضر وتستعمل كالسكر . زراعته مروية ، ينشط في الاقاليم الحارة ، يوجد في الأتربة المتوسطة الاندماج .

١٠٩١٨ - ذرة سودانية

Andropogon sorghum sudanensis, Holcus sudanensis (S). Sorgho menu, Sorgho soudanais (F). Sudan grass (E). Soudanische sorghogras (D). Erba di Sudan (I).

ضرب من الذرة وهو نبات عشبي حولي زراعي تكثر زراعته في السودان حيث يستعمل حبه للأكل .

١٠٩١٩ - ذرة صفراء * ، ذرة شامية

Zea mays (S). Maïs, Blé de Turquie (F). Maize, Indian corn, Turkey wheat (E). Echter mais, Türkisches korn (D). Maïs, Gran-turco, Formentone (I).

نبات عشبي حولي زراعي من النجيليات ضروبه عديدة . زراعته منتشرة في جميع أصقاع العالم . يرغب في الأتربة المروية المتوسطة الاندماج . انتاجه وافر المحصول عديد الفوائد الاقتصادية .

١٠٩٢٠ - ذرة صفراء سكرية

Zea saccharata (S). Maïs sucré (F). Sugar corn, Sweet corn (E). Zuckermals (D). Frumentone zuccherino (I).

نوع من الذرة الصفراء العلفية والصناعية الغنية بالمواد السكرية . انتاجها وافر المحصول . ترغب في الأتربة المروية القليلة الاندماج الوافرة الخصب .

١٠٩٢١ - ذرة ميكنسية * ، ميكنس

Andropogon sorghum technicus (S). Sorgho à balais, Mil d'Inde (F). Broom corn (E). Moorhirse, Sorghohirse (D). Saggina da scope (I).

ضرب من الذرة وهو نبات عشبي زراعي حولي يستعمل في صناعة المكناس . بزوره دقيقة مستطيلة حطية اللون صناعية المواجه مسحوقها وافر المادة الغذائية يستعمل لطعام الطير .

١٠٩٢٢ - ذرة ناب الجمل

Zea indentata (S). Maïs dent de cheval (F). Dent corn, Dent maize (E). Pferdezahnmais (D). Frumentone, Dente di cavallo (I).

نوع من الذرة الصفراء شائع الزراعة والاستعمال . حبه مبسط مفلطح جامد اللباب ، ابيض المكسر . يوجد في معظم الأتربة ولا يخشى المندمجة انما يتطلب وفرة العناصر الغذائية .



ذرة سكرية



ذرة صفراء



ذرة ميكنسية



ذرة ناب الجمل



ذرة نيلية



ذُرْوِيَّة



ذُعْرَة الرَّبِيع



ذُعْرَة الْغَنَمِ



ذُعْرَة بَلَقَاء



ذُعْرَة رَمْدَاء

١٠٩٤٧ - ذُعْرَة مُهْدَبَة ٥. *Buphone ciliaris* (S).

Buphone ciliée (F).

نوع من الذعاق. قليلة المادة الجمالية. أوراقها سنانية الشكل. طول نحو ٢٥ سم. نصالها خضراء اللون، وطوقه يحترق من الحدب التنبني اللون. أزهارها صيواني التجميع يرتكز على شراخ يرتفع نحو ٣٠ سم. أزهارها أرجوانية اللون، فستقية الوسط، قليلة العرف، طول نحو ٣ سم. تنويرها يستمر من حزيران إلى آب.

١٠٩٤٨ - ذُعْبَان. الفتي من الذئاب.

Motacilla (S).

١٠٩٤٩ - ذُعْرَة

Bergeronnette (F). *Wagtail* (F).

جنس طير من فصيلة الذعريات ورثة الجوامث المشرومات المناقير. أنواعه عديدة نحو ٣٢ جميعها عصافير صغيرة القد، بلقاء الثوب، سريعة الانتقال، شيالة الذنب الكثير الحركة. تعيش قرب الماء، قوتها الحشرات والموام. تدن في صدوع وأوكاف الصخور، في فلوج الحيطان وفي شقوق الأشجار. أناتها تحضن وحدها في نيسان من ٦ إلى ٨ بيضات ثم تحضن عن جديد في حزيران من ٤ إلى ٦ بيضات. أشهر أنواعه ما يتبع:

١٠٩٥٠ - ذُعْرَة الرَّبِيع *، فَتَّاح، قُوبَع،

مِرْطِيزَة

Motacilla flava, *Budytes flava* (S). *Bergeronnette printanière*, *Flavéole* (F). *Willow wagtail* (E).

طائر من ضواري لبنان، طوله نحو ١٧ سم. رأسه إلى الرمادي الأزرق الموج. ظهره أصفر أخضر. سقاطه وذنبه إلى الريدة البلقاء. عنقه أبيض. بطنه أصفر كبريتي منقاره ورجلاه سود. يألف المراعي والحقول المزروعة ويجاري الماء.

١٠٩٥١ - ذُعْرَة الْغَنَمِ *، ابرقصاده

Motacilla arcticapilla (S). *Bergeronnette à tête noire* (F).

طائر من الذعرة، يألف المراعي والحقول. يرافق الغنم والماعز. طوله نحو ٢٠ سم. رأسه أسود. ظهره أبيض أسمر. بطنه أبيض. سقاطه وذنبه بلق. أفنيكه أبيض.

١٠٩٥٢ - ذُعْرَة بَلَقَاء *، أم سَكْعَكْع، أم عَجَلَان

Motacilla alba (S). *Bergeronnette grise*, *Hoche-queue grise*, *Lavandière grise* (F). *White wagtail* (E).

طائر من القواطع لكنه من أوابد لبنان. طوله نحو ١٩ سم. قفنه وزوره وصدره إلى السواد الحلي. ظهره أبيض. جبهته وحسراه وبطنه أبيض. سقاطه وذنبه إلى السمرة البلقاء. أفنيكه أبيض. يألف الحقول المزروعة والمراعي ويجاري الماء.

١٠٩٥٣ - ذُعْرَة رَمْدَاء *، زِبْطَة، أم صُفْبْدَة

Motacilla cinerea, *M. sulphurea* (S). *Bergeronnette jaune*, *Hochequeue boarule*, *Lavandière jaune* (F).

طائر من القواطع، طوله نحو ٢٠ سم. ثوبه إلى الريدة السمراء يعلوه موج أصفر. عنقه وسقاطه سود. محسراه إلى الرمادي. بطنه إلى السمرة يعلوها موج كبريتي. يألف المناطق وضياف الأنهار.

١٠٩٥٤ - ذُعْرَة لَيْمُونِيَّة. *Budytes citreola* (S).

Bergeronnette citrine (F).

طائر من الذعرة. موطنها يمتد من الشرق الأوسط إلى أروبة

١٠٩٢٤ - ذُرْوِيَّة هي الكرفنة، اطلبها.

١٠٩٢٥ - ذُرْي. *Abri* (F). *Cover, Shelter* (E).

هو كل ما يتخذ من أدوات لوقاية النباتات المزروعة من الرياح أو الشمس أو الصقيع، الخ.

١٠٩٢٦ - ذُرْي

ذري الشاة: جز صوفها وترك فوق ظهرها شيئاً منه لتعرف به.

١٠٩٢٧ - ذُرْيَب. *Jaunâtre* (F). *Yellowish* (E).

هو الأصفر من الزهر وغيره.

١٠٩٢٨ - ذُرْيَبَة. *Cuspide* (F). *Cusp* (E).

الذرية الطرف المستطيل الذرب من الورقة وغيرها.

١٠٩٢٩ - ذُرْيَرَة. *Hemarthria* (S).

Hemarthrie (F).

جنس نباتات عشبية، برية، مرعوية، حولية من فصيلة النجيليات. أنواعها المعروفة قليلة العدد منبتها يمتد من الشرق الأدنى إلى الهند. سوقها متصببة، وحيدة أو شطية. أوراقها عصفية، مستطيلة، مسنة الحتار. أزهارها سنيلات شبه عكولية التجميع.

١٠٩٤٠ - ذُرْيَرَة، أُنُوم. *Atome* (F). *Atom* (E).

هي الجوهر الفرد. راجع ذرة.

١٠٩٤١ - ذُرْيَرَة هي الأروم الايطالي، اطلبه.

١٠٩٤٢ - ذُعَاع. *Interligne* (F).

Interlining, Space-line (E).

الذعاع هو الفاصل ما بين خطين من النبات ويدعى المسافة البينية.

١٠٩٤٣ - ذُعَاف، ذُعَاق. *Toxique* (F). *Toxic* (E).

نعت تعريبي يطلق على المواد السامة القاتلة من أي مصدر كانت.

١٠٩٤٤ - ذُعَافَة، ذُعُف. *Toxicité* (F).

Toxicity (E).

صفة الشيء السام.

١٠٩٤٥ - ذُعَافَة ٥. *Buphone* (S).

Buphone (F). *Buphone* (E).

الاسم العلمي من اليوناني بمعنى قاتل الثور. جنس نباتات عشبية دوفسية من فصيلة التريسيات. مهدها بعض مناطق افريقية الشرقية والجنوبية. أوراقها سنانية النصل الجامد. أزهارها صيواني التجميع. أزهارها شبه قمية الشكل. شراعيها ثنائية المصراع.

أنواعها المعروفة قليلة العدد، أشهرها التالية:

١٠٩٤٦ - ذُعَافَة سَامَة ٥. *Buphone toxicaria* (S).

Buphone toxique (F).

نوع من الذعاق. كانت تستعمل في تسميم حراب الزنوج. أوراقها مالة، مستطيلة، بحرية الخضار، طول نحو ٥٠ سم. أزهارها صيواني التجميع يرتكز على شراخ يرتفع نحو ٣٠ سم. أزهارها وردية اللون، عرقية الأريج طول نحو ٤ سم. تنويرها يستمر من أيلول إلى تشرين الأول.

التشذيب والتقليم التي لم تظهر ولم تخرج بالمستطك لان الفطر يدخل منها ويفعل فعله || لا علاج له حتى الآن رغم شدة اذاه لانه قليل الانتشار لا يوحى الاهتمام من قبل اصحاب الشأن .

١٠٩٦٣ - دُعْلِيَّات ° Valsacées (F). Valsaceae (E).

عمارة فطور مجهرية من فصيلة الحشاريات ورتبة الزقيات تتميز بونية مجنحة تحضن اصنافاً فردية الانتشار كثيفة التجميع || معظم انواعها من الفطور الرمية التي تعيش على المواد العضوية المنحلة . اشهر اجناسها الذعلب والذغيلة .

١٠٩٦٤ - دُعْلُوق * Cytinus hypocistis (S).

Cytinelle, Cytinet, Hypociste (F). Hypocist (E). Hypocist, Echte blutschuppe (D). Ipcisto, Mucchignero (I).

نبات عشبي طفيلي من فصيلة الذعلوقيات . مهدد حوض البحر المتوسط . اوراقه لحمية . ازهاره ثمانية الاسدية ، سداسية التلات . ثماره عنبية || يستخرج من ساقه المادة عصارة لزجة سمراء اللون تدخل في تركيب بعض المستحضرات الطبية .

١٠٩٦٥ - دُعْلُوق ° ، خَنْشَع ° Hypolais (S).

Hypolais (F). Warbler (E).

جنس طير من فصيلة الحشوريات . انواعه المعروفة قليلة العدد . تتميز باستطالة الاجنحة وقوة الارباع ودقة الاصابع . مناقيرها مستعرضة القاعدة ، ذلقة الطرف ، مسننة المحاطم العليا القليلة الاحديداب || اعطائها العالم القديم . تألف اطراف الغابات والحدائق والبساتين . قوتها الحشرات المجنحة وبعض الثمار اللينة . اعرف انواعه واشهرها الثلاثة التالية :

١٠٩٦٦ - دُعْلُوقَة الزَيْتُون ° ، خَنْشَع الزَيْتُون °

Hypolais olivorum (S). Hypolais des oliviers (F). Olive-tree warbler (E).

طائر من الذعاليق . اعطائه تمتد من الشرق الاوسط الى اروبة الجنوبية والغربية . يحجب بعض المناطق ويأيد في البعض الآخر . يألف الزوازين والخصاب المبعثرة الاشجار . قوته الحشرات المجنحة وبعض الثمار البرية || جسمه صغير القد يطول من ١٣ الى ١٤ سم . ثوبه منسجم الالوان القليلة التباين . ظهره الى الطحلة الخضراء الموح . بطنه الى الصفار الكبريتي الباهت . جناحه وذنبه وافنيكه الى السمرة الخنطية . رسفاه الى الربدة السمراء .

١٠٩٦٧ - دُعْلُوقَة الصَفَصَاف ° ، خَنْشَع

الصَفَصَاف ° Hypolais icterina (S).

Hypolais icterine, H. des saules, Rossignol bâtard, Contrefaisant (F). Icterine warbler (E).

طائر من الذعاليق الضواري يحجب معظم مناطق حوض البحر الابيض المتوسط . قوته الحشرات والثمار البرية وبعض انواع الكرز . يألف حراج السنديان وضفاف مجاري الماء حيث يكثر الصفصاف ولا يقترب من حراج الصنوبر ايما كان موقعها || جسمه صغير القد يطول نحو ١٣ سم . ظهره الى الربدة الخضراء . بطنه الى الصفار الباهت . قوادمه وافنيكه الى السمرة يطوقها اطوار اخضر . حدقة عينه كستنية اللون . متقاربه الى السمرة الخنطية . رسفاه الى الزرقة البحرية || يتميز بتروديد زقزقة كل طائر

الشرقية . تألف المراعي والحقول || جسمها معتدل القد . طولها نحو ٢١ سم . رأسها وصدرها وبطنها الى الصفار اليموني . ظهرها وسقطها وذنبها الى الربدة الرمضاء || قوتها الحشرات والموام .

١٠٩٥٥ - دُعْرِيَّات Motacillidae (S).

Motacillidés (F). Motacillidae (E).

فصيلة طيور من رتبة الجوائم المشرومات المناقير . اجناسها وانواعها عديدة . اجسامها صغيرة القد مشوقة ، رشيقة ، مستطيلة الذنب . مناقيرها دقيقة جالسة . عيونها كبيرة مكحلة . ارساغها طويلة || اشهر اجناسها الذعرة .

١٠٩٥٦ - دُعْفَانِي ° Toxicologiste (F).

Toxicologist (E).

الدعفاني من تعامل الذعفة اي علم خصائص السموم .

١٠٩٥٧ - دُعْفَنَة ° Toxicologie (F).

Toxicology (E).

الذعفة علم يبحث في خصائص السموم .

١٠٩٥٨ - دُعْلِب ° ، قَلَسَا ° Valsa

جنس فطور مجهرية من الذعلقيات . اعسانها قسم ضخام تقوم داخل ونية غليظة . بونغها مخروطي الشكل ثماني التجميع احادي الخلية || انواعه المؤذية الضارة اربعة وهي .

١٠٩٥٩ - دُعْلِب الخَوْخ °

Valsa (Eutypella) prunastri cytosporina (S).

فطر مجهري يركب الخوخ والدراق والمشمش . مظهره الخارجي يقع سمر بلسمية الشكل تركب افناد وافناد الاشجار الهرمة السقيمة فتستعجل دور قحامتها وتستبق زمن پياسها .

١٠٩٦٠ - دُعْلِب الكَرْز °

Valsa leucostoma, Leucostoma persoonii, Cytospora leucostoma, Cytospora nivea (S). Apoplexie des cerisiers, Maladie rhénane (F). Dieback of cherry (E). Baumsterben des steinobotes, Kirschbaums-sterben (D).

فطر مجهري يصيب الكرز فيؤذيه . مظهره الخارجي اصفرار يحل بنصل الاوراق فيسبب جفافها والتفافها ويباسها وسقوطها . وهو على السور والاعضان والافناد والافناد يقع عدسية الشكل كثيفة التجميع ينضج منها مادة صمغية . يكافح باقتلاع الاشجار الموصومة التي لا امل في نجاتها ويقطع وحق الاغصان المصابة ، حيث الامل بالنجاة لا يزال كبيراً ، وتطهير الجروح توف بعد الاقطاع بحلول سلفات الحديد او سلفات النحاس .

١٠٩٦١ - دُعْلِب المشْمِش ° Valsa cincta,

Leucostoma cincta, Cytospora cincta (S).

فطر مجهري يصيب اشجار المشمش الذاتية فيستعجل پياسها || مظهره الخارجي لا يختلف عن مظهر دُعْلِب الخوخ الا ان البقع فيه اقل عدداً وافصح قطراً واشد سمرة .

١٠٩٦٢ - دُعْلِب الهَمْْلُوش °

Eutypa lata, Phomopsis ribis (S).

فطر مجهري يصيب الهملوش فيسبب پياسها . مظهره الخارجي تجمش . يحل بافناد الشجرة فيمنعها عن النمو ثم يذبلها ويطوح بها . يشاهد مشيج الفطر في الاوعية الليفية والخشبية وبين اللحاء والشكير || تعذى الاصابة الى جروح



ذعلوق



ذغلوقَة الزيتون



ذغلوقَة الصفصاف

يسمعه . يدن في الشجيرات الوارفة الظل . انشاء تضع من ٤ الى ٥ بيضات ، وردية اللون مرقوشة بالاسمر ، تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٣ يوماً .

١٠٩٦٨ - دُعْلُوقة ثَرْثَارَة * ، خَشَع ثَرْثَار ٥

Hypolaïs polyglotta (S). Hypolaïs polyglotte (F).
Melodious warbler (E).

طائر من الذعاليق الاوابد . اعطانه تمتد من الشرق الاوسط الى اروية الجنوبية وافريقية الشمالية . يألف المصايب والجلال المتوسطة الارتفاع . يحوي الكروم وجنائن الاشجار المشجرة عند الصباح وقرب الغروب حيث تكثر الحشرات التي يرغب فيها || جسمه صغير القد يطول نحو ١٣ سم . ثوبه قريب الشبه بثوب دُعْلُوقة الصفصاف الا انه اقل اخضراراً واشد سمرة ، اما رسفاه فالى الطحلة السمره || يتميز بكثرة الزققة وبترديد تغاريد الطيور التي يسمعا || يدن عشه في الشجيرات القليلة الارتفاع . انشاء تضع من ٤ الى ٥ بيضات تبينة اللون مرقوشة بالاسمر والاحمر ، تحضنها نحو ١٣ يوماً بمناوبة الذكر .

١٠٩٦٩ - دُعْلُوقيات

Cytinae (S). Cytinées (F). Cytinae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها وانواعها قليلة العدد جميعها اعشاب طفيلية . اوراقها لحمية . ازهارها وحيدة او ثنائية المسكن || اشهر اجناسها الذعلوق .

١٠٩٧٠ - دُعْمَاط ٥

Scotophilus (S). Scotophile (F).
جنس حيوان من فصيلة الحفاشيات . انواعه قليلة العدد ، رؤوسها مستعرضة ، فراطيسها قصيرة مقطومة . آذانها متوسطة الكبر . آلسنها مستطيلة || اجسامها صغيرة ربة طوطا يراوح من ٧٠ الى ٨٠ مم . واذناتها من ٤٠ الى ٥٠ مم . اثوابها ترتكز على الخططي الاسمر يعلوها موج ذهبي او كستنائي او رمادي يختلف باختلاف الانواع . بطونها وخوافها الى الصفرة الداكنة || موطنها فسيح الارجاء يعم العالم القديم وامريكة واستراليا || طيارتها متوسط السرعة . مسرحها من النسق العائم الى الفجر العميق . تعيش ازواجاً او سباعيات قليلة العدد . تألف البيوت والمعابد والسقائف وتجاويف الاشجار واوقاب الصخور . قوتها الحشرات على اختلافها اخصها القرصة والنمل .

١٠٩٧١ - دُعْل ، غِش ، مَدَق ، فِرَلَاغَة (F).

Adulteration (E).

مزج الشيء او خلطه بمواد تنقص من فعاليته الموصوفة او من نسبة عناصره المقررة .

١٠٩٧٢ - دُعْفَاة ٥

Lepidosiren (S). Lépidosirène (F).

جنس اسماك نهريّة من مزدوجات التنفس وفصيلة الرحناشيات . انواعها المعروفة قليلة العدد منها افريقية تعيش في مستنقعات النيجر والستفال والنيل ومنها امريكية تعيش في مستنقعات الامازون || اجسامها شبه اسطوانية الشكل تطول من ٥٠ الى ٦٠ سم . حراشفها مستديرة . رؤوسها معتدلة القد ، صغيرة الاخطام القصيرة . عيونها صغيرة ماسحة . زعانفها الظهرية قليلة العرض قاطبة تتصل بالشرجية عند اطراف الاذيال . زعانفها الصدرية والحوضية تشبه العذبات المستطيلة . اثوابها . الى الربة الرصاصية تشته سميتها في الظهر وتحف في البطن || تعيش في الاسماك حتى البروض ، اي نحو ثمانية اشهر ثم تنغم في الغرين وتبقى على هذه

الحالة من الاستكثان الى ان تعود المياه فتفتر المستنقع || لحومها كاعنة الصنف قل من يرغب فيها .

١٠٩٧٣ - دُعْفَاة ٥

Brodiaea (S). Brodiée (F). Brodiaea (E).

جنس نباتات دوفسية سبروتية من فصيلة الزنبقيات قريبة الشبه بالجوثن . اوراقها ضيقة النصال المخددة . ازهارها بحيلة الشكل يكثر فيها اللون الازرق || تزرع للزينة حسن البيوت وفي الحدائق . ترغب في الاقربة القليلة الاندماج الوافرة المواد الغذائية من عضوية ومعديّة اخه الازوت .

انواعها المعروفة عديدة ، اشهرها التالية :

١٠٩٧٤ - دُعْفَاة حَمْرَاء * (S). Brodiaea coccinea

Brodiée rouge (F).

نوع من الدفالة . اوراقها خضراء اللون زيتية الموج . شراخها يرتفع نحو ٤٥ سم . ازهارها صيواني التجميع . ازهارها متدلّية تعد من ٥ الى ١٥ وتطول نحو ٤ سم . لونها من الخارج الى الحمرة الدامية ، ومن الداخل الى الخضار الاصفر || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

١٠٩٧٥ - دُعْفَاة رَشِيْقَة ٥

Brodiaea pulchella (S). Brodiée élégante (F).

نوع من الدفالة . اوراقها ضيقة النصال المخددة ، بحيلة الخضار الزاهي . شراخها يرتفع نحو ٣٠ سم . ازهارها صيواني التجميع . ازهارها متدلّية ، قصيرة الاهدن ، تعد من ٤ الى ٨ كونها الى الزققة البنفسجية الموج || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

١٠٩٧٦ - دُعْفَاة كَبِيرَة الزَهْر ٥

Brodiaea grandiflora (S).

Brodiée à grandes fleurs (F).

نوع من الدفالة . اوراقها ضيقة النصال المخددة الجميلة الخضار العابق . شراخها يرتفع من ٣٠ الى ٤٠ سم . ازهارها صيواني التجميع . ازهارها متدلّية ، كبيرة القد ، قطرها نحو ٤ سم . وعددها من ٧ الى ١٥ كونها الى الزققة البنفسجية اللامعة || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

١٠٩٧٧ - دُعْفَاة وَحِيدَة الزَهْرَة ٥

Brodiaea uniflora (S). Brodiée uniflore (F).

نوع من الدفالة . اوراقها ضيقة النصال المخددة ، بحرية الخضار ، تطول من ١٥ الى ٣٠ سم . وتعرض من ٥ الى ٨ مم . شراخها يعلو نحو ٣٥ سم . ازهارها صيواني . خيمتها الزهرية تتألف من زهرة واحدة طولها نحو ٤ سم . وقطرها نحو ٥ سم . كونها الى الزققة اليلكية الموج . عرفها مستحب الاربيع || تنويرها يكون بين اواخر نيسان واوائل ايار .

١٠٩٧٨ - دُفِر ٥

Sperme des ovins et caprins (F). Sperm of ovine and caprine (E).

هو شلخ الفحل من الفأن والمعرز .

١٠٩٧٩ - دُفِرَاء ٥

هي سذاب البر ، اطلبه .

١٠٩٨٠ - دُفِرَة ، كَلْبُومَة ، زُفِرَة (S) Cleome

Cléome (F). Spider flower (E). Kleome, Pillen-blume (D). Cleome (I).

جنس نباتات برية وزينية من سبط الدفريات وفصيلة



دُعْلُوقة ثَرْثَارَة



دُعْفَاة



دُعْفَاة حَمْرَاء



دُعْفَاة كَبِيرَة الزَهْر



دُعْفَاة وَحِيدَة الزَهْرَة

١٠٩٩٠ - ذُقَط

هو الذباب الصغير. ج ذقطن. والذقط: زبل الذباب.

١٠٩٩١ - ذَقْن البَاشَا هو ألبيزيا اللبخ، اطلبها.

١٠٩٩٢ - ذَقْن الحَيَّة *، لَحْيَة الحَيَّة

Ophiopogon (S). Ophiopogon (F). Snake's beard (E). Schlangenhbart (D). Ophiopogon (I).

جنس نباتات عشبية جذمورية معمرة من الزنبقيات، أوراقها متتابة تشب في الجذمور. أزهارها سنبلية التجميع يرتكز على شمراخ جذموري الانتشاح || أنواعه قليلة مهدها اليابان، أشهرها ما يلي.

١٠٩٩٣ - ذَقْن الحَيَّة الأزرق

Ophiopogon jaburan (S). Ophiopogon jaburan (F).

نوع من ذقن الحية مهدها اليابان أوراقه تطول من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. وتعرض نحو ١٢ مم. نصلها جميل الخضار تقطبه خطوط تنية. شمراخه الزهري يعلو من ١٥ إلى ٦٠ سم. أزهاره تطول من ٨ إلى ١٥ مم. لونها إلى البنفسجي الجميل || أزهاره يستمر طوال شهر تموز. ثماره عتية الشكل لونها إلى الزرق العابقة تدوم من آب إلى تشرين الثاني.

١٠٩٩٤ - ذَقْن الحَيَّة الفَيروزي

هو زنبق الفيروزج، اطلبه.

١٠٩٩٥ - ذَقْن الشَّيْخ *، شَيْبَة، رِيحَان أبيض

Artemisia arborescens (S). Armoise en arbre (F). Tree wormwood (E). Wermuthbäumchen (D). Assenzio arboreo, Erva bianca (I).

جنية معمرة برية وزينية من فصيلة المركبات الانجوبية الزهر. تملو من ٥٠ إلى ٣٠٠ سم. أوراقها ريشية مقلقة. أزهارها كبير الرؤيسات المستطيلة المعاليق. رؤيساتها تظهر متدللة نحو الارض ثم تلتصب مع العمر فتبدو كثيفة الزغب الاطحل الابيض || أزهارها يستمر من ايار الى حزيران.

١٠٩٩٦ - ذَقْن المعزَى اطلب عراوة حية التيس.

١٠٩٩٧ - ذَقِيْمَة ٥، نيموفيل ٥

Nemophila (S). Némophile (F). Nemophila (E).

الاسم العلمي من اليوناني بمعنى « نبات حرجي ». جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة الشجنيات. سوقها نحيلة قصيرة أو معتدلة الارتفاع. أوراقها مشرمة ثنائية الصنف، قدية الشكل أو فلقية. أزهارها مختلفة الألوان. أنواعها المعروفة عديدة، أشهرها التالية:

١٠٩٩٨ - ذَقِيْمَة مَبْدُولَة *

Nemophila insignis (S).

Némophile commune (F).

نوع من الذقمة. ساقها تملو من ٢٥ إلى ٣٠ سم. أوراقها سباعية أو تساعية الوريقات الاهليجية الشكل. نصلها مستلق الاطراف، مسننة الختار. أزهارها معتدلة الحجم، زرقاء اللون، مطوقة بالابيض. ضروبها الزراعية عديدة الألوان || تنويرها يستمر من حزيران الى آب.

الكبريات. انواعه نحو ١٠٠ معظمها من نباتات المناطق الحارة وبعضها مهد حوض البحر المتوسط. جميعها اشباح وجنات متعاقبة الاوراق المركبة البورية التجميع. أزهارها جميلة الشكل، مختلفة الألوان || أشهر انواعه التريينية ما يلي.

١٠٩٨١ - ذَفِرَة بَنْفَسَجِيَّة

Cleome pungens (S). Cléome violet, C. piquant (F).

جنية شائكة تملو من ٦٠ إلى ١٢٠ سم. ساقها خلية اللحاء، غدية، لزجة. أوراقها خماسية أو سباعية التركيب، نصلها مالمس البشرة. أزهارها بنفسجية اللون. أزهارها يستمر من تموز الى ايلول.

١٠٩٨٢ - ذَفِرَة شَائِكَة

Cleome spinosa (S). Cléome épineux (F).

جنية معمرة تملو من ٨٠ إلى ١٢٠ سم. ساقها شائكة. أوراقها خماسية أو سباعية التركيب. وريقاتها مالمسة. أزهارها بيض || أزهارها يستمر نحو ٩ اسابيع ابتداء من اوائل حزيران.

١٠٩٨٣ - ذَفِرَة عَرَبِيَّة، أم رُمَيْل

Cleome arabica (S). Cléome d'Arabie (F).

جنية معمرة تملو من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. ساقها زباء، غدية، لزجة. أوراقها ثلاثية التركيب. وريقاتها مستطيلة. أزهارها سداسية الاسدية. بتلاتها بيض. بزورها صوفية. أزهارها ربيعي، ترطب في الاتربة الرملية.

١٠٩٨٤ - ذَفِرَة وَرْدِيَّة

Cleome rosea (S). Cléome rose (F).

جنية محولة تملو من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. ساقها مرطاء اللحاء. أوراقها الوسطى خماسية التركيب أما السفلى والعليا فتلاثية. أزهارها وردية اللون || أزهارها يدوم شهراً واحداً وذلك في حزيران.

١٠٩٨٥ - ذَفِرِيَّات، زَفِرِيَّات

Cléomées (F). سيط من الكبريات. اجناسه وانواعه عديدة جميعها جنات واعشاب معمرة أو حولية. أوراقها مركبة وزية التجميع، وريقاتها اصعية. أزهارها رباعية الفصلات والبتلات، شفعية الاسدية الرباعية أو السداسية. ثمارها خرنوبية الشكل جافة البزور.

١٠٩٨٦ - ذُقَط ذفل الطائر اثناء: سفدها.

١٠٩٨٧ - ذَفْل، ذَقْل

Goudron (F). Tar (E). هو القطران الرقيق.

١٠٩٨٨ - ذَقِيْف

Hérissan (mâle) (F). Hedgehog (male) (E). هو ذكر القنافة.

١٠٩٨٩ - ذَقَالَة *

Acalles (S). Acalie (F).

جنس حشرات دامتة من غديات الاجنحة وفصيلة السوسيات. انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اصقاع العالم القديم. تألف الغابات والاحراج والمراعي الطبيعية. تعيش تحت الجشاة. قوتها المواد النباتية المنحلة || اجسامها صغيرة القد، شبه بيضية الشكل، تطول من ٢ إلى ٦ مم. اخطامها ثاقبة. قرونها الاستشعارية مرفقية الشكل، صقية الاطراف. اغمارها محززة، اثوابها متباينة الألوان الداكنة يكثر فيها الجوزي.



ذَقَالَة



ذَقْن الحَيَّة



ذَقْن الشَّيْخ



ذَقِيْمَة مَبْدُولَة

١٠٩٩٩ - ذِئْبَةُ مُطَخَّة ٥

Nemophila maculata (S).
Némophile maculée (F).

نوع من الذئبة . ساقها خلية اللحاء تعلو من ١٥ الى ٢٠ سم . أوراقها متقابلة ، سباعية او تساعية الفلق ، تطول نحو ٨ سم . نصالها خلية البشرة . ازهارها كبيرة القد قطرها نحو ٤ سم . لونها الى البياض الناصع تعلو في طرف كل يتلة لطخة بنفسجية عابقة || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

١١٠٠٠ - ذِئْبَةُ مُنْقَطَعَة ٥

Nemophila atomaria (S).
Némophile ponctuée (F).

نوع من الذئبة . ساقها تعلو من ١٥ الى ٢٠ سم . أوراقها خاسية او سباعية الفلق . نصالها شبه بيضية الشكل ، مهدبة الخشار . ازهارها صغيرة القد ، بيضاء اللون ، يعلوها تنقيط اسود . ضرورها التريينية عديدة || تنويرها يستمر من حزيران الى آب .

١١٠٠١ - ذُكَّار ، تَيْسَن بَرِّي ٥

Caprificus (S).
Caprifiguler, Figuier sauvage (F). *Wild fig* (E).
Wilder feigenbaum (D). *Caprifico* (I).

كانوا يعتبرونه ذكر التين المحصب وهو نوع من التين البري المجمع الكثير الفروع ، يعيش بين الصخور وفي البراري القاحلة .

١١٠٠٢ - ذُكَّار ٥

Androgène (F).
Androgenic (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما من شأنه الحث على انتاج الذكور .

١١٠٠٣ - ذُكَّار التين ٥

Blastophaga psenes (S).
Blastophage des figues (F).

حشرة من الغوانيات ورتبة غشائيات الاجنحة المحصورة . تعمل على تأخير زهر التين فإخصابه وذلك بنقلها للويج من زهر التين البري الذكري الى المزدرع الانثوي || الانثى مجنحة سوداء اللون تطول نحو ١ سم . الذكر عديم الجناح ، اصفر اللون ، مستطيل الطنايب الامامية والخلفية ، مقوس البطن ، يطول نحو ١ سم .

١١٠٠٤ - ذُكَّارَة ٥

Androgénese.
Androgénie (F). *Androgeny* (E).

الذكارة تعاقب الذكور . وهي ايضا عملية تجريبية صار اختبارها على بعض الحيوانات الدنيا فكانت نتائجها ايجابية .

١١٠٠٥ - ذُكَّارَة الذكارة : حمل النخل .

١١٠٠٦ - ذِكْرُونَة زَرْقَاء ٥

Zicrona coerulea (S). *Zicrone bleue* (F).

حشرة ناهمة من فصيلة الفاسيائيات . جسمها صغير القد ، مفلطح الجرم ، شبه بيضي الشكل ، بطول نحو ٨ مم . || ثوبها الى الزرقة البنفسجية المواج . رأسها مخروطي مقطوم . خطمها معتدل الطول . عينها صغيرتان بارزتان . زبانها مستطيلان . حنجرتها مجذع بالاسود . حنجرتها تتقدم طرف الحنجر . قوائمها الى الزرقة السمراء || مسرحها

البراري والكروم والمباقل . تقضي على معظم انواع القدان والعذفوط والكرنبيات وعلى يرقات خنافس البطاطا || رائحتها كريهة .

١١٠٠٧ - ذُكْرُونَة ، ذُكْبَة ٥

Combustible

كل مادة محترقة تستعمل لتوليد الحرارة .

١١٠٠٨ - ذُكُور البقل ٥

ما غلظ منه ضارباً الى المرارة وهي خلاف الاحرار التي تؤكل || ارض مذكور : تنبت ذكُور البقل .

١١٠٠٩ - ذُلَّاح اللبن المزوج بالماء .

١١٠١٠ - ذَلَّاحَة جَنْوَبِيَّة ٥

Corixa meridionalis (S). *Corixe méridionale* (F).

حشرة مائية من فصيلة الدلاخيات . جسمها صغير القد ، يطول نحو ٦ سم . رأسها مزواني ، مبسط ، اصفر اللون صنابي المواج ، مخطط بالبني . خطمها قصير ملحوف . عينها كبيرتان . كوسلها قصير ، بني اللون . حنجرتها شديدة الصغر . ظهراتها غضروفي المادة كامل الخنجية ، لاحف ، بني اللون . بطنها الى الخنطي الاسمر . قوائمها نشيطة مجهزة للسباحة || يوجد منها في مستنقعات البقاع ، خاصة في عميق .

١١٠١١ - ذَلَّاحِيَّات ٥

Corisidae, Corixidae (S). *Corisidés, Corixidés* (F). *Corisidae, Corixidae* (E).

فصيلة حشرات مائية من رتبة مختلفات الاجنحة وطبقة نصفيات الجناح . اجناسها وانواعها كثيرة العدد منتشرة في جميع اقطار العالم اخصها المناطق الباردة || اجسامها لاقياسية القد . رؤوسها مستعرضة . اخطامها قصيرة . قرونها الاستشعارية رباعية الفصل . كواسلها لانظامية . اجنحتها كاملة الحناجب . رواشها غشائية شفافة . قوائمها معدة للسباحة || اناثها تسره المكن على النباتات المغورة فيلتصق بها ويبقى لاصقاً حتى النقف || تعيش في المياه الراكدة . قوتها المواد النباتية والمضوية المنحلة وبعض الكلويينات الدنيا اخصها قليلات الهلب .

١١٠١٢ - ذَلَّاف ٥

Penaeus (S).

Pénée (F). *Penaeus* (E).

جنس حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الارجل طوال الذيل وفصيلة الدلائيات . انواعه المعروفة متوسطة العدد اعطانها بحار البلاد الاستوائية والحارة ومنها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط || اجسامها كبيرة القد جميلة الالوان القسطنطينية . تتميز بمتكها المنشارية التفليج || لحمها مأكولة فاخرة الصنف .

١١٠١٣ - ذَلَّافِيَّات ٥

Peneidae (S).

Pénéidés (F). *Peneidae* (E).

فصيلة حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الارجل طوال الذيل . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد اعطانها بحار المناطق الاستوائية والحارة || اجسامها مستطيلة الشكل ، متوسطة القد او صغيرة ، محجنة المؤخر ، جميلة الالوان القسطنطينية الزاهرة || اعرف اجناسها واشهرها الدلاف والجنادة .



ذَلَّاف

١١٣١ - ذَنَابَةُ حَقِيرَةٍ *

Stenocranus minutus (S). *Stenocrane fluat* (F).
حشرة من فصيلة الدلفاسيات ورتبة متجانسات الاجنحة .
جسمها صغير القد يطول من ٥ الى ٦ مم . || ثوبها الى
الحنطي الاصفر يعلو تمشيح اسمر . ظهرها قسطاني
اللون ، اسمر العروق النشرة ، اسود الخثار في زامه الاخير .
رأسها ناشز الياقوخ الذي يبدو كالقرن المقطوم . خطمها
معتدل الطول . عيناها صغيرتان . زبانها مستغلفا الفصل
الاولى والثانية . كوسلها معتدل الحجم . حنفتها كبيرة
محسمة . ظهرها كامل الحنجبة ، شارف . روثناها
غشائيان ، شفافان . بطنها معتدل الجرم والتبليط ||
قوائمها نشيطة . الزوج الخلفي مجهز بمنخنخ حاد ||
مسرحتها الغابات وكل موقع تكثر فيه الاعشاب البرية .

١١٣٢ - ذَنَابِي

Queue d'oiseau (F).
Tail of bird (E).
الذناي : ذنب الطائر او منبت ذنبه . ويقال ذنب الفرس
وذناي الطائر || وفي جناح الطائر اربع ذناي بعد
الحوافي .

١١٣٣ - ذَنَانُ الخيل ، جَفِيلُ الخيل ، سَرَّاجَةٌ

Lymphangitis epizootica (S). *Lymphangite épizootique*, *Farcin cryptococcique* (F).
مرض وخيم يصيب الخيل في اوعيتها اللفافوية فيؤذيها ان
لم يتدارك ويعالج بالسرعة اللازمة .

١١٣٤ - ذَنَبٌ ، ذَيْلٌ

Queue (F). *Tail* (E).
عضو من اعضاء الجسم الحيواني موقعه في العقب اي المؤخر .

١١٣٥ - ذَنَبٌ

Apparier (F). *To pair* (E).
ذنب الجراد والفراس اذا اراد التعاظم .

١١٣٦ - ذَنَبٌ

Térébrer, Déposer (F).
To deposit (E).
ذنبت الجرادة : غرزت اشترتها في التربة لرز السرة .

١١٣٧ - ذَنَبُ الأَيْلِ هو الجريس الأعجم ، اطلبه .

١١٣٨ - ذَنَبُ الثَّعْلَبِ ، ثَعْلَبِيَّةُ المُرُوجِ ، سُبَيْلَةٌ

Alopecurus pratensis (S). *Alopecure*, *Vulpin des près*, *Queue de renard* (F). *Meadow foxtail grass* (E).
Weisenfuchsschwanz, *Falsches kanariengras* (D).
Coda di volpe, *C. di topo*, *Codolino dei prati* (I).
نبات عشبي بري كلابي من النجيليات يكثر في المراعي
وفي الاراضي المروية . ازهاره يشبه ذنب الثعلب وهو
طرفي الارتكاز ، اسطواني التجميع ، متراكب السبلات
الدقيقة الكثيفة .

١١٣٩ - ذَنَبُ الجَدْيِ

Deneb Algedi (F).
Deneb Algedi (E).
ذنب الجددي نجمان نيران مركزهما على ذنب الجددي . رابع
برج الجددي .

١١٤٠ - ذَنَبُ الحِدَاةِ

هو السرخس الخزفي من النباتات الطبية ، اطلبه .

١١٤١ - ذَنَبُ الحِرْدُونِ * ، ذَنَبُ الحِرْدُونِ

Saururus (S).
Saurure (F). *Lizard's tail* (E).
هو الصروة نبات عشبي بري طيب دقيق الاصل كثير

الفروع ، مر الطعم ، يسكن المغص ويقطع الدم .
عصارته تقلع البياض تقطيراً .

١١٤٢ - ذَنَبُ الخَيْلِ هو الاسوخ ، اطلبه .

١١٤٣ - ذَنَبُ الدِّلْفَيْنِ

Deneb
ذنب الدلفين ويسمى عمود الصليب نجم نير من كوكبة
الدلفين .

١١٤٤ - ذَنَبُ السَّبْعِ *

Cirsium rhizocephalum (S). *Cirse*, *Cnicus* (F). *Horse chistle* (E). *Kratzdistel* (D). *Cirsio* (I).

نبات عشبي بري طيب من القصوران وفصيلة المركبات .
ساقه مثلكة الزوايا تستدير كلها ارتفعت . تعلو من ٦٠
الى ١٢٠ سم . اوراقه مهدبة النصل يحف بها الشوك .
يقال انه ترياق الورم وعصارته تشد الاجفان المسترخية ،
ويستعمل ضماداً ولصوقاً على الاورام والمفاصل فيسكن
الها .

١١٤٥ - ذَنَبُ الضَّبِّ هو الصروة ، اطلبها .

١١٤٦ - ذَنَبُ الْعُقَابِ

Deneb
ذنب العقاب او ذنب العقاب الطائر نجم نير من كوكبة
العقاب مركزه في الذنب بالقرب من أنور الظليمن .

١١٤٧ - ذَنَبُ الْعَقْرَبِ هو العقرية ، اطلبها .

١١٤٨ - ذَنَبُ الفَّارِ *

Myosurus minimus (S).
Myosure nain, *Ratoncule*, *Queue de souris* (F).
Blood strange, *Mouse-tail* (E). *Kleines mäueschwän- zchen* (D). *Coda di sorcio* (I).

نبات عشبي بري من فصيلة الشقاريات يعلو نحو ١٥ سم .
اوراقه ضيقة النصل خطية . ازهاره فردية هامية ، لونها
الى الصفرة الخضراء . تحتها مستطيل الشكل يشبه ذنب
الفار .

١١٤٩ - ذَنَبُ الفَّرَسِ

هو الاسوخ الشثوي ، اطلبه .

١١٥٠ - ذَنَبُ القِطِّ ، كَرِيرُوكُومِه

Chrysocoma (S). *Chrysocome* (F). *Goldyllocks* (E).
Goldhaar (D). *Chrysocoma*, *Chiomadora* (I).

جنس نباتات برية وتزيينية معمرة من فصيلة المركبات
الاسطريات . انواعه عديدة جميعها جنبات صغيرة ومتوسطة
القد . سوقها مخشوشة تعلو من ٣٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها
متعاقبة ، خيطية ، كثيرة العدد تطول نحو ٢٠ سم . وتعرض
١ مم . رؤسائها الزهرية تجمع من ٨٠ الى ١٥٠ زهرة ،
لونها الى الصفرة على اختلاف ماجاتها || ازهارها يستمر
من ايار الى تموز .

١١٥١ - ذَنَبُ قَيْطَسِ الجنوبي

Deneb Kaitos
ذنب قيطس الجنوبي ويدعى الضفدع الثاني ، نجوم نيرة
من كوكبة قيطس مركزها على الشعبة الجنوبية .

١١٥٢ - ذَنَبُ قَيْطَسِ الشمالي

Dheneb
ذنب قيطس الشمالي نجم نير من كوكبة قيطس مركزه على
الشعبة الشمالية من الذنب .



ذنب الثعلب



ذنب الحردون



ذنب السبع



ذنب الفار

١١٠٦١ - ذُبَان عَصَلِيّ

Eremurus robustus (S). *Erémure robuste*, Nez de Cléopâtre (F).
نوع من الذببان أوراقه خيطية نصلها مالمس البشرة بحري اللون ، يطول من ٦٠ الى ١٠٠ سم . شراخه الزهري يعلو من ٢٥٠ الى ٣٠٠ سم . سنبلة كبيرة القد متوسطة الكثافة . أزهاره وردية اللون الشاحب .

١١٠٦٢ - ذُبَان كُرُولُكُوف

Eremurus korolkowi (S). *Erémure de Korolkow* (F).
نوع من الذببان أوراقه خيطية مستطيلة . شراخه الزهري يعلو من ١٠٠ الى ١٢٠ سم . سنبلة قليلة الكثافة . أزهاره وردية اللون يعلوها موج احمر .

١١٠٦٣ - ذُبَاب

Buffe (F). *Buffalo* (E).
هو الجاموس ، اطلبه .

١١٠٦٤ - ذُبَابِي

Caudal
نعت تعريبي يطلق على كل ما له علاقة بذنب الحيوان .

١١٠٦٥ - ذُبُون * ، ذُبُونُ الْجَن

Cistanchus
جنس نباتات طفيلية من فصيلة الجعفيليات . مهددا المناطق الحارة من البلاد الاسيوية والاروية والافريقية . انواعه قليلة متشابهة يفرقها لون الازهار الذي يغلب فيه الاصفر والاحمر والبفسجي .

١١٠٦٦ - ذُبَان * ، *Edelweiss* (F).

Leontopodium (S).
الاسم العلمي من اليوناني بمعنى رجل الاسد الصغيرة . جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المركبات . سوقها وأوراقها وأزهارها زغبية البشرة نديتها . أوراقها الجلدية كبيرة القد . أزهارها رؤسي صغير الحجم || اعرف انواعه الخمسة التالية .

١١٠٦٧ - ذُبَان أَصْفَر

Leontopodium leontopodium (S). *Edelweiss jaune* (F).
نوع من الذببان موطنه الشرق الاوسط . يعلو نحو ٣٠ سم . أوراقه الجلدية العلوية لاطئة الانتشاب خلية البشرة . أزهاره مركب من ١٠ الى ١٥ رؤسة قطر الواحدة نحو ٦ سم .

١١٠٦٨ - ذُبَان جَبَلِي ، رَجُلُ الْأَسَد

Leontopodium alpinum (S). *Edelweiss alpin*, Pied de lion (F). *Edelweiss*, Lion's-foot, Live-ever (E). *Echtes edelweiss* (D). *Leontopodio*, Piè di leone (I).
نوع من الذببان موطنه الشرق الاوسط واروبة . يعلو من ١٠ الى ٤٠ سم . أوراقه كثيفة التجميع ، نصلها ابيض خل الصفحة العليا ، أربد السفلى . أزهاره مركب من ٨ الى ١٢ رؤسة . قطر الواحدة نحو ٦ سم .

١١٠٦٩ - ذُبَان حَمَلَايَا

Leontopodium himalayana (S). *Edelweiss de l'Himalaya* (F).
نوع من الذببان اعطاه بعض مناطق حملايا والتبت ، يعلو من ١٥ الى ٢٥ سم . أوراقه الجلدية نحو ١٠ ، نصلها مستعرضة واطئة تفر الساق . أزهاره مركب من ٣ الى ١٠ رؤسات قطر الواحدة منها نحو ٧ سم .

١١٠٧٠ - ذُبَان سيبيري

Leontopodium sibiricum (S). *Edelweiss de Sibérie* (F).
نوع من الذببان موطنه سيبيرية ومنشورية . يعلو من ٣٠

١١٠٥٣ - ذُبَاب ٥

Caelops (S). *Caelops* (F).
جنس حيوان وحيد النوع من الماشيات . يتميز بزوائده المنخرية الورقية التركيب ، النضوية الشكل ، المفصصة المتدلية . جسمه صغير القد طوله نحو ٧ سم . بسطته ٢٦ . جلده رمادي اللون ، شعره اشقر || موطنه بلاد فارس والهند وجاوا . يألف الكهوف والمقاو . يعيش جماعات قليلة العدد . منفرجة من الفسق الى فحمة الليل . قوة الحشرات والدويبات والحسوم .

١١٠٥٤ - ذُبَان * ، ذُبَابِي ، أُمُور

Eremurus (S). *Erémure* (F).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الزنبقيات . انواعه نحو ١٥ معظمها تزييني وبعضها بري . جميعها كبيرة القد ، جماتها لحمية ، أوراقها قرصية التجميع مستطيلة النصل الضيق . أزهارها سنبلية ترتكز على شراخ عني مستطيل . اشهر انواعه التزيينية ما يتبع .

١١٠٥٥ - ذُبَان إَلْوَيْس

Eremurus alwesii (S). *Erémure d'Elwes* (F).
نوع من الذببان أوراقه عصفية سنانية لونها الى الخضار الباهت . شراخه الزهري يعلو نحو ٣٠٠ سم . سنبلة كبيرة القد تبلغ نحو ١٠٠ سم . أزهاره وردية اللون .

١١٠٥٦ - ذُبَان بُرْتُقَالِي

Eremurus aurantiacus (S). *Erémure orangé* (F).
نوع من الذببان أوراقه حنطية تطول نحو ٣٠ سم . وتعرض من ٦ الى ١٠ سم . شراخه الزهري يعلو نحو ٥٠ سم . سنبلة متوسطة الكثافة تطول نحو ١٥ سم . قطرها نحو ٤ . أزهاره الى الصفرة البرتقالية .

١١٠٥٧ - ذُبَان بُنْجِي

Eremurus bungei (S). *Erémure de Bunge* (F).
نوع من الذببان أوراقه حنطية ضمية تطول نحو ٣٠ سم . وتعرض من ٥ الى ٨ سم . شراخه الزهري يعلو نحو ٤٠ سم . سنبلة كثيفة لبدة تطول نحو ١٢ سم . أزهاره الى الصفار الزاهي .

١١٠٥٨ - ذُبَان بَهِيّ

Eremurus spectabilis (S). *Erémure élégant* (F).
نوع من الذببان أوراقه قدية الشكل شراكية تطول من ٣٠ الى ٤٥ سم . نصلها جامد الاطراف لونه الى الخضار الازرق . شراخه الزهري يعلو نحو ٧٠ سم . سنبلة متوسطة الكثافة . أزهاره نجمية الشكل ، لونها الى الصفرة الكبريتية .

١١٠٥٩ - ذُبَان تَرْكِسْتَانِي

Eremurus turkestanicus (S). *Erémure du Turkestan* (F).
نوع من الذببان أوراقه هدية لونها الى الخضار البحري . شراخه الزهري يعلو من ١٢٠ الى ١٥٠ سم . سنبلة مستطيلة كثيفة الزهر . أزهاره الى الجؤوة يحوق تبالتها اطار ابيض .

١١٠٦٠ - ذُبَان حَمَلَايَا


Eremurus himalaicus (S). *Erémure de l'Himalaya* (F).
نوع من الذببان أوراقه ملساء مدببة العقصة تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم . شراخه الزهري يعلو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم . سنبلة كثيفة التجميع . أزهاره كالنجوم لونها الى الالبيض .



ذُبَان



ذُبَان كُرُولُكُوف



ذُبُون



ذُبَان

على المنكب الايسر يدعى « العيوق » ورقب الثريا ، والذي على المرفق الايسر « العنز » . والاثنين اللذين على المعصم الايسر « الجديين » . ويسمى الذي على المنكب الايمن والاثنان اللذان على الكمين « توابع العيوق » .

١١٠٨١ - ذُو الرُّمَيْحِ

هو اليربوع ذو رميح ، اطلبه . سمي هكذا نسبة الى ذنبه الذي يشبه الرمح . وهو طويل الرجلين في وسط كل وظيف من أوظفته فضل ظفر .

١١٠٨٢ - ذُو جَنَاحَيْنِ (F). Bipennate (E). Bipenne (F). هو من الحيوان من كان له جناحان .

١١٠٨٣ - ذُو رِجْلَيْنِ (F). Bipède (F). Biped (E). نعت تعريفي يطلق على كل حيوان له رجلان او يسير على رجلين .

١١٠٨٤ - ذُو صَفَيْنِ (F). Distichous (E). Distique (F). نعت وصفي يطلق على الازهار والاوراق والسنبيلات القائمة على صفين متقابلين .

١١٠٨٥ - ذُو قَصَيْنِ (F). Didymous (E). Didyme (F). نعت تعريفي يطلق على كل عضو نباتي او حيواني ثنائي الاجزاء الفصية الشكل .

١١٠٨٦ - ذُو مَنَقَارَيْنِ (F). Birostré (F). Birostrated (E). من كان مجهزاً بمنقارين .

١١٠٨٧ - ذُوَابَةٌ (F). Chevelure de Bérénice (F). Coma Berenices (E).

الذؤابة كوكبة نجوم شمالية الموقع مركزها بين العواء والاسد . نجوميها الواضحة عشرة منها تسعة مزدوجة ونجم واحد مثلث .

١١٠٨٨ - ذَوَات الجَنَاحَيْنِ (S). Diptera (S). Diptères (F). Diptera (E).

رتبة حشرات تنتمي الى طبقة سدنيات الجناح فشعبة الخراطيط فطائفة المنحنيات اصلاً | فصائلها واجناسها وانواعها تعد بعض مئات الالوف . جميعها من الحشرات الثامة التطور . خطمها ثاقب لاقع او ماص . تحمل زوجاً من الاجنحة الكاملة ولها زوج آخر صغير القد يدعى رقاص التوازن . ارساغها خاسية المعقل | قوتها رحيق ازهور وبعضها يتغذى على المواد العضوية ومنها الدامية التي تمتص دم الحيوانات الفقيرة دون الاسماك | يرقاتها صغيرة دودية الشكل ، غبراء اللون ، منها المفترسة ومنها المتطفلة ومنها التي تعيش على المواد العضوية المختمرة القالفة . كزودها برميكية الشكل قليلة الحركة او عديمتها تسترها غشاوة خاوية وبعضها عار لا ستر له | اشهر فصائلها : البعوضيات ، الخرشيات ، الذبابيات ، السرفيديات ، الشعراويات ، الشوشيات ، الضفديات ، الطيثاريات ، العنتريات ، القدوحيات ، القرمسيات ، اللافحات ، النبريات ، النعريات ، الهفيات ، الهبيجات ، والتقيريات .

١١٠٨٩ - ذَوَات الخُفِّ (F). Tylopodes (F).

فئة من الحيوان تشمل الجمل واللامة والنعام . تتميز بمناسمها المستعرضة المحدبة الكائبة وبصغر اظلافها الشبيهة بالخالب الغليظة العادمة التحجيج .

١١٠٩٠ - ذَوَات الرِّجَمَيْنِ

رتبة حيوانات تعرف بالجراريات ، راجعها .

الى ٤٥ سم . ساقه غليظة قوية . اوراقه الجذبية نحو ٣٠ جميعها لاطئة تطول نحو ٢٥ سم . ازهاره مركب من نحو ٣٠ رويضة . قطر الواحدة نحو ٥ مم .

١١٠٧١ - ذُبْيَان يَابَانِي *

Leontopodium japonicum (S). Edelweiss du Japon (F).

نوع من الذببان موطنه اليابان والصين . يملو نحو ٥٠ سم . ساقه ليفية كثيفة الورق . اوراقه الجلعية لاطئة ، تصلها لامع بشرة الصفحة العليا . ازهاره مركب من ٦ الى ٨ رويسات قطر الواحدة منها نحو ٤ مم .

١١٠٧٢ - ذُبْيَاب (F). Pétiole (E). Pétiole (F).

هو العلاقة ، جزء دقيق من ضلع الورقة يوصل النصل بالقصيب ويؤمن له النسخ .

١١٠٧٣ - ذُبْيَخَةٌ *

Anthostomella pullulans, Aureobasidium pullulans, Dematium pullulans, Aureobasidium vitis, Exobasidium vitis, Pullularia pullulans (S). Anthostomella (F).

فطر مجهرى يصيب عدة نباتات اخضها الكرمة والدراق واللوز والحوخ وبعض الاشجار الحرجية | يركب اوراق النباتات المصابة بالمثان والمجمعات . مظهره الخارجي بقع صغيرة حنطية اللون تتخلل بقع الفطور الاخرى فتسبب جفاف النسج المتحار ثم الاعبال الباكر | اضراره محدودة لا توجب المكافحة .

١١٠٧٤ - ذُبْيَيْن ٥ (F). Sperme des ruminants (F).

Sperm of ruminants (E). هو افراز الغدد التناسلية الذكرية عند المجترات كالبقر والغنم والماعز والابل .

١١٠٧٥ - ذَهَب (F). Gold (E). Or (F).

هو التبر وقد يؤث . معدن نفيس عرفه الانسان من قديم الزمان لونه الى صفرة الشمس يشحب اذا مزج بالفضة ويحمر اذا مزج بالنحاس . لا يتأثر بالماء والهواء والحوامض والقلويات | رمزه (Au - ذ) وزنه الاتومي ١٩٧,٢ ثقله النوعي ١٩,٣ وهو كثير الليونة قابل التمديد والتصفيج . ينصهر في ١٠٨٤ °سغ . ويغلي في ٢٥٣٠ °سغ . يوجد في الطبيعة مختللاً بالصخور على شكل عروق فيستخلص بالسحق والطحن والفصل . او راسباً في قاع بعض الانهار الجارية او الجافة . اشهر مناجمه في جنوب افريقية وروسية وكندا والولايات المتحدة واستراليا والمكسيك واليابان والهند .

١١٠٧٦ - ذَهَب أَبْيَض (F). هو البلاتين ، اطلبه .

١١٠٧٧ - ذَهَب الشَّمْسِ (F). هي الحالة القنابية ، اطلبها .

١١٠٧٨ - ذُهْلُول

الذحلول من الخيل : الجواد الدقيق الاصيل .

١١٠٧٩ - ذُو إصْبَعَيْنِ (F). Didactyle (F). Didactyl (E).


هو من الحيوان من كان له اصبعان .

١١٠٨٠ - ذُو الأَعْنَةِ ، مُنْسِكُ الأَعْنَةِ ، عَنَاز (F). le Cocher, Phaéton (F).

Auriga, the Charioteer, the Waggoner (E). ذو الأعنة ومنسك الأعنة وعناز ثلاثة أسماء لكوكبة نجوم شمالية الموقع مركزها بين الدب الاكبر وبرج الثور . عدد نجومها ٦٦ منها ٢٤ مزدوجة ومثلثة | الكواكب الموجودة في وسط الصورة تدعى « الخباء » . والنير الذي



ذُبْيَان يَابَانِي



ذُبْيَخَةٌ

١١١٠٠ - ذَوْبَل الكَشْمِش *^٥

Pseudopeziza ribis, Gloeosporidiella ribis, Gloeosporium ribis, G. curvatum (S). Anthracnose du groseillier, *Gleosporiose du groseillier* (F). Leaf spot (E). Blattfallkrankheit der Stachelund Johannisbeere (D).

فطر مجهرى يصيب الكشمش على اختلاف أنواعه فيذبل الأوراق ويقضي على الثمار || مظهره الخارجي بقع صغيرة قطرها نحو ملليمتر لونها البنية المحورة نقطة بيضاء، تركيب النصل وتوسمه ابتداء من أيار فتسبب يباس نسجه ثم الاعمال الباكر. و تركيب الأمن فتعرقل الدورة الغذائية فتضمحل الثمار وتذوى || يكافح أولا في زمن الرقاد وذلك في الشتاء حيث تنضج الاشجار بأحد المركبات السلفوكلسية المركزة نحو ١٠٪ ثم تنضج عند الاكاح بذات المركبات المركزة ٢٠٪ وتنضج بعد الايقاق في فترة الازهار، بسائل بوردو المحلول ١٪

١١١٠١ - ذَوْبَل النَفَل *^٥

Pseudopeziza trifolii (S). Anthracnose du trèfle (F). فطر مجهرى يركب أوراق النفل على صفحاتها العليا فيعطها ويذويها || مظهره الخارجي بقع صغيرة مستديرة صفراء اللون ثم حنطية تركيب نصل الأوراق فتعطب وتسبب يباسه || يكافح باحتشاش النفل الموصوم حتى ولو كان قبل أوانه.

١١١٠٢ - ذَوْرَة

Jabot (F). Crop (E). مقدم حوصلة الطائر يحمل فيها الماء، ج ذور

١١١٠٣ - ذَوْطَة *^٥

Thomisus (S). Thomise (F). نوع من العنكبوت صغيرة الجثة صفراء الظهر. الذكر منها يطول نحو ٦ مم. والانثى ١٠ مم. || يكثر وجودها على الازهار تكمن وترقب قدوم الحشرات اللاصقة فتشقص عليها وتفترسها. ج أدواط.

١١١٠٤ - ذَوْطَة الازهار *^٥، عَنكَبُوت سَلَطَعُونِي

Thomisus onustus, T. abbreviatus (S). Thomise chargé, Araignée crabe (F). Crab-Spider (E).

نوع من العناكب القانصة ثنائيات الروايا، سداسيات المشاقن، تنتمي الى فصيلة الذوطيات || جسمها صغير القد يطول نحو ٤ مم. عند الذكر ونحو ١٠ مم. عند الانثى. صدراسها صغير الجرم، مقطوم الطرف، احمر اللون عند الذكر، اصفره عند الانثى. عيناها زُجْمِيَّتان.

شيفها صغيران ذريان. فكها مستدقان قصيران.

جرامزها الامامية نشيطة مستطيلة، جرامزها الخلفية قصيرة مستدقة. بطنها يرسمي الشكل، اصفر اللون تعلوه خمس

نقط سود || تألف المواقع التي تكثر فيها النباتات المغترية.

قوتها الحشرات المجنحة الصغيرة التي تمتص رحيق الازهار.

تسرح في النهار. سمها جانبي كسمي السلطعون ولذا سميت عنكبوت سلطعوني || عكدهتها جراب صغير القد

تنسجه بين الغضبان اليابسة تأوي اليه في الليل وفي زمن

بياتها الشتوي الذي يستمر نحو خمسة اشهر || ملجن

تطوراتها الحياتية وتناسلها لا يختلف عن ملجن سائر

العناكب || تعتبر من الدويبات اللامؤدية لانها لا تتعرض للنحل.

١١١٠٥ - ذَوْطِيَّات *^٥

Thomisidae (S). *Thomisidés* (F). *Thomisidae* (E).

فصيلة عناكب من الرتيلاوات. اجناسها وانواعها المعروفة

قليلة العدد منتشرة في جميع مناطق البلاد الحارة من العالم

١١٠٩١ - ذَوَاة

Agnelle (F). Ewe-lamb (E). البعجة الصغيرة، ج ذوى.

١١٠٩٢ - ذَوَاة

قشرة البليخة والحنظلة والعنبة.

١١٠٩٣ - ذَوَاق

Goût (F). Taste (E). الذواق هو طعم الشيء. تقول ذواقه طيب.

١١٠٩٤ - ذَوَاق *^٥

Jars (F). Gander (E). الذواق هو ذكر الاز.

١١٠٩٥ - ذَوْبَان

Fusibilité (F). Fusibility (E). قابلية الذوب.

١١٠٩٦ - ذَوْبَر *^٥

Heterobranchus (S). *Hétérobranche* (F).

جنس اسماك نهريه من مفتوحات المثانة وفصيلة السلوريات.

انواعه المعروفة خمسة اعطانها نهر القارة الافريقية انحصها

النيل والنيجر والسنگال والنمبي || اجسامها مستطيلة

الشكل، معتدلة التبطيط، تطول من ٢٥ الى ٤٥ سم.

تتميز برؤوسها المفلطحة وبانظامها المستديرة الاطراف،

السداسية العذبات الكبيرة. زعانفها الظهرية والشرجية

تنتهي عند قواعد الاذنان. اثوابها تراوح من الكهبة السراء

الى الشبهة الزرقاء. بطونها دائما فضية الموج. زعانفها

سراء اللون || لحمها متوسطة الصنف، مأكولة.

١١٠٩٧ - ذَوْبَل *^٥

Pseudopeziza جنس فطور مجهرية من السقديات وفصيلة الحشاريات

يتميز بسدائنه الصغيرة الحجم التي تتكون وتلتأ داخل

سافة النصل الادمية ثم تنطلق نحو الخارج. بريداتها

بسيطة شفافة شفعية الارتكاز تحضنها التكاثر المتشابهة

بالتكت الحيطية || اشهر انواعه المؤدية الاربعة التالية.

١١٠٩٨ - ذَوْبَل الفَصَّة *^٥

Pseudopeziza medicaginis (S).

فطر مجهرى يركب أوراق الفصة على صفحاتها العليا

فيعطها || مظهره الخارجي بقع صغيرة لا قياسية الشكل

وا لحجم تغلب فيها الاستدارة، لونها الى الشقرة الصفراء

ثم تنحرف نحو الجؤوة الحنطية المهدبة بالسرة. تركيب

نصال الأوراق القرية من التربة فتعطب وتسبب يباسها.

ومن خصائصه انه ينتشر في الخريف لان البرد يوافق مزاجه.

يكافح بتأخير الري لان الجفاف يضيئه ويقضي على

نشاطه.

١١٠٩٩ - ذَوْبَل الكَرْمَة *^٥

Pseudopeziza tracheiphila (S). Rougeot, Brenner

(F). Rot-Brenner (E).

فطر مجهرى يصيب الاوراق البالغة فيعطها ويؤذي الجفنة.

يظهر في الربيع على الاوراق البالغة، وهي اوراق الزام

الاول من السرع، من البقتين الى الثلاث بقع تركيب

النصل على صفحته العليا ثم تمتد وتنتشر الى ان يبلغ قطرها

نحو ٣ سم. لونها منوط بنوع الجفنة فهو اصعب اطحل

في الجفان البيض العنب وهو الى الجؤوة في الجفان الحمر.

يبلغ كامل انتشاره بسرعة فيسبب جفاف النسيج المنحار

ويعمج نصل الورقة ويقودها الى الذبول والاعمال الباكر.

فهو اذا يؤثر في المحصول لانه يحرمه الغذاء الناتج عن

الاوراق الساقطة || يكافح مكافحة التسنه (الميلديو)

على ان تكون الرشة الاولى بعد الازهار مباشرة.



ذوبر



ذوبل الفصة



ذوبل الكرمة



ذوبل الكشمش



ذوبل النفل



ذوطة




ذوطة الازهار




ذؤلف جوتني



ذؤلف



ذئار البندورة



ذئار البئر



ذئار البئر



ذئار القرعيات

الاخير وتقوده الى العفن والهرمان || يكافح وقائياً مكافحة غيره من الفطور وذلك باستعمال سائل بورديو او غيره من الفوطير الكيماوية عند تبشير الادراك .

١١١١٣ - ذئار الشمكار *

Glomerella cingulata, *G. fructigena*, *Gloeosporium fructigenum*, *G. rufomaculans*, *G. cingulatum*, *G. versicolor*, *Colletotrichum coffeanum*, *Septoria rufomaculans*, *Gnomoniopsis cingulata* (S). Pourriture amère des fruits (F). Bitter rot (E). Bitter-fäule (D).

فطر مجهري شديد الازى يصيب الياسم وثمار بعض الاشجار وفنديها منها التفاح والاجاص والسفرجل والدراق والخرخ والكرز والكرمة والتين والمنغا والقشدة والموز والحوخ والبن والكاكادو والشاي || مظهره الخارجى على ثمار التفاح والاجاص وغيرها يقع سمر مستديرة منخفضة تركيب الثمار عند ادراكها وتغور في لها فتكسبه بعض المارة ثم تتحول الى عفن ينتشر على بشرة الثمرة وفي داخلها فيقضي عليها ويسبب سقوطها على التربة او تحيطها على الشجرة . اما في الكرز فالثمرة الملوثة تجف وتبقى على الشجرة حتى الحريف حيث تسقط من امانها تاركة هذا الاخير عالقاً حيث كان || وهو على الافئاد والافئان لطح سمر داكنة لا قياسية الشكل والحجم تصيب الافئان في مراكز انتشارها على الفسود فتعطب البشرة واللحاء والشكير والخشب لانها ترقى وتجول من الخارج الى الداخل || اضراره محدودة رغم شدة وقعها لان انتشاره منوط بالعوامل الجوية المؤاتية وخصها ارتفاع الحرارة وكثرة الرطوبة || يكافح مبدئياً من حزيران الى آب باستعمال سائل بورديو نصفاً على الاشجار من ثلاث الى اربع مرات .

١١١١٤ - ذئار القرعيات * بشرة الخيار

Glomerella lagenarium, *Colletotrichum lagenarium*, *C. oligochaetum*, *Gloeosporium lagenarium*, *G. orbiculare* (S). Anthracnose des cucurbitacées, Nulle des cucurbitacées (F). Anthracnose of cucurbits (E). Anthracnose der gürkengewächse (D).

فطر مجهري يركب نباتات الفصيلة القرعية اخصها الخيار والبطيخ والشمام والقشاة والقرع || يركب القرعيات في مختلف ادوار حياتها وعلى اختلاف اعضائها . يصيب السوق في اول عهده فيذبل ويميته بعد ان يكسوه بلطح حنطية اللون ثم سمراء تجول نحو الداخل فتفسد الخلايا والوعية وتوقف التبادل النسبي || وهو على الاوراق يقع زيتية الموج لونها الى الخضار الباهت ثم يتحول الى الجؤرة فالسمة الداكنة فالذبول فالبياس . والبقع على النصل تبقى مستديرة حتى اقترابها من العروق حيث تصبح مقرنة الزوايا . وهو على المعاليق والسوق يقع لا قياسية تبدو خضراء صباء ثم تميل الى السمة || وهو على الثمار ، وقد يعتريها من الجهة المعرضة للرطوبة ، بقع سطحية بارزة لا قياسية الشكل والحجم تظهر شديدة الخضار ثم تميل الى الحنطية وتجول نحو الداخل فتسبب العفن والعطب || يكافح وقائياً وشفاً باستعمال اما سائل بورديو المركب (٥٠/٤/٤) والمخلول ١٪ او احد الفوطير الكيماوية الشديدة النشاط على ان تنضخ صفحات النصل من جهتيها العليا والسفلى . وقد يحسن استعمال النضخة الاولى عندما يكون النبات في دور النشوء السريع . اما الثانية فبعد العقد بأسبوع والثالثة بعد الثانية بأسبوعين || ومن الطرق الوقائية المستحسنة اجتناب الزراعة في المواقع الرطبة وفي الآتربة الكتومة وتطهير البذار بالفرمول عيار ٤٠ المركز ٢٪

القديم || جميعها صغيرة القد ، معتدلة الجرامز . تسمى وراة قنصها ركضاً وتغزاً || اشهر اجناسها الذؤلة .

١١١٠٦ - ذؤلف *

Griffinia (S).

Griffinie (F). *Griffinia* (E).

جنس نباتات عشبية دوفسية من فصيلة النرجسيات . مهدا البرازيل . اوراقها معنقة ، سنانية النصل . ازهارها صيواني التجميع . ازهارها ثنائية اللون || تزرع للزينة ضمن البيوت وفي الحدائق . ترغب في الاقربة المعتدلة الاندماج الوفرة المواد الغذائية . من عضوية ومعدنية . انواعها المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية :

١١١٠٧ - ذؤلف بلومينو *

Griffinia Blumenavia (S).

Griffinie de Blumenau (F).

نوع من الذؤلف . اوراقه تطول من ١٥ الى ٢٠ سم . وتعرض من ٥ الى ٨ سم . ازهاره صيواني التجميع يرتكز على شراخ يعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم . ازهاره بيضاء اللون ، مشيرة بالوردي || تنويره صيفي .

١١١٠٨ - ذؤلف جوتني *

Griffinia hyacinthina (S). *Griffinie jacinthe* (F).

نوع من الذؤلف . اوراقه تطول من ١٢ الى ١٨ سم . وتعرض من ٤ الى ٦ سم . نصلها جميلة الخضار الزيتي الموج . ازهاره صيواني التجميع يرتكز على شراخ يرتفع من ٢٥ الى ٥٠ سم . ازهاره بيض الوسط ، زرق الاطراف || تنويره صيفي .

١١١٠٩ - ذؤنون *

Lathraea (S).

Lathrée, *Clandestine*, *Madrade*, *Herbe à la matrice* (F). *Common tooth-wort* (E). *Echte schuppenwurz* (D). *Fuoco de boschi* (I).

جنس نباتات طفيلية من فصيلة الجعفيليات . انواعه ثلاثة تعيش في التراب على جذور بعض الاشجار والاعشاب فتؤذيها وتوقع بها الاضرار . جميعها عديمة الخصب صغيرة القد تعلق من ٥ الى ٣٠ سم . سوقها منتضبة ، ضنية الانتشاب متراكبة الحراشف الورقية الملونة . ازهارها عنقودي التجميع ، لون ازهارها يختلف مع النوع منه الابيض والاصفر والازرق الموشح بالوردي والبنفسجي . قيل ان غسيل المهبل بعصارته قبل ادراك زهره تفيد النساء العواقر .

١١١١٠ - ذؤليل *

Macrescence

ذبول جاف يحل بفصل وتويجات بعض الازهار فيمنعها عن السقوط .

١١١١١ - ذئار *

Glomerella

جنس فطور مجهرية من الدشميات وقصيلة الخشاريات . اعسانه سمر خضمة او اجاصية الهيئة . قصباته زميرية التجميع تحضنها زيمية وسادية الشكل . تكاته شفافة صقية مستطيلة || انواعه عديدة اشهرها ما يتبع .

١١١١٢ - ذئار البندورة *

Glomerella lycopersici, *Gloeosporium lycopersici* (S). *Anthracnose de la tomate* (F). *Anthracnose of tomato* (E).

فطر مجهري يصيب ثمار البندورة فيعقرها ويعرضها الى العفن والهرمان . مظهره الخارجى يقع مستديرة حنطية اللون تركيب الثمار الناضجة فتعطب البشرة واللبن ثم تغمر هذا

وأبو العطلس وأبو كاسب وأبو سيلة || ومن الامثال الضرورية به : أسرصر وأغدر وأظلم وأعق من ذئب .

١١١١٩ - ذئب أسود
Canis niger (S).
Loup noir (F). Black wolf (E).

نوع من الذئاب موطنه أمريكا الشمالية . يعيش قرب مجاري الماء . طوله نحو ١٣٠ سم . وارتفاعه ٥٠ سم . يتميز باستطالة ذنبه الجلل . ثوبه الى السمرة السوداء .

١١١٢٠ - ذئب أغبر ، ذئب هندي
Canis pallipes (S). Loup indien (F). Indian wolf (E).
نوع من الذئاب موطنه الهند يألف السهل والقفور . ثوبه الى السمرة الخطية يعبق مع اقترابه من ثبج الظهر . بطنه ابيض اغبر . طوله نحو ١٣٠ سم . وارتفاعه ٤٥ سم .

١١١٢١ - ذئب أغبس* ، ذئب حضرموت ،
أغبس
Canis hadramauticus (S).
Loup du Hedjaz (F). Hadramautwoy (E).

نوع من الذئاب موطنه الجزيرة العربية . ثوبه اغبس اللون ، بطنه الى الصهبة الخطية . طوله نحو ١٢٠ سم . وعلوه ٤٥ سم .

١١١٢٢ - ذئب أسترالية* ، دنكو
Canis dingo (S). Dingo (F).

قيل انه ليس من الذئاب بل هو كلب مستوحش . موطنه استرالية . جثته جثة الكلب ، طوله نحو ١٤٠ سم . وارتفاعه يراوح من ٥٥ الى ٦٠ سم . خطمه ذلق مستطيل . اذناه قصيرتان ، ذنبه منسدل الارتكاز ، جثل الصوف ، ثوبه الى الصهبة الصنابية .

١١١٢٣ - ذئب الثبت
Canis laniger (S).
Loup laniger (F). Laniger wolf (E).

نوع من الذئاب موطنه الثبت ، ثوبه الى الصهبة الارباء يسمر مع اقترابه من ثبج الظهر . طوله نحو ١٣٠ سم . وارتفاعه ٦٠ سم .

١١١٢٤ - ذئب الحبشة
Canis simensis (S).
Cabéru, Loup d'Abyssinie (F). Cabéru, Kaberu, Abyssinian wolf (E).

نوع من الذئاب موطنه الحبشة وجميع مناطق افريقية الشرقية والجنوبية . جسمه اهيف الشكل ، طوله نحو ١٢٥ سم . وارتفاعه نحو ٨٠ سم . خطمه ذلق مستطيل . اذناه كبيرتان ، ذنبه جثل الصوف اللبد ، ثوبه الى الصهبة يعبق مع اقترابه من ثبج الظهر وينحرف الى الابيض التبي عند البطن .

١١١٢٥ - ذئب أمريكي*
Canis occidentalis (S).
Loup occidental, L. d'Amérique (F). Black wolf of America (E).

نوع من الذئاب ، موطنه أمريكا الشمالية من المكسيك الى كندا . ثوبه متباين الالوان التي تختلف باختلاف المناطق وفصول السنة . جثته قريبة الشبه من جثة الذئب المألوف .

١١١٢٦ - ذئب أمغر* ، ذئب العفرة
Canis jubatus (S). Loup à crinière, L. rouge, L. des pampas, Aguara (F). Red wolf, Aguara (E).

نوع من الذئاب موطنه أمريكا الجنوبية . جثته مستطيلة الشكل وقوائمه كذلك . ثوبه الى الصهبة السفعاء المواج . ثبج ظهره الى السمرة العابقة . عفرته بيضاء دون ان تكون جليلة الوضوح . يألف الاماكن الرطبة يقتنص الحيوان والطير والافاعي لكنه يخشى الانسان .

١١١١٥ - ذئار القطن*

Glomerella gossypii, Gloeosporium gossypii, Colletotrichum gossypii (S). Anthracnose du cotonnier (F). Anthracnose of cotton tree (E).

فطر مجهري يصيب القطن من سوقه الى عفازه فيؤذيه اشد الاذى . مظهره الخارجي بقع صغيرة مستديرة لونها الى الحمرة تركب السوق والاوراق والعفاز فتسبب يباس النسيج المنحارة بعد ان تقعرها وتعطب التيل داخل العفازة وقد تخضبها بالاحمر او توقع فيه العفن || يكافح عند ظهوره باستعمال احد الفواطير الكيماوية غير المرتكزة على النحاس || ومنهم من طهر البذار بالحرارة التي تخلص قوة الانتاش بعد ان تقضي على جراثيم الفطور .

١١١١٦ - ذئار اللوبياء*

Glomerella lindemuthianum, Gloeosporium lindemuthianum, Colletotrichum lindemuthianum (S). Anthracnose du haricot (F). Bean anthracnose (E). Brennfleckenkrankheit der bohnen und erbsen (D).

فطر مجهري يصيب اللوبياء من سوقها الى ثمارها فيؤذيها ويعطبها . مظهره الخارجي بقع مهدبة لا قياسية الشكل والحجم تغلب فيها الاستدارة لونها يراوح من الصهبة الى السمرة . تركب السوق والاوراق والقرون فتقعرها وتجول من الخارج الى الداخل فتعطب الحب وتوشم ببقع حنطية تغلب فيها الحمرة || يكافح عند ظهور الوصم باستعمال سائل يورده المحلول من ١ الى ١,٥ ٪ او غيره من الفواطير الكيماوية . ومن المستحسن ، في سبيل الحيلة والوقاية ، تطهير البذار عند استعماله وذلك بنقعه نحو ربع ساعة بالفرمول المركز من ١٠ الى ٠,٤ ٪ .

١١١١٧ - ذئب ، سبع
Le Loup, la Bête (F).
Lupus (E).


السبع والذئب اسمان لكوكبة نجوم واحدة موقعها في الجنوب الغربي . مركزها تحت برج العقرب خلف كوكبة قنطورس القابض على يد السبع || عدد نجومها ٥١ والعرب تسمي هذه الكوكبة مع كوكبة قنطورس مجتمعتين « الثماريخ » || أشهر نجم منها يقع في المرتبة الثالثة ويدعى « ليقون » .

١١١١٨ - ذئب ، بلسكال
Canis lupus (S).
Loup (F). Wolf (E).

جنس حيوانات من فصيلة الكلبيات ورتبة اللوامح . انواعه وسلالاته عديدة جميعها من الحيوانات الضارية المفترسة . يعيش على الجيف وعلى لحوم الحيوانات التي يتمكن من افتراسها . لا يقرب الانسان الا عند الجوع القاهر || قد الكلب الكبير طوله يراوح من ١٠٠ الى ١٦٥ سم . ارتفاعه من ٤٠ الى ٨٥ . رأسه مستعرض القفن ، ذلق الخطم . عيناه مستديرتان ، اذناه منتصبتان . ذيله جثل الور منسدل الارتكاز . ثوبه اغيش اللون يهت ويمبق مع فصول السنة || يألف الجبال والسهول والصحارى . وهو حاد البصر والسمع ، مرهف احساس الشم ، سريع العدو ، قليل الجسارة ، كثير الحذر والخوف || محبل الانثى يدوم ٦٣ يوماً تضع في نهايته من ٤ الى ٦ جراء تبقى مغضاة الاجفان نحو ١٠ ايام . رضاعتها تدوم من ٥ الى ٦ اسابيع || انثى الذئب ذئبة . وجمع القطة اذؤب وجمع الكثرة ذئاب . وللذئب اسماء عديدة ، أشهرها : السيد والحافظ والسرطان والسلق وذؤالة والعلمس وأويس . والانثى سلفة ومسام || ومن كناه الشهيرة : ابو مذقة وابو جعدة وابو جاعد وابو تهامة وابو رعدة وابو سلعامة



ذئار القطن



ذئار اللوبياء



ذئب اغبس



ذئب استراليه



ذئب امريكي



ذئب امغر



ذئب مألوف



ذئب مصري



ذيل الارنب



ذيل الثعلب



ذيل الحصان



ذيلفان

Mousetail (E). Ackerfuchsschwanz, Kölbchengras (D). Alopecoro agreste, Codolino dei campi (I).

نبات عشبي بري كلاتي من فصيلة النجيليات يكثر في المراعي وفي الأراضي المروية.

١١١٤٢ - ذيل الحصان * Hippuris vulgaris (S).

Pesse d'eau, Pin aquatique (F). Mare's-tail, Bottle-brush, Witche's milk (E). Gemeiner cannwedel, Schaftholm (D). Coda di cavallo, Pino acquatico, Falso abeto (I).

نبات عشبي منقعي من فصيلة الزمكيات. ساقه منتصبة تعلو نحو ٥٠ سم. أوراقه هدية ضمية التجميع. أزهاره محورية الارتكاز، لبد، متراكبة || يقال انه لا يخلو من بعض الخواص الطبية وأنه مدر للبول.

١١١٤٣ - ذيل الخروف هو الخزام الابيض، اطلبه.

١١١٤٤ - ذيل الفار Polypogon (S). Polypogon, Queue de rat (F). Annual beard grass (E). Wilder fenchel (D). Polipogono (I).

جنس نباتات عشبية برية حولية من فصيلة النجيليات. تعلو من ١٠ الى ٣٠ سم. أوراقها عصفية خلية النصل. أزهارها سنبل لبد مستدير || يكثر في الأراضي المروية. ترعاه الماشية بشبهة.

١١١٤٥ - ذيل القط

هو العصوية من النجيليات العلفية، اطلبها.

١١١٤٦ - ذيل الكلب هو الساهر، اطلبه.

١١١٤٧ - ذيلان، لزان مجنح

Podocytisus (S). Podocytis (F). Podocytisus (E).

جنبه برية وتزيينية معمرة من فصيلة السنبلات. مهدا هضاب وهام البحر الابيض المتوسط. ساقها فرعاء تعلو من متر الى مترين. أوراقها سنانية الشكل. فصاها معتدلة السماكة لونها الى الخضار البحري. أزهارها عنقودي التجميع، منتصب الارتكاز. أزهارها الى الصفرة الذهبية. حنابلها مبطة، مجنحة الحواشي، مستطيلة الزيدات || تنويرها يستمر طوال شهر تموز.

١١١٤٨ - ذيلبة Urostège (F).

الذيلبة هي الصفحة الواحدة من الصفائح التي تغلف مدب ذئب الحية. ج ذياب. اما صفحة البطن فتدعى دعبلة.

١١١٤٩ - ذيلفان * Gastrana (S).

Gastrane (F). Gastrana (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة الطليسيات. انواعه المعاصرة المعروفة نحو عشرة. اعطانها جميع بحار العالم القديم || اصداها شبه بيضية الشكل، كبيرة القد، بعضها يطول نحو ٦ سم. ألوانها متداخلة الاحمر والوردي والاصفر. اجسامها كبيرة. مشاعها مستطيلة، طليقة || لحومها مأكولة، جيدة الصنف.

١١١٥٠ - ذيلي Caudal (F). Caudal (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما له علاقة بذيل الحيوان، كقولك زعنفة ذيلية.

١١١٥١ - ذيم Difformité (F). Deformity (E).

معاية في الشكل مرجحها عدم التناسب.

١١١٥٢ - ذيوغ راجع تسامع.

١١١٢٧ - ذئب ذفر Canis nubilus (S).

Loup odorant (F). Sweet-smelling wolf (E).

نوع من الذئب، موطنه جبال فلوريدا وجوارها، ثوبه الى الصهبة الجذوية. طوله بما فيه الذئب يبلغ نحو ١٤٠ سم. وارتفاعه ٧٠ سم.

١١١٢٨ - ذئب مألوف * Canis lupus (S).

Loup commun (F). Common wolf, European wolf (E).

هو الذئب الشائع المعروف. موطنه شاسع الاطراف يمتد من اقاصي الشرق الى اوروبا الشمالية. ثوبه الى الصهبة الخنطية السمر. طوله نحو ١٦٠ سم. وارتفاعه ٧٥ سم. وهو من انشط انواع جنسه واصلها عوداً واخبثها خلقاً.

١١١٢٩ - ذئب مصري * Canis lupaster (S).

Loup d'Egypte (F). Egyptian wolf (E).

نوع من الذئب، موطنه فسيح الارحاء يمتد من شواطئ البحر الاحمر الى صحارى ليبيا وتونس. ثوبه اغبس اللون. بطنه الى الصهبة الصنابية. قوائمه الى الجذوة السمر. طوله نحو ١٣٠ سم. وارتفاعه ٥٠ سم.

١١١٣٠ - ذئبان

بقية الوبر بعد الجز. والوبر على عنق البعير ومشفره.

١١١٣١ - ذئبة Louve (F). She-wolf (E).

انثى الذئب.

١١١٣٢ - ذئبتين

الذئبتين لجهان ليران من كوكبة التنين مركزها على مؤخره.

١١١٣٣ - ذيتال هو الثور الوحشي.

١١١٣٤ - ذيتالة، ذيتالات Marcoures

رتيبة حيوانات من القشريات العشاريات الارجل.

١١١٣٥ - ذينخ

الذينخ نجم احمر في اصل ذئب التنين، راجع تنين.

١١١٣٦ - ذينخ

الذينخ: قنر النخلة، ج ذينة. يقال ذينخت النخلة اذا اذا لم تقبل الابار ولم تعقد شيئاً.

١١١٣٧ - ذينخ هي الضيع الرقطاء، اطلبها.

١١١٣٨ - ذيفسان، توكسين Toxine (F). Toxin (E).

هو القشب، اطلبه.

١١١٣٩ - ذيل Queue (F). Tail (E).

هو الذئب او ما اسبل منه فتعلق.

١١١٤٠ - ذيل الارنب، شعر الارنب

Lagurus (S). Lagure, Queue de lièvre (F). Hare's-tail grass, Turk's-head grass (E). Echter hasenschwanz, Hasenschwanzgras (D). Coda di lepre, Gatto grasso Plumino (I).

من اليوناني بمعنى ذيل الارنب. جنس نباتات عشبية مرجية حولية برية وتزيينية من فصيلة النجيليات. أوراقها كثيفة التجميع خلية النصل المستعرض القصير. أزهارها سنبل، سنبلتها بيضية الشكل صوفية الملمس تشبه ذيل الارنب طولها نحو ٤ سم. وهي قابلة للتخصيب بمختلف الالوان، كثيرة الاستعمال التزييني.

١١١٤١ - ذيل الثعلب، ثعلبية الحقول

Alopecurus agrestis (S). Alopécure des champs, Vulpin des champs (F). Black grass, Slender foxtail,

أُنجزت «المطبعة الكاثوليكية ش م ل»
في عاريا - لبنان
طباعة الجزء الأول من «الموسوعة في علوم الطبيعة»
في العام ١٩٨٨

*L'Encyclopédie des Sciences de la Nature
se compose de quatre volumes, dont le dernier
comprend les lexiques des termes
allemands,
anglais,
français,
grecs,
italiens et
latins.*

Edouard Ghaleb
Ingénieur agronome

ENCYCLOPEDIE DES SCIENCES DE LA NATURE

ENCYCLOPEDIA OF NATURAL SCIENCES

Agriculture, Botanique, Zoologie, Ornithologie,
Ichtyologie, Entomologie, Parasitologie, Bactériologie,
Microbiologie, Affections animales et végétales.

Termes techniques:

(Physique, Chimie, Mathématiques, Géologie, Astronomie, Droit)

Volume I

2ème ÉDITION REVUE ET AUGMENTÉE



Dar el-Machreq sarl
Beyrouth

**ENCYCLOPEDIE DES
SCIENCES DE LA NATURE**

**ENCYCLOPEDIA
OF NATURAL SCIENCES**



Dar el-Machreq sarl
Boîte Postale 946 Beyrouth, Liban



Distribution :
Librairie Orientale – Boîte Postale 1986
Beyrouth, Liban

ARTICLES ET INDEX
en arabe, anglais, français
allemand, italien, latin et grec






Edouard Ghaleb **ENCYCLOPEDIE DES
SCIENCES DE LA NATURE**

Agriculture • Botanique • Zoologie • Géologie

**ENCYCLOPEDIA
OF NATURAL SCIENCES**

2420 pages • 31464 articles
6962 illustrations • 24 planches en couleurs

Agriculture • Botany • Zoology • Geology



DAR EL-MACHREQ
BEYROUTH